

《数理方程与特殊函数》练习册
(第十版)

练习一

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 写出长度为 L 的弦振动的边界条件和初值条件:

- (1) 端点 $x = 0, x = L$ 是固定的;
- (2) 初始位移为 $f(x)$;
- (3) 初始速度为 $g(x)$;
- (4) 弦上任何一点处, 在时刻 t 时的位移是有界的.

2. 写出长度为 L 的弦振动的边界条件:

- (1) 在端点 $x = 0$ 处, 弦是移动的, 由 $g(t)$ 给出;
- (2) 在端点 $x = L$ 处, 弦不固定地自由移动.

3. 长度为 L 的各向同性均匀细长导热体, 已知其侧面绝热, 两端保持 0 度, 初始温度分布为 $u|_{t=0} = \varphi(x)$ 且无热源, 试写出相应的定解问题.

4. 下列偏微分方程哪些是线性的, 哪些是非线性的? 它们分别是几阶偏微分方程? 哪些偏微分方程含有自由项?

(1) $u_t = u_{xx} + u_{yy} + \sin(x^2 + y^2)$;

(2) $u_t + uu_x = 0$ (无粘性Burgers方程);

(3) $u_{tt} + 2u_t = u_{xx}$ (电报方程);

(4) $u_t + uu_x + u_{xxx} = 0$ (KdV方程);

(5) $u_{xx} + u_{yy} = y \sin x$.

练习 二

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 证明 $u(x, t) = e^{-8t} \sin 2x$ 是如下定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \\ u(x, 0) = \sin 2x \end{cases}$$

的古典解.

2. 设 F, G 是二次可微函数,

(1) 证明 $u(x, t) = F(2x + 5t) + G(2x - 5t)$ 是方程 $4u_{tt} = 25u_{xx}$ 的通解;

(2) 求其满足定解条件

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = \sin 2x, \quad u_t(x, 0) = 0$$

的特解.

3. (1) 求二阶偏微分方程 $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} u = x^2 y$ 的通解;
(2) 求该方程满足定解条件 $u(x, 0) = x^2$, $u(1, y) = \cos y$ 的特解.

4. 验证函数 $u = f(xy)$ 是方程 $xu_x - yu_y = 0$ 的解, 其中 f 是任意连续可微函数.

练习 三

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 写出下列固有值问题的固有值和固有函数(无需给出计算步骤):

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X(0) = X'(l) = 0. \end{cases}$$

2. 求如下定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \ t > 0, \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 3 \sin \frac{3\pi x}{2l} + 6 \sin \frac{5\pi x}{2l}, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

3. 写出下列固有值问题的固有值和固有函数(无需给出计算步骤):

$$\begin{cases} X''(x) + (\lambda + 2)X(x) = 0, \\ X(0) = X(1) = 0. \end{cases}$$

4. 求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + 2u, & 0 < x < 1, \ t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \sqrt{\pi^2 - 2} \sin \pi x. \end{cases}$$

练习 四

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \ t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(l - x), & 0 < x < l. \end{cases}$$

2. 求下列固有值问题的固有值和固有函数:

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

3. 求如下定解问题的解:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 2, \ t > 0, \\ u_x(0, t) = u(2, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 4 \cos \frac{5\pi x}{4}, & 0 < x < 2. \end{cases}$$

4. 求如下定解问题的解:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 2u_x, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x} \sin \pi x, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

练习 五

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ u_x(0, y) = 0, \quad u_x(1, y) = 0, & 0 < y < 1 \\ u(x, 0) = 1 + \cos 3\pi x, \quad u(x, 1) = 3 \cos 2\pi x. \end{cases}$$

2. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0, & 1 < r < 2, \ 0 < \theta \leq 2\pi, \\ u(1, \theta) = 0, \quad u(2, \theta) = u_0, & 0 < \theta \leq 2\pi \\ u(r, 0) = u(r, 2\pi). \end{cases}$$

3. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0, & 0 < r < 1, \ 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ u(r, 0) = 0, \quad u(r, \frac{\pi}{2}) = 0, & 0 < r < 1, \\ u(1, \theta) = \theta(\frac{\pi}{2} - \theta), \quad |u(0, \theta)| < +\infty. \end{cases}$$

4. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < \pi, \ 0 < y < +\infty, \\ u(0, y) = 0, \quad u(\pi, y) = 0, & 0 < y < +\infty, \\ u(x, 0) = \sin 5x, \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0. \end{cases}$$

练习 六

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + \cos \pi x, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

2. 求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + t \sin \frac{\pi x}{l}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < l. \end{cases}$$

3. 求如下定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = -2x, & x^2 + y^2 < 1, \\ u|_{x^2+y^2=1} = 1. \end{cases}$$

4. 求如下定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = r \sin \theta, & 0 < r < 1, \ 0 < \theta < \pi, \\ u(r, 0) = 0, \quad u(r, \pi) = 0, & 0 < r < 1, \\ u(1, \theta) = 0, \quad |u(0, \theta)| < +\infty. \end{cases}$$

练习 七

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \ t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 1, & t > 0, \\ u(x, 0) = \sin \frac{3\pi x}{l} + \frac{x}{l}, \quad u_t(x, 0) = x(l - x) & 0 < x < l. \end{cases}$$

2. 求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = 8u_{xx} + \cos t + e^t \sin \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, \ t > 0, \\ u(0, t) = \sin t, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

3. 求如下定解问题的解:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 2u_x - 1, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 1, & t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x} \sin \pi x + \frac{x}{2} + \frac{1-e^{-2x}}{2(1-e^{-2})}, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

练习 八

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = 2u_{xx} + 4 + 2e^{-x}, & 0 < x < 3, t > 0, \\ u_x(0, t) = 1, \quad u(3, t) = -18 - e^{-3}, & t > 0, \\ u(x, 0) = -2x^2 - e^{-x}, & 0 < x < 3. \end{cases}$$

2. 求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 6(x-1), & 0 < x < 2, \ t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(2, t) = 1, & t > 0, \\ u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{4} + x^3 - 3x^2 + x, & 0 < x < 2. \end{cases}$$

3. 求如下定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = \sin \pi x, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \\ u(0, y) = 1, \quad u(1, y) = 2, & 0 < y < 1, \\ u(x, 0) = 1 + x, \quad u(x, 1) = 1 + x - \pi^{-2} \sin \pi x, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

练习 九

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求解如下特征值问题的特征值与特征函数:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(-\pi) = X(\pi), \quad X'(-\pi) = X'(\pi). \end{cases}$$

2. 证明固有值问题:

$$\begin{cases} x^2 y''(x) + xy'(x) + \lambda y(x) = 0, \\ y(1) = y(e) = 0 \end{cases}$$

的固有函数系 $\{y_n(x) : n = 1, 2, \dots\}$ 在区间 $[1, e]$ 上带权 $\frac{1}{x}$ 正交.

3. 设 $u(x, t)$ 是热传导方程初边值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

的古典解, 试证明 $u(x, t) \equiv 0$. (提示: 方程乘以 u 后对 x 积分)

4. 设 $u(x, t)$ 是弦振动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, & u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

的古典解, 试证明 $u(x, t) \equiv 0$. (提示: 方程乘以 u_t 后对 x 积分)

练习十

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

2. 求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + at + x, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

3. 用行波法求下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -at < x < 0, \quad t > 0, \\ u|_{x=0} = \phi(t), & u|_{x+at=0} = \psi(x). \end{cases}$$

练习 十一

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求解以下三维波动方程的Cauchy问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), & -\infty < x, y, z < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = xy, \quad u_t(x, y, z, 0) = xz, & -\infty < x, y, z < +\infty. \end{cases}$$

2. 求解以下二维波动方程的Cauchy问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & -\infty < x, y < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, y, 0) = x^2(x + y), \quad u_t(x, y, 0) = 0, & -\infty < x, y < +\infty. \end{cases}$$

3. 类比一维波动方程柯西问题的齐次化原理, 写出三维波动方程柯西问题的齐次化原理.

练习 十二

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 用积分变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \cos x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

2. 用积分变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 1, & |u(x, t)| \leq M, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

3. 用积分变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(0, t) = A \sin \omega t, & |u(x, t)| \leq M, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

4. 用积分变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = \cos 3\pi x, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

练习 十三

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 用积分变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t = t^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

2. 用积分变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + ku, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

3. 用积分变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t + u_x + u = 0, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \\ u(x, 0) = 1. \end{cases}$$

4. 用积分变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 2tu, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

练习 十四

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 用 K_R 表示 \mathbb{R}^3 中以原点为中心以 R 为半径的开球, Γ_R 表示 \mathbb{R}^3 中以原点为中心以 R 为半径的球面. 若 u 是如下定解问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in K_R, \\ u|_{\Gamma_R} = 1 + \sin xy^2 z^3, \end{cases}$$

利用极值原理证明: 在 K_R 内, $u > 0$.

2. 记号同上题所述, 再用 $\overline{K_R}$ 表示 \mathbb{R}^3 中以原点为中心以 R 为半径的闭球. 若 $0 < r < R$, 且 u 是如下定解问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in K_R \setminus \overline{K_r}, \\ u|_{\Gamma_r} = 1, & u|_{\Gamma_R} = 2, \end{cases}$$

证明: 在区域 $K_R \setminus \overline{K_r}$ 内, $1 < u < 2$.

3. 若 $u(r, \theta, \phi)$ 是单位开球 K_1 内的调和函数在极坐标系下的表示, 且它在闭单位球 $\overline{K_1}$ 上连续. 若 $u(r, \theta, \phi)$ 在上半单位球面上为 $1 - \sin \theta$, 在下半单位球面上恒为 0, 试证明在单位球 K_1 内 $0 < u(r, \theta, \phi) < 1$, 并求 $u(r, \theta, \phi)$ 在 $r = 0$ 的值.

练习 十五

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 设 D 为平面有界区域, 其边界 C 是分段光滑的封闭曲线. 设 u 在 D 中调和, 且在 $\bar{D} = D \cup C$ 上连续可微, 试证明二维调和函数的积分表达式(其中 n 是区域 D 在边界上的外法向):

$$u(M_0) = -\frac{1}{2\pi} \int_C \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{\partial u}{\partial n} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} \right] ds, \quad M_0 \in D.$$

2. 在下半平面 $y < 0$ 内求解拉普拉斯方程的边值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & -\infty < x < +\infty, \quad -\infty < y < 0, \\ u|_{y=0} = f(x). \end{cases}$$

3. 分别用分离变量法和格林函数法求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0, & 0 < r < 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \\ |u(r, \theta)| < +\infty, \\ u(1, \theta) = 2 \cos \theta, & 0 \leq \theta < 2\pi. \end{cases}$$

4. 设 A, B, R 为常数, 用试探法求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0, & 0 < r < R, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \\ |u(r, \theta)| < +\infty, \\ u(R, \theta) = A \cos \theta + B \sin \theta, & 0 \leq \theta < 2\pi. \end{cases}$$

练习 十六

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 设 Ω 是 \mathbb{R}^3 中以分片光滑封闭曲面 Γ 为边界的有界区域, 若边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + ku|_{\Gamma} = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \Gamma \end{cases}$$

有解(其中常数 $k > 0$, n 是曲面 Γ 的单位外法向), 试证明其解是唯一的(提示: 用格林第一公式).

2. 设 Ω 为 \mathbb{R}^3 中任意区域, 函数 u 在 Ω 内二阶连续可微. 若对任何球面 $\Gamma \subset \Omega$, 只要它的内部也包含在 Ω 中, 就有

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0,$$

则 u 是 Ω 上的调和函数, 其中 n 是球面 Γ 的单位外法向(提示: 用格林第二公式).

3. 设 u 是 \mathbb{R}^3 上的二阶连续可微函数, 若 $\Delta u \geq 0$, 则称 u 是下调和的. 试证明: u 在 \mathbb{R}^3 中下调和的充分必要条件是对任何球面 Γ 都有:

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} dS \geq 0,$$

这里, n 是球面 Γ 的单位外法向(提示: 用格林公式).

练习 十七

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 证明下列等式成立:

$$(1) \frac{d}{dx}[xJ_0(x)J_1(x)] = x[J_0^2(x) - J_1^2(x)];$$

$$(2) \int x^2 J_1(x) dx = 2xJ_1(x) - x^2 J_0(x) + C;$$

$$(3) J_2(x) - J_0(x) = 2J_0''(x);$$

$$(4) \int x^n J_0(x) dx = x^n J_1(x) + (n-1)x^{n-1} J_0(x) - (n-1)^2 \int x^{n-2} J_0(x) dx.$$

2. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^3 (3-x) J_0\left(\frac{\mu_2^{(0)}}{3}x\right) dx;$$

$$(2) \int_0^R r(R^2 - r^2) J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{R}r\right) dr.$$

3. 设 $\mu_m^{(1)}$ ($m = 1, 2, \dots$) 是 $J_1(x)$ 的正零点, 将函数 $f(x) = x$ ($0 < x < 1$) 展成 $J_1(\mu_m^{(1)} x)$ 的傅立叶-贝塞尔级数.

练习 十八

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 得分: _____

1. 求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r, & 0 < r < 1, \quad t > 0, \\ u(1, t) = 0, & |u(r, t)| < +\infty, \\ u(r, 0) = 1 - r^2. \end{cases}$$

2. 求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + u_{zz} = 0, & 0 < r < 1, \quad 0 < z < 1, \\ u(1, z) = 0, & |u(0, t)| < +\infty, \\ u_z(r, 0) = 0, & u(r, 1) = 1. \end{cases}$$

3. 设 A 为常数, 用固有函数法求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{rr} + \frac{1}{r}u_r) + A, & 0 < r < 1, \quad t > 0, \\ u(1, t) = 0, & |u(r, t)| < +\infty, \\ u(r, 0) = 0, & u_t(r, 0) = 0. \end{cases}$$

4. 设 A 为常数, 用固有函数法求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{rr} + \frac{1}{r}u_r) + u, & 0 < r < 1, \quad t > 0, \\ u(1, t) = 0, & |u(r, t)| < +\infty, \\ u(r, 0) = 1 - r. \end{cases}$$