

## Computing Method - Chapter2&5

Zhixin Zhang, 3210106357

16

在(2.33)式中, 令  $n = 2$ , 求  $f'(x_0), f'(x_1), f'(x_2)$ .

解: 令  $x = x_0 + th, x_k = x_0 + kh (k = 0, 1, 2)$ ,

$$\varphi_2(x) = f_0 + t\Delta f_0 + \frac{t(t-1)}{2}\Delta^2 f_0 = f_0 + \frac{x-x_0}{h}(f_1 - f_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_0-h)}{2h^2}(f_2 - 2f_1 + f_0)$$

所以

$$\varphi_2'(x) = \frac{f_1 - f_0}{h} + \frac{f_2 - 2f_1 + f_0}{2h^2}(2x - 2x_0 - h)$$

代入  $x_0, x_1, x_2$  得

$$\begin{cases} f'(x_0) = \frac{f_1 - f_0}{h} - \frac{f_2 - 2f_1 + f_0}{2h} = \frac{4f_1 - f_2 - 3f_0}{2h} \\ f'(x_1) = \frac{f_1 - f_0}{h} + \frac{f_2 - 2f_1 + f_0}{2h} = \frac{f_2 - f_0}{2h} \\ f'(x_2) = \frac{f_1 - f_0}{h} + \frac{3(f_2 - 2f_1 + f_0)}{2h} = \frac{-4f_1 + f_0 + 3f_2}{2h} \end{cases}$$

□

### 补充题

求  $x_1, x_2, A_1, A_2$ , 满足

$$\int_0^1 e^x f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

具有最高代数精度 (精确到 0.0001)

解:

$$\begin{cases} \int_0^1 e^x dx = e - 1 = A_1 + A_2 \\ \int_0^1 x e^x dx = 1 = A_1 x_1 + A_2 x_2 \\ \int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 = A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 \\ \int_0^1 x^3 e^x dx = 6 - 2e = A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 \end{cases}$$

求解的 python 代码如下:

```
from scipy.optimize import fsolve
import numpy as np

def equations(vars):
    A1, A2, x1, x2 = vars

    e_minus_1 = np.exp(1) - 1
    integral_x_ex = 1
```

```
integral_x2_ex = np.exp(1) - 2
integral_x3_ex = 6 - 2 * np.exp(1)

eq1 = A1 + A2 - e_minus_1
eq2 = A1 * x1 + A2 * x2 - integral_x_ex
eq3 = A1 * x1**2 + A2 * x2**2 - integral_x2_ex
eq4 = A1 * x1**3 + A2 * x2**3 - integral_x3_ex

return np.array([eq1, eq2, eq3, eq4])

initial_guesses = [0.5, 0.5, 0.25, 0.75]

result = fsolve(equations, initial_guesses)
print(f"Results: A1 = {result[0]}, A2 = {result[1]}, x1 = {result[2]}, x2 = {result[3]}")

# Results: A1 = 0.7131482910221459, A2 = 1.005133537436899, x1 = 0.24760397941963827, x2
= 0.8192161683583419
```

所以，

$$\begin{cases} A_1 = 0.7131 \\ A_2 = 1.0051 \\ x_1 = 0.2476 \\ x_2 = 0.8192 \end{cases}$$

□