

代数学

第三卷

交换代数与代数几何方法

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 素谱、有限性与整性	1
第一章 素理想、根理想与素谱	5
1.1 素理想与极大理想	5
1.1.1 素理想与商整环	5
1.1.2 极大理想与剩余域	6
1.1.3 素理想存在性的集合论条件	6
1.2 根与约化	7
1.2.1 幂零根与根理想	7
1.2.2 根理想的素理想交表示	8
1.2.3 约化环与零维例子	9
1.3 素谱的拓扑	9
1.3.1 Zariski 闭集与基本开集	9
1.3.2 拟紧性与不可约闭集	10
1.3.3 一般点与闭点	11
1.4 环同态与素谱	11
1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射	11
1.4.2 商环与闭子空间	12
1.4.3 主开集与一般局部化的谱	12
习题	13
第二章 模的局部化、局部环与局部判据	17
2.1 模局部化	17
2.1.1 分式模的构造	17
2.1.2 模局部化的张量描述	18
2.1.3 局部化的正合性	19
2.2 理想与局部化	19
2.2.1 扩张、收缩与饱和	20
2.2.2 局部化中的素理想对应	20
2.2.3 剩余域与纤维	21
2.3 模的支集	21
2.3.1 支集、零化子与有限生成性	22
2.3.2 局部化与 Hom 的交换条件	22

2.3.3	短正合列中的支集	23
2.4	局部—整体原则	24
2.4.1	元素与模的消失判据	24
2.4.2	单射、满射与同构的局部检测	24
2.4.3	素理想检测与极大理想检测	25
2.5	局部环与局部同态	26
2.5.1	局部环的单位、极大理想与剩余域	26
2.5.2	局部同态与点处局部环	26
2.5.3	多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环	27
2.5.4	局部化、Hensel 化与完备化的比较	27
	习题	28
第三章	Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理	33
3.1	有限性条件	33
3.1.1	有限生成与有限展示	33
3.1.2	Noether 环上的有限生成模	34
3.1.3	Hilbert 基定理的模论后果	35
3.2	Nakayama 引理	35
3.2.1	行列式技巧	35
3.2.2	Jacobson 根版本与局部环版本	36
3.2.3	极小生成元与剩余向量空间	37
3.3	Artin 环	38
3.3.1	降链条件与有限长度	38
3.3.2	交换 Artin 环的局部直积分解	39
3.3.3	幂零根与零维 Noether 环	40
3.4	有限性在变换下的行为	40
3.4.1	商、局部化与有限代数	40
3.4.2	Noether 环的非 Noether 子环	41
3.4.3	有限性假设的适用范围	42
	习题	43
第四章	关联素理想与准素分解	48
4.1	关联素理想	48
4.1.1	元素零化子的索性	48
4.1.2	关联素理想的存在性与有限性	49
4.1.3	零因子的关联素理想描述	50
4.2	准素理想	51
4.2.1	准素性与根理想	51
4.2.2	素理想幂不为准素理想的例子	52
4.2.3	局部化中的准素理想	52
4.3	准素分解定理	53

4.3.1	Noether 环中的准素分解存在性	53
4.3.2	极小分解、孤立分支与嵌入分支	54
4.3.3	准素分解的唯一性与非唯一性	55
4.4	模的版本与例子	55
4.4.1	子模的准素分解	55
4.4.2	嵌入关联素理想的显式例子	56
4.4.3	几何分支与非约化结构	57
	习题	58
第五章	整扩张、整闭性与 Noether 正规化	63
5.1	整元素	63
5.1.1	首一方程与有限模判据	63
5.1.2	整性的传递性	64
5.1.3	整闭包与正规整环	65
5.2	素理想的提升	65
5.2.1	Lying-over 定理	65
5.2.2	Incomparability 定理	66
5.2.3	Going-up 定理	66
5.3	Going-down 定理	67
5.3.1	整闭基整环上的 Going-down 定理	67
5.3.2	定理的证明与素理想链的应用	67
5.3.3	Going-down 定理的适用条件	68
5.4	Noether 正规化	68
5.4.1	有限生成代数的整子多项式环	68
5.4.2	有限基域与无限基域上的证明	69
5.4.3	代数独立与有限映射	69
	习题	71
第六章	Hilbert 零点定理、正规化与导子理想	74
6.1	Zariski 引理	74
6.1.1	作为域的有限生成代数	74
6.1.2	极大理想的剩余域	75
6.1.3	代数闭域假设的作用	75
6.2	弱零点定理	75
6.2.1	代数闭域上的极大理想	76
6.2.2	公共零点的存在判据	76
6.2.3	非代数闭域上的对照	76
6.3	强零点定理	77
6.3.1	根理想与零点集的对应	77
6.3.2	Rabinowitsch 技巧	77
6.3.3	几何与代数的反变关系	78

6.4	正规化	78
6.4.1	整环、约化环与正规化的定义	78
6.4.2	非有限正规化的例子	79
6.4.3	尖点与结点曲线的正规化	79
6.4.4	整闭包、有限性与双有理性	80
6.4.5	Nagata 性、卓越性与正规化的有限性	80
6.5	正规化有限性的证明	80
6.5.1	由 Noether 正规化归约整闭包问题	81
6.5.2	可分扩张中的迹配对与公共分母	81
6.5.3	正特征不可分扩张中的有限性引理	82
6.5.4	约化代数的极小素分支与总分式环	83
6.5.5	正规化有限性定理的完整证明	84
6.6	导子理想与曲线正规化的比较	84
6.6.1	有限双有理扩张中的导子理想	84
6.6.2	尖点的导子理想与正规化商模	85
6.6.3	结点正规化与奇点上的两个原像	85
6.6.4	有限双有理映射的点集与局部环	86
	习题	87
第七章	仿射代数集与坐标环	92
7.1	代数集	92
7.1.1	Zariski 拓扑与闭子集	92
7.1.2	不可约性与素理想	93
7.1.3	连通性与幂等元	93
7.2	正则函数与态射	94
7.2.1	坐标函数与多项式映射	94
7.2.2	仿射代数集的坐标环	94
7.2.3	态射与环同态的反向对应	95
7.3	纤维与基域扩张	96
7.3.1	纤维的方程	96
7.3.2	张量积与坐标环	97
7.3.3	非代数闭域上的点与几何点	97
7.4	典型例子	98
7.4.1	尖点、结点、交叉直线与加厚点	98
7.4.2	约化性、不可约性与正规性	99
7.4.3	几何图像与局部环计算	99
	习题	100

第二编 计算、维数、平坦性与完备化 107

第八章 Gröbner 基与消去 111

8.1	全局单项式序与多元除法	111
8.1.1	字典序、分次字典序与分次逆字典序	111
8.1.2	首项、标准单项式与多元除法	112
8.1.3	余式的顺序依赖与 Dickson 引理	113
8.1.4	全局良序与算法终止的适用范围	114
8.2	Buchberger 理论	115
8.2.1	S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性	115
8.2.2	首项理想升链与算法终止性	116
8.2.3	约化 Gröbner 基的唯一性	117
8.2.4	手算例题与零余式的线性组合表示	118
8.3	消去与理想运算	119
8.3.1	消去定理与投影的 Zariski 闭包	119
8.3.2	理想成员、交、理想商与饱和	120
8.3.3	隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧	121
8.3.4	理想等式与乘子表示的核验	122
8.4	可验证的计算与系数域	122
8.4.1	有理数、有限域与有理函数域上的精确运算	122
8.4.2	计算步骤与结果验证	123
8.4.3	复杂度、系数膨胀与单项式序	123
8.4.4	数值近似与精确理想判定	124
8.5	零维方程组与商代数	124
8.5.1	商代数的标准单项式基与乘法矩阵	124
8.5.2	商代数的维数、重数与约化性	125
8.5.3	FGLM 换序与零维假设	126
8.5.4	三角形式、有理单变量表示与退化分支	127
	习题	128

第九章 Krull 维数与高度定理 135

9.1	维数与高度	135
9.1.1	素理想链、环维数与理想高度	135
9.1.2	模的维数与支集	136
9.1.3	局部化对维数的影响	137
9.2	高度定理	137
9.2.1	Krull 主理想定理	137
9.2.2	广义高度定理	138
9.2.3	生成元数与余维约束	139
9.3	有限型代数的维数	139
9.3.1	多项式环的维数	139

9.3.2	Noether 正规化与超越次数	140
9.3.3	整扩张的维数保持	141
9.4	局部维数	141
9.4.1	参数系	141
9.4.2	嵌入维数与 Krull 维数	142
9.4.3	正则局部环的定义	142
习题		143
第十章	赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环	147
10.1	赋值与赋值环	147
10.1.1	赋值群与赋值环的整除性质	147
10.1.2	一般赋值环与离散赋值环	148
10.1.3	分式域与局部性	149
10.1.4	赋值环的秩、维数与一维正规性	149
10.2	离散赋值环	150
10.2.1	一维 Noether 正规局部整环的刻画	150
10.2.2	极大理想的统一化元	151
10.2.3	理想与阶函数	151
10.3	Dedekind 整环	151
10.3.1	Dedekind 整环的定义与局部刻画	152
10.3.2	非零理想的素理想分解	152
10.3.3	分式理想与可逆性	153
10.4	算术和几何例子	154
10.4.1	数域整数环的 Dedekind 性	154
10.4.2	理想类群与 Picard 群	154
10.4.3	正规曲线与离散赋值	155
习题		156
第十一章	分次环、Hilbert 函数与多项式	161
11.1	分次环与分次模	161
11.1.1	正分次与标准分次	161
11.1.2	齐次理想与分次展示	162
11.1.3	次数平移与有限生成	163
11.2	Hilbert 函数	163
11.2.1	分次片的维数与长度	163
11.2.2	Hilbert 级数的有理性	164
11.2.3	Hilbert 级数与增长	164
11.3	Hilbert 多项式	165
11.3.1	Hilbert 函数的多项式性	165
11.3.2	多项式次数与维数	166
11.3.3	重数与首项系数的归一化	166

11.4 局部环中的增长	167
11.4.1 伴随分次环	167
11.4.2 Hilbert–Samuel 函数与多项式	168
11.4.3 参数理想、重数与切锥的例子	169
11.4.4 单层长度、累计长度与零维例外	170
习题	171
第十二章 平坦性、基变换与下降	175
12.1 平坦性的判据	175
12.1.1 理想张量判据	175
12.1.2 平坦性的局部性	176
12.1.3 局部化的平坦性与无挠模反例	177
12.1.4 理想张量判据的局部检测形式	177
12.2 有限性与局部自由	178
12.2.1 有限展示平坦模	178
12.2.2 局部环上的有限自由性	178
12.2.3 有限生成投射模与局部自由模	179
12.3 Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由	179
12.3.1 Fitting 理想的定义与基变换	179
12.3.2 纤维生成元数的上半连续性	180
12.3.3 局部自由与常秩的 Fitting 判据	181
12.3.4 子式理想、泛自由性与 Smith 形的适用条件	181
12.3.5 幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数	182
12.4 泛自由性与泛平坦性	182
12.4.1 Noether 整环上的泛自由性定理	182
12.4.2 有限自由模项序与分母清除	182
12.4.3 稠密主开集上的平坦性	183
12.4.4 一般纤维与特殊纤维的代数描述	184
12.4.5 代数有限呈现、模有限展示时的非 Noether 推广	184
12.5 忠实平坦性	184
12.5.1 正合性与消失的反映	184
12.5.2 忠实平坦基变换下的性质检测	185
12.5.3 纤维与下降的动机	186
12.6* 有限展示模的下降	186
12.6.1 双重基变换与余循环条件	186
12.6.2 忠实平坦下降的模论形式	187
12.6.3 下降数据与基变换后对象	189
习题	189
第十三章 滤过、Artin–Rees 与完备化	195
13.1 理想进滤过	195

13.1.1	I 进拓扑与分离性	195
13.1.2	模滤过与伴随分次	196
13.1.3	Rees 环与有限生成	197
13.2	Artin–Rees 引理	197
13.2.1	子模滤过与诱导滤过	197
13.2.2	Artin–Rees 引理及其证明	198
13.2.3	Krull 交定理的局部版本	198
13.3	完备化	199
13.3.1	完备化的逆极限定义	199
13.3.2	形式幂级数环	200
13.3.3	Noether 环上有限模完备化的正合性	200
13.3.4	完备化的 Noether 性、完备性与张量表示	201
13.4	完备化的局部性质	202
13.4.1	完备化与张量积	202
13.4.2	Noether 局部环完备化的忠实平坦性	203
13.4.3	极大理想、剩余域与维数	203
13.4.4	由完备化正合性到忠实平坦性	204
13.4.5	Hilbert–Samuel 理论与完备化的维数保持	204
13.5	有限阶近似与形式邻域	204
13.5.1	有限阶商、截断数据与相容逆系统	204
13.5.2	有限阶、形式与收敛解析对象	205
13.5.3	完备化中理想的扩张与收缩	205
13.5.4	幂级数计算的输入形式与有效算法的适用范围	206
	习题	206
第十四章 Kähler 微分与无穷小结构		211
14.1	导子与微分模	211
14.1.1	基环上的线性导子	211
14.1.2	微分模的泛性质	212
14.1.3	多项式环的微分模	213
14.2	基本正合列	213
14.2.1	商环的余法正合列	213
14.2.2	复合环映射的微分序列	214
14.2.3	微分模的局部化与基变换	214
14.3	切空间与 Jacobian 矩阵 (雅可比矩阵)	215
14.3.1	极大理想模平方与余切空间	215
14.3.2	仿射方程的切空间计算	216
14.3.3	非完美基域上的切空间	217
14.4	可分性与光滑性初步	217
14.4.1	有限代数域扩张的微分模	218

14.4.2	非分歧与光滑的基本概念	219
14.4.3	微分模消失与平展性的条件	219
14.4.4	有限呈示映射的形式非分歧、非分歧与平展性	220
14.4.5	可分与纯不可分扩张的微分计算	221
习题		222

第三编 同调方法与局部环的结构 227

第十五章 正则序列与 Koszul 复形 230

15.1	正则序列	230
15.1.1	模上非零因子与逐次商	230
15.1.2	正则序列的次序	230
15.1.3	局部条件与理想包含条件	230
15.1.4	局部有限模正则序列的非退化约定	230
15.2	Koszul 复形	230
15.2.1	外代数上的 Koszul 微分	230
15.2.2	一元情形与张量积构造	230
15.2.3	符号约定与微分平方为零	230
15.3	Koszul 正合性	230
15.3.1	正则序列给出的自由消解	230
15.3.2	Noether 局部有限模的反向判据	230
15.3.3	Koszul 同调与非正则性	231
15.4	几何和计算例子	231
15.4.1	超曲面与完全交模型	231
15.4.2	小长度正则序列的显式计算	231
15.4.3	外代数与 Tor 的联系	231

第十六章 深度与局部上同调的预备 232

16.1	深度	232
16.1.1	极大正则序列的长度	232
16.1.2	深度的存在性与有限性	232
16.1.3	深度与维数的不等式	232
16.2	Ext 刻画	232
16.2.1	剩余域的 Ext 与深度检测	232
16.2.2	Ext 刻画与正则序列定义的等价性	232
16.2.3	局部化与有限生成假设	232
16.3	深度引理	232
16.3.1	短正合列中的深度不等式	232
16.3.2	合冲模的深度	232
16.3.3	沿消解逐步比较深度	232

16.4 Serre 条件	233
16.4.1 模的 S_k 条件	233
16.4.2 局部化后的深度要求	233
16.4.3 S_1 、 S_2 与嵌入分支	233
第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式	234
17.1 局部极小自由消解	234
17.1.1 极小生成元与极小微分	234
17.1.2 剩余域张量后的简化	234
17.1.3 Betti 数与消解终止性	234
17.2 投射维数	234
17.2.1 有限模的投射维数	234
17.2.2 Ext、Tor 与投射维数判据	234
17.2.3 维数平移	234
17.2.4 局部有限模的同调消失判据	234
17.3 Auslander–Buchsbaum 公式	234
17.3.1 Noether 局部环与非零有限模的假设	234
17.3.2 有限投射维数条件	234
17.3.3 Auslander–Buchsbaum 公式的证明	235
17.4 应用与反例	235
17.4.1 商环、理想与合冲模的计算	235
17.4.2 有限投射维数假设的必要性	235
17.4.3 正则局部环的同调刻画初步	235
第十八章 正则局部环	236
18.1 正则性的等价观点	236
18.1.1 维数与极大理想的最小生成元数	236
18.1.2 伴随分次环的结构	236
18.1.3 参数系与正则序列	236
18.2 同调刻画	236
18.2.1 剩余域的有限投射维数	236
18.2.2 Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据	236
18.2.3 正则局部环的整体维数	236
18.3 局部化与完备化	236
18.3.1 正则性的局部化	236
18.3.2 正则性与完备化	236
18.3.3 正则局部环的整性	236
18.4 正则局部环的阶乘性	237
18.4.1 唯一分解与高度一素理想的主性	237
18.4.2 行列式线与主开集上的可逆模	237
18.4.3 正则参数、维数归纳与秩一模	237

18.4.4	局部主性与主开集上的自由性	237
18.4.5	正则局部环阶乘性的证明及其与除子的联系	237
18.5	几何解释	237
18.5.1	正则点与切空间维数	237
18.5.2	正则性与基域上的光滑性	237
18.5.3	非完美域上的区分例子	237
第十九章	Cohen–Macaulay 环与完全交	238
19.1	Cohen–Macaulay 模	238
19.1.1	深度等于维数	238
19.1.2	Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义	238
19.1.3	参数系与正则序列	238
19.2	结构性质	238
19.2.1	商去正则元素	238
19.2.2	Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化	238
19.2.3	正则局部环的 Cohen–Macaulay 性	238
19.3	完全交	238
19.3.1	正则环中正则序列定义的商	238
19.3.2	完全交的 Koszul 消解	238
19.3.3	完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系	238
19.4	典型实例	239
19.4.1	超曲面与零维局部环	239
19.4.2	非 Cohen–Macaulay 的嵌入分支	239
19.4.3	参数、重数与几何交	239
第二十章	正规性与 Serre 判别法	240
20.1	R_k 与 S_k 条件	240
20.1.1	余维上的正则性	240
20.1.2	深度条件的局部化表述	240
20.1.3	余维一与高余维的条件比较	240
20.2	Serre 正规性判据	240
20.2.1	Noether 环上的 R_1 与 S_2 条件	240
20.2.2	局部环整闭性与 Serre 判据	240
20.2.3	非零因子与深度方法	240
20.3	余维一观点	240
20.3.1	正规整环与高度一局部化	240
20.3.2	Weil 除子与类群	240
20.3.3	Dedekind 理论的高维延伸	240
20.4	奇点比较	241
20.4.1	正规但非正则的例子	241
20.4.2	Cohen–Macaulay 但非正规的例子	241

20.4.3	正规化与奇点消解	241
20.5*	秩一反射模、除子类群与局部阶乘性	241
20.5.1	双对偶、反射性与高度一局部数据	241
20.5.2	分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群	241
20.5.3	正则局部环的类群消失与非阶乘模型	241
20.5.4	局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解	241
第二十一章	分次自由消解与合冲模	242
21.1	合冲模	242
21.1.1	关系之间的关系	242
21.1.2	分次极小自由消解	242
21.1.3	分次 Betti 数	242
21.2	Hilbert 合冲定理	242
21.2.1	多项式环的有限整体维数	242
21.2.2	Hilbert 合冲定理及其证明	242
21.2.3	自由消解长度与变量数	242
21.3	消解与 Hilbert 级数	242
21.3.1	消解的交错和公式	242
21.3.2	由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数	242
21.3.3	Hilbert 级数对消解的决定范围	242
21.4	计算方法	243
21.4.1	Gröbner 基与合冲模算法	243
21.4.2	全局模项序与 Schreyer 构造	243
21.4.3	具体理想的消解计算与验证	243
21.5	消解的极小化与 Betti 数据的解释	243
21.5.1	单位微分项、可缩直和项与极小化	243
21.5.2	剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数	243
21.5.3	微分矩阵、齐次次数与正合性证书	243
21.5.4	Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表	243
第四编	交换代数进阶与几何初步	245
第二十二章*	局部上同调、典范模与 Gorenstein 环	248
22.1	局部上同调	248
22.1.1	支集挠子函子	248
22.1.2	Čech 复形与导出函子的比较	248
22.1.3	局部上同调的消失与深度	248
22.2	典范模	248
22.2.1	典范模的定义与存在条件	248
22.2.2	完备局部环上的局部对偶	248

22.2.3	典范模的存在性问题	248
22.2.4	内射包络、Matlis 对偶与有限模和 Artin 模	248
22.2.5	Cohen–Macaulay 商环的典范模	248
22.2.6	局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶	248
22.2.7	正则局部覆盖与 Cohen 结构定理	249
22.3	Gorenstein 环	249
22.3.1	Noether 局部环的有限自内射维数	249
22.3.2	Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性	249
22.3.3	完全交的 Gorenstein 性	249
22.4	对偶与例子	249
22.4.1	Artin Gorenstein 环	249
22.4.2	超曲面与完全交的对偶例子	249
22.4.3	对偶复形简介	249
第二十三章*	Hensel 性、非分歧与平展	250
23.1	Hensel 引理	250
23.1.1	单根提升与因式分解提升	250
23.1.2	完备局部环的 Hensel 性	250
23.1.3	Hensel 化与完备化	250
23.2	形式性质	250
23.2.1	平方零扩张上的提升问题	250
23.2.2	形式光滑、形式非分歧与形式平展	250
23.2.3	有限呈示条件的作用	250
23.3	光滑与平展	250
23.3.1	光滑映射的标准局部模型	250
23.3.2	平展映射的平坦性与非分歧性	250
23.3.3	局部同胚直觉与平展的代数条件	250
23.4	局部性质的比较与反例	251
23.4.1	尖点正规化的局部计算	251
23.4.2	光滑性、正则性与可分性	251
23.4.3	代数几何中的不同拓扑	251
23.4.4	尖点正规化的微分模与非分歧性	251
23.4.5	尖点纤维的长度与非平坦性	251
23.4.6	尖点外的同构与局部性质的比较	251
第二十四章*	概形与射影方法初步	252
24.1	结构层	252
24.1.1	基本开集上的局部化	252
24.1.2	仿射概形的结构层	252
24.1.3	局部环空间与态射	252
24.2	模与层	252

24.2.1	模对应的拟凝聚层	252
24.2.2	局部自由层与向量丛	252
24.2.3	局部化相容性与黏合	252
24.3	Proj 构造	252
24.3.1	齐次素理想	252
24.3.2	标准开集与射影空间	252
24.3.3	分次模与射影几何	252
24.4	概形理论专题简介	253
24.4.1	分离性、有限型与固有性	253
24.4.2	层上同调简介	253
24.4.3	概形理论的进一步学习	253
附录		255
附录 A	代数数论初步：理想、整数环与分歧	257
A.1	整闭包的算术意义	257
A.2	数域整数环、判别式与理想分解	257
A.3	素数处的局部化与完备化	257
A.4	类域论与全局解析方法导读	257
附录 B	计算交换代数专题	258
B.1	系数、表示与复杂度	258
B.1.1	多项式、分式、幂级数截断与有限展示模的表示	258
B.1.2	Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数	258
B.1.3	有效系数环的可判定性与运算条件	258
B.1.4	算术复杂度、次数增长与系数膨胀	258
B.2	高效 Gröbner 算法	258
B.2.1	F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数	258
B.2.2	FGLM 零维换序与 Gröbner walk	258
B.2.3	模方法、坏素数、重构与原域验证	258
B.2.4	算法实现与结果验证	258
B.3	分解、参数与组合	258
B.3.1	准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题	258
B.3.2	综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层	259
B.3.3	一般参数、特殊化与退化分支	259
B.3.4	单项式理想、组合结构与分解的非唯一性	259
B.4	模与自由消解的计算	259
B.4.1	Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表	259
B.4.2	局部计算中的项序与结果验证	259
B.4.3	计算机代数系统中的环与局部化	259

B.4.4	多项式环与局部环中理想成员判定的比较	259
附录 C	奇点与交换代数专题	260
C.1	卓越性、形式纤维与普适链性质	260
C.2	Frobenius 方法与正特征奇点	260
C.3	余切复形、切复形与形变问题	260
C.4	交理论、乘数理想与高阶局部对偶	260
附录 D	局部环、幂级数与结构定理	261
D.1	局部对象的比较	261
D.1.1	代数、Hensel、完备与解析局部环	261
D.1.2	Hensel 化与完备化的泛性质	261
D.1.3	代数、形式与收敛幂级数	261
D.1.4	局部对象间的环同态与比较关系	261
D.2	Cohen 结构定理	261
D.2.1	完备局部环、系数环与系数域	261
D.2.2	等特征情形的形式幂级数商表示	261
D.2.3	混合特征情形与 Cohen 环	261
D.2.4	完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型	261
D.3	Weierstrass 方法与局部计算	261
D.3.1	形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理	261
D.3.2	Hironaka 型标准基、初始指数与局部有限映射	262
D.3.3	曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过	262
D.3.4	形式解、收敛解与代数解	262
D.4	形式纤维、卓越性与逼近	262
D.4.1	完备化的形式纤维与卓越性	262
D.4.2	卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近	262
D.4.3	有限阶逼近、收敛性与代数化	262
D.4.4	奇点与消解理论导读	262
附录 E	微分代数与微分消去	263
E.1	微分结构与基本对象	263
E.1.1	导子、常数、微分理想与分式域延拓	263
E.1.2	微分多项式、微分阶与微分域扩张	263
E.1.3	微分代数、Kähler 微分与 DG 代数	263
E.2	有限性与微分代数几何的基本概念	263
E.2.1	Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件	263
E.2.2	微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数	263
E.2.3	低阶微分方程、常数域与解析解	263
E.3	特征集与有效消去的代表方法	263
E.3.1	导数排序、导变量、初式、分离与伪约化	263

E.3.2	Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解	263
E.3.3	消去算例与分母、初式、分离子的退化分支	263
E.4	线性微分理论与相关专题	264
E.4.1	线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 理论	264
E.4.2	微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数	264
E.4.3	微分代数几何、维数多项式与模型论导读	264
附录 F	局部标准基、幂级数与切锥计算	265
F.1	局部化、局部序与标准基	265
F.1.1	全局序、局部序、混合序与相应局部化	265
F.1.2	首项理想与标准基的定义	265
F.1.3	标准基、标准单项式与局部最小生成元	265
F.2	Mora 弱正规形的动机	265
F.2.1	局部约化中的无穷过程	265
F.2.2	单位乘子、弱正规形与理想成员判定	265
F.2.3	Mora 方法的算例与进一步讨论	265
F.3	形式幂级数与切锥	265
F.3.1	Hironaka 型标准基、形式除法与收敛性	265
F.3.2	伴随分次环、初始齐次理想与切锥	265
F.3.3	尖点、加厚点与重数计算	265
F.4	局部计算的应用	266
F.4.1	有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算	266
F.4.2	模的标准基、合冲模与局部自由消解	266
F.4.3	幂级数结构与局部算法专题导读	266
附录 G	实代数与半代数几何	267
G.1	半代数集合与量词消去	267
G.1.1	半代数集合与半代数映射	267
G.1.2	Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去	267
G.1.3	低维投影算例与柱状代数分解	267
G.2	实根理想与实零点定理	267
G.2.1	实理想、实根理想与实零点集	267
G.2.2	平方和方程的实消失理想	267
G.2.3	实零点定理与实谱的基本对象	267
G.3	非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题	267
G.3.1	非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和	267
G.3.2	Motzkin 多项式与 Artin 定理	267
G.3.3	平方和表示的系数域、分母与定义域	267
G.4	正性证书与 Positivstellensatz	268
G.4.1	预序、二次模与多项式不等式证书	268
G.4.2	Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz	268

G.4.3	Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较	268
G.5	计算、优化及其与其他分支的联系	268
G.5.1	Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解	268
G.5.2	Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书	268
G.5.3	半代数拓扑、Nash 几何、o-minimal 几何与矩问题	268
后记		i
参考文献		iii
中文索引		v
外文索引		ix
符号索引		xiii

算法目录

8.1 Buchberger 算法	117
-----------------------------	-----

第一编

素谱、有限性与整性

本编导读


一个多项式环可以同时呈现两种面貌：它是可以加、乘、取理想的环，也是多项式函数的集合。第一卷以运算和方程为主，第二卷以模及其构造为主；本编将二者结合，研究交换环怎样记录一个代数对象的整体及局部结构。除明确说明外，环均指含单位元的交换环，环同态保持单位元。

第一章从素理想开始建立素谱。这里的点不只包括熟悉的坐标点：一个非极大素理想还可以记录整条不可约闭子集的一般情形。读者应先熟悉闭集 $V(I)$ 、基本开集 $D(f)$ 与理想运算之间的对应，再阅读谱的函子性。第二章把局部化推广到模，解释如何在一点处检查零元、正合性和有限生成性，并特别区分局部化所得的茎与模去极大理想所得的纤维。

第三章整理 Noether 性、Artin 性及 Nakayama 引理。有限生成假设常在清除公共分母、选取有限关系或控制幂零指数时真正发挥作用，阅读证明时应找到它被使用的那一步。第四章以元素的零化子定义关联素理想，再证明准素分解及其唯一性。嵌入分支不能由底拓扑空间直接恢复，这正是仅看零点集会遗漏的代数信息之一。

第五章讨论整扩张中的素理想及整闭性，并在任意底域上证明 Noether 正规化引理。第六章由此证明 Hilbert 零点定理，再处理仿射代数的正规化与导子。两种“正规化”务必区分：Noether 正规化选取一个多项式子环，使原代数成为其上的有限模；环的正规化则在分式域或全分式环中取整闭包。后者的有限性需要证明，本编会处理任意底域及约化多分支情形。

第七章集中解释这些结论的几何意义。正则函数、坐标环和态射的对应从定义开始证明，不预设概形或层论。尖点、结点、交叉直线与加厚点提供反复检验定义的例子：相同的点数、双射的映射乃至同胚的空间，都可能伴随不同的函数环。



图中列出主要依赖。第 5 章不要求先掌握第 4 章的全部准素分解理论；第 6 章处理约化环的多分支正规化时则使用关联素理想。第 7 章还直接调用第 1 章的拓扑结论和第 2 章的局部化判据。初读可先完成第 6 章的零点定理，再读第 7 章前两节，随后回到正规化及具体曲线；有限生成代数正规化的完整有限性证明保留在第 6.5 节。

先修知识包括第一卷的理想、商环、多项式、整性和域扩张，以及第二卷的模、正合列、张量积与有限展示。一般点和无限维反例有时需要选择原理，正规化有限性还会调用第一卷有限可分扩张的迹配对；使用处均给出确切引用。每章习题附有解答，建议先独立写出理想、同态或分式的具体表达式，再比较答案中对有限性及良定义的检查。

第一章 素理想、根理想与素谱

素理想把商整环的代数条件变成一种点的概念。理想的根决定这些点组成的闭集，环同态则通过收缩反向诱导连续映射。本章从基本定义和存在性出发，建立素谱的 Zariski 拓扑、拟紧性、不可约分支与一般点，证明商环和局部化的谱对应，并用零因子、幂零元及无限乘积说明不同有限性条件不能混同。

本章目标

- 用商环辨认素理想与极大理想，说明选择原理在一般存在性证明中的作用。
- 证明根理想的素理想交表示，区分幂零元、幂零理想与约化性。
- 在闭集、基本开集和理想之间往返计算，辨认一般点、闭点与不可约分支。
- 理解谱的反变方向，并区分主开集与一般局部化的像。

本章使用第一卷的理想、商环、多项式和环局部化，也沿用其中的 Noether 升链条件。一般极大对象的存在性明确调用第一卷附录 A 的 Zorn 引理。此时不需要概形、层或同调代数；“点”暂时就是一个素理想，几何的直观只用来帮助解释已经给出的代数定义。

可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[2, §1, pp. 1–3, §4, pp. 24–25]。该书的根记号与本卷略有不同，本卷以 $\text{Nil}(R)$ 表示幂零根，并将其与 Jacobson 根区分。后者的模论作用在第三章讨论。

1.1 素理想与极大理想

在交换环中，模去一个理想以后，可能得到整环，也可能直接得到域。这两种情形分别由素理想和极大理想刻画。它们将成为本卷所研究空间的点，因此先把代数条件、商环及存在性说清楚。除另有说明外，本卷的环都交换且含幺，同态保持单位；允许零环，但素理想和极大理想必须是真理想。

1.1.1 素理想与商整环

定义 1.1.1. 环 R 的真理想 $\mathfrak{p}$ 若满足

$$ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ 或 } b \in \mathfrak{p} \quad (a, b \in R),$$

称为**素理想** (prime ideal)。真理想 $\mathfrak{m}$ 若不存在严格介于 $\mathfrak{m}$ 与 R 之间的理想，称为**极大理想** (maximal ideal)。

命题 1.1.2. $\mathfrak{p}$ 为素理想当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 为整环； $\mathfrak{m}$ 为极大理想当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 为域。特别地，极大理想必为素理想。

证明. 真理想保证商中的单位元不为零. 商中 $(a + \mathfrak{p})(b + \mathfrak{p}) = 0$ 等价于 $ab \in \mathfrak{p}$, 故第一个断言正是无零因子的条件.

若 $\mathfrak{m}$ 极大, 对 $a \notin \mathfrak{m}$ 有 $\mathfrak{m} + (a) = R$, 可写 $1 = u + ra$, $u \in \mathfrak{m}$, 所以 $r + \mathfrak{m}$ 是 $a + \mathfrak{m}$ 的逆. 反之, 若商为域, 设 J 严格包含 $\mathfrak{m}$, 取 $a \in J \setminus \mathfrak{m}$. 将商中 $a + \mathfrak{m}$ 的逆提升为 $b \in R$, 则 $ab - 1 \in \mathfrak{m} \subseteq J$, 而 $ab \in J$, 相减得 $1 \in J$. 所以 $J = R$, 证明极大性. 域是整环, 再由第一个断言即得最后结论. $\square$

这重述了第一卷命题 10.2.6 的商环判据. 实际检验时, 寻找一个方便辨认的商环, 常比逐一检查所有乘积更直接. 例如 $k[x, y]/(x) \cong k[y]$, 所以 (x) 素而不极大; $k[x, y]/(x, y) \cong k$, 所以 (x, y) 极大. $\mathbb{Z}$ 的素理想为 (0) 和 (p) , p 为素数, 其中只有后者极大.

还可利用理想的乘积表述素性: 若 $IJ \subseteq \mathfrak{p}$, 则 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $J \subseteq \mathfrak{p}$. 否则分别取 $a \in I \setminus \mathfrak{p}$, $b \in J \setminus \mathfrak{p}$, 有 $ab \in \mathfrak{p}$, 违反素性. 这个形式将在闭集并的计算中使用.

1.1.2 极大理想与剩余域

对极大理想 $\mathfrak{m}$, 域 $\kappa(\mathfrak{m}) = R/\mathfrak{m}$ 称为该点的**剩余域** (residue field). 若 R 是域 k 上的非零代数, 这个域含有 k 的像, 却未必等于 k . 例如 $\mathbb{R}[t]$ 中 $(t^2 + 1)$ 极大, 剩余域为 $\mathbb{C}$, 而不存在实数 a 使这个理想等于 $(t - a)$. 第六章将说明有限型代数在代数闭域上的情形为何不同.

定理 1.1.3. 任一真理想都包含于某个极大理想. 因而非零环至少有一个素理想; 零环没有素理想.

证明. 固定真理想 I , 在包含 I 的全部真理想中按包含排序. 此集合非空. 非空链的并仍为理想, 且不含一: 若一在并中, 它已在某个链成员中, 矛盾. 空链由 I 提供上界. 因此第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理给出极大元, 它也是 R 的极大理想. 取 $I = 0$ 得非零环的结论. 零环没有真理想, 故两个定义都不适用. $\square$

一个常用后果是: $a \in R$ 可逆当且仅当它不属于任何极大理想. 若不可逆, (a) 为真理想, 用定理 1.1.3 即可找到包含它的极大理想; 反向则因为包含单位的理想必为全环. 注意这里并不要求 R 为 Noether 环.

1.1.3 素理想存在性的集合论条件

引理 1.1.4 (避开乘法集). 设 $S \subseteq R$ 含一且对乘法封闭, I 为与 S 不交的理想. 则存在素理想 $\mathfrak{p} \supseteq I$ 与 S 不交.

证明. 考虑包含 I 且与 S 不交的理想. 链的并仍与 S 不交, 空链有上界 I , 所以 Zorn 引理给出极大者 $\mathfrak{p}$. 它不含一, 因而为真理想. 若 $a, b \notin \mathfrak{p}$, 极大性使 $\mathfrak{p} + (a)$, $\mathfrak{p} + (b)$ 分别含有 $s = u + ra \in S$, $t = v + qb \in S$. 若 $ab \in \mathfrak{p}$, 展开乘积即得 $st \in \mathfrak{p}$, 与 $st \in S$ 矛盾. 因此 $\mathfrak{p}$ 素. $\square$

这里使用选择原理的地方, 是在避开乘法集的理想族中取极大元; 它未必是原环的极大理想. 证明没有默认环已经有某种有限生成性质. 对具体多项式环, 可以经常

直接写出所需的素理想；上述论证则保证任意交换环中相应对象存在。可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[2, Theorems 1.1–1.2, pp. 2–3]。

引理 1.1.5 (有限素理想回避). 设 I 是理想, $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$, $r \geq 1$, 是有限个素理想。若 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^r \mathfrak{p}_i$, 则 $I \subseteq \mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立。

证明. 删去被其他素理想包含的成员不改变并集, 可设余下者两两不可比。若 I 不包含于任何一个, 选 $a_i \in I \setminus \mathfrak{p}_i$ 。对 $j \neq i$, 不可比性使我们可以选 $b_{ij} \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$ 。令

$$c_i = a_i \prod_{j \neq i} b_{ij}, \quad c = \sum_i c_i.$$

素性使 $c_i \notin \mathfrak{p}_i$, 而 $c_i \in I$ 且属于每个 $\mathfrak{p}_j$, $j \neq i$ 。对固定 i , 和式中其他各项都在 $\mathfrak{p}_i$ 内, 所以 $c \notin \mathfrak{p}_i$ 。于是 $c \in I$ 却不在所给并集中, 矛盾。只有一个成员时把空乘积取为一, 同一论证仍成立。□

这称为**素理想回避引理** (prime avoidance lemma) 的有限素理想版本。它说明有限个素理想的并并不比其中某个成员更容易完整地容纳一个理想；有限性是陈述的一部分, 不能删去。

1.2 根与约化

素理想能检测一个元素的某次幂是否落在给定理想中, 却不能区分这个幂到底是多少。因此, 将理想换成其根, 会保留素理想的包含信息, 同时可能遗失幂零结构。先明确这两种信息的差别, 才能理解素谱为什么还需要局部环来补充。

1.2.1 幂零根与根理想

定义 1.2.1. 对理想 $I \subseteq R$, 定义其**根** (radical of an ideal) 为

$$\sqrt{I} = \{a \in R : \text{存在 } n \geq 1 \text{ 使 } a^n \in I\}.$$

若 $I = \sqrt{I}$, 称 I 为**根理想** (radical ideal)。 $\sqrt{(0)}$ 称为 R 的**幂零根** (nilradical), 记为 $\text{Nil}(R)$ 。若它为零, 称 R 为**约化环** (reduced ring)。

$\sqrt{I}$ 确实是理想。若 $a^m, b^n \in I$, 展开 $(a+b)^{m+n-1}$, 每项至少含 a^m 或 b^n , 故该幂属于 I ; 负号和环元素倍乘也保持条件。还直接得到

$$I \subseteq \sqrt{I}, \quad \sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}, \quad \sqrt{I \cap J} = \sqrt{IJ} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}.$$

最后一式中, 若 $a^m \in I, a^n \in J$, 则 $a^{m+n} \in IJ$; 另一方向由 $IJ \subseteq I \cap J$ 给出。对理想根迭代时, 只需把两个存在的正指数相乘, 便回到 I 。

商环的幂零根为 $\sqrt{I}/I$, 所以 R/I 约化当且仅当 I 是根理想。特别地, $R_{\text{red}} = R/\text{Nil}(R)$ 约化, 称为 R 的约化商。它把全部幂零元素送到零, 而不要求剩下的非零元素都可逆。

命题 1.2.2. 若理想 $J = (a_1, \dots, a_m)$ 的生成元均幂零, 且 $a_i^{n_i} = 0$, 则

$$J^N = 0, \quad N = 1 + \sum_{i=1}^m (n_i - 1).$$

因此 Noether 环的幂零根是幂零理想。

证明. J^N 由全部 N 个生成元的乘积线性生成。若每个 a_i 出现次数都小于 n_i , 总个数至多为 $N - 1$, 矛盾。所以每个乘积含某个 $a_i^{n_i}$, 均为零。Noether 环的幂零根作为理想有限生成, 每个生成元又幂零, 故适用第一项。□

没有有限生成性时, 幂零根未必有统一的幂零指数。例如

$$R = k[x_1, x_2, \dots] / (x_1^2, x_2^2, \dots).$$

令 $J = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots)$ 。每个 $u \in J$ 只用有限多个变量, 设有 r 个; 任何 $r + 1$ 个正次单项式的乘积都会重复一个变量, 所以 $u^{r+1} = 0$ 。但 $\bar{x}_1 \cdots \bar{x}_N \neq 0$ 对任意 N 成立, 因为平方关系生成的理想由含某个平方因子的单项式线性生成, 不能包含这个平方自由单项式。又因商 $R/J = k$ 约化, 全部幂零元都在 J 中。因此 $J = \text{Nil}(R)$ 而 $J^N \neq 0$ 对全部 N 成立。

1.2.2 根理想的素理想交表示

定理 1.2.3. 任意理想 $I \subseteq R$ 满足

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I, \mathfrak{p} \text{ 素}} \mathfrak{p}. \quad (1.1)$$

空交取为 R , 因而公式也适用于 $I = R$ 。

证明. 若 $a^n \in I \subseteq \mathfrak{p}$, 反复使用素性得到 $a \in \mathfrak{p}$, 故左边包含于右边。反过来, 若 $a \notin \sqrt{I}$, 乘法集 $S = \{1, a, a^2, \dots\}$ 与 I 不交。引理 1.1.4 给出包含 I 并避开 S 的素理想 $\mathfrak{p}$, 特别是 $a \notin \mathfrak{p}$ 。因此 a 不在右边的交中, 证明反向包含。□

取 $I = 0$, 可知一个元素幂零当且仅当它属于全部素理想。于是映射

$$R \longrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \text{ 素}} R/\mathfrak{p}, \quad a \longmapsto (a + \mathfrak{p})_{\mathfrak{p}}$$

的核恰为 $\text{Nil}(R)$ 。约化环因而可以嵌入整环的乘积, 但本身未必是整环: $k \times k$ 已给出最简单的反例。

这里必须取全部素理想, 而不是只取极大理想。以 $R = k[t]_{(t)}$ 为例, 其唯一极大理想为 (t) , 但 R 是整环, 幂零根为零。因此所有极大理想的交, 即 Jacobson 根, 可以严格大于幂零根。局部化中的这个例子也将在第二章详细解释。

1.2.3 约化环与零维例子

$k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 只有一个素理想 (ε) ：素理想必须包含幂零元 ε ，商为域 k 。它的约化商是 k 。因此只记录有哪些素理想，尚不能区分这两个环；它们的区别在于前者存在非零平方零元。

$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的素理想是 $(\bar{2})$ 、 $(\bar{3})$ ，其交为 $(\bar{6})$ ，故幂零根平方为零。约化商为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_3$ 。后者没有非零幂零元，却仍有零因子，例如 $\bar{2}\bar{3} = 0$ 。约化性只排除幂零元，不排除两个不同非零元素的乘积为零。

当非零环的每个素理想都是极大理想时，称它为零维环；这里先使用这个等价于“不存在严格的素理想包含”的说法，一般 Krull 维数将在第九章定义。上述双数环及有限个域的乘积都零维。零维性也不单独保证有限长度：无限乘积 $\prod_{n \geq 1} k$ 的每个素商仍为域，因为对任意元素 $a = (a_n)$ ，令 $b_n = a_n^{-1}$ 若 $a_n \neq 0$ 、否则 $b_n = 0$ ，便有 $a = a^2 b$ 。在整环商中，非零的 $\bar{a}$ 因消去而满足 $\bar{a}\bar{b} = 1$ 。但把前 n 个坐标规定为零的理想给出无限严格降链，所以该环不是 Artin 环。第三章将说明 Noether 条件与零维性结合后的结论。

1.3 素谱的拓扑

把素理想作为点，还要指定哪些点属于同一个闭集。理想的包含关系给出一种自然规则：把包含同一理想的素理想收集起来。这个拓扑通常不是 Hausdorff 拓扑，甚至不同点之间可能有特殊化关系；这些现象正是需要保留的代数信息。

1.3.1 Zariski 闭集与基本开集

定义 1.3.1. 环 R 的素理想谱 (prime spectrum) 是集合

$$\text{Spec } R = \{\mathfrak{p} \subset R : \mathfrak{p} \text{ 是素理想}\}.$$

对理想 I ，记 $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$ 。以这些 $V(I)$ 为闭集得到的拓扑称为 **Zariski 拓扑** (Zariski topology)。对单个元素或有限个元素，简记 $V(f) = V((f))$ 、 $V(f_1, \dots, f_r) = V((f_1, \dots, f_r))$ 。对 $f \in R$ ，记

$$D(f) = \text{Spec } R \setminus V(f) = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\},$$

称为**基本开集** (basic open subset)，也称主开集。

这里的规则确实定义拓扑，因为

$$\begin{aligned} V(0) &= \text{Spec } R, & V(R) &= \emptyset, \\ \bigcap_{\lambda} V(I_{\lambda}) &= V\left(\sum_{\lambda} I_{\lambda}\right), & V(I) \cup V(J) &= V(IJ). \end{aligned} \quad (1.2)$$

前三式来自包含关系。最后一式是因为素理想包含 IJ 当且仅当它包含 I 或 J ：若两者都不包含，分别从 I, J 中选取不属于该素理想的元素，它们的乘积属于 IJ ，与素性矛盾。任意理想之和中的每个元素仅为有限和，所以这也说明无限交闭集的条件成立。

由根的表达, 还有

$$V(I) \subseteq V(J) \iff \sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}. \quad (1.3)$$

因此 $V(I) = V(\sqrt{I})$, 根理想与闭子集反向一一对应。另一方面, $D(f) \cap D(g) = D(fg)$, 且 $\text{Spec } R \setminus V(I) = \bigcup_{f \in I} D(f)$, 故基本开集构成开集的一组基。特别地, $D(f) = \emptyset$ 当且仅当 f 幂零, $D(f) = \text{Spec } R$ 当且仅当 f 是单位。

1.3.2 拟紧性与不可约闭集

一个拓扑空间若每个开覆盖都有有限子覆盖, 称为**拟紧空间** (quasi-compact space)。本书不在此词中附加 Hausdorff 条件。

命题 1.3.2. $\text{Spec } R$ 及每个基本开集 $D(f)$ 都拟紧。

证明. 先将任一开覆盖细化为基本开覆盖。若 $\text{Spec } R = \bigcup_{\lambda} D(f_{\lambda})$, 则不存在包含全部 f_{λ} 的素理想。由定理 1.1.3, 理想 $(f_{\lambda})_{\lambda}$ 必为 R , 所以一是其中有限个元素的组合。这有限个基本开集已经覆盖全谱, 再取它们所属的原开集便得有限子覆盖。

对 $D(f)$ 的任意子空间开覆盖, 可先细化成由基本开集与 $D(f)$ 的交组成的覆盖; 交仍是基本开集, 因为 $D(f) \cap D(g) = D(fg)$ 。因此只需考虑 $D(f) \subseteq \bigcup_{\lambda} D(g_{\lambda})$ 。补集的包含关系是 $V((g_{\lambda})_{\lambda}) \subseteq V(f)$ 。由(1.3), 某个 f^N 属于 $(g_{\lambda})_{\lambda}$, 于是属于其中有限个 g_{λ} 生成的理想。取基本开集又得到有限子覆盖。 $D(f)$ 为空时同样成立。□

定义 1.3.3. 非空拓扑空间若不能写成两个真闭子集之并, 称为**不可约空间** (irreducible space)。闭子集的不可约性用其子空间拓扑理解。若空间不能分成两个非空、不交的开集, 称为连通; 不可约性比连通性强, 因为在不可约空间中任意两个非空开集必须相交。

命题 1.3.4. 非空闭集 $V(I)$ 不可约, 当且仅当 $\sqrt{I}$ 为素理想。

证明. 若 $\sqrt{I} = \mathfrak{p}$ 素, 且 $V(I) = (V(I) \cap V(J)) \cup (V(I) \cap V(K))$, 则 $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(JK)$ 。由(1.3), $JK \subseteq \mathfrak{p}$, 故 $J \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $K \subseteq \mathfrak{p}$ 。相应的一个闭子集就是整个 $V(I)$ 。

反过来, 若 $\sqrt{I}$ 不素, 选 $a, b \notin \sqrt{I}$, $ab \in \sqrt{I}$ 。有 $V(I) \subseteq V(ab) = V(a) \cup V(b)$, 但 $V(I)$ 不包含于任何一边, 否则根的表达会使 a 或 b 属于 $\sqrt{I}$ 。这给出两个真闭子集之并, 违反不可约性。□

命题 1.3.5. 若 R 为 Noether 环, 则 $\text{Spec } R$ 的闭集降链最终稳定, 并且它是有限多个极大不可约闭子集之并。它们恰为 $V(\mathfrak{p}_1), \dots, V(\mathfrak{p}_r)$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 R 的全部极小素理想; 每个素理想都包含其中至少一个。零环对应空分解。

证明. 闭集降链由(1.3)对应根理想升链, Noether 升链条件使其稳定。若存在不能分成有限个不可约闭集之并的闭集, 取其中按包含最小的一个 Y 。降链条件保证这种最小者存在: 否则连续选择更小的坏闭集会得到无限严格降链。 Y 本身不可能不可约, 故是两个真闭子集之并; 两个较小者都有有限不可约分解, 相并即给出 Y 的分解, 矛盾。

因此全谱有有限不可约闭分解, 删去被其他成员包含者, 得到两两不包含的 $V(\mathfrak{p}_i)$, 由命题 1.3.4 各 $\mathfrak{p}_i$ 素。任一不可约闭集被这些闭集覆盖, 反复使用不可约性可知它包

含于某个成员, 故这些成员就是极大不可约闭集。特别地, 对任一素理想 $\mathfrak{q}$, 不可约闭集 $V(\mathfrak{q})$ 包含于某个 $V(\mathfrak{p}_i)$, 即 $\mathfrak{p}_i \subseteq \mathfrak{q}$ 。若还有素理想严格小于某个 $\mathfrak{p}_i$, 同一结论和两两不包含性便矛盾。所以所列者恰为全部极小素理想。 $\square$

闭集降链稳定的空间称为 **Noether 拓扑空间** (Noetherian topological space); 极大不可约闭子集称为 **不可约分支** (irreducible component)。不同分支可以相交, 例如 $k[x, y]/(xy)$ 的两条坐标轴分支在 $(\bar{x}, \bar{y})$ 处相交, 不能因有两个分支就认定空间不连通。

1.3.3 一般点与闭点

一个点若单独构成闭集, 称为 **闭点** (closed point)。素谱中还常有闭包比单点大的点; 这种闭包可以直接由理想的包含关系读出。

命题 1.3.6. 素理想 $\mathfrak{p}$ 所对应点的闭包为 $V(\mathfrak{p})$ 。因此它是闭点当且仅当 $\mathfrak{p}$ 极大; 每个不可约闭子集恰有一个闭包为它的点。

证明. 闭集 $V(I)$ 包含点 $\mathfrak{p}$, 当且仅当 $I \subseteq \mathfrak{p}$, 这又保证 $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(I)$ 。所以 $V(\mathfrak{p})$ 是包含该点的最小闭集。它只有该点, 当且仅当没有更大的真素理想; 利用极大理想存在性, 这等价于 $\mathfrak{p}$ 极大。若闭集不可约, 命题 1.3.4 把它唯一写成 $V(\mathfrak{p})$, 根理想与闭集的一一对应保证此 $\mathfrak{p}$ 唯一。 $\square$

闭包等于指定不可约闭集的点称为该闭集的 **一般点** (generic point)。例如整环的素谱有一般点 (0) ; 在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 中, 它的闭包是全谱, 所有 (p) 则是闭点。不同点具有不同闭包, 所以素谱满足 T_0 分离性质, 却一般不满足每点都闭, 更不必是 Hausdorff 空间。

若 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, 称 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{p}$ 的 **特殊化** (specialization), 并称 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的 **一般化** (generalization); 包含方向在这里不能颠倒。一般点保存的是整条不可约分支的共同代数关系, 闭点则可能带有一个较大的剩余域。第六、七章将在代数闭基域的有限型情形把闭点解释为通常的坐标点。

1.4 环同态与素谱

环同态将元素沿一个方向送出, 素理想则沿收缩反向移动。商环与局部化是理解这个反向关系的两种基本操作: 前者给出闭子空间, 后者保留避开指定分母的点。主元局部化总对应基本开集; 一般乘法集给出的子空间却未必是开集。

1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射

命题 1.4.1. 含幺环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 给出映射

$$\varphi^*: \text{Spec } S \longrightarrow \text{Spec } R, \quad \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

它连续, 且

$$(\varphi^*)^{-1}(V(I)) = V(IS), \quad (\varphi^*)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f)), \quad (1.4)$$

其中 IS 由全部 $\varphi(a)$, $a \in I$, 在 S 中生成。恒等同态诱导恒等映射, 而 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$ 。

证明. 因 1 不在 $\mathfrak{q}$ 中, 收缩是真理想; 若 ab 的像在 $\mathfrak{q}$, 素性使 $\varphi(a)$ 或 $\varphi(b)$ 在其中, 所以收缩为素理想. 包含 $I \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 等价于 $IS \subseteq \mathfrak{q}$, 给出第一式和连续性. 对主理想取补集得到第二式. 最后两项由原像的恒等及复合规则直接得到. $\square$

极大理想的收缩未必极大. 例如 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 把域的唯一素理想 (0) 收缩为 $\mathbb{Z}$ 的零理想; 后者不是极大理想. 这也是素谱采用全部素理想而不只采用极大理想的一个理由.

1.4.2 商环与闭子空间

定理 1.4.2. 商映射 $R \rightarrow R/I$ 诱导同胚

$$\mathrm{Spec}(R/I) \longrightarrow V(I) \subseteq \mathrm{Spec} R, \quad \bar{\mathfrak{p}} \mapsto \mathfrak{p}.$$

这里 $\mathfrak{p}$ 是 $\bar{\mathfrak{p}}$ 的原像, 逆映射为 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}/I$.

证明. 理想的商对应和商整环判据给出所列互逆双射. 对包含 I 的理想 J , R/I 的闭集 $V(J/I)$ 对应为 $V(J)$, 它已包含于 $V(I)$; 另一方面, $V(I)$ 中任一子空间闭集可写为 $V(I) \cap V(K) = V(I + K)$, 也如此得到. 故双射及其逆都连续. $\square$

取 $I = \mathrm{Nil}(R)$, 所有素理想都包含它, 因而得到 $\mathrm{Spec} R_{\mathrm{red}} \cong \mathrm{Spec} R$. 底拓扑空间看不见被取商消去的幂零元. 这不表示两个环相同; 后面讨论加厚点与纤维时, 会反复用到这一区别.

1.4.3 主开集与一般局部化的谱

设 $T \subseteq R$ 为含一的乘法集, 允许 $0 \in T$, 此时局部化为零环. 第一卷定理 13.2.2 已构造环 $T^{-1}R$, 其中 $a/t = 0$ 当且仅当存在 $u \in T$ 使 $ua = 0$. 下面把第一卷定理 13.4.4 的素理想对应补上拓扑说明.

定理 1.4.3. 局部化映射诱导同胚

$$\mathrm{Spec}(T^{-1}R) \longrightarrow X_T = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec} R : \mathfrak{p} \cap T = \emptyset\},$$

右侧赋予子空间拓扑. 对应的逆为 $\mathfrak{p} \mapsto T^{-1}\mathfrak{p}$. 特别地, $\mathrm{Spec} R_f \cong D(f)$.

证明. 局部化中的素理想不能包含可逆分母的像, 故其收缩与 T 不交. 若 $\mathfrak{p} \cap T = \emptyset$, 则

$$(T^{-1}R)/(T^{-1}\mathfrak{p}) \cong \bar{T}^{-1}(R/\mathfrak{p})$$

是非零整环, 因 $\bar{T}$ 不含零. 所以扩张为素理想. 其收缩仍为 $\mathfrak{p}$: 若 $a/1 \in T^{-1}\mathfrak{p}$, 清分母后某个 $ta \in \mathfrak{p}$, 其中 $t \notin \mathfrak{p}$, 素性迫使 $a \in \mathfrak{p}$. 反向, 对局部化的理想, 分母可逆说明它由收缩重新扩张得到. 这验证了双射.

由命题 1.4.1, 该映射连续. 局部化中的基本开集 $D(a/t)$ 在上述双射下对应 $D(a) \cap X_T$: 素理想是否含 a/t , 只取决于它是否含分子. 这些正是子空间的一组开集基, 故逆映射也连续. 取 $T = \{1, f, f^2, \dots\}$ 时, 素理想与 T 不交恰好等价于不含 f , 得到主开集的断言. $\square$

一般的 $X_T = \bigcap_{t \in T} D(t)$ 未必开。取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $T = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，其像只有一般点 (0) 。任何包含它的基本开集 $D(n)$ 、 $n \neq 0$ ，都还包含一个 (p) ，其中素数 p 不整除 n ；这样的素数存在，因为有限多个素数不能穷尽全部素数。因此单点 $\{(0)\}$ 不是开集，尽管它与 $\text{Spec } \mathbb{Q}$ 同胚。

对素理想 $\mathfrak{p}$ ，取 $T = R \setminus \mathfrak{p}$ ，所得 $R_{\mathfrak{p}}$ 的谱对应全部包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想。它研究的是 $\mathfrak{p}$ 及其一般化，而不是包含 $\mathfrak{p}$ 的全部特殊化。第二章将把这个点附近的环与模的分式构造一并展开。

本章小结

素性与极大性分别使商环成为整环与域。避开乘法集的极大性论证不仅给出素理想存在性，还证明根理想等于包含它的全部素理想之交。这个交只检测幂零现象是否存在，不能给出统一指数；统一指数需要有限生成等额外条件。

Zariski 闭集对应根理想，基本开集对应元素不被素理想包含。全谱和每个基本开集都拟紧，而一般点与闭点反映素理想的包含方向。Noether 性使不可约分支有限，却不能从底拓扑空间反推出原环一定 Noether 环；幂零结构同样不能仅由这个空间恢复。

环同态使素理想反向收缩。取商给闭子空间，主元局部化给基本开集，一般局部分化则给避开全部分母的子空间，它未必开。下一章把这种局部观察推广到模，并说明怎样从各点处的结果恢复全局结论。

习题

习题 1.1. 在 $R = k[x, y]/(xy)$ 中，证明 $(\bar{x})$ 、 $(\bar{y})$ 素而不极大， $(\bar{x}, \bar{y})$ 极大。证明每个素理想至少包含 $\bar{x}, \bar{y}$ 中一个。

解. 前两个商分别是 $k[y], k[x]$ ，为整环而非域；第三个商为 k ，由命题 1.1.2 得到结论。又 $\bar{x}\bar{y} = 0$ 属于任何素理想，素性迫使至少一个因子在其中。因此这两条闭分支已经覆盖全谱。□

习题 1.2. 求 $\mathbb{F}_2[t]/(t^2 + t + 1)$ 的元素与非零元素的逆，说明对应理想是极大理想，但剩余域不是原系数域。

解. 多项式在零、一处都不为零，故这个二次多项式不可约。商以 $1, \alpha$ 为基，有四个元素 $0, 1, \alpha, 1 + \alpha$ ，其中 $\alpha^2 = \alpha + 1$ 。等式 $\alpha(1 + \alpha) = 1$ 给出后二者互逆，一自逆，所以商为四元域。商域判据给出极大性，元素个数则说明它不是 $\mathbb{F}_2$ 。□

习题 1.3. 在 $k[x, y]$ 中证明 $\sqrt{(x^2, y^3)} = (x, y)$ ，并求商环的幂零根的最小正幂零指数。

解. 两个变量都有幂在原理想中，故 (x, y) 包含于根；反向因原理想包含于极大理想 (x, y) ，其根也包含于其中。商中的根由 $\bar{x}, \bar{y}$ 生成。任一四次单项式都含 x^2 或 y^3 ，故四次幂为零；但 $\bar{x}\bar{y}^2 \neq 0$ ，因为它不被任一单项式生成元整除，故三次幂非零。最小正指数为四。□

习题 1.4. 证明 $\sqrt{I+J} = \sqrt{\sqrt{I} + \sqrt{J}}$. 再以 $I = (y), J = (y - x^2) \subseteq k[x, y]$ 说明两个根理想之和未必为根理想。

解. $I + J \subseteq \sqrt{I} + \sqrt{J}$ 给出一个根包含。另一方面, $\sqrt{I+J}$ 同时包含 $\sqrt{I}$ 和 $\sqrt{J}$, 又已是根理想, 故包含右侧的根, 得到相等。例中两个商都为 $k[x]$, 所以 I, J 为素理想, 特别是根理想; 但其和为 (y, x^2) , 其中 x^2 属于它而 x 不属于它, 故和不为根理想。□

习题 1.5. 设 J 的每个元素都幂零, 证明 $a \in R$ 可逆当且仅当 $a + J$ 在 R/J 中可逆。不假设 J 有统一幂零指数。

解. 只有反向需要说明。若 $ab - 1 = u \in J$, 选 N 使 $u^N = 0$, 则 $1+u$ 的逆为 $\sum_{j=0}^{N-1} (-u)^j$. 所以 $b \sum_{j=0}^{N-1} (-u)^j$ 是 a 的逆。只用了这一个元素 u 的幂零性, 不需要对全部 J 同时选一个指数。□

习题 1.6. 求 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的全部素理想、幂零根和约化商。它的谱有几个点, 哪些点闭?

解. 由商环对应, 素理想来自 $\mathbb{Z}$ 中包含十八的素理想, 即 $(2), (3)$ 。故幂零根为两像理想的交 (6) , 包含 $0, \bar{6}, \bar{12}$, 其平方为零。约化商为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 谱有两个点, 都是极大理想对应的闭点。两个单点的补集也闭, 因此这个有限谱是离散的。□

习题 1.7. 证明 $\text{Spec}(A \times B)$ 是 $\text{Spec } A$ 与 $\text{Spec } B$ 的不交并, 且这两个部分都是开闭子集。

解. 令 $e = (1, 0), f = (0, 1)$ 。因 $ef = 0, e + f = 1$, 素理想恰好包含二者之一。若包含 f , 它形如 $\mathfrak{p} \times B$, 且商为 $A/\mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{p}$ 必素; 另一类为 $A \times \mathfrak{q}$ 。两部分分别是 $D(e) = V(f), D(f) = V(e)$, 均开闭。各部分的拓扑由商环同胚定理 1.4.2 识别为相应因子的谱, 所以这不仅是集合双射。□

习题 1.8. 令 $I = (x, y) \subseteq k[x, y]$ 。对全部常数项为零的不可约多项式 h , 考察素理想 (h) 。证明它们的并包含 I , 但其中没有一个包含整个 I 。

解. 域上的多项式环为唯一分解整环, 这是第一卷定理 12.2.6 逐次添加两个变量的结论。对 $0 \neq f \in I$, 不可约分解的常数项乘积为零, 所以某个不可约因子 h 的常数项为零; 于是 $f \in (h)$ 。零也在这些理想中。若 $I \subseteq (h)$, 则 h 同时整除 x, y , 只能为单位, 矛盾。 $h = x - y^n, n \geq 1$, 已经给出无限多个不同的此类不可约元。这个例子说明有限素理想回避不能直接推广到无限并。□

习题 1.9. 在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 中求 $V(30), D(6)$ 及点集 $\{(2), (3)\}$ 的闭包。再证明任意无限多个不同的闭点组成的集合稠密。

解. $V(30) = \{(2), (3), (5)\}$, $D(6)$ 包含一般点 (0) 及除 $(2), (3)$ 外的全部闭点。所给两个点的集合本身等于 $V(6)$, 所以已经闭。若一个闭集 $V(n)$ 包含无限多个不同闭点, 则整数 n 被无限多个素数整除, 只能 $n = 0$ 。因此包含这些点的唯一闭集是全谱, 它们的闭包即为全谱。□

习题 1.10. 设 k 代数闭。描述 $\text{Spec } k[t]$ 的点及全部真闭集，并证明两个非空开集必相交。

解. 一元多项式环的非零素理想由不可约多项式生成；代数闭性使这些多项式都是一次式。因此点为 (0) 及 $(t-a)$ 、 $a \in k$ 。任何真闭集形如 $V(f)$ 、 $f \neq 0$ ，恰为这个多项式的有限多个根对应的闭点；反向任意有限点集都由对应一次因子的乘积给出。非空开集必含一般点 (0) ，所以任意两个这样的开集相交。其不可约性也可由整环的零理想为素理想得到。□

习题 1.11. 求 $R = k[t]_{(t)}$ 的素谱及全部开集，给出一个非空开集却不包含全谱任何闭点的例子。

解. 局部化对应只留下包含于 (t) 的素理想，故谱只有 (0) 和 $(t)R$ 。前者一般，后者闭；全部开集为 $\emptyset, \{(0)\}, \text{Spec } R$ 。其中 $D(t) = \{(0)\}$ 非空，却不包含全谱的唯一闭点。这不与每个非空闭子集都有闭点的结论矛盾。□

习题 1.12. 在 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 中令 $U = \bigcup_{i \geq 1} D(x_i)$ 。证明 U 不拟紧，尽管全谱及每个 $D(x_i)$ 都拟紧。

解. 若有限个 $D(x_i)$ 覆盖 U ，取未在这有限指标中出现的 j 。把所选变量送到零、 x_j 送到一、其余变量送到零，得到满同态 $R \rightarrow k$ 。它的核为极大理想，属于 $D(x_j) \subseteq U$ ，却不在有限个所选基本开集内，矛盾。所以这个开覆盖没有有限子覆盖。□

习题 1.13. 令 V 为无限维 k 空间，在 $R = k \oplus V$ 上规定 $(a, v)(b, w) = (ab, aw + bv)$ 。证明 R 的谱只有一个点，但 R 不是 Noether 环。

解. 对第三个元素 (c, u) ，乘法的两种结合次序都得到 $(abc, abu + acw + bcv)$ ，单位为 $(1, 0)$ 。理想 $0 \oplus V$ 平方为零，商为 k ，所以它是唯一素理想。谱因而是单点 Noether 空间。选无限线性无关序列 v_i ，其有限初段所张成的 $0 \oplus \text{span}_k\{v_1, \dots, v_n\}$ 都是理想，并组成严格升链。故 R 不是 Noether 环；底拓扑空间无法检测全部环的有限性。□

习题 1.14. 在 $k[x, y, z]$ 中证明 $(xy, xz) = (x) \cap (y, z)$ ，并求 $V(xy, xz)$ 的全部不可约分支及其一般点。

解. 左边显然包含于右边。若 $xh \in (y, z)$ ，模去 (y, z) 得 $xh(x, 0, 0) = 0$ 于整环 $k[x]$ ，所以 $h(x, 0, 0) = 0$ ，即 $h \in (y, z)$ 。故反向包含成立。两个理想的商分别为 $k[y, z]$ 与 $k[x]$ ，所以都素，且互不包含。因此分支为 $V(x)$ 、 $V(y, z)$ ，一般点分别为 (x) 、 (y, z) 。它们的交为 $V(x, y, z)$ ，非空；不可约分支不是必然互不相交的部分。□

习题 1.15. 对 $m \geq 1$ ，比较环 $k[t]/(t^m)$ 的素谱、 k 维数和幂零根指数，说明谱同胚不能决定环同构。

解. 每个素理想都含 $\bar{t}$ ，商为域，所以谱总为一个点。环以 $1, \bar{t}, \dots, \bar{t}^{m-1}$ 为基，维数为 m ； $(\bar{t})^m = 0$ ，若 $m > 1$ ，其 $m-1$ 次幂非零，因此最小正指数为 m 。不同 m 的这些 k 代数因维数或幂零指数不同而不同构，但底谱相同。□

习题 1.16. 分别给出反例, 说明环同态单射未必使谱映射单射, 以及谱映射同胚未必使环同态单射或满射。

解. 包含 $k \hookrightarrow k[t]$ 单射, 谱上的映射却把多个点全部送到 $\operatorname{Spec} k$ 的唯一一点。商映射 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) \rightarrow k$ 不是单射, 却在谱上给同胚。一个真域扩张 $k \hookrightarrow K$ 不是满射, 但两端的谱都是单点, 也给同胚。环的元素及剩余域信息并不能由这个底空间映射单独恢复。 $\square$

习题 1.17. 描述 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6]$ 和 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(2)}$ 在 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 中的像, 判断两者是否开。

解. 前者的像是 $D(6)$, 为开集。后者只保留包含于 (2) 的素理想, 即 $\{(0), (2)\}$ 。任何包含一般点的开集都包含某个 $D(n)$ 、 $n \neq 0$, 而这个基本开集还含无限多个其他素数点。因此后者不是开集。两种像均按定理 1.4.3 具有正确的子空间拓扑。 $\square$

习题 1.18. 对 $\varphi: k[s] \rightarrow k[t]$ 、 $s \mapsto t^2$, 求点 $(t-a)$ 的收缩, 并计算 $(\varphi^*)^{-1}(D(s))$ 与 $(\varphi^*)^{-1}(V(s))$ 。

解. 多项式 $f(s)$ 的像属于 $(t-a)$, 当且仅当 $f(a^2) = 0$ 。一元除法说明核为 $(s-a^2)$, 所以这是收缩点。由 (1.4), 两个原像分别为 $D(t^2) = D(t)$ 与 $V(t^2) = V(t)$ 。平方没有改变这个底闭集, 但在取商时 $k[t]/(t^2)$ 仍不同于 $k[t]/(t)$ 。 $\square$

习题 1.19. 证明每个到约化环 S 的环同态 $R \rightarrow S$, 都唯一经 R_{red} 分解。说明为何仅有谱同胚不能反向推出这个同态的泛性质。

解. 幂零元的像仍幂零, 而 S 约化, 所以同态零化 $\operatorname{Nil}(R)$ 。定义 $r + \operatorname{Nil}(R) \mapsto \varphi(r)$ 即得到良定义的环同态; 原商映射满射, 故分解唯一。这个泛性质谈的是到每个约化环的全部同态; 例如 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(i)$ 的谱同样是单点间同胚, 却不能使恒等映射 $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ 经 $\mathbb{Q}(i)$ 分解, 因为 $\mathbb{Q}$ 中没有平方为负一的元素, 所以底拓扑同胚没有提供这一代数性质。 $\square$

习题 1.20. 证明 $\operatorname{Spec} R$ 不可约当且仅当 $\operatorname{Nil}(R)$ 为素理想。给出一个非整环但谱不可约的非零环, 并说明加入约化条件后能得到什么。

解. 零环的谱为空, 不可约性与幂零根为素理想这两项均不成立。对非零环, 结论是命题 1.3.4 在 $I = 0$ 时的应用。双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的幂零根 (ε) 为极大理想, 故谱不可约, 但 $\varepsilon \neq 0$ 且平方为零, 环不是整环。若另有约化性, 幂零根为零, 所以零理想素, 商整环判据说明 R 本身是整环。 $\square$

第二章 模的局部化、局部环与局部判 据

把环中的某些元素变为单位，也会把模中的相应挠元消去。本章从分式构造出发，证明局部化的正合性，追踪理想的扩张、收缩与饱和，并用支集记录模在素谱上的分布。随后建立元素、子模和同态的局部检测原则，说明有限生成与有限展示如何控制统一分母。局部环、剩余域及纤维的具体例子，使这些判据与点处计算相联系。

本章目标

- 能用分式零判据处理模局部化中的核、商与子模。
- 区分乘法集饱和、理想幂饱和、局部模及剩余向量空间。
- 正确使用支集与 Hom 的局部化公式，并指出所需的有限性条件。
- 用局部环检测给定同态，理解点处数据与邻域数据的差别。

本章需要第一章的环局部化和素谱，以及第二卷第 2 章的模、核与商、第 6 章的张量积。除明确说明外，不假设底环是 Noether 环，也不假设所讨论的模有限生成。读者可以一边阅读一边追问：这里需要给一个元素清分母，还是需要给全部生成元或全部关系选择共同分母？这项区别决定了多数定理的假设。

进一步阅读可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, Theorems 4.4–4.6, pp. 26–27]，对照局部化、张量积与局部消失的证明；该书 [2, Theorem 4.10, pp. 28–29] 还说明有限生成、有限展示如何把点处性质延伸到开邻域。

2.1 模局部化

环的局部化允许把指定元素当作分母；模也可以作同样的变换。不过，模中通常没有乘法，分式相等必须用标量作用来定义。以下始终设 R 为交换含幺环， $S \subseteq R$ 含 1 且对乘法封闭， M 为 R 模。允许 $0 \in S$ ，此时局部化环及局部化模都为零。第二卷命题 6.4.5 已给出模局部化的张量描述；本节重新展开分母的处理，使后续局部判据能够直接使用。

2.1.1 分式模的构造

定义 2.1.1. 在 $M \times S$ 上规定

$$(m, s) \sim (n, t) \iff \text{存在 } u \in S \text{ 使 } u(tm - sn) = 0.$$

所得等价类记为 m/s ，全部等价类组成的集合记为 $S^{-1}M$ ，称为 M 关于 S 的局部化 (localization of a module)。当 $S = R \setminus \mathfrak{p}$ 时记为 $M_{\mathfrak{p}}$ ；当 $S = \{1, f, f^2, \dots\}$ 时记为 M_f 。

先核对这确实是等价关系。自反性取 $u = 1$, 对称性把等式取负。若 $u(tm - sn) = 0$ 、 $v(rn - tp) = 0$, 则

$$uvt(rm - sp) = uv(r(tm - sn) + s(rn - tp)) = 0,$$

所以传递性也成立。关系中的额外乘子 u 不能省去: 若某个分母已经零化了 m , 局部化后 m 就应消失。

命题 2.1.2. 下列公式使 $S^{-1}M$ 成为 $S^{-1}R$ 模:

$$\frac{m}{s} + \frac{n}{t} = \frac{tm + sn}{st}, \quad \frac{a}{s} \frac{m}{t} = \frac{am}{st}.$$

自然映射 $\iota_M: M \rightarrow S^{-1}M$ 、 $m \mapsto m/1$ 为 R 线性映射, 且

$$\frac{m}{s} = 0 \iff um = 0 \text{ 对某个 } u \in S \text{ 成立.} \quad (2.1)$$

若 N 是 $S^{-1}R$ 模, 任意 R 线性映射 $h: M \rightarrow N$ 唯一延拓为 $S^{-1}R$ 线性映射

$$\tilde{h}: S^{-1}M \rightarrow N, \quad \tilde{h}(m/s) = (s/1)^{-1}h(m).$$

证明. 若 $m/s = m'/s'$, 取 $u \in S$ 使 $u(s'm - sm') = 0$. 加上同一个 n/t 后, 两分子的交叉差为 $t^2(s'm - sm')$, 仍被 u 零化; 乘上同一个 a/t 后, 交叉差为 $at(s'm - sm')$, 也被 u 零化. 改变第二个加数的代表元同理. 若 $a/t = a'/t'$, 相应交叉差为 $s(t'a - ta')m$, 由环分式的等价关系零化. 因此运算良定义. 把有限个分式通分后, 结合律、分配律、零元 $0/1$ 、负元 $-m/s$ 以及单位作用, 都化为 M 中的相应公理. 零判据直接把 m/s 与 $0/1$ 比较。

若 $u(tm - sn) = 0$, 在 N 中 u, s, t 均可逆, 施加 h 再消去这些单位, 即得 $s^{-1}h(m) = t^{-1}h(n)$. 这证明延拓良定义; 通分验证线性. 因 $m/s = (1/s)(m/1)$, 任何这样的延拓都只能采用所给公式, 故唯一. $\square$

例如 $R = \mathbb{Z}$ 、 $M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 在 (2) 处局部化时 3 可逆, 原来阶为 3 的部分消失, 得到 $M_{(2)} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. 确切的同构由 $\bar{a}/s \mapsto \bar{a}s^{-1}$ 给出, 其中 s 为奇数; 其核为零可由 $4 \mid a \Rightarrow 12 \mid 3a$ 核验。

2.1.2 模局部化的张量描述

命题 2.1.3. 存在关于 M 自然的 $S^{-1}R$ 模同构

$$(S^{-1}R) \otimes_R M \rightarrow S^{-1}M, \quad \frac{a}{s} \otimes m \mapsto \frac{am}{s}.$$

其逆映射为 $m/s \mapsto (1/s) \otimes m$.

证明. 正向公式对两个变量可加, 且 $(ar/s) \otimes m$ 与 $(a/s) \otimes rm$ 具有相同的像, 故由张量积的泛性质给出线性映射. 若 $u(tm - sn) = 0$, 则

$$\frac{1}{s} \otimes m - \frac{1}{t} \otimes n = \frac{1}{ust} \otimes u(tm - sn) = 0.$$

因此逆向公式良定义，通分后可直接验证它线性。两种公式的复合在 m/s 及纯张量 $(a/s) \otimes m$ 上均为恒等，故互为逆映射。模同态 $f: M \rightarrow N$ 在两边都把分子 m 变为 $f(m)$ ，这就是自然性。□

局部化因而是沿 $R \rightarrow S^{-1}R$ 的标量扩张。它允许把原来的生成元乘以新的分式标量，并消去被某个分母零化的元素。例如对任意理想 I ，该描述给出

$$S^{-1}(M/IM) \cong (S^{-1}M)/(S^{-1}I)(S^{-1}M).$$

这里也可以把分式 $(m + IM)/s$ 直接送到 m/s 的商类；其良定义和核将在下一小节的正合性中一并得到。

2.1.3 局部化的正合性

定理 2.1.4. 模同态 $f: M \rightarrow N$ 诱导 $S^{-1}f(m/s) = f(m)/s$ 。这一定义给出正合函子：若

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} N \longrightarrow 0$$

正合，则局部化后的序列仍正合。因此局部化与核、像、余核及有限交相容。

证明. 若两分式相等，对它们的交叉差施加 f 即可证明诱导映射良定义；恒等映射与复合的相容性在分子上直接成立。

若 $i(l)/s = 0$ ，由(2.1)有 $ui(l) = i(ul) = 0$ 。原映射 i 单射，故 $ul = 0$ ，于是 $l/s = 0$ 。若 $q(m)/s = 0$ ，取 $u \in S$ 使 $q(um) = 0$ ，再取 $l \in L$ 使 $i(l) = um$ 。则

$$\frac{m}{s} = \frac{um}{us} = S^{-1}i\left(\frac{l}{us}\right).$$

反过来， $qi = 0$ 保证像包含于核。最后，对 n/s 选 m 满足 $q(m) = n$ ，便有原像 m/s ，证明满射性。

把任意同态分别分解为到其像的满射及像的包含，便得到关于核、像和余核的断言。对子模 $L_1, L_2 \subseteq M$ ，把交写为映射 $L_1 \oplus L_2 \rightarrow M$ 、 $(x, y) \mapsto x - y$ 的核，再用 $S^{-1}(L_1 \oplus L_2) \cong S^{-1}L_1 \oplus S^{-1}L_2$ ，得到有限交的相容性。□

第二卷命题 7.3.9 用有限关系判据证明 $S^{-1}R$ 是平坦 R 模；结合命题 2.1.3，那也能推出正合性。这里的分式证明则明确指出：落在局部核中不意味着原分子已经在核中，而是要先乘上某个分母。这个区别将在理想的收缩和模的支集中反复使用。

2.2 理想与局部化

局部化可能使一个非零理想变成零，也可能使一个真理想变成单位理想。要准确追踪理想，必须同时使用扩张与收缩；回到原环后增加的元素，正是能被某个允许的分母送入原理想的元素。本节还把第一章的素谱对应用于剩余域及纤维。

2.2.1 扩张、收缩与饱和

对理想 $I \subseteq R$, 扩张理想 $I(S^{-1}R)$ 正好由 a/s 、 $a \in I$ 、 $s \in S$ 组成, 记为 $S^{-1}I$ 。这是因为这些分式对加法及任意环分式的乘法封闭, 而且每个 $a/s = (a/1)(1/s)$ 。对 $J \subseteq S^{-1}R$, 其收缩是 $J^c = \{r \in R : r/1 \in J\}$ 。

定义 2.2.1. 理想 I 关于乘法集 S 的**饱和** (saturation with respect to a multiplicative set) 为

$$I : S^\infty := \{r \in R \mid sr \in I \text{ 对某个 } s \in S \text{ 成立}\}.$$

若 $I : S^\infty = I$, 称 I 关于 S 饱和。记号中的 ∞ 仅提示允许乘上分母; 这里没有把 S 当作理想取幂。

命题 2.2.2. 对上述理想有

$$(S^{-1}I)^c = I : S^\infty, \quad S^{-1}(J^c) = J.$$

因此 $S^{-1}R$ 的理想与 R 中关于 S 饱和的理想一一对应。此外, $S^{-1}I = S^{-1}R$ 当且仅当 $I \cap S \neq \emptyset$ 。

证明. 若 $r/1 = a/s$ 、 $a \in I$, 则存在 $u \in S$ 使 $u(sr - a) = 0$, 所以 $(us)r = ua \in I$ 。反过来, 若 $sr \in I$, 则 $r/1 = (sr)/s \in S^{-1}I$ 。这证明第一个等式, 也证明所定义的饱和是理想。

对 $a/s \in J$, 有 $a/1 = (s/1)(a/s) \in J$, 因而 $a \in J^c$; 反向包含由 J 是理想得到。两个等式还表明扩张收缩在饱和理想上互逆。最后, $1 \in (S^{-1}I)^c$ 等价于存在 $s \in S$ 属于 I , 这就是单位理想的判据。□

在 $R = k[x, y]$ 中, 取 $S = \{1, x, x^2, \dots\}$ 、 $I = (xy)$, 则

$$I : S^\infty = (y), \quad IR_x = (y)R_x.$$

确实, $x(y) \subseteq I$ 给出一个包含; 若 $x^n f \in (xy)$, 在整环 $k[x, y]/(y) = k[x]$ 中约去非零的 x^n , 便得 $f \in (y)$ 。同一个 I 在 x, y 都可逆的环中扩张成单位理想。

若 S 由单个 f 的幂组成, 这个饱和就是 $I : f^\infty = \bigcup_n (I : f^n)$ 。它与关于多生成元理想 J 的 $I : J^\infty$ 不同: 后者要求 $J^n r \subseteq I$, 即该幂理想的每个元素都满足条件; 本节的定义只要求存在一个分母。理想商与饱和的系统计算将在第八章继续讨论。

2.2.2 局部化中的素理想对应

命题 2.2.3. 扩张与收缩给出对应

$$\{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\} \longleftrightarrow \text{Spec}(S^{-1}R), \quad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}.$$

在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中唯一的极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 其素理想对应于 R 中包含在 $\mathfrak{p}$ 内的素理想。

证明. 第一章的定理 1.4.3 已证明这一对应及其拓扑相容性; 这里说明代数上怎样使用。若 $sr \in \mathfrak{p}$ 、 $s \notin \mathfrak{p}$, 素性给出 $r \in \mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{p}$ 饱和。商环

$$(S^{-1}R)/(S^{-1}\mathfrak{p}) \cong \bar{S}^{-1}(R/\mathfrak{p})$$

是非零整环, 因此扩张仍为素理想。相反, 局部化环中所有 $s/1$ 都是单位, 不可能落入真素理想; 其收缩是与 S 不交的素理想。由命题 2.2.2 两种操作互逆。

取 $S = R \setminus \mathfrak{p}$ 。一个素理想与 S 不交正是它包含于 $\mathfrak{p}$, 故最大的一个为 $\mathfrak{p}$ 。也可直接看出, 若 $a/s \notin \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 则 $a \notin \mathfrak{p}$, 其逆为 s/a ; 所以剩下的全部元素都是单位, 极大理想唯一。□

2.2.3 剩余域与纤维

定义 2.2.4. 素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$ 处的剩余域为

$$\kappa(\mathfrak{p}) := R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \cong \text{Frac}(R/\mathfrak{p}).$$

给定环同态 $\varphi: R \rightarrow A$, 称 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 为其在 $\mathfrak{p}$ 处的**纤维代数** (fibre algebra)。对 R 模 M , 相应的剩余向量空间为 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \cong M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$ 。

剩余域的同构可从分式直接看出: 模掉 $\mathfrak{p}$ 后, $R \setminus \mathfrak{p}$ 的像恰是整环 $R/\mathfrak{p}$ 的全部非零元素。两个张量描述则依次使用命题 2.1.3 及商模的张量公式。

命题 2.2.5. 纤维代数的素理想自然对应于 A 中满足 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$ 。

证明. 令 $S = R \setminus \mathfrak{p}$, 则

$$A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \cong S^{-1}A/\mathfrak{p}S^{-1}A.$$

商环的素理想对应于 $S^{-1}A$ 中包含 $\mathfrak{p}S^{-1}A$ 的素理想; 局部化对应又把它们识别为 A 中包含 $\varphi(\mathfrak{p})$ 且与 $\varphi(S)$ 不交的素理想。这两个条件分别给出 $\mathfrak{p} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 及反向包含, 故恰好是所述等式。□

例如 $k[t] \rightarrow k[x]$ 、 $t \mapsto x^2$ 在 $(t-a)$ 处的纤维代数为 $k[x]/(x^2-a)$ 。当 $a=0$ 时, 其中 x 的像非零却平方为零; 即使素谱只有一个点, 纤维代数仍保存这项幂零信息。当 $a \neq 0$ 、 $\text{char } k \neq 2$ 且 $a = b^2$ 时, 中国剩余定理给出 $k[x]/(x^2-a) \cong k \times k$ 。若 a 在 k 中没有平方根, 商环则为二次域扩张。纤维的点与剩余域都依赖基域。

2.3 模的支集

局部化把一个模分散到素谱的各点; 支集记录它在哪些点仍然非零。有限生成性使这些局部信息受到一个理想的统一控制。处理同态时, 还要进一步区分“有限个生成元”与“有限个生成关系”, 因为清分母必须一次覆盖全部有关数据。

2.3.1 支集、零化子与有限生成性

定义 2.3.1. R 模 M 的支集 (support) 与零化子 (annihilator) 分别为

$$\begin{aligned}\mathrm{Supp}_R M &= \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec} R \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}, \\ \mathrm{Ann}_R M &= \{a \in R \mid am = 0 \text{ 对所有 } m \in M\}.\end{aligned}$$

零化子也称湮灭子。对单个元素, 简记 $\mathrm{Ann}_R(m) = \{a \in R : am = 0\}$; 它等于循环子模 Rm 的零化子。

定理 2.3.2. 对任意 M 有

$$\mathrm{Supp}_R M \subseteq V(\mathrm{Ann}_R M).$$

若 M 有限生成, 则等号成立。更具体地, 有限生成模满足

$$M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff sM = 0 \text{ 对某个 } s \notin \mathfrak{p} \text{ 成立}.$$

证明. 若 $a \in \mathrm{Ann}_R M \setminus \mathfrak{p}$, 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中 a 可逆, 又零化 $M_{\mathfrak{p}}$, 故该模为零。这证明一般包含关系。

设 $M = Rm_1 + \cdots + Rm_r$ 且 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 。由 (2.1), 对每个 i 有 $s_i \notin \mathfrak{p}$ 使 $s_i m_i = 0$ 。取 $s = s_1 \cdots s_r$, 则 $s \notin \mathfrak{p}$ 且 $sM = 0$ 。反向由 s 局部可逆得到。于是 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 等价于 $\mathrm{Ann}_R M \not\subseteq \mathfrak{p}$, 即所述等式。对零模取空生成集及 $s = 1$, 论证仍成立。 $\square$

因而有限生成模的支集是闭集。例如

$$\mathrm{Supp}_{k[x,y]} k[x,y]/(xy) = V(xy) = V(x) \cup V(y).$$

模掉 xy 得到的模同时分布在两条坐标轴上; 若进一步在 x 处局部化, 则只留下 $y = 0$ 且 $x \neq 0$ 的部分。

有限生成条件不能省去。整数模 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的零化子为零: 对非零整数 n , 选不能整除 n 的正整数 d , 则 $n(1/d + \mathbb{Z}) \neq 0$ 。但在 (0) 处局部化后, 每个元素都被某个非零整数零化, 故整个模变成零。所以

$$(0) \in V(\mathrm{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})), \quad (0) \notin \mathrm{Supp}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

此例中每个元素各有一个有效乘子, 却没有一个非零整数同时零化全部元素。

2.3.2 局部化与 Hom 的交换条件

设 M, N 为 R 模。局部化后的同态可以对分式取值, 因而有自然映射

$$S^{-1} \mathrm{Hom}_R(M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N), \quad \frac{f}{s} \longmapsto \left(\frac{m}{t} \longmapsto \frac{f(m)}{st} \right). \quad (2.2)$$

若两侧的分式代表元改变, 交叉差仍被某个分母零化; 因此该公式良定义。也可先在 M 上取 $m \mapsto f(m)/s$, 再用命题 2.1.2 的延拓泛性质。

定理 2.3.3. 若 M 有限生成, (2.2) 为单射。若 M 有限展示, 即存在有限整数 a, b 及正合列

$$R^a \longrightarrow R^b \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

则该映射为同构。两种结论都不要要求 N 有限生成。

证明. 设 $m_1, \dots, m_b$ 生成 M , 且 f/s 在右侧为零。每个 $f(m_i)/s = 0$, 故可取 $u_i \in S$ 使 $u_i f(m_i) = 0$ 。乘积 $u = \prod_i u_i$ 零化 f 在全部生成元上的值, 因而 $uf = 0$, 即 $f/s = 0$ 。这证明单射性。

再设 M 有上述有限展示, 记 $e_1, \dots, e_b$ 在 M 中的像为 m_i 。展示的第一个映射的像由有限个关系 $\sum_i a_{ij} m_i = 0, 1 \leq j \leq a$ 生成。给定右侧的同态 g , 把有限个 $g(m_i/1)$ 通分为 n_i/s 。每个关系给出

$$\frac{\sum_i a_{ij} n_i}{s} = 0.$$

故可选一个共同的 $u \in S$, 使全部 $\sum_i a_{ij} u n_i = 0$ 在 N 中成立。于是 $m_i \mapsto u n_i$ 满足全部关系, 诱导 $f: M \rightarrow N$ 。此时 $f/(us)$ 在 (2.2) 下的像在 $m_i/1$ 上等于 g , 因而就是 g 。这证明满射性。□

有限生成用来同时清除生成元的分母; 有限展示还让我们同时清除关系中的分母。若两者都不假设, 取 $R = \mathbb{Z}, S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}, M = \mathbb{Q}, N = \mathbb{Z}$ 。任意 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ 都为零, 因为 $f(q)$ 被每个正整数整除; 而局部化后的同态环为 $\text{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ 。因此一般的 Hom 不能无条件移过局部化。

2.3.3 短正合列中的支集

命题 2.3.4. 若 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 正合, 则

$$\text{Supp}_R M = \text{Supp}_R L \cup \text{Supp}_R N.$$

该结论对任意模成立。此外, 任意模族满足

$$\text{Supp}_R \left(\bigoplus_{\lambda} M_{\lambda} \right) = \bigcup_{\lambda} \text{Supp}_R M_{\lambda}.$$

证明. 由定理 2.1.4, 在每个 $\mathfrak{p}$ 处仍有短正合列。中间项为零当且仅当两端同时为零, 取补集即得第一式。

局部化与直和相容: 把分式 $(m_{\lambda})_{\lambda}/s$ 送到 $(m_{\lambda}/s)_{\lambda}$ 。其像仍为有限支集; 反过来, 有限支集中的各个分母可以取乘积通分, 得到逆映射。直和为零当且仅当各分量为零, 因而得到第二式。□

第一式说明支集忽略了短正合列是否分裂。例如 $R = k[x]$ 上

$$0 \longrightarrow (x)/(x^2) \longrightarrow R/(x^2) \longrightarrow R/(x) \longrightarrow 0$$

的三个非零模支集都为 $\{(x)\}$, 但中间项中的 x 作用非零而平方为零, 两端的 x 作用均为零。这种厚度信息并未由支集单独记录, 后面还要用长度、关联素理想及准素分解作更细的分析。

2.4 局部—整体原则

在一个素理想处看不见某个元素,只说明有一个不属于该素理想的乘子零化它;若在每个极大理想处都看不见它,这些乘子便不可能共同被任何极大理想限制。本节利用这一点检测元素、模和映射。这里的大部分结论不要求有限生成,有限性只在进一步推广到邻域或生成元个数时出现。

2.4.1 元素与模的消失判据

定理 2.4.1. 设 $m \in M$ 。下列条件等价:

1. $m = 0$;
2. 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $m/1 = 0$ 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中成立;
3. 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $m/1 = 0$ 在 $M_{\mathfrak{m}}$ 中成立。

因此 $M = 0$ 当且仅当所有 $M_{\mathfrak{m}}$ 为零,也当且仅当所有 $M_{\mathfrak{p}}$ 为零。

证明. 前两次蕴含直接成立,因为极大理想是素理想。若 $m \neq 0$, 其零化子 $\text{Ann}_R(m)$ 是真理想,故包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 。若 $m/1 = 0$ 在 $M_{\mathfrak{m}}$ 中成立, (2.1) 给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sm = 0$, 与 $\text{Ann}_R(m) \subseteq \mathfrak{m}$ 矛盾。因此第三个条件推出第一个。对 M 的每个元素应用该结论,即得模的断言。若 R 为零环,么性模只能为零,空集上的检验也与结论相符。 $\square$

推论 2.4.2. 若 $N \subseteq M$, 则

$$m \in N \iff m/1 \in N_{\mathfrak{m}} \text{ 对每个极大理想 } \mathfrak{m}.$$

特别地,两个子模 $N, L \subseteq M$ 相等,当且仅当它们在每个极大理想处局部化后相等。

证明. 由定理 2.1.4, $(M/N)_{\mathfrak{m}} \cong M_{\mathfrak{m}}/N_{\mathfrak{m}}$ 。所以条件恰好表示 $m + N$ 在每个局部化中为零;应用定理 2.4.1 即得 $m + N = 0$ 。对子模的每个元素分别应用包含判据,得到相等判据。 $\square$

例如整环 R 在分式域 K 内满足

$$R = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} R_{\mathfrak{m}}.$$

确实,对 $z \in K$, 分母理想 $I_z = \{a \in R : az \in R\}$ 若为真理想,选包含它的极大理想 $\mathfrak{m}$ 。若 $z \in R_{\mathfrak{m}}$, 则 $z = b/s$, $s \notin \mathfrak{m}$, 于是 $s \in I_z$, 矛盾。故处处属于局部环便迫使 $I_z = R$, $z \in R$ 。

2.4.2 单射、满射与同构的局部检测

定理 2.4.3. 对任意 R 模同态 $f: M \rightarrow N$, 单射、满射及同构这三种性质,均可在所有极大理想处的 $f_{\mathfrak{m}}$ 上检测,也可在所有素理想处检测。更一般地,一个复形

$$L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N, \quad vu = 0,$$

在 M 处正合,当且仅当每个极大理想处的局部化复形在中间项正合。

证明. 正合性定理给出

$$(\ker f)_m \cong \ker f_m, \quad (\operatorname{coker} f)_m \cong \operatorname{coker} f_m.$$

用定理 2.4.1 分别检测这两个模是否为零, 便得到单射与满射的判据; 两者同时成立等价于同构。对复形同样考虑 $H = (\ker v)/\operatorname{im} u$ 。由局部化与核、像及商相容, 其局部化恰为局部复形的中间同调。因此所有局部复形正合等价于所有 $H_m = 0$, 也就等价于 $H = 0$ 。改用所有素理想的证明完全相同。□

上述结论检测的是一个已经给定的映射。若只知道每个 M_m 与 N_m 各自同构, 却没有一个共同的全局映射, 就不能直接应用该定理。局部同构之间是否相容, 是另一项需要处理的数据。

给定一组元素 $m_1, \dots, m_r \in M$, 它们生成 M , 当且仅当其像生成每个 M_m : 把判据应用于 $R^r \rightarrow M$, $e_i \mapsto m_i$ 的满射性即可。这里生成元是全局预先选定的; 不能偷换成“每个点都能另选有限个局部生成元”。

2.4.3 素理想检测与极大理想检测

命题 2.4.4. 设 $f_1, \dots, f_r \in R$ 生成单位理想。

1. 若 $M_{f_i} = 0$ 对每个 i 成立, 则 $M = 0$ 。
2. 若每个 M_{f_i} 都是有限生成 R_{f_i} 模, 则 M 有限生成。

证明. 对 $m \in M$, 第一项的假设给出整数 $n_i \geq 1$ 使 $f_i^{n_i} m = 0$ 。理想 $(f_1^{n_1}, \dots, f_r^{n_r})$ 仍为单位理想: 否则它包含于某个极大理想, 该极大理想由素性包含每个 f_i , 与原假设矛盾。将 1 写成这些幂的线性组合, 便得 $m = 0$ 。

对第二项, 把每个局部模的有限生成元写成 $m_{ij}/f_i^{a_{ij}}$ 。取由全部有限个分子 m_{ij} 生成的子模 N 。由于 f_i 已可逆, $N_{f_i} = M_{f_i}$; 正合性给出 $(M/N)_{f_i} = 0$ 。第一项应用于 M/N , 即得 $M = N$ 。□

第一章中 $D(f_i)$ 覆盖素谱恰好等价于 $(f_1, \dots, f_r) = R$ 。所以该命题说明, 在一组有限基本开覆盖上给出有限生成性, 足以得到全局有限生成性。若每个点有这样的基本开邻域, 还可由素谱拟紧性抽取有限子覆盖。

仅要求每个茎 M_p 有限生成则不够。例如

$$M = \bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

不是有限生成整数模, 因为有限个元素只涉及有限个直和分量; 但 $M_{(p)} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 而 $M_{(0)} = 0$ 。故所有素理想处的局部模都有限生成, 却未必能把一处的生成元扩大到一个共同邻域。这与定理 2.3.2 对有限生成性的要求相呼应。

此外, “在局部环上检验” 不能随意改成 “张量到剩余域上检验”。在 $R = k[t]_{(t)}$ 上, 商映射 $R/(t^2) \rightarrow R/(t)$ 不是同构, 但张量到唯一的剩余域 k 后成为 k 上的恒等映射。下一章的 Nakayama 引理能在有限生成条件下用剩余向量空间检测生成性; 它并不使剩余域张量变成一般的正合操作。

2.5 局部环与局部同态

在 $\mathfrak{p}$ 处局部化后, 所有不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素都成为单位, 留下的非单位恰好组成一个极大理想。这种情形值得独立命名, 因为接下来的生成元判据和维数理论都将在这样的环上表述。局部性只说明单位与非单位的分界, 不包含任何隐含的有限性假设。

2.5.1 局部环的单位、极大理想与剩余域

定义 2.5.1. 非零交换含幺环 R 若恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 称为**局部环** (local ring)。写作 $(R, \mathfrak{m})$, 或连同剩余域 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 写作 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 。

命题 2.5.2. 对非零交换环 R , 下列条件等价:

1. R 为局部环;
2. 全部非单位组成一个理想;
3. 存在真理想 $\mathfrak{m}$, 使 $R \setminus \mathfrak{m} = R^\times$ 。

在这些条件下, 该非单位理想就是唯一的极大理想; 特别地, $a \in \mathfrak{m}$ 时 $1 - a$ 是单位。

证明. 一个元素 a 非单位, 当且仅当主理想 (a) 为真理想, 也就当且仅当 a 属于某个极大理想。若极大理想唯一, 全部非单位恰为它, 得到第二项与第三项。反过来, 若非单位集是理想, 则它包含每个真理想中的元素, 又不含 1, 所以是唯一的极大理想。第三项也给出同样结论。最后, 若 $a, 1 - a$ 都属于 $\mathfrak{m}$, 则 $1 \in \mathfrak{m}$, 矛盾。 $\square$

局部环不必是 Noether 环。取

$$R = k[x_1, x_2, \dots]_{(x_1, x_2, \dots)}.$$

这是由命题 2.2.3 得到的局部环, 但理想链 $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \dots$ 仍严格上升。若 x_{n+1} 属于前一项, 清分母后有 $sx_{n+1} \in (x_1, \dots, x_n)$, 其中 s 的常数项非零; 令前 n 个变量为零, 在剩余变量的多项式整环中得到一个非零多项式乘 x_{n+1} 为零, 矛盾。

2.5.2 局部同态与点处局部环

定义 2.5.3. 局部环之间的含幺同态 $\varphi: (R, \mathfrak{m}) \rightarrow (A, \mathfrak{n})$ 若满足 $\varphi(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$, 称为**局部同态** (local homomorphism)。

任意含幺同态都把单位送到单位, 所以总有 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) \subseteq \mathfrak{m}$ 。因此局部同态的条件等价于 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$, 也等价于非单位不会变成单位。它诱导一个含幺的剩余域同态

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow A/\mathfrak{n},$$

该映射为单射, 因为域到非零环的含幺同态核为零。

命题 2.5.4. 若 $\varphi: R \rightarrow A$ 、 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } A$, 并令 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, 则有自然的局部同态

$$R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow A_{\mathfrak{q}}, \quad r/s \mapsto \varphi(r)/\varphi(s).$$

它诱导剩余域的嵌入 $\kappa(\mathfrak{p}) \rightarrow \kappa(\mathfrak{q})$ 。

证明. $s \notin \mathfrak{p}$ 意味着 $\varphi(s) \notin \mathfrak{q}$, 因而目标分母合法; 局部化的泛性质给出同态. 若 $r \in \mathfrak{p}$, 其像落在 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$, 故该同态为局部同态. 再取剩余域即得所述嵌入. $\square$

例如有限型仿射代数 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$ 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部环为 $A_{\mathfrak{p}}$. 对一个 k 有理点 $a = (a_1, \dots, a_n)$, 即所有 $f \in I$ 在 a 处取零, 代入映射的核 $\mathfrak{m}_a$ 为极大理想, 剩余域为 k . 局部环中的元素可写成 f/g , 要求 $g(a) \neq 0$. 这个描述表示在该点附近允许分母不消失, 而不要求 g 在所有点上都非零.

局部环之间的任意含么同态未必局部. 例如 $\mathbb{Z}_{(p)} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 把非单位 p 变为单位, 其极大理想不能映入 $\mathbb{Q}$ 的极大理想 0 . 所以使用剩余域映射前必须检查局部条件.

2.5.3 多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环

在

$$R = k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}$$

中, 唯一极大理想由 $x_1, \dots, x_n$ 生成, 剩余域为 k . 当 $n = 1$ 时, 每个非零元素都唯一写成 $x^r u$, 其中 $r \geq 0$, u 为单位. 因为多项式分子可提取唯一的 x 次幂, 而局部化的分母常数项非零. 非零理想中取这样的最小 r , 便知该理想等于 (x^r) .

定义 2.5.5. 设 K 为域, 满射 $v: K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ 满足

$$v(ab) = v(a) + v(b), \quad v(a+b) \geq \min\{v(a), v(b)\} \quad (a+b \neq 0).$$

这样的 v 称为一个**离散赋值** (discrete valuation); 相应子环 $V = \{0\} \cup \{a \in K^\times \mid v(a) \geq 0\}$ 称为**离散赋值环** (discrete valuation ring), 简称 DVR.

由赋值条件, V 确实对加法及乘法封闭; 其单位恰为赋值为零的元素. 若选 π 满足 $v(\pi) = 1$, 每个非零元素为 $\pi^r u$, 并且非单位组成 (π) . 因此它是非域的局部整环, 所有非零理想均为 (π^r) , 证明与上一段的最小赋值论证相同. $\mathbb{Z}_{(p)}$ 及 $k[x]_{(x)}$ 分别对应有理数的 p 指数及有理函数在 $x = 0$ 处的零点阶数. 第十章将证明 DVR 的其他内在刻画; 当前只使用这些直接算例.

另一类局部环来自有限维代数. 例如, 对整数 $r \geq 1$, 取

$$B = k[\epsilon]/(\epsilon^r), \quad C = k[x, y]/(x, y)^2.$$

在 B 中, 一个元素为单位当且仅当常数项非零: 把它写成 $a(1+n)$, 其中 $a \in k^\times, n^r = 0$, 逆为 $a^{-1}(1 - n + \dots + (-n)^{r-1})$. 在 C 中同理, 唯一极大理想为 $(\bar{x}, \bar{y})$, 其平方为零. 这些环作为 k 向量空间有限维, 故理想降链必稳定; 它们是 Artin 局部环, 正式结构将在下一章证明. 与 DVR 不同, 它们的极大理想幂会变成零, 而且 C 的极大理想需要两个生成元.

2.5.4 局部化、Hensel 化与完备化的比较

局部化的任务已经明确: 允许一个乘法集中的元素作分母. 例如 $k[x]_{(x)}$ 中的 $1/(1-x)$ 是一个分式, 没有因此加入所有形式幂级数.

完备化则要求同时保存模掉 $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}^2, \dots$ 的相容近似, 其基本对象是

$$\widehat{R} = \varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n.$$

对 $k[x]_{(x)}$, 每个商同构于 $k[x]/(x^n)$, 相容的截断多项式逐项确定一个形式幂级数, 所以其完备化为 $k[[x]]$. 这项识别只用系数的相容性; 完备化何时保持正合性、原环何时嵌入其中, 将由第十三章在明确的有限性条件下证明。

Hensel 化处理的是剩余域中的单根或互素因子能否提升到局部环的问题。在特征不为 2 的域上, 方程 $T^2 - (1+x) = 0$ 模掉 x 后在 $T = 1$ 处有单根; 但它在 $k[x]_{(x)}$ 中没有根, 因为有理函数的平方在不可约多项式 $1+x$ 处具有偶数阶, 而 $1+x$ 的阶为一。Hensel 化会按其泛性质补足这类提升。第二十三章才给出 Hensel 环与 Hensel 化的完整定义、构造及性质; 本段只是区分三种操作的目的, 不把尚未建立的提升性质用于本章证明。

本章小结

局部化中的等式允许再乘一个分母后成立; 这一零判据同时解释了分式模的构造、局部化的正合性和理想收缩时的饱和。剩余域则还要模掉局部环的极大理想, 因而保存的信息少于整个局部化模。

任意模的元素、子模和给定同态都可以在所有极大理想处检测, 不要求有限生成。有限生成使支集由零化子的闭集描述, 使若干元素的分母可以统一; 有限展示进一步使同态的有限个关系可以统一清分母。逐点有限与邻域有限之间仍有差别, 不能混同。

局部环把非单位集中在唯一极大理想中, 为下一章的 Nakayama 引理准备了单位判据。多项式局部环、DVR 及 Artin 局部环已经展示不同的极大理想结构; 完备化与 Hensel 化各自增加的内容将在后续章节另行建立。

习题

习题 2.1. 设 $n \geq 1$, p 为素数, 写 $n = p^a d$, $p \nmid d$. 求 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{(p)}$, 并说明 $a = 0$ 时的结果。

解. 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中 d 是单位, 所以 $n\mathbb{Z}_{(p)} = p^a \mathbb{Z}_{(p)}$. 由商与局部化相容,

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{(p)} \cong \mathbb{Z}_{(p)}/p^a \mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}/p^a \mathbb{Z}.$$

末个同构把 b/s 送到 bs^{-1} 模 p^a 的类, $p \nmid s$ 保证逆存在; 核恰为 $p^a \mathbb{Z}_{(p)}$. 若 $a = 0$, n 已是单位, 商为零。□

习题 2.2. 令 $R = k[x, y]/(xy)$, 仍用 x, y 记剩余类。求 $R \rightarrow R_x$ 的核, 并显式确定 R_x 。

解. x 可逆后, 由 $xy = 0$ 得 $y = 0$, 所以 $R_x \cong k[x, x^{-1}]$. 每个 R 中的元素唯一写成 $a(x) + yb(y)$. 其在局部化中的像为 $a(x)$, 由 $k[x]$ 到 Laurent 多项式环的嵌入可知像为零当且仅当 $a = 0$. 故核为 (y) , 恰好是被某个 x 幂零化的元素组成的理想。□

习题 2.3. 固定素数 p , 取 $M = \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, 把 p 变为单位。证明每个分量的局部化均为零, 而 $M[1/p] \neq 0$ 。这与局部化正合有无矛盾?

解. 第 n 个分量被 p^n 零化, 故局部化为零。取 $m = (1 \bmod p^n)_n$ 。对任何 r , 其第 $r+1$ 个分量满足 $p^r \nmid 0 \pmod{p^{r+1}}$, 所以 $p^r m \neq 0$ 。由零判据, $m/1 \neq 0$ 。因此局部化不必与无限直积交换。正合性讨论的是核、像和有限的正合条件, 不包含任意无限直积相容性, 故无矛盾。□

习题 2.4. 在 $R = k[x, y]$ 中, 令 $I = (x^2, xy)$ 。求 $I : y^\infty$ 、 $I : x^\infty$, 并写出在 R_y, R_x 中的扩张理想。

解. 因 $yx \in I$, 有 $(x) \subseteq I : y^\infty$ 。若 $y^n f \in I \subseteq (x)$, 模掉 x 后在整环 $k[y]$ 中得到 $y^n \bar{f} = 0$, 故 $\bar{f} = 0$, 即 $f \in (x)$ 。所以 $I : y^\infty = (x)$, 相应扩张为 $(x)R_y$ 。又 $x^2 \in I$, 故 $1 \in I : x^\infty$, 得到 $I : x^\infty = R$ 、 $IR_x = R_x$ 。□

习题 2.5. 在 $k[x, y]$ 中取 $I = (xy)$ 、 $J = (x, y)$, 并令 S 为 x, y 生成的乘法集。比较 $I : J^\infty$ 与 $I : S^\infty$ 。

解. 若 $fJ^n \subseteq (xy)$, 则 fx^n 和 fy^n 都被 xy 整除。第一式模掉 y 后迫使 $f \in (y)$, 第二式模掉 x 后迫使 $f \in (x)$ 。多项式的单项式展开给出 $(x) \cap (y) = (xy)$, 故 $f \in I$ 。反向显然, 因而 $I : J^\infty = I$ 。另一方面 $xy \in I \cap S$, 所以 $I : S^\infty = R$ 。前者要求一整个幂理想都送入 I , 后者只要求找到一个乘子。□

习题 2.6. 列出 $\mathbb{Z}[1/6]$ 的素理想, 并求 $(\mathbb{Z}/42\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[1/6]$ 的支集。

解. 素理想对应于 $\mathbb{Z}$ 中与 $\{6^n : n \geq 0\}$ 不交的素理想, 故为 0 及 $(p)\mathbb{Z}[1/6]$, 其中 $p \neq 2, 3$ 为素数。局部化后 $42 = 6 \cdot 7$ 与 7 生成同一理想, 所以该模为 $\mathbb{Z}[1/6]/(7) \cong \mathbb{F}_7$ 。其支集只有极大理想 $(7)\mathbb{Z}[1/6]$ 。□

习题 2.7. 在 $R = k[x, y]$ 中取 $\mathfrak{p} = (x)$ 、 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 。分别求剩余域, 说明为什么 $R_{\mathfrak{p}}$ 中 y 可逆, 而 $R_{\mathfrak{m}}$ 中不可逆。

解. $R/\mathfrak{p} = k[y]$, 故 $\kappa(\mathfrak{p}) = k(y)$; $R/\mathfrak{m} = k$, 故 $\kappa(\mathfrak{m}) = k$ 。因 $y \notin \mathfrak{p}$, 它是 $R_{\mathfrak{p}}$ 的允许分母; 而 $y \in \mathfrak{m}$, 在 $R_{\mathfrak{m}}$ 中属于唯一极大理想, 不能为单位。素理想处的剩余域不必是基域, 也不必由一个闭点给出。□

习题 2.8. 考虑 $k[t] \rightarrow k[x, y]$ 、 $t \mapsto xy$ 。求在 $(t-a)$ 、 $a \in k$, 处的纤维代数, 并分别讨论 $a=0$ 与 $a \neq 0$ 。

解. 纤维代数为 $k[x, y]/(xy-a)$ 。若 $a=0$, 素谱是 $V(x) \cup V(y)$, 且 x, y 的非零剩余类乘积为零。若 $a \neq 0$, 关系说明 x 可逆, 逆为 $a^{-1}y$; 映射

$$k[x, y]/(xy-a) \longrightarrow k[x, x^{-1}], \quad x \mapsto x, \quad y \mapsto ax^{-1}$$

的逆把 x^{-1} 送到 $a^{-1}y$, 故为同构。此时纤维环是整环, 且不包含 $x=0$ 的点。□

习题 2.9. 求 $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ 的零化子与支集, 并据此说明无限生成模的支集与零化子闭集可以不同。

解. 没有非零整数能同时零化全部 $p^{-n} + \mathbb{Z}$, 所以零化子为零。在 (q) 、 $q \neq p$, 处, p 已可逆, 每个元素被某个 p 幂零化, 故局部模为零; 在 (0) 处同样为零。在 (p) 处, 任何不被 p 整除的整数作用在每个有限循环子群上都是可逆的, 因此自然局部化不消去非零元素。支集恰为 $\{(p)\}$, 而 $V(0) = \text{Spec } \mathbb{Z}$ 。□

习题 2.10. 设 M 有限生成且 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 。证明存在 $f \notin \mathfrak{p}$ 使 $M_f = 0$ 。进一步, 若有限个全局元素生成 $M_{\mathfrak{p}}$, 证明它们在某个这样的 $D(f)$ 上生成 M_f 。

解. 由定理 2.3.2, 存在 $f \notin \mathfrak{p}$ 使 $fM = 0$, 因而 $M_f = 0$ 。对第二问, 令 N 为这些全局元素生成的子模。有限生成商模 $Q = M/N$ 满足 $Q_{\mathfrak{p}} = 0$, 故存在 $f \notin \mathfrak{p}$ 使 $Q_f = 0$ 。由局部化正合性, $N_f = M_f$, 正是所需结论。□

习题 2.11. 令 $R = \prod_{n \geq 1} k$, $I = \bigoplus_{n \geq 1} k \subseteq R$ 为有限支集理想。对有限集 $F \subseteq \mathbb{N}$, 令 e_F 为其特征幂等元, 取 $S = \{1 - e_F : F \text{ 有限}\}$ 。证明 $M = R/I$ 是有限生成模, 但

$$S^{-1} \text{Hom}_R(M, R) \longrightarrow \text{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}R)$$

不是满射。

解. S 对乘法封闭, 因为 $(1 - e_F)(1 - e_G) = 1 - e_{F \cup G}$, 并且包含 1 而不包含 0。 M 循环, 所以有限生成。若 $aI = 0$, 逐个乘单坐标幂等元得每个坐标 $a_n = 0$, 故 $\text{Ann}_R I = 0$ 。由同态在 $1 + I$ 上的值决定它, $\text{Hom}_R(R/I, R) = \text{Ann}_R I = 0$ 。

每个 $x \in I$ 的支集含于某个有限 F , 故 $(1 - e_F)x = 0$, 于是 $S^{-1}I = 0$ 。正合性给出 $S^{-1}M \cong S^{-1}R$ 。这个局部化环非零, 因为 $0 \notin S$, 而 $1/1 = 0$ 将要求 S 含有零元。因此右侧含非零恒等同态, 左侧为零, 不可能满射。这具体说明定理 2.3.3 的满射性不能仅用有限生成替代有限展示。□

习题 2.12. 取 $M = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}e_n$ 、 $N = \mathbb{Z}$, 把一个素数 p 变为单位。证明局部化后由 $e_n \mapsto p^{-n}$ 定义的同态, 不来自 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Z})[1/p]$ 。

解. 局部化后 $M[1/p]$ 是具有基 e_n 的自由 $\mathbb{Z}[1/p]$ 模, 因此指定这些像确实定义同态。若它来自 f/p^r , 则对每个 n 有 $f(e_n) = p^{r-n}$ 作为有理数成立。但 $n > r$ 时右侧不是整数, 矛盾。这个例子的困难已经发生在无限个生成元上, 无需再考虑生成关系。□

习题 2.13. 在 $k[x, y]$ 中, 先求 $(x) \cap (y)$, 再在 y 处局部化, 核对结果等于两个扩张理想的交。

解. 属于 (x) 的多项式的每个非零单项式都含 x , 属于 (y) 的则都含 y 。因此交为 (xy) 。在 R_y 中, $(y)R_y = R_y$, 而 $(xy)R_y = (x)R_y$, 故

$$\left((x) \cap (y)\right)R_y = (x)R_y = (x)R_y \cap (y)R_y.$$

这与有限交的局部化相容性一致; 习题 2.3 的无限直积反例说明不能因此任意扩展到无限操作。□

习题 2.14. 固定素数 q 。在 $\mathbb{Q}$ 内计算 $\bigcap_{p \neq q} \mathbb{Z}_{(p)}$, 其中 p 遍历其余素数。

解. 把一个有理数写成互素分子分母 a/b , $b > 0$ 。它属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 当且仅当 $p \nmid b$ 。要求对所有 $p \neq q$ 成立, 就等价于 b 只有素因子 q 。因此交恰为 $\mathbb{Z}[1/q]$ 。删去一个极大理想处的检测, 确实可能失去信息。□

习题 2.15. 设 $fR + gR = R$, $N \subseteq M$ 。若 $m/1 \in N_f$ 且 $m/1 \in N_g$, 直接用分母证明 $m \in N$, 不要只引用全部极大理想处的判据。

解. 在 M/N 中, $m + N$ 分别在 f, g 处消失, 所以存在 $r, s \geq 1$ 使 $f^r m, g^s m \in N$ 。理想 (f^r, g^s) 为单位理想: 否则一个包含它的极大理想将同时包含 f, g 。取 $af^r + bg^s = 1$, 得到 $m = a(f^r m) + b(g^s m) \in N$ 。□

习题 2.16. 令 $M = \bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。证明对每个非零整数 n , $M[1/n]$ 仍不是有限生成 $\mathbb{Z}[1/n]$ 模。由此解释为什么 $M_{(0)} = 0$ 不能在 (0) 的一个基本开邻域上给出有限生成性。

解. 若 $p \mid n$, 第 p 个分量被局部化消去; 若 $p \nmid n$, n 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上已可逆, 该分量保留。故 $M[1/n] \cong \bigoplus_{p \nmid n} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。仍有无限多个非零分量, 而有限个元素的 $\mathbb{Z}[1/n]$ 线性组合只能涉及有限个分量, 所以不有限生成。包含 (0) 的基本开集恰好是非零 n 给出的 $D(n)$, 因此没有一个这样的邻域满足所需有限性。□

习题 2.17. 对 $R = k[t]_{(t)}$, 计算 $R/(t^3) \rightarrow R/(t)$ 的核, 并证明张量到剩余域后该核的自然像为零, 而张量后的商映射是同构。

解. 核为 $(t)/(t^3)$, 其中 $t + (t^3) \neq 0$ 。张量到 $k = R/(t)$ 时, 两个商模都变成 k , 诱导映射为恒等。核的张量为

$$\left((t)/(t^3) \right) \otimes_R k \cong (t)/(t^2) \cong k,$$

但它到 $\left(R/(t^3) \right) \otimes_R k = k$ 的自然映射把 t 的类送到零。于是原序列的单射在张量后不再单射; 这恰是剩余域张量不能替代局部化正合性的原因。□

习题 2.18. 证明 $k[x]_{(x)} \rightarrow k[x, y]_{(x, y)}$ 的自然同态为局部同态, 并求其剩余域映射。再说明 $k[x]_{(x)} \hookrightarrow k(x)$ 为什么不是局部同态。

解. 来源中允许的分母在 $x = 0$ 处非零, 进入目标后在 $(0, 0)$ 处仍非零, 所以同态存在。极大理想 (x) 映入 (x, y) , 故同态局部; 两边剩余域都是 k , 诱导映射为恒等。到分式域的嵌入把非单位 x 变为单位, 或者说 (x) 的像不包含于目标极大理想 0 , 所以不局部。□

习题 2.19. 在 $R = k[x]_{(x)}$ 中求理想 $(x^3(1+x), x^5)$, 并求商环的所有理想及其作为 k 向量空间的维数。

解. $1+x$ 为单位, 所以原理想等于 (x^3) 。 R 的每个非零理想为一个 (x^r) , 因此商环 $R/(x^3)$ 的理想为 $0, (\bar{x}^2), (\bar{x}), R/(x^3)$ 。该商同构于 $k[x]/(x^3)$, 基为 $1, \bar{x}, \bar{x}^2$, 维数为 3; 其中三个非零理想的维数分别为 1, 2, 3。□

习题 2.20. 对 $A = k[x, y]/(x, y)^2$, 写出一般单位的逆, 并证明其极大理想不能由一个元素生成。

解. 一般元素为 $a + b\bar{x} + c\bar{y}$. 若 $a \neq 0$, 令 $n = b\bar{x} + c\bar{y}$, 有 $n^2 = 0$, 故逆为 $a^{-1} - a^{-2}n$. 若 $a = 0$, 该元素平方为零, 不能为单位. 所以极大理想为 $\mathfrak{m} = k\bar{x} \oplus k\bar{y}$. 因 $\mathfrak{m}^2 = 0$, 一个元素 $u \in \mathfrak{m}$ 生成的理想只有 ku , 至多一维, 不能等于二维的 $\mathfrak{m}$. $\square$

习题 2.21. 直接从相容序列定义构造 $\varprojlim_n k[x]/(x^n) \cong k[[x]]$, 并说明 $1/(1-x)$ 在该同构下的像。

解. 一个相容序列可唯一写成 $a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \pmod{x^n}$, 因为相邻项的低次系数必须相同. 把它送到 $\sum_{j \geq 0} a_j x^j$ 得到双射; 每个固定次数的加法与乘法只涉及有限个系数, 故双射保留环运算. 在每个商环中, $1-x$ 的逆为 $1+x+\cdots+x^{n-1}$, 因此相容序列对应 $\sum_{j \geq 0} x^j$. 这是形式系数的等式, 不涉及实数或复数意义的收敛. $\square$

习题 2.22. 设 $\text{char } k \neq 2$. 证明 $T^2 - (1+x)$ 在 $k[[x]]$ 中有唯一常数项为 1 的根, 却在 $k(x)$ 中没有根。

解. 令根为 $1 + \sum_{n \geq 1} a_n x^n$. 比较一次项得 $2a_1 = 1$; 对 $n \geq 2$ 比较系数得

$$2a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i} = 0.$$

因 2 可逆, 这些等式递归且唯一地确定全部系数, 并使平方恰为 $1+x$. 若有有理函数根 f/g , 约成互素多项式后由 $f^2 = (1+x)g^2$, 不可约多项式 $1+x$ 在左侧的指数为偶数, 在右侧为奇数, 矛盾. 因此完备化中可以出现原局部环及其分式域都没有的代数根. $\square$

第三章 Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理

有限生成与有限展示使模能够用有限数据描述，Noether 条件进一步保证子模仍有这样的描述。本章以行列式技巧证明交换环上的 Nakayama 引理，进而用剩余向量空间计算局部模的最少生成元数。对交换 Artin 环，则先证明根的幂零性与有限长度，再得到局部直积分解和零维 Noether 环的刻画。最后比较商、局部化、有限代数与子环中的有限性行为。

本章目标

- 区分有限生成、有限展示、Noether 性、Artin 性与有限长度。
- 能在具体证明中指出行列式技巧和 Nakayama 引理的假设。
- 用 $M/\mathfrak{m}M$ 选择极小生成组，并避免把生成组误认为自由基。
- 分解交换 Artin 环，理解零维刻画中 Noether 条件的作用。

预备知识为前两章的理想、素谱、局部化与局部环，以及第二卷第 12.2 节的有限长度与 Jordan–Hölder 定理。第一卷定理 12.4.5 承担 Hilbert 基定理的主要证明，本章只据此发展模论后果。阅读 Artin 环的证明时尤其要留意顺序：根的幂零性先于 Noether 性建立，不能在中途调用尚未得到的有限生成性。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, Theorems 2.1–2.3, pp. 7–9, Theorem 3.2, p. 16] 可用于对照行列式技巧、局部生成元和交换 Artin 环的证明。这些结果所需的论证也在本章完整给出。

3.1 有限性条件

有限个生成元能描述整个模，有限个关系能控制映射的定义，而 Noether 条件进一步控制它的每个子模。三种说法不能混用。本节把这些条件连起来，并说明第一卷已经证明的 Hilbert 基定理如何保证本卷主要算例具有所需的有限性。以下环仍交换且含幺。

3.1.1 有限生成与有限展示

定义 3.1.1. 若存在 $m_1, \dots, m_b \in M$ ，使每个 $m \in M$ 都能写成 $\sum_{i=1}^b a_i m_i$ 、 $a_i \in R$ ，称 M 为有限生成模 (finitely generated module)，也简称有限模。若存在有限整数 $a, b \geq 0$ 及正合列

$$R^a \xrightarrow{A} R^b \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

称 M 为**有限展示模** (finitely presented module)。该正合列给出一个有限展示: R^b 的基给出生成元, 矩阵 A 的列生成它们的全部关系。

有限展示也称有限呈示; 本书以“展示”为主称。有限模不表示底集合有限, 例如 $\mathbb{Z}$ 是有限生成整数模, 任意非零有限维实向量空间也是有限模, 却都有无限多个元素。

命题 3.1.2. M 有限展示, 当且仅当它有限生成且某个有限自由满射 $R^b \rightarrow M$ 的核有限生成。此时每个有限自由满射 $R^n \rightarrow M$ 的核都有限生成。

证明. 第一句只是把关系矩阵的像写成核; 反过来, 对核选有限个生成元即可构成有限展示。证明最后一句时, 设 $p: R^b \rightarrow M$ 的核 L 有限生成, 另有满射 $q: R^n \rightarrow M$ 。逐个提升基向量的像, 得到 $u: R^b \rightarrow R^n$ 、 $v: R^n \rightarrow R^b$, 满足 $qu = p$ 、 $pv = q$ 。若 $K = \ker q$, 则 $u(L) \subseteq K$, 且 $q(1 - uv) = q - pv = 0$ 。对 $x \in K$, 有 $vx \in L$, 所以

$$x = u(vx) + (1 - uv)x.$$

因此 $K = u(L) + (1 - uv)(R^n)$, 由 L 的有限生成元的像和有限个 $(1 - uv)e_i$ 生成。□

循环模 R/I 总是有限生成; 由这个命题, 它有限展示当且仅当理想 I 有限生成。取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 、 $I = (x_1, x_2, \dots)$, 便得到有限生成而非有限展示的模。若 I 由有限个多项式生成, 把其中出现的变量集中在前 n 个内, 再将这 n 个变量取零; 所有生成元的像为零, x_{n+1} 的像却非零, 矛盾。

3.1.2 Noether 环上的有限生成模

定义 3.1.3. 若模 M 的每条子模升链 $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \dots$ 最终稳定, 称 M 为**Noether 模** (Noetherian module)。若每条子模降链最终稳定, 称为**Artin 模** (Artinian module)。对正则模 R 应用这些条件, 分别得到**Noether 环** (Noetherian ring)与**Artin 环** (Artinian ring); 交换性使此处不必区分左右。

一个模是 Noether 模, 当且仅当它的每个子模有限生成。若某个子模不有限生成, 逐次添入不能由已有元素生成的元素, 就得到严格升链。反过来, 一条升链的并是子模; 其有限个生成元都属于同一个链项, 所以以后各项只能等于该项。

命题 3.1.4. 短正合列 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 的中间项为 Noether 模, 当且仅当两端均为 Noether 模; Artin 模也满足同样结论。特别地, 若 R 为 Noether 环, 则每个有限生成 R 模及其子模都为 Noether 模, 并且都有限展示。

证明. 子模的链也是原模的链, 商模的链可以取逆像, 所以中间项的链条件传给两端。反向设两端具有升链条件。对 M 的升链 (M_i) , 交链 $M_i \cap L$ 及其在 N 中的像链都稳定。若 $M_i \subseteq M_j$, 且交与像相同, 对 $x \in M_j$ 可取 $y \in M_i$ 有相同的像, 则 $x - y \in M_j \cap L = M_i \cap L$, 所以 $x \in M_i$ 。因此原链稳定。降链在共同的稳定起点后, 对反向包含使用同一个论证, 即得 Artin 情形。

若 R 为 Noether 环, 由 $0 \rightarrow R^{n-1} \rightarrow R^n \rightarrow R \rightarrow 0$ 归纳得到有限自由模为 Noether 模; 其商即任意有限生成模仍为 Noether 模, 所有子模也如此。对这些模选有限自由满射, 核作为 Noether 模的子模有限生成, 再用命题 3.1.2 得到有限展示。□

这个命题把第二卷第 12.1 节的链条件论证落实到交换环上。它还解释了定理 2.3.3 在 Noether 环上为何只需假设源模有限生成：有限展示此时自动成立。若底环不满足 Noether 条件，就不能省略该项假设。

3.1.3 Hilbert 基定理的模论后果

第一卷定理 12.4.5，即 Hilbert 基定理，已经证明：若 R 为 Noether 环，则有限变量多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 仍为 Noether 环。这里不重复其主证明，而将它与命题 3.1.4 合用。

推论 3.1.5. 若 R 为 Noether 环， $A = R[a_1, \dots, a_n]$ 为有限型交换 R 代数，则 A 为 Noether 环。每个有限生成 A 模有有限展示，每个子模有限生成；有限矩阵给出的核、像及余核也都是有限生成 A 模。

证明. 代入同态 $R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A, x_i \mapsto a_i$ 为满射。由 Hilbert 基定理，来源是 Noether 环；商环的理想链取逆像，故商环 A 仍为 Noether 环。现在对 A 使用命题 3.1.4，得到关于有限生成模和子模的断言。矩阵的核是有限自由模的子模，像与余核分别是有限自由模的同态像及商，也满足这些结论。□

例如在 $A = k[x, y]/(y^2 - x^3)$ 上，理想、理想之间的关系以及有限矩阵的解模，都能用有限数据表示。这个结论保证有限描述存在，却没有给出具体的生成元算法；当系数域上可以作精确计算时，第一卷附录 F 的 Gröbner 基方法和本卷第八章将进一步处理算法问题。

必须分清有限型代数与有限模。 $k[x]$ 由一个元素作为 k 代数生成，却有无限多个线性无关的单项式，因而不是有限 k 模。上面的推论说有限 A 模是 Noether 模，没有说它作为 R 模也有限生成。

3.2 Nakayama 引理

在局部环上，把一个有限模模掉极大理想，就得到剩余域上的有限维向量空间。Nakayama 引理说明，向量空间中的生成元可以提升为原模的生成元。这里的有限性十分关键；证明它的行列式技巧，还将在整依赖中给出首一方程。

3.2.1 行列式技巧

定理 3.2.1 (行列式技巧). 设 M 由 $n \geq 1$ 个元素生成， $I \subseteq R$ 为理想， $u: M \rightarrow M$ 为 R 线性自同态，并且 $u(M) \subseteq IM$ 。则存在

$$P(T) = T^n + c_1 T^{n-1} + \dots + c_n, \quad c_i \in I^i,$$

使 $P(u) = 0$ 作为 M 的自同态成立。

证明. 选生成元 $m_1, \dots, m_n$, 写 $u(m_i) = \sum_j a_{ij}m_j$, $a_{ij} \in I$. 在自同态环 $\text{End}_R(M)$ 中, 标量作用与 u 交换, 所以它们生成一个交换子环 $R[u]$; 这不要求整个自同态环交换. 将上述等式写成

$$(uI_n - A) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = 0, \quad A = (a_{ij}).$$

在交换环 $R[u]$ 上左乘伴随矩阵, 得到

$$\det(uI_n - A)m_i = 0 \quad (1 \leq i \leq n).$$

令 $P(T) = \det(TI_n - A) \in R[T]$. 行列式的展开中, T^{n-i} 的系数每项都含 i 个 A 的元素, 故 $c_i \in I^i$. 由于 $P(u)$ 零化全部生成元, 它零化整个 M . $\square$

这称为**行列式技巧** (determinant trick). 其要点是使用生成元而不要求基: 矩阵 A 未必唯一, 所产生的首一多项式也不必唯一, 但它确实零化给定自同态. 若 M 自由且所取生成元是一组基, 便得到熟悉的 Cayley–Hamilton 恒等式. 上述一般版本可对照 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, Theorem 2.1, pp. 7–8].

若 $M = IM$, 对 $u = \text{id}_M$ 使用该定理, 得到

$$(1 + c_1 + \dots + c_n)M = 0.$$

也就是说, 存在 $a \in I$ 使 $(1 - a)M = 0$. 有限生成将逐个生成元的关系合成了一个统一的零化元.

3.2.2 Jacobson 根版本与局部环版本

定义 3.2.2. 交换环 R 的 **Jacobson 根** (Jacobson radical) 为

$$J(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} \mathfrak{m}.$$

零环采用空交为整个环的约定。

若 $a \in J(R)$, 则 $1 - a$ 不属于任何极大理想, 因此是单位. 更一般地, 每个 $1 - ra$, $r \in R$, 都是单位. 反过来, 若这对所有 r 成立而 $a \notin \mathfrak{m}$, 可在域 $R/\mathfrak{m}$ 中取 $\bar{a}$ 的逆并提升为 r , 则 $1 - ra \in \mathfrak{m}$, 矛盾. 这给出 Jacobson 根的单位判据; 在局部环上, $J(R)$ 就是唯一的极大理想.

定理 3.2.3 (Nakayama 引理). 设 M 为有限生成 R 模, $I \subseteq J(R)$.

1. 若 $IM = M$, 则 $M = 0$.
2. 若 $N \subseteq M$ 且 $M = N + IM$, 则 $M = N$.

第二项实际上只需 M/N 有限生成, 而不必要求 M 本身有限生成. 特别地, 在局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 上, 有限生成模满足 $M/\mathfrak{m}M = 0$ 当且仅当 $M = 0$.

证明. 第一项中, 若 $M \neq 0$, 选有限个生成元。行列式技巧给出 $a \in I$ 使 $(1-a)M = 0$ 。由 $I \subseteq J(R)$, $1-a$ 为单位, 乘其逆得到 $M = 0$, 矛盾; 零模情形本来成立。第二项对有限生成商模 $Q = M/N$ 使用第一项, 因为原等式恰好表示 $IQ = Q$ 。局部版本取 $I = \mathfrak{m}$ 。□

Nakayama 引理 (Nakayama's lemma)的这一交换环证明, 也可见 [2, Theorem 2.2 and Corollary, p. 8]。第二卷定理 14.2.1 则用 Jacobson 根的单位判据直接处理非交换模, 没有把交换行列式用于非交换系数。

两项假设都有明确作用。对局部环 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ 的模 $M = \mathbb{Q}$, 有 $pM = M \neq 0$, 因为 M 不有限生成: 有限个有理数只能给出有统一上界的负 p 指数。若省去 $I \subseteq J(R)$, 则 $R = \mathbb{Z}$ 、 $I = (2)$ 、 $M = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 满足 $IM = M \neq 0$ 。有限生成与 Jacobson 根条件不能相互替代。

推论 3.2.4. 交换环上的有限生成模的每个满自同态都是同构。

证明. 设 $u: M \rightarrow M$ 满。赋予 M 一个 $R[T]$ 模结构, 令 T 作用为 u ; 原来的有限个 R 生成元也生成此 $R[T]$ 模。于是 $TM = M$ 。用行列式技巧所得的一般结论, 而不是要求 $(T) \subseteq J(R[T])$ 的版本, 得到 $(1 - Tg(T))M = 0$, 其中 $g(T) \in R[T]$ 。所以 $ug(u) = g(u)u = \text{id}_M$, 给出了双侧逆。□

3.2.3 极小生成元与剩余向量空间

推论 3.2.5. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环, M 有限生成。元素 $m_1, \dots, m_r$ 生成 M , 当且仅当其剩余类生成 κ 向量空间 $M/\mathfrak{m}M$ 。它们构成不可再删去元素的极小生成组, 当且仅当剩余类构成该向量空间的一组基。因此所有极小生成组的元素个数都等于

$$\mu_R(M) := \dim_{\kappa}(M/\mathfrak{m}M).$$

证明. 正向由取商得到。反向令 $N = \sum_i Rm_i$, 剩余类生成意味着 $M = N + \mathfrak{m}M$, 由定理 3.2.3 有 $M = N$ 。若剩余类为基, 删去任一项便不再生成剩余向量空间, 故不再生成 M 。若某个极小生成组的剩余类线性相关, 可从中删去至少一项而保持对剩余向量空间的生成性; 刚证明的反向蕴含说明原模仍被其余元素生成, 与极小性矛盾。□

例如在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中, $\mathfrak{m} = (x, y)$ 满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong k^2$, 基为 x, y 的类。确实一次项给出这两个独立坐标, 极大理想平方恰好没有一次项; 局部化的分母常数项非零, 只会把一次项乘以一个非零标量。因此 $\mathfrak{m}$ 需要两个生成元, 不是主理想。同样, $(x, y)^r/(x, y)^{r+1}$ 的基由全次数恰为 r 的 $r+1$ 个单项式给出, 故 $\mu_R(\mathfrak{m}^r) = r+1$ 。

极小生成组不是自由基。例如 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上的模 $M = R/(\epsilon)$ 只需一个生成元, 但该生成元被非零的 ϵ 零化。余向量空间的维数测量生成元数, 并没有排除原模的关系。上述极小生成组的结论也可对照 [2, Theorem 2.3, pp. 8–9]。

3.3 Artin 环

降链条件对一般模弱于有限长度，但对交换环本身有更强的后果：它迫使极大理想只有有限多个，迫使 Jacobson 根幂零，最终迫使正则模具有有限长度。本节把这些步骤逐一证明，特别避免在尚未证明 Noether 性时假设根理想有限生成。

3.3.1 降链条件与有限长度

一个非零模若只有 0 和自身两个子模，称为**简单模** (simple module)。一个模若存在有限子模链

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M,$$

且每个 M_i/M_{i-1} 都简单，则称为**有限长度模** (module of finite length)。上述链称为**合成列** (composition series)，各商称为合成因子。第二卷定理 12.2.3，即模的 Jordan-Hölder 定理，已经证明其层数与所取链无关，称为模的**长度** (length of a module)，记作 $\ell_R(M)$ 。第二卷定理 12.2.4 进一步证明：有限长度等价于同时满足升链与降链条件。此处使用它检测正则模，而不假设任意 Artin 模已经有限生成。

引理 3.3.1. 设 $R \neq 0$ 为交换 Artin 环。则每个素理想都极大，极大理想只有有限多个，而且 $J(R)$ 幂零。

证明. 若 $\mathfrak{p}$ 素，则整环 $R/\mathfrak{p}$ 仍满足降链条件。在任意满足该条件的整环中，对非零 a ，主理想链 $(a) \supseteq (a^2) \supseteq \cdots$ 稳定，所以 $a^n = a^{n+1}b$ 对某个 n, b 成立。约去非零的 a^n ，得到 $ab = 1$ 。该整环是域，故 $\mathfrak{p}$ 极大。

若有无穷多个不同的极大理想 $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \dots$ ，令 $I_n = \mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n$ 。对每个 $i \leq n$ ，选 $a_i \in \mathfrak{m}_i \setminus \mathfrak{m}_{n+1}$ ，则 $\prod_i a_i \in I_n \setminus \mathfrak{m}_{n+1}$ ，因为 $\mathfrak{m}_{n+1}$ 素。另一方面 $I_{n+1} \subseteq I_n \cap \mathfrak{m}_{n+1}$ ，故 $I_{n+1} \subsetneq I_n$ ，与降链条件矛盾。因此极大理想只有 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 。

记 $J = J(R)$ 。降链条件给出 $J^n = J^{n+1}$ ，其中 $n \geq 1$ 。令 $K = \text{Ann}_R(J^n)$ ，则

$$(K : J) = \text{Ann}_R(J^{n+1}) = K.$$

若 $K \neq R$ ，在严格包含 K 的理想中选一个极小者 K' ；降链条件保证这种选择存在。取 $x \in K' \setminus K$ ，极小性给出 $K' = K + Rx$ 。商模 K'/K 循环且非零，故由定理 3.2.3， $J(K'/K) \neq K'/K$ 。但是 $Jx + K$ 介于 K, K' 之间，极小性迫使 $Jx \subseteq K$ 。于是 $x \in (K : J) = K$ ，矛盾。所以 $K = R$ ，即 $J^n = 0$ 。□

这个证明只对循环模 K'/K 使用 Nakayama 引理。若直接从 $J^n = JJ^n$ 推出 $J^n = 0$ ，就会漏掉 J^n 尚未证明有限生成的问题。上面的处理可参阅 [2, Theorem 3.2, p. 16]。

定理 3.3.2. 交换 Artin 环作为自身的模具有有限长度，因而是 Noether 环。它的每个有限生成模也具有有限长度。

证明. 零环的结论直接成立，以下设 $R \neq 0$ 。沿用引理 3.3.1 中极大理想及其幂零交的记号，不同极大理想两两互素，中国剩余定理给出

$$R/J \cong \prod_{i=1}^r R/\mathfrak{m}_i.$$

考虑有限滤过 $R \supseteq J \supseteq \cdots \supseteq J^n = 0$ 。每个商层 J^i/J^{i+1} 被 J 零化，因而是 R/J 模；它又是 Artin 模，因为子模和商模继承降链条件。

有限个域的直积上的模，可由各坐标幂等元分成有限直和；每个分量是相应域上的向量空间。一个满足降链条件的向量空间必有限维：若含无限线性无关序列，扩充为基，逐次删去其中前几个向量所得的线性生成空间就构成严格降链。所以每个商层是有限个有限维向量空间的直和，具有有限长度。把各商层的合成列取逆像并连接，得到 R 的有限合成列。

由第二卷定理 12.2.4，有限长度推出 Noether 性。若 M 由 s 个元素生成，它是 R^s 的商；有限直和与商都保留有限长度，因此 M 也具有有限长度。□

3.3.2 交换 Artin 环的局部直积分解

定理 3.3.3. 设 $R \neq 0$ 为交换 Artin 环，极大理想为 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 。对充分大的 n ，自然映射给出

$$R \cong \prod_{i=1}^r R/\mathfrak{m}_i^n \cong \prod_{i=1}^r R_{\mathfrak{m}_i}.$$

每个因子都是非零 Artin 局部环。相应地， $1 = e_1 + \cdots + e_r$ 分解为两两正交的非零幂等元，每个 R 模都有 $M = e_1 M \oplus \cdots \oplus e_r M$ 。这些局部因子由各极大理想唯一确定，分解仅差排列。

证明. 取 n 使 $J(R)^n = 0$ 。对不同的 i, j ，有 $\mathfrak{m}_i + \mathfrak{m}_j = R$ 。写 $a + b = 1$ 、 $a \in \mathfrak{m}_i$ 、 $b \in \mathfrak{m}_j$ ，展开 $(a + b)^{2n-1}$ 后每一项至少含 a^n 或 b^n ，故 $\mathfrak{m}_i^n + \mathfrak{m}_j^n = R$ 。于是

$$\bigcap_i \mathfrak{m}_i^n = \prod_i \mathfrak{m}_i^n = \left(\prod_i \mathfrak{m}_i \right)^n = J(R)^n = 0.$$

中国剩余定理给出第一个同构。

包含 $\mathfrak{m}_i^n$ 的极大理想必包含 $\mathfrak{m}_i$ ：对每个 $a \in \mathfrak{m}_i$ ，有 $a^n \in \mathfrak{m}_i^n$ ，再用素性即可。因此商环 $R/\mathfrak{m}_i^n$ 的极大理想唯一，它又是 Artin 环的商，所以是 Artin 局部环。

在直积中，令 e_i 对应第 i 个坐标为 1、其余为 0 的元素。则 $e_i \notin \mathfrak{m}_i$ ，在 $R_{\mathfrak{m}_i}$ 中它是单位；又有 $e_i e_j = 0$ ，故 e_j 在该局部化中为零， $j \neq i$ 。只留下第 i 个局部因子，而该因子中对应于 $R \setminus \mathfrak{m}_i$ 的元素已经是单位，所以 $R_{\mathfrak{m}_i} \cong R/\mathfrak{m}_i^n$ 。这个描述也说明因子只由 $\mathfrak{m}_i$ 决定。

最后 $m = \sum_i e_i m$ 给出模的分解；若 $\sum_i m_i = 0$ 、 $m_i \in e_i M$ ，逐次乘 e_j 得 $m_j = 0$ ，故和是直和。任一非零局部直积因子恰好贡献一个极大理想，且在该极大理想处局部化恢复它，因此所有这类分解只有排列的差别。□

例如

$$\mathbb{Z}/72\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z},$$

对应幂等元可取 $e_1 = 9$ 、 $e_2 = 64$ 的剩余类：二者和为 1，乘积为零，且各自平方等于自身。在这个环上的模中， $9M$ 和 $64M$ 分别保留 2 主部分与 3 主部分；分解来自环的幂等元，而不需要为模另选生成元。

3.3.3 幂零根与零维 Noether 环

本小节把“零维”用于每个素理想都极大的非零环；一般 Krull 维数的定义和基本定理留在第九章。零环作为单独的平凡情形处理。

定理 3.3.4. 对非零交换环 R ，下列条件等价：

1. R 为 Artin 环；
2. R 为 Noether 环，且每个素理想都极大。

此时幂零根与 Jacobson 根相等，均为幂零理想。 R 约化当且仅当它是有限个域的直积。

证明. 由引理 3.3.1 及定理 3.3.2，第一项推出第二项。

反过来，设 R 为 Noether 环且每个素理想极大。第一章的命题 1.3.5 表明其极小素理想只有有限多个，且每个素理想包含一个极小素理想。现在包含在两个素理想之间只能是相等，所以整个素谱就是有限个极大理想 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 。由定理 1.2.3，

$$\sqrt{(0)} = \bigcap_i \mathfrak{m}_i = J(R).$$

Noether 条件使幂零根有限生成；它的每个元素幂零，故由命题 1.2.2，该理想的某个幂为零。

记 $J = J(R)$ ，中国剩余定理仍给出 $R/J \cong \prod_i R/\mathfrak{m}_i$ 。各个 J^j/J^{j+1} 是有限生成 R 模，并且被 J 零化，所以是有限生成的 R/J 模。有限生成模在有限个域的直积上分成有限维向量空间，因而具有有限长度。沿有限的 J 幂滤过连接合成列，得到 R 具有有限长度，故满足降链条件。

最后，若 R 约化，上述公共根为零，直接得到 $R \cong \prod_i R/\mathfrak{m}_i$ 。有限个域的直积没有非零幂零元，反向也成立。□

这里的逆向论证只用了 Noether 素谱的有限不可约分支与有限生成幂零理想的幂零性，并未预用下一章的准素分解。去掉 Noether 条件，零维便不足以推出 Artin 性：例如 $R = \prod_{n \geq 1} k$ 中每个元素 a 都满足 $a = a^2 b$ ，只需对非零坐标取逆、零坐标取零。模掉任意素理想后，所得整环仍有这项性质，约去非零 a 得 $ab = 1$ ，所以所有素理想都极大。但使前 n 个坐标为零的理想构成严格降链，故 R 不是 Artin 环。

3.4 有限性在变换下的行为

商、局部化和有限代数都保留相当多的有限性，而取子环一般不保留。把这些结论放在一起，可以避免在具体计算中因“环变小了”或“只剩一个点了”就误判其理想结构。本节还区分茎上的条件与基本开邻域上的条件。

3.4.1 商、局部化与有限代数

命题 3.4.1. Noether 环的商环及任意局部化仍为 Noether 环；Artin 环的商环及任意局部化仍为 Artin 环。有限生成模与有限展示模局部化后仍分别有限生成、有限展示。

证明. 商环的理想链取逆像, 严格包含仍严格, 故两种链条件都传给商. 局部化环中每个理想都是其收缩的扩张, 见命题 2.2.2. 因此一条严格理想链收缩后仍严格; 原环的相应链条件排除了无限严格升链或降链.

模的生成元取分式 $m_i/1$ 就生成局部化模. 对有限展示 $R^a \rightarrow R^b \rightarrow M \rightarrow 0$, 使用定理 2.1.4, 得到 $(S^{-1}R)^a \rightarrow (S^{-1}R)^b \rightarrow S^{-1}M \rightarrow 0$, 故有限展示也被保持. $\square$

命题 3.4.2. 若交换 R 代数 A 作为 R 模有限生成, 称 A 为有限 R 代数.

1. 若 R 为 Noether 环, 则 A 为 Noether 环.
2. 若 R 为 Artin 环, 则 A 为 Artin 环.
3. 若 M 为有限生成 A 模, 则它也是有限生成 R 模.

证明. 第一项中, A 作为有限生成 R 模满足升链条件, 而每个 A 理想都是 R 子模, 所以理想升链稳定. 第二项同理: 由定理 3.3.2, A 作为 R 模具有有限长度, 其 R 子模降链稳定, 特别地 A 理想降链稳定. 第三项中, 若 $a_1, \dots, a_s$ 生成 A 作为 R 模, $m_1, \dots, m_t$ 生成 M 作为 A 模, 则全部 $a_i m_j$ 生成 M 作为 R 模. $\square$

这里的“有限”比有限型严格得多. $k[x]$ 是域 k 上的有限型代数, 却不是 Artin 环, 因为 $(x) \supsetneq (x^2) \supsetneq \dots$. 有限型代数保留 Noether 性靠 Hilbert 基定理, 有限代数保留 Artin 性则靠模的有限长度, 二者是不同的论证.

命题 3.4.3. 若 $f_1, \dots, f_r$ 生成 R 的单位理想, 且每个 M_{f_i} 是有限展示 R_{f_i} 模, 则 M 有限展示. 若每个 R_{f_i} 是 Noether 环, 则 R 为 Noether 环.

证明. 由命题 2.4.4, M 有限生成, 取满射 $R^n \rightarrow M$, 核为 K . 局部化后仍正合, 且目标有限展示, 所以由命题 3.1.2, 每个 K_{f_i} 有限生成. 再次使用有限基本开覆盖上的有限生成性判据, 得到 K 有限生成, 因而 M 有限展示.

对第二句, 任取理想 $I \subseteq R$. 其局部化是 Noether 环 R_{f_i} 的理想, 故有限生成. 对 I 使用同一有限生成性判据, 得到每个理想都有限生成, 所以 R 为 Noether 环. $\square$

3.4.2 Noether 环的非 Noether 子环

取多项式环 $B = k[x, y]$ 的子环

$$A = k + xk[x, y] = k[x, xy, xy^2, \dots].$$

等号右侧表示常数项之外的每个单项式都至少含一个 x ; 它对乘法封闭, 并且与 B 具有相同的单位元. 环 B 由 Hilbert 基定理是 Noether 环, A 却不是.

为此令 $I = xk[x, y]$, 它是 A 的理想, $A/I \cong k$, 而 $I^2 = x^2k[x, y]$. 于是

$$I/I^2 = \bigoplus_{j \geq 0} k \cdot (xy^j + I^2)$$

为无限维 k 向量空间. 如果 I 由有限个元素作为 A 理想生成, 模掉 I^2 后, 这些元素的剩余类就会在 $A/I = k$ 上生成 I/I^2 , 与无限维性矛盾. 故 I 不有限生成, A 不是 Noether 环.

这个例子也显示问题所在：在较大的环 B 中， I 由一个元素 x 生成，因为可以任意乘以 y ；在 A 中没有这个乘子。取子环虽然减少了元素，却也减少了生成理想时允许使用的系数，可能使有限生成性失败。

3.4.3 有限性假设的适用范围

前面的结论可以从三个具体问题来检验。第一，原模有限生成，是否能控制所有子模？只有底环的 Noether 性等附加条件才能作出肯定回答。无限变量多项式环作为自身的模由 1 生成，却包含不有限生成的变量理想。

第二，所有点处都有限生成，是否已经给出有限的全局描述？第 2.4.3 小节中的 $\bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在每个素理想处都有限生成，但全局不是有限生成模。命题 2.4.4 及命题 3.4.3 要求的是一组基本开邻域上的有限数据；仅检查各个茎不足以自动得到这些邻域。

第三，Artin 模是否必为有限生成模？交换 Artin 环的有限模确有有限长度，但任意环上的 Artin 模不必如此。整数模

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$$

中，每个真子模都是有限循环群：若一个子模中元素的阶无界，它就含有每个 $p^{-n} + \mathbb{Z}$ 所生成的群，因而等于全模；若阶有界，它就包含于其中一个有限循环群。故任何降链一旦离开全模便进入有限群，此后稳定，而该模并不有限生成。环本身的 Artin 条件在定理 3.3.2 中具有特殊力量，不应推广成对任意 Artin 模的断言。

后续证明遇到有限性条件时，可以据此逐项辨认它的职责：有限生成负责选取统一分母或应用 Nakayama 引理，有限展示负责一次处理全部关系，Noether 条件负责把子对象仍然放在有限描述之内，Artin 条件则限制降链，并在环的层面带来局部直积分解。它们的使用位置各不相同。

本章小结

有限展示把生成元与全部关系都限制在有限范围，Noether 环则使每个有限生成模的子模仍有限生成。Hilbert 基定理将这一性质传给有限型代数，因而多项式方程中的理想与有限矩阵的关系模具有有限描述。

行列式技巧不要求生成元线性无关，却能产生一个统一的首一零化方程。对恒等映射使用它，再利用 Jacobson 根的单位判据，便得到 Nakayama 引理。在局部环上，极小生成元数因此等于剩余向量空间的维数；这项维数不负责判断关系是否消失。

交换 Artin 环具有有限长度，并分解为各极大理想处的局部环。反向刻画需要 Noether 性与零维同时成立。有限代数、商及局部化保留适当的链条件，任意子环却不保留；后续整扩张与维数论中的有限性假设将继续依赖这些区别。

习题

习题 3.1. 分别给出 $k[x]/(x^3)$ 作为 $k[x]$ 模, 以及 $k[x, y]/(x, y)$ 作为 $k[x, y]$ 模的有限展示。解释展示中的生成元与关系数。

解. 第一种为 $k[x] \xrightarrow{\times x^3} k[x] \rightarrow k[x]/(x^3) \rightarrow 0$, 一个生成元为 1 的类, 全部关系由 x^3 生成。第二种为

$$k[x, y]^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} k[x, y] \rightarrow k[x, y]/(x, y) \rightarrow 0.$$

仍只有一个模生成元, 而两个关系 $x \cdot 1 = 0$ 、 $y \cdot 1 = 0$ 生成全部关系。“两个关系”不表示第一个映射单射; 关系之间还可能有关系。□

习题 3.2. 令 $R = k[x, y]$ 。求映射 $R^2 \rightarrow (x, y)$ 、 $(a, b) \mapsto ax + by$ 的核, 并给出 (x, y) 的有限展示。

解. 若 $ax + by = 0$, 模掉 y 后在 $k[x]$ 中有 $\bar{a}x = 0$, 故 $a = yc$ 。代回得到 $y(cx + b) = 0$, 整环性给出 $b = -xc$ 。因此核由 $(y, -x)$ 生成, 得到正合列

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{c \mapsto (yc, -xc)} R^2 \rightarrow (x, y) \rightarrow 0.$$

第一个映射单射, 因为 $y \neq 0$ 且 R 为整环。□

习题 3.3. 设 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 正合。证明若 L, N 有限生成, 则 M 有限生成; 同时给出 M 有限生成而 L 不有限生成的例子。

解. 取 L 的有限生成元, 并提升 N 的有限生成元到 M 。对任意 $m \in M$, 先减去提升元的适当线性组合, 使差落入 L , 再用 L 的生成元表示, 故这些有限个元素生成 M 。反向取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 、 $M = R$ 、 $L = (x_1, x_2, \dots)$ 。 M 循环, 但 L 不有限生成, 理由是任意有限组多项式只涉及有限个变量, 不能生成另一个变量。此处底环不是 Noether 环。□

习题 3.4. 令 $A = k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$ 、 $R = k[t^2]$ 。证明 A 是有限 R 代数并为 Noether 环; 比较 $k[t, y]$ 作为 $k[t]$ 代数的有限型性与有限性。

解. 每个 A 中的单项式次数都为偶数, 或为至少 3 的奇数, 故 $A = R + Rt^3$ 。所以 A 是由 $1, t^3$ 生成的有限 R 模。 R 同构于一元多项式环, 是 Noether 环, 故由命题 3.4.2, A 为 Noether 环。另一方面 $k[t, y]$ 作为 $k[t]$ 代数由 y 生成, 是有限型代数; 若它作为模由有限个多项式生成, 生成元的 y 次数有共同上界, 而 $k[t]$ 系数的组合不能超过这个上界, 不能得到任意高次的 y^n 。所以它不是有限代数。□

习题 3.5. 设 R 为整环, K 为其分式域, $0 \neq M \subseteq K$ 为有限生成 R 子模。若 $z \in K$ 满足 $zM \subseteq M$, 证明 z 满足一个 R 系数的首一多项式。

解. 乘 z 是 M 的 R 线性自同态。对 $I = R$ 应用定理 3.2.1, 得到首一 $P(T) \in R[T]$, 使 $P(z)m = 0$ 对所有 $m \in M$ 成立。取一个非零 $m \in M \subseteq K$, 在域中约去它, 得到 $P(z) = 0$ 。非零子模的条件负责最后的约去; 若 $M = 0$, 这个论证不能给 z 任何限制。□

习题 3.6. 在 $R = \mathbb{Z}$ 、 $I = (2)$ 、 $M = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中, 找出 $a \in I$ 使 $(1-a)M = 0$ 。解释为什么这不意味着 $M = 0$ 。

解. 取 $a = 4$, 则 $1-a = -3$ 零化 M , 而 $4 \in (2)$ 。这里 -3 不是整数环的单位, 不能从 $(-3)M = 0$ 约去 -3 。(2) 也不包含于 $J(\mathbb{Z}) = 0$, 因为所有极大理想 (p) 的交为零。所以满足的是行列式技巧给出的统一零化元结论, 没有满足 Nakayama 的 Jacobson 根假设。□

习题 3.7. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环, $A \in M_n(R)$ 。证明 A 可逆当且仅当其模 $\mathfrak{m}$ 的矩阵 $\bar{A}$ 可逆。用此解释两组极小生成元之间的 $n \times n$ 转换矩阵为什么可逆。

解. 若 A 可逆, 取商后仍可逆。反向若 $\bar{A}$ 可逆, 则 $\det A \bmod \mathfrak{m} = \det \bar{A} \neq 0$, 故 $\det A$ 为 R 的单位, 伴随矩阵公式给出 $A^{-1} = (\det A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$ 。若两组极小生成元各有 n 个, 模掉 $\mathfrak{m}M$ 后都是剩余向量空间的基; 任何把一组表示为另一组线性组合的矩阵, 在剩余域上成为基变换矩阵, 因此在 R 上可逆。生成元未必是自由基, 这只说明该转换矩阵可逆。□

习题 3.8. 令 $R = k[x_1, \dots, x_d]_{(x_1, \dots, x_d)}$ 、 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d)$, 其中 $d \geq 1$ 。求 $\mu_R(\mathfrak{m}^r)$ 、 $r \geq 0$ 。

解. $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$ 以全次数 r 的单项式为 k 基。局部化分母的常数项非零, 在这个商中只影响其非零常数倍, 不引入新的线性关系。因此

$$\mu_R(\mathfrak{m}^r) = \dim_k(\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}) = \binom{r+d-1}{d-1}.$$

末个数是在 d 个非负整数中分配总和 r 的方案数。 $r = 0$ 时即 $R/\mathfrak{m}$ 的维数 1, 与 R 作为自身的模循环一致。□

习题 3.9. 证明整数模 $\mathbb{Z}$ 同时有极小生成组 $\{1\}$ 和 $\{2, 3\}$ 。说明这不违反局部环上的极小生成元结论。

解. $\{1\}$ 显然生成; $\{2, 3\}$ 也生成, 因为 $3 - 2 = 1$, 但删去任意一个只得到 $2\mathbb{Z}$ 或 $3\mathbb{Z}$, 所以它也极小。“极小”是不能删去元素, 并不是在所有生成组中个数最少。整数环不是局部环, 因此不能把不同极大理想的剩余信息统一成同一个剩余向量空间。局部结论所用的 $\mathfrak{m}$ 唯一性在此缺失。□

习题 3.10. 若 M 是交换环上的有限生成模, 且 $M \cong M \oplus N$, 证明 $N = 0$ 。再用 $\mathbb{Z}$ 上的一个单自同态说明“满自同态可逆”不能改成“单自同态可逆”。

解. 将给定同构 $M \rightarrow M \oplus N$ 与第一投影复合, 得到 M 的满自同态。由推论 3.2.4 它单射, 而其核在原同构下恰为 $0 \oplus N$, 故 $N = 0$ 。整数模的乘二映射为单射但不是满射, 因 1 没有原像, 所以不具有逆映射。□

习题 3.11. 设理想 $I \subseteq R$ 有限生成且 $I^2 = I$ 。证明存在幂等元 $e \in R$ 使 $I = eR$ 。若 R 局部, 说明只能有 $I = 0$ 或 $I = R$ 。

解. 把 I 看作有限生成模, 行列式技巧应用于 $I = II$, 得到 $e \in I$ 使 $(1 - e)I = 0$ 。于是 $x = ex$ 对所有 $x \in I$ 成立, 故 $I \subseteq eR$; 另一包含由 $e \in I$ 得到。再取 $x = e$, 便有 $e = e^2$ 。在局部环中, e 与 $1 - e$ 至少一个是单位, 因为二者之和为 1。由 $e(1 - e) = 0$, 若 e 可逆则 $e = 1$, 若 $1 - e$ 可逆则 $e = 0$ 。因此 I 只能是所述两个理想。□

习题 3.12. 显式分解 $\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$ 为 Artin 局部环的直积, 并找出三个对应的正交幂等元。

解. $360 = 8 \cdot 9 \cdot 5$, 三因子两两互素, 所以

$$\mathbb{Z}/360\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

可取 $e_1 = 225$ 、 $e_2 = 280$ 、 $e_3 = 216$ 的剩余类。它们在对应因子中取 1, 在另外两个因子中取 0; 由中国剩余同构可知它们幂等、两两正交, 且和为 1。也可直接核对 $225 + 280 + 216 = 721 \equiv 1 \pmod{360}$ 。□

习题 3.13. 对 $A = k[x, y]/(x^2, y^2)$, 求唯一极大理想、其幂零指数、环的长度, 以及零化该极大理想的元素组成的理想。

解. A 的 k 基为 $1, \bar{x}, \bar{y}, \bar{x}\bar{y}$ 。非零常数项的元素可用有限几何级数求逆, 零常数项的元素幂零, 所以唯一极大理想为 $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ 。有 $\mathfrak{m}^2 = k\bar{x}\bar{y} \neq 0$ 、 $\mathfrak{m}^3 = 0$, 幂零指数为 3。商层 $A/\mathfrak{m}$ 、 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 、 $\mathfrak{m}^2$ 的维数分别为 1, 2, 1, 将中间二维层细分即得长度 4。若 $a + b\bar{x} + c\bar{y} + d\bar{x}\bar{y}$ 被 $\bar{x}, \bar{y}$ 同时零化, 分别相乘得到 $a = c = 0$ 与 $a = b = 0$, 故零化子为 $k\bar{x}\bar{y}$ 。□

习题 3.14. 分解 $A = k[t]/(t^2(t-1)^3)$ 为局部因子, 求其长度及约化商。

解. (t^2) 与 $((t-1)^3)$ 互素, 所以

$$A \cong k[t]/(t^2) \times k[t]/((t-1)^3).$$

两个因子分别在 (t) 与 $(t-1)$ 处局部, 具有长度 2, 3, 因此 A 的长度为 5。幂零根在两个因子中分别为 $(\bar{t})$ 与 $(\overline{t-1})$, 约化商为 $k \times k$ 。□

习题 3.15. 令 V 为无限维 k 向量空间, 在 $R = k \oplus V$ 上规定 $(a, u)(b, v) = (ab, av + bu)$ 。证明它是局部环, 极大理想平方为零, 但它不是 Artin 环。

解. 该乘法直接满足结合律及分配律, 单位为 $(1, 0)$ 。若 $a \neq 0$, $(a, u)^{-1} = (a^{-1}, -a^{-2}u)$; 若 $a = 0$, 元素平方为零, 所以非单位集恰为 $\mathfrak{m} = 0 \oplus V$, 且 $\mathfrak{m}^2 = 0$ 。 V 的每个 k 子空间都是 R 理想, 因为 V 对它作用为零, 标量 k 按通常方式作用。选一系列线性无关向量并扩充为基, 逐次删去前面的向量所得子空间构成严格降链。因此 R 不是 Artin 环。极大理想幂零本身不能替代有限性。□

习题 3.16. 证明有限维约化交换 k 代数是有限个有限域扩张的直积 (零代数对应空乘积)。指出当 k 代数闭时这些因子是什么。

解. 有限维性使理想升链、降链都稳定, 故代数为 Artin 环; 约化性结合定理 3.3.4 给出有限个域的直积。各域为原代数的商, 因此作为 k 向量空间仍有限维, 是有限域扩张。若 k 代数闭, 每个有限扩张中的元素都有 k 上的最小多项式, 该不可约多项式只能为一次, 故各因子均等于 k 。□

习题 3.17. 设 R 为 Artin 局部环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余域为 κ , M 为有限生成模。证明

$$\ell_R(M) = \sum_{i \geq 0} \dim_{\kappa}(\mathfrak{m}^i M / \mathfrak{m}^{i+1} M).$$

推导 $\ell_R(M) \geq \mu_R(M)$, 并刻画等号成立的情形。

解. $\mathfrak{m}$ 幂零, 所以和中只有有限个非零项; 每个商层被 $\mathfrak{m}$ 零化, 是有限维 κ 向量空间。按一组基的前若干项构造向量空间旗标, 每个一维商作为 R 模都是简单模 κ 。将各层的旗标取逆像并连接, 就得到总层数为右侧的合成列。第一项为 $\dim_{\kappa} M / \mathfrak{m}M = \mu_R(M)$, 其他项非负, 因此有不等式。等号成立等价于 $\mathfrak{m}M / \mathfrak{m}^2 M = 0$, 再由 Nakayama 引理应用于有限模 $\mathfrak{m}M$, 得到 $\mathfrak{m}M = 0$ 。反向若 $\mathfrak{m}M = 0$, 只有第一项非零, 当然取等号。□

习题 3.18. 设 R 为交换 Artin 环, 极大理想为 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$, M 为有限生成模。证明

$$\ell_R(M) = \sum_{i=1}^r \ell_{R_{\mathfrak{m}_i}}(M_{\mathfrak{m}_i}).$$

解. 由定理 3.3.3, $R = \prod_i e_i R$, 且 $M = \bigoplus_i e_i M$ 、 $e_i M \cong M_{\mathfrak{m}_i}$ 。一个 $e_i M$ 的 R 子模恰为其 $e_i R$ 子模, 因为其他坐标作用为零; 因此两种底环下的合成列及长度相同。分别取各分量的合成列, 再在直和中依次添入各分量, 便得到长度为各长度之和的 M 合成列, 证明所需等式。□

习题 3.19. 令 $A = k + xk[x, y]$ 、 $I = xk[x, y]$ 。证明局部环 A_I 仍不是 Noether 环。

解. $A/I = k$, 故 I 极大, A_I 的极大理想为 IA_I 。由局部化正合性及乘积的分式公式,

$$IA_I / (IA_I)^2 \cong (I/I^2)_I.$$

I/I^2 被 I 零化, 且 $A \setminus I$ 的作用只是非零常数的作用, 已经可逆, 所以右侧仍为以 $xy^j + I^2$ 、 $j \geq 0$, 为基的无限维 k 向量空间。若 IA_I 有限生成, 其模极大理想后的向量空间就有限维, 矛盾。因此该局部环不是 Noether 环。□

习题 3.20. 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 是 Noether 环, 并分解 $\mathbb{Z}[i]/(5)$ 为 Artin 局部环的直积。

解. $\mathbb{Z}[i]$ 由 $1, i$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模生成, 而整数环为 Noether 环, 所以它是有限代数, 从而是 Noether 环。模掉 5 后,

$$\mathbb{Z}[i]/(5) \cong \mathbb{F}_5[T]/(T^2 + 1) = \mathbb{F}_5[T]/((T - 2)(T + 2)).$$

两个一次因子互素, 由中国剩余定理得到 $\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$ 。这两个域就是局部因子, 商环约化且长度为 2。□

习题 3.21. 令 $R = \prod_{n \geq 1} k$. 证明每个 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是域, 但 R 不是 Noether 环。解释为何不违反命题 3.4.3。

解. 每个 $a \in R$ 都有 $a = a^2 b$, 逐坐标取 $b_n = a_n^{-1}$ 或 0 即可。局部化中的元素也满足这种等式: 若 $z = a/s$, 可取 $w = bs$, 便有 $z = z^2 w$ 。在局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 中, 若 z 属于极大理想, 则 $1 - zw$ 为单位; $z(1 - zw) = 0$ 遂给出 $z = 0$ 。所以唯一极大理想为零, 局部环是域。但有限支集、只在前 n 个坐标可能非零的理想组成严格升链, 故 R 不是 Noether 环。该命题要求基本开邻域上的 Noether 性并形成覆盖, 这里只证明各个茎是 Noether 环, 没有得到相应的邻域。□

习题 3.22. 分别给出下列例子并验证: Noether 而非 Artin 的环; Artin 而非 Noether 的模; 有限生成但非有限展示的模。最后说明为什么不存在交换 Artin 而非 Noether 的环。

解. $\mathbb{Z}$ 的每个理想为主理想, 故是 Noether 环; 理想链 $2^n \mathbb{Z}$ 严格下降, 故不是 Artin 环。整数模 $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ 的每个真子模有限循环, 所以降链稳定; 但它含有阶依次为 p^n 的严格上升子群链, 所以不是 Noether 模。取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 、 $I = (x_1, x_2, \dots)$, 则 R/I 循环而有限生成; 若它有限展示, 命题 3.1.2 会迫使 I 有限生成, 与变量数的论证矛盾。最后一种环由定理 3.3.2 排除: 交换 Artin 环的正则模具有有限长度, 必满足升链条件。□

第四章 关联素理想与准素分解

一个有限模既有支集，也有支集上可能看不见的零化关系。本章通过元素的素零化子定义关联素理想，证明其存在性、有限性与局部化公式，并用它们描述全部零因子。在此基础上建立 Noether 环及有限模的准素分解，区分所属素理想、孤立分支与嵌入分支的唯一性。多项式理想和展示矩阵的计算说明：相同的约化支集，可以承载不同的幂零结构。

本章目标

- 由实际元素的零化子寻找关联素理想，说明存在性与有限性各需什么假设。
- 用素理想滤过、局部化及零因子的并描述研究有限模，并辨认支集中的极小点。
- 证明准素分解存在性，准确表述两类唯一性，给出素理想幂不准素及嵌入分支不唯一的例子。
- 对理想、子模与矩阵余核作准素分析，区分非约化结构与嵌入关联素理想。

本章使用第一章的素谱、根理想及有限素理想回避，第二章的模局部化和支集，以及第三章的 Noether 模与有限性。理想商的基础运算可结合第一卷第 10.3 节复习。准素分解在第一卷中只作前瞻，本章承担完整证明；下文不把尚未建立的维数、深度或几何零点定理作为前提。

阅读时宜把 $(x^2, xy) \subset k[x, y]$ 保留在手边：它的两个关联素理想容易由零化子算出，孤立分支固定，嵌入分支却有多种选择。另一例 $k[x, y, z]/(xy - z^2)$ 说明即使环境是整环，素理想的普通幂也未必准素。这两个例子分别检验唯一性和乘法条件，不能互相替代。

4.1 关联素理想

同一个元素可以被许多环元素零化，但它的全部零化子组成一个确定的理想。当这个理想恰好是素理想时，环在该元素生成的循环子模上的作用就具有整环的特征。这给出了从模中提取素理想的方法。本节环均为交换含么环；存在性要求环是 Noether 环，有限性还要求模有限生成，这两个条件不要混同。

4.1.1 元素零化子的素性

定义 4.1.1. 设 M 是 R 模， $m \in M$ 。元素的零化子为

$$\text{Ann}_R(m) = \{a \in R \mid am = 0\}.$$

若素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$ 等于某个非零元素 m 的零化子，就称 $\mathfrak{p}$ 为 M 的**关联素理想** (associated prime)。所有这样的素理想组成集合 $\text{Ass}_R(M)$ ，并约定 $\text{Ass}_R(0) = \emptyset$ 。

映射 $R \rightarrow M, a \mapsto am$ 的核为 $\text{Ann}_R(m)$ 。因此 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$ 等价于存在单射 $R/\mathfrak{p} \hookrightarrow M$ 。定义说的是某个元素的零化子，不是整个模的零化子必须为素理想。

引理 4.1.2. 若 $\text{Ann}_R(m)$ 在所有非零元素零化子中极大，则它是素理想。

证明. 记 $I = \text{Ann}_R(m)$ 。因 $m \neq 0, I \neq R$ 。若 $ab \in I$ 且 $b \notin I$ ，则 $bm \neq 0$ ，而 $I \subseteq \text{Ann}_R(bm)$ 。极大性给出相等，故由 $a(bm) = 0$ 得 $a \in I$ ，这正是素性。□

这里的“极大”指元素零化子这一族中的极大元，并不表示 I 是环的极大理想。例如整环 R 作为自身上的模时，每个非零元素的零化子都是 (0) ，于是 $\text{Ass}_R(R) = \{(0)\}$ ，即使 R 不是域也成立。

命题 4.1.3. 若 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ 正合，则

$$\text{Ass}_R(N) \subseteq \text{Ass}_R(M) \subseteq \text{Ass}_R(N) \cup \text{Ass}_R(P).$$

特别地，有限直和的关联素理想集合是各因子对应集合的并。

证明. 子模中的元素在 N 与 M 内有同一个零化子，得第一个包含。给定 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$ ，在 M 内取 $L \cong R/\mathfrak{p}$ 。 L 中每个非零元素的零化子都是 $\mathfrak{p}$ ，因为 $R/\mathfrak{p}$ 是整环。如果 $L \cap N \neq 0$ ，取交内非零元素即得 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(N)$ ；如果交为零， L 单射到 P ，故 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(P)$ 。直和结论由分裂正合列和两因子各自的嵌入得到，再对因子数归纳。□

4.1.2 关联素理想的存在性与有限性

定理 4.1.4. 若 R 是 Noether 环， $M \neq 0$ 是 R 模，则 $\text{Ass}_R(M) \neq \emptyset$ 。这里不要求 M 有限生成。

证明. 所有非零元素零化子构成非空理想族。Noether 升链条件保证其中有极大元，再用引理 4.1.2。□

定理 4.1.5. 设 R 是 Noether 环， M 是有限 R 模。存在有限子模链

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M, \quad M_i/M_{i-1} \cong R/\mathfrak{p}_i,$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想；这种链称为**素理想滤过** (prime filtration)。并且

$$\text{Ass}_R(M) \subseteq \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\},$$

所以关联素理想只有有限个。 $M = 0$ 时采用空滤过。

证明. 若已构造 $M_i \neq M$ ，对非零商模 M/M_i 应用定理 4.1.4，取其中同构于 $R/\mathfrak{p}_{i+1}$ 的子模，并令 M_{i+1} 为其原像。由命题 3.1.4，有限模 M 是 Noether 模，故这个严格上升过程必在有限步停止。对短正合列 $0 \rightarrow M_{i-1} \rightarrow M_i \rightarrow R/\mathfrak{p}_i \rightarrow 0$ 逐次应用命题 4.1.3，再用 $\text{Ass}_R(R/\mathfrak{p}_i) = \{\mathfrak{p}_i\}$ ，得到所需包含。□

滤过中出现的素理想可能多于关联素理想。例如 $\mathbb{Z} \supset 2\mathbb{Z} \supset 0$ 的两个因子为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}$ ，但 $\text{Ass}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}) = \{(0)\}$ 。此外，有限生成性不能删除： $\bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的关联素理想包括所有 (p) ，因而是无限集。

命题 4.1.6. 设 R 为 Noether 环, $S \subseteq R$ 为乘法集, M 为任意 R 模。则

$$\text{Ass}_{S^{-1}R}(S^{-1}M) = \left\{ S^{-1}\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M), \mathfrak{p} \cap S = \emptyset \right\}.$$

证明. 若 $\text{Ann}_R(m) = \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 则 $m/1 \neq 0$ 。当 $(a/s)(m/1) = 0$ 时, 有 $t \in S$ 使 $tam = 0$; 由 $ta \in \mathfrak{p}$ 、 $t \notin \mathfrak{p}$ 得 $a \in \mathfrak{p}$ 。故其零化子恰为 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 。

反之, 设 $\mathfrak{q}$ 是 m/s 的素零化子, 令 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{q}$ 在 R 中的收缩。以单位 $s/1$ 乘此元素后可改用 $m/1$ 。取 $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_l)$; 因 $(a_i m)/1 = 0$, 可选 $s_i \in S$ 使 $s_i a_i m = 0$ 。令 $t = s_1 \cdots s_l$, 则 $\mathfrak{p} \subseteq \text{Ann}_R(tm)$ 。若 $a(tm) = 0$, 局部化后 $a/1$ 零化 $m/1$, 所以 $a \in \mathfrak{p}$ 。于是零化子相等; 且 $tm \neq 0$, 否则 $m/1 = 0$ 。这就找到了原模中的关联元素。 $\square$

命题 4.1.7. 设 R 为 Noether 环, M 为非零有限 R 模。则 $\text{Supp}_R(M)$ 的每个素理想都包含某个关联素理想, 且

$$\min \text{Supp}_R(M) = \min \text{Ass}_R(M).$$

尤其, 对任意真理想 I , 包含 I 的极小素理想都是 R/I 的关联素理想。

证明. 若 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$, 上述局部化命题保证 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, 故 $\text{Ass}_R(M) \subseteq \text{Supp}_R(M)$ 。给定 $\mathfrak{q} \in \text{Supp}_R(M)$, $R_{\mathfrak{q}}$ 是 Noether 环, 非零模 $M_{\mathfrak{q}}$ 有关联素理想; 由命题 4.1.6, 它来自某个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$, 且 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ 。因此两集合的极小元一致。对有限模, $\text{Supp}_R(M) = V(\text{Ann}_R(M))$: 一边由零化子局部化得到, 另一边用有限组生成元逐个清分母即可。取 $M = R/I$ 就得到最后一句。 $\square$

4.1.3 零因子的关联素理想描述

称 $a \in R$ 是 M 上的零因子 (zero divisor on a module), 如果存在 $0 \neq m \in M$ 使 $am = 0$; 否则称它在 M 上是正则的。记这些零因子的集合为 $Z_R(M)$ 。这里允许 $a = 0$: 对非零模, 零当然属于这个集合; 对零模, 集合为空。

定理 4.1.8. 设 R 为 Noether 环, M 为 R 模。则

$$Z_R(M) = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)} \mathfrak{p}.$$

若 M 有限, 这就是有限个素理想的并。

证明. 关联素理想中的元素会零化定义它的非零元素, 因此右端包含于左端。反向设 $am = 0$ 、 $m \neq 0$ 。在包含 $\text{Ann}_R(m)$ 的非零元素零化子中选一个极大元 $\text{Ann}_R(n)$; 它在全部非零元素零化子中也是极大的, 因任何更大零化子仍包含 $\text{Ann}_R(m)$ 。引理 4.1.2 说明它是关联素理想, 而 a 在其中。 $\square$

例如在 $R = k[x, y]/(xy)$ 中, $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 的零化子分别为 $(\bar{y})$ 和 $(\bar{x})$ 。每个元素都可唯一写为常数加一个无常数项的 x 多项式, 再加一个无常数项的 y 多项式; 据此相乘可知零因子恰为这两个素理想的并。 $\bar{x} + \bar{y}$ 不在其中, 因而不是零因子, 尽管它的两个加项都是零因子。

更一般地, 若理想 J 的每个元素都是有限模 M 上的零因子, 由定理 4.1.5 和定理 4.1.8 及引理 1.1.5 的有限素理想回避性质, J 必包含于某一个关联素理想。这把“逐个检查乘法是否单射”的问题转成了有限个素理想的包含问题。以上存在性、局部化和滤过方法可对照 [2, §6, Theorems 6.1–6.5]。

4.2 准素理想

素理想在商环中排除一切非零零因子, 准素理想则允许零因子存在, 但要求它们最终被某个幂消去。这个差别使准素理想既保留一个确定的素支集, 又能描述支集上的幂零结构。先把准素性直接写成乘法条件, 再研究它与局部化的相容性。

4.2.1 准素性与根理想

定义 4.2.1. 交换环 R 的真理想 Q 称为**准素理想** (primary ideal), 如果对任意 $a, b \in R$,

$$ab \in Q, \quad b \notin Q \implies a^n \in Q \text{ 对某个整数 } n \geq 1.$$

若 $\sqrt{Q} = \mathfrak{p}$, 也称 Q 是 $\mathfrak{p}$ 准素理想。

等价地, R/Q 中每个零因子都是幂零元。素理想满足更强的条件 $n = 1$, 因而总是准素理想; 反之不成立, 例如 $\mathbb{Z}/(p^e)$ 中每个非单位都是 p 的倍数, 故 (p^e) 为 (p) 准素理想。

命题 4.2.2. 准素理想 Q 的根 $\mathfrak{p} = \sqrt{Q}$ 是素理想。对 $c \notin Q$, 理想商 $(Q : c)$ 仍为 $\mathfrak{p}$ 准素理想; 若还满足 $c \notin \mathfrak{p}$, 则 $(Q : c) = Q$ 。同一素理想所属的有限个准素理想的交仍为该素理想所属的准素理想。

证明. 若 $ab \in \sqrt{Q}$ 、 $b \notin \sqrt{Q}$, 则某个 $a^m b^m \in Q$, 且 $b^m \notin Q$ 。准素性给出 $a^{mn} \in Q$, 从而 $a \in \sqrt{Q}$ 。根是真理想, 故为素理想。

若 $ab \in (Q : c)$ 、 $b \notin (Q : c)$, 即 $a(bc) \in Q$ 、 $bc \notin Q$, 则某个 $a^n \in Q \subseteq (Q : c)$ 。又 $Q \subseteq (Q : c)$, 而 $dc \in Q$ 、 $c \notin Q$ 蕴涵 $d \in \mathfrak{p}$, 所以两者根相同。若 $c \notin \mathfrak{p}$, 从 $dc \in Q$ 与 $d \notin Q$ 将推出 $c \in \mathfrak{p}$, 故 $d \in Q$ 。

最后令 $Q = \bigcap_{i=1}^r Q_i$, 各 Q_i 的根均为 $\mathfrak{p}$ 。若 $ab \in Q$ 、 $b \notin Q$, 则至少一个因子给出 $a \in \mathfrak{p}$ 。于是每个 Q_i 都包含 a 的某个幂, 取这些指数的最大值即得 $a^n \in Q$; 同时 $\sqrt{Q} = \bigcap_i \sqrt{Q_i} = \mathfrak{p}$ 。□

命题 4.2.3. 若真理想 Q 的根是极大理想 $\mathfrak{m}$, 则 Q 是 $\mathfrak{m}$ 准素理想。因此极大理想的任意正整数次幂均为准素理想。

证明. R/Q 只有一个极大理想 $\mathfrak{m}/Q$ 。若 $a \notin \mathfrak{m}$, 其像为单位, 故 $ab \in Q$ 必导致 $b \in Q$ 。取逆否命题即得到准素条件。又 $\sqrt{\mathfrak{m}^n} = \mathfrak{m}$, 得最后一句。□

命题 4.2.4. 设 R 为 Noether 环, $Q \subseteq R$ 。则 Q 是准素理想, 当且仅当 $\text{Ass}_R(R/Q)$ 仅有一个元素; 这唯一的元素就是 $\sqrt{Q}$ 。

证明. 若 Q 为准素理想, 对每个非零 $\bar{b} \in R/Q$, $\text{Ann}_R(\bar{b}) = (Q : b)$ 的根由命题 4.2.2 等于 $\sqrt{Q}$. 因此当零化子本身为素理想时, 它只能是 $\sqrt{Q}$; 存在性保证这样的零化子确实出现。

反之, 设关联素理想只有 $\mathfrak{p}$. 命题 4.1.7 说明 Q 的极小素理想只有 $\mathfrak{p}$, 故 $\sqrt{Q} = \mathfrak{p}$. 由定理 4.1.8, 商环中的每个零因子来自 $\mathfrak{p}$, 所以它都是幂零元, Q 准素. $\square$

4.2.2 素理想幂不为准素理想的例子

极大理想幂的结论不能直接推广到任意素理想. 以下例子甚至发生在一个有限型整环中。

例 4.2.5. 设 k 为任意域,

$$R = k[x, y, z]/(xy - z^2), \quad \mathfrak{p} = (\bar{x}, \bar{z}).$$

则 R 是整环, $\mathfrak{p}$ 是素理想, 而 $\mathfrak{p}^2$ 不是准素理想。

证明. 映射 $\bar{x} \mapsto s^2, \bar{y} \mapsto t^2, \bar{z} \mapsto st$ 将 R 嵌入 $k[s, t]$. 具体地, 利用 $z^2 = xy$, 每个类可写为 $a(x, y) + zb(x, y)$; 代入后的第一项只含偶数指数对, 第二项只含奇数指数对, 两类单项式不能抵消, 因此映射单射, R 是整环. 又 $R/\mathfrak{p} \cong k[y]$, 故 $\mathfrak{p}$ 素。

关系 $xy - z^2$ 是全次数二的齐次式, 因而商环仍按全次数分解, 互不相同的次数不能相互抵消. 理想 $\mathfrak{p}^2 = (\bar{x}^2, \bar{x}\bar{z}, \bar{z}^2)$ 由全次数二的齐次元生成, 所以非零的一次齐次元 $\bar{x}$ 不属于它. 然而

$$\bar{y}\bar{x} = \bar{z}^2 \in \mathfrak{p}^2, \quad \bar{y}^n \notin \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}^2 \quad (n \geq 1),$$

后一句由商环 $k[y]$ 核验. 这直接违反准素条件. $\square$

失效的原因是 $\bar{y}$ 虽不在素理想 $\mathfrak{p}$ 中, 却在 $R/\mathfrak{p}^2$ 中成为零因子. 只知道 $\sqrt{\mathfrak{p}^2} = \mathfrak{p}$ 并不足以推出准素性; 上一小节中的“根是极大理想”确有作用。

4.2.3 局部化中的准素理想

命题 4.2.6. 设 Q 为交换环 R 的 $\mathfrak{p}$ 准素理想, S 为乘法集. 若 $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$, 则 $S^{-1}Q = S^{-1}R$; 若 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$, 则 $S^{-1}Q$ 为 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 准素理想, 且其在 R 内的收缩是 Q . 反之, $S^{-1}R$ 中任一准素理想的收缩也是准素理想。

证明. 第一种情形取 $s \in S \cap \mathfrak{p}$, 则某个 $s^n \in Q$, 局部化后 Q 包含单位. 第二种情形中, 若 $a/1 \in S^{-1}Q$, 则某个 $s \in S$ 满足 $sa \in Q$; 因为 $s \notin \mathfrak{p}$, 命题 4.2.2 给出 $a \in Q$, 这证明收缩断言, 也说明扩张仍是真理想。

若 $(a/s)(b/t) \in S^{-1}Q, b/t \notin S^{-1}Q$, 收缩断言给出 $ab \in Q, b \notin Q$. 于是 $a^n \in Q$, 进而 $(a/s)^n \in S^{-1}Q$. 又由已证的收缩性质, $(a/s)^n \in S^{-1}Q$ 当且仅当 $a^n \in Q$. 某个这样的正整数 n 存在, 恰等价于 $a \in \sqrt{Q} = \mathfrak{p}$, 所以局部化后的根为 $S^{-1}\mathfrak{p}$. 最后, 对于收缩的理想, 把 ab, b 送入局部化环并应用准素条件, 所获 $(a/1)^n$ 属于该理想就意味着 a^n 属于收缩. $\square$

定义 4.2.7. 对素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 及整数 $n \geq 1$, 称

$$\mathfrak{p}^{(n)} := \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R$$

为 $\mathfrak{p}$ 的第 n 个符号幂 (symbolic power); 交表示沿 $R \rightarrow R_{\mathfrak{p}}$ 的收缩, 不要求该映射单射。

$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是极大理想, 所以由命题 4.2.3 和命题 4.2.6, $\mathfrak{p}^{(n)}$ 总是 $\mathfrak{p}$ 准素理想, 且包含普通幂 $\mathfrak{p}^n$ 。在例 4.2.5 中, $\bar{y}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中可逆, 故 $\bar{x} = \bar{z}^2/\bar{y} \in \mathfrak{p}^2 R_{\mathfrak{p}}$, 于是 $\bar{x} \in \mathfrak{p}^{(2)} \setminus \mathfrak{p}^2$ 。符号幂正是先在目标素理想处集中研究, 再把结果收回原环所得的准素对象。

4.3 准素分解定理

整数的素因数分解给出 $(12) = (4) \cap (3)$ 。一般 Noether 环的理想也能分解为有限个准素理想的交, 但“各因子都唯一”不再成立。本节分别证明分解存在、所属素理想唯一和孤立分支唯一; 这三项结论的强弱不同。

4.3.1 Noether 环中的准素分解存在性

称真理想 I 是**不可约理想** (irreducible ideal), 如果每当 $I = J \cap K$ 时, 至少有 $I = J$ 或 $I = K$ 。这里讨论的是理想作为交的不可约性, 不是元素的不可约性, 也不是模的单性。

引理 4.3.1. 在 Noether 环中, 每个真理想是有限个不可约理想的交, 而每个不可约理想都是准素理想。

证明. 若有真理想不能写成有限个不可约理想的交, 在这些理想中取极大者 I 。它不可能不可约, 故 $I = J \cap K$, 其中 J, K 都严格包含 I 。极大性保证两者都已有这样的有限分解; 将两个分解合并就得到 I 的分解, 矛盾。

设 Q 不可约且 $ab \in Q$ 、 $b \notin Q$ 。升链

$$(Q : a) \subseteq (Q : a^2) \subseteq \dots$$

稳定; 选 $n \geq 1$ 使 $(Q : a^n) = (Q : a^{n+1})$ 。我们证明

$$Q = (Q + (a^n)) \cap (Q + (b)).$$

只需检查反向包含。若 $w = q + ra^n = q' + sb$, 其中 $q, q' \in Q$, 则乘以 a 后第二式给出 $aw \in Q$, 于是第一式给出 $ra^{n+1} \in Q$ 。由理想商稳定性, $ra^n \in Q$, 故 $w \in Q$ 。因为 $b \notin Q$, 不可约性迫使 $Q + (a^n) = Q$, 即 $a^n \in Q$ 。这正是准素条件。□

定理 4.3.2 (准素分解存在性). 交换 Noether 环 R 的每个真理想 I 都能写成

$$I = Q_1 \cap \dots \cap Q_r, \quad (4.1)$$

其中各 Q_i 为准素理想。可以进一步要求没有任何 Q_i 能删去, 且各根 $\mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}$ 两两不同。

证明. 引理 4.3.1 给出一个有限准素分解。把根相同的因子合并为一个交, 由命题 4.2.2 它仍为同根准素理想。再删去冗余因子, 即得附加条件。□

后面的几个计算使用单项式理想的一个直接判据: 由单项式 $m_1, \dots, m_s$ 生成的理想, 作为 k 向量空间, 恰由那些被某个 m_i 整除的单项式生成。事实上, 把各多项式系数展开, 就得到这一方向的包含; 反向, 每个这样的单项式本来就是某个 m_i 的倍数。由于不同单项式线性无关, 一个多项式属于此理想, 当且仅当它的每个非零单项都属于此理想。因此两个单项式理想取交时可以逐项检查, 不需要预先运行 Gröbner 基算法。

准素理想不一定不可约。例如在 $k[x, y]$ 内,

$$(x, y)^2 = (x^2, y) \cap (x, y^2).$$

等式可逐个比较单项式: 同时属于右端的单项式恰被 x^2, xy, y^2 之一整除。两边的理想都是 (x, y) 准素理想, 右边两个因子却都严格大于左边。因此不可约分解只是证明存在性的一种工具, 并不是最后要保存的标准形式。

4.3.2 极小分解、孤立分支与嵌入分支

满足定理 4.3.2 中两个附加条件的分解, 称为**极小准素分解** (minimal primary decomposition)。“极小”在这里表示根互异且无冗余, 不声称每个准素因子在包含关系下极小。

定理 4.3.3. 若 $I = \bigcap_{i=1}^r Q_i$ 是 Noether 环中的极小准素分解, $\sqrt{Q_i} = \mathfrak{p}_i$, 则

$$\text{Ass}_R(R/I) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}.$$

特别地, 分解中出现哪些素理想与分解的选择无关。

证明. 对角映射给出单射

$$R/I \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^r R/Q_i, \quad \bar{a} \mapsto (a + Q_1, \dots, a + Q_r).$$

由命题 4.1.3 和命题 4.2.4, 左端的关联素理想都在 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 中。

固定 i , 令 $J_i = \bigcap_{j \neq i} Q_j$, 在 $r = 1$ 时约定 $J_i = R$ 。无冗余保证 $J_i/I \neq 0$, 而映射 $J_i/I \rightarrow R/Q_i$ 单射, 因其核为 $(J_i \cap Q_i)/I = 0$ 。由定理 4.1.4, 这个非零子模有至少一个关联素理想; 由于它嵌入 R/Q_i , 该素理想只能是 $\mathfrak{p}_i$ 。它同时是 R/I 的子模, 故 $\mathfrak{p}_i \in \text{Ass}_R(R/I)$ 。逐个取 i 得反向包含。□

在上述集合中, 按包含关系极小的 $\mathfrak{p}_i$ 称为**孤立关联素理想** (isolated associated prime), 其余称为**嵌入关联素理想** (embedded associated prime); 相应 Q_i 称为孤立准素分支和嵌入准素分支。由命题 4.1.7, 孤立关联素理想恰是包含 I 的极小素理想。它们对应 $V(I)$ 的不可约分支, 而嵌入素理想对应的闭集包含在这些分支之内。

例如 $I = (x^2, xy) \subset k[x, y]$ 满足

$$I = (x) \cap (x^2, y). \quad (4.2)$$

第二因子因根为极大理想 (x, y) 而准素。要验证交，设 $xf = x^2a + yb$ ，模掉 x 后有 $y\bar{b} = 0$ 于 $k[y]$ ，故 $b = xc$ ，于是 $xf = x^2a + xyc \in I$ 。两因子均不可删，根分别为 (x) 与 (x, y) ，所以前者孤立、后者嵌入。

4.3.3 准素分解的唯一性与非唯一性

定理 4.3.4. 在极小准素分解 $I = \bigcap_i Q_i$ 中，若 $\mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}$ 为孤立关联素理想，则

$$Q_i = IR_{\mathfrak{p}_i} \cap R.$$

因此每个孤立准素分支由 I 与其根唯一决定。

证明. 有限交与局部化交换。若 $j \neq i$ ，由于 $\mathfrak{p}_i$ 在所有根中极小且根互异， $\mathfrak{p}_j \not\subseteq \mathfrak{p}_i$ 。取 $a \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$ ，则某个 $a^n \in Q_j$ ，而 a 在 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 中成为单位，所以 $Q_j R_{\mathfrak{p}_i} = R_{\mathfrak{p}_i}$ 。于是 $IR_{\mathfrak{p}_i} = Q_i R_{\mathfrak{p}_i}$ 。命题 4.2.6 又说明 Q_i 是其扩张的收缩，得到公式。□

嵌入分支一般不唯一。在式 (4.2) 的同一个理想上，对每个 $n \geq 1$ 都有

$$(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, xy, y^n). \quad (4.3)$$

右边第二因子的根为 (x, y) ，故它准素。由单项式整除判据，第二因子中同时被 x 整除的单项式恰属于 (x^2, xy) ，所以交确实不变。 x 不属于第二因子， y^n 不属于第一因子，因而各分解都极小；而 y^n 属于第 n 个第二因子，却不属于第 $n+1$ 个，故这些分支互不相同。

因此，准素分解唯一性应分为两句话记忆：全部所属素理想唯一，孤立准素分支唯一；嵌入准素分支允许改变。不能把“根唯一”误写成“分支唯一”。模的对应结论及另一种存在性证明见下一节；文献中的统一表述可对照 [2, §6, Theorem 6.8]。

4.4 模的版本与例子

理想分解其实是自由模 R 中的子模分解。若要研究一个矩阵给出的余核，或研究有限模的支集与局部结构，就需要允许一般有限模。此时准素性必须说明“某个标量的幂零化整个商模”，不能只说它零化眼前的一个元素。本节 R 均为交换 Noether 环， M 为有限 R 模。

4.4.1 子模的准素分解

定义 4.4.1. 真子模 $N \subsetneq M$ 称为**准素子模** (primary submodule)，如果对任意 $a \in R$ 、 $m \in M$ ，

$$am \in N, \quad m \notin N \implies a^n M \subseteq N \text{ 对某个 } n \geq 1.$$

若 $\sqrt{\text{Ann}_R(M/N)} = \mathfrak{p}$ ，也称 N 为 $\mathfrak{p}$ 准素子模。整个条件仅依赖商模 M/N ，但“ N 准素”总须指明它位于哪个模中。

命题 4.4.2. 真子模 $N \subsetneq M$ 准素, 当且仅当 $\text{Ass}_R(M/N)$ 只有一个元素; 此元素就是 $\sqrt{\text{Ann}_R(M/N)}$, 因而该根是素理想。

证明. 记 $T = M/N$ 与 $J = \text{Ann}_R(T)$ 。若 N 准素, 取 $\mathfrak{p} = \text{Ann}_R(t) \in \text{Ass}_R(T)$ 。因 $J \subseteq \mathfrak{p}$, 有 $\sqrt{J} \subseteq \mathfrak{p}$ 。另一方面, 每个 $a \in \mathfrak{p}$ 都零化非零元 t , 准素条件给出 $a^n T = 0$, 即 $a \in \sqrt{J}$ 。故所有关联素理想都等于 $\sqrt{J}$, 且存在性保证集合非空。

反向若 $\text{Ass}_R(T) = \{\mathfrak{p}\}$, 则命题 4.1.7 与 $\text{Supp}_R(T) = V(J)$ 给出 $\sqrt{J} = \mathfrak{p}$ 。若 $at = 0, t \neq 0$, 由定理 4.1.8 得 $a \in \mathfrak{p} = \sqrt{J}$, 故某个 $a^n \in J$, 这就是 $a^n M \subseteq N$ 。□

定理 4.4.3. 有限模 M 的每个真子模 N 有极小准素分解

$$N = N_1 \cap \cdots \cap N_r, \quad \text{Ass}_R(M/N_i) = \{\mathfrak{p}_i\},$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 互异, 且无因子可删。并且

$$\text{Ass}_R(M/N) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}.$$

若 $\mathfrak{p}_i$ 为该集合的极小元, 记 $\lambda_i: M \rightarrow M_{\mathfrak{p}_i}$ 为局部化映射, 则

$$N_i = \lambda_i^{-1}(N_{\mathfrak{p}_i}).$$

证明. 称真子模不可约, 如果不能写成两个严格更大子模的交。因为 M 是 Noether 模, 引理 4.3.1 第一段的极大反例证明逐字适用于子模, 故 N 是有限个不可约子模的交。

不可约子模必准素。否则由命题 4.4.2, 非零模 M/N 至少有两个不同关联素理想 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 。分别取子模 $L \cong R/\mathfrak{p}, K \cong R/\mathfrak{q}$ 。若它们的交包含非零元素, 该元素的零化子会同时等于 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$, 矛盾。所以 $L \cap K = 0$, 其在 M 中的原像便把 N 写成两个严格更大子模的交。

同根准素子模的有限交仍然准素: 商模单射到各商模的直和, 由命题 4.1.3 其关联素理想只能属于这个单元集合; 商模非零, 故恰有该关联素理想。于是可以合并同根因子并删除冗余。对所得分解, 对角单射 $M/N \hookrightarrow \bigoplus_i M/N_i$ 给出关联素理想的一边包含。反向, 非零模 $(\bigcap_{j \neq i} N_j)/N$ 同时嵌入 M/N 与 M/N_i , 它的关联素理想非空且只能为 $\mathfrak{p}_i$, 故每个 $\mathfrak{p}_i$ 都出现。

最后设 $\mathfrak{p}_i$ 极小。对 $j \neq i$, 取 $a \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$ 。因为 $\mathfrak{p}_j = \sqrt{\text{Ann}_R(M/N_j)}$, 某个 a^n 零化 M/N_j 。局部化后 a 是单位, 故 $(N_j)_{\mathfrak{p}_i} = M_{\mathfrak{p}_i}$, 得到 $N_{\mathfrak{p}_i} = (N_i)_{\mathfrak{p}_i}$ 。若 $m/1 \in (N_i)_{\mathfrak{p}_i}$, 则某个 $s \notin \mathfrak{p}_i$ 满足 $sm \in N_i$ 。若 $m \notin N_i$, 准素性将给出 $s \in \sqrt{\text{Ann}_R(M/N_i)} = \mathfrak{p}_i$, 矛盾。所以收缩恰为 N_i , 公式得证。□

4.4.2 嵌入关联素理想的显式例子

先回到 $R = k[x, y], I = (x^2, xy)$ 。商模 R/I 中有

$$\text{Ann}_R(\bar{x}) = (x, y), \quad \text{Ann}_R(\bar{y}) = (x).$$

第一式因为 $f\bar{x} = f(0,0)\bar{x}$; 第二式可将 $fy \in (x^2, xy)$ 模掉 x , 由 $k[y]$ 是整环得到 $f \in (x)$ 。这不仅列出了素理想, 还给出了定义它们的实际元素。它们正是定理 4.3.3 对式 (4.2) 所给出的两个关联素理想。

一个矩阵也可以同时包含孤立与嵌入成分。令

$$\Phi: R^3 \longrightarrow R^2, \quad [\Phi] = \begin{pmatrix} x & y & 0 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}, \quad T = \text{coker } \Phi.$$

按两个坐标拆开生成关系，得到

$$T \cong R/(x, y) \oplus R/(x).$$

因此 $\text{Ass}_R(T) = \{(x, y), (x)\}$ 。若 e_1, e_2 是 R^2 的标准基，则 $N = \text{im } \Phi$ 的极小准素分解为

$$N = (Re_1 \oplus (x)e_2) \cap ((x, y)e_1 \oplus Re_2).$$

第一个商模为 $R/(x)$ ，第二个为 $R/(x, y)$ ，故两因子分别属于 (x) 与 (x, y) 。在 (x) 处局部化时 y 成为单位，第一坐标的商消失，第二坐标留下 $k(y)$ 。这就是孤立分支公式在一个展示矩阵上的具体表现。

4.4.3 几何分支与非约化结构

对 Noether 环的真理想 I ，闭集 $V(I) = V(\sqrt{I})$ 只保存极小素理想所给出的不可约分支。若把 I 换为 $\sqrt{I}$ ，幂零元全部消失；准素分解中记录的额外结构却不一定保留。这里先在素谱中作这种解释，无须预设基域代数闭。

命题 4.4.4. 若 R 是约化 Noether 环，则

$$\text{Ass}_R(R) = \min \text{Spec } R.$$

因此约化 Noether 环没有嵌入关联素理想。

证明. 若 $R = 0$ ，等式两侧均为空集。以下设 $R \neq 0$ 。由命题 1.3.5，Noether 素谱只有有限个极小素理想，记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 。约化性给出 $0 = \bigcap_i \mathfrak{p}_i$ 。这个交无冗余：固定 i ，对每个 $j \neq i$ 取 $a_j \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$ ，则 $\prod_{j \neq i} a_j$ 属于其余所有素理想而不属于 $\mathfrak{p}_i$ ； $r = 1$ 时取空积 1。因此它是极小准素分解，定理 4.3.3 给出所需等式。□

其逆命题不成立： $k[x, y]/(x^2)$ 非约化，却只有孤立关联素理想 $(\bar{x})$ 。事实上将元素写成 $a(y) + \bar{x}b(y)$ ，若 $a(y) \neq 0$ ，先比较常数项、再比较 $\bar{x}$ 的系数可见其乘法是单射；因而零因子全是平方为零的 $\bar{x}b(y)$ ， (x^2) 为 (x) 准素理想。

再看 $A = k[x, y]/(x^2, xy)$ 。其幂零理想 $(\bar{x})$ 被 $(\bar{x}, \bar{y})$ 零化，且作为 k 向量空间只有一维；在开集 $D(\bar{y})$ 上它消失。因此这个环在整条直线的通常结构之外，还在原点保留了一份幂零信息，表现为嵌入关联素理想。与之相比， $k[x, y]/(x^2)$ 的幂零结构沿整条直线存在。两者的约化商都同构于 $k[y]$ ，但其零因子与局部模结构明显不同。这样的区别是后面研究局部环、重数及正规化时必须保留的。

本章小结

关联素理想由循环子模 $R/\mathfrak{p}$ 的实际嵌入定义。Noether 环保证非零模有这样的子模，有限模的升链条件进一步给出有限素理想滤过，因而关联素理想只有有限个。它们的并是全部零因子，它们的极小元与支集的极小元一致；局部化保留恰好那些不遇到分母集的关联素理想。

准素分解把一个理想或子模写成有限个只对应一个关联素理想的部分之交。存在性来自 Noether 条件；分解中的素理想由原商模唯一确定；孤立分支还可以用一次局部化及收缩唯一恢复。嵌入分支的非唯一性表明，准素分解不是素因数分解的逐字推广。约化环没有嵌入关联素理想，但没有嵌入关联素理想的环仍可能带有幂零元。

习题

习题 4.1. 求 $M = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的关联素理想与零因子，并为每个关联素理想给出一个零化子恰为它的元素。

解. 自由因子的非零元素零化子为 (0) 。第二因子内， $\bar{a}$ 的零化子由 $12/\gcd(12, a)$ 生成，成为素理想时只能是 (2) 或 (3) 。因此关联素理想为 $(0), (2), (3)$ ，可分别取 $(1, \bar{0}), (0, \bar{6}), (0, \bar{4})$ 为见证。由定理 4.1.8，零因子为 $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ ，这里 0 已在此并中。□

习题 4.2. 在 $R = k[x, y]$ 中，直接计算 $R/(x^3)$ 的零因子及关联素理想，并求元素 $\bar{x}^2$ 的零化子。

解. 每个类唯一写成 $a_0(y) + a_1(y)\bar{x} + a_2(y)\bar{x}^2$ 。若 $a_0 \neq 0$ ，将其与另一个这样的式子相乘，逐次比较 $1, \bar{x}, \bar{x}^2$ 的系数，利用 $k[y]$ 为整环可知乘法单射。若 $a_0 = 0$ ，该元素是幂零元，且会零化非零元 $\bar{x}^2$ 。所以零因子来自 (x) ， (x^3) 为 (x) 准素理想，关联素理想集合为 $\{(x)\}$ 。计算 $f\bar{x}^2 = a_0(y)\bar{x}^2$ 给出零化子 (x) 。□

习题 4.3. 取 $R = k[t]$ 。利用 $0 \rightarrow tR \rightarrow R \rightarrow R/(t) \rightarrow 0$ ，说明不能把命题 4.1.3 改写为 $\text{Ass}_R(R/(t)) \subseteq \text{Ass}_R(R)$ 。再解释素理想滤过中的素理想为何可以比关联素理想多。

解. R 及同构于它的 tR 都只有关联素理想 (0) ，而 $R/(t)$ 只有 (t) 。这已经否定所提包含。滤过 $0 \subset tR \subset R$ 的因子为 $R/(0)$ 和 $R/(t)$ ，所以出现 $(0), (t)$ ，但原模 R 的关联集合只有 (0) 。短正合列命题给出的是原模关联集合包含于两端的并，不能反向读取。□

习题 4.4. 求 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模的关联素理想。说明它的例子不违反关联素理想有限性定理。

解. 非零元 $a/n + \mathbb{Z}$ 在 $\gcd(a, n) = 1$ 时零化子为 (n) ，故素零化子恰为所有素数 p 对应的 (p) ，由 $1/p + \mathbb{Z}$ 实现。不存在零化子为零的元素，因为每个元素都有有限加法阶。所得集合无限，而 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 不有限生成：有限多个有理数的分母有公倍数 d ，它们生成的模被 d 零化，却不能包含所有 $1/p + \mathbb{Z}$ 。有限性定理的模假设不满足。□

习题 4.5. 令 $R = k[x, y]$ 、 $M = R/(x) \oplus R/(x, y)$ 。计算 M_y 及 $M_{(x, y-1)}$ ，并描述两次局部化后的关联素理想。

解. 原关联素理想为 $(x), (x, y)$ 。倒置 y 会消去被 y 零化的第二因子，而第一因子成为 $k[y, y^{-1}]$ ，其在 R_y 上的关联素理想为 $(x)R_y$ 。在 $\mathfrak{m} = (x, y-1)$ 处， $y \notin \mathfrak{m}$ ，所以第二因子同样消失；第一因子成为 $k[y]_{(y-1)}$ ，其关联素理想为 $(x)R_{\mathfrak{m}}$ 。注意局部化后的唯一关联素理想不必是该局部环的极大理想。□

习题 4.6. 对 $R = k[x, y]$ 、 $M = R/(x^2, xy)$ ，构造长度为二的素理想滤过，写出两个因子的具体同构。

解. 取 $M_1 = R\bar{x}$ 。因 $\text{Ann}_R(\bar{x}) = (x, y)$ ，映射 $R/(x, y) \rightarrow M_1$ 、 $\bar{a} \mapsto a\bar{x}$ 同构。商掉 M_1 相当于再加关系 $x = 0$ ，故 $M/M_1 \cong R/(x)$ 。链 $0 \subsetneq M_1 \subsetneq M$ 即所求；两个商都非零，且都是相应素商环。□

习题 4.7. 在 $R = k[x, y]$ 中令 $Q = (x^2, y^3)$ 。证明 Q 准素，写出 R/Q 的一组 k 基，并计算 $(Q : x)$ 、 $(Q : y^2)$ 。

解. $\sqrt{Q} = (x, y)$ 极大，所以由命题 4.2.3， Q 为 (x, y) 准素理想。标准单项式为 $1, y, y^2, x, xy, xy^2$ ，它们生成商空间且因原理想为单项式理想而线性无关。逐个判断乘积所属关系得 $(Q : x) = (x, y^3)$ 、 $(Q : y^2) = (x^2, y)$ 。两理想的根仍为 (x, y) ，符合准素理想商命题。□

习题 4.8. 令 $R = k[x, y, z]$ 、 $J = (x^2, xz)$ 。求其根，并用两个明确元素证明 J 不准素。指出这说明关于根的哪一个逆命题错误。

解. $x^2 \in J \subseteq (x)$ ，故 $\sqrt{J} = (x)$ ，为素理想。但 $zx \in J$ 、 $x \notin J$ ，而 $z^n \notin (x) \supseteq J$ 对所有 $n \geq 1$ 成立，所以 J 不准素。因而“准素理想的根是素理想”的逆命题错误；极大根准素命题的“极大”不能换成“素”。□

习题 4.9. 在 $k[x, y]$ 中令 $Q = (x^2, y^3)$ 。分别倒置 $1+x$ 与 x ，计算 Q 的扩张及收缩；说明两种答案的差别。

解. $1+x \notin (x, y) = \sqrt{Q}$ ，因此在 R_{1+x} 中，扩张是由 x^2, y^3 生成的真准素理想，收缩仍为 Q 。商环中 $(1+x)(1-x) = 1$ ，所以这次倒置事实上不改变商环 R/Q 。倒置 x 时 $x^2 \in Q$ 成为单位，扩张是全环，收缩是 R 。区别恰在分母集是否与根相交。□

习题 4.10. 在例 4.2.5 的环内，证明 $\mathfrak{p}^{(2)} = (\bar{x})$ 。

解. 商环 $R/(\bar{x}) \cong k[y, z]/(z^2)$ 中，每个元素为 $a(y) + zb(y)$ 。若 $a \neq 0$ ，比较乘积的两个系数可见其为非零因子；若 $a = 0$ ，它平方为零。故 $(\bar{x})$ 为 $\mathfrak{p}$ 准素理想。局部化于 $\mathfrak{p}$ 后 $\bar{y}$ 可逆， $\bar{x} = \bar{z}^2/\bar{y}$ ，且 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = (\bar{z})$ ，于是 $\mathfrak{p}^2R_{\mathfrak{p}} = (\bar{x})R_{\mathfrak{p}}$ 。利用准素理想的收缩性质得到 $\mathfrak{p}^{(2)} = (\bar{x})$ 。这也再次显示 $\mathfrak{p}^2 \subsetneq \mathfrak{p}^{(2)}$ 。□

习题 4.11. 在 $R = k[x, y, z]$ 中分解 $I = (xy, xz)$ ，求 $\text{Ass}_R(R/I)$ ，并解释其准素分支为何全部唯一。

解. $I = (x) \cap (y, z)$: 若 $xf \in (y, z)$, 模掉 (y, z) 后在 $k[x]$ 中有 $x\bar{f} = 0$, 故 $f \in (y, z)$. 两个因子都是素理想, 互不包含, 且 x, y 分别见证无冗余. 因此关联素理想恰为 $(x), (y, z)$, 两者都极小, 分支由定理 4.3.4 唯一决定. $\square$

习题 4.12. 证明 $I = (x^2y, xy^2) \subset k[x, y]$ 有极小准素分解

$$I = (x) \cap (y) \cap (x, y)^3.$$

求关联素理想, 并给出一个零化子为嵌入素理想的元素.

解. 前两个理想的交为 (xy) , 其中全次数至少三的单项式恰被 x^2y 或 xy^2 整除, 故再与 $(x, y)^3$ 取交得到 I . 第三因子因根极大而准素. 删去第三因子会增加 xy , 删去第一因子会增加 y^3 , 删去第二因子会增加 x^3 , 因此分解极小. 关联素理想为 $(x), (y), (x, y)$, 最后一个嵌入. 非零元 $\overline{xy}$ 的零化子为 (x, y) , 因为 $fxy \in (x^2y, xy^2)$ 当且仅当 $f \in (x, y)$. $\square$

习题 4.13. 对 $I = (x^2, xy) \subset k[x, y]$, 计算 $I : y^\infty$ 与 $I : x^\infty$, 并用准素分解解释被保留与被消去的分支.

解. 对每个 $n \geq 1$, $fy^n \in I$ 当且仅当 $f \in (x)$, 故 $I : y^\infty = (x)$. 又 $x^2 \in I$, 所以 $I : x^\infty = R$. 分解 $I = (x) \cap (x^2, y)$ 中, 倒置 y 保留根为 (x) 的孤立分支, 消去根含 y 的嵌入分支; 倒置 x 则同时消去两个分支. 饱和是相应局部化扩张的收缩, 因此与直接计算一致. $\square$

习题 4.14. 设 R 为 Noether 环, 真理想 I 的全部关联素理想都是极大理想. 证明其极小准素分解唯一, 且 $R/I \cong \prod_i R/Q_i$.

解. 不同极大理想互不包含, 所以所有关联素理想都孤立, 各准素分支唯一. 若 $Q_i + Q_j \neq R$, 取包含此和的极大理想 $\mathfrak{m}$, 它包含 $\sqrt{Q_i}$ 与 $\sqrt{Q_j}$, 故两者都等于 $\mathfrak{m}$, 与根互异矛盾. 因此各 Q_i 两两互素, 中国剩余定理给出所述乘积分解, 其核正是 $\bigcap_i Q_i = I$. $\square$

习题 4.15. 对任意 $c \in k$, 令 $Q_c = (x^2, y - cx) \subset k[x, y]$. 证明 $(x) \cap Q_c = (x^2, xy)$, 并证明 $c \neq d$ 时 $Q_c \neq Q_d$.

解. $R/Q_c \cong k[x]/(x^2)$, 其中 $y = cx$, 所以 Q_c 的根为 (x, y) , 它准素. 若 $xf \in Q_c$, 在此商环中 $xf = xf(0, 0)$, 而 $x \neq 0$, 故 $f(0, 0) = 0$, 即 $f \in (x, y)$. 因此交包含于 (x^2, xy) , 反向由 $xy = x(y - cx) + cx^2$ 立即验证. 若 $c \neq d$, $y - cx$ 在 R/Q_d 中等于 $(d - c)x \neq 0$, 所以不属于 Q_d . 这给出另一类明确不同的嵌入分支. $\square$

习题 4.16. 设 $R = k[t]$, $M = R^2$, N 是矩阵 $\text{diag}(t^2, (t-1)^3)$ 的像. 给出 N 的极小准素分解、 M/N 的关联素理想, 以及商模的 k 维数.

解. 令 $N_0 = t^2Re_1 \oplus Re_2$, $N_1 = Re_1 \oplus (t-1)^3Re_2$, 则逐坐标取交得 $N = N_0 \cap N_1$. 两个商模分别为 $R/(t^2)$ 与 $R/((t-1)^3)$, 因而两因子分别属于 $(t), (t-1)$, 且无冗余. 关联素理想就是这两个极大理想. 商模同构于上述两个循环模的直和, 维数为 $2 + 3 = 5$. $\square$

习题 4.17. 令 $R = k[x]$, $M = \bigoplus_{n \geq 1} R/(x^n)$. 证明 $\text{Ass}_R(M) = \{(x)\}$, 但零子模不满足定义 4.4.1 中的准素条件. 说明有限生成假设在哪里不可缺少.

解. 每个非零元素只占有限个坐标, 其零化子是这些坐标零化子的有限交, 因而为某个 (x^r) 、 $r \geq 1$ 。它为素理想时只能是 (x) , 而第一个因子的 $\bar{1}$ 实现这个零化子。虽然 x 零化该非零元, 但对每个 $m \geq 1$, x^m 不能零化因子 $R/(x^{m+1})$ 中的 $\bar{1}$ 。故没有 $x^m M = 0$, 零子模不准素。命题 4.4.2 假定 M 有限; 没有此假设, 逐元素幂零不能统一为作用于整个模的一个指数。□

习题 4.18. 设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想, $M = R/\mathfrak{p} \oplus R/\mathfrak{p}$ 。直接证明零子模准素但可约。

解. 若 $a(m_1, m_2) = 0$ 且元组非零, 至少一个坐标在整环 $R/\mathfrak{p}$ 中非零, 故 $a \in \mathfrak{p}$ 。于是 $aM = 0$, 准素条件甚至以指数一成立。另一方面, 两个坐标子模 $R/\mathfrak{p} \oplus 0$ 与 $0 \oplus R/\mathfrak{p}$ 都非零, 交为零, 所以零子模可约。子模准素与不能分解为交是不同性质。□

习题 4.19. 在 $R = k[x, y]$ 中令

$$\Phi = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}, \quad N = \text{im } \Phi \subset R^2.$$

证明 R^2/N 的关联素理想只有 (x) , 因而 N 是准素子模。

解. 记 $\Psi = \begin{pmatrix} x & -y \\ 0 & x \end{pmatrix}$, 则 $\Phi\Psi = \Psi\Phi = x^2 I_2$ 。映射 $v \mapsto \Psi v \bmod x^2 R^2$ 诱导

$$R^2/N \longrightarrow \left(R/(x^2)\right)^2.$$

它是单射: 若 $\Psi v = x^2 w$, 乘以 Φ 得 $x^2 v = x^2 \Phi w$, 而 R 是整环, 所以 $v = \Phi w$ 。目标的关联素理想只有 (x) , 故源的关联集合包含于它。源非零, 例如模掉 (x, y) 后矩阵为零而余核为 k^2 , 所以关联素理想存在, 必须恰为 (x) 。再用命题 4.4.2 得 N 准素。□

习题 4.20. 在 $R = k[x, y, z]$ 中令 $I = (xy, xz, yz)$ 。证明 I 为根理想, 求 R/I 的关联素理想, 并判断 $\overline{x+y+z}$ 是否为零因子。

解. 由单项式整除判据, $I = (x, y) \cap (x, z) \cap (y, z)$ 。它是素理想的交, 故为根理想; 三个因子互不包含且无冗余, 因此关联素理想为这三个理想, 或在商环中写作它们的像。 $x+y+z$ 模这三个理想分别为 z, y, x , 均非零, 故不在任何关联素理想中。由定理 4.1.8, 其像为非零因子。□

习题 4.21. 令 $r \geq 1$ 、 $A = k[x, y]/(x^2, xy^r)$ 。求幂零理想的 k 维数、它的支集, 以及 A 的关联素理想。

解. 根为 (x) , 所以幂零理想为 $(\bar{x})$, 其 k 基为 $\bar{x}, \bar{x}\bar{y}, \dots, \bar{x}\bar{y}^{r-1}$, 维数 r 。零化子为 $(\bar{x}, \bar{y}^r)$, 故支集只有 $(\bar{x}, \bar{y})$ 这一点。直接验证

$$(x^2, xy^r) = (x) \cap (x^2, y^r)$$

给出极小准素分解, 两个关联素理想为 $(\bar{x})$ 与 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。后者也由元素 $\bar{x}\bar{y}^{r-1}$ 的零化子实现。倒置 y 后幂零理想消失, 而不同的 r 给出不同维数的原点幂零部分。□

习题 4.22. 设 $M \neq 0$ 为 Noether 环 R 上的有限模, $\text{Ass}_R(M) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}$ 。证明

$$\sqrt{\text{Ann}_R(M)} = \bigcap_{i=1}^r \mathfrak{p}_i,$$

并证明某个 $n \geq 1$ 满足 $(\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r)^n M = 0$ 。

解. 由命题 4.1.7, 包含 $\text{Ann}_R(M)$ 的极小素理想恰为关联素理想集合的极小元。取全部关联素理想的交不会改变这些极小元的交, 故得到根理想公式。记这个交为 $J = (a_1, \dots, a_s)$, 有限生成来自 Noether 性。对每个 a_i 选 $n_i \geq 1$ 使 $a_i^{n_i} M = 0$ 。令 $n = 1 + \sum_i (n_i - 1)$, 则任意 n 次生成元乘积中某个 a_i 至少出现 n_i 次, 所以 $J^n M = 0$ 。因为 $\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \subseteq J$, 所需结论成立。若 $J = 0$, 直接取 $n = 1$ 。□

第五章 整扩张、整闭性与 Noether 正规化

整性把首一方程与有限模联系起来，使环扩张中的元素和素理想都能受到控制。本章从有限模判据出发，建立整闭包、素理想的提升与不可比性，完整证明整闭基整环上的 Going-down 定理。最后用适用于任意域的加权代换证明 Noether 正规化，把有限型代数组织成多项式子环上的有限模。

本章目标

- 用有限模判据证明整性，区分有限型、有限与整扩张。
- 明确整闭包的环境，检验整闭性及局部化的作用。
- 在指定端点上提升素理想链，并核对 Going-up 与 Going-down 的不同假设。
- 实际构造整子多项式环，说明有限域上为何需要非线性的加权代换。

本章用到环局部化、素理想对应和有限模的行列式技巧。最小多项式与代数独立沿用第一卷的域论定义；Noether 正规化对含零因子的有限型代数也成立，所以不能在证明中暗中改成只讨论整环。素理想链的比较先按包含关系处理，维数术语留待下一编。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, §9, Theorems 9.1–9.4, pp. 64–68] 适合对照整性与素理想提升；其中 Going-down 的主证明使用正规扩域中的素理想共轭，本章改用最小多项式系数的局部化论证。[2, §33, Lemma 2, p. 262] 给出无限域上的线性代换证明，本章同时处理有限域，避免把非零多项式必有非零取值的结论用于有限域。

5.1 整元素

有理数 $1/2$ 满足整数系数方程 $2T - 1 = 0$ ，却不满足整数系数的首一方程。首项系数能否取为一，决定了高次幂能否用低次幂表示，也决定了加入一个元素以后是否仍能用有限个模生成元控制运算。本节始终约定环交换且有单位，环包含保持单位。

5.1.1 首一方程与有限模判据

定义 5.1.1. 设 $A \subseteq B$ 为环包含。若 $b \in B$ 满足

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A,$$

则称 b 在 A 上整 (integral)。若 B 的每个元素都在 A 上整，称 B/A 为整扩张 (integral extension)。若 B 作为 A 模有限生成，称 B/A 为有限扩张 (finite extension)。

这里的“有限”是模的有限生成性，不是底集合有限，也不是仅指代数生成元有限。例如 $A[T]$ 是有限型 A 代数，但当 $A \neq 0$ 时不可能是有限 A 模。

命题 5.1.2 (整性的有限模判据). 对 $b \in B$ ，下列条件等价：

I. b 在 A 上整；

II. $A[b]$ 是有限 A 模；

III. 存在有限 A 模 M ，它同时是忠实 $A[b]$ 模，且两种 A 作用一致。

因此，有限环扩张必为整扩张；若 $B = A[b_1, \dots, b_r]$ ，则 B/A 有限当且仅当每个 b_i 在 A 上整。

证明. 首一方程可把 b^n 及更高幂递次化为 $1, b, \dots, b^{n-1}$ 的 A 线性组合，故第一项推出第二项。取 $M = A[b]$ ，其中一使乘法作用忠实，得到第三项。

设第三项成立，选 A 模生成元 $m_1, \dots, m_s$ ，写 $bm_j = \sum_i c_{ij} m_i$ ，其中 $c_{ij} \in A$ 。定理 3.2.1 说明首一多项式 $\det(TI_s - C)$ 在乘法算子 b 上取值为零。忠实性再说明这个取值作为 $A[b]$ 元素也为零，所以 b 整。

对有限扩张取 $M = B$ ，乘法作用同样忠实，便得到每个元素整。反过来，若 b_i 满足次数 n_i 的首一方程，则所有单项式

$$b_1^{e_1} \cdots b_r^{e_r}, \quad 0 \leq e_i < n_i,$$

生成整个 B ，因为可依次降低每个变量的指数。 $\square$

例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ 由 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 作为整数模生成。每个有限代数扩域都是整扩张；一般代数扩域也整，却未必有限。例如 $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ 包含任意大的有限子域，不是有限维扩张。

5.1.2 整性的传递性

命题 5.1.3 (整性的传递性). 若 $A \subseteq B \subseteq C$ ， B/A 和 C/B 都整，则 C/A 整。

证明. 对 $c \in C$ ，取其在 B 上的首一方程，设其中的有限个系数为 $b_1, \dots, b_r$ 。由命题 5.1.2， $B_0 = A[b_1, \dots, b_r]$ 是有限 A 模， $B_0[c]$ 是有限 B_0 模。若两层分别由 u_i 与 v_j 生成，则乘积 $u_i v_j$ 作为 A 模生成 $B_0[c]$ 。再次应用有限模判据，得到 c 在 A 上整。 $\square$

命题 5.1.4. 设 B/A 整。对理想 $J \subseteq B$ ，包含 $A/(J \cap A) \subseteq B/J$ 整；对 A 中的乘法集 S ，包含 $S^{-1}A \subseteq S^{-1}B$ 整。

证明. 商环中的首一方程由原方程逐项取像得到。局部化中，对 b/s 把 b 的次数为 n 的首一方程除以 s^n ，得到系数 $a_i/s^i \in S^{-1}A$ 的首一方程。局部化的包含仍是单射：若 a/s 在 $S^{-1}B$ 中为零，则某个 $t \in S$ 满足 $ta = 0$ ，该等式也在 A 中成立。 $\square$

这一命题允许把整性问题移到某个素理想附近，或移到某个闭集上。它不声称任意 B 中分母的局部化仍在 A 上整；例如把整数中的所有非零元素倒置便得到非整扩张 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ 。

5.1.3 整闭包与正规整环

命题 5.1.5. B 中所有在 A 上整的元素组成一个包含 A 的子环 $\overline{A}^B$ 。若 $c \in B$ 在此子环上整, 则 $c \in \overline{A}^B$ 。

证明. 若 x, y 整, 则 $A[x, y]$ 是有限 A 模, 其中的 $x + y$ 、 xy 、 $-x$ 均由命题 5.1.2 在 A 上整。这给出子环性。最后一项由命题 5.1.3 得到。□

定义 5.1.6. 子环 $\overline{A}^B$ 称为 A 在 B 中的**整闭包** (integral closure)。若它等于 A , 称 A 在 B 中整闭。整环 A 若在其分式域 $\text{Frac}(A)$ 中整闭, 称为**整闭整环** (integrally closed domain), 也称**正规整环** (normal domain)。

本章的正规整环不把 Noether 性包含在定义中。整闭性必须带有环境: $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中整闭, 却不在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中整闭。

命题 5.1.7. 唯一分解整环是整闭整环。整闭整环关于不含零的乘法集的局部化仍是整闭整环。

证明. 设 A 是唯一分解整环, a/b 为互素分子分母表示。若它满足次数 n 的首一方程, 乘以 b^n 得 $b \mid a^n$ 。唯一分解及互素性迫使 b 为单位, 故 $a/b \in A$ 。

设 A 整闭, $0 \notin S$, $z \in \text{Frac}(A)$ 在 $S^{-1}A$ 上整。把其方程的有限个系数通分为 a_i/s , 其中 $s \in S$ 。令 $w = sz$, 乘原方程以 s^n , 得

$$w^n + a_1 w^{n-1} + a_2 s w^{n-2} + \cdots + a_n s^{n-1} = 0.$$

于是 $w \in A$, 从而 $z = w/s \in S^{-1}A$ 。□

特别地, 域上的多项式环是整闭整环。相反, $A = k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$ 的分式域含有 $t = t^3/t^2$, 而 t 满足 $T^2 - t^2 = 0$ 却不在 A 中, 因为 A 的每个多项式的一次项系数为零。这是后面正规化计算的基本例子。

5.2 素理想的提升

环包含 $A \subseteq B$ 给出素谱上的收缩映射 $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A$ 。整性对这个映射有三项具体约束: 每个底层素理想都有原像, 同一个原像纤维中没有严格包含的素理想链, 而且底层向上的链可以从指定的起点提升。

5.2.1 Lying-over 定理

引理 5.2.1. 若整环包含 $D \subseteq E$ 是整扩张, 则 D 是域当且仅当 E 是域。

证明. 若 D 是域, 对非零 $e \in E$ 取最低次数的首一方程。其常数项非零, 否则可在整环中约去 e 而降次。把方程除以 e , 再除以非零常数项, 可把 e^{-1} 写成 e 的多项式, 故 E 是域。

若 E 是域, 对 $0 \neq d \in D$, $d^{-1} \in E$ 整。把它的次数 n 的首一方程乘以 d^{n-1} , 得 $d^{-1} \in D$ 。所以 D 是域。□

整扩张中的素理想 $\mathfrak{q}$ 因而满足: $\mathfrak{q}$ 极大当且仅当其收缩 $\mathfrak{p}$ 极大。这里应把引理用于整环包含 $A/\mathfrak{p} \subseteq B/\mathfrak{q}$, 不是直接假定原环为整环。

定理 5.2.2 (Lying-over). 若 $A \subseteq B$ 整, 则对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, 存在 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ 满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 。这一结论称为 **Lying-over 定理** (lying-over theorem)。

证明. 取 $S = A \setminus \mathfrak{p}$ 。命题 5.1.4 给出整包含 $A_{\mathfrak{p}} \subseteq S^{-1}B$, 后者非零, 故有极大理想 $\mathfrak{n}$ 。由引理 5.2.1, $\mathfrak{n} \cap A_{\mathfrak{p}}$ 极大, 只能等于局部环的唯一极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 。局部化素理想对应定理 1.4.3 将 $\mathfrak{n}$ 收缩为 B 中不交 S 的素理想 $\mathfrak{q}$, 其在 A 中的收缩正是 $\mathfrak{p}$ 。□

包含是必要条件。若只给一个不单射的整同态 $A \rightarrow B$, 像是 $\text{Spec } A$ 中包含同态核的闭集; 应对 $A/\ker \rightarrow B$ 应用定理。

5.2.2 Incomparability 定理

定理 5.2.3 (Incomparability). 设 $A \subseteq B$ 整, $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$ 是 B 的素理想。若二者在 A 中的收缩都为 $\mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。这称为 **Incomparability 定理** (incomparability theorem)。

证明. 先模掉 $\mathfrak{q}$, 再把 $A/\mathfrak{p}$ 的全部非零元素倒置, 得到在域 $\text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 上整的整环

$$C = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}(B/\mathfrak{q}).$$

由引理 5.2.1, C 是域。 $\mathfrak{q}'/\mathfrak{q}$ 不交这些分母, 故对应于 C 的一个素理想, 只能是零。局部化在整环 $B/\mathfrak{q}$ 上是单射, 因而 $\mathfrak{q}'/\mathfrak{q} = 0$ 。□

定理并没有断言一个素理想只能提升一次。例如 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[i]$ 中, $(2+i)$ 与 $(2-i)$ 都收缩到 (5) , 二者不同且互不包含。收缩到 (5) 可由商环分别同构于 $\mathbb{F}_5$ 、其中 i 分别取 -2 与 2 来检验。

5.2.3 Going-up 定理

定理 5.2.4 (Going-up). 设 $A \subseteq B$ 整, $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$ 是 A 的素理想, 且 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 。存在 $\mathfrak{q}' \supseteq \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$ 。这称为 **Going-up 定理** (going-up theorem)。

证明. 商包含 $A/\mathfrak{p} \subseteq B/\mathfrak{q}$ 整。在此包含上对素理想 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$ 应用定理 5.2.2, 得到 $B/\mathfrak{q}$ 的素理想 $\mathfrak{r}$, 其收缩为 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$ 。 $\mathfrak{r}$ 在 B 中的原像就是所求 $\mathfrak{q}'$ 。□

从任意指定的底层原像出发, 重复使用此定理, 就能提升一个有限的上升素理想链。反向收缩一个严格链时, 定理 5.2.3 保证严格性不会丢失。这两点将在维数理论中比较整扩张两端的链长; 目前它们只涉及素理想及包含, 不需要预先使用维数公式。

命题 5.2.5. 整包含诱导的映射 $\pi: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 满射且为闭映射。更精确地, 对理想 $J \subseteq B$,

$$\pi(V_B(J)) = V_A(J \cap A).$$

证明. 左侧的每个素理想显然包含 $J \cap A$ 。反向, 对包含 $J \cap A$ 的素理想, 向整包含 $A/(J \cap A) \subseteq B/J$ 应用定理 5.2.2, 便得到包含 J 的原像。取 $J = 0$ 给出满射性。□

5.3 Going-down 定理

Going-up 从链的下端出发，向上寻找原像。若已经指定上端，能否反过来向下寻找？整性本身不足以保证这一点。本节在底环整闭、两端为整环的条件下证明肯定结论，并给出底环不整闭时失败的例子。

5.3.1 整闭基整环上的 Going-down 定理

定理 5.3.1 (Going-down). 设 $A \subseteq B$ 为整环的整扩张，且 A 在 $\text{Frac}(A)$ 中整闭。若

$$\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2, \quad \mathfrak{q}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2,$$

其中 $\mathfrak{p}_i \in \text{Spec } A$ 、 $\mathfrak{q}_2 \in \text{Spec } B$ ，则存在素理想 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$ ，使 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}_1$ 。这称为 **Going-down 定理** (going-down theorem)。

证明将使用整闭性控制最小多项式的系数。设 $K = \text{Frac}(A)$ ，则 B 的分式域是 K 的代数扩张： B 中每个元素代数，两个代数元素的商仍代数。这一观察保证下列最小多项式确实存在。

引理 5.3.2. 设 A 是整闭整环， $K = \text{Frac}(A)$ ， b 在一个扩域中且在 A 上整。则 b 在 K 上的首一最小多项式属于 $A[T]$ 。进一步，若 $A \subseteq B$ 为整环的整扩张， $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ ，而 $b \in \mathfrak{p}B$ ，则此最小多项式的首项以外的全部系数，都属于 $\mathfrak{p}$ 。

证明. 取 b 在 A 上的首一方程 $F(b) = 0$ 。其在 K 上的最小多项式 f 整除 F ，所以 f 在分裂域中的全部根都在 A 上整。把根按重数计入， f 的系数是这些根的初等对称多项式，由命题 5.1.5 也在 A 上整。系数原来属于 K ，整闭性便给出它们属于 A 。

再设 $b = \sum_{j=1}^r a_j c_j$ ，其中 $a_j \in \mathfrak{p}$ 、 $c_j \in B$ 。有限 A 代数 $M = A[c_1, \dots, c_r]$ 包含 b ，并满足 $bM \subseteq \mathfrak{p}M$ 。对有限组模生成元，乘 b 的表示矩阵各项均可取在 $\mathfrak{p}$ 中。定理 3.2.1 因而给出

$$b^m + d_1 b^{m-1} + \dots + d_m = 0, \quad d_i \in \mathfrak{p}^i.$$

其中 M 含有一，故算子等式确实推出环内等式。

取 f 的一个分裂域 L/K ，令 C 为 A 在 L 中的整闭包。由定理 5.2.2 取 $\mathfrak{P} \in \text{Spec } C$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上。 f 的每个根 β 都属于 C ，也满足刚得到的首一方程。模掉 $\mathfrak{P}$ 后有 $\beta^m = 0$ ，所以每个根都属于 $\mathfrak{P}$ 。 f 的首项以外系数作为这些根的对称多项式均属于 $\mathfrak{P}$ ，又属于 A ，从而属于 $\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$ 。此处即使有重根也成立。□

5.3.2 定理的证明与素理想链的应用

定理 5.3.1 的证明. 先证

$$\mathfrak{p}_1 B_{\mathfrak{q}_2} \cap A = \mathfrak{p}_1. \quad (5.1)$$

若 a 属于左侧而不在 $\mathfrak{p}_1$ ，清去有限个分母后有

$$sa \in \mathfrak{p}_1 B, \quad s \in B \setminus \mathfrak{q}_2.$$

在 $A_{\mathfrak{p}_1} \subseteq (A \setminus \mathfrak{p}_1)^{-1}B$ 中， a 可逆，故 $s \in \mathfrak{p}_1 (A \setminus \mathfrak{p}_1)^{-1}B$ 。由命题 5.1.7， $A_{\mathfrak{p}_1}$ 整闭；其分式域仍是 $K = \text{Frac}(A)$ 。将引理 5.3.2 用于此局部分化，得 s 在 K 上的首一最小多项

式的首项以外系数属于 $\mathfrak{p}_1 A_{\mathfrak{p}_1}$ 。同一引理用于原包含, 说明这些系数属于 A 。因此它们属于

$$A \cap \mathfrak{p}_1 A_{\mathfrak{p}_1} = \mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2.$$

把该方程模掉 $\mathfrak{q}_2$, 得到 $s^n = 0$, 于是 $s \in \mathfrak{q}_2$, 矛盾。这证明了(5.1)。

式(5.1)说明理想 $\mathfrak{p}_1 B_{\mathfrak{q}_2}$ 不交 $A \setminus \mathfrak{p}_1$ 。把这些元素再倒置, 所得理想仍为真理想, 故包含在某个极大理想中。将这个极大理想依次收缩到 $B_{\mathfrak{q}_2}$ 和 B , 得到素理想 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$ 。它包含 $\mathfrak{p}_1$, 且不交 $A \setminus \mathfrak{p}_1$, 故收缩恰为 $\mathfrak{p}_1$ 。□

若指定链的顶端 $\mathfrak{q}_r$, 重复向下应用定理, 就能把 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$ 提升为顶端为 $\mathfrak{q}_r$ 的严格链。严格性来自收缩理想不同。相反, 任意给定的 $\mathfrak{q}_r$ 以下严格链收缩后仍严格, 由定理 5.2.3 保证。因此在本定理假设下, $\mathfrak{q}_r$ 与其收缩以下的有限素理想链, 具有相同的可能最大长度; 若长度无界, 两边同时无界。

5.3.3 Going-down 定理的适用条件

下面给出一个显式失败情形。设 $\text{char } k \neq 2$, 在 $B = k[t, z]$ 内取

$$u = t^2 - 1, \quad v = t(t^2 - 1), \quad A = k[u, v, z].$$

因为 t 满足 $T^2 - (u + 1) = 0$, 且 $B = A[t]$, 故 B/A 有限整。令

$$\mathfrak{q}_+ = (t - 1, z), \quad \mathfrak{q}_- = (t + 1, z), \quad \mathfrak{r} = (z - t - 1).$$

$\mathfrak{q}_\pm$ 收缩为同一个极大理想 $\mathfrak{p}_2 = (u, v, z)$: 代入 $(t, z) = (1, 0)$ 或 $(-1, 0)$, A 上的取值都是把 u, v, z 送到零。令 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{r} \cap A$ 。由于 $\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{q}_-$, 有 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$; 此包含严格, 因为 $z \notin \mathfrak{r}$, 从而 $z \notin \mathfrak{p}_1$ 。

注意 $u \notin \mathfrak{p}_1$, 因为模掉 $\mathfrak{r}$ 后 $u = t^2 - 1$ 非零。倒置 u 后, $t = v/u$ 已属于 A_u , 所以 $A_u = B_u$ 。局部化素理想对应因而说明 $\mathfrak{p}_1$ 在 B 中只有一个原像 $\mathfrak{r}$: 任何原像都不含 u , 局部化后的原像唯一, 再收缩也唯一。但 $z - t - 1 \notin \mathfrak{q}_+$, 因为它在 $(1, 0)$ 取值 -2 。所以不存在位于 $\mathfrak{q}_+$ 以下、收缩为 $\mathfrak{p}_1$ 的素理想。

这里底环确实不整闭。元素 $t = v/u$ 属于其分式域且整, 却不属于 A : A 中的元素在 $(1, 0)$ 与 $(-1, 0)$ 取相同值, 而 t 的两个值不同。这个例子直接指出整闭性在定理中的作用, 不应把 Going-down 加在任意整扩张的性质清单里。

5.4 Noether 正规化

有限型代数通常由带关系的生成元给出。Noether 正规化要从中找出一组没有代数关系的元素, 使剩下的全部复杂性成为有限模扩张。这一构造既为维数提供坐标, 也为下一章的正规化有限性提供一个可控制的底环。

5.4.1 有限生成代数的整子多项式环

定理 5.4.1 (Noether 正规化). 设 k 为任意域, $A \neq 0$ 为有限型 k 代数。存在代数独立元素 $y_1, \dots, y_d \in A$, 使

$$k[y_1, \dots, y_d] \subseteq A$$

为有限扩张；这里允许 $d = 0$ ，此时底环为 k 。这称为 **Noether 正规化定理** (Noether normalization theorem)。

本定理不要求 A 是整环或约化环。例如 $k[x, \varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 在 $k[x]$ 上由 $1, \varepsilon$ 生成；幂零元由有限扩张承载，而 x 本身仍然代数独立。“Noether 正规化”是找整子多项式环；下一章把环换成其整闭包的“正规化”是另一构造。

5.4.2 有限基域与无限基域上的证明

定理 5.4.1 的证明. 写 $A = k[a_1, \dots, a_n]$ ，对生成元个数 n 归纳。 $n = 0$ 时 $A = k$ 。若 $a_1, \dots, a_n$ 代数独立，则已完成构造。否则存在非零多项式 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ ，使 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$ 。

选整数 N 大于 f 中出现的全部单个变量指数，对 $i < n$ 令 $m_i = N^i$ ，并作代换

$$X_i = Y_i + Y_n^{m_i} \quad (i < n), \quad X_n = Y_n.$$

原来指数为 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的单项式，在新的 Y_n 中产生最高次数

$$w(\alpha) = \alpha_n + \alpha_1 N + \dots + \alpha_{n-1} N^{n-1}.$$

由于每个指数小于 N ，不同的 α 有不同的 N 进制表示，从而这些次数互异。取其中最大的一个，其最高次 Y_n 项的系数恰为原单项式的非零系数；其他项不能抵消它。除此系数后，变换所得多项式作为 Y_n 的多项式首一，系数在 $k[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$ 中。

令 $b_i = a_i - a_n^{m_i}$ ，则刚才的关系说明 a_n 在 $C = k[b_1, \dots, b_{n-1}]$ 上整；又 $a_i = b_i + a_n^{m_i}$ ，所以 $A = C[a_n]$ 是有限 C 模。对至多由 $n-1$ 个元素生成的非零代数 C 应用归纳假设，得到一个多项式子环 $R = k[y_1, \dots, y_d]$ ，使 C/R 有限。将两层有限组模生成元相乘便知 A/R 有限，证明完成。□

加权代换对有限域和无限域同样有效。无限域上还有次数通常较低的做法：设 f 的最高齐次部分为 f_m 。非零多项式在无限域上不可能处处为零，因此可取

$$f_m(c_1, \dots, c_{n-1}, 1) \neq 0.$$

这里代入最后变量为一不会把非零齐次式变成零多项式：其余各变量的指数确定后，最后一个指数由总次数唯一确定。代换 $X_i = Y_i + c_i Y_n$ 即使 f 对 Y_n 首一。所用的非零多项式取值事实可对变量个数归纳：固定前面的变量使某个非零系数不消失，再避开最后一个变量的有限个根。

有限域上这一步不能照搬。例如 $X^q Y - X Y^q$ 是 $\mathbb{F}_q[X, Y]$ 中的非零齐次多项式，却在全部 $\mathbb{F}_q$ 有理方向上取零。上面的加权证明不需要寻找非零取值，因而避免了这个障碍。

5.4.3 代数独立与有限映射

若 A 是整环，正规化得到的 $R = k[y_1, \dots, y_d]$ 满足

$$k(y_1, \dots, y_d) \subseteq \text{Frac}(A)$$

为有限域扩张。事实上,把 R 的非零元素倒置后得到有限维整环 $A \otimes_R \text{Frac}(R)$, 由引理 5.2.1 它是域,因而就是 $\text{Frac}(A)$ 。所以 d 等于此分式域在 k 上的超越次数: y_i 代数独立,整个扩域在它们生成的有理函数域上代数。这里使用第一卷定义 14.3.1 的超越基判据及定理 14.3.6 的超越次数不变性;本卷后面的维数理论将把这个数与素理想链长度联系起来。

例 5.4.2. 在 $A = k[x, y]/(xy - 1)$ 中, A 不在 $k[x]$ 上有限,因为 $y = x^{-1}$ 不是在 $k[x]$ 上的整元素。取 $u = x + y$ 则不同:

$$x^2 - ux + 1 = 0, \quad y = u - x.$$

因此 $A = k[u][x]$ 由 $1, x$ 作为 $k[u]$ 模生成。 u 代数独立,因为在同构 $A = k[x, x^{-1}]$ 下,若次数 r 的非零多项式在 $x + x^{-1}$ 处取零,其最高 Laurent 次数 x^r 的系数却非零,矛盾。对尖点 $k[t^2, t^3]$, 直接取 $u = t^2$ 即得由 $1, t^3$ 生成的有限扩张。

定义 5.4.3. 若环同态 $R \rightarrow A$ 使 A 成为有限 R 模,称诱导的素谱映射为有限映射 (finite morphism)。本节只在仿射素谱之间使用这一术语。

于是 Noether 正规化给出从 $\text{Spec } A$ 到某个多项式环素谱的有限满射。有限性蕴含整性,满射性由定理 5.2.2 保证。其点集纤维也是有限集:对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, 纤维对应于

$$\text{Spec}(A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})).$$

该代数在剩余域上有限维,任意素理想都极大;不同的有限组极大理想两两互素,中国剩余定理给出的非零域商直积的维数不超过代数维数,因此极大理想总数也不超过这一维数。纤维对应可先把 $R \setminus \mathfrak{p}$ 倒置,再模掉 $\mathfrak{p}$, 逐次使用局部化及商环的素理想对应得到。有限映射仍可能把不同点合在一起,也可能有非约化纤维;有限性没有消除这些现象。

本章小结

首一方程使一个元素的高次幂落在有限个低次幂的线性生成空间中;行列式技巧给出反向推导。因此有限代数生成与各生成元的整性合起来,才得到有限模。整性可传递,所有整元素组成整闭包,但整闭性总要相对于指定的扩环或分式域来理解。

整扩张的素谱映射满射且闭,同一纤维中的素理想互不包含。Going-up 不要求整闭性;从指定顶端向下提升则需要本章 Going-down 版本中的整环及整闭假设。证明中整闭性的实际用途,是把最小多项式的系数留在底环内。

Noether 正规化把任意非零有限型域代数写成多项式子环上的有限扩张。加权代换在有限域上仍能找出唯一的最高幂,因而不依赖域中可供选择的点数。这个多项式子环将在正规化有限性、超越次数和维数的比较中反复使用。

习题

习题 5.1. 给 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 找一个整数系数的首一方程, 并给 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 找一组至多四个元素的模生成元。

解. 由 $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, 得到 $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$, 即 $\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$. 依此递降幂次, $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$ 生成 $\mathbb{Z}[\alpha]$. 这里不需要先证明这个四次多项式不可约. $\square$

习题 5.2. 设整数 $n > 1$. 证明 $\mathbb{Z}[1/n]$ 是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数, 却不是有限 $\mathbb{Z}$ 模。

解. 它由 $1/n$ 作为代数生成. 若为有限模, 命题 5.1.2 将使 $1/n$ 整, 设其首一方程次数为 r . 乘以 n^r 后有 $1 + a_1n + \cdots + a_rn^r = 0$, 从而 $n \mid 1$, 矛盾. $\square$

习题 5.3. 设 $A \subseteq B$, $u \in B$ 幂零. 证明 b 在 A 上整, 当且仅当 $b + u$ 在 A 上整。

解. 若首一 $f \in A[T]$ 满足 $f(b) = 0$, 则逐项展开得 $f(b + u) \in uB$. 取 $u^N = 0$, 便有 $f(b + u)^N = 0$, 而 $f(T)^N$ 仍首一, 所以 $b + u$ 整. 把 u 换成 $-u$ 得到反向结论. $\square$

习题 5.4. 证明一个整扩张是其有限子代数的有向并, 并用 $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ 说明整扩张不必有限。

解. 任取有限多个元素, 它们生成的子代数由命题 5.1.2 有限. 两组元素的并仍有限, 所以这些子代数有向, 且每个元素都属于其中一个. $\overline{\mathbb{F}_p}$ 中每个元素代数, 因而整; 若其维数为 d , 它就只有 p^d 个元素, 不可能同时含有每个有限域 $\mathbb{F}_{p^r}$, 故不有限. $\square$

习题 5.5. 设 A 为整环, L 为其分式域的扩域, C 为 A 在 L 中的整闭包, 且 $S \subseteq A \setminus \{0\}$ 乘法封闭. 证明 $S^{-1}C$ 是 $S^{-1}A$ 在 L 中的整闭包。

解. 局部化保持整性, 所以 $S^{-1}C$ 中的元素整. 反向, 若 z 满足 $S^{-1}A$ 上首一方程, 选公共分母 $s \in S$, 把各系数写成 a_i/s . 与命题 5.1.7 的第二段证明一样, sz 满足 $T^n + a_1T^{n-1} + a_2sT^{n-2} + \cdots + a_ns^{n-1}$, 故 $sz \in C$, 于是 $z \in S^{-1}C$. $\square$

习题 5.6. 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 不整闭, 并证明 $(1 + \sqrt{5})/2$ 所生成的环是有限 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 模。

解. $\omega = (1 + \sqrt{5})/2$ 满足 $\omega^2 - \omega - 1 = 0$, 属于原环的分式域, 却不写成 $a + b\sqrt{5}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, 因为 $1, \sqrt{5}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关. 又 $\sqrt{5} = 2\omega - 1$, 所以 $\mathbb{Z}[\omega]$ 包含原环, 并由 $1, \omega$ 在原环上生成. 这只证明一个有限的整扩环, 不在此宣称已算出全部整闭包. $\square$

习题 5.7. 设 k 代数闭, 求 $k[u] \subseteq k[t]$, $u = t^2$ 中位于 $(u - a)$ 上的全部素理想, 并区分 $\text{char } k = 2$ 的情形。

解. 原像由 $k[t]/(t^2 - a)$ 的素理想给出, 即 $(t - b)$, 其中 $b^2 = a$. 特征不为二且 $a \neq 0$ 时有两个不同根; $a = 0$ 时只有 (t) . 特征二时, 代数闭性给出一个平方根 b , 且 $t^2 - a = (t - b)^2$, 所以也只有一个素理想. 二重因子不产生第二个点, 却使商环含有幂零元. $\square$

习题 5.8. 证明若一个整包含的素谱收缩映射为双射, 则它是同胚. 说明双射之外还需要用到什么性质。

解. 环同态诱导的素谱映射连续, 因为闭集 $V_A(I)$ 的原像为 $V_B(IB)$ 。命题 5.2.5 进一步说明此映射闭。一个连续闭双射的逆映射连续: 逆像为原映射的像, 而原映射把闭集送到闭集。因此是同胚。单独连续双射并不提供这一闭性。□

习题 5.9. 在 $k[x] \subseteq k[x, y]$ 中给出严格包含而收缩相同的两个素理想, 并证明这个扩张不整。

解. $(0) \subsetneq (y)$ 都收缩到零, 两个商环分别为 $k[x, y]$ 和 $k[x]$, 所以确为素理想。若 y 在 $k[x]$ 上整, 就会满足关于独立变量 y 的首一方程, 和多项式表达唯一性矛盾。因此不能在这里应用定理 5.2.3。□

习题 5.10. 设 $A \subseteq B$ 有限, 且 B 可由 r 个元素作为 A 模生成。证明每个素理想 $\mathfrak{p}$ 上至多有 r 个素理想。

解. 纤维代数 $C = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的向量空间维数至多为 r 。其任意素商是在域上有限的整环, 由引理 5.2.1 为域, 所以每个素理想都极大。若有 $r+1$ 个不同素理想, 中国剩余定理给出 C 到 $r+1$ 个非零域的直积的满映射, 其目标维数至少为 $r+1$, 矛盾。局部化再取商的素理想对应将这些素理想识别为原映射的纤维。□

习题 5.11. 在第 5.3.3 小节反例中, 证明

$$\mathfrak{p}_1 = \left(u - z^2 + 2z, v - (z-1)u \right)_A.$$

据此再次核验 $\mathfrak{p}_1 \subsetneq (u, v, z)$ 。

解. 代入 $t = z-1$ 后, 两项都为零。模掉右侧理想, u, v 都成为 z 的多项式, 所以商环由 z 生成; 另一方面代入给出这个商环到 $k[z]$ 的映射, 其在 z 上恒等, 故商环恰为 $k[z]$, 核就是 $\mathfrak{r} \cap A$ 。两生成元都属于 (u, v, z) , 但 z 在商环 $k[z]$ 中非零, 因此包含严格。□

习题 5.12. 设 k 代数闭且特征不为二。在 $A = k[x, y] \subseteq B = k[s, t]$ 、 $x = s^2, y = t^2$ 中, 把链

$$(0) \subsetneq (x-1) \subsetneq (x-1, y-1)$$

提升为顶端指定为 $(s+1, t-1)$ 的链, 并解释 Going-down 的假设为何满足。

解. 可取 $(0) \subsetneq (s+1) \subsetneq (s+1, t-1)$ 。中间理想的商环为 $k[t]$, A 上的核恰为 $(x-1)$, 因为 $y \mapsto t^2$ 仍超越; 顶端的收缩直接取值得到。 A 是唯一分解整环, 按命题 5.1.7 整闭, 且 s, t 各满足一个首一二次方程, 故 B/A 整, 满足定理 5.3.1。□

习题 5.13. 对任意非零环 R 及次数 $n \geq 1$ 的首一多项式 $f \in R[T]$, 证明 $R[T]/(f)$ 是秩 n 的自由 R 模, 即使 R 有零因子也成立。

解. 首一除法使每个商类有次数小于 n 的代表, 给出 $1, \bar{T}, \dots, \bar{T}^{n-1}$ 的生成性。若低次多项式 g 属于 (f) , 写 $g = fh$ 。只要 $h \neq 0$, 因 f 首一, 最高项不会消失, $\deg(fh) = n + \deg h \geq n$, 矛盾。因此代表唯一, 这组元素线性无关。□

习题 5.14. 设 A 为整环。证明在 $\text{Frac}(A)$ 内,

$$A = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max } A} A_{\mathfrak{m}},$$

并据此证明 A 整闭当且仅当每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 整闭。

解. 若 $z \notin A$, 则 $J = \{a \in A \mid az \in A\}$ 是真理想, 取极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq J$ 。若 $z = c/s \in A_{\mathfrak{m}}$, 其中 $s \notin \mathfrak{m}$, 则 $sz = c \in A$, 即 $s \in J$, 矛盾。这证明交集等式。整闭性向局部化传递已由命题 5.1.7 证明; 反向, 若 z 在 A 上整, 它在每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 上整, 从而属于所有局部环, 交集等式给出 $z \in A$ 。□

习题 5.15. 在 $A = k[x, y]/(x^2 + y^3 - 1)$ 中, 分别给出多项式子环 $k[x]$ 与 $k[y]$ 上的有限模基, 并说明两个变量各自代数独立。

解. 把关系看成关于 y 的首一三次式, 习题 5.13 给出自由 $k[x]$ 模基 $1, y, y^2$, 同时说明 $k[x] \rightarrow A$ 单射。把关系看成关于 x 的首一二次式, 得到自由 $k[y]$ 模基 $1, x$, 并说明 $k[y] \rightarrow A$ 单射。单射正说明对应变量在 k 上超越。这不需要预先判定关系多项式是否不可约。□

习题 5.16. 令 $A = \mathbb{F}_2[x, y]/(x^2y - xy^2)$ 。作 $u = x - y^3, v = y$, 写出关于 v 的首一关系, 并证明 u 超越, 从而给出一个 Noether 正规化。

解. 在特征二中代入 $x = u + v^3, y = v$, 得到

$$v^7 + v^5 + u^2v + uv^2 = 0.$$

原变量替换是多项式环同构, 其逆为 $u = x - y^3, v = y$ 。因此 A 同构于以所列首一七次式为关系的 $\mathbb{F}_2[u, v]$ 商。由习题 5.13 的解答, 商是自由 $\mathbb{F}_2[u]$ 模, 基为 $1, v, \dots, v^6$, 故 $\mathbb{F}_2[u]$ 单射且扩张有限。□

习题 5.17. 证明 $k[x, x^{-1}]$ 不在 $k[x]$ 上有限, 却在 $k[x + x^{-1}]$ 上自由且秩为二。

解. 第一项由 $k[x]$ 整闭而 $x^{-1} \notin k[x]$, 结合有限扩张必整得到。令 $u = x + x^{-1}$, 关系 $x^2 - ux + 1 = 0$ 给出生成元 $1, x$ 。若 $P(u) + xQ(u) = 0$, 在有理函数域中用自同构 $x \mapsto x^{-1}$ 再写一次, 相减得 $(x - x^{-1})Q(u) = 0$ 。 $x - x^{-1} \neq 0$, 且 u 超越, 所以 $Q = 0$, 继而 $P = 0$ 。故所列生成元为基, 此论证也适用于特征二。□

习题 5.18. 设 $A = k[x, y]/(y^2 - x^3)$, 以 $k[x]$ 为底环。计算 $x = 0$ 与 $x = 1$ 的纤维代数, 比较其点数与约化性, 允许任意特征。

解. 两纤维分别为 $k[y]/(y^2)$ 与 $k[y]/(y^2 - 1)$ 。第一纤维总有一个素理想且非约化。第二纤维在特征不为二时由中国剩余定理同构于 $k \times k$, 有两个点且约化; 特征二时为 $k[y]/((y-1)^2)$, 只有一个点且非约化。两者作为 k 向量空间的维数始终为二。□

第六章 Hilbert 零点定理、正规化与导子理想

零点定理把代数闭域上的多项式零点集与根理想联系起来，正规化则补入同一有理函数环境中的整元素。本章先由 Zariski 引理证明弱零点定理，再用 Rabinowitsch 技巧得到强形式；随后建立正规化的对象，完整证明任意域上有限型代数的正规化有限性。尖点、结点及导子理想的计算，用来区分有限性、双有理性、点集纤维与局部环的变化。

本章目标

- 区分有限生成域扩张与有限型域代数，判断极大理想的剩余域。
- 从零点条件得到根理想成员关系，并写清 Rabinowitsch 技巧中的分母消去。
- 对整环、约化环和非约化环采用明确的正规化约定。
- 分开处理可分迹论证与正特征不可分扩张，理解有限系数的作用。
- 计算曲线正规化、导子及商模，避免把点数、环同构和平坦性混为一谈。

本章前半使用 Noether 正规化、极大理想与根理想；后半还用到有限模的 Noether 性，以及第一卷的可分扩张、迹配对和纯不可分扩张。读者可先完成零点定理，再跟算第 6.4 节中的两条曲线，随后读一般有限性的证明。两条曲线的计算自成证明，不依赖先接受后面的定理。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, §5, Theorems 5.3–5.4, pp. 33–34] 可用于对照零点定理和 Rabinowitsch 技巧；正规化有限性的论证见该书 [2, §33, Integral closure of a Noetherian integral domain, pp. 261–263]。本章把其中的不可分扩张处理和有限分支推广单独展开，逐项说明所需条件。

6.1 Zariski 引理

把一个有限型代数模掉极大理想，得到的剩余域依然由有限个元素作为代数生成。域的倒数运算与代数生成元的有限性相互约束，结果是这种剩余域只能是基域的有限代数扩张。Noether 正规化使这一事实有一个简洁证明。

6.1.1 作为域的有限生成代数

引理 6.1.1 (Zariski). 设 L 是域且作为 k 代数有限生成，则 $[L : k] < \infty$ 。这一结论称为 **Zariski 引理 (Zariski's lemma)**。

证明. 由定理 5.4.1, 存在多项式子环 $R = k[y_1, \dots, y_d] \subseteq L$, 使 L/R 有限, 因而整。因为 L 是域, 引理 5.2.1 迫使 R 也是域。若 $d > 0$, 变量 y_1 在多项式环中非零且不可逆, 矛盾。因此 $d = 0$, $R = k$, 而正规化结论正说明 L 是有限 k 模, 即有限维 k 向量空间。□

“作为代数有限生成”不能换成“作为域有限生成”。例如 $k(t)$ 由一个元素作为域生成, 但不是有限型 k 代数, 否则引理将迫使超越元 t 在 k 上代数。反方向, 有限代数扩张选一个有限的向量空间基即可作为代数生成集, 所以引理也刻画了哪些域是有限型 k 代数。

6.1.2 极大理想的剩余域

推论 6.1.2. 若 A 为有限型 k 代数、 $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, 则 $A/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限扩张。一般素理想 $\mathfrak{p}$ 的剩余域 $\kappa(\mathfrak{p}) = \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 则只必然是有限生成的域扩张。

证明. $A/\mathfrak{m}$ 是域, 同时是 A 的有限型代数商, 应用引理 6.1.1 即可。对一般素理想, $A/\mathfrak{p}$ 的有限组代数生成元也作为域生成元生成其分式域, 但此时已经允许把任意非零多项式倒置, 不能继续应用 Zariski 引理。□

例如 $k[x, y]$ 的极大理想若取 (x, y) , 剩余域为 k ; 素理想 (x) 的剩余域却是 $k(y)$ 。闭点和一般点的差别, 在这里反映为剩余域的代数性与超越性。

6.1.3 代数闭域假设的作用

若 k 代数闭, 它没有非平凡有限代数扩张: 有限扩张中的每个元素有 k 上的不可约最小多项式, 而代数闭性迫使该多项式为一次。因此推论 6.1.2 给出

$$A/\mathfrak{m} = k$$

的典范 k 代数同构。这里的等号意为结构映射 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 为同构, 而不是选定某个任意的抽象域同构。

基域不代数闭时, 有限剩余域扩张必须保留。例如 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$, 对应一个实多项式环的极大理想, 却不对应实数轴上的点; $\mathbb{F}_q[x]$ 的次数 r 的首一不可约多项式给出剩余域 $\mathbb{F}_{q^r}$ 。下一节正是把代数闭性用在排除这些额外的剩余域上。

6.2 弱零点定理

在代数闭域上, 极大理想可以由坐标值完整描述。对 $a = (a_1, \dots, a_n) \in k^n$, 取值映射 $\text{ev}_a: k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow k$ 的核为 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$: 逐个变量减去其坐标值可把任意多项式写成常数 $f(a)$ 加上这些线性多项式的倍数之和。因此每个点都给出极大理想。零点定理说明代数闭域上没有遗漏。

6.2.1 代数闭域上的极大理想

定理 6.2.1 (Hilbert 弱零点定理). 设 k 是代数闭域。 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个极大理想唯一写成

$$\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n), \quad a \in k^n.$$

这称为弱零点定理 (weak Nullstellensatz)。

证明. 对极大理想 $\mathfrak{m}$, 由推论 6.1.2 及代数闭性, 结构映射 $k \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$ 是同构. 令 $a_i \in k$ 为 x_i 在商域中的像, 则 $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$, 故 $\mathfrak{m}_a \subseteq \mathfrak{m}$. 二者都极大, 只能相等. 若 $\mathfrak{m}_a = \mathfrak{m}_b$, 将 $x_i - a_i$ 在 b 处取值, 得到 $b_i = a_i$, 所以点唯一. $\square$

6.2.2 公共零点的存在判据

对理想 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, 记

$$Z_k(I) = \left\{ a \in k^n \mid f(a) = 0 \text{ 对每个 } f \in I \right\}.$$

这与素谱中的 $V(I)$ 需要区别: $Z_k(I)$ 只记录 k 坐标点, 而 $V(I)$ 包含所有含 I 的素理想. 在代数闭域上, 二者的闭点由弱零点定理对应起来。

推论 6.2.2. 设 k 代数闭. 理想 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 是真理想, 当且仅当 $Z_k(I) \neq \emptyset$. 因此有限组多项式 $f_1, \dots, f_r$ 没有公共零点, 当且仅当存在多项式 $g_1, \dots, g_r$ 满足

$$g_1 f_1 + \dots + g_r f_r = 1.$$

证明. 真理想包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}_a$ 中; 由定理 6.2.1, 这个 a 就是公共零点. 反过来, 若 a 为公共零点, 则 $I \subseteq \ker \text{ev}_a$, 所以 $1 \notin I$. 最后对 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 使用理想生成的定义即可. $\square$

例如 $xy - 1$ 和 x 没有公共零点, 等式 $yx - (xy - 1) = 1$ 就是可以直接核验的证据. 零点定理保证任何无公共零点的有限系统都有这样的代数组合; 它本身没有给出这些系数的次数上界. 第一卷附录 F.3 的 Gröbner 基算法可在有精确运算的系数域上寻找理想成员证据。

6.2.3 非代数闭域上的对照

$(x^2 + 1) \subseteq \mathbb{R}[x]$ 是真理想, 却没有实零点. 有限域上的差别甚至会出现零理想的零点理想中: 多项式 $x^q - x$ 在全部 $\mathbb{F}_q$ 元素上取零, 本身却不是零多项式. 这些例子分别说明公共零点存在性及从点集恢复多项式关系, 都依赖所使用的基域。

不过任何域上的真理想, 在代数闭包中都有公共零点. 对真理想 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, 选择极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq I$, 其剩余域 L 由推论 6.1.2 是有限代数扩张. 把 L 嵌入一个固定代数闭包 $\bar{k}$, 变量的像给出所求点. 这里有限扩域嵌入代数闭包, 可按有限组代数生成元逐次选择最小多项式的根完成; 不要求 L/k 可分。

若只研究实点或有限域上的有理点, 就应当保留相应基域的额外关系, 而不能把代数闭域版本原样照用. 本卷后续的实代数补充也将据此区分不同的零点定理。

6.3 强零点定理

弱形式只判断方程组是否有解。强形式进一步回答：已知全部解之后，究竟能恢复哪些多项式关系？一个多项式与它的正整数次幂有相同零点，因此期望恢复原理想通常过强；正确对象是根理想。本节除特别说明外， k 始终为代数闭域。

6.3.1 根理想与零点集的对应

对 $X \subseteq k^n$ ，定义它的**零点理想** (vanishing ideal)

$$I(X) = \{ f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f(a) = 0 \text{ 对每个 } a \in X \}.$$

这是根理想，因为 $f(a)^r = 0$ 在域中推出 $f(a) = 0$ 。空集零点理想按全称命题约定为整个多项式环。

定理 6.3.1 (Hilbert 强零点定理). 对任意理想 $J \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$,

$$I(Z_k(J)) = \sqrt{J}.$$

这称为**强零点定理** (strong Nullstellensatz)。因此根理想与形如 $Z_k(J)$ 的代数集，分别经 Z_k 与 I 构成反向包含的一一对应。

例如 (x^2, y) 和 (x, y) 在 k^2 中都只给出原点；从这个点集恢复的是根理想 (x, y) 。商环 $k[x, y]/(x^2, y)$ 中保留的非零幂零元，无法由普通点集上的取值看到。下一小节证明等式，再核对对应关系。

6.3.2 Rabinowitsch 技巧

把“不等于零”的条件写成“存在倒数”，是从弱形式过渡到强形式的关键。对 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ ，再加变量 T ，方程 $Tf - 1 = 0$ 正是要求 f 的值可逆。这个方法称为**Rabinowitsch 技巧** (Rabinowitsch trick)。

定理 6.3.1 的证明. 若 $f^r \in J$ ，则在 $Z_k(J)$ 的每个点都有 $f(a)^r = 0$ ，从而 $f(a) = 0$ 。因此 $\sqrt{J} \subseteq I(Z_k(J))$ 。

反向，取在 $Z_k(J)$ 上恒为零的多项式 f 。当 $f = 0$ 时结论直接成立，以下设 $f \neq 0$ 。在 $k[x_1, \dots, x_n, T]$ 中考虑

$$J' = J k[x_1, \dots, x_n, T] + (1 - Tf).$$

若 (a, t) 为其零点，则 $a \in Z_k(J)$ ，所以 $f(a) = 0$ ，但又要求 $1 - tf(a) = 0$ ，矛盾。由推论 6.2.2， J' 是单位理想。因此存在有限个 $h_i \in J$ 及多项式 $g_i(x, T), g(x, T)$ ，使

$$1 = \sum_{i=1}^r g_i(x, T) h_i(x) + g(x, T)(1 - Tf).$$

在局部化 $k[x_1, \dots, x_n]_f$ 中代入 $T = 1/f$ ，得到 $1 = \sum_i g_i(x, 1/f) h_i(x)$ 。取整数 N 至少为所有 g_i 关于 T 的次数，把等式乘以 f^N ，便得到

$$f^N = \sum_i H_i(x) h_i(x) \in J.$$

若所得 $N = 0$, 已有 $1 \in J$, 也可取正指数。故 $f \in \sqrt{J}$, 等式成立。

两种运算都反向包含。刚证明对根理想 J 有 $I(Z_k(J)) = J$ 。对代数集 $X = Z_k(J)$, 一方面 $J \subseteq I(X)$ 给出 $Z_k(I(X)) \subseteq X$; 另一方面每个 $a \in X$ 按定义使 $I(X)$ 中全部多项式为零, 得到反向包含。于是两种运算在所述对象上互逆。□

6.3.3 几何与代数的反变关系

定义 6.3.2. 对代数集 $X \subseteq k^n$, 商环

$$k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$$

称为其**坐标环** (coordinate ring)。其中一个元素就是多项式在 X 上给出的函数; 两个多项式给出同一函数, 当且仅当它们之差属于 $I(X)$ 。

若 $X \subseteq Y$, 限制函数给出满同态 $k[Y] \rightarrow k[X]$, 其核是 $I(X)/I(Y)$ 。包含方向在这里反了过来。更一般地, 若一个映射

$$\varphi: X \rightarrow Y, \quad a \mapsto (f_1(a), \dots, f_m(a))$$

由多项式坐标给出, 则代入给出同态

$$\varphi^*: k[Y] \rightarrow k[X], \quad [g] \mapsto [g(f_1, \dots, f_m)].$$

若 g 在 Y 上为零, 复合后在 X 上也为零, 所以此同态良定义。直接代入又给出 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$ 。下一章将以这些已建立的对象为基础, 系统证明映射与同态的对应, 而不再从图形直觉猜测箭头方向。

6.4 正规化

同一个有理函数域可能包含不同的坐标环。尖点的 $k[t^2, t^3]$ 与直线的 $k[t]$ 就有相同分式域, 但前者漏掉了一个已经满足首一方程的函数 t 。正规化把这样的整元素一并加入。它改变的是环; 点集是否改变、扩张是否有限, 需要分别核验。

6.4.1 整环、约化环与正规化的定义

定义 6.4.1. 若 A 是整环, 它在 $\text{Frac}(A)$ 中的整闭包 $\tilde{A}$ 称为 A 的**正规化** (normalization)。若 A 是约化环, 令 S 为其全部非零因子的集合, 定义**总分式环** (total ring of fractions) $Q(A) = S^{-1}A$, 并把 A 在 $Q(A)$ 中的整闭包称为其正规化。对于非约化环, 本书先取 $A_{\text{red}} = A/\sqrt{0}$, 再正规化 A_{red} , 不将幂零元保留在正规化对象中。

非零因子乘法封闭, 而且 $A \rightarrow Q(A)$ 单射: $a/1 = 0$ 意味着某个非零因子 s 满足 $sa = 0$, 从而 $a = 0$ 。当 A 是整环时, 定义退回普通分式域, 因此两种定义一致。正规化始终是整扩张, 但尚不能只凭定义断言它是有限模。

对约化 Noether 环, 极小素理想只有有限多个, 并有

$$Q(A) \cong \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Min}(A)} \text{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

这一分支描述将在命题 6.5.4 完整证明；目前的定义不以该描述为前提。它预示正规化可能把相交的分支分开，但对于一个整环，总分式环和正规化仍然是整环中的对象，不会凭空分成直积。

6.4.2 非有限正规化的例子

例 6.4.2. 取无限次代数扩域 K/k ，例如 $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ ，并令

$$A = k + xK[x] \subseteq B = K[x].$$

则 $\text{Frac}(A) = K(x)$ ，正规化为 B ，但 B 不是有限 A 模；此处 A 不是 Noether 环。

证明. 对每个 $c \in K$ ，有 $c = (cx)/x \in \text{Frac}(A)$ ，故分式域为 $K(x)$ 。 K 中每个元素在 k 上代数，因而在 A 上整；而 B 由 A 与这些常数生成，所以命题 5.1.5 说明 B/A 整。又 $B = K[x]$ 是唯一分解整环，按命题 5.1.7 在 $K(x)$ 中整闭。任何在 A 上整的 $z \in K(x)$ 也在 B 上整，所以属于 B 。这就证明了正规化等于 B 。

若 B 是有限 A 模，模掉同时为 A, B 理想的 $xK[x]$ ，就会得到 $K = B/xK[x]$ 是有限维 $A/xK[x] = k$ 向量空间，与 $[K : k] = \infty$ 矛盾。最后，理想 $\mathfrak{m} = xK[x]$ 满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong K$ ，其上 A 的作用经 k 因子化；若 $\mathfrak{m}$ 有限生成，此商将是有限维 k 空间，仍矛盾。因此 A 确实不是 Noether 环。□

这个例子说明没有额外条件时正规化未必有限；其底环是非 Noether 环。域上有限型代数拥有更强的结构；定理 6.5.5 将证明这一范围内的正规化有限，任意基域都允许。

6.4.3 尖点与结点曲线的正规化

命题 6.4.3. 对任意域 k ，映射 $x \mapsto t^2, y \mapsto t^3$ 给出同构

$$k[x, y]/(y^2 - x^3) \cong k[t^2, t^3].$$

此整环的分式域是 $k(t)$ ，正规化为 $k[t]$ ，并且 $k[t]$ 由 $1, t$ 作为 $k[t^2, t^3]$ 模生成。

证明. 按首一多项式 $y^2 - x^3$ 除法，每个商类有代表 $P(x) + yQ(x)$ 。代入后为 $P(t^2) + t^3Q(t^2)$ ，前一项只含偶次幂，后一项只含不小于三的奇次幂，故等于零恰好要求 $P = Q = 0$ 。因此核就是所列主理想，像按定义为 $k[t^2, t^3]$ 。

元素 $t = t^3/t^2$ 在分式域中，且满足 $T^2 - t^2 = 0$ ，所以 $k[t] = A + At$ 在 $A = k[t^2, t^3]$ 上有限整。 $k[t]$ 在 $k(t)$ 中整闭，任何在 A 上整的分式也在 $k[t]$ 上整，因而属于 $k[t]$ 。于是它正是整闭包。□

命题 6.4.4. 设 $\text{char } k \neq 2$ 。映射

$$x \mapsto t^2 - 1, \quad y \mapsto t(t^2 - 1)$$

给出同构

$$k[x, y]/(y^2 - x^2(x + 1)) \cong A = k[t^2 - 1, t(t^2 - 1)].$$

其分式域为 $k(t)$ ，正规化为 $B = k[t]$ ，且 $B = A + At$ 。这称为本章的结点模型。

证明. 模掉关于 y 的首一关系后, 每个商类写为 $P(x) + yQ(x)$ 。像为

$$P(t^2 - 1) + t(t^2 - 1)Q(t^2 - 1).$$

第一项只含偶次幂, 第二项只含奇次幂。两者之和为零时分别为零; 由于 $t^2 - 1$ 在 $k[t]$ 中超越且非零, 得到 $P = Q = 0$ 。这证明核的断言。分式 $y/x = t$ 给出分式域相等, 方程 $t^2 = x + 1$ 给出有限模生成式, 最后由 $k[t]$ 的整闭性判定它就是正规化。□

特征不为二用于保证 $t = 1$ 与 $t = -1$ 是两个不同点; 上面的核及整闭包计算本身不需除以二。原点在结点正规化中有两个原像, 在尖点正规化中只有一个。两种情形将在导子理想计算时进一步比较, 不能只用“增加了参数 t ”就判定它们的几何行为相同。

6.4.4 整闭包、有限性与双有理性

对整环包含 $A \subseteq B$, 如果诱导的分式域映射是同构, 就称其为**双有理扩张** (birational extension); 相应的仿射映射称为双有理。正规化按定义双有理且整, 但有限性是额外结论。例如前面的非 Noether 例仍双有理而不可有限。

反过来, 有限整扩张不必双有理: $k[t^2] \subseteq k[t]$ 虽然由 $1, t$ 生成, 却诱导二次分式域扩张 $k(t)/k(t^2)$ 。即使特征为二、底层点集可能不能区分平方根, 这个域扩张仍有次数二。双有理也不意味着有限, 例如 $k[t] \subseteq k[t, t^{-1}]$ 分式域相同, 却把零点处的分母倒置; t^{-1} 不在整闭环 $k[t]$ 上整, 所以此扩张不有限。

尖点与结点的有限性在命题 6.4.3 及命题 6.4.4 中已由两项模生成式直接证明。下面的一般定理将覆盖它们, 但这些算例的论证没有提前使用该定理。

6.4.5 Nagata 性、卓越性与正规化的有限性

有限型假设将在下一节的证明中两次起作用: 先选有限个正规化参数, 再控制有限代数扩域所用的有限个系数。只知道一个环是 Noether 环, 并不能按同一路证明自动补出这两项数据。因此本章不会把有限型结论无条件外推为“一切 Noether 整环的正规化都有限”。

后续资料中常见的 **Nagata 环** (Nagata ring), 按一种标准定义, 是满足下列条件的 Noether 环 A : 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, 以及 $\text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 的每个有限域扩张 L , $A/\mathfrak{p}$ 在 L 中的整闭包都是有限模。这个条件明确把所需有限性写进了适用范围。**卓越环** (excellent ring) 还包含关于形式纤维、维数链及正则性的条件, 本节不以这个术语调用任何尚未证明的结果; 其定义和一般理论留给本卷附录的补充。当前证明只需要并将直接建立域上有限型代数的结论。

6.5 正规化有限性的证明

上一节定义了正规化, 并在曲线中找到了有限个新生成元。一般有限型代数是否也只需添有限个元素, 不能由定义直接得出。本节的关键是控制整元素的分子: 可分

扩张中用迹配对, 不可分扩张中先进行一个只涉及有限个系数的纯不可分变基。整个论证允许基域不完美。这一有限性论证可对照 [2, §33, Integral closure of a Noetherian integral domain, pp. 261–263]; 下文把其中的不可分变基与分支处理分别展开。

6.5.1 由 Noether 正规化归约整闭包问题

设 C 为域 k 上的有限型整环。由定理 5.4.1, 存在代数独立的 $x_1, \dots, x_d \in C$, 使

$$A = k[x_1, \dots, x_d] \subseteq C$$

为有限扩张。记 $K = \text{Frac}(A)$ 、 $L = \text{Frac}(C)$ 。 C 的有限组代数生成元在 K 上代数, 且生成 L , 因此 $[L : K] < \infty$ 。

更一般地, 若 L'/L 是任意有限域扩张, 则 C 在 L' 中的整闭包等于 A 在 L' 中的整闭包。一个方向由 $A \subseteq C$ 直接得到; 另一个方向用 C/A 整和命题 5.1.3。所以只须证明: 多项式环 A 在任意有限分式域扩张中的整闭包是有限 A 模。若这一步完成, 有限组 A 模生成元也生成同一个 C 模, 因为 $A \subseteq C$ 。

6.5.2 可分扩张中的迹配对与公共分母

引理 6.5.1. 设 A 为整闭 Noether 整环, $K = \text{Frac}(A)$, L/K 为有限可分扩张。则 A 在 L 中的整闭包 B 是有限 A 模。

证明. 先取一组 K 基 $v_1, \dots, v_n$; 乘以适当的非零 A 元素, 可使各基元素对 A 整。确切地, 若

$$v_i^m + c_1 v_i^{m-1} + \dots + c_m = 0, \quad c_j \in K,$$

选非零 $d_i \in A$ 清除全部 c_j 的分母, 则 $u_i = d_i v_i$ 满足首一方程

$$u_i^m + d_i c_1 u_i^{m-1} + \dots + d_i^m c_m = 0$$

且其系数均在 A 内。缩放后 $u_1, \dots, u_n$ 仍为 K 基。

对任一整元素 $z \in L$, 域迹 $\text{Tr}_{L/K}(z)$ 属于 A 。事实上, 第一卷定理 18.2.3 把可分扩张的迹写成各 K 嵌入像之和; 每个像都满足 z 的同一个首一 A 系数方程, 故都对 A 整。它们的和也整, 而迹又属于 K , 由 A 整闭得此结论。

令

$$T = \left(\text{Tr}_{L/K}(u_i u_j) \right)_{1 \leq i, j \leq n}, \quad \Delta = \det T.$$

各 $u_i u_j$ 都整, 故 T 的条目在 A 中。第一卷定理 18.3.3 说明有限可分扩张的迹配对非退化, 所以 $\Delta \neq 0$ 。给定 $b \in B$, 写 $b = \sum_i \lambda_i u_i$ 、 $\lambda_i \in K$ 。各 bu_j 仍整, 于是

$$T(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T = \left(\text{Tr}_{L/K}(bu_1), \dots, \text{Tr}_{L/K}(bu_n) \right)^T \in A^n.$$

用伴随矩阵乘上式, 得每个 $\Delta \lambda_i \in A$ 。因此

$$B \subseteq \Delta^{-1} \sum_{i=1}^n A u_i. \quad (6.1)$$

右端是有限自由 A 模, 左端由命题 5.1.5 是一个 A 子模. 因 A 为 Noether 环, 有限模的子模有限, 故 B 有限. $\square$

这一步真正使用可分性的地方是 $\Delta \neq 0$. 在非平凡纯不可分扩张中, 域迹恒为零, 所有这样的迹矩阵都退化; 不能在此情形下仍写 Δ^{-1} . 下一小节通过有限变基把问题移到可以使用这个引理的地方.

6.5.3 正特征不可分扩张中的有限性引理

引理 6.5.2. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域, $K = k(x_1, \dots, x_d)$, L/K 为有限扩张. 在同一个代数闭包内, 可以选取 $q = p^e$ 、有限纯不可分扩张 k'/k 及元素 y_j 满足 $y_j^q = x_j$, 使

$$K' = k'(y_1, \dots, y_d), \quad L' = LK'$$

满足 L'/K' 有限可分. 并且 $A' = k'[y_1, \dots, y_d]$ 是多项式环, 是 $A = k[x_1, \dots, x_d]$ 上的有限模.

证明. 取有限组域生成元 $z_1, \dots, z_s$, 使 $L = K(z_1, \dots, z_s)$. 将每个首一不可约最小多项式写成

$$f_i(T) = g_i(T^{q_i}), \quad q_i = p^{e_i}, \quad g'_i(T) \neq 0.$$

这可以通过反复除去全部指数的公因子 p 实现. g_i 仍不可约, 否则代入 T^{q_i} 会分解 f_i ; 因而 g_i 可分.

取 $q = p^e$ 为所有 q_i 的公倍数. 将各 g_i 的有限多个系数写成 $x_1, \dots, x_d$ 的有理函数, 只涉及有限多个 k 中的分子、分母多项式系数, 设其集合为 E . 令

$$k' = k\left(c^{1/q} : c \in E\right), \quad y_j = x_j^{1/q}.$$

各次根在固定代数闭包中唯一, k'/k 有限纯不可分, 且 $(k')^q \subseteq k$. 因此 $y_1, \dots, y_d$ 在 k' 上代数独立: 若有非零多项式关系, 将其取 q 次幂便得到 $x_1, \dots, x_d$ 在 k 上的非零关系, 矛盾.

每个 g_i 的系数 $c \in K$ 都有 q_i 次根属于 K' . 要看到这一点, 只须将其分子和分母的每个系数取 q_i 次根, 并把每个 x_j 换为 y_j^{q/q_i} ; 这些系数的次根由已添入的 q 次根取适当幂得到. 写 $g_i(T) = \sum_j c_{ij} T^j$, 令

$$h_i(T) = \sum_j c_{ij}^{1/q_i} T^j \in K'[T].$$

则 $h_i(T)^{q_i} = f_i(T)$, 故 $h_i(z_i) = 0$. 而 h_i 可分: 若 w 同时零化 h_i 与 h'_i , 取 q_i 次幂后即得

$$g_i(w^{q_i}) = 0, \quad g'_i(w^{q_i}) = 0,$$

其中导数系数中的整数属于素域, 取 q_i 次幂后不变. 这与 g_i 可分矛盾. 因此各 z_i 在 K' 上可分, 其共同生成的 L'/K' 也是有限可分扩张.

最后取 k'/k 的有限基 $c_1, \dots, c_t$. 因为 $y_j^q = x_j$, A' 由有限组元素

$$c_l y_1^{a_1} \cdots y_d^{a_d}, \quad 1 \leq l \leq t, \quad 0 \leq a_j < q,$$

作为 A 模生成。 $d = 0$ 或所有 $q_i = 1$ 时, 上述构造分别采用空变量组或 $q = 1$, 同样成立。□

只取“实际用到的有限多个系数”的次根, 是这个引理中的有限性所在。任意不完美域的扩张 $k^{1/p}/k$ 可能无限, 因而直接把全部 p 次根都添进去, 反而会失去这里需要的有限模控制。

定理 6.5.3. 设 k 为任意域, $A = k[x_1, \dots, x_d]$, $K = \text{Frac}(A)$ 。对任意有限扩张 L/K , A 在 L 中的整闭包是有限 A 模。

证明. 多项式环 A 是 Noether 唯一分解整环, 因而由命题 5.1.7 整闭。若 L/K 可分, 直接应用引理 6.5.1。特征零的情形已全部包括在内。

在正特征中, 按引理 6.5.2 构造 A' 、 K' 、 L' 。 A' 也是整闭 Noether 多项式环, 而 L'/K' 可分, 所以 A' 在 L' 中的整闭包 B' 有限于 A' 。由于 A' 又有限于 A , B' 是有限 A 模。原来每个对 A 整的 $b \in L$ 也对 A' 整, 因此原整闭包 B 包含于 B' 。 B 是 A 子模, A 的 Noether 性于是保证 B 有限。这里既未假定 k 完美, 也未对不可分扩张使用非退化迹配对。□

6.5.4 约化代数的极小素分支与总分式环

整环只有一个分式域; 约化环可能有多个极小素分支, 故应在总分式环中同时处理各分支。下面先给出此前使用的乘积描述的证明。

命题 6.5.4. 设 $C \neq 0$ 为约化 Noether 环, 极小素理想为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$, $K_i = \text{Frac}(C/\mathfrak{p}_i)$ 。则自然映射给出同构

$$Q(C) \cong \prod_{i=1}^r K_i. \quad (6.2)$$

若 B_i 为 $C/\mathfrak{p}_i$ 在 K_i 中的整闭包, 则 C 在 $Q(C)$ 中的整闭包为 $\prod_i B_i$ 。

证明. 由命题 4.4.4 和定理 4.1.8, C 的非零因子组成

$$S = C \setminus \bigcup_i \mathfrak{p}_i.$$

约化性给出 $\bigcap_i \mathfrak{p}_i = 0$, 故 $C \rightarrow \prod_i K_i$ 单射。每个 $s \in S$ 在所有 K_i 中非零, 因此该映射延伸为单射 $Q(C) = S^{-1}C \rightarrow \prod_i K_i$ 。

为证明满射, 对每个 i 选

$$c_i \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i.$$

这样的 c_i 可由逐个取 $a_j \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$ 后相乘得到; $r = 1$ 时取 $c_1 = 1$ 。给定第 i 个域中的分式 $\bar{a}/\bar{b}$, 其中 $a, b \in C$ 、 $b \notin \mathfrak{p}_i$, 令

$$s = bc_i + \sum_{j \neq i} c_j.$$

它模 $\mathfrak{p}_i$ 等于非零的 bc_i , 模每个 $\mathfrak{p}_j$ 、 $j \neq i$ 等于非零的 c_j , 所以 $s \in S$ 。分式 ac_i/s 的第 i 个坐标就是 $\bar{a}/\bar{b}$, 其余坐标全零。逐坐标相加即可得到任意元组, 满射得证。

若 $b \in Q(C)$ 对 C 整, 投影它的首一方程可见每个坐标 b_i 属于 B_i 。反之, 若各 $b_i \in B_i$, 为每个 i 取一个零化 b_i 的首一 $(C/\mathfrak{p}_i)$ 系数多项式, 并把系数提升为首一 $f_i(T) \in C[T]$ 。对元组 $b = (b_i)_i$, 多项式 $\prod_i f_i(T)$ 在每个坐标上都有一个为零的因子 $f_i(b_i) = 0$, 故 $\prod_i f_i(b) = 0$ 。这个首一方程证明 b 对 C 整。 $\square$

特别地, 总分式环中的不同分支彼此独立, 正规化也逐分支进行。这里的有限个分支来自 Noether 性; 约化性则保证环嵌入这些分式域的乘积。若原环非约化, 本书按定义 6.4.1 的约定先取约化商, 再谈这一正规化。

6.5.5 正规化有限性定理的完整证明

定理 6.5.5. 设 k 为任意域。

1. 若 C 为有限型 k 整环, $L'/\text{Frac}(C)$ 为有限域扩张, 则 C 在 L' 中的整闭包是有限 C 模。特别地, C 的正规化有限。
2. 若 C 为约化有限型 k 代数, 则它在总分式环中的正规化是有限 C 模。

证明. 第一项取定理 5.4.1 给出的有限扩张 $A = k[x_1, \dots, x_d] \subseteq C$ 。第 6.5.1 小节已经核实验: $L'/\text{Frac}(A)$ 有限, 且 A 与 C 在 L' 中的整闭包相同。定理 6.5.3 保证此整闭包有限于 A , 故也有限于 C 。

第二项中, $C = 0$ 时结论直接成立。否则 C 是 Noether 环, 有有限个极小素理想 $\mathfrak{p}_i$ 。每个 $C/\mathfrak{p}_i$ 都是有限型 k 整环, 由第一项其正规化 B_i 为有限 $C/\mathfrak{p}_i$ 模, 从而也是有限 C 模。命题 6.5.4 把 C 的正规化识别为有限乘积 $\prod_i B_i$, 所以它仍是有限 C 模。 $\square$

这一定理保证下一节计算导子理想时所用的有限扩张确实存在。其假设是“域上的有限型代数”, 不能只保留“Noether 环”便照搬结论; 而可分性只属于证明的中间步骤, 并非最终定理对基域或分式域扩张的附加限制。

6.6 导子理想与曲线正规化的比较

正规化中哪些元素原来就能相乘而不离开旧环? 这个问题由导子理想回答。它既是旧环的理想, 也是新环的理想, 因此可以直接比较两侧的局部化与商模。本节继续使用尖点和结点的显式环, 不以一般奇点理论解释尚未计算的现象。

6.6.1 有限双有理扩张中的导子理想

定义 6.6.1. 对环包含 $A \subseteq B$, 定义**导子理想** (conductor ideal)

$$\mathfrak{c}_{B/A} = \{a \in A \mid aB \subseteq A\} = \text{Ann}_A(B/A).$$

本节主要考虑整环的有限双有理扩张。

命题 6.6.2. 导子理想是包含在 A 中的最大 B 理想, 因而同时为 A, B 的理想。若整环扩张 B/A 有限且双有理, 则存在非零 $d \in A$ 使 $dB \subseteq A$ 。对每个 $c \in \mathfrak{c}_{B/A}$, 都有 $A_c = B_c$ 。

证明. 若 $a \in \mathfrak{c}_{B/A}$ 、 $b \in B$, 则 $ab \in A$, 且 $(ab)B \subseteq aB \subseteq A$, 所以 ab 也在导子理想中. 任意 B 理想 $J \subseteq A$ 满足 $jB \subseteq J \subseteq A$, 故 $J \subseteq \mathfrak{c}_{B/A}$.

有限双有理情形选 B 的有限组 A 模生成元 $b_i = u_i/v_i$, 其中 $u_i, v_i \in A$ 、 $v_i \neq 0$. 令 $d = \prod_i v_i$, 便有 $db_i \in A$, 于是 $dB \subseteq A$ 且 $d \neq 0$. 最后对 $b \in B$, 有 $b = (cb)/c \in A_c$, 这证明 $B_c \subseteq A_c$, 反向包含由原包含得到. $\square$

对有限扩张, 差异还可以用支集精确表述:

$$\text{Supp}_A(B/A) = V_A(\mathfrak{c}_{B/A}).$$

这里 B/A 是有限模, 故定理 2.3.2 将其支集识别为零化子的零点集. 因而一个素理想 $\mathfrak{p}$ 不含导子理想, 当且仅当 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ 是同构; 这只是局部环比较, 不是光滑性判据.

6.6.2 尖点的导子理想与正规化商模

命题 6.6.3. 对 $A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$,

$$A = k \oplus t^2 k[t], \quad B/A \cong k \cdot [t], \quad \mathfrak{c}_{B/A} = t^2 k[t] = (t^2, t^3)_A.$$

其中 B/A 上 A 的作用经 $A/(t^2, t^3) \cong k$ 因子化.

证明. 所有不小于二的整数都由二和三作非负整数线性组合, 故 A 恰由没有一次项的多项式组成. 于是商空间由 $[t]$ 生成, 且 t^2, t^3 都零化它. 若 $a = c + t^2 h(t) \in A$, 则 $at = ct + t^3 h(t)$ 属于 A 当且仅当 $c = 0$. 由于 $B = A + At$, 条件 $aB \subseteq A$ 等价于 $at \in A$, 故导子为 $t^2 k[t]$. 最后任意次数至少四的单项式可除以 t^2 而仍属于 A , 再加上 t^2, t^3 两项, 得到其作为 A 理想的生成式. $\square$

导子只在尖点极大理想 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3)$ 处消失, 离开该点两环局部化相同. 该点上只有一个原像 $(t) \subseteq k[t]$, 但纤维代数是

$$B/\mathfrak{m}B = k[t]/(t^2),$$

并不是 k . 所以“只有一个原像点”仍会遗漏非约化纤维. 局部化后的差商 $B_{(t)}/A_{\mathfrak{m}}$ 仍为一维 k 空间; 这里两个局部化嵌在 $k(t)$ 中, 并且 $B \otimes_A A_{\mathfrak{m}} = B_{(t)}$. 后一个等式可由引理 5.2.1 与局部化素理想对应看出: 左环的极大理想收缩为 $A_{\mathfrak{m}}$ 的唯一极大理想, 因此左环也只有极大理想 (t) , 因而所有不属于 (t) 的多项式都成为单位.

6.6.3 结点正规化与奇点上的两个原像

命题 6.6.4. 设 $\text{char } k \neq 2$, 令

$$A = k[t^2 - 1, t(t^2 - 1)] \subseteq B = k[t].$$

则

$$A = k + (t^2 - 1)k[t] = \left\{ f \in k[t] \mid f(1) = f(-1) \right\},$$

并有

$$B/A \cong k, \quad \mathfrak{c}_{B/A} = (t^2 - 1)k[t] = (x, y)_A,$$

其中 $x = t^2 - 1$ 、 $y = t(t^2 - 1)$ 。原点的两个原像为 $(t - 1)$ 和 $(t + 1)$ 。

证明. 记 $h = t^2 - 1$ 。若 j 为偶数, 则 $ht^j = h(h + 1)^{j/2} \in k[h]$; 若 j 为奇数, 则 $ht^j = ht(h + 1)^{(j-1)/2} \in k[h, ht]$ 。故 $hB \subseteq A$, 而 A 的生成元都属于 $k + hB$, 得到第一项等号。

任意 $f \in k[t]$ 除以 h 的余式为 $a + bt$ 。条件 $f(1) = f(-1)$ 等价于 $2b = 0$, 由特征假设等价于 $b = 0$, 这证明第二项等号。线性映射 $f \mapsto f(1) - f(-1)$ 满射到 k , 核为 A , 所以 B/A 一维; A 的作用经公共值 $a(1) = a(-1)$ 给出。

因为 $hB \subseteq A$, 导子包含 hB 。若 a 在导子中, 则 $a \in A$ 且 $at \in A$, 从而 $a(1) = a(-1)$ 与 $a(1) = -a(-1)$ 同时成立。因二可逆, 二者均为零, 所以 $h \mid a$ 。这证明导子等于 hB 。前面对 ht^j 的表达又说明其作为 A 理想由 h, ht 生成, 即 (x, y) 。

最后 $(x, y)B = hB$, 而 $h = (t - 1)(t + 1)$ 有两个不同线性因子。商环及中国剩余定理给出

$$B/(x, y)B \cong k[t]/(t^2 - 1) \cong k \times k.$$

因此其两个素理想正给出所述两个原像。 $\square$

6.6.4 有限双有理映射的点集与局部环

尖点和结点的正规化都有限且双有理, 差商的 k 维数也都为一; 它们仍以不同方式改变特殊点。尖点只增加同一点附近缺失的函数, 结点则把同一个原点上的两种参数值分开。前者纤维为 $k[t]/(t^2)$, 后者纤维为 $k \times k$, 所以点的个数与纤维的幂零结构必须同时保留。

对结点令 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 、 $S = A \setminus \mathfrak{m}$ 。局部正规化

$$B \otimes_A A_{\mathfrak{m}} = S^{-1}k[t]$$

有两个极大理想, 分别来自 $(t - 1)$ 与 $(t + 1)$, 是一个半局部整环。它并不是两个局部环的直积: 左侧仍嵌在域 $k(t)$ 中, 而非零环的二项直积有零因子。再分别在这两个极大理想处局部化, 才得到

$$k[t]_{(t-1)}, \quad k[t]_{(t+1)}.$$

中国剩余分解出现在模掉 $\mathfrak{m}$ 的纤维中, 不能提前搬到整个局部正规化环上。

在两例中, 导子理想之外的局部化都是同构; 在特殊点, 有限性与双有理性则不足以决定平坦性和非分歧性。它们需要对模或微分再作独立检验, 留到第 23.4 节进行。本章没有把正规化称为这些更强性质的实例。

本章小结

有限型代数的极大理想有有限剩余域。代数闭域把这些剩余域压缩为基域本身, 于是闭点由坐标值表示; 强零点定理进一步说明, 普通零点集能恢复根理想, 不能恢复被幂零元记录的加厚信息。

正规化是在总分式环中取整闭包，非约化对象先取约化。域上有限型代数的有限性证明先借 Noether 正规化得到多项式底环：可分部分由非退化迹配对控制公共分母，不可分部分则只添有限多个系数的根及有限个参数的根。约化代数再按有限个极小素分支合并；没有假设基域完美。

导子是两环共同拥有的最大新环理想，也是差商的零化子。尖点与结点的差商都只有一维，前者在特殊点给出非约化的单点纤维，后者给出两个点。结点的局部正规化仍是半局部整环，不能把纤维的直积分解当成整个局部环的直积分解。

习题

习题 6.1. 证明不存在有限多个有理函数 $f_1(t), \dots, f_r(t)$, 使 $k(t) = k[f_1, \dots, f_r]$ 。再说明这与 $k(t)$ 是单生成的域扩张不矛盾。

解. 若这样的代数生成式存在, 引理 6.1.1 说明 $k(t)/k$ 有限, 迫使 t 代数, 和变量的定义矛盾。域生成只要求每个元素是 t 的有理式; 方括号中的代数生成只允许多项式, 不能任意取倒数。□

习题 6.2. 列出 $\mathbb{F}_2[x]$ 中剩余域次数为一、二、三的全部极大理想。

解. 一次不可约式为 $x, x+1$; 二次为 x^2+x+1 ; 三次为 x^3+x+1, x^3+x^2+1 。二次或三次多项式可约时必有一次因子, 所以只需排除在零或一取零的首一多项式, 便得到完整清单。对应剩余域分别有 2, 4, 8 个元素。后两类不是 $\mathbb{F}_2$ 有理点, 但都是素谱中的闭点。□

习题 6.3. 证明 $\mathfrak{m} = (x^2+1, y-x)$ 是 $\mathbb{R}[x, y]$ 的极大理想, 并求其在 $\mathbb{C}^2$ 中的零点。

解. 先用 $y=x$ 消元, 商环为 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$, 所以极大。它没有实零点; 复数零点恰为 (i, i) 与 $(-i, -i)$ 。这说明一个基域上的闭点在扩域后可以分裂为多个坐标点。□

习题 6.4. 证明 $xy-1$ 与 y^2 在任意域上都没有公共零点, 并给出单位理想的显式证据。

解. 等式

$$x^2y^2 - (xy+1)(xy-1) = 1$$

成立, 因此两者生成单位理想。若有公共零点, 在该点取值将给出 $0=1$ 。此处已经给出证据, 所以不需代数闭域假设。□

习题 6.5. 证明 $(x^2+y^2+1) \subseteq \mathbb{R}[x, y]$ 是真理想, 却没有实零点, 并给一个复零点。

解. 非零的非常数多项式不是 $\mathbb{R}[x, y]$ 的单位, 因为非零乘积的全次数相加, 所以所列主理想是真理想。实数上 $x^2+y^2+1 > 0$, 无零点; 复点 $(i, 0)$ 满足方程。不能由实零点集为空推出单位理想。□

习题 6.6. 令 $I = (x^2, xy, y^3) \subseteq k[x, y]$ 。计算 $\sqrt{I}$ 和 $k[x, y]/I$ 的一组 k 基; 若 k 代数闭, 说明点集遗漏了什么信息。

解. 因为 $x^2, y^3 \in I$, 有 $(x, y) \subseteq \sqrt{I}$. 又 $I \subseteq (x, y)$, 后者极大且为根理想, 所以 $\sqrt{I} = (x, y)$. 模掉 I 后只剩单项式 $1, x, y, y^2$; 理想由单项式生成, 这四项中没有任何非零线性组合属于 I , 故为基. 点集只剩原点, 坐标环为 k , 看不到原商环四维及非零幂零元的结构. $\square$

习题 6.7. 设 k 代数闭, $X = Z_k(xy - 1)$. 证明 $I(X) = (xy - 1)$, 并计算 $k[X]$.

解. 映射 $k[x, y] \rightarrow k[t, t^{-1}]$, $x \mapsto t, y \mapsto t^{-1}$ 诱导商环同构: 反向映射把 t 送到 $[x]$, 其逆元为 $[y]$. 商环为整环, 所以 $(xy - 1)$ 是素理想, 因而为根理想. 定理 6.3.1 于是给出 $I(X) = (xy - 1)$, 坐标环即 $k[t, t^{-1}]$. $\square$

习题 6.8. 对代数闭域上的代数集 $X, Y \subseteq k^n$, 证明

$$I(X \cup Y) = I(X) \cap I(Y), \quad I(X \cap Y) = \sqrt{I(X) + I(Y)}.$$

解. 多项式在并集上恒为零当且仅当在两集合上分别为零, 给出第一式. 第二式中, 和理想的公共零点恰为 $X \cap Y$, 因为 $Z_k(I(X)) = X, Z_k(I(Y)) = Y$; 再应用定理 6.3.1 得到其零点理想为该和的根. $\square$

习题 6.9. 设 k 代数闭. 考察 $k \rightarrow k, t \mapsto t^2$ 的点集满射及其坐标环同态 $k[x] \rightarrow k[t]$. 证明后者单射但不是满射; 在特征二中, 点集映射甚至双射.

解. 代数闭性保证每个数有平方根, 故点集映射满射. 环同态为 $P(x) \mapsto P(t^2)$, 不同次数产生不同的偶次幂, 故单射; 像只含偶次幂, 所以不含 t , 不是满射. 特征二时 $a^2 = b^2$ 推出 $(a - b)^2 = 0$, 域中于是 $a = b$. 因此点集双射也不能替代坐标环同构. $\square$

习题 6.10. 对任意域 k 、理想 $I \subseteq R = k[x_1, \dots, x_n]$ 和 $f \in R$, 证明

$$f \in \sqrt{I} \iff IR[T] + (1 - Tf) = R[T].$$

解. 若 $f^N \in I$, 用有限几何级数得到

$$1 = (1 - Tf) \sum_{j=0}^{N-1} (Tf)^j + T^N f^N,$$

所以右侧理想含一. 反向, 若理想含一, 在 R_f 中代入 $T = 1/f$, 清去有限个分母便得 $f^N \in I$. 若 $f = 0$, 右侧本来含 $1 - Tf = 1$, 两边也同时成立. 此等价是纯代数事实, 不需要零点定理或代数闭性. $\square$

习题 6.11. 证明在 $\mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$ 中,

$$I(\mathbb{F}_q^n) = (x_1^q - x_1, \dots, x_n^q - x_n).$$

解. 右侧的生成元在每个点上为零, 故包含于左侧. 反向, 依次用这些关于不同变量的首一多项式除法, 得到余式 r , 其中每个变量的次数都小于 q , 且 r 仍在全部点上为零. 对变量数归纳: $n = 1$ 时非零次数小于 q 的多项式不可能有 q 个根; 一般情形固定前 $n - 1$ 个变量, 将 r 视为最后一个变量的多项式, 所有系数在这些固定值上为零, 再由归纳假设得系数多项式为零. 因此 $r = 0$, 原多项式属于右侧理想. $\square$

习题 6.12. 按本书约定求 $A = k[t, \varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的正规化, 并说明为何 A 到正规化的自然映射不是单射。

解. 写元素为 $P(t) + \varepsilon Q(t)$. 幂零元恰好为 (ε) : 若一个幂为零, 模掉 ε 后 $P(t)$ 在整环 $k[t]$ 中幂零, 只能为零; 反向该理想平方为零。因此 $A_{\text{red}} = k[t]$, 后者已整闭, 正规化还是 $k[t]$. 自然映射的核为非零理想 (ε) . $\square$

习题 6.13. 设 $A = k[x, y, z]/(xy, xz, yz)$. 求总分式环、正规化、正规化商模的 k 维数及导子理想。

解. 把一个元素送到三条坐标轴上的限制, 得到单射

$$A \longrightarrow B = k[x] \times k[y] \times k[z].$$

确切地说, A 的元素唯一写成 $c + xf(x) + yg(y) + zh(z)$, 其像恰为三个常数项相等的多项式组。因此环约化, 极小素理想是三条轴对应的 $(y, z), (x, z), (x, y)$ 。命题 6.5.4 给出总分式环 $k(x) \times k(y) \times k(z)$ 。

在 $Q(A)$ 中添入三个坐标幂等元 e_1, e_2, e_3 , 它们满足 $e_i^2 - e_i = 0$, 且生成 B , 所以 B/A 整。 B 的三个分量各自整闭, 任何在 A 上整的分数组逐分量属于这些多项式环。因此正规化为 B 。

商模由三常数项模去对角常数组组成, 维数为二。一个 $a \in A$ 若要满足 $aB \subseteq A$, 其公共常数必须为零, 因为分别乘 e_i 后三个常数仍须相等; 反过来常数全零时乘任意 B 元素仍满足要求。因此导子为 $(x, y, z)_A$, 在 B 中即 $xk[x] \times yk[y] \times zk[z]$. $\square$

习题 6.14. 设 $A \subseteq B$ 为整环的整双有理扩张, 且 A 整闭。证明 $A = B$ 。说明此处不需有限性。

解. 双有理使 B 嵌在 $\text{Frac}(A)$ 中, 每个 $b \in B$ 又在 A 上整。按整闭的定义, $b \in A$ 。因此原包含为等号, 仅用了逐元素整性。 $\square$

习题 6.15. 在例 6.4.2 的 $A = k + xK[x] \subseteq B = K[x]$ 中, 计算导子与 B/A , 并说明导子非零不保证扩张有限。

解. 正次数部分都在 A , 所以 $B/A \cong K/k$ 作为 k 向量空间, 且 $xK[x]$ 零化此商。若导子中的元素常数项 $c \in k$ 非零, 取 $\lambda \in K \setminus k$, 则与 λ 相乘的常数项 $c\lambda \notin k$, 不再属于 A , 矛盾。因此导子恰为 $xK[x]$, 非零; 但正文已由无限剩余域维数证明扩张不有限。 $\square$

习题 6.16. 令 $A = k[t^3, t^4]$. 证明其正规化为 $B = k[t]$, 计算 B/A 的维数与导子。

解. $t = t^4/t^3$ 在分式域中, 且 $t^3 \in A$, 所以 $B = A + At + At^2$ 有限; B 整闭使其成为正规化。由三、四生成的非负整数包括 0, 3, 4 及全部不小于六的整数, 遗漏 1, 2, 5, 因此 B/A 的基为 $[t], [t^2], [t^5]$, 维数三。

显然 $t^6B \subseteq A$, 所以它包含于导子。若 $a \in A$ 有非零常数项, 则 at 的一次项非零; 若常数项为零而三次项非零, 则 at^2 的五次项非零; 若前两项为零而四次项非零, 则 at 的五次项非零。这些情况都不在导子中。故导子恰为 $t^6B = (t^6, t^7, t^8)_A$. $\square$

习题 6.17. 对 $A = k[t^2, t^5] \subseteq B = k[t]$, 求正规化商模与导子, 并比较正文尖点例子。

解. $t = t^5/(t^2)^2$, 又满足 $T^2 - t^2 = 0$, 故正规化为 $k[t]$. 可出现的幂次是零、全部正偶数和不少于五的奇数, 遗漏一、三, 因此 B/A 有基 $[t], [t^3]$, 维数二。全部不少于四的单项式都在 A , 所以 $t^4 B$ 在导子中; 若 a 的常数项或二次项非零, 乘 t 后会出现一次项或三次项, 故不在导子中。因此导子为 $t^4 B = (t^4, t^5)_A$ 。与 $k[t^2, t^3]$ 相比, 缺失的函数和导子的消失阶数都增加了。□

习题 6.18. 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$ 中取由整元素组成的域基 $u_1 = 1, u_2 = \sqrt{5}$ 。计算迹矩阵 $T = (\text{Tr}(u_i u_j))$, 并用引理 6.5.1 说明所有代数整数的公共分母受到怎样的控制。

解. 迹把 $a + b\sqrt{5}$ 送到 $2a$, 故 $T = \text{diag}(2, 10)$ 、 $\det T = 20$ 。若 $z = a + b\sqrt{5}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上整, 则 $\text{Tr}(z) = 2a$ 与 $\text{Tr}(z\sqrt{5}) = 10b$ 都是整数, 故

$$z \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} + \frac{1}{10}\mathbb{Z}\sqrt{5}, \quad 20z \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{5}.$$

这给出有限格内的控制, 不声称所有该格中的元素都整。例如 $(1 + \sqrt{5})/2$ 整, 而 $1/2$ 不整。□

习题 6.19. 设 $\text{char } k = p > 0$, $a \in k \setminus k^p$, 令 $K = k(x)$, 取 z 满足 $z^p = ax^p + x$ 。在添入 $\alpha = a^{1/p}$ 、 $y = x^{1/p}$ 后, 说明 z 如何消除, 并给出 $k[\alpha, y]$ 在 $k[x]$ 上的一组有限模生成元。

解. 在共同代数闭包中,

$$(\alpha y^p + y)^p = \alpha y^{p^2} + y^p = ax^p + x.$$

特征 p 的域中取 p 次幂单射, 所以 $z = \alpha y^p + y$ 。因而加入有限个系数根与参数根后, 这个纯不可分生成元已属于新的有理函数域。环 $k[\alpha, y]$ 在 $k[x]$ 上由 $\alpha^i y^j$ 、 $0 \leq i, j < p$ 生成, 因为 $\alpha^p = a$ 、 $y^p = x$ 。本题不要求确定原环在 $K(z)$ 中的整闭包; 它展示的是有限基变换如何处理不可分部分。□

习题 6.20. 设 $\text{char } k = p > 0$, $L = k(t)$ 、 $K = k(t^p)$ 。证明 L/K 次数为 p , 且迹映射恒为零。为什么不能把可分情形的迹分母论证原样用于此例?

解. $1, t, \dots, t^{p-1}$ 在 K 上线性无关: 清分母后, 不同幂次模 p 的余数不同, 非零项不能抵消; 又 $t^p \in K$, 故它们是基。对 $1 \leq i < p$, 乘 t^i 在这组基上的矩阵没有对角项, 因为指数的余数都被非零的 i 改变; 乘常数 $c \in K$ 的迹为 $pc = 0$ 。线性性给出全部元素的迹为零。因此迹配对是零配对, 不可逆的迹矩阵不能用于求坐标分母。□

习题 6.21. 设 $A \subseteq B$ 为有限扩张, $\mathfrak{c} = \text{Ann}_A(B/A)$ 。证明对素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}} = B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ 当且仅当存在 $c \in \mathfrak{c} \setminus \mathfrak{p}$ 。

解. 若有这样的 c , 由命题 6.6.2 有 $A_c = B_c$, 再局部化便得结论。反向, 有限模 $M = B/A$ 的局部化为零, 选有限生成元 m_i , 分别存在 $s_i \notin \mathfrak{p}$ 使 $s_i m_i = 0$ 。于是 $c = \prod_i s_i \notin \mathfrak{p}$ 零化全部 M , 即 $c \in \mathfrak{c}$ 。有限性就在选取有限乘积时使用。□

习题 6.22. 解释为什么结点的局部正规化 $S^{-1}k[t]$ 没有非平凡幂等元, 而它模掉原点极大理想后的纤维有非平凡幂等元, 并写出后者。

解. 局部正规化是整环, 若 $e^2 = e$, 则 $e(e-1) = 0$, 所以 $e = 0$ 或 1 。纤维为 $k[t]/(t^2-1)$, 特征不为二时,

$$e_+ = \frac{t+1}{2}, \quad e_- = \frac{1-t}{2}$$

满足 $e_{\pm}^2 = e_{\pm}$ 、 $e_+ + e_- = 1$ 、 $e_+e_- = 0$, 分别在 $t = 1, -1$ 取值 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 。这两个幂等元是商环中的类, 不在整环中满足同一恒等式。□

习题 6.23. 在特征二中仍取 $A = k[t^2 - 1, t(t^2 - 1)]$ 。用新变量 $u = t - 1$ 把 A 化成尖点形式, 并计算其导子和原点纤维。

解. 此时 $t^2 - 1 = u^2$, 且 $t(t^2 - 1) = u^3 + u^2$, 所以 $A = k[u^2, u^3]$ 。正规化是 $k[u]$, 由命题 6.6.3 导子为 $u^2k[u]$ 。原点理想扩张为 (u^2) , 纤维为 $k[u]/(u^2)$, 只有一个点且非约化。于是正文结点的“两点”结论确实需要特征不为二。□

习题 6.24. 设 A 是约化有限型 k 代数。证明其正规化 $\tilde{A}$ 仍为有限型 k 代数。再说明若 A 为整环, 正规化不改变分式域的超越次数。

解. 由定理 6.5.5, 取有限个 A 模生成元 $b_1, \dots, b_s$ 生成 $\tilde{A}$ 。若 $a_1, \dots, a_r$ 作为 k 代数生成 A , 则 $a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s$ 作为 k 代数生成 $\tilde{A}$: 每个元素都是 b_j 的 A 线性组合。整环情形 $A \subseteq \tilde{A} \subseteq \text{Frac}(A)$, 且两侧取分式域得到同一域, 因此超越次数不变。□

第七章 仿射代数集与坐标环

零点定理使仿射代数集与约化有限生成代数相互对应。本章说明这项对应怎样作用于不可约分支、连通性、正则函数和态射，证明仿射代数集上的全局正则函数恰为坐标环元素，并把局部环解释为正则函数的芽环。随后区分集合意义的纤维与保留幂零元的纤维代数，讨论基域扩张和几何点，最后用尖点、结点、交叉直线及加厚点检验代数与几何之间的对应。

本章目标

- 从坐标环辨认不可约分支和开闭分解，区分代数集与不可约的仿射簇。
- 证明全局正则函数定理及仿射反等价，解释局部环所记录的函数信息。
- 计算纤维代数和基域扩张，辨认约化性、闭点与几何点的不同含义。
- 在曲线例子中计算正规化、导子与局部不变量，说明双射为何不足以给出同构。

前六章已经给出了本章所需的代数工具：素谱把理想组织成拓扑空间，局部化描述一点附近的运算，有限性控制分支与生成元，整扩张和零点定理则把环与多项式的零点联系起来。现在可以逐项说明这些代数结论在几何中究竟说了什么。读者应始终留意映射的方向：点向前移动，函数通过复合向后拉回。

前两节以及最后一节以代数闭域为基础；第三节讨论基域扩张时会明确放宽这一假设。全局正则函数与局部环的经典叙述可参阅 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[1, Chapter I, §3, pp. 14–18]。其中定理 3.2 以不可约簇为对象；本章给出的拼接论证同时适用于可约仿射代数集，因而不必把每个例子预先拆成分支。

7.1 代数集

前六章主要从环和模出发；本章把其中一些对象重新解释为多项式方程的解集。为使点集确实能够恢复全部约化关系，本节和下一节固定代数闭域 k 。第 7.3 节才明确放宽基域，并用域值点及纤维代数保留普通点集看不到的信息。

7.1.1 Zariski 拓扑与闭子集

定义 7.1.1. 记 $\mathbb{A}_k^n = k^n$ 。形如 $X = Z_k(I)$ 、 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 为理想，的子集称为**仿射代数集** (affine algebraic set)。以这些子集为闭集，得到 $\mathbb{A}_k^n$ 的 Zariski 拓扑；每个代数集赋予子空间拓扑。本书允许代数集为空或可约；非空不可约的代数集称为**仿射代数簇** (affine variety)。

此处采用的“簇”约定比“代数集”多一个不可约条件。拓扑公理可与(1.2)相同地验证：任意交对应理想之和，有限并对应理想之积。对闭集 X ，定理 6.3.1 给出 $I(X)$ 为根理想，且 $X = Z_k(I(X))$ 。

沿用定义 6.3.2 记 $A = k[X]$ 。对 $f \in A$ ，记

$$D_X(f) = \{a \in X : f(a) \neq 0\}, \quad Z_X(J) = \{a \in X : g(a) = 0 \text{ 对全部 } g \in J\}.$$

这里 J 是 A 的理想；这些定义不依赖在多项式环中选择的代表。 $D_X(f)$ 构成 X 的开集基。由弱零点定理，映射

$$X \longrightarrow \text{MaxSpec } A, \quad a \longmapsto \mathfrak{m}_a = \{f \in A : f(a) = 0\} \quad (7.1)$$

是双射，且把上述拓扑对应为素谱中极大理想子集的子空间拓扑。因为 $a \in Z_X(J)$ 恰好等价于 $J \subseteq \mathfrak{m}_a$ ，它同时识别了闭集。

因此 X 的每个点都闭，而 $\text{Spec } k[X]$ 还可能有非闭的一般点。两种空间记录的信息不同；例如仿射直线的坐标点是 $(t - a)$ ，素谱还含零理想。

7.1.2 不可约性与素理想

命题 7.1.2. 非空代数集 $X \subseteq k^n$ 不可约，当且仅当 $I(X)$ 素，也当且仅当 $k[X]$ 为整环。每个代数集有有限个不可约分支，它们对应 $k[X]$ 的极小素理想。

证明. 若 $fg \in I(X)$ ，则每个点上至少一个因子为零，故 $X = Z_X(f) \cup Z_X(g)$ 。不可约性使其中一个等于 X ，即 f 或 g 属于 $I(X)$ ，所以这个真理想素。

反过来，若 $I(X)$ 素，而 $X = Y \cup Z$ 是两个闭子集之并，假设两者都真。由强零点定理，包含反向严格，因而可取 $f \in I(Y) \setminus I(X)$ 、 $g \in I(Z) \setminus I(X)$ 。乘积在全部 X 上为零，违反素性。商整环的等价性由命题 1.1.2 给出。

最后 $A = k[X]$ 为 Noether 环。由命题 1.3.5，它有有限个极小素理想 $\mathfrak{p}_i$ ，且因 A 约化而 $\bigcap_i \mathfrak{p}_i = 0$ 。零点运算把这个有限交变成 $X = \bigcup_i Z_X(\mathfrak{p}_i)$ 。前面的判据说明各成员不可约，极小素理想互不包含，故它们恰为全部不可约分支。□

在 $X = Z_k(xy)$ 中，两分支为两条坐标轴，它们都不可约，却在原点相交。相比之下， $Z_k(x(x-1)) \subseteq \mathbb{A}_k^1$ 是两个分开的点。不可约分支的数目和连通分支的数目因而是不同的数据。

7.1.3 连通性与幂等元

定理 7.1.3. 代数集 X 连通，当且仅当 $k[X]$ 没有除零与一以外的幂等元。

证明. 设 $e^2 = e$ 。在每个点上， $e(a)$ 为零或一，所以

$$X = Z_X(e) \sqcup Z_X(1 - e).$$

两部分闭且互为补集，故也开。如果 $e \neq 0, 1$ ，因 $k[X]$ 的元素确为函数，两部分都非空，得到不连通性。

反过来, 若 $X = Y \sqcup Z$, 其中 Y, Z 非空且均开闭, 取它们在 $A = k[X]$ 中的零点理想 J, K 。因为并为 X , 有 $J \cap K = 0$; 因为交为空, 由推论 6.2.2, $J + K = A$ 。第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理给出 $A \cong A/J \times A/K$ 。两因子非零, 元素 $(1, 0)$ 的原像就是非平凡幂等元。空集的坐标环为零环, 零与一相同, 也符合所述判据。□

例如两条交叉直线的坐标环可嵌入 $k[x] \times k[y]$, 其像为两坐标常数项相同的多项式对。一个幂等元的两个坐标都只能为零或一, 再要求常数项相同, 只剩 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 。因此这个可约代数集仍连通。相比之下, 两点代数的坐标环为 $k \times k$, 其两个非平凡幂等元把两个点分开。

7.2 正则函数与态射

坐标多项式显然给出函数, 但在一个点附近允许除以不为零的函数, 也应得到可用的局部表达。正则性先按这个局部条件定义。本节证明, 在整个仿射代数集上处处正则的函数恰好来自坐标环, 并由此确定代数集之间的映射应当如何与环同态对应。

7.2.1 坐标函数与多项式映射

定义 7.2.1. 设 U 是代数集 X 的开子集。函数 $f: U \rightarrow k$ 若在每个 $a \in U$ 的某个开邻域内写成 g/h , 其中 $g, h \in k[X]$, 且 h 在该邻域处处非零, 称为 U 上的**正则函数** (regular function)。全部这样的函数构成环 $\mathcal{O}_X(U)$ 。

两个局部表达式相加或相乘时, 分母取乘积; 在共同邻域内它仍非零, 所以正则函数对环运算封闭。它们也连续: 在局部表达 g/h 上, 方程 $f = c$ 等价于 $g - ch = 0$, 是相对闭条件; 仿射直线的真闭集为有限点集, 由此得到 Zariski 连续性。

一个映射 $\varphi: X \rightarrow Y \subseteq k^m$, 若其每个坐标函数都在 X 上正则, 称为代数集的**态射** (morphism of algebraic sets)。多项式关系的代入仍为正则函数, 故这种映射连续, 并且正则函数的复合仍正则: 在目标的局部表达式中代入各坐标, 其分母在相应原像邻域不为零。因而态射对复合封闭。对代数集的开子集, 也用同一个局部条件定义其间的态射。

7.2.2 仿射代数集的坐标环

定理 7.2.2. 自然映射 $k[X] \rightarrow \mathcal{O}_X(X)$ 是同构。故整个仿射代数集上的正则函数都能由一个多项式表示。

证明。按坐标环的定义, 不同商类给不同的多项式函数, 所以映射单射。设 f 处处正则。在每个点附近, 将一个局部表达式 a/b 的邻域缩小为主开集 $D_X(h)$, 使它仍包含该点且 b 在其中非零。令 $a' = ah, b' = bh$ 。在 $D_X(b')$ 上仍有 $f = a'/b'$, 这些主开集覆盖 X 。以下将这组分子分母记为 a_i, b_i 。

全部 b_i 没有公共零点, b_i^2 也没有。由推论 6.2.2 在坐标环中的形式, 它们生成单位理想; 因此存在有限多个指标及 $c_i \in k[X]$, 使 $\sum_i c_i b_i^2 = 1$ 。对每个 i , 函数等式

$$b_i^2 f = a_i b_i$$

在 $D_X(b_i)$ 上来自局部表达式, 在其补集上则两边都为零, 所以在全部 X 上成立。于是

$$f = \sum_i c_i b_i^2 f = \sum_i c_i a_i b_i,$$

右侧是坐标环中的一个函数, 证明满射。这一步没有将 $k[X]$ 假定为整环, 所以可约代数集也包括在内。□

该结论可与 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[1, Chapter I, Theorem 3.2(a), p. 17] 对照。原书此处以不可约仿射簇为对象; 上面的证明直接处理本书允许的可约代数集。它说的是全局正则函数; 在真开子集上, 分母通常不能全部消去。例如 $1/t$ 在 $\mathbb{A}_k^1 \setminus \{0\}$ 上正则, 却不是全直线上的多项式函数。

命题 7.2.3. 设 $a \in X$, 记 $\mathfrak{m}_a \subseteq A = k[X]$ 为该点的极大理想。正则函数在 a 处的芽组成的环 $\mathcal{O}_{X,a}$ 自然同构于 $A_{\mathfrak{m}_a}$ 。

证明. 一个芽由包含 a 的邻域上的正则函数表示; 两代表若在某更小的含 a 邻域相等, 就表示同一芽。分式 g/s , $s(a) \neq 0$, 在 $D_X(s)$ 上定义正则函数, 局部化的等价关系保证这给出同态 $A_{\mathfrak{m}_a} \rightarrow \mathcal{O}_{X,a}$ 。每个芽按定义局部都是这样的分式, 故同态满射。

若这个分式的芽为零, 缩小到 $a \in D_X(h) \subseteq D_X(s)$ 后有 $g = 0$ 。因此函数 hg 在 $D_X(h)$ 上为零, 在补集上也为零, 故 $hg = 0$ 于 A 。又 $h(a) \neq 0$, 分式零判据使 $g/s = 0$ 于 $A_{\mathfrak{m}_a}$, 得到单射。□

7.2.3 态射与环同态的反向对应

定理 7.2.4. 对代数集 X, Y , 取函数拉回给出双射

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \cong \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(k[Y], k[X]).$$

它与恒等映射及反向的复合相容。每个约化有限型 k 代数都同构于某个代数集的坐标环, 因此代数集与约化有限型 k 代数之间得到反变等价。

证明. 态射的坐标正则函数由定理 7.2.2 可用多项式表示。若 $\varphi: X \rightarrow Y$, 令 $\varphi^*(g) = g \circ \varphi$, 则这是 k 代数同态。

反过来, 给定 $\psi: k[Y] \rightarrow k[X]$, 选 $Y \subseteq k^m$ 的坐标函数 $y_1, \dots, y_m$, 令 $f_i = \psi(\bar{y}_i)$ 。定义 $\varphi(a) = (f_1(a), \dots, f_m(a))$ 。对任意 $h \in I(Y)$, 有 $h(f_1, \dots, f_m) = \psi(\bar{h}) = 0$ 于 $k[X]$, 故该坐标点确实落在 Y 。其坐标为多项式函数, 所以是态射。所得拉回与 ψ 在代数生成元上相同, 故完全相同; 而从原态射开始也恢复相同坐标, 所以两个过程互逆。复合次序由函数复合直接得到。

最后, 约化有限型代数写成 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$, 其中约化性使 I 为根理想。对 $X = Z_k(I)$, 强零点定理给出 $I(X) = I$, 故 $A \cong k[X]$ 。空集对应零环, 也符合这组同态与态射的对应。□

一个双射态射未必是同构。例如尖点的参数式 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 在域值点上双射: $x \neq 0$ 时逆参数为 y/x , 原点则对应零。但是坐标环包含 $k[t^2, t^3] \subsetneq k[t]$ 不满射, 依定理 7.2.4, 它不能来自同构。形式上的逆函数存在, 不说明它在原点正则。

对 $f \in k[X]$, 主开集 $D_X(f)$ 可识别为闭代数集

$$Y = \left\{ (a, t) \in X \times k : tf(a) = 1 \right\}$$

的第一坐标投影; 反向为 $a \mapsto (a, 1/f(a))$, 两者都是态射。其坐标环为 $k[X][t]/(tf - 1) \cong k[X]_f$, 这个商是约化环, 因为约化环的局部化约化。故主开集也有自然的仿射代数集结构, 且 $\mathcal{O}_X(D_X(f)) \cong k[X]_f$ 。这里使用的是具体的正反射射, 不要求把一般开子集都当成仿射代数集。

7.3 纤维与基域扩张

把参数固定为一个值, 就得到映射的一条纤维。这个操作在方程中是代入, 在代数中是取商或张量积。取商可能产生幂零元, 即使原来的源和目标都约化; 因此纤维的点集与记录全部关系的代数必须分别保留。

7.3.1 纤维的方程

设 k 仍代数闭, $\varphi: X \rightarrow Y$ 为态射, $A = k[X], B = k[Y]$ 。对 $b \in Y$, 记其极大理想为 $\mathfrak{m}_b$, 并令 $J = \varphi^*(\mathfrak{m}_b)A$ 。若坐标表达为 $\varphi = (f_1, \dots, f_m)$ 、 $b = (b_1, \dots, b_m)$, 则

$$\varphi^{-1}(b) = Z_X(f_1 - b_1, \dots, f_m - b_m) = Z_X(J).$$

这个闭集称为 b 上的**纤维** (fiber)。用强零点定理得到它作为代数集的坐标环

$$k[\varphi^{-1}(b)] \cong A/\sqrt{J}. \quad (7.2)$$

命题 7.3.1. 在上述条件下有自然同构

$$A \otimes_B \kappa(b) \cong A/J, \quad \kappa(b) = B/\mathfrak{m}_b \cong k.$$

因此纤维的坐标环是该张量代数的约化商; 只有当 J 已为根理想时, 才能直接把坐标环写成 A/J 。

证明. 将 $a \otimes (c + \mathfrak{m}_b)$ 送到 $a\varphi^*(c) + J$ 。改变 c 的代表所产生的差在 J 中, 且该公式对 B 平衡、保持代数乘法, 故得到同态。反向由 $a + J \mapsto a \otimes 1$ 给出; J 的每个生成元都在这个映射下为零, 所以良定义。两个复合在纯张量及 $a + J$ 上分别为恒等, 得到同构。再结合(7.2)即得最后断言。□

例如 $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{A}_k^1, t \mapsto t^2$, 在零处的纤维代数为 $k[t]/(t^2)$, 点集却只有零, 其坐标环为 k 。若 $\text{char } k \neq 2$, 在一处的纤维代数为 $k[t]/(t^2 - 1) \cong k \times k$, 有两个不同点; 在特征二时它变成 $k[t]/((t-1)^2)$, 仍只有一个点, 却保留非零平方零元。相同的代入过程可以产生不同的根数与幂零结构。

7.3.2 张量积与坐标环

现在为说明变换系数的代数操作, 允许 k 为任意域, A 为有限型 k 代数, 不要求约化。对域扩张 K/k , 记 $A_K = K \otimes_k A$, 称为将标量扩张到 K 的代数。这个定义同时适用于上一小节可能非约化的纤维代数。

命题 7.3.2. 若 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$, 则

$$K \otimes_k A \cong K[x_1, \dots, x_n]/IK[x_1, \dots, x_n].$$

若 A, B 是以两组不同变量表示的有限型 k 代数, 则它们的张量积由两组变量及两组原关系共同表示。

证明. 第一式中, 将 $c \otimes \bar{f}$ 送到 cf 的商类, 得到良定义的代数同态。反向将 K 中的标量送到 $c \otimes 1$, 变量送到 $1 \otimes \bar{x}_i$; 原关系都为零, 所以该赋值可下降到商。两复合固定所有标量和代数生成元, 因此互逆。

第二项同样将第一组变量送到 $a_i \otimes 1$, 第二组变量送到 $1 \otimes b_j$ 。两侧的元素交换, 各自满足原关系。反向把纯张量送到两组多项式代表的乘积, 检查平衡及原关系后得到逆映射。这也解释了为什么必须使用两组不同变量。 $\square$

这个结论说明张量积怎样保存方程, 却不自动保证所得环约化。若把一组方程解释为代数闭域中的普通零点集, 强零点定理仍要求取其关系理想的根。在不代数闭的域上, 仅看本域中的点还可能损失更多信息。

例如 $A = \mathbb{R}[u]/(u^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ 没有到 $\mathbb{R}$ 的实代数同态, 但

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} A \cong \mathbb{C}[u]/(u^2 + 1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C},$$

两个因子对应 $u = i, -i$ 。从环的角度, 原对象并不为空; 只是它没有实坐标点。不能把实零点集为空与原代数为零环混为一谈。

7.3.3 非代数闭域上的点与几何点

定义 7.3.3. 对有限型 k 代数 A 及域扩张 K/k , 一个 K 值点是 k 代数同态 $A \rightarrow K$ 。当 $K = k$ 时称为 k 有理点; 当 K 为代数闭域时称为以 K 为值的几何点 (geometric point)。

若 $A = k[x]/I$, 一个这样的同态恰由使全部 I 关系为零的一组 K 坐标确定。它的核是素理想, 却未必极大: 例如 $k[t] \rightarrow \overline{k(t)}, t \mapsto t$, 有零核, 给出以一个含超越元素的代数闭域为值的几何点。如果只取固定代数闭包 $\bar{k}$ 中的值, 则由有限型性, 坐标的像生成有限代数扩域, 核为极大理想。

对任意素理想 $\mathfrak{p}$, 点处的剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 都可嵌入某个代数闭域, 从而给出位于它上面的几何点。这与只枚举 k 有理点不同。纤维代数 $A \otimes_B \kappa(\mathfrak{p})$ 正是使底点固定以后, 继续研究各种剩余域扩张中坐标的对象。

例 7.3.4 (变基后的非约化性). 令 $k = \mathbb{F}_p(s)$, $L = k(\alpha)$, $\alpha^p = s$ 。则 L 为域, 但

$$L \otimes_k L \cong L[\varepsilon]/(\varepsilon^p).$$

证明. s 不是 k 中的 p 次幂: 若 $(f/g)^p = s$, 把 $f, g \in \mathbb{F}_p[s]$ 取互素, 比较不可约因子 s 的指数便矛盾. α 的首一最小多项式在代数闭包中只能为 $(T - \alpha)^r$, $1 \leq r \leq p$. 若 $r < p$, 其 T^{r-1} 系数 $-r\alpha \in k$ 会使 $\alpha \in k$, 与上述结论矛盾. 故 $L \cong k[T]/(T^p - s)$. 应用命题 7.3.2 后, 在 L 中写 $T^p - s = (T - \alpha)^p$, 令 $\varepsilon = T - \alpha$ 即得所述同构. $\square$

因此“约化”与“经过任意扩域仍约化”是不同要求. 上例变基后仍只出现一个点, 却有 p 次幂零结构. 本章保留这个具体区别; 一般几何约化性、可分性和平展性的关系将在后面的微分与平展章节中继续讨论.

7.4 典型例子

以下四个例子分别展示缺失的整函数、同一点上的两个参数分支、相交的不可约分支, 以及普通点集不记录的幂零元. 固定代数闭域 k ; 结点例额外要求 $\text{char } k \neq 2$. 我们使用第六章已经计算的正规化与导子, 同时把坐标环、纤维和局部环的作用逐一分开.

7.4.1 尖点、结点、交叉直线与加厚点

尖点 $C = Z_k(y^2 - x^3)$ 的坐标环由命题 6.4.3 识别为 $A = k[t^2, t^3]$, 正规化为 $B = k[t]$. 参数映射 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 双射, 环包含却严格. 命题 6.6.3 给出

$$\mathfrak{c} = t^2 k[t], \quad B/A \cong k \cdot [t], \quad B/(t^2, t^3)B \cong k[t]/(t^2).$$

所以即使点的个数没有改变, 特殊纤维仍有幂零信息, 原坐标环也确实少了一个函数.

结点 $N = Z_k(y^2 - x^2(x+1))$ 使用参数 $x = t^2 - 1, y = t(t^2 - 1)$. 由命题 6.4.4 和命题 6.6.4, 坐标环与正规化为

$$A = k + (t^2 - 1)k[t] \subseteq B = k[t], \quad \mathfrak{c} = (t^2 - 1)k[t].$$

原点的纤维代数为 $B/(x, y)B \cong k \times k$, 对应 $t = 1, -1$ 两个不同点. 其余点满足 $x \neq 0$, 可以用 $t = y/x$ 恢复参数.

命题 7.4.1. 对交叉直线的坐标环 $A = k[x, y]/(xy)$, 限制到两轴给出嵌入

$$A \hookrightarrow k[x] \times k[y], \quad \bar{f} \mapsto (f(x, 0), f(0, y)).$$

其像为常数项相等的多项式对, 正规化为 $B = k[x] \times k[y]$, 导子为 $(\bar{x}, \bar{y})_A$, 且 $B/A \cong k$.

证明. 每个商类唯一写为 $c + xp(x) + yq(y)$, 这同时证明单射性及像的描述. 令 $e = (1, 0)$. 任一多项式对 (f, g) 可以减去 $(f(0) - g(0))e$ 后落入 A , 所以 $B = A + Ae$. 因 $e^2 - e = 0$, 这给出有限整扩张.

由命题 6.5.4, $Q(A) = k(x) \times k(y)$. 也可直接看见 e 在总分式环中: 它等于 $(x, 0)/(x, y)$, 其中分母在两个整环坐标上都非零, 故为非零因子. B 在这个乘积中整闭, 因为分别投影首一方程后, 每个坐标都属于整闭环 $k[x]$ 、 $k[y]$. 因此 B 正是 A 的正规化.

若 $(f, g) \in A$ 属于导子，分别乘以 $e, 1-e$ ，要求 $(f, 0), (0, g)$ 的常数项仍相等，所以 $f(0) = g(0) = 0$ 。反向这个条件保证与任意多项式对相乘仍在 A 内。因此导子就是两坐标常数项都为零的理想，由 $\bar{x}, \bar{y}$ 生成。最后，差值映射 $(f, g) \mapsto f(0) - g(0)$ 的核为 A ，像为 k ，得到商空间的描述。□

加厚点则用代数 $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 及其素谱描述。它只有一个素理想，却含非零的 ε 。任何到域的同态都把 ε 送到零，所以所有域值点仍只能看到普通一点。作为普通代数集，这一点的坐标环是 k ；要研究加厚结构，必须保留 D 本身，不能在开始时就换成零点集的约化坐标环。

7.4.2 约化性、不可约性与正规性

坐标环按定义约化，所以普通代数集本身不带被点集遗漏的幂零元。不可约性进一步要求坐标环为整环。对不可约仿射代数集，若坐标整环在其分式域中整闭，称它为**正规仿射簇** (normal affine variety)。正规化正是针对最后这一项条件的构造。

命题 7.4.2. 整环 A 整闭，当且仅当每个极大理想处的局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 整闭。

证明. 正向由命题 5.1.7 中整闭性对局部化的保持性得到。反向设 $z \in K = \text{Frac}(A)$ 对 A 整。它对每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 也整，故属于每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 。对模 K/A ，商类 $z + A$ 在每个极大理想处的局部化都为零；这里由局部化正合性将该局部化识别为 $K/A_{\mathfrak{m}}$ 。定理 2.4.1 因此使 $z + A = 0$ ，即 $z \in A$ 。□

尖点和结点都约化且不可约，因为它们的坐标环是 $k[t]$ 的子环。但 t 属于其分式域、满足首一方程且不在原环中，因此都不正规。交叉直线约化而可约，其正规化分开了两个整环分支；加厚点的代数模型则首先就不约化。不能只用“有几个点”或“有几条曲线”代替这些环条件。

尖点的参数映射还给出一个双射同胚而非同构的例子。它由有限整扩张给出，命题 5.2.5 使相应谱映射闭；对代数闭基域的有限型代数，极大理想对应坐标点，有限整扩张把其上的素理想仍送到极大理想，所以参数映射也闭。它已经双射，因而为同胚，却因坐标环包含不满而不是同构。拓扑空间相同并不意味着正则函数相同。

7.4.3 几何图像与局部环计算

在尖点原点 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3)$ 处， $t \notin A_{\mathfrak{m}}$ 。否则存在 $a, b \in A, b \notin \mathfrak{m}$ ，使 $tb = a$ 。 b 的常数项非零，所以 tb 的一次项非零； A 中元素的一次项却全为零，矛盾。这证明不整闭性确实保留在特殊点的局部环中。导子之外，由命题 6.6.2 两侧局部化相同，因而没有这项差别。

结点处同样不能把 t 写成原局部环的元素。若 $tb = a, a, b \in A$ 且 b 在结点非零，则 $b(1) = b(-1) \neq 0$ ，而 $a(1) = a(-1)$ ；等式 $tb = a$ 却要求这两个相同值互为负数，与特征不为二矛盾。其局部正规化是 $S^{-1}k[t], S = A \setminus \mathfrak{m}$ ，为有两个极大理想的半局部整环；分别再局部化得到 $k[t]_{(t-1)}, k[t]_{(t+1)}$ 。只有模掉 $\mathfrak{m}$ 后的纤维是 $k \times k$ ，整个半局部环并不是这个直积。

另一个可计算的局部量是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ ，它是点处剩余域上的向量空间，称为**余切空间** (cotangent space)。在以上平面尖点、结点和交叉直线的原点，关系多项式都没有一次项，故 $\bar{x}, \bar{y}$ 给出二维余切空间：若其线性组合落在 $\mathfrak{m}^2$ ，比较多项式的一次项只能使两个系数都为零。局部化后这个计算不变，因为不在原点极大理想中的元素在该商上按其非零常数值可逆作用。

直线 $k[t]_{(t)}$ 的余切空间却只有基 $t + (t^2)$ ，维数为一；加厚点 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的余切空间也为一维，而普通点 k 的余切空间为零。这些区别来自局部环与平方理想的计算。正则局部环、Jacobian 判据及光滑性之间的联系将在后面的章节建立，本节不把当前维数计算直接当作尚未证明的光滑性定理。

本章小结

在代数闭域上，仿射代数集由根理想刻画，其坐标环是约化有限生成代数。不可约性对应整性，开闭分解对应幂等元。坐标环不仅记录多项式函数，也包含全部全局正则函数；局部化则给出一点处的正则函数芽。由此，正则态射与坐标环同态构成方向相反的对应。

点集并不包含全部代数信息。纤维代数可能有幂零元，取根理想才得到普通代数集的坐标环；基域扩张既可能使一个闭点分裂，也可能在不可分情形下产生幂零元。几何点还可能落在非闭点上，不能一概等同于原底域上的坐标点。

正规化把整闭性落实到具体函数环中。尖点、结点与交叉直线有不同的分支和导子，双射也未必保持正则函数。至此，本编的代数工具已经能够解释一批基本几何现象。下一编转向 Gröbner 基、消元及若干有效计算，使理想之间的这些关系能够通过有限步骤求出。

习题

以下各题除另有说明外， k 为代数闭域，代数集及其态射采用本章约定。

习题 7.1. 证明抛物线 $X = Z_k(y - x^2)$ 与仿射直线同构。分别写出两个方向的态射及坐标环同构，并说明嵌入空间维数不同不妨碍代数集同构。

解. 参数映射 $t \mapsto (t, t^2)$ 与投影 $(a, b) \mapsto a$ 都由多项式给出，复合分别为恒等映射。相应的环同构为 $k[x, y]/(y - x^2) \rightarrow k[t]$ ，将 $\bar{x}, \bar{y}$ 送到 t, t^2 ，逆映射将 t 送到 $\bar{x}$ 。这里同构要求互逆的正则态射，并不要求所选嵌入具有相同的坐标数。□

习题 7.2. 求 $Z_k(xy(x-1))$ 的不可约分支，证明它连通但不可约性不成立。

解. 由乘积为零，零点集是 $Z_k(x)$ 、 $Z_k(y)$ 与 $Z_k(x-1)$ 三条直线的并。每条直线的坐标环为一元多项式环，故不可约，且三者互不包含，正是不可约分支。水平直线分别在 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 与两条竖直线相交。两个相交的连通子空间之并连通：若其并分成不交开闭部分，每个连通子空间必须全落在其中一部分，交点迫使二者落在同一部分。连续使用这项观察使得整个代数集连通。它有三个分支，故不不可约。□

习题 7.3. 求 $X = Z_k(x(x-1))$ 的坐标环与全部幂等元, 并用它们描述 X 的连通分支。

解. 理想 (x) 与 $(x-1)$ 互素, 其交为积。中国剩余定理给出

$$k[X] \simeq k[y] \times k[y], \quad \bar{x} \mapsto (0, 1).$$

每个因子为整环, 幂等元只有零与一。因此乘积环的幂等元为 $0, 1, \bar{x}, 1 - \bar{x}$ 。后两者的取值分别选出两条竖直线; 每条直线不可约, 因而连通, 这就是全部连通分支。□

习题 7.4. 证明仿射直线的全部 k -自同构为 $t \mapsto at + b$, 其中 $a \in k^\times, b \in k$ 。

解. 由定理 7.2.2, 一个态射由多项式 $f(t)$ 给出。若逆态射由 $g(t)$ 给出, 则 $g \circ f = t$, 二者都非常数, 次数公式给出 $\deg g \deg f = 1$ 。因此 $f = at + b$ 且 $a \neq 0$ 。反之, $t \mapsto a^{-1}(t - b)$ 是这种映射的正则逆。□

习题 7.5. 设 $\text{char } k = p > 0$ 。证明 $F: \mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{A}_k^1, a \mapsto a^p$ 是有限的双射, 并诱导拓扑同胚, 但不是代数集同构。

解. 代数闭性保证每个元素有 p 次根, 而 $a^p = b^p$ 蕴含 $(a - b)^p = 0$, 故该根唯一。环映射 $k[s] \rightarrow k[t], s \mapsto t^p$ 使后者由 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 生成模, 所以态射有限。仿射直线的真闭集都是有限点集, 任意双射都保持这类闭集, 因而此处是同胚。环映射的像却只有 $k[t^p]$, 不含 t ; 由定理 7.2.4, 态射不是同构。两边坐标环都是整闭整环也不能改变这个结论。□

习题 7.6. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为仿射代数集的态射。证明 $f^*: k[Y] \rightarrow k[X]$ 满射, 当且仅当 f 给出 X 与 Y 的一个闭代数子集之间的同构。

解. 设拉回满射, 记核为 J 。因商环 $k[Y]/J \simeq k[X]$ 约化, J 为根理想。零点定理给出 $Z_Y(J)$ 的坐标环恰为这个商。拉回经商环分解得到一个同构, 再由定理 7.2.4 还原为 $X \rightarrow Z_Y(J)$ 的同构, 其与包含映射的复合就是 f 。反之, 闭代数子集的坐标环由取商得到, 限制映射满射; 与一个环同构复合后仍满射。□

习题 7.7. 证明 $f^*: k[Y] \rightarrow k[X]$ 单射当且仅当 $f(X)$ 在 Y 中稠密。举例说明单射不能保证 f 满射。

解. 核恰是 Y 上在 $f(X)$ 处处为零的函数所成的理想, 也就是在其闭包上为零的函数理想。闭包为 Y 时, 这个理想为零; 反之, 若闭包是真闭代数子集, 零点定理表明它的零点理想非零, 否则零理想的零点集将是整个 Y 。例如双曲线 $xy = 1$ 到横轴的投影在环上给出 $k[t] \hookrightarrow k[t, t^{-1}]$, 是单射; 其像为 $k^\times$, 稠密但遗漏原点。□

习题 7.8. 计算态射 $t \mapsto t^3$ 在零、一上方的纤维代数及集合意义的纤维。讨论底域特征为三时发生的变化。

解. 由命题 7.3.1, 在 a 上方的代数数为 $k[t]/(t^3 - a)$. 零纤维代数数为 $k[t]/(t^3)$, 有非零幂零元 $\bar{t}$, 而点集只有原点, 点集的坐标环为 k . 若特征不为三, $t^3 - 1$ 有三个不同的根, 因为它与导数 $3t^2$ 无公共根; 中国剩余定理给出一纤维代数 k^3 , 点集有三个点. 特征为三时, $t^3 - 1 = (t - 1)^3$, 一纤维代数数为 $k[t]/((t - 1)^3)$, 约化后为 k , 点集只有一个. $\square$

习题 7.9. 对 $f: \mathbb{A}_k^2 \rightarrow \mathbb{A}_k^1, (x, y) \mapsto xy$, 计算各纤维的坐标环, 判断它们是否约化、是否不可约.

解. 纤维代数数为 $k[x, y]/(xy - a)$. 当 $a = 0$ 时, $(xy) = (x) \cap (y)$ 为根理想, 故它已经约化; 两个轴给出两个不可约分支. 当 $a \neq 0$ 时, 映射 $x \mapsto t, y \mapsto at^{-1}$ 给出该环与 $k[t, t^{-1}]$ 的同构, 逆映射取 $t \mapsto \bar{x}, t^{-1} \mapsto a^{-1}\bar{y}$. 后者为整环, 故相应纤维约化且不可约. $\square$

习题 7.10. 通过 $s \mapsto u^2$ 和 $s \mapsto v^2$ 把两个多项式环视为 $k[s]$ -代数. 计算 $k[u] \otimes_{k[s]} k[v]$, 并比较特征为二与不为二的情形.

解. 张量积的生成元为 $u \otimes 1, 1 \otimes v$, 平衡关系使二者的平方相等. 反向将 $u^i \otimes v^j$ 送到商环中 $u^i v^j$, 得到互逆同构

$$k[u] \otimes_{k[s]} k[v] \simeq k[u, v]/(u^2 - v^2).$$

若特征不为二, 令 $r = u - v, q = u + v$ 是可逆线性换元, 右边成为 $k[r, q]/(rq)$, 是两条交叉直线的约化坐标环. 若特征为二, 令 $r = u - v$, 右边成为 $k[v, r]/(r^2)$, 其中 $\bar{r} \neq 0$ 而平方为零. 集合条件 $u^2 = v^2$ 只给出对角线, 其坐标环是再取约化得到的 $k[v]$. $\square$

习题 7.11. 令 $A = \mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2)$. 求其 $\mathbb{Q}$ -值点、 $\mathbb{R}$ -值点和 $\mathbb{C}$ -值点, 并计算 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} A$. 为什么 $\text{Spec } A$ 只有一个点?

解. $\mathbb{Q}$ -代数同态由 $\bar{t}$ 的像决定, 这个像必须满足平方等于二. 因此没有 $\mathbb{Q}$ -值点, 而实值点和复值点各有两个, 分别取 $\pm\sqrt{2}$. 基域扩张的展示给出 $\mathbb{C}[t]/(t^2 - 2) \simeq \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. 另一方面, $t^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故 A 本身是域, 谱只有零理想这一个闭点. 扩张后的两个点来自这个剩余域到 $\mathbb{C}$ 的两种嵌入, 并非原谱中已有两个素理想. $\square$

习题 7.12. 设 $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 证明对每个扩域 K/k , D 只有一个 K -值点; 但到 $E = k[\delta]/(\delta^2)$ 的 k -代数同态由 k 中的元素参数化.

解. 域无非零幂零元, 故任何同态 $D \rightarrow K$ 必须把 $\bar{\varepsilon}$ 送到零, 唯一性随之成立. E 中平方为零的元素恰为 $c\bar{\delta}$: 若 $(a + c\bar{\delta})^2 = 0$, 其常数项给出 $a^2 = 0$, 故 $a = 0$; 反之显然成立. 因此每个 $c \in k$ 给出且仅给出一个同态 $\bar{\varepsilon} \mapsto c\bar{\delta}$. 域值点看不见的幂零方向, 可以被含幂零元的测试代数辨认. $\square$

习题 7.13. 设 $A = k[x, y]/(xy)$. 计算主开集 $D_X(\bar{x})$ 的正则函数环及点 $(1, 0)$ 的局部环, 再与原点的局部环比较.

解. 将 $\bar{x}$ 变成单位后, 关系 $\bar{x}\bar{y} = 0$ 迫使 $\bar{y} = 0$, 所以 $A_{\bar{x}} \simeq k[x, x^{-1}]$. 由命题 7.2.3, 点 $(1, 0)$ 的局部环为 $A_{(\bar{x}-1, \bar{y})} \simeq k[x]_{(x-1)}$, 是整环. 原点处 $\bar{x}, \bar{y}$ 都仍非零: 若分母在原点不为零, 其与 x 的乘积属于 (xy) , 在整环 $k[x, y]$ 中约去 x 将迫使分母属于 (y) , 与常数项非零矛盾; 对 y 同理. 但二者乘积为零, 所以原点局部环不是整环. $\square$

习题 7.14. 把 $\mathbb{G}_m$ 视为双曲线 $xy = 1$. 证明其全部自同构为 $t \mapsto at$ 或 $t \mapsto at^{-1}$, 其中 $a \in k^\times$.

解. 坐标环为 $k[t, t^{-1}]$. 非零 Laurent 多项式的最高次数与最低次数之差在相乘时相加, 故可逆元的差必须为零; 所有单位恰为 at^n , 其中 $a \neq 0, n \in \mathbb{Z}$. 自同构将 t 送到一个单位 at^n , 逆同构将 t 送到 bt^m , 复合后指数为 $mn = 1$, 所以 $n = \pm 1$. 这两种映射均有同类的逆, 因而穷尽全部自同构. $\square$

习题 7.15. 设 $U = \mathbb{A}_k^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 正则函数按开子集上的定义理解. 证明 $\mathcal{O}(U) = k[x, y]$, 但 U 不与任何仿射代数集同构.

解. 写 $R = k[x, y]$. 主开覆盖 $U = D(x) \cup D(y)$ 把正则函数确定为 R_x 和 R_y 中在交集上相等的两个元素. 交集的函数环是 R_{xy} , 并嵌入 $k(x, y)$, 故这个条件给出 $\mathcal{O}(U) = R_x \cap R_y$. 若 $a/x^m = b/y^n$, 则 $ay^n = bx^m$. 第一卷定理 12.2.6 保证 R 是唯一分解整环; 因 x, y 互素, 得到 $x^m \mid a$, 从而该分式在 R 中. 这证明交等于 R .

若存在仿射代数集 Y 和同构 $h: Y \rightarrow U$, 与包含映射复合得到 $j: Y \rightarrow \mathbb{A}_k^2$. 刚才的计算和定理 7.2.2 说明 $j^*: R \rightarrow k[Y]$ 为同构. 仿射反等价迫使 j 为同构, 特别必须满射; 但其像遗漏原点, 矛盾. 这里反等价只对假定存在的仿射代数集 Y 与 $\mathbb{A}_k^2$ 使用, 没有预先把 U 当成仿射代数集. $\square$

习题 7.16. 证明包含态射 $\mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{A}_k^1$ 的每个集合纤维都有限, 但该态射不是有限态射.

解. 非零点上方恰有一个点, 零上方为空. 若态射有限, $k[t, t^{-1}]$ 将是有限 $k[t]$ -模, 从而 t^{-1} 在 $k[t]$ 上整. 由于 $k[t]$ 是整闭整环, 而 t^{-1} 属于其分式域但不属于它, 这不可能. 也可将一个假定存在的首一整方程乘以足够次 t , 得到常数项为一却能被 t 整除的多项式矛盾. $\square$

习题 7.17. 设 $C = Z_k(y^3 - x^4)$. 结合习题 6.16, 证明参数映射 $t \mapsto (t^3, t^4)$ 是有限双射而非同构. 计算原点的纤维代数, 并比较 C 原点与参数直线原点的余切空间.

解. 先核实坐标环为 $A = k[t^3, t^4]$. 将多项式对首一多项式 $y^3 - x^4$ 除法, 余式为 $\sum_{j=0}^2 a_j(x)y^j$. 代入参数后, 各组单项式的次数 $3i + 4j$ 在模三意义下由 j 区分, 同组的次数也互异, 所以余式只有为零才可能消失. 这证明参数代入的核恰为 $(y^3 - x^4)$. 商环嵌入 $k[t]$, 故该理想素, 零点定理给出所需坐标环.

由习题 6.16, 正规化 $B = k[t]$ 是有限 A -模, 且包含严格, 所以参数态射有限而非同构. 若 $(a, b) \in C$ 且 $a \neq 0$, 取 $t = b/a$, 则由 $b^3 = a^4$ 得 $t^3 = a, t^4 = b$, 且这样的参数唯一; 若 $a = 0$, 必有 $b = 0$, 参数只能为零. 因此点集上双射. 原点的纤维代数为

$$B/(t^3, t^4)B \simeq k[t]/(t^3),$$

含非零幂零元, 而普通点集的坐标环只有 k 。

原点极大理想 $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ 的余切空间以 $\bar{x}, \bar{y}$ 的类为基: 关系 $y^3 - x^4$ 没有一次项, 故二者模 $\mathfrak{m}^2$ 线性无关。维数为二, 参数直线原点的余切空间则为 $(t)/(t^2)$, 维数为一。这进一步从局部环说明双射不能成为同构。□

习题 7.18. 设 $\text{char } k \neq 2$, $A = k + (t^2 - 1)k[t]$, $\mathfrak{m} = (t^2 - 1, t(t^2 - 1))_A$, $S = A \setminus \mathfrak{m}$ 。证明 $S^{-1}k[t]$ 正是把所有在 1, -1 处都不为零的多项式变成单位得到的环。它为何没有非平凡幂等元?

解. A 的元素在 1, -1 的值相同, 属于 S 当且仅当这个公共值非零。因此先把所有在这两点均非零的多项式变成单位, 必使 S 可逆。反过来, 若 $f(1)f(-1) \neq 0$, 则 $f(t)f(-t)$ 是偶多项式, 属于 $k[t^2] \subseteq A$, 且在两点的值均为非零的 $f(1)f(-1)$, 所以属于 S 。恒等式 $f(t)^{-1} = f(-t)/(f(t)f(-t))$ 的分母由这个元素给出, 故 f 已在 $S^{-1}k[t]$ 中可逆。两次局部化因此相同。该环是域 $k(t)$ 的子环, 为整环, 幂等元只能为零或一; 虽有两个极大理想, 也不能写成两个非零环的直积。□

习题 7.19. 设 $A = k[x, y]/(xy)$, $B = k[x] \times k[y]$, $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$, $S = A \setminus \mathfrak{m}$ 。证明

$$S^{-1}B \simeq k[x]_{(x)} \times k[y]_{(y)}, \quad B/\mathfrak{m}B \simeq k \times k.$$

将前一个结果与习题 7.18 比较。

解. 把 A 认作常数项相同的多项式对, S 就是公共常数项非零的那些对。局部化后两因子的分母都在零处非零。反之, 给定两个分母 $g(x), h(y)$ 满足 $g(0)h(0) \neq 0$, 用 $h(0)g(x), g(0)h(y)$ 组成公共常数项相同的分母对, 就能表示乘积局部环中的任意分式对, 得到满射; 单射由两个因子的分式表示立即成立。

理想 $\mathfrak{m}B$ 为 $(x) \times (y)$, 故商为 $k \times k$ 。此处两个分支的正规化局部环确实成直积; 结点原环却是整环, 其分式域内的正规化仍为整环。两个例子在闭点上方都有两个点, 甚至纤维代数都为 $k \times k$, 但这并不能判定正规化的半局部环是否为直积。□

习题 7.20. 设 $r \geq 2$, $A = k[x, y]/(x, y)^r$, $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ 。计算 $\dim_k A$ 、 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 与 $\text{Spec } A$ 的点数。

解. 全次数小于 r 的单项式的像组成 A 的基, 各次依次有 $1, 2, \dots, r$ 个, 所以 $\dim_k A = r(r+1)/2$ 。模去 $\mathfrak{m}^2$ 后, $\mathfrak{m}$ 中只有 $\bar{x}, \bar{y}$ 的一次项留下, 且 $r \geq 2$ 保证它们线性无关, 故余切空间维数为二。每个素理想都包含幂零元 $\bar{x}, \bar{y}$, 而商 $A/\mathfrak{m} = k$, 所以谱只有 $\mathfrak{m}$ 一个点。点数、代数的向量空间维数和余切空间维数分别记录不同信息。□

习题 7.21. 设 $X = Z_k(xy - 1)$ 。证明 $1/x$ 是全局正则函数, 而 $1/(x+y)$ 只在一个真开子集上正则, 不能延拓成 X 上的全局正则函数。

解. 在坐标环 $k[x, x^{-1}]$ 中, $x^{-1} = y$, 所以第一项本来就是多项式函数的限制。第二项的分母对应 $x + x^{-1}$ 。代数闭域中 $x^2 + 1$ 有非零根, 故分母确实有零点; 其非零集是非空真主开集。若逆函数延拓为全局函数 g , 则 $(x + x^{-1})g = 1$ 在这个稠密主开集成立, 因而作为整环 $k[x, x^{-1}]$ 中的等式处处成立。在分母的零点取值便得到 $0 = 1$, 矛盾。□

习题 7.22. 设 X 为非空连通仿射代数集, Y 为非空有限仿射代数集。证明每个态射 $X \rightarrow Y$ 都是常值, 并用坐标环解释这个结论。

解. 有限代数集的每个单点闭, 其补集也是有限闭集, 故拓扑离散。连续像连通, 只能包含一个点。环上, 设 Y 有 n 个点; 零点定理及中国剩余定理给出 $k[Y] \simeq k^n$ 。其标准幂等元 e_i 的像在 $k[X]$ 中仍为两两正交、和为一的幂等元。由定理 7.1.3, 每个像只能为零或一; 两两正交保证至多一个为一, 和为一保证恰有一个为一。于是拉回先取 k^n 的某个坐标, 再嵌入 $k[X]$ 的常数, 正是常值态射。 $\square$

第二编

计算、维数、平坦性与完备化

本编导读

第一编已经建立理想、局部环及整扩张的基本关系。现在要进一步回答几个可以实际检验的问题：怎样计算理想，几个方程能限制多少维，局部代数随基底改变时是否保持结构，以及有限阶近似能恢复哪些信息。本编第 8—14 章分别发展这些问题所需的计算、维数、增长、平坦性、完备化和微分方法。


第八章从单项式序和多元除法开始，在本卷完整证明 Gröbner 基的基础理论，再讨论消去、理想运算、参数例外和零维商代数。它可以作为本编的计算起点；不要求先读第一卷的相关附录。学习时应保存每次约化的多项式等式，尤其区分“同一理想”“同一零点集”和“相同的投影闭包”。

第九章用素理想链定义维数，证明主理想定理及广义高度定理，再建立有限型代数的维数、参数系和嵌入维数。第十章把这些结论用于一维正规整环，证明 DVR 的刻画和 Dedekind 整环的理想分解。这里的赋值记录局部零点阶，理想类群则记录局部主理想未必能由一个全局元素生成的现象。尚不熟悉算术例子的读者，可以先以多项式曲线跟随这些证明。

第十一章从分次片的维数或长度建立 Hilbert 级数及多项式，最终用 Hilbert–Samuel 增长刻画局部维数。计数中必须始终区分单层长度与累计长度：正维情形下，它们的多项式次数相差一。证明先在原环上完成，不借用后面完备化保持维数的结论。

第十二章在本卷重建所需的平坦判据，然后讨论有限展示平坦模、局部自由性、Fitting 理想、泛自由性和忠实平坦性。Fitting 理想不仅记录每个纤维的生成元数，也能保留纤维维数看不到的幂零信息；不能仅因纤维维数恒定就判定平坦。末尾的第 12.6* 节是选读，完整说明带余循环相容条件的有限展示模下降；其余主干不以这节为前提。

第十三章通过 Rees 环和 Artin–Rees 引理处理滤过，再构造完备化。证明按正合性、有限模的张量表示、Noether 性、平坦性及维数保持依次展开。形式幂级数来自所有阶的相容数据，一个有限截断通常不能代替它。第十四章则从导子的乘法法则构造 Kähler 微分，以基本正合列计算余切空间与 Jacobian 矩阵，并区分可分性、形式非分歧、非分歧和平展的条件。



图中只画本编关键证明的直接依赖。第 8 章的计算方法还可帮助理解第 11 章的单项式计数和第 12 章泛自由性的首项论证，后二者所需的分次或模论版本会在使用处说明。第 14 章前半可在第一编后单独阅读；讨论平展时才需要第 12 章的平坦性。不必先完成第 10 章的全部算术例子再学习增长或微分。

本编默认读者已掌握环、模、张量积和有限维线性代数的基本运算；关键的局部判据、首项计算和有限关系论证均在本卷给出。维数、赋值、Hilbert 理论及完备化可配合松村英之的《Commutative Ring Theory》[2, Chapters 3–5] 研读，具体结果的定位见各章。本编结束后，局部环的深度、正则序列和同调刻画将成为下一编的主题，届时再明确引入复形及消解所需的基础。

第八章 Gröbner 基与消去

理想的有限生成性并不直接解决成员判定。本章从单项式序和多元除法出发，完整建立 Gröbner 基、正规式、Buchberger 判据及算法、约化基唯一性，再用消去计算投影闭包、理想交商和饱和。计算过程中始终保存可核验的多项式恒等式。最后以标准单项式和乘法矩阵研究零维商代数，区分向量空间维数、点数与重数，并说明换序和单变量表示的适用条件。

本章目标

- 正确选择单项式序，完成多元除法，并解释一般余式与正规式的区别。
- 理解最高项抵消的有界表示，证明并执行 Buchberger 算法。
- 通过扩展变量计算消去、交、理想商和饱和，同时保留成员表示。
- 用标准单项式和乘法矩阵计算有限商代数，辨认参数例外及非约化结构。

本章需要多项式、理想、商环及有限维线性代数；投影的几何解释还使用本卷的零点定理。单项式有限性和 Gröbner 基的基础证明都在这里展开，不要求先读其他卷的 Gröbner 基入门。第一次阅读时，宜跟着手算例子同时记录两组数据：当前多项式是什么，以及它怎样由原生成元表示。这能把“发现一个答案”与“证明答案正确”联系起来。

零维部分可配合 Sturmfels 的《Solving Systems of Polynomial Equations》[3, Sections 2.1–2.3, pp. 13–19] 阅读；其中以标准单项式、局部重数及乘法矩阵组织计算。本章先建立这些计算所需的代数依据，附录 B 再讨论高效算法与实现，附录 F 另行处理局部标准基。

8.1 全局单项式序与多元除法

理想的有限生成性只保证存在有限描述，并不立即给出成员判定的方法。一元多项式的带余除法提示我们先处理最高项；多元情形没有唯一的“最高次数项”，必须先选择一个与乘法相容的次序。以下固定域 k 、正整数 n 和 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 。代数结论适用于任意域；称某过程为可执行算法时，还要求系数域支持精确四则运算及零判定。

8.1.1 字典序、分次字典序与分次逆字典序

对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ ，记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

这里 $\mathbb{N}$ 含零。 x^α 称为单项式， $|\alpha|$ 为其全次数；非零系数与单项式的乘积称为项。单项式整除等价于各坐标指数分别不大于。

定义 8.1.1. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 其中 $1 \leq n < \infty$. R 的单项式集合上的全序 $\prec$, 若每个非空子集都有最小元, 且

$$x^\alpha \prec x^\beta \implies x^{\alpha+\gamma} \prec x^{\beta+\gamma} \quad (\gamma \in \mathbb{N}^n),$$

称为**单项式序** (monomial order), 本章也称全局单项式序。良序性与乘法相容性是两个分别需要核验的条件。

单位单项式 1 必为最小元。否则若 $m \prec 1$, 相乘给出 $1 \succ m \succ m^2 \succ \dots$, 违反良序。反之, 一个与乘法相容且以一为最小元的全序, 在有限个变量的交换单项式上也必为良序; 本节稍后用 Dickson 引理说明这个结论。

固定变量优先顺序 $x_1 \succ \dots \succ x_n$, 三种常用次序如下。

1. **字典序** (lexicographic order): 在 $\alpha - \beta$ 的第一个非零坐标处, 正数对应较大的单项式。
2. **分次字典序** (graded lexicographic order): 先比较全次数, 全次数相同时再按字典序比较。
3. **分次逆字典序** (graded reverse lexicographic order): 先比较全次数; 相同时, 在 $\alpha - \beta$ 的最后一个非零坐标处, 负数对应较大的单项式。

字典序的非空指数集有最小元: 依次在剩余指数中最小化第一、第二直至第 n 个坐标。后两种次序先选最小全次数, 该次数下只有有限个单项式, 再取最小者。给两指数同时加上 γ 不改变差向量, 也不改变全次数之差, 所以三种次序都与乘法相容。

在三个变量中, 分次字典序把 xz 排在 y^2 前面, 分次逆字典序却把 y^2 排在 xz 前面; 字典序则把 x 排在每个 y^N 前面, 而与 N 多大无关。所谓“逆”不是把一个良序整体倒过来, 而只是在全次数相等时改变最后一个不同指数的比较方向。后文的消去需要特定次序, 不能把这三种次序互换而不检查结论。

8.1.2 首项、标准单项式与多元除法

定义 8.1.2. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定单项式序 $\prec$ 。将 $0 \neq f \in R$ 按此序写成有限个项之和。最大的单项式记为 $\text{LM}(f)$, 其系数记为 $\text{LC}(f)$, 二者的乘积记为 $\text{LT}(f)$, 分别称为**首单项式** (leading monomial)、**首项系数** (leading coefficient) 和**首项** (leading term)。零多项式不定义首项。

若 $f, g \neq 0$, 乘法相容性保证

$$\text{LM}(fg) = \text{LM}(f) \text{LM}(g), \quad \text{LC}(fg) = \text{LC}(f) \text{LC}(g).$$

因为除了两个最高项的乘积, 其余乘积至少有一因子较小, 故严格小于最高乘积, 不可能抵消它。这里用到了系数域中两个非零数的乘积仍非零。

定理 8.1.3 (多元除法). 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序 $\prec$ 。给定 R 中的有序组 $G = (g_1, \dots, g_s)$, 其中各 $g_i \neq 0$, 每个 $f \in R$ 都能在有限步内写成

$$f = \sum_{i=1}^s q_i g_i + r, \quad (8.1)$$

其中 r 的每个单项式都不被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除。若 $f \neq 0$, 所有非零乘积 $q_i g_i$ 以及非零余式 r 的首单项式均不大于 $\text{LM}(f)$ 。

证明. 令 $h = f$, 各 $q_i = 0$, $r = 0$ 。若 $h \neq 0$, 查找第一个满足 $\text{LM}(g_i) \mid \text{LM}(h)$ 的下标。若存在, 置

$$u = \frac{\text{LT}(h)}{\text{LT}(g_i)}, \quad q_i \leftarrow q_i + u, \quad h \leftarrow h - u g_i.$$

这里 u 是一个项, 系数除法在域 k 中进行。若不存在, 就把 $\text{LT}(h)$ 加入 r , 再从 h 中减去它。每步均保持恒等式

$$f = \sum_i q_i g_i + r + h.$$

新的非零待处理式的首单项式严格下降, 良序性排除无限执行。最终 $h = 0$, 得到除法等式。移入余式的项不能被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除, 且后来的项更小, 不会改变这一性质。

每步加入的乘积 $u g_i$ 的首单项式等于当时 $\text{LM}(h)$, 因而不超过初始 $\text{LM}(f)$ 。对同一个 i 把这些乘子相加, 也不会产生更大的项; 移入余式的项同样受这个界限制。这证明最后的首项界。 $f = 0$ 时全部输出为零; 空除数组时逐项移入余式, 输出 $r = f$ 。□

除法因此同时产生余式和一个理想成员的线性组合表示。但是, 非零余式目前只说明这次除法没有化为零, 尚不能断言 $f \notin (G)$ 。要使这种逆向判断成立, 必须对生成组增加条件。

定义 8.1.4. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序 $\prec$ 。理想 $I \subseteq R$ 的**首项理想** (initial ideal) 为

$$\text{in}_{\prec}(I) = (\text{LM}(f) \mid 0 \neq f \in I).$$

若有限组 $G \subseteq I \setminus \{0\}$ 满足

$$\text{in}_{\prec}(I) = (\text{LM}(g) \mid g \in G),$$

称 G 为 I 的**Gröbner 基** (Gröbner basis)。不属于首项理想的单项式称为**标准单项式** (standard monomial)。

首项理想也可由首项生成, 因为每个非零首系数在域中可逆。定义先要求 $G \subseteq I$, 尚未把“生成 I ”作为额外公理; 下一小节证明这项生成性自动成立。零理想以空组为 Gröbner 基, 单位理想以 $\{1\}$ 为 Gröbner 基。

8.1.3 余式的顺序依赖与 Dickson 引理

在 $k[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$, 令

$$g_1 = xy - 1, \quad g_2 = y^2 - 1, \quad f = xy^2.$$

先用 g_1 得到 $f = yg_1 + y$, 余式为 y ; 先用 g_2 得到 $f = xg_2 + x$, 余式为 x 。两个余式的项都不能被 xy, y^2 整除, 却不相等。进一步, $x - y = yg_1 - xg_2$ 属于原理想, 按这组生成元除法却留下非零余式。问题在生成组, 而不在除法恒等式。

引理 8.1.5 (Dickson). 设 n 为有限正整数。对任意 $E \subseteq \mathbb{N}^n$, 存在有限子集 $E_0 \subseteq E$, 使每个 $\alpha \in E$ 都逐坐标不小于某个 $\beta \in E_0$ 。因此任意单项式理想由有限个单项式生成, 单项式理想的升链必稳定。

证明. 先说明每个无限自然数序列都含无限非下降子序列。如果某个值出现无限次, 就取常值子序列; 否则每个有界区间中只有有限项, 可以逐次在尾部选出更大的值。对 $\mathbb{N}^n$ 中的无限序列先按第一坐标抽取, 再按第二坐标抽取, 直至第 n 个坐标, 便得到所有坐标均非下降的无限子序列。特别地, 原序列中存在 $i < j$, 使第 i 项逐坐标不大于第 j 项。

若不存在所需有限 E_0 , 先选 $\alpha^{(1)} \in E$, 然后总可选取一个不逐坐标大于等于任何已选指数的新指数。这样得到无限序列, 其中没有上一段所说的一对, 矛盾。 $E = \emptyset$ 时取空集即可。

由单项式生成的理想, 作为向量空间恰由这些单项式的全部倍数生成: 展开多项式系数给出一个包含, 倍数本身属于理想给出反向包含。不同单项式线性无关, 因此单项式属于该理想, 当且仅当它被某个生成单项式整除。把指数结论用于所有生成单项式, 便得有限生成。对单项式理想升链取并, 选并理想的有限组生成元; 它们同时落在某个链成员中, 此后各成员都等于并理想, 故升链稳定。□

这一论证称为 **Dickson 引理** (Dickson's lemma)。它只使用自然数指数的有限维性质, 不预先借用多项式环的 Hilbert 基定理。

定理 8.1.6. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序。每个理想 $I \subseteq R$ 都存在有限 Gröbner 基。若 G 为其 Gröbner 基, 则 $I = (G)$, 且除法余式是只含标准单项式、与 f 模 I 同余的唯一多项式。特别地,

$$f \in I \iff \text{NF}_G(f) = 0,$$

其中 $\text{NF}_G(f)$ 称为 f 的**正规式** (normal form)。

证明. 由引理 8.1.5, 可从全部 $\text{LM}(f)$ 、 $0 \neq f \in I$, 中选出有限个单项式, 生成首项理想。各选一个产生它的 $g_i \in I$, 便得有限 Gröbner 基。

若 $f \in I$, 按该基除法得到的余式 $r = f - \sum_i q_i g_i$ 仍在 I 中。若 $r \neq 0$, 它的首单项式属于首项理想, 却又不被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除, 与引理 8.1.5 证明中的单项式成员判据矛盾。因此 $r = 0$, 并得到 $I = (G)$ 。

对一般 f , 除法余式只含标准单项式且与 f 同余。若还有一个这样的 r' , 则非零的 $r - r' \in I$ 也只含标准单项式, 同样矛盾, 故 $r = r'$ 。这证明唯一性。理想成员的余式已证为零; 反向, 余式为零的除法等式直接给出 $f \in (G) = I$ 。□

8.1.4 全局良序与算法终止的适用范围

良序性不是一个可以在证明末尾略去的形式要求。若把一元单项式按 $1 \succ x \succ x^2 \succ \dots$ 排列, 则 $1 - x$ 的首项为一。用它约化一, 会依次留下 $x, x^2, x^3, \dots$, 永不终止。这类局部次序有其用途, 但需要其他终止机制, 不能直接使用本节的除法算法。

在本章的有限变量交换情形下, 若一个乘法相容的全序以一为最小元, Dickson 引理反而能推出其良序性。否则有严格下降序列 $m_1 \succ m_2 \succ \dots$; 从中取 $i < j$ 且 $m_i \mid m_j$ 。写 $m_j = m_i u$, 因 $1 \preceq u$, 乘法相容性使 $m_i \preceq m_j$, 矛盾。此论证依赖指数属于 $\mathbb{N}^n$, 不能直接用于非交换字或无限多个变量。

存在有限 Gröbner 基与实际计算它仍是两件事: 上面的存在性证明从整个理想的首项中选择生成元, 尚不是有限输入的计算过程。下一节从已经给定的有限生成组出发, 只用有限次四则运算和单项式比较逐步完成这个构造。

8.2 Buchberger 理论

Gröbner 基控制理想中全部多项式的首项, 定义本身包含无限多个检验。有限算法的关键在于理解最高项怎样抵消: 两个生成元的首项抵消由一个 S 多项式记录, 而多个最高项同时抵消可以分解为这样的两两抵消。本节将这项观察写成首项下降的严格论证, 再据此建立算法。仍固定 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 及全局单项式序。

8.2.1 S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性

定义 8.2.1. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序。对非零 $f, g \in R$, 置

$$L = \text{lcm}(\text{LM}(f), \text{LM}(g)).$$

称

$$S(f, g) = \frac{L}{\text{LM}(f)} \frac{f}{\text{LC}(f)} - \frac{L}{\text{LM}(g)} \frac{g}{\text{LC}(g)} \quad (8.2)$$

为 f, g 的 **S 多项式** (S-polynomial)。单项式最小公倍式的各个指数取两指数的较大者。

两项的首项都归一化成 L , 故它们相减后或者为零, 或者首单项式严格小于 L 。仅有 $S(f, g) \in (f, g)$ 没有检验意义; 重要的是能否用原生成元把它表示出来, 同时让表示中的每个乘积也严格小于 L 。

定理 8.2.2 (Buchberger 判据). 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序。设 $G = (g_1, \dots, g_s)$ 由 R 中的非零多项式组成, $I = (G)$ 。以下条件等价:

- I. G 是 I 的 Gröbner 基;
- II. 每个 $S(g_i, g_j)$ 、 $i < j$, 按 G 除法的余式为零;
- III. 对每个 $i < j$, 存在表示

$$S(g_i, g_j) = \sum_{\ell=1}^s h_{ij\ell} g_\ell, \quad \text{LM}(h_{ij\ell} g_\ell) \prec L_{ij} \quad (h_{ij\ell} \neq 0), \quad (8.3)$$

其中 $L_{ij} = \text{lcm}(\text{LM}(g_i), \text{LM}(g_j))$ 。

空组对应零理想, 后两个条件此时为空条件。

证明. 若(I)成立, S 多项式属于 I , 由定理 8.1.6 余式为零, 得到(II)。再用多元除法的首项界, 每个非零乘积的首单项式不超过 S 多项式的首单项式, 而后者严格小于 L_{ij} , 便得(III)。 S 多项式为零时取所有系数为零。

反过来, 假定有这些有界表示, 记 $\tilde{g}_i = g_i / \text{LC}(g_i)$ 。给定 $0 \neq f \in I$, 将生成元表示的系数展开为项, 可写成

$$f = \sum_{\nu=1}^t a_{\nu} m_{\nu} \tilde{g}_{i_{\nu}}, \quad a_{\nu} \in k^{\times}, \quad m_{\nu} \text{ 为单项式.}$$

在全部这样的表示中, 选择

$$M = \max_{\nu} \{m_{\nu} \text{LM}(g_{i_{\nu}})\}$$

最小的一种, 良序性保证它存在。相加不会产生更大的项, 故 $\text{LM}(f) \preceq M$ 。如果相等, 某个 $\text{LM}(g_i)$ 整除 $\text{LM}(f)$, 已经得到所需结论。

否则令 J 为达到 M 的那些指标。最高项系数抵消给出 $\sum_{\nu \in J} a_{\nu} = 0$ 。固定 $\nu_0 \in J$, 于是

$$\sum_{\nu \in J} a_{\nu} m_{\nu} \tilde{g}_{i_{\nu}} = \sum_{\nu \in J \setminus \{\nu_0\}} a_{\nu} (m_{\nu} \tilde{g}_{i_{\nu}} - m_{\nu_0} \tilde{g}_{i_{\nu_0}}).$$

括号中若两个生成元下标相同, 则乘子也相同, 差为零; 否则, 令它们首单项式的最小公倍式为 L 。二者都整除 M , 故 $L \mid M$, 括号中的差恰为 $(M/L)S(g_{i_{\nu}}, g_{i_{\nu_0}})$ 。下标反序只改变符号。按假设, 这可以用各 g_{ℓ} 表示, 且每个非零乘积的首单项式严格小于 M 。系数展开成项后这个界仍保持。

替换全部达到 M 的项, 其他原项本来就小于 M , 便得到最大首单项式更小的表示, 矛盾。因此必有 $\text{LM}(f) = M$ 。每个非零理想成员的首单项式都被某个 $\text{LM}(g_i)$ 整除, 结合 $G \subset I$ 即得首项理想相等, 证明(I)。□

这称为 **Buchberger 判据** (Buchberger criterion)。证明中的第三种表述不仅解释正确性, 还使我们能够保存每次计算的具体依据: 以后即使加入新生成元, 旧的有界表示仍然成立, 不必假定不同除法顺序给出相同的中间余式。

8.2.2 首项理想升链与算法终止性

如果一个 S 多项式留下非零余式, 余式仍在原理想中, 但它的首单项式未被当前生成元控制。把余式加入即可改进生成组; 同时必须登记它与原有全部生成元组成的新多项式对。

定理 8.2.3. 设域 k 支持精确四则运算与零判定, 输入为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的有限生成组及一个可比较的全局单项式序。算法 8.1 在有限步后终止, 输出确为原理想的 Gröbner 基。算法还可同时记录每个新生成元关于原输入的多项式线性组合。

证明. 每轮有等式 $S(g_i, g_j) = \sum_{\ell} q_{\ell} g_{\ell} + r$, 所以余式仍在当前理想中, 添加它不改变理想。非零余式的首单项式不被已有首单项式整除, 故每次添加使它们生成的单项式理想严格增大。引理 8.1.5 排除无限次添加。每次添加只引入有限个新对, 每轮删除一

算法 8.1 Buchberger 算法

输入: 有限组 $F = (f_1, \dots, f_m) \subseteq R$, 全局单项式序及有效给定的系数域。

输出: $I = (F)$ 的一个有限 Gröbner 基 G 。

```

1: 删除零多项式, 将其余元素首一化, 记为  $G = (g_1, \dots, g_s)$ 。
2: 建立待处理集合  $P = \{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq s\}$ 。
3: while  $P \neq \emptyset$  do
4:   取出并删除一对  $(i, j)$ , 按当前  $G$  对  $S(g_i, g_j)$  除法, 得到余式  $r$ 。
5:   if  $r \neq 0$  then
6:     把  $r/\text{LC}(r)$  加到  $G$  末尾, 记新下标为  $s+1$ 。
7:     将  $(1, s+1), \dots, (s, s+1)$  加入  $P$ , 再令  $s$  增加一。
8:   end if
9: end while
10: return  $G$ 。

```

个待处理对, 添加结束后余下的有限个对也会处理完; 每轮除法本身终止, 因此整个算法终止。

处理某对时, 若余式为零, 多元除法给出(8.3)。若余式非零, 添加首一 $g_{\text{new}} = r/\text{LC}(r)$ 后, 有

$$S(g_i, g_j) = \sum_{\ell} q_{\ell} g_{\ell} + \text{LC}(r) g_{\text{new}}.$$

所有非零乘积的首单项式都不超过原 S 多项式的首单项式, 因而严格小于 L_{ij} 。算法保留已有生成元, 这些有界表示在后续步骤中仍成立。终止时最终组的每一对都已处理, 由定理 8.2.2 即得 Gröbner 性。

最初首一化仅除以非零常数。已有生成元关于原输入的表示时, 将它们代入 S 多项式和除法等式, 就得到余式的表示, 再除以首系数得到新生成元的表示。因此可以与算法同步, 逐步记录全部关系。□

还可以省去部分 S 多项式的实际除法。例如首一 $f = a + u, g = b + v$, 其中 a, b 为首单项式; 若 a, b 互素, 则

$$S(f, g) = bf - ag = ug - vf.$$

这里两个非零乘积的首单项式都严格小于 ab 。因此这对已经具有判据所需的有界表示。这个 **Buchberger 乘积判据** (Buchberger product criterion) 只略去有数学依据的对; 单凭两个多项式看起来简单, 不能跳过检验。

8.2.3 约化 Gröbner 基的唯一性

定义 8.2.4. 设 k 为域, $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 为理想, 并固定全局单项式序。 I 的 Gröbner 基 G 若各元素首一, 并且每个 $g \in G$ 的任何单项式都不被其他 $h \in G \setminus \{g\}$ 的首单项式整除, 称为**约化 Gröbner 基** (reduced Gröbner basis)。零理想的约化基为空, 单位理想的约化基为 $\{1\}$ 。

定理 8.2.5. 设 k 为域, 并在 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 上固定全局单项式序。每个理想 $I \subseteq R$ 都有唯一的约化 Gröbner 基。由任意 Gröbner 基可以在有限步内得到它。

证明. 先在一组 Gröbner 基的首单项式中只保留整除关系下的极小者, 相同单项式只保留一个对应多项式。保留者仍属于原理想, 且首单项式生成原首项理想, 因而仍为 Gröbner 基。将它们首一化, 再对每个元素用其他基元素约化尾项。首单项式不被其他极小首单项式整除, 所以不会改变; 所得多项式仍属于原理想, 尾项不被其他首单项式整除, 也不能被自己的首单项式整除, 因为真倍数严格更大。首单项式集合在整个过程中不变, 有限次除法就得到约化基。

两个约化基的首单项式都恰为首项理想中整除关系的极小单项式。这组单项式只由理想决定: 任一理想单项式被其中一个整除, 而极小者不能被另一个严格更小的理想单项式整除。按相同首单项式配对两个基元素 g, h 。二者首一, 故首项相消; 所有余下项均为标准单项式。又 $g - h \in I$, 由定理 8.1.6 只能有 $g - h = 0$ 。逐对相等, 证明唯一性。 $\square$

唯一的是固定次序下的约化基, 而不是任意 Gröbner 基。增加一个已在理想中的冗余多项式通常不会破坏 Gröbner 基性质; 改变次序却可能同时改变首项理想、标准单项式和约化基。两种变化应分别考察。

8.2.4 手算例题与零余式的线性组合表示

在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$, 以

$$f_1 = x^2 - y, \quad f_2 = xy - 1$$

为输入。第一对给出

$$h = yf_1 - xf_2 = x - y^2.$$

h 的首单项式 x 不被 x^2, xy 整除, 所以要加入。随后 f_2 与 h 的 S 多项式为

$$p = f_2 - yh = y^3 - 1.$$

这又提供未被控制的纯 y 首单项式。我们可以不再保留冗余的原生成元, 而用以下双向等式核验最终理想:

$$\begin{aligned} h &= yf_1 - xf_2, & p &= -y^2f_1 + (1 + xy)f_2, \\ f_1 &= (x + y^2)h + yp, & f_2 &= yh + p. \end{aligned} \tag{8.4}$$

因此 $I = (f_1, f_2) = (h, p)$ 。对最后一组, 只需检验一对:

$$S(h, p) = y^3h - xp = x - y^5 = h - y^2p.$$

先减去 h , 再消去 $-y^2p$, 余式为零。判据表明 $\{x - y^2, y^3 - 1\}$ 是 Gröbner 基, 而且已经约化。所有等式在任意系数域中仍成立; 若进一步数几何点, 才须另看 $y^3 - 1$ 是否有重根。

换成字典序 $y \succ x$, 同一理想的约化基为

$$\{y - x^2, x^3 - 1\}.$$

因为 $y - x^2 = -f_1$ 、 $x^3 - 1 = xf_1 + f_2$, 反向有 $f_2 = x(y - x^2) + (x^3 - 1)$; 首单项式为 y, x^3 , 互素, 乘积判据给出 Gröbner 性。两种次序分别先消去 x 与 y , 商代数虽然相同, 适合展示的坐标却不同。

等式(8.4)还有一个实际作用: 检查者只需展开有限个多项式等式, 再检查一个 S 多项式, 就能确认最终答案。只报告“软件返回这组基”, 或只验证原多项式对新组的余式为零, 都少了一半理想包含的依据。

8.3 消去与理想运算

消去变量的目的, 是把一个含参数或辅助变量的问题转成原坐标中的理想问题。但消去所得方程只记录闭条件; 被排除的分母和不能提升的点, 未必能由这些方程单独恢复。本节在计算理想时保留等式, 在解释零点时另外核对基域、闭包和分母条件。

8.3.1 消去定理与投影的 Zariski 闭包

设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$, $S = k[y_1, \dots, y_s]$ 。对理想 $I \subseteq R$, 交 $I \cap S$ 称为对前 r 个变量的**消去理想** (elimination ideal)。取字典序, 且全部 x 变量先于 y 变量。它的关键性质是: 只含 y 的单项式小于任何含 x 的单项式。

定理 8.3.1 (消去定理). 设 k 为域, $I \subseteq R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$ 为理想, $S = k[y_1, \dots, y_s]$ 。对全部 x 变量先于 y 变量的字典序, 若 G 是 I 的 Gröbner 基, 则 $G \cap S$ 是 $I \cap S$ 的 Gröbner 基。

证明. 取 $0 \neq f \in I \cap S$ 。因 G 为 Gröbner 基, 某个 $g \in G$ 的首单项式整除 $\text{LM}(f)$ 。后者只含 y , 故 $\text{LM}(g)$ 也只含 y 。如果 g 中另有含 x 的项, 该项在当前次序下将大于 $\text{LM}(g)$, 矛盾。因此 $g \in G \cap S$ 。于是 $I \cap S$ 中任一非零元素的首单项式都被 $G \cap S$ 的某个首单项式整除; 这些基元素本来就在交理想中, 故首项理想相等。由定理 8.1.6, 它们也生成整个交理想。□

这个结果称为**消去定理** (elimination theorem)。证明同样适用于满足上述变量分块比较性质的全局序; 对任意次序则没有这种保证。

定理 8.3.2 (投影的闭包). 设 k 代数闭, $R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$, $S = k[y_1, \dots, y_s]$, $I \subseteq R$ 为理想, $\pi: k^{r+s} \rightarrow k^s$ 为忘掉 x 坐标的投影。则

$$\overline{\pi(Z_k(I))}^{\text{Zar}} = Z_k(I \cap S).$$

此外, 投影像的消失理想为 $\sqrt{I} \cap S = \sqrt{I \cap S}$ 。

证明. 对 $f \in S$, 它在 $\pi(Z_k(I))$ 上为零, 当且仅当把它看成不含 x 的多项式后, 在 $Z_k(I)$ 上为零。由定理 6.3.1, 后者等价于 $f \in \sqrt{I}$ 。因此消失理想为 $\sqrt{I} \cap S$ 。对 $f \in S$,

某个 f^N 在 I 中当且仅当在 $I \cap S$ 中, 故这也等于 $\sqrt{I \cap S}$ 。任一集合的 Zariski 闭包是其消失理想的零点集, 结论随之成立。□

例如 $I = (xy - 1) \subseteq k[x, y]$ 满足 $I \cap k[y] = 0$: 商环同构于 $k[y, y^{-1}]$, 所以 $k[y]$ 映入商环为单射。投影像是 $k \setminus \{0\}$, 闭包却是整个直线。闭包定理没有断言每个闭包中的点都能补出被消去的坐标。

代数闭条件也有实际作用。在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中取 $I = (x^2 + 1)$, 其消去理想为零, 实零点集却为空。代数的消去计算仍正确, 关于实点投影闭包的上述公式则不适用; 实零点的消去需要额外的有序域理论。

8.3.2 理想成员、交、理想商与饱和

成员判定由定理 8.1.6 完成。下面把其他理想运算也化成可以消去的理想。暂设 $I = (f_1, \dots, f_a)$ 、 $J = (g_1, \dots, g_b)$ 都在 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 中。

命题 8.3.3. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $I, J \subseteq R$ 为理想。在 $R[u]$ 中扩张这两个理想后, 有

$$I \cap J = (uI + (1-u)J) \cap R.$$

右侧可对生成组 $uf_i, (1-u)g_j$ 取消去 u 的 Gröbner 基求得。

证明. 若 $h \in I \cap J$, 写 $h = uh + (1-u)h$, 便得右侧包含它。反过来, 若 $h \in R$ 有表示 $h = u \sum A_i f_i + (1-u) \sum B_j g_j$, 置 $u = 1$ 得 $h \in I$, 置 $u = 0$ 得 $h \in J$ 。两次代入也把计算所得的表示分别变成原环中的成员表示。□

命题 8.3.4. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $I \subseteq R$ 为理想。若 $0 \neq g \in R$, 并已求得 $I \cap (g) = (h_1, \dots, h_c)$, 则各 h_i 被 g 整除, 且

$$(I : g) = (h_1/g, \dots, h_c/g).$$

对任意 $g \in R$, 记 $(I : g^\infty) = \bigcup_{N \geq 0} (I : g^N)$, 则

$$(I : g^\infty) = (IR[u] + (1-ug)) \cap R.$$

若 $J = (g_1, \dots, g_b)$, 有

$$(I : J) = \bigcap_{j=1}^b (I : g_j), \quad (I : J^\infty) = \bigcap_{j=1}^b (I : g_j^\infty).$$

空生成组即 $J = 0$ 时, 后两式均按交为空时等于 R 的约定解释。

证明. 对第一式, 若 $ag \in I$, 它属于 $I \cap (g)$, 写成 $ag = \sum c_i h_i$, 在整环中消去非零 g 得 $a = \sum c_i (h_i/g)$ 。反向直接乘以 g 即得。

若 $g^N h \in I$, 在 $R[u]$ 中有恒等式

$$h = u^N g^N h + (1-ug)h \sum_{j=0}^{N-1} (ug)^j,$$

故 h 在所述消去理想中, $N = 0$ 时直接使用 $h \in I$. 反向, 对一个成员表示代入 $u = g^{-1}$, 得到 $h/1 \in IR_g$; 有限清分母给出某个 $g^N h \in I$. $g = 0$ 时右端含 1, 左端也等于 R , 单独处理即可。

理想商的交式直接来自逐个生成元检验。对饱和, 若 $J^N h \subseteq I$, 则 $g_j^N h \in I$, 给出一个包含。反向, 设分别有 $g_j^{N_j} h \in I$, 可增大到 $N_j \geq 1$. 取 $N = 1 + \sum_j (N_j - 1)$. J^N 的每个生成单项式至少含某个 $g_j^{N_j}$, 故乘以 h 后都在 I 中。这证明另一包含。 $\square$

例如 $I = (x^2, xy) \subseteq k[x, y]$, 直接计算得

$$(I : x) = (x, y), \quad (I : y) = (x), \quad (I : x^\infty) = R, \quad (I : y^\infty) = (x).$$

第一式由 $xh = x(ax + by)$ 消去 x 得到; 第二式中 $yh \in (x)$ 迫使 $h \in (x)$, 反向由 $xy \in I$ 得到。因 $x^2 \in I$, 关于 x 的饱和为全环; 关于 y 的饱和保持 (x) . 于是 $(I : (x, y)^\infty) = (x)$. 若误把多生成元饱和写成关于乘积 xy 的饱和, 就会错误地得到全环。

8.3.3 隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧

命题 8.3.5 (参数映射的隐式理想). 设 k 为域, $t = (t_1, \dots, t_m)$ 为代数无关元, $0 \neq q \in k[t]$, $p_1, \dots, p_n \in k[t]$. 定义

$$\phi : k[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow k[t, q^{-1}], \quad x_i \longmapsto p_i/q.$$

则

$$\ker \phi = (qx_1 - p_1, \dots, qx_n - p_n, uq - 1) \cap k[x_1, \dots, x_n],$$

右边的理想先在 $k[t, x, u]$ 中生成, 再消去 t, u 。

证明. 令右边取交前的理想为 H . 商环中 q 可逆, 逆元为 u , 并有 $x_i = up_i$. 所以把 t_j 送到自身、 u 送到 q^{-1} 、 x_i 送到 p_i/q , 给出商环到 $k[t, q^{-1}]$ 的同构; 逆映射由局部化泛性质将 q^{-1} 送回 $\bar{u}$. 限制到 $k[x]$, 核就是 $H \cap k[x]$, 得到公式。 $\square$

例如有理参数化

$$x = \frac{t-1}{t}, \quad y = \frac{t}{t-1}, \quad t(t-1) \neq 0$$

满足 $xy = 1$. 它的隐式理想恰为 $(xy - 1)$: 商 $k[x, y]/(xy - 1) \cong k[x, x^{-1}]$ 映入 $k(t)$ 时, x 的像 $1 - t^{-1}$ 是超越元, 所以映射单射。在代数闭域上, 参数像是双曲线删去 $(1, 1)$; 因为其余点可由 $t = (1 - x)^{-1}$ 恢复。消去得到整条双曲线, 原来的分母条件仍须另记。

Rabinowitsch 技巧还给出一个有效的根理想成员判据。对 $f \in R$,

$$f \in \sqrt{I} \iff 1 \in IR[u] + (1 - uf). \quad (8.5)$$

这是命题 8.3.4 中“关于 f 的饱和为全环”的情形, 也可直接使用其中的恒等式。右边可以用 Gröbner 基检验; 若结果为真, 保存 $1 = \sum A_i(u, x)f_i + B(u, x)(1 - uf)$, 代入 $u = f^{-1}$ 再清分母, 便产生某个实际指数 N 和等式 $f^N = \sum c_i f_i$. 这个判据不要求底域代数闭; 只有把它解释为“在全部几何零点上消失”时才调用零点定理。

8.3.4 理想等式与乘子表示的核验

消去算法输出的一组生成元, 应当带着它们属于原理想的表示。若原生成组为 $F = (f_1, \dots, f_m)$, 计算时可把每个新多项式连同同一个向量一起保存:

$$g_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i.$$

加减多项式、乘单项式及首一化时, 对表示向量执行同一运算, 因而始终保持等式。若最终还验证每个 f_i 对 $G = (g_j)$ 的余式为零, 就得到反向表示 $f_i = \sum_j b_{ji} g_j$ 。两组等式分别证明 $(G) \subseteq (F)$ 与 $(F) \subseteq (G)$; Gröbner 性则由有界 S 多项式表示单独证明, 不能只凭理想相等推出。

对交理想, 命题 8.3.3 的表示在 $u = 0, 1$ 的两次取值给出两边的成员证明。对饱和, 清分母后得到 $g^N h \in I$; 不同生成元可以有不同指数, 取最大值便统一成一个指数。对于消去理想的完备性, 只检验“所得多项式确实消去变量”还不够, 还需确认使用了消去序且原扩展理想的 Gröbner 基已经算完。

例如要证明 $(xy, xz) \cap (y, z) = (xy, xz)$, 只须观察两生成元都在 (y, z) 中, 原理想本来已包含于后者; 不必为每个简单理想关系都重算一次 Gröbner 基。算法提供一般办法, 具体结构往往给出更短的证明。无论采用哪种方法, 都应保留足以恢复两侧包含的等式或论证。

8.4 可验证的计算与系数域

同一组符号式放在不同的系数环中, 可能给出不同的理想。精确计算除了记录多项式, 还须说明允许哪些除法、参数取值是否使分母为零, 以及怎样独立检验结果。本节用具体算例说明这些要求, 并区分算法终止、计算规模和数值近似。

8.4.1 有理数、有限域与有理函数域上的精确运算

前面各算法只用到系数的加、减、乘、除及零判定。因此, 给定一个抽象域还不够: 实际执行时, 必须说明它的元素怎样表示、这些运算怎样完成。 $\mathbb{Q}$ 中的系数可用互素整数对表示, 每次运算后约分; $\mathbb{F}_p$ 中的系数用模 p 的剩余类表示, 除法由扩展 Euclid 算法求逆。对于有限扩域 $\mathbb{F}_p[z]/(h)$, 还须给定不可约多项式 h , 并把系数约化为次数小于 $\deg h$ 的多项式。

在 $k(a_1, \dots, a_s)$ 上计算时, 参数 a_i 被视为代数无关元。系数是多项式之比, 零判定归结为分子是否为零多项式; 其分母在有理函数域中可逆, 却未必在参数的每个具体取值处可逆。例如 $(ax - 1) \subset k(a)[x]$ 的约化 Gröbner 基为 $\{x - a^{-1}\}$ 。当 $a = c \neq 0$ 时它可以直接专门化; 当 $a = 0$ 时原生成元成为 -1 , 所得理想是单位理想, 原公式则没有意义。

命题 8.4.1. 设 k 为域, $A = k[a_1, \dots, a_s]$, $K = \text{Frac}(A)$, 并固定 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中的全局单项式序。若 $F \subset A[x_1, \dots, x_n]$ 为有限集, G 是 $(F)K[x_1, \dots, x_n]$ 的首一 Gröbner 基,

则存在非零 $d \in A$, 使 $G \subset A_d[x_1, \dots, x_n]$, 且对任意域扩张 $k \subset L$ 和任意满足 $d(c) \neq 0$ 的 $c \in L^s$, 专门化后的 $G(c)$ 是 $(F(c))$ 的 Gröbner 基, 其首单项式与 G 相同。

证明. 记录 G 的全部系数、两组生成元互相表示的系数, 以及每个 $S(g_i, g_j)$ 约化为零所得的有界表示系数。这些都是有限多个有理函数。取其所有非零分母的乘积为 d , 便可把全部恒等式写在 $A_d[x_1, \dots, x_n]$ 中。

当 $d(c) \neq 0$ 时, 代入给出良定义的同态 $A_d \rightarrow L$ 。两组互相表示的等式保证 $(G(c)) = (F(c))$ 。每个 g_i 首一, 故专门化不改变其首单项式; 其余系数即使变为零, 也只会删去较低的项。因此, 各 S -多项式专门化后仍具有小于相应最小公倍数的有界表示。由定理 8.2.2, $G(c)$ 是所求 Gröbner 基。□

这一命题只说明存在一个可以沿用计算结果的非空开集。对 $d(c) = 0$ 的参数必须另算, 不能把它们当作无解。例如 $F = \{ax, y - x\}$ 在 $k(a)[x, y]$ 中生成 (x, y) , 而在 $a = 0$ 时生成 $(y - x)$, 零点从一点变成一条直线。按参数分情形的系统方法留待附录 B。

8.4.2 计算步骤与结果验证

一份可重复的计算至少应写出系数域、变量及其顺序、单项式序、原生成元, 以及输出多项式的精确系数。若使用有限扩域, 应写出定义该域的不可约多项式; 若使用有理函数域, 应区分参数和多项式变量。例如, $k(a)[x]$ 中可用 a 除, 而 $k[a, x]$ 中一般不可以, 这会改变理想成员问题本身。

验证 Gröbner 基时可把任务分成三个有限检查。给原生成元 $F = (f_i)$ 和候选基 $G = (g_j)$, 先检查多项式恒等式

$$g_j = \sum_i a_{ij} f_i, \quad f_i = \sum_j b_{ji} g_j,$$

证明两者生成同一理想; 再检查每一对 g_i, g_j 的 S -多项式有定理 8.2.2 要求的有界表示, 或按已指定的除法次序确实得到零余式。前两项不能由第三项取代: $\{x\}$ 自身是 Gröbner 基, 却不是 (x^2) 的 Gröbner 基。

理想成员的证书可以更短。证明 $f \in (F)$, 只需给出并核验 $f = \sum a_i f_i$, 无须重新验证一次完整 Gröbner 基计算; 证明 $f \notin (F)$, 则可以先验证 G 的 Gröbner 基资格, 再展示 f 的非零正规形。保存计算过程中的表示向量, 正是为了在结果出来后提取这些较短的恒等式。它们能由另一套程序或人工逐项检查, 与发现结果所用的实现相互独立。

8.4.3 复杂度、系数膨胀与单项式序

Buchberger 算法的终止性来自首单项式理想不可能形成无限严格升链。这个论证没有给出“只需少量步骤”的保证, 也没有限制途中多项式的次数、项数和系数长度。即使最后得到很短的答案, 中间表达式也可能很大。

消去本身便可能提高次数。在 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中考虑

$$I = (x_2 - x_1^2, x_3 - x_2^2, \dots, x_n - x_{n-1}^2).$$

逐次代入表明商环同构于 $k[x_1]$, 且

$$I \cap k[x_1, x_n] = (x_n - x_1^{2^{n-1}}).$$

后一等式也可直接检验: 以 $x_n - x_1^{2^{n-1}}$ 作一元首一除法, 余式只含 x_1 , 代入后为零便迫使余式为零。原方程全是二次式, 消去后的关系却有指数增长的次数。这是具体输出变大的例子, 并不声称所有单项式序或所有表示方法都具有相同复杂度。

系数也可能增长。对方程 $x_1 = 2$ 、 $x_{i+1} = x_i^2$ 逐次消去, 得到整数 $x_n = 2^{2^{n-1}}$, 其二进制长度为 $2^{n-1} + 1$ 。有理数运算虽然精确, 存储分子、分母和做整数运算的成本仍须计算。单项式序还会改变中间基及最后基的形状: 字典序适合消去, 但不总是最快; 先用另一种全局序得到商代数, 再在线性代数中换序, 是下一节要解释的做法。附录 B 再讨论具体实现, 正文只以已经证明终止的算法承担存在性与有效性。

8.4.4 数值近似与精确理想判定

在 $\mathbb{R}[x]$ 中, $I_\varepsilon = (x, x - \varepsilon)$ 当 $\varepsilon \neq 0$ 时等于整个环, 因为

$$1 = \varepsilon^{-1}x - \varepsilon^{-1}(x - \varepsilon).$$

当 $\varepsilon = 0$ 时却等于 (x) 。若把足够小的非零系数统一舍为零, 便会把一个无公共零点的系统误判为有零点的系统。这里出错的不是近似精度还不够高, 而是“系数等于零”这个精确问题没有被近似数据决定。

同样, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中 x^2 与 $x^2 - \varepsilon$ 的系数可以任意接近, 但前者有一个二重根, 后者在 $\varepsilon \neq 0$ 时有两个不同的根。数值计算适合近似根的位置, 精确理想运算则要判断恒等式、理想相等和重数。两者可以相互帮助: 例如先猜测有理系数关系, 再用精确运算验证; 但未经验证的近似零余式不能作为理想成员关系的证明。

8.5 零维方程组与商代数

有限维商代数把多项式关系转成有限个矩阵的关系。标准单项式给出坐标, 乘法矩阵保存全部代数运算; 它们既能辅助求解, 也能记录不同零点个数所不能反映的幂零结构。本节同时说明单变量表示需要哪些附加条件。

8.5.1 商代数的标准单项式基与乘法矩阵

设 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 、 $I \subsetneq R$, 并固定一个全局单项式序。正规形把每个剩余类写成标准单项式的线性组合。如果标准单项式只有有限多个, 所有乘法也就能由有限个矩阵表示; 求解方程的问题由此获得另一种计算方法。

命题 8.5.1. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $I \subsetneq R$, 并固定全局单项式序。不属于 $\text{in}(I)$ 的标准单项式的剩余类构成 $A = R/I$ 的 k 基。下列条件等价:

1. $\dim_k A < \infty$;
2. 标准单项式只有有限多个;
3. 对每个 i , 存在 $d_i \geq 1$ 使 $x_i^{d_i} \in \text{in}(I)$ 。

证明. 用 Gröbner 基除法得到的余式只含标准单项式, 故它们生成商空间。若其非零线性组合属于 I , 首单项式便同时属于且不属于 $\text{in}(I)$, 矛盾。

由基的性质, 前两项等价。若对某个 i 没有这样的幂, 则 $1, x_i, x_i^2, \dots$ 都是标准单项式, 违反有限性。反之, 第三项使任何标准单项式的 x_i 指数均小于 d_i , 故总数至多 $d_1 \cdots d_n$ 。□

本节把有限维商代数称为零维商代数。它与素理想链意义的零维一致: 有限维代数是 Artin 环, 素理想都极大; 反之, 有限型 k 代数是 Noether 环, 若所有素理想都极大, 则由定理 3.3.4 和定理 3.3.2 知它有有限合成列, 每个简单因子是某个极大理想的剩余域。推论 6.1.2 保证这些剩余域在 k 上有限维, 逐个相加便得 $\dim_k A < \infty$ 。第 9 章将系统定义和讨论 Krull 维数。

设标准单项式基为 $B = (b_1, \dots, b_D)$ 。对 $a \in A$, 记乘法映射 $m_a: A \rightarrow A, v \mapsto av$ 在此基下的矩阵为 T_a , 称为乘法矩阵 (multiplication matrix)。其第 j 列就是 ab_j 的正规形系数列。因此 $T_a T_b = T_{ab}$, 各 T_{x_i} 两两交换, 且对任意 $f \in R$ 有

$$T_{\bar{f}} = f(T_{x_1}, \dots, T_{x_n}).$$

映射 $a \mapsto T_a$ 是单射, 因为 $m_a(1) = a$ 。特别地, $f \in I$ 当且仅当这个矩阵为零; a 为单位当且仅当 T_a 可逆, 后者的逆作用于 1 就给出 a^{-1} 。

对 $I = (x - y^2, y^3 - 1)$, 取基 $(1, y, y^2)$, 则

$$T_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_x = T_y^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $x^2 = y, x^3 = 1$ 都可以直接从矩阵乘法读出。Sturmfels 在 [3, Section 2.3, pp. 17–19] 中进一步讨论了乘法矩阵与方程求解的联系。

8.5.2 商代数的维数、重数与约化性

商空间的维数计入了剩余域的次数及幂零元所造成的重数。为看清这两项贡献, 先在任意域 k 上写出 Artin 分解

$$A \simeq \prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{m}_i}, \quad L_i = A/\mathfrak{m}_i.$$

由定理 3.3.3, 这些正是全部局部因子。设 ℓ_i 为 $A_{\mathfrak{m}_i}$ 在自身上作为模的长度。局部环的简单模只有 L_i , 沿合成列计算 k 维数得到

$$\dim_k A = \sum_{i=1}^r \ell_i [L_i : k]. \quad (8.6)$$

因子 ℓ_i 称为这一闭点的重数。当 k 代数闭时, $L_i = k$, 故 $D = \sum_i \ell_i$; 此时不同点数等于 D 当且仅当每个局部因子都是 k , 也就是 A 约化。

这个等价可以不借助任何求根公式来证明。局部 Artin 环的极大理想是幂零理想, 所以约化时它只能为零, 局部因子成为域; 反之, 域的有限直积没有非零幂零元。若 k 不代数闭, 则即使 A 约化, 各 $[L_i : k]$ 仍可能大于一。例如 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 维数为二, 有一个闭点而没有实坐标点。

在前述三维代数 $k[x, y]/(x - y^2, y^3 - 1)$ 中, 若 k 代数闭且特征不为三, $y^3 - 1$ 有三个不同的根, 代数为 k^3 。若特征为三, 则 $y^3 - 1 = (y - 1)^3$, 代数同构于 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$, 只剩一个重数为三的点。这两种情形有完全相同的标准单项式数和乘法矩阵公式, 却有不同约化性。

基域扩张也须留意可分性。令 $k = \mathbb{F}_p(s)$, 则 $A = k[t]/(t^p - s)$ 是维数为 p 的域: s 不是 k 中的 p 次幂, 其不可约性已在例 7.3.4 中通过最小多项式系数证明。但扩张到含 $s^{1/p}$ 的域后, 关系变成 $(t - s^{1/p})^p = 0$ 。所以原代数约化, 不代表基域扩张后仍约化; 谈几何点的数目时, 不能略去这一差别。

8.5.3 FGLM 换序与零维假设

同一个零维理想在两种单项式序下的标准单项式可能不同, 却给出同一个有限维向量空间。已知一种序下的 Gröbner 基后, 可以用其正规形把任意单项式表示成 k^D 中的列向量, 再按照新的单项式序寻找线性相关关系。这就是 FGLM 换序方法的基本思想。

具体地, 已有若干线性无关的单项式剩余类时, 考察它们乘各变量所得的候选单项式。若一个候选 m 的向量在先前较小单项式的线性生成空间中, 写成

$$\bar{m} = \sum_j c_j \bar{b}_j,$$

便得到首单项式为 m 的关系 $m - \sum_j c_j b_j \in I$; 其倍数无需再作为基候选。若向量独立, 则把它加入新的基。所有向量均可由乘法矩阵计算。候选的组织方式、完整算法和终止性证明放在附录 B; 这里先说明为什么新问题能转为有限维线性代数。

例如旧序 $x > y$ 的字典序给出基 $\{x - y^2, y^3 - 1\}$ 。改用 $y > x$ 后, 在旧商空间中 $1, x, x^2$ 依次对应 $1, y^2, y$, 因而独立; 随后 $x^3 = 1, y = x^2$ 给出新基 $\{y - x^2, x^3 - 1\}$ 。这次换序只须三维空间中的计算, 不需要从原生成元重新完成所有 S -多项式约化。

零维条件提供的是有限的 D 和有限个 $D \times D$ 乘法矩阵。对 $k[x, y]/(y) \simeq k[x]$, 单项式 $1, x, x^2, \dots$ 永远线性无关, 不能沿用这一有限维计算框架。正维理想仍有有限 Gröbner 基, 但那是另一种有限性。

8.5.4 三角形式、有理单变量表示与退化分支

若能找到一个元素 $t \in A$ 使 $1, t, \dots, t^{D-1}$ 成为 k 基, 那么每个坐标都能写成 $x_i = q_i(t)$, 且 t 满足一个首一 D 次多项式 p 。于是

$$A \simeq k[T]/(p(T)), \quad x_i = q_i(T).$$

这是一种三角描述: 先解一个一元方程, 再恢复全部坐标。它需要 A 是单生成代数, 不能仅从有限维性推出。

命题 8.5.2. 设 k 为代数闭域, $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 是根理想, 且商代数维数为 $D < \infty$ 。存在一个线性形式 $t = \sum c_i x_i$, 在所有零点上取值两两不同。对任意这样的 t , 存在无重根的首一 D 次多项式 $p(T)$ 及次数小于 D 的 $q_i(T)$, 使上述同构成立。

证明. 由式(8.6)及约化性, $A \simeq k^D$, 各因子对应点 $P_1, \dots, P_D$ 。对每对不同点, 等式 $\sum c_i (P_{ji} - P_{hi}) = 0$ 定义系数空间中的一个真超平面。无限域上的有限个真超平面不能覆盖整个空间: 这些非零线性多项式之积非零, 而非零多项式不在无限域的全部点上消失, 后一事实对变量数归纳即可。故可以选取避开这些超平面的 c 。

令 $\lambda_j = t(P_j)$, 取 $p(T) = \prod_j (T - \lambda_j)$ 。Lagrange 插值给出次数小于 D 的 q_i , 满足 $q_i(\lambda_j) = P_{ji}$ 。映射 $k[T] \rightarrow k^D, f \mapsto (f(\lambda_j))_j$ 满射, 核为 (p) , 并把 q_i 送到第 i 个坐标函数, 这就给出所需同构。□

也可把坐标写为 $x_i = q_i(T)/q_0(T)$ 。若 $\gcd(q_0, p) = 1$, Euclid 算法给出 $uq_0 + vp = 1$, 从而 q_0 在 $k[T]/(p)$ 中可逆; 这种写法称为**有理单变量表示** (rational univariate representation), 没有增加或丢失根。如果 q_0 与 p 有公因子, 分母为零的根不能直接代入; 在无重根情形应先按 $\gcd(p, q_0)$ 与其互素补因子分支, 在含重根情形则必须保留相应幂次, 另行计算局部因子。

最后列出两种不能忽略的情形。有限域上的线性形式未必分离全部有理点, 例如 $\mathbb{F}_2^2$ 的四个点不可能通过一个 $\mathbb{F}_2$ 值的函数取得四个不同值。含幂零元的代数也未必单生成: $k[x, y]/(x, y)^2$ 维数为三, 每个元素都形如 $c + n, n^2 = 0$, 其生成的子代数最多二维。一般零维计算因此要允许域扩张、多个三角分支或更一般的有限代数表示; 不能把一个漂亮的单变量形式当作无条件存在的输出。

本章小结

全局单项式序提供严格下降, Dickson 引理提供有限性。二者结合, 既保证多元除法和补充生成元的过程终止, 也使理想的全部首项能够由有限个首项控制。Buchberger 判据把最高项抵消归结到有限对的有界表示, 约化基则为固定次序下的理想给出唯一描述。

消去把投影和理想运算化为扩展多项式环中的计算。几何投影通常只得到闭包; 参数分母、特殊取值和不能提升的点仍须另行检查。两向生成元表示证明理想相等, S 多项式的约化证明 Gröbner 性, 二者承担不同任务。

零维商代数把问题带入有限维线性代数。标准单项式数计算代数维数，局部因子的长度记录重数，乘法矩阵保留坐标之间的全部关系。后续维数与 Hilbert 函数将把这种有限计数推广为多项式增长；本章的精确首项方法也将用于泛自由性的证明。

习题

习题 8.1. 对变量顺序 $x \succ y \succ z$ ，分别按字典序、分次字典序和分次逆字典序将 x^4, x^2z, xy^2, yz^3 从大到小排列。

解. 字典序先看 x 的指数，得到 $x^4 \succ x^2z \succ xy^2 \succ yz^3$ 。分次字典序先分成四次与三次两组，再看字典序，得到 $x^4 \succ yz^3 \succ x^2z \succ xy^2$ 。分次逆字典序中，三次两项的最后一个不同坐标是 z 的指数，较小者较大，故得到 $x^4 \succ yz^3 \succ xy^2 \succ x^2z$ 。□

习题 8.2. 给定正整数权 $w_1, \dots, w_n$ ，先比较 $\sum_i w_i \alpha_i$ ，相同再按字典序比较。证明这给出全局单项式序。若允许负权，这个证明在哪一步失效？

解. 权重值相加，差向量不变，所以乘法相容。任意非空指数集先有最小权重；因各 $w_i > 0$ ，不超过某个固定权重的指数只有有限个，从中按字典序取最小者便得良序。若某个 $w_i < 0$ ，则 $1 \succ x_i \succ x_i^2 \succ \dots$ ，良序性失效。这不是只须调整同权时的比较即可修复的问题。□

习题 8.3. 求 $J = (x^3y, x^2y^2, xy^3, x^4y)$ 的极小单项式生成组，并判断 x^2y^3, x^3 是否属于 J 。再说明无限变量环中的理想 $(x_1, x_2, \dots)$ 不存在有限生成组。

解. x^4y 被 x^3y 整除，其余三项互不整除，故极小组为 x^3y, x^2y^2, xy^3 。 x^2y^3 被后二者整除，属于 J ； x^3 不含 y ，不属于 J 。无限变量环中，若上述理想由有限个多项式生成，这些多项式只涉及有限个变量。它们都无常数项，把涉及的变量全置零后，生成理想映为零，但某个未涉及的 x_j 仍非零，矛盾。□

习题 8.4. 在 $k[x, y]$ 的字典序 $x \succ y$ 下，用 $g_1 = xy - 1, g_2 = y^2 - y$ 的两种排列分别除 $f = xy^2$ 。找出应补入的关系，并给出原理想的约化 Gröbner 基。

解. 先用 g_1 得 $f = yg_1 + y$ ，余式为 y 。先用 g_2 ，得到 $f = xg_2 + xy = xg_2 + g_1 + 1$ ，余式为一。差 $y - 1 = (1 - y)g_1 + xg_2$ 在原理想中。又

$$x - 1 = g_1 - x(y - 1), \quad g_1 = y(x - 1) + (y - 1), \quad g_2 = y(y - 1).$$

所以原理想是 $(x - 1, y - 1)$ 。其首单项式 x, y 互素，两多项式首一且尾项均为常数，乘积判据说明它们构成约化 Gröbner 基。此时 f 的正规范式是一。□

习题 8.5. 在字典序 $x \succ y$ 下计算 $I = (x^2 - y, xy)$ 的约化 Gröbner 基和标准单项式，并在商环中计算 x^3, y^2 。

解. 初始 S 多项式为 $y(x^2 - y) - x(xy) = -y^2$, 故加入 y^2 . 三对 S 多项式分别为 $-y^2$ 、 $-y^3$ 、零, 均约化为零. 因此

$$G = \{x^2 - y, xy, y^2\}, \quad \mathcal{B} = \{1, x, y\}.$$

各尾项不可再约化, 所以该基约化. 商中 $x^3 = x(x^2 - y) + xy = 0$, 且 $y^2 = 0$, 但 $x^2 = y \neq 0$, 后一点由标准单项式独立性保证. $\square$

习题 8.6. 对习题 8.5 的理想, 改用字典序 $y \succ x$, 求约化基, 并写出两组标准单项式基之间的变换.

解. 令 $h = y - x^2$. 有 $h = -(x^2 - y)$ 、 $x^3 = x(x^2 - y) + xy$, 反向 $xy = xh + x^3$, 故 $I = (h, x^3)$. 首单项式 y, x^3 互素, 得到约化基 $\{y - x^2, x^3\}$. 新标准基是 $(1, x, x^2)$, 旧基为 $(1, x, y)$, 在商中第三项相同, 所以按此顺序的换基矩阵是单位矩阵; 它们所用的多项式代表却不同. $\square$

习题 8.7. 在字典序 $x \succ y$ 下, 证明 $\{x^2 + y, y^2 + 1\}$ 是 Gröbner 基, 并求 $x^4 + y^2$ 的正规式. 结果随 $\text{char } k = 2$ 有何变化?

解. 首单项式 x^2, y^2 互素, 乘积判据适用. 商中 $x^2 = -y$ 、 $y^2 = -1$, 故 $x^4 + y^2 = 2y^2 = -2$, 常数已为标准余式. 特征二时正规式为零, 原多项式属于理想; 其他特征下不属于. 两种情况下所给基仍是 Gröbner 基. $\square$

习题 8.8. 说明 $\{x^2 + y, xy + 1\}$ 在字典序 $x \succ y$ 下不是 Gröbner 基, 尽管它当然生成自己的理想. 给出一个属于该理想却对这组除法留下非零余式的多项式.

解. 取 S 多项式 $y(x^2 + y) - x(xy + 1) = y^2 - x$. 其首单项式为 x , 不能被 x^2 或 xy 整除, 其他项 y^2 也不能, 故余式就是非零的 $y^2 - x$. 这违反 Gröbner 基的成员判据. 理想相等只检查生成关系, 不能取代首项控制. $\square$

习题 8.9. 设 $p(y)$ 首一且次数 $d \geq 1$, $h(y) \in k[y]$. 在字典序 $x \succ y$ 下, 证明 $G = \{x - h(y), p(y)\}$ 是 Gröbner 基, 并写出它约化的充要条件及任意 f 的正规式求法.

解. 首单项式为 x, y^d , 互素, 故为 Gröbner 基. 第一元素的尾项不可被 y^d 整除恰当且仅当 $\deg h < d$, 零多项式也允许; 第二元素只有较低的 y 次幂, 所以这就是约化的充要条件. 差 $f(x, y) - f(h(y), y)$ 被 $x - h(y)$ 整除, 这由每个 $x^j - h(y)^j$ 的差幂公式得到. 先代入 $x = h(y)$, 再除以 p , 余式只含 $1, y, \dots, y^{d-1}$, 因此为唯一正规式. $\square$

习题 8.10. 对参数 $x = t^2, y = t^3$, 求 $k[t, x, y]$ 中 $(x - t^2, y - t^3)$ 与 $k[x, y]$ 的交, 并说明全部几何点能否提升成参数点.

解. 代入同态的核就是所求交. 显然 $y^2 - x^3$ 在核中; 对它按 y 作首一除法, 任意余式形如 $a(x) + yb(x)$. 代入后成为 $a(t^2) + t^3b(t^2)$, 前者只有偶次幂, 后者只有奇次幂, 且各组内部指数互异, 故只有 $a = b = 0$ 才能为零. 因此交为 $(y^2 - x^3)$. 对任一扩域中的点 (a, b) , 若 $a \neq 0$, 取 $t = b/a$, 由 $b^2 = a^3$ 得 $t^2 = a, t^3 = b$; 若 $a = 0$, 则 $b = 0$, 取 $t = 0$. 这里的提升来自具体公式, 并非一般闭包定理. $\square$

习题 8.11. 设 k 代数闭, $X = Z_k(u - x, v - xy) \subseteq k^4$. 求向 (u, v) 平面的投影像、消去理想及其零点集, 并描述不能提升成 X 中点的那些平面点。

解. 若 $u \neq 0$, 取 $x = u, y = v/u$ 即可提升; 若 $u = 0$, 则 $x = 0$, 只能有 $v = 0$. 因此像为 $\{u \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$. 商环同构于 $k[x, y]$, 其中 $u \mapsto x, v \mapsto xy$. 不同单项式 $u^i v^j$ 映成不同的 $x^{i+j} y^j$, 故限制同态 $k[u, v] \rightarrow k[x, y]$ 单射, 消去理想为零. 其零点集及投影闭包都是整个平面; 遗漏的点恰为 $u = 0, v \neq 0$, 并非某个完整不可约分支. $\square$

习题 8.12. 在 $k[x, y]$ 中求 $(x^2, y) \cap (x, y^2)$, 并给出每个输出生成元属于两理想的表示。

解. 单项式属于交, 当且仅当同时被第一组和第二组中的某项整除, 因而被某一对生成元的最小公倍式整除. 四个最小公倍式为 $x^2, x^2 y^2, xy, y^2$, 删去冗余得交为 (x^2, xy, y^2) . 分别有 $x^2 = 1 \cdot x^2 = x \cdot x$, $xy = x \cdot y = y \cdot x$, $y^2 = y \cdot y = 1 \cdot y^2$, 即为两侧的成员表示. 单项式成员判据同时证明这些生成元已经穷尽交理想. $\square$

习题 8.13. 设 $I = (x^3, x^2 y, y^3) \subset k[x, y]$. 计算 $(I : x^2)$ 、 $(I : y)$ 及 $(I : (x, y))$ 。

解. 单项式理想除以单项式 m 的理想商由 $u / \gcd(u, m)$ 生成, 其中 u 遍历原生成元; 逐个指数比较即可验证. 于是

$$(I : x^2) = (x, y), \quad (I : y) = (x^3, x^2, y^2) = (x^2, y^2).$$

同理 $(I : x) = (x^2, xy, y^3)$. 与 (x^2, y^2) 取交, 使用两组最小公倍式, 删去冗余后得到

$$(I : (x, y)) = (x^2, xy^2, y^3).$$

$\square$

习题 8.14. 设 $I = (xy) \subset k[x, y]$. 求 $(I : x^\infty)$ 、 $(I : y^\infty)$ 、 $(I : (x, y)^\infty)$ 和 $(I : (xy)^\infty)$, 并解释后两者为什么不同。

解. 由于 x, y 互素, 某个 $x^N h$ 被 xy 整除恰等价于 $y \mid h$, 所以第一项为 (y) ; 第二项同理为 (x) . 多生成元饱和的交公式给出第三项为 $(x) \cap (y) = (xy)$. 因 $xy \in I$, 第四项含一, 等于全环. 第三项要求一个足够高幂理想中的全部乘子有效, 第四项只允许乘积 xy 的幂, 量词和乘法集合不同. $\square$

习题 8.15. 设 $I = (x^2, y^3)$. 给出一个适用于任意特征的恒等式, 证明 $x + y \in \sqrt{I}$, 并据此写出 $1 \in I k[x, y, u] + (1 - u(x + y))$ 的证书。

解. 展开得

$$(x + y)^4 = x^2(x^2 + 4xy + 6y^2) + y^3(4x + y).$$

这个整数系数恒等式在任意特征下都成立. 记 $f = x + y$, 则

$$1 = u^4 f^4 + (1 - uf)(1 + uf + u^2 f^2 + u^3 f^3).$$

将第一式代入第二式的 f^4 , 便得到一关于 $x^2, y^3, 1 - uf$ 的显式表示. 证书不依赖求出任何零点. $\square$

习题 8.16. 在 $k[t, x, u]$ 中令 $H = (tx - 1, ut - 1)$ 。计算 $H \cap k[x]$ ，并比较参数 $x = 1/t$ 、 $t \neq 0$ 的像与其闭包。为什么不能只消去方程 $tx - 1$ 后宣称每个点都可取参数？

解. 商环由 t, t^{-1} 生成，且 $x = u = t^{-1}$ ，同构于 $k[t, t^{-1}]$ 。限制映射 $k[x] \rightarrow k[t, t^{-1}]$ 单射，所以交为零。在代数闭域上，参数像为 $k^\times$ ，闭包为整条直线；零不能提升。消去计算保留了所有多项式关系，却不把“参数分母非零”转成普通闭方程。即使加入辅助变量保证分母可逆，投影后仍可能漏点。□

习题 8.17. 将 $I = (ax - y, y^2 - y)$ 视为 $k(a)[x, y]$ 中的理想，求字典序 $x \succ y$ 的约化 Gröbner 基。讨论专门化 $a = c$ 后的商代数及其维数，并说明为什么 $a = 0$ 要单独处理。

解. 在有理函数域中，约化基为 $\{x - a^{-1}y, y^2 - y\}$ ，两首单项式 x, y^2 互素且尾项不可约。对 $c \neq 0$ ，可直接代入，商代数同构于 $k[y]/(y^2 - y) \simeq k \times k$ ，维数二，两个点为 $(0, 0), (c^{-1}, 1)$ 。当 $c = 0$ 时，原生成组成为 $-y, y^2 - y$ ，理想为 (y) ，商为 $k[x]$ ，维数无限。原基含分母 a ，在零处没有定义；单纯删去其分母会错误保留泛点处才成立的条件。□

习题 8.18. 在 $\mathbb{F}_2[\alpha] = \mathbb{F}_2[z]/(z^2 + z + 1)$ 上取 $I = (x - \alpha y, y^2 - 1)$ ，按字典序 $x \succ y$ 求约化基、标准基及 x^2 的正规式；这个商代数约化吗？

解. 给定两生成元首一旦首单项式互素，尾项均不可约，已构成约化基；标准基为 $1, y$ 。由 $\alpha^2 = \alpha + 1$ 得 $x^2 = \alpha^2 y^2 = \alpha + 1$ 。但特征二下 $y^2 - 1 = (y - 1)^2$ ，商中的 $y - 1$ 非零而平方为零，故商不约化。系数域本身的不可约定义多项式并不保证另一个商代数约化。□

习题 8.19. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中和 $\mathbb{F}_2[x]$ 中分别计算由整系数多项式 $2x, x + 1$ 生成的理想。说明一次模素数计算为何不能自动证明有理数域中的理想相等。

解. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，

$$1 = (x + 1) - \frac{1}{2}(2x),$$

故理想为全环。在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中第一生成元变成零，理想为 $(x + 1)$ 。原证书的分母二在该特征下不可逆，原首系数也消失。因此模素数计算可以提供线索，但要回到有理数域验证精确表示，并排除坏素数。□

习题 8.20. 在 $k[x]$ 中分别用 $F = \{x^2\}, G = \{x\}$ 和 $F = \{x\}, G = \{x^2\}$ ，说明只核验原生成元对候选组的零余式，或者只核验候选组属于原理想，都不能证明两组理想相等。

解. 第一组有 $x^2 = x \cdot x$ ，故 F 对 G 的余式为零，但 $x \notin (x^2)$ ，仅得到 $(F) \subseteq (G)$ 。第二组中 $x^2 \in (x)$ ，候选元素确属原理想，但 $x \notin (x^2)$ ，仅得到 $(G) \subseteq (F)$ 。两个候选单元组本身都是 Gröbner 基；仍须同时验证两向理想包含。□

习题 8.21. 设 $n \geq 2$ ， $I = (x_{i+1} - x_i^2 \mid 1 \leq i < n)$ 。求 $I \cap k[x_1, x_n]$ ，并给出关系 $x_n - x_1^{2^{n-1}}$ 属于 I 的递推证明。

解. 记 $h_j = x_j - x_1^{2^{j-1}}$. 有 $h_1 = 0$, 且

$$h_{j+1} = (x_{j+1} - x_j^2) + (x_j + x_1^{2^{j-1}})h_j.$$

递推得到 $h_n \in I$. 另一方面, 商环通过逐次代入同构于 $k[x_1]$. 任一 $f(x_1, x_n)$ 对首一 h_n 除法, 余式只含 x_1 ; 若 $f \in I$, 该余式在商环中为零, 只能是零多项式. 所以交理想恰为 (h_n) . 输入二次关系的数目随 n 线性增长, 输出关系的次数却为 2^{n-1} . $\square$

习题 8.22. 令 $I_\varepsilon = (x^2 - \varepsilon, xy, y^2) \subseteq \mathbb{R}[x, y]$. 比较 $\varepsilon = 0$ 、 $\varepsilon > 0$ 、 $\varepsilon < 0$ 时商代数的维数、约化性及实零点, 说明小的系数扰动可以改变哪些性质.

解. $\varepsilon = 0$ 时理想为 $(x, y)^2$, 商有基 $1, x, y$, 维数三, 非约化, 实零点只有原点. 若 $\varepsilon \neq 0$, 商中 $x^2 = \varepsilon$ 使 x 可逆, 再由 $xy = 0$ 得 $y = 0$; 反向 $y = \varepsilon^{-1}(x(xy) - y(x^2 - \varepsilon))$ 给出理想中的显式表示. 因此商为 $\mathbb{R}[x]/(x^2 - \varepsilon)$, 维数二且约化. 正参数时有两个实根, 商为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$; 负参数时无实根, 商为一个同构于 $\mathbb{C}$ 的域. 任意小的参数区间都包含这三种不同情形, 近似系数不能单独决定上述离散数据. $\square$

习题 8.23. 对 $A = k[x, y]/(x^2 - y, xy)$, 用基 $(1, x, y)$ 写出 T_x, T_y , 求 T_x 的最小多项式, 并计算 $(1 + x)^{-1}$.

解. 由习题 8.5,

$$T_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_y = T_x^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$T_x^3 = 0$ 、 $T_x^2 \neq 0$, 所以最小多项式为 T^3 . 商中 $(1 + x)(1 - x + y) = 1$, 因为 $x^2 = y$ 、 $xy = 0$. 故逆为 $1 - x + y$, 任意特征下均成立. $\square$

习题 8.24. 设 k 为域. 对 $A = k[x, y]/(x - y, y^2(y - 1)^2)$, 求其标准单项式数、局部因子及各点重数. 为什么底域已经含有全部根仍不能把维数当作不同点数?

解. 字典序 $x \succ y$ 的三角基给出标准单项式 $1, y, y^2, y^3$, 所以维数四. 因 y^2 与 $(y - 1)^2$ 互素, 中国剩余定理给出

$$A \simeq k[y]/(y^2) \times k[y]/((y - 1)^2).$$

两个局部因子均长二, 分别对应 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$, 故每个点重数二. 非零幂零元保留在局部因子中, 底域是否含根不能将它们消去. 零与一在任意特征下都不同, 因而这里不需要排除特征二. $\square$

习题 8.25. 设 k 代数闭, $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$ 非零且有限维, T_i 为坐标乘法矩阵. 证明零点 $a \in Z_k(I)$ 恰对应一组共同特征值: 存在非零 v , 使 $T_i v = a_i v$ 对所有 i 成立. 这是 Sturmfels 的《Solving Systems of Polynomial Equations》中 [3, Theorem 2.6, pp. 17–18] 的结论; 本题要求包括非约化情形.

解. 若有这样的 v , 则任意 $f \in I$ 满足 $0 = f(T_1, \dots, T_n)v = f(a)v$, 所以 $f(a) = 0$. 反过来, 对零点 a 取相应的局部 Artin 因子 A_{m_a} . 其极大理想 $\mathfrak{n}$ 幂零; 若 $\mathfrak{n} = 0$, 取 $v = 1$, 否则取最后一个非零幂 $\mathfrak{n}^r$ 中的非零 v , 使 $\mathfrak{n}v = 0$. 由于 $x_i - a_i \in \mathfrak{n}$, 有 $x_i v = a_i v$. 把这个 v 放入该局部因子、其余因子取零, 就得到 A 中所需非零向量. 此证明不要求 I 为根理想. $\square$

习题 8.26. 在习题 8.25 的条件下, 证明所有 T_i 能同时对角化, 当且仅当 A 约化. 此结论见 [3, Corollary 2.7, p. 18], 这里要求写出两个方向的证明.

解. 若 A 约化, 局部 Artin 分解及代数闭性给出 $A \simeq k^D$. 取各因子的一作为基, 所有乘法算子同时为对角矩阵. 反过来, 若 T_i 同时对角化, 每个 T_a 都是它们的多项式, 也为对角矩阵. 若 a 幂零, 则 T_a 是幂零对角矩阵, 只能为零; 乘法表示单射, 故 $a = 0$. 因此 A 约化. $\square$

习题 8.27. 已知 $I = (x - y^2, y^3 - y)$ 的字典序 $x \succ y$ Gröbner 基. 用商空间基 $1, y, y^2$ 找出字典序 $y \succ x$ 的约化基, 并写出新标准单项式.

解. 商中 $x = y^2$, 故 $x^2 = x, xy = y, y^2 = x$. 因此候选基为

$$G' = \{y^2 - x, xy - y, x^2 - x\}.$$

第一关系是原生成元的负数; 第二为 $y(x - y^2) + (y^3 - y)$; 第三由 $x^2 - x = (x + y^2 - 1)(x - y^2) + y(y^3 - y)$ 给出. 反向 $x - y^2 = -(y^2 - x), y^3 - y = y(y^2 - x) + (xy - y)$, 故理想相等. 三对 S 多项式依次可写为 $y^2 - x^2 = (y^2 - x) - (x^2 - x), xy^2 - x^3 = x(y^2 - x) - x(x^2 - x)$, 零; 在该序下均可约化为零. 该组已经约化, 标准单项式为 $1, x, y$, 其旧坐标分别为 $1, y^2, y$. $\square$

习题 8.28. 在 $\mathbb{Q}^2$ 中取三点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$, 令 A 为它们的坐标代数. 证明 $t = x + 2y$ 生成 A , 并写出满足 $x = q_x(t), y = q_y(t)$ 的二次以下多项式.

解. t 的取值依次为 $0, 1, 2$, 互不相同. 取

$$p(T) = T(T - 1)(T - 2), \quad q_x(T) = T(2 - T), \quad q_y(T) = \frac{1}{2}T(T - 1).$$

这两个坐标多项式在三点分别给出 x, y 的取值. 评价同态给出 $A \simeq \mathbb{Q}^3$, 而 T 的三个取值不同, 使 $\mathbb{Q}[T]/(p) \rightarrow A$ 为同构. 分母二也说明这份具体公式不能未经重算就搬到特征二. $\square$

习题 8.29. 设 $p(T) = T(T - 1)(T - 2) \in \mathbb{Q}[T]$. 判断 $T + 1$ 与 T 在 $\mathbb{Q}[T]/(p)$ 中是否可逆; 对前者给出逆, 对后者说明使其可逆会丢去哪一个点.

解. 对 $T + 1$ 的逆在 $0, 1, 2$ 处应分别取 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$. 插值得

$$u(T) = 1 - \frac{2}{3}T + \frac{1}{6}T^2, \quad (T + 1)u(T) - 1 = \frac{1}{6}p(T).$$

故 u 是逆. T 在零处为零, 不是单位; 把它变为单位只保留根一、二对应的两个因子, 丢掉根零. 因此带分母的单变量表示必须同时检查分母和 p 互素, 或明确分支范围. $\square$

习题 8.30. 设 $r \geq 2$, $A = k[x_1, \dots, x_r]/(x_1, \dots, x_r)^2$. 证明 A 作为 k 代数的最少生成元恰为 r . 再说明有限域上的约化有限代数也未必单生成。

解. 记 $\mathfrak{m} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_r)$, 则 $\mathfrak{m}^2 = 0$, 且 $\dim_k \mathfrak{m} = r$. 若代数生成元为 $a_j = c_j + n_j$, $1 \leq j \leq s$, 其中 $n_j \in \mathfrak{m}$, 由于任何两个 n_j 的乘积为零, 每个生成的多项式都在 $k + \sum_j kn_j$ 中. 因此若它们生成全部 A , 必须使 n_j 线性生成 $\mathfrak{m}$, 从而 $s \geq r$. 原来的 r 个变量已经生成, 所以最少数为 r . 约化例取 $B = \mathbb{F}_2^3$. 一个元素的三个坐标只能取零、一, 至少两个坐标相同; 其任意多项式在这两坐标也相同, 不能生成全部 B . 有限维性本身不保证单变量描述. $\square$

第九章 Krull 维数与高度定理

Krull 维数用素理想链的长度衡量环和模。本章先比较商、局部化及支集中的链，再独立证明主理想定理和广义高度定理。有限型代数的维数通过 Noether 正规化转化为超越次数；局部环的维数则等于参数系的长度。将它与极大理想的最少生成元数比较，得到嵌入维数和正则局部环的定义。

本章目标

- 按严格包含的次数计算链长，区分高度、商环维数和模的支集维数。
- 在主理想定理中辨认极小性，并用高度界限制方程和生成元的个数。
- 利用超越次数、整扩张及正规化计算有限型代数的维数。
- 构造参数系，计算嵌入维数，区分参数、极大理想生成元和正则性。

本章使用第一章至第六章中的素谱、局部化、Noether 条件、准素理想、Nakayama 引理和整扩张；超越次数仍指一组超越基的元素个数，其域论基础见第一卷第 14.3 节。高度定理的证明先于 Hilbert 函数和 Artin–Rees 引理，后面的章节可以直接调用它。正则局部环在这里仅建立定义和基本算例，一般结构定理留在第十八章。

有限型整代数的维数公式可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, Theorem 5.6, pp. 34–35]；高度定理和逐次商环的维数见 [2, Theorems 13.5–13.6, pp. 100–101]，参数系与嵌入维数的定义见 [2, §14, Systems of parameters and multiplicity, pp. 104–105]。本章采用不依赖增长函数的高度定理证明，以适合本卷的讲授次序。

9.1 维数与高度

素谱中的点既可以独立出现，也可以按包含关系排列。一个不可约闭集内还有多少层更小的不可约闭集，是维数要记录的问题。以下的链长只计算严格包含的次数；不假设所有极大链一样长，也不预设任何几何图像中的维数公式。

9.1.1 素理想链、环维数与理想高度

定义 9.1.1. 设 R 为交换环。其有限素理想链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

的长度 r 的上确界称为 R 的 **Krull 维数** (Krull dimension)，记为 $\dim R$ 。对素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$ ，以 $\mathfrak{p}$ 为末项的此类链长的上确界称为它的**高度** (height)，记为 $\text{ht } \mathfrak{p}$ 。真理想 $I \subseteq R$ 的高度定义为

$$\text{ht } I = \inf_{\mathfrak{p} \supseteq I} \text{ht } \mathfrak{p}.$$

允许维数或高度为 $+\infty$ 。零环的谱为空，约定其维数为 $-\infty$ ；单位理想的高度不在本章使用。

域只有一个素理想 0 ，所以维数为零。整数环的非零素理想都是极大理想，故 $\dim \mathbb{Z} = 1$ 。一元多项式环 $k[t]$ 同样为一维：它是主理想整环，每个非零素理想由不可约多项式生成，因而极大。零维并不表示素谱只有一个点；有限个域的直积已经给出多个点。

命题 9.1.2. 设 R 为交换环， $I \subseteq R$ 为理想， $R_{\text{red}} = R/\sqrt{(0)}$ 。则有 $\dim(R/I) \leq \dim R$ ，而 $\dim R_{\text{red}} = \dim R$ 。若 $\mathfrak{p}$ 为素理想，且有关数均有限，则

$$\text{ht } \mathfrak{p} + \dim(R/\mathfrak{p}) \leq \dim R.$$

有限直积的维数等于各非零因子的维数的最大值。

证明. 商环的素理想链对应原环中包含 I 的链；模掉幂零根时，所有素理想都保留，故链长完全不变。对第二式，取一条末项为 $\mathfrak{p}$ 的最长链，以及一条首项为 $\mathfrak{p}$ 的最长链，接在一起即可。有限整数的上确界能取到，故这些链存在。直积环的素理想分别来自一个因子，不同因子所对应的素理想互不包含，所以任何链都留在同一个因子中。 $\square$

上述不等式不能在没有附加条件时写成等式。高度测量点以下的链，商环维数测量点以上的链；两段能连接起来，不表示任何最长链都经过这个指定点。

9.1.2 模的维数与支集

定义 9.1.3. 设 R 为交换环， M 为 R 模。支集 $\text{Supp}_R M = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}$ 内有限严格素理想链长的上确界称为 M 的**维数** (dimension of a module)，记为 $\dim_R M$ 。空支集的维数取 $-\infty$ 。

若 M 有限生成，定理 2.3.2 给出 $\text{Supp}_R M = V(\text{Ann}_R M)$ ，所以

$$\dim_R M = \dim(R/\text{Ann}_R M). \quad (9.1)$$

这里的维数不是生成元个数，也不是向量空间维数。例如 $R = k[x]$ 上的 R^r ， $r \geq 1$ ，都有支集 $\text{Spec } R$ ，故维数均为一；而 $R/(x^n)$ ， $n \geq 1$ ，的支集只有一个闭点，维数为零，其 k 向量空间维数却为 n 。

命题 9.1.4. 若 R 为交换 Noether 环， $M \neq 0$ 为有限 R 模，则

$$\dim_R M = \max_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R M} \dim(R/\mathfrak{p}).$$

若 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 为有限模的短正合列，则

$$\dim_R M = \max\{\dim_R L, \dim_R N\}.$$

证明. 由命题 4.1.7，支集中每个素理想都包含某个关联素理想，且关联素理想有限。因此支集等于这些 $V(\mathfrak{p})$ 的有限并。任一链的最小项包含某个这样的 $\mathfrak{p}$ ，整条链便落在 $V(\mathfrak{p})$ 中，得到第一式。短正合列的支集是两端支集之并，见命题 2.3.4。因有限模的支集是闭集，链的最小项落在哪一端，整条链就留在该端，故得到最大值公式。 $\square$

9.1.3 局部化对维数的影响

命题 9.1.5. 设 R 为交换环, $\mathfrak{p} \subseteq R$ 为素理想, $S \subseteq R$ 为乘法集。则有

$$\dim R_{\mathfrak{p}} = \text{ht } \mathfrak{p}, \quad \dim S^{-1}R \leq \dim R, \quad \dim R = \sup_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} \dim R_{\mathfrak{m}}.$$

若 M 为有限 R 模, 则 $\dim_{S^{-1}R} S^{-1}M \leq \dim_R M$ 。零环情形的空上确界同样取 $-\infty$ 。

证明. 局部化素理想对应保留包含关系。 $R_{\mathfrak{p}}$ 的素理想恰好对应包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想, 每条这样的链都可在末端补上 $\mathfrak{p}$, 所以其维数就是高度。一般局部化只保留不遇到 S 的素理想, 故不能增加链长。任一有限素链的末项包含于某个极大理想; 在该极大理想处局部化保留整条链, 得到第三式。

对模, 若 $\mathfrak{q} \cap S = \emptyset$, 则先在 S 处局部化、再在 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 处局部化, 与直接取 $M_{\mathfrak{q}}$ 相同。两者均由允许 $R \setminus \mathfrak{q}$ 中的分母给出, 分式的互逆公式保证这一识别。因此局部模的支集链对应原支集中避开 S 的链, 得到不等式。□

一般点处的局部化可能大幅降低维数。例如整环的零理想处局部环是分式域, 维数为零, 不论原环有多少维。相反, 在多项式环的闭点处, 局部化会保留许多不同方向的素理想链; 下一节将用理想生成元的个数限制这些链的长度。

9.2 高度定理

一个方程不应一次切掉任意多层素理想链, 这个直觉在 Noether 环中由主理想定理保证。证明需要小心区分极小素理想与任意包含该方程的素理想。本节先用准素性和 Nakayama 引理建立单个方程的结论, 再归纳处理多个方程; 不使用尚未讲授的 Hilbert–Samuel 理论或 Artin–Rees 引理。

9.2.1 Krull 主理想定理

引理 9.2.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部整环, 且 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$ 。则 $\dim R \leq 1$ 。

证明. 若 $a = 0$, 整环性给出 $\mathfrak{m} = 0$, 故 R 是域。以下设 $a \neq 0$ 。反设存在非零素理想 $0 \neq \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}$ 。因 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$, 有 $a \notin \mathfrak{p}$ 。

环 R/aR 是零维 Noether 环, 所以由定理 3.3.4 为 Artin 环。考虑符号幂 $Q_n = \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R$ 。在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中, $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$ 的根为唯一极大理想, 故由命题 4.2.3 准素; 再由命题 4.2.6, 收缩后的每个 Q_n 都是 $\mathfrak{p}$ 准素理想。它们在 R/aR 中的像组成降链, 因此存在 $n \geq 1$ 使

$$Q_n + aR = Q_{n+1} + aR.$$

对 $x \in Q_n$, 可写 $x = y + ar$, 其中 $y \in Q_{n+1}$ 。于是 $ar \in Q_n$; 因 $a \notin \sqrt{Q_n} = \mathfrak{p}$, 准素性迫使 $r \in Q_n$ 。所以

$$Q_n = Q_{n+1} + aQ_n.$$

有限生成模 Q_n/Q_{n+1} 因而等于自身的 a 倍。由 $a \in \mathfrak{m}$ 及定理 3.2.3, 它为零, 故 $Q_n = Q_{n+1}$ 。

在 $\mathfrak{p}$ 处局部化得到 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}^{n+1} R_{\mathfrak{p}}$ 。再对 Noether 局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的有限模 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$ 使用 Nakayama 引理, 得到它为零。但 $R_{\mathfrak{p}}$ 是整环, 且非零的 $\mathfrak{p}$ 在其中仍非零, 其正整数次幂不可能为零, 矛盾。于是除零理想外, 没有严格小于 $\mathfrak{m}$ 的素理想。□

定理 9.2.2 (Krull 主理想定理). 设 R 为交换 Noether 环, $a \in R$ 。每个在 (a) 上极小的素理想 $\mathfrak{p}$ 都满足

$$\text{ht } \mathfrak{p} \leq 1.$$

证明. 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化后, 只存在一个包含 a 的素理想, 即唯一极大理想; 因此可设 R 为局部环且 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$ 。若存在长度至少二的素链, 可截取并在末端补上 $\mathfrak{m}$, 得到 $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{m}$ 。在局部整环 $R/\mathfrak{q}_0$ 中, a 的像的根仍为极大理想的像, 上一引理却排除了非零的中间素理想 $\mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_0$, 矛盾。因此局部维数至多为一, 即所求高度界。□

这称为 **Krull 主理想定理** (Krull's principal ideal theorem)。在整环中, 若 a 非零且非单位, 其上极小素理想非零, 故高度恰好为一。“极小”不可删除: 例如 $(x) \subseteq (x, y)$ 于 $k[x, y]$, 后者包含主理想 (x) , 却有链 $0 \subsetneq (x) \subsetneq (x, y)$, 高度至少为二。

9.2.2 广义高度定理

定理 9.2.3 (广义高度定理). 若 R 为交换 Noether 环, $I = (a_1, \dots, a_r) \subsetneq R$, 其中 $r \geq 0$, 则每个在 I 上极小的素理想 $\mathfrak{p}$ 都满足

$$\text{ht } \mathfrak{p} \leq r.$$

证明. 对 r 归纳。 $r = 0$ 时, $\mathfrak{p}$ 是极小素理想, 高度为零; $r = 1$ 已由主理想定理证明。一般情形在 $\mathfrak{p}$ 处局部化, 可设 $(R, \mathfrak{m})$ 局部且 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ 。

取任意链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_d = \mathfrak{m}.$$

若 $d = 0$ 无须证明。因 $I \not\subseteq \mathfrak{p}_{d-1}$, 重排生成元后可设 $a_1 \notin \mathfrak{p}_{d-1}$ 。令 $\mathfrak{q}_d = \mathfrak{m}$, 从 $i = d-1$ 向下逐次在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 内选一个在 $\mathfrak{p}_i + (a_1)$ 上极小的素理想 $\mathfrak{q}_i$ 。这样的选择可以先在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 处局部化、取一个极小素理想, 再收缩; 任何更小的候选也在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 内, 故它在原环中仍然极小。

对 $i \leq d-2$, 若 $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_{i+1}$, 则

$$\mathfrak{p}_i \subsetneq \mathfrak{p}_{i+1} \subsetneq \mathfrak{q}_i.$$

第二个包含严格, 因为 $a_1 \in \mathfrak{q}_i$ 而 $a_1 \notin \mathfrak{p}_{i+1}$ 。但在 $R/\mathfrak{p}_i$ 中, $\mathfrak{q}_i/\mathfrak{p}_i$ 在一个主理想上极小, 主理想定理禁止它具有这样的长度二链。故 $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_{d-1}$ 严格。

这是一条包含 a_1 的长度 $d-1$ 的链。在局部商环 $R/(a_1)$ 中, 其极大理想是剩余 $r-1$ 个生成元的根, 由归纳假设高度至多 $r-1$ 。所以 $d-1 \leq r-1$, 即 $d \leq r$ 。原链任意, 结论成立。□

这一定理也称 **Krull 高度定理** (Krull's height theorem)。证明没有将 $\text{ht } \mathfrak{p}$ 擅自拆成两个高度之和; 一般环上的素链未必具有允许这种拆分的长度性质。Matsumura 的

《Commutative Ring Theory》给出相同高度结论 [2, Theorem 13.5, pp. 100–101], 但其证明次序先用 Samuel 函数; 本卷采用上述独立论证, 使后面的增长理论能够调用高度定理。

9.2.3 生成元数与余维约束

若 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 有有限个生成元, 故定理 9.2.3 说明 $\dim R < \infty$ 。更一般地, 若 $\sqrt{(a_1, \dots, a_r)} = \mathfrak{m}$, 就有 $\dim R \leq r$ 。这限制的是使零点集中到闭点所需的方程数; 不表示任一主理想的任一零点都只有余维一。

引理 9.2.4. 设 $(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为交换 Noether 局部环, $d = \dim R$ 。存在 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$, 使

$$\sqrt{(x_1, \dots, x_d)} = \mathfrak{m}.$$

$d = 0$ 时取空组。

证明. 对有限整数 d 归纳。 $d = 0$ 时唯一素理想为 $\mathfrak{m}$, 所以幂零根为 $\mathfrak{m}$, 空组满足要求。若 $d > 0$, 环的极小素理想只有有限多个, 且都严格小于 $\mathfrak{m}$; 否则 $\mathfrak{m}$ 极小便排除了其他素理想, 维数将为零。由引理 1.1.5 选 $x_1 \in \mathfrak{m}$ 避开全部极小素理想。

任一包含 x_1 的素链, 其首项不是极小素理想, 可以在下面补上一项。因此 $\dim R/(x_1) \leq d - 1$ 。对这个局部商环使用归纳假设, 提升其至多 $d - 1$ 个元素, 得到一个根为 $\mathfrak{m}$ 、至多由 d 个元素生成的理想。若少于 d 个, 则广义高度定理会给出 $\dim R < d$, 矛盾。所以总数恰为 d , 完成归纳。□

这个引理与高度定理合起来, 将局部维数解释为生成一个 $\mathfrak{m}$ 准素理想所需的最少元素个数。第 9.4 节将把这样的元素组命名为参数系。它们生成的理想通常小于 $\mathfrak{m}$, 因此参数个数和极大理想的最少生成元数仍需区分。

9.3 有限型代数的维数

多项式环中有明显的素理想链, 但仅展示一条长链只能给出下界。上界需要证明: 每增加一个真正的新方程, 分式域中能保持代数独立的元素就会减少。Noether 正规化随后把一般有限型整代数与多项式环联系起来。

9.3.1 多项式环的维数

引理 9.3.1. 设 A 为域 k 上的有限型整代数, $0 \neq \mathfrak{p}$ 为素理想。则

$$\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) < \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A).$$

证明. 从 $A/\mathfrak{p}$ 的有限代数生成组中取极大代数独立组 $\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_r$, 并在 A 中取提升 y_i 。其他生成元在 $k(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_r)$ 上代数, 故左侧超越次数是 r 。提升后的 y_i 也代数独立。

取 $0 \neq a \in \mathfrak{p}$ 。我们证明 a 在 $k(y_1, \dots, y_r)$ 上超越。若它代数, 取最小多项式并清除分母, 得到

$$c_s(y)a^s + \dots + c_1(y)a + c_0(y) = 0, \quad 0 \neq c_0 \in k[Y_1, \dots, Y_r].$$

常数项非零, 因为 $a \neq 0$, 它的最小多项式不能被变量整除。模掉 $\mathfrak{p}$ 得 $c_0(\bar{y}) = 0$, 与代数独立性矛盾。因此 $y_1, \dots, y_r, a$ 代数独立, 右侧超越次数至少是 $r + 1$ 。□

定理 9.3.2. 任意域 k 及整数 $n \geq 0$ 满足

$$\dim k[X_1, \dots, X_n] = n.$$

更一般地, 有限型整 k 代数 A 的维数不超过 $\text{trdeg}_k \text{Frac}(A)$ 。

证明. 对严格素链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_r$, 逐次将上一引理用于 $A/\mathfrak{p}_i$ 及其非零素理想 $\mathfrak{p}_{i+1}/\mathfrak{p}_i$ 。超越次数每一步至少下降一, 而起点超越次数不超过 $\text{trdeg}_k \text{Frac}(A)$: 商环中的代数独立元素提升后仍然代数独立。这证明上界。对于多项式环,

$$(0) \subsetneq (X_1) \subsetneq (X_1, X_2) \subsetneq \dots \subsetneq (X_1, \dots, X_n)$$

的各项都是素理想, 给出长度 n 的链。 $n = 0$ 时环为域, 结论同样成立。□

例如 $k[X, Y, Z]/(XY)$ 的两个极小素理想为 $(\bar{X})$ 和 $(\bar{Y})$, 相应商环均为二元多项式环, 故其维数为二。这个计算按不可约分支分别进行, 不把有零因子的环擅自当成具有一个分式域的整环。

9.3.2 Noether 正规化与超越次数

定理 9.3.3. 设 k 为域。若 A 是有限型整 k 代数, 则

$$\dim A = \text{trdeg}_k \text{Frac}(A).$$

若 $A \neq 0$ 只是有限型交换 k 代数, 则

$$\dim A = \max_{\mathfrak{p} \in \text{Min } A} \text{trdeg}_k \text{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

这里 $\text{Min } A$ 表示极小素理想的集合。

证明. 整环情形由定理 5.4.1 选出代数独立元素 $y_1, \dots, y_d$, 使 A 是 $B = k[y_1, \dots, y_d]$ 上的有限模。在 $B \setminus \{0\}$ 处局部化后, 所得环是有限维 $k(y_1, \dots, y_d)$ 代数且为整环, 因而是域, 等于 $\text{Frac}(A)$ 。所以该域在 $k(y_1, \dots, y_d)$ 上有限, 超越次数为 d 。

多项式环 B 中有长度 d 的素链。由定理 5.2.2 提升首项, 再反复用定理 5.2.4 提升其余各项; 收缩严格增加, 提升链也严格增加。因此 $\dim A \geq d$ 。反向不等式已由定理 9.3.2 证明。

一般情形下, A 为 Noether 环, 只有有限多个极小素理想。任意素链的首项都包含某个极小素理想, 因此整条链都来自某个 $A/\mathfrak{p}$ 。反之这些商环中的链也是 A 中的链。这给出 $\dim A = \max_{\mathfrak{p} \in \text{Min } A} \dim(A/\mathfrak{p})$, 再应用整环情形。□

尖点环 $k[t^2, t^3]$ 整包含 $k[t^2]$, 其分式域为 $k(t)$, 所以维数为一。变量之间有关系 $(t^3)^2 = (t^2)^3$, 两个代数生成元不意味着二维。相反, $k[x, y, x^{-1}]$ 虽添入了一个逆元, 分式域仍为 $k(x, y)$, 所以维数仍为二。有限型条件在这里保证 Noether 正规化可用; 不能把该公式未经说明用于任意子环。

9.3.3 整扩张的维数保持

定理 9.3.4. 若交换环间的包含 $A \subseteq B$ 是整扩张, 则 $\dim A = \dim B$. 不要求扩张有限, 也不要要求两环为整环。

证明. B 中的严格素链收缩到 A 后仍严格, 因为定理 5.2.3 说明具有相同收缩的两个可比较素理想必相等。因此 $\dim B \leq \dim A$ 。反之, 从 A 中任意有限素链出发, 先用 Lying-over 提升首项, 再用 Going-up 逐项提升; 不同的收缩保证每次包含严格。所以 $\dim B \geq \dim A$ 。这比较的是所有有限链的长度, 维数无穷时也成立。□

该定理解释了有限映射为什么保存整体维数, 却没有声称每个点的高度在任意整扩张下都保持。若基环 A 为整闭整环, 扩环 B 也为整环, 则 Going-down 能补足点处的结论。

推论 9.3.5. 若 $A \subseteq B$ 为整环间的整扩张, 且 A 整闭, 则对 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ 、 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$, 有 $\operatorname{ht} \mathfrak{q} = \operatorname{ht} \mathfrak{p}$ 。

证明. 以 $\mathfrak{q}$ 为末项的链收缩后仍严格, 故得到一个方向。反向由定理 5.3.1, 从指定的 $\mathfrak{q}$ 开始向下提升每条以 $\mathfrak{p}$ 为末项的有限链。□

整同态若不是单射, 应先把基环换成其像: 此时能推出的是

$$\dim B = \dim(A / \ker(A \rightarrow B)).$$

例如商同态 $k[x] \rightarrow k$ 、 $x \mapsto 0$ 是整同态, 却并不保持原基环的维数。

9.4 局部维数

在局部环中, 维数有两种容易混淆的比较对象: 使零点只剩闭点需要多少个方程, 以及生成整个极大理想需要多少个元素。前者等于 Krull 维数, 后者可能更大。两者相等时得到正则局部环的定义。

9.4.1 参数系

定义 9.4.1. 设 $(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为交换 Noether 局部环, $d = \dim R$ 。若一组元素 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ 满足 $\sqrt{(x_1, \dots, x_d)} = \mathfrak{m}$, 则称它们为 R 的**参数系** (system of parameters), 称它们生成的理想为**参数理想** (parameter ideal)。

定理 9.4.2. 设 $(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为交换 Noether 局部环, $d = \dim R$ 。则 R 有参数系, 其维数等于生成一个根为 $\mathfrak{m}$ 的理想所需的最少元素个数。若 $x_1, \dots, x_d$ 是参数系, 则对 $0 \leq i \leq d$, 有

$$\dim R/(x_1, \dots, x_i) = d - i.$$

此外, 对任意 $a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{m}$, 都有 $\dim R/(a_1, \dots, a_r) \geq d - r$ 。

证明. 存在性已由引理 9.2.4 证明, 高度定理说明少于 d 个元素不可能生成根为 $\mathfrak{m}$ 的理想。设 $e = \dim R/(a_1, \dots, a_r)$, 在此商环中选一个有 e 个元素的参数系并提升。它与

$a_1, \dots, a_r$ 合起来生成根为 $\mathfrak{m}$ 的理想, 所以 $d \leq r + e$ 。对参数系的前 i 项应用这个不等式, 得到商维数至少是 $d - i$; 剩余 $d - i$ 项在商环中生成极大根理想, 高度定理又给出反向不等式。□

$R/(x_1, \dots, x_d)$ 是零维 Noether 局部环, 故是 Artin 环, 且作为 R 模具有有限长度。反之, 若商模具有有限长度, 其支集只含闭点, 于是生成理想的根为 $\mathfrak{m}$ 。所以参数系也可以通过商环的有限长度识别。

例如在 $k[x, y]_{(x, y)}$ 中, x, y 和 x^2, y^3 都是参数系, 后者并不生成极大理想。在尖点局部环 $k[t^2, t^3]_{(t^2, t^3)}$ 中, t^2 单独构成参数系: 模掉它后 $(t^3)^2 = (t^2)^3 = 0$, 故商环只有一个素理想。参数并不要求能作自由的坐标。

9.4.2 嵌入维数与 Krull 维数

定义 9.4.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, 剩余域为 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 。定义

$$\text{edim } R := \dim_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

称为 R 的**嵌入维数** (embedding dimension)。

$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上的标量作用来自 R , 并因 $\mathfrak{m}$ 零化该商模而降为 κ 作用。推论 3.2.5 说明, 嵌入维数恰好等于极大理想的最少生成元数。由高度定理立即得到

$$\dim R \leq \text{edim } R. \quad (9.2)$$

这个向量空间仅保留函数的一次信息; 乘积落入 $\mathfrak{m}^2$ 而消失。取

$$R = k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)},$$

则变量的像构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基。生成性显然; 若线性式属于局部化后的平方理想, 则乘一个常数项非零的分母后, 其一次部分仍是该线性式乘以非零常数, 故各系数必须为零。因此嵌入维数为 n 。坐标素链在此局部化中全部保留, Krull 维数也为 n 。

尖点的情形不同。 t^2, t^3 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中线性独立, 因为平方理想中每个非零元素的最低次数至少为四, 局部化的单位分母不改变这一结论。因此该环的嵌入维数为二, Krull 维数为一。这两个数字之差已经能辨认这个点与直线上的点不同。

9.4.3 正则局部环的定义

定义 9.4.4. 若交换 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 满足 $\dim R = \dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$, 则称它为**正则局部环** (regular local ring)。

域是零维正则局部环; 反过来, 零维正则局部环的极大理想满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$, 由 Nakayama 引理有 $\mathfrak{m} = 0$, 所以它是域。上小节的多项式局部环是正则的, 尖点局部环则不是。另一个简单的非正则例子为 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$: 其 Krull 维数为零, 而嵌入维数为一。

在 d 维正则局部环中, 任一极大理想的极小生成组都是一个有 d 项的参数系, 称为**正则参数系** (regular system of parameters)。这句话目前只使用生成元数, 不包含

“这些元素构成正则序列”的证明；正则序列在第十五章引入，正则局部环的结构理论在第十八章建立。同样，正规表示整闭，正则表示上述维数等式，它们是不同的定义。下一章将先在一维整环情形证明二者与离散赋值环的关系。

本章小结

素链给出维数的定义，也给出最直接的下界。上界需要额外论证：Noether 条件下由理想的生成元数控制高度，有限型整代数中则由超越次数沿严格素链的下降控制链长。整扩张用 Going-up 和 Incomparability 保持整体维数；指定点的高度比较另外用到 Going-down 的假设。

在 Noether 局部环中，参数系存在且长度恰为维数，但它生成的理想通常不是极大理想。极大理想最少需要多少个生成元，由剩余域向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 决定。尖点的一维与二维嵌入维数，说明这两种计数回答了不同问题。

习题

习题 9.1. 计算 $\mathbb{Z} \times k[x, y]$ 的维数，以及素理想 $(p) \times k[x, y]$ 、 $\mathbb{Z} \times (x)$ 的高度和相应商环的维数。

解. 直积维数为 $\max\{1, 2\} = 2$ 。第一素理想来自 $\mathbb{Z}$ 中的 (p) ，高度为一，商环为 $\mathbb{F}_p$ ，维数零。第二个来自 $k[x, y]$ 中的 (x) ，它在非零主理想上极小，故高度一；商环为 $k[y]$ ，维数一。第一项显示高度与商维数的和可以严格小于全环维数。□

习题 9.2. 设 $A = k[x, y, \epsilon]/(\epsilon^3)$ 。计算 $\dim A$ 和 $\dim_A A/(x, \epsilon)$ ，并解释增加幂零元为何没有增加维数。

解. 每个素理想都含 ϵ ，故 A 的谱与 $k[x, y]$ 有相同素链，维数二。商模是 $k[y]$ ，其支集对应商环的谱，模维数一。幂零元给出不同的环乘法信息，却不产生新的素理想或链。□

习题 9.3. 将 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 视为 $\mathbb{Z}$ 模，计算其零化子、支集和模维数，说明有限模的零化子公式不能任意推广。

解. 没有非零整数零化全部有理数类，故零化子为零。在零素理想处局部化，每个元素原本被某个非零整数零化，所以局部化为零。在 (p) 处， $1/p + \mathbb{Z}$ 不能被不属于 (p) 的整数零化，因此局部化非零。支集恰为全部非零素理想，这些素理想互不可比，模维数零；而 $\dim(\mathbb{Z}/\text{Ann}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})) = 1$ 。□

习题 9.4. 在 $R = k[x, y, z]$ 上，计算 $R/(x) \oplus R/(y, z)$ 及子模 $xR \subseteq R$ 的维数。再由短正合列核对 $\dim R$ 。

解. 两直和项的维数为二和一，直和维数为二。乘以 x 给出 $R \simeq xR$ ，故后者维数三。短正合列 $0 \rightarrow xR \rightarrow R \rightarrow R/(x) \rightarrow 0$ 的维数公式为 $3 = \max\{3, 2\}$ 。非零子模不必比商模低维。□

习题 9.5. 在 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 中令 $\mathfrak{p} = (x_1, \dots, x_r)$, $0 \leq r \leq n$. 计算 $\dim R_{\mathfrak{p}}$ 和 $\dim R/\mathfrak{p}$.

解. 前 r 个变量逐个加入给出末项为 $\mathfrak{p}$ 的长度 r 素链. 另一方面 $\mathfrak{p}$ 在自己生成的 r 元理想上极小, 高度定理给出高度至多 r . 所以 $\dim R_{\mathfrak{p}} = \text{ht } \mathfrak{p} = r$, 而商环为 $n-r$ 元多项式环, 维数为 $n-r$. $\square$

习题 9.6. 在 $k[x, y, z]$ 中求 $I = (xy, xz)$ 的极小素理想及其高度, 并计算 $\dim R/I$.

解. 包含 I 的素理想若不含 x , 必同时含 y, z , 所以极小素理想恰为 (x) 与 (y, z) , 高度分别为一和二. 这符合两个生成元的高度上界, 却不要求所有极小素理想有相同高度. 两个分支的商环维数分别为二和一, 因此 $\dim R/I = 2$. $\square$

习题 9.7. 证明在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中, 任何 $(x, y)R$ 准素理想都不能由一个元素生成. 再求 $R/(x^a, y^b)$, $a, b \geq 1$, 的长度.

解. 该局部环的维数为二. 若一个主理想的根为极大理想, 主理想定理会给出维数至多一, 矛盾. 所给商环中 $x^i y^j$, $0 \leq i < a, 0 \leq j < b$, 构成 k 基; 常数项非零的分母在这个环中已经可逆, 因为其非常数部分幂零. 商环为局部 Artin 环且剩余域为 k , 每个简单因子是一维 k 空间, 所以长度为 ab . $\square$

习题 9.8. 设 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ 为非零非单位. 证明 $\dim k[x_1, \dots, x_n]/(f) = n-1$.

解. 先设 f 不可约, 重排变量使其对 x_n 的次数为正. 它不能整除只含前 $n-1$ 个变量的非零多项式, 所以这些变量在商环中仍代数独立. 关系 $f=0$ 又说明 x_n 在它们的分式域上代数; 首项系数虽未必为单位, 在分式域中却可逆. 因此商整环的分式域超越次数为 $n-1$, 用有限型维数公式得结论. 一般 f 的极小素理想由其不可约因子生成; 有限多个对应商环都有维数 $n-1$, 故结论不变. $\square$

习题 9.9. 若 A 为有限型整 k 代数, $0 \neq f \in A$, 证明 $\dim A_f = \dim A$. 解释这为何不与 $\dim A_{(0)} = 0$ 冲突.

解. $A_f = A[f^{-1}]$ 仍是有限型整代数, 且具有相同分式域, 故两者超越次数和维数相等. 零素理想处的局部化同时逆转所有非零元素, 一般不能由有限个逆元生成, 因而不一定还是有限型 k 代数. 例如 $k[t]_{(0)} = k(t)$ 不是有限型 k 代数. $\square$

习题 9.10. 设 a, b 为互素正整数. 计算 $k[t^a, t^b]$ 的维数和分式域, 并说明哪一步使用互素性.

解. 整数 Bézout 等式 $ra + sb = 1$ 给出 $t = (t^a)^r (t^b)^s$, 允许负指数后说明分式域为 $k(t)$, 所以维数一. 互素性只用于认出分式域等于 $k(t)$. 若最大公因数为 d , 相同论证给出分式域 $k(t^d)$, 超越次数仍为一, 因此维数仍为一. $\square$

习题 9.11. 设 L/k 为无限次代数扩张. 证明 $k[t] \subseteq L[t]$ 为非有限的整扩张, 并计算两环维数.

解. 任意一个 $L[t]$ 元素只有有限多个系数, 它们生成有限域扩张 k'/k . 环 $k'[t]$ 是 $k[t]$ 上有限自由模, 所以其中每个元素都整. 这证明整性. 若 $L[t]$ 是有限 $k[t]$ 模, 模掉 t 后会使得 L 成为有限维 k 空间, 矛盾. 两环分别是一元多项式环, 维数均为一, 符合整扩张的维数不变性. $\square$

习题 9.12. 设 k 为域, $A = k[x, y]$, $B = k[x, y, z]/(z^2 - xy)$. 证明 A 自然嵌入 B , 且 B 是整环. 计算 B 在素理想 (x, z) 和 (x, y, z) 处的局部维数, 并说明高度比较为什么需要把素链的末项固定.

解. 关于 z 的首一关系使 B 作为 A 模自由, 基为 $1, z$, 因而 $A \rightarrow B$ 单射且有限. 多项式 $z^2 - xy$ 对 $k[x, y]$ 中的素元 x 满足 Eisenstein 判据: 常数项被 x 整除但不被 x^2 整除, 其余非首项系数也被 x 整除. 因此它不可约, 唯一分解环中的不可约元为素元, 故 B 是整环. 两理想的商环分别为 $k[y]$ 和 k , 所以确为素理想; 收缩到 A 后分别是 (x) 和 (x, y) . 基环 A 为整闭整环, 推论 9.3.5 使两处高度分别等于一和二, 这也就是所求局部维数. Going-up 从已选的底端素理想向上构造链, 末项未必是这两个指定素理想之一; Going-down 则能从指定末项向下提升. 这解释了所用高度比较中整闭基环的作用. $\square$

习题 9.13. 设 $R = \left(k[x, y]/(x^2, xy) \right)_{(x, y)}$. 计算 Krull 维数、嵌入维数, 并找一个同时为零因子的参数.

解. 幂零根为 (x) , 约化局部环为 $k[y]_{(y)}$, 故维数一. 关系中没有一次项, x, y 的像构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基, 嵌入维数二. 模掉 y 得 $k[x]/(x^2)$, 所以 y 是参数; 同时 $yx = 0$ 且 $x \neq 0$, 故它是零因子. 参数系无需由非零因子组成. $\square$

习题 9.14. 证明参数系中每个元素可独立换为任意正整数次幂, 仍得参数系. 又证明参数系可以任意重排, 且每个前 i 项的商环维数为 $d - i$.

解. 一个素理想包含元素的正整数次幂当且仅当包含元素本身, 因此这些理想有相同根. 重排不改变生成理想. 对重排后的参数系应用定理 9.4.2, 使得每个前缀的维数公式. $\square$

习题 9.15. 设 $R \neq 0$ 为交换 Artin 局部环. 证明 R 正则当且仅当它是域. 计算 $k[x_1, \dots, x_n]/(x_1, \dots, x_n)^2$ 的嵌入维数.

解. Artin 环 Noether 且零维. 正则性等价于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$, Nakayama 引理使 $\mathfrak{m} = 0$, 故为域; 域显然正则. 所给环的极大理想平方为零, $x_1, \dots, x_n$ 的像构成其 k 基, 所以嵌入维数为 n . 当 $n > 0$ 时它不正则. $\square$

习题 9.16. 令 $\mathfrak{n} = (x_1, \dots, x_n) \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, 设 $I = (f_1, \dots, f_r) \subseteq \mathfrak{n}$, $R = \left(k[x_1, \dots, x_n]/I \right)_{\mathfrak{n}/I}$. 证明 $\text{edim } R$ 等于 n 减去这些 f_i 的一次部分的秩.

解. 极大理想的平方商为 $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + I)$, 局部化不改变这个被 $\mathfrak{n}$ 零化的 k 向量空间. 模掉 $\mathfrak{n}^2$ 后, 每个 f_i 只留下其一次部分; 任意组合 $\sum_i g_i f_i$ 的一次部分为 $\sum_i g_i(0)(f_i)_{\text{lin}}$. 所以全部关系恰是这些线性形式的张成空间, 商空间维数为题述数值. $\square$

习题 9.17. 设 $R = \left(k[x, y, z]/(xy, xz) \right)_{(x, y, z)}$ 。证明其维数为二、嵌入维数为三，并验证 $x + y, z$ 是参数系。

解. 两个分支为局部化后的 $k[y, z]$ 和 $k[x]$ ，维数分别为二和一，所以总维数二。所定义关系都为二次式，没有一次关系，嵌入维数三。令 $z = 0, y = -x$ 后，商环为 $k[x]_{(x)}/(x^2)$ ，是零维局部环，故两个元素构成参数系。这个例子也说明参数系的存在不要求各个不可约分支等维。 $\square$

习题 9.18. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环， $M \neq 0$ 为有限模， $d = \dim_R M$ 。证明存在 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ 使 $M/(x_1, \dots, x_d)M$ 具有有限长度，并证明少于 d 个元素不能做到这一点。

解. 置 $A = R/\text{Ann}_R M$ ，则 $\dim A = d$ 。对 A 取参数系并提升，得到理想 $I = (x_1, \dots, x_d)$ 。有限模的支集及局部 Nakayama 引理说明

$$\text{Supp}(M/IM) = \text{Supp}(M) \cap V(I).$$

具体地，局部化后若 $I \not\subseteq \mathfrak{p}$ ，商为零；若 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 且 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ ，Nakayama 引理禁止其等于 $IM_{\mathfrak{p}}$ ，所以商非零。参数条件使这个支集只有 $\mathfrak{m}$ ，因此其零化子的根为 $\mathfrak{m}$ ，某个极大理想幂零化它，幂滤过的各商为有限维剩余域空间，长度有限。反之，有限长度使这个支集只有 $\mathfrak{m}$ ，即 I 在 A 中的像具有极大根；高度定理要求其生成元数至少为 d 。 $\square$

第十章 赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环

赋值把整除关系化为有序群中的大小比较。离散赋值环中，每个非零元素由统一化元的幂和一个单位相乘而成；本章从一维、Noether 性与整闭性出发证明这一结构。Dedekind 整环把这些局部整数阶合成为全局理想的唯一分解。数域整数环、理想类群和正规曲线展示这种分解怎样应用于算术与几何。

本章目标

- 从赋值构造局部环，区分赋值的秩、有理秩与离散性。
- 证明一维 Noether 正规局部整环是 DVR，计算理想的阶数与商模长度。
- 通过局部化恢复 Dedekind 整环的非零理想分解，并构造分式理想的逆。
- 区分可逆理想与主理想，理解理想类群和秩一投射模之间的关系。

本章使用第 2 章的局部化检测、第 3 章的行列式技巧与 Nakayama 引理、第 5—6 章的整闭性和正规化有限性，以及第 9 章的维数语言。Picard 群部分还用有限投射模、对偶和张量积，这些构造已在第二卷建立；这里不使用 Ext、Tor 或完备化。

一般赋值可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, §10, General valuations, pp. 71–77]。DVR 的等价刻画与可逆理想见 [2, Theorems 11.1–11.3, pp. 78–81]；Dedekind 整环的分解定理见 [2, Theorem 11.6, pp. 82–84]。本章保留一般赋值与离散赋值的区别，再在 Noether 条件下开展理想分解。

10.1 赋值与赋值环

整数中可以比较两个数含有多少个素因子 p ，有理函数中也可以比较它们在一点的零点或极点阶数。赋值把这种比较写成有序群中的加法。先允许一般的有序群，才能看清哪些性质来自整除的全序性，哪些性质另外需要离散性或 Noether 性。

10.1.1 赋值群与赋值环的整除性质

定义 10.1.1. 设 Γ 为带有全序的加法交换群。若对所有 $\alpha, \beta, \gamma \in \Gamma$ 有 $\alpha \leq \beta \Rightarrow \alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$ ，则称 Γ 为**全序交换群** (totally ordered abelian group)。设 K 为域， Γ 为全序交换群。若满射 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 在扩充规定 $v(0) = +\infty$ 后满足

$$v(ab) = v(a) + v(b), \quad v(a+b) \geq \min\{v(a), v(b)\}.$$

则称 v 为 K 上取值于 Γ 的**赋值** (valuation)。第一式先对 $a, b \in K^*$ 理解，第二式对所有 $a, b \in K$ 成立； $+\infty$ 大于每个群元素，且 $\gamma + (+\infty) = +\infty$ 。称 Γ 为赋值群。

由第一条公理有 $v(1) = 0$ 、 $v(a^{-1}) = -v(a)$ 。全序群无挠，故由 $2v(-1) = 0$ 得 $v(-1) = 0$ 。如果 $v(a) < v(b)$ ，则 $v(a+b) = v(a)$ ：否则把 $a = (a+b) - b$ 代入三角不等式便矛盾。这说明最低阶项只有在至少两项同阶时才可能互相抵消。

定义 10.1.2. 设 K 为域， $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为取值于全序交换群 Γ 的赋值。子环

$$V_v = \{0\} \cup \{a \in K^* \mid v(a) \geq 0\}.$$

称为 v 的**赋值环** (valuation ring)。等价地，若整环 V 的分式域为 K ，且对每个 $x \in K^*$ 都有 $x \in V$ 或 $x^{-1} \in V$ ，则称 V 为 K 的赋值环。允许 $V = K$ ，这对应零赋值群，称为平凡赋值。

说明两种说法确实等价。赋值不等式保证 V_v 对加法、减法、乘法封闭，且含 1；全序性给出倒数条件。反过来，若满足倒数条件，令 $\Gamma = K^*/V^*$ ，把商群运算写成加法，并规定

$$[a] \leq [b] \iff b/a \in V.$$

换乘单位不改变此条件；若两个方向同时成立，商为单位，故两类相等。倒数条件给出全序，乘法给出与平移的相容性。设 $v(a) = [a]$ ，若 $v(a) \leq v(b)$ ，则 $(a+b)/a = 1+b/a \in V$ ，于是赋值不等式成立。这个构造说明赋值群应取实际像；将它嵌入一个更大的有序群不会增加赋值环的信息。

命题 10.1.3. 设 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为域 K 上的赋值， V_v 为其赋值环。则 V_v 的任意两个理想可以按包含关系比较。因此每个有限生成理想都是主理想。对非零元素 $a, b \in V_v$ ，有 $a \mid b \iff v(a) \leq v(b)$ 。

证明。末一等价式就是 $b/a \in V_v$ 。若理想 I 不包含于 J ，取 $a \in I \setminus J$ 。任取 $0 \neq b \in J$ ，不能有 $a \in bV$ ，故必有 $b \in aV \subseteq I$ ，于是 $J \subseteq I$ 。有限多个主理想中有一个包含其余各个，所以它们的和等于这个最大的主理想。□

10.1.2 一般赋值环与离散赋值环

定义 10.1.4. 设 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为域 K 上的赋值。若赋值群 Γ 与通常排序的 $\mathbb{Z}$ 同构，便称相应赋值环 V_v 为离散赋值环，缩写为 DVR。本书的 DVR 不是域。

“离散”说的是赋值群由整数阶组成，并不是说极大理想的幂所定义的拓扑为离散拓扑。

对素数 p ，将非零有理数唯一写成 $p^n a/b$ ，其中 $p \nmid ab$ ，定义 $v_p(p^n a/b) = n$ ，所得赋值环是 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 。对有理函数 $f(t)/g(t)$ ，用分子中 t 的次数减去分母中 t 的次数定义 ord_0 ，所得赋值环为 $k[t]_{(t)}$ 。两例中乘法阶数相加、加法阶数不下降都可直接由提取最大公因子验证。

一般赋值未必离散。令 $K = \bigcup_{n \geq 1} k(t^{1/n!})$ ，在一个固定扩域中相容选取这些元；取 $v(t^{1/n!}) = 1/n!$ ，把有理函数的零点阶除以 $n!$ 。这些赋值在嵌套子域上相容，因而定义了 K 上以 $\mathbb{Q}$ 为值群的赋值。其极大理想没有最小的正赋值，所以不是有限生成理想；否则命题 10.1.3 会使它由某个最小正赋值元素生成。这给出一个非 Noether 赋值环。

10.1.3 分式域与局部性

命题 10.1.5. 设 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为域 K 上的赋值, V_v 为其赋值环。则 V_v 的分式域是 K , 它是局部整环, 唯一极大理想为

$$\mathfrak{m}_v = \{0\} \cup \{a \in K^* \mid v(a) > 0\},$$

单位恰为赋值零的元素。每个赋值环都在 K 中整闭。

证明. 任意 $x \in K^*$ 或属于 V_v , 或为 V_v 中非零元素的倒数, 故分式域为 K 。赋值公理说明 $\mathfrak{m}_v$ 是理想; 非零 $a \in V_v$ 可逆恰当 $v(a) = 0$, 所以非单位全体恰是该真理想。这证明局部性。

若 $x \in K$ 满足首一方程 $x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, $a_i \in V_v$, 而 $v(x) < 0$, 除以 x^n 得 $1 + a_1x^{-1} + \cdots + a_nx^{-n} = 0$ 。除首项外每项均属于 $\mathfrak{m}_v$, 于是 $1 \in \mathfrak{m}_v$, 矛盾。因此 $x \in V_v$ 。□

局部性不保证是赋值环。例如 $k[x, y]_{(x, y)}$ 中 x/y 与 y/x 都不存在。若 $x/y = f/g$, $g \notin (x, y)$, 则 $gx = fy$, 在多项式唯一分解整环中 $y \mid g$, 和分母的常数项非零矛盾。另一个分式同理。它还是整闭环, 所以整闭局部环也不必是赋值环。

10.1.4 赋值环的秩、维数与一维正规性

设 Γ 为全序交换群, H 为其子群。若对所有 $\gamma \in \Gamma$ 和 $h \in H$, $0 \leq \gamma \leq h$ 均蕴含 $\gamma \in H$, 则称 H 为**凸子群** (convex subgroup)。凸子群按包含关系组成全序: 若 $H_1 \not\subseteq H_2$, 取正的 $h \in H_1 \setminus H_2$, 则 H_2 的每个正元素均小于 h , 故属于 H_1 。赋值的**秩** (rank of a valuation) 定义为其赋值群中有限严格凸子群链的长度上确界。

命题 10.1.6. 设 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为域 K 上的赋值, V_v 为其赋值环。则 Γ 的凸子群与 V_v 的素理想有反包含对应

$$H \mapsto \mathfrak{p}_H = \{0\} \cup \{a \in V_v \setminus \{0\} \mid v(a) > h \text{ 对所有 } h \in H\}.$$

特别地, 赋值的秩等于赋值环的 Krull 维数。

证明. 对非负群元素, 属于 H 或大于 H 中所有元素, 二者必居其一; 这是凸性的直接结果。所以 $V_v \setminus \mathfrak{p}_H$ 恰由赋值属于 H 的非零元素组成。这个集合对乘法封闭, 而 $\mathfrak{p}_H$ 对相加、乘以 V_v 元素封闭, 故为素理想。

反过来, 给定素理想 $\mathfrak{p}$, 令 $S = \{v(a) : a \in V_v \setminus \mathfrak{p}\} \subseteq \Gamma_{\geq 0}$ 。它对加法封闭。若 $0 \leq \gamma \leq s = v(a) \in S$, 取 $b \in V_v$ 使 $v(b) = \gamma$; 因 $b \mid a$, $b \in \mathfrak{p}$ 会迫使 $a \in \mathfrak{p}$, 所以 $\gamma \in S$ 。于是 S 向下封闭, 且 $H = S - S = S \cup (-S)$ 是凸子群, 其非负部分恰为 S 。因此 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_H$, 两构造互逆。包含的反转由公式直接看出。有限严格链由此互相对应, 长度不变。□

不要把这里的秩与 $\dim_{\mathbb{Q}}(\Gamma \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})$, 即有理秩, 混同。例如有序子群 $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$ 的有理秩为二, 却只有两个凸子群 0 与自身: 任何正元素的整数倍最终超过指定的另一正元素, 凸性迫使含一个正元素的凸子群包含全部元素。它的秩为一。这也说明“秩

一”没有蕴含赋值群为 $\mathbb{Z}$ 。上面的 $\mathbb{Q}$ 值群例子同样为一维整闭局部环，却不是 DVR。下一节增加 Noether 条件后，结论才会成立。

10.2 离散赋值环

离散赋值环最有用之处在于，所有非零理想都由同一个元素的幂生成。因此它既能按整数测量阶数，也能从局部环的有限性和整闭性识别。本节的刻画不依赖尚未证明的完备化或一般 Krull 交集定理。

10.2.1 一维 Noether 正规局部整环的刻画

定理 10.2.1. 对非域整环 R ，下列条件等价：

I. R 为离散赋值环；

II. R 为 Noether 局部环，且其极大理想由一个元素生成；

III. R 为一维 Noether 正规局部整环。

它们也等价于 R 是非域的局部主理想整环。

证明. 先设 $R = V_v, v(K^*) = \mathbb{Z}$ ，选 π 满足 $v(\pi) = 1$ 。每个 $0 \neq a \in R$ 唯一写成 $a = \pi^n u$ ，其中 $n \geq 0, u$ 为单位。非零理想中非零元素的赋值有最小值 n ，于是该理想恰为 (π^n) 。所以 R 是主理想整环，且只有 $(0), (\pi)$ 两个素理想。由命题 10.1.5，赋值环整闭，这同时得到(II)和(III)。

设(II)成立， $\mathfrak{m} = (\pi)$ 。令 $J = \bigcap_{n \geq 0} \pi^n R$ 。若 $x \in J$ ，写 $x = \pi y$ ；由整环中可约去 π ，从 $x \in \pi^{n+1} R$ 得 $y \in \pi^n R$ ，故 $y \in J$ 。于是 $J = \pi J$ 。理想 J 有限生成，Nakayama 引理给出 $J = 0$ 。因此每个非零 $a \in R$ 有最大的 n 使 $a \in \pi^n R$ ，并写成 $\pi^n u$ ，其中 $u \notin \mathfrak{m}$ 是单位。对分式定义 $v(a/b) = n(a) - n(b)$ 。分解的唯一性保证分式表示无关；乘法指数相加，加法在提出较小的幂后仍属于 R ，故满足赋值不等式。其值群为 $\mathbb{Z}$ ，非负值元素恰属于 R ，所以得到(I)。

最后设(III)成立，记极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，分式域为 K 。取 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$ 。维数一说明 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$ ，故某个 $\mathfrak{m}^n \subseteq aR$ 。这里用到 $\mathfrak{m}$ 有限生成：每个生成元的某个幂属于 aR ，展开充分高次的乘积即可。取最小的 $n \geq 1$ ，再取 $b \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus aR$ 。则 $x = b/a \notin R$ ，但 $x\mathfrak{m} \subseteq R$ 。若 $x\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$ ，对有限忠实模 $\mathfrak{m}$ 使用定理 3.2.1，便知 x 在 R 上整：相应首一多项式零化 $\mathfrak{m}$ ，而整环中 $\mathfrak{m} \neq 0$ 使该多项式在 K 中为零。正规性将推出 $x \in R$ ，矛盾。所以理想 $x\mathfrak{m}$ 含有单位，从而 $x\mathfrak{m} = R$ 。选 $\pi \in \mathfrak{m}$ 满足 $x\pi = 1$ 。每个 $y \in \mathfrak{m}$ 都满足 $xy \in R$ ，于是 $y = \pi(xy)$ ，得到 $\mathfrak{m} = (\pi)$ ，即(II)。局部主理想整环满足(II)，而第一段已证明(I)使每个理想主生成，故最后一个等价条件也成立。□

证明中两处 Noether 性各有明确用途：让 $\bigcap \pi^n R$ 可用 Nakayama 引理，以及让极大理想可用行列式技巧。若直接删除有限性，上一节的一维非离散赋值环就给出反例。

10.2.2 极大理想的统一化元

定义 10.2.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 DVR。若元素 $\pi \in R$ 满足 $\mathfrak{m} = (\pi)$ ，则称其为 **统一化元 (uniformizer)**。相应赋值取 $v(\pi) = 1$ ，称为正规化赋值。

统一化元并不唯一： π' 是另一个统一化元，当且仅当 $\pi' = u\pi$ 、 $u \in R^*$ 。所以元素的展开 $a = u\pi^n$ 中单位部分依赖选择，整数 n 则与选择无关。对 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 可取 p ，对 $k[t]_{(t-c)}$ 可取 $t-c$ 。正规化赋值确定了理想的阶数，但没有预先选定剩余域在环内的一套代表，更没有使环自动成为形式幂级数环。

命题 10.2.3. 非域赋值环为 Noether 环，当且仅当它为 DVR。

证明. DVR 已证明为主理想整环。反向，Noether 赋值环的极大理想有限生成，因而由命题 10.1.3 主生成，再应用定理 10.2.1。□

还须区别“极大理想主生成”和“Noether”。取 $K = k((u))((t))$ ，对非零 $f = t^n a_n(u) + t^{n+1} a_{n+1}(u) + \dots$ 定义 $v(f) = (n, \text{ord}_u a_n)$ ，赋值群按字典序排序的 $\mathbb{Z}^2$ 。首项乘法和加法直接验证赋值公理。最小正值是 $(0, 1)$ ，所以极大理想由 u 生成；但赋值为正的第一坐标的元素组成非零素理想 $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$ ，其中 t/u^r 、 $r \geq 0$ ，没有赋值最小者。因此 $\mathfrak{p}$ 不是有限生成理想，这个环不是 DVR。

10.2.3 理想与阶函数

命题 10.2.4. 在 DVR $(R, \mathfrak{m})$ 中，每个非零理想唯一写成 $\mathfrak{m}^n$ 、 $n \geq 0$ 。对 $a, b \geq 0$ ，有

$$\mathfrak{m}^a \mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{a+b}, \quad \mathfrak{m}^a + \mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{\min(a,b)}, \quad \mathfrak{m}^a \cap \mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{\max(a,b)}.$$

并且 $\ell_R(R/\mathfrak{m}^n) = n$ 。

证明. 理想形式已在刻画定理中证明； $\pi^n \notin \mathfrak{m}^{n+1}$ 保证指数唯一。乘积公式由生成元相乘得到，和与交由理想的包含次序得到。对每个 $i \geq 0$ ，乘以 π^i 给出 $R/\mathfrak{m} \simeq \mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$ ：满射显然，核为 $\mathfrak{m}$ ，因为可在整环中约去 π^i 。因此 $R/\mathfrak{m}^n$ 的幂滤过有恰好 n 个简单商，长度为 n 。□

若 $0 \neq a \in R$ ，则 $v(a) = \ell_R(R/aR)$ 。这样，整数阶也能仅从商模长度恢复。在一维正规曲线中，这将给出零点重数的一个局部代数描述。这里的正规性不可省略：尖点环的极大理想不能由一个元素生成，即使它的 Krull 维数也是一。

10.3 Dedekind 整环

一个整数的素因子分解，可以分别在每个素数处读取指数。Dedekind 理论保留了这种办法，不过应分解的对象是非零理想。每个非零素理想处的局部环是 DVR，先在那里读出整数阶，再把有限多个局部数据合成原理想。

10.3.1 Dedekind 整环的定义与局部刻画

定义 10.3.1. 设 R 为整环。若 R 为 Noether 环、在其分式域中整闭，且每个非零素理想都是极大理想，则称 R 为 **Dedekind 整环** (Dedekind domain)。本书允许域作为零维情形；非域的 Dedekind 整环恰为一维 Noether 正规整环。

定理 10.3.2. 设 R 为非域 Noether 整环。则 R 是 Dedekind 整环，当且仅当每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的 $R_{\mathfrak{m}}$ 都是 DVR。

证明. 若 R 为 Dedekind 整环，则 $R_{\mathfrak{m}}$ 为一维 Noether 局部整环。整闭性由命题 5.1.7 传至局部化，所以可用定理 10.2.1。

反向，任意非零素理想 $\mathfrak{p}$ 包含于某个 $\mathfrak{m}$ 。其局部化是 DVR 中的非零素理想，只能等于 $\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$ ；收缩回去得 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ 。再证整闭性。首先在分式域 K 中有

$$R = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} R_{\mathfrak{m}}.$$

事实上，若 $x \notin R$ ，则 $J = \{r \in R : rx \in R\}$ 是真理想。取 $\mathfrak{m} \supseteq J$ ，若 $x = a/s \in R_{\mathfrak{m}}$ ，则 $s \notin \mathfrak{m}$ 却满足 $sx = a \in R$ ，矛盾。若 $x \in K$ 在 R 上整，它在每个 $R_{\mathfrak{m}}$ 上也整，因各 DVR 整闭而属于上述交集，故属于 R 。□

Noether 假设在这个表述中是全局条件，不能仅凭每个点处的局部环 Noether 就省略它。在已知 Dedekind 的环中，局部化仍为 Dedekind 整环或域：Noether 性、整闭性均保持，而素链只会减少。

10.3.2 非零理想的素理想分解

对 Dedekind 整环 R 的非零素理想 $\mathfrak{p}$ ，将 $R_{\mathfrak{p}}$ 的正规化赋值记为 $v_{\mathfrak{p}}$ 。给定非零理想 I ，定义 $v_{\mathfrak{p}}(I) \geq 0$ 为唯一满足 $IR_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})^{v_{\mathfrak{p}}(I)}$ 的整数。

定理 10.3.3. 设 R 为 Dedekind 整环， $I \subseteq R$ 为非零理想；对非零素理想 $\mathfrak{p}$ ，令 $v_{\mathfrak{p}}(I)$ 表示 $IR_{\mathfrak{p}}$ 在 DVR $R_{\mathfrak{p}}$ 中的幂指数。则有唯一分解

$$I = \prod_{\mathfrak{p} \neq 0} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(I)},$$

其中只有有限多个指数非零。单位理想对应空乘积。

证明. 若 $I = R$ ，空乘积就是所求分解；以下设 $I \subsetneq R$ ，此时 R 不是域。取 $0 \neq a \in I$ 。含 (a) 的素理想全是极大理想，所以 $R/(a)$ 是零维 Noether 环，因而是 Artin 环，只有有限多个素理想。若 $v_{\mathfrak{p}}(I) > 0$ ，则 $I \subseteq \mathfrak{p}$ ，故 $a \in \mathfrak{p}$ 。因此非零指数只有有限多个。

令右端有限乘积为 J 。在任一非零极大理想 $\mathfrak{q}$ 处局部化，所有 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$ 都含有一个不属于 $\mathfrak{q}$ 的元素，因而其局部化为单位理想。只有 $\mathfrak{q}$ 因子保留，于是 $JR_{\mathfrak{q}} = IR_{\mathfrak{q}}$ 。由推论 2.4.2 得到 $I = J$ 。

任一有限素理想乘积在 $\mathfrak{p}$ 处局部化时，只保留对应素理想的幂；DVR 中幂指数唯一，所以分解中每个指数都被原理想确定。□

分解不仅给出乘法。对非零理想 I, J , 局部化并使用 DVR 中的公式可得

$$\begin{aligned} v_p(IJ) &= v_p(I) + v_p(J), \\ v_p(I + J) &= \min\{v_p(I), v_p(J)\}, \\ v_p(I \cap J) &= \max\{v_p(I), v_p(J)\}. \end{aligned}$$

因此 $I \subseteq J$ 当且仅当各处指数满足 $v_p(I) \geq v_p(J)$ 。理想的包含方向与“整除得更多”的指数方向相反, 使用这些公式时须保留这个次序。

10.3.3 分式理想与可逆性

定义 10.3.4. 设 R 为整环, K 为其分式域, $I \subseteq K$ 为非零 R 子模。若存在 $0 \neq d \in R$ 使 $dI \subseteq R$, 则称 I 为 **分式理想** (fractional ideal)。两个分式理想的乘积由全部有限和 $\sum_i a_i b_i$ 、 $a_i \in I, b_i \in J$, 组成。定义

$$I^{-1} := \{x \in K : xI \subseteq R\}.$$

若 $II^{-1} = R$, 则称 I 为 **可逆理想** (invertible ideal)。

在 Noether 整环上, 分式理想都是有限模, 因为乘以 d 将它同构到一个通常理想。 I^{-1} 也是分式理想: 它包含非零的 dR ; 取 $0 \neq a \in I$, 则 $aI^{-1} \subseteq R$, 再清除 a 自身的分母即可得到定义中所需的 R 元素。

命题 10.3.5. 设 R 为整环, K 为其分式域。若分式理想 $I \subseteq K$ 为有限 R 模, 则它可逆, 当且仅当每个极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq R$ 处的 $IR_{\mathfrak{m}}$ 都由一个非零分式生成。可逆分式理想必为有限生成投射模。

证明. 若 $II^{-1} = R$, 取有限和 $\sum_i a_i b_i = 1$, 其中 $a_i \in I, b_i \in I^{-1}$ 。每个 $x \in I$ 都可写成 $x = \sum_i (xb_i)a_i$, 说明 a_i 生成 I 。映射 $R^r \rightarrow I, (c_i) \mapsto \sum_i c_i a_i$ 有截面 $x \mapsto (xb_i)_i$, 故 I 是有限自由模的直和因子, 因而投射。在 $R_{\mathfrak{m}}$ 中, 和为 1 使某个 $a_i b_i$ 成为单位。对任意 $x \in I$, 有 $x/a_i = (xb_i)/(a_i b_i) \in R_{\mathfrak{m}}$, 于是 $I_{\mathfrak{m}} = a_i R_{\mathfrak{m}}$ 。

反向需要说明逆理想与局部化相容。若 $I = (a_1, \dots, a_r)$, 且 $xI_{\mathfrak{m}} \subseteq R_{\mathfrak{m}}$, 为每个 xa_i 选一个分母 $s_i \notin \mathfrak{m}$ 使 $s_i xa_i \in R$ 。令 $s = \prod_i s_i$, 便有 $sx \in I^{-1}$ 。因此 $(I^{-1})_{\mathfrak{m}} = (I_{\mathfrak{m}})^{-1}$ 。若 $I_{\mathfrak{m}}$ 主生成且非零, 它与自己的逆相乘为 $R_{\mathfrak{m}}$, 故 $(II^{-1})_{\mathfrak{m}} = R_{\mathfrak{m}}$ 。若 II^{-1} 为真理想, 将其包含在某个极大理想中会与这个等式矛盾。于是 $II^{-1} = R$ 。□

推论 10.3.6. 设 R 为 Dedekind 整环。它的全部非零分式理想在乘法下组成交换群。每个分式理想 I 有唯一表达式

$$I = \prod_{\mathfrak{p} \neq 0} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}, \quad n_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z},$$

其中只有有限多个指数非零。因此该群是以非零素理想为基的自由交换群。

证明. 若 R 为域, 则唯一非零分式理想为 R , 结论成立。以下设 R 非域。分式理想有限生成, 每个极大理想非零, 相应局部环为 DVR, 局部化理想均主生成, 故由上一命

题可逆。选 $0 \neq d \in R$ 使 dI 为通常理想，则 $I = (dI)(dR)^{-1}$ 。分别分解这两个通常理想便得到整数指数；在每个 DVR 处读出指数又证明唯一性。乘法的结合律、交换律来自有限和与环乘法，单位元是 R ，所定义的 I^{-1} 即群逆元。□

可逆不等于主生成。主分式理想 xR 总有逆 $x^{-1}R$ ，但一般 Dedekind 整环中还存在非主可逆理想。下一节给出具体算例，并说明它们怎样组成理想类群。

10.4 算术和几何例子

整数环和一元多项式环都具有唯一的元素分解，但其有限扩张未必仍有这个性质。Dedekind 理论说明，转向非零理想之后仍能保持唯一分解。曲线上的零点阶数则把同一结构解释为几何数据。

10.4.1 数域整数环的 Dedekind 性

定义 10.4.1. 设域 K 包含 $\mathbb{Q}$ 。若 $[K : \mathbb{Q}] < \infty$ ，则称 K 为**数域** (number field)。 $\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包，即所有满足首一整数系数多项式的元素组成的环，称为 K 的**整数环** (ring of integers)，记为 $\mathcal{O}_K$ 。

定理 10.4.2. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为有限域扩张， $\mathcal{O}_K$ 为 $\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包。则 $\mathcal{O}_K$ 是有限自由 $\mathbb{Z}$ 模，秩为 $[K : \mathbb{Q}]$ ，并且是 Dedekind 整环。

证明. 特征零保证 $K/\mathbb{Q}$ 可分。 $\mathbb{Z}$ 是整闭 Noether 整环，故引理 6.5.1 给出 $\mathcal{O}_K$ 的有限生成性。为直接说明自由性，取 K 的一个有理基，并为 $\mathcal{O}_K$ 的有限个整数模生成元的坐标清除公分母。于是 $\mathcal{O}_K$ 同构于某个 $\mathbb{Z}^n$ 的子群，其中 $n = [K : \mathbb{Q}]$ 。每个子群 $H \subseteq \mathbb{Z}^n$ 都自由，可对 n 归纳：第一坐标像若为零，就在 $\mathbb{Z}^{n-1}$ 中使用归纳；否则其像为 $d\mathbb{Z}$ ， $d > 0$ ，取 $h \in H$ 的第一坐标为 d 。每个元素唯一写成 $mh + h_0$ ，其中 $m \in \mathbb{Z}$ 、 h_0 第一坐标为零，故 $H = \mathbb{Z}h \oplus H_0$ ，再对 H_0 归纳。这证明 $\mathcal{O}_K$ 为有限自由模。任何 $x \in K$ 乘一个非零整数后都对 $\mathbb{Z}$ 整：对 x 的首一有理系数方程清除分母，正如引理 6.5.1 证明中的缩放。因此 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_K = K$ ，自由秩为 $[K : \mathbb{Q}]$ ，分式域也为 K 。

有限 $\mathbb{Z}$ 模性使 $\mathcal{O}_K$ 为 Noether 环；整闭包对整性传递而整闭。由定理 9.3.4，它与 $\mathbb{Z}$ 同为一维。于是它是 Dedekind 整环。□

这个证明也说明正规化有限性在算术中的作用：它先给出 Noether 性，不能只凭“所有元素都整”就断言整数环 Noether。对任意 $0 \neq a \in \mathcal{O}_K$ ，乘以 a 是有限自由整数模上的单射，且在 $\mathbb{Q}$ 上为同构，所以余核是有限交换群。因此 $\mathcal{O}_K/(a)$ 有限；非零素理想的剩余域也有限。

10.4.2 理想类群与 Picard 群

定义 10.4.3. 设 R 为 Dedekind 整环， $K = \text{Frac}(R)$ 。分式理想群对其主分式理想子群的商

$$\text{Cl}(R) := \{\text{非零分式理想}\} / \{xR : x \in K^*\}.$$

称为 R 的**理想类群** (ideal class group)。另设 R 为任意交换环。考虑有限生成投射 R 模 L 的同构类, 要求对每个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$, $L_{\mathfrak{p}}$ 都是秩一自由 $R_{\mathfrak{p}}$ 模。这些同构类以 R 上的张量积为乘法所成的群, 称为 R 的**Picard 群** (Picard group), 记为 $\text{Pic}(R)$ 。

说明后一构造确实为群。两个有限投射模都是有限自由模的直和因子, 张量后仍为有限投射模; 局部化后两个秩一自由模的张量积仍秩一。对偶 $L^* = \text{Hom}_R(L, R)$ 也为有限投射模: 将分解 $R^r = L \oplus L'$ 取对偶便得到相应的直和分解。有限投射模也有限展示, 因为这项分解中 L' 是由 R^r 的有限基经投影得到的有限生成核。因此**定理 2.3.3** 适用于 L , 它使求值映射 $L \otimes_R L^* \rightarrow R$ 在每个素理想处成为秩一自由模的求值同构。由**定理 2.4.3** 它本身即为同构。因此 $[L^*]$ 是逆元, $[R]$ 是单位元。

命题 10.4.4. 设 R 为 Dedekind 整环, $K = \text{Frac}(R)$ 。则有自然群同构 $\text{Cl}(R) \simeq \text{Pic}(R)$, 由 $[I] \mapsto [I]$ 给出。而 $\text{Cl}(R) = 0$ 当且仅当 R 是主理想整环。

证明. 可逆理想由**命题 10.3.5** 为有限投射模, 并且局部自由秩一。乘法映射 $I \otimes_R J \rightarrow IJ$ 在每个局部 DVR 上, 是两个非零主分式理想的乘法同构, 故由局部检测是同构。主分式理想同构于 R , 所以映射在类群上良定义且保持乘法。

若 $I \simeq J$, 将同构张量到 K 后, 得到两个一维 K 空间间的同构, 必为乘以某个 $x \in K^*$ 。于是 $J = xI$, 说明类群映射单射。给定有限投射且局部秩一的 L , 它是自由模的直和因子, 因而无挠; 所以 $L \rightarrow K \otimes_R L$ 单射。后者一维, 选择它与 K 的同构, 将 L 识别为 K 内有限生成的非零子模。为有限个生成元清除分母后, 它成为一个分式理想。因此映射满射。最后, 类群平凡恰好表示每个非零分式理想都主生成, 特别是每个非零通常理想主生成; 反向由清分母同样成立。□

取 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 记 $s = \sqrt{-5}$ 。此时 $R = \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[s]$ 。为核实这一步, 设 $a + bs$ 整, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$ 。迹 $2a$ 和范数 $a^2 + 5b^2$ 都为整数, 故 $-20b^2 = (2a)^2 - 4(a^2 + 5b^2)$ 为整数。将 b 写成既约分数, 分母的平方整除 20, 所以 $2b \in \mathbb{Z}$ 。写 $a = A/2, b = B/2$, 由 $A^2 + 5B^2 \equiv 0 \pmod{4}$ 得 A, B 都为偶数, 故 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。反向由 s 整显然成立。

理想 $\mathfrak{p} = (2, 1 + s)$ 的商环为 $\mathbb{F}_2$, 所以是素理想。有 $\mathfrak{p}^2 = (2)$: 平方的生成元均被 2 整除, 而 $2(1 + s) - (1 + s)^2 = 6$, 连同 $4 \in \mathfrak{p}^2$ 得 $2 \in \mathfrak{p}^2$ 。它不是主理想。若 $\mathfrak{p} = (\alpha)$, $\alpha = a + bs$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$, 则由 $\mathfrak{p}^2 = (2)$ 得 $\alpha^2 = 2u$, 其中 $u \in R^*$ 。范数 $N(a + bs) = a^2 + 5b^2$ 非负且有乘法性; 对单位 u , $N(u)N(u^{-1}) = 1$ 使 $N(u) = 1$ 。于是 $N(\alpha)^2 = 4$, 即 $a^2 + 5b^2 = 2$, 但这个方程没有整数解。因此 $[\mathfrak{p}]$ 是类群中阶二的非平凡元素。这里已经看到元素分解与理想分解的区别, 不需要先计算整个类群。

10.4.3 正规曲线与离散赋值

设 k 为域, A 为有限型整 k 代数。若 $\dim A = 1$, 本节便称 A 所对应的仿射对象为一条不可约仿射曲线。这里用 $\text{Spec } A$ 表示该仿射对象, 以便包含非代数闭基域的闭点。由**定理 9.3.3**, 其有理函数域在 k 上的超越次数为一。若 A 整闭, 称曲线正规。此时 A 为 Dedekind 整环, 每个闭点 $\mathfrak{p}$ 的局部环是 DVR。

对 $0 \neq f \in \text{Frac}(A)$, 整数 $v_{\mathfrak{p}}(f)$ 表示在该点的阶数: 正值是零点阶数, 负值是极点阶数, 零值表示在该局部环中为单位。主分式理想的分解说明只有有限多个非零阶, 并给出

$$fA = \prod_{\mathfrak{p} \neq 0} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(f)}.$$

这里列的是这个仿射曲线上的闭点; 没有说已把某个完备曲线上可能存在的其他点也列入。

在 $A = k[t]$ 上, 闭点由首一不可约多项式 $q(t)$ 表示, 统一化元为 q , 阶数即 q 在分子和分母中的重数之差。在 $k[t, t^{-1}]$ 上, (t) 已因局部化而消失, t 是单位, 在留下的所有闭点的阶数都为零。这解释了删去一点会怎样改变可逆函数, 而不改变函数域。

尖点 $k[t^2, t^3]$ 的正规化为 $k[t]$, 见命题 6.4.3。原点上方正规局部环的统一化元是 t , 原来两个坐标的阶数分别为二和三。但原来的局部环不含 t , 它的极大理想需要两个生成元, 因此自身不是 DVR。正规化使零点阶成为一个整数赋值; 这不等于把原局部环已经具有的生成关系抹去。

本章小结

赋值环的整除关系是全序的, 这使有限生成理想成为主理想; 但值群可以稠密, 也可以具有多个凸子群。因此整闭、局部、一维或极大理想主生成等零散条件, 都不能单独代替 DVR 的完整刻画。Noether 性使行列式技巧和 Nakayama 引理能够把一维正规局部结构转化为统一化元的整数幂。

Dedekind 整环的非零理想在各个 DVR 处留下有限多个整数指数, 局部检测再恢复唯一的全局分解。分式理想允许负指数, 于是组成自由交换群; 模掉主分式理想得到类群。类群也可以用秩一有限投射模来描述, 这为后来讨论可逆模和线丛提供了已证明的代数例子。

习题

习题 10.1. 设 $a_1 + \cdots + a_r = 0$, 其中各 a_i 是赋值域的非零元素。证明最小的 $v(a_i)$ 至少出现两次。给出两个同阶元素之和阶数严格增大的例子。

解. 若最小值只在 a_1 处出现, 则有限和的赋值不小于各项的最小值给出 $v(a_2 + \cdots + a_r) > v(a_1)$, 但左侧为 $v(-a_1) = v(a_1)$, 矛盾。在 $k(t)$ 的零点赋值中, 1 与 $-1+t$ 都为零阶, 其和 t 为一阶; 这在任意特征都成立。□

习题 10.2. 在 $\mathbb{Q}$ 中计算 $v_2(84/75)$ 、 $v_3(84/75)$ 、 $v_5(84/75)$, 判断该有理数属于哪些 $\mathbb{Z}_{(p)}$, 并指出在哪些局部环中为单位。

解. $84/75 = 2^2 \cdot 7 / (3 \cdot 5^2)$, 所以三个赋值分别为 $2, -1, -2$ 。它恰在 $p \neq 3, 5$ 时属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$; 在这些环中, $p = 2, 7$ 时非单位, 其余素数处是单位。□

习题 10.3. 取正无理数 α 。对 $0 \neq f = \sum c_{ij}x^i y^j \in k[x, y]$, 令 $v(f) = \min\{i + \alpha j : c_{ij} \neq 0\}$ 。证明它延拓为 $k(x, y)$ 的赋值, 并求其值群的秩和有理秩。这一构造见 [2, Exercise 10.11, p. 78], 这里补入两种秩的比较。

解. 无理性使不同单项式具有不同权重, 所以每个非零多项式有唯一最低权项。两个最低权项的乘积是乘积多项式唯一最低权项, 系数非零, 故 $v(fg) = v(f) + v(g)$ 。相加只能消去已有项, 因而满足赋值不等式。定义 $v(f/g) = v(f) - v(g)$, 乘法等式保证与分式表示无关。值群为 $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$, 作为实数有序子群, 其非零凸子群必为全群, 秩一。 $1, \alpha$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性独立, 所以有理秩二。□

习题 10.4. 对正文中值群为 $\mathbb{Q}$ 的赋值环, 证明极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足 $\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}$, 并说明为什么 Nakayama 引理不能使它为零。

解. 取 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$, 设 $v(a) = q > 0$ 。由赋值满射可取 b 使 $v(b) = q/2$; 于是 $b, a/b \in \mathfrak{m}$, 故 $a \in \mathfrak{m}^2$ 。反向包含总成立。 $\mathfrak{m}$ 非零却不有限生成; 它没有最小正赋值元素, 有限生成会迫使主生成。这正是 Nakayama 引理的有限性条件失效之处。□

习题 10.5. 证明整环 V 为赋值环, 当且仅当任意两个主理想可按包含比较。再说明“每个有限生成理想都主生成”单独是否足够。

解. 赋值环的主理想可比较已在正文证明。反向, 对 $x = a/b \in \text{Frac}(V)^*$, 若 $aV \subseteq bV$, 则 $x \in V$; 若 $bV \subseteq aV$, 则 $x^{-1} \in V$ 。仅要求有限生成理想主生成不够, 例如 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环, 但 (2) 和 (3) 不可比较, $2/3$ 及其倒数均不在 $\mathbb{Z}$ 。□

习题 10.6. 设 V 为 K 的赋值环, 且 $V \subseteq W \subseteq K$ 为子环。证明存在 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } V$ 使 $W = V_{\mathfrak{p}}$ 。

解. 对 $x \in K^*$, x 或 x^{-1} 已在 V , 当然也在 W , 故 W 为赋值环。设 $\mathfrak{n}$ 为其极大理想, $\mathfrak{p} = \mathfrak{n} \cap V$ 。 $V \setminus \mathfrak{p}$ 中的元在 W 可逆, 所以 $V_{\mathfrak{p}} \subseteq W$ 。对 $x \in W \setminus V$, 倒数条件给 $x^{-1} \in V$, 它在 W 中的逆为 x , 故 $x^{-1} \notin \mathfrak{p}$, 于是 $x \in V_{\mathfrak{p}}$ 。这证明反向包含。□

习题 10.7. 对正文中 $\mathbb{Z}^2$ 字典序赋值环, 列出全部素理想, 并证明它的极大理想主生成而环不 Noether。

解. 凸子群恰为 $0, \{0\} \times \mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}^2$ 。若凸子群含某个第一坐标非零的元素, 换号后可令第一坐标为正, 其正整数倍超过任意给定元素, 凸性使子群为全群; 其余凸子群归结为 $\mathbb{Z}$ 的凸子群。对应素理想为 $\mathfrak{m}, \mathfrak{p} = \{0\} \cup \{f : v(f)_1 > 0\}$ 和 (0) 。最小正值是 $(0, 1) = v(u)$, 所以 $\mathfrak{m} = (u)$ 。若 $\mathfrak{p}$ 有限生成, 它会主生成并有最小赋值, 但 $(1, -r) = v(t/u^r)$ 随 r 无界下降, 且第一坐标一是 $\mathfrak{p}$ 中最小可能第一坐标, 故不存在最小赋值。环不 Noether。□

习题 10.8. 对尖点局部环 $R = k[t^2, t^3]_{(t^2, t^3)}$, 计算 R/t^2R 和 R/t^3R 的长度。说明这两个数虽然等于正规化环中相应元素的阶数, 仍不能推出 R 为 DVR。

解. 在 $k[t^2, t^3]$ 中, 出现的幂指数恰为 $0, 2, 3, 4, \dots$. 模掉 t^2 后留下 $1, t^3$ 作为 k 基; 模掉 t^3 后留下 $1, t^2, t^4$ 作为 k 基. 两商环中非常数部分均幂零, 故原来常数项非零的分母已可逆, 局部化不改变这两个商环. 它们的剩余域为 k , 每个简单因子都是一维 k 空间, 因此长度分别为二和三. 有限型代数保证原环 Noether, 其分式域为 $k(t)$, 维数为一; 原点极大理想非零, 所以 R 仍一维. 长度与零点阶的这些相等关系却不足以判定整闭性. 元素 t 满足首一方程 $X^2 - t^2 = 0$, 却不属于 R . 若 $t = f/g$, g 常数项非零, 而 $f, g \in k[t^2, t^3]$, 则 $tg = f$ 左边的 t 系数非零, 右边无一次项, 矛盾. 因此它不整闭, 不能为 DVR. $\square$

习题 10.9. 设 R 为 DVR. 求 $(\mathfrak{m}^a : \mathfrak{m}^b)$ 、 $a, b \geq 0$, 以及 $R/\mathfrak{m}^n$ 中被 π^r 零化的子模的长度.

解. 条件 $x\mathfrak{m}^b \subseteq \mathfrak{m}^a$ 等价于 $v(x) + b \geq a$, 且 $x \in R$, 所以理想商为 $\mathfrak{m}^{\max(a-b, 0)}$. 第二个子模为 $\mathfrak{m}^{\max(n-r, 0)}/\mathfrak{m}^n$, 其长度为 $\min(r, n)$, 这里 $r \geq 0$. $\square$

习题 10.10. 设 R 为 DVR, 计算矩阵 $\begin{pmatrix} \pi^2 & \pi^2 \\ 0 & \pi^3 \end{pmatrix}$ 所定义的 $R^2 \rightarrow R^2$ 的余核分解与长度.

解. 交换两列得到 $\begin{pmatrix} \pi & \pi^2 \\ \pi^3 & 0 \end{pmatrix}$. 第二行减去第一行的 π^2 倍, 再令第二列减去第一列的 π 倍, 得到 $\text{diag}(\pi, -\pi^4)$. 这些均为可逆基变换, 故余核为 $R/(\pi) \oplus R/(\pi^4)$, 长度五. 行列式的阶也为五, 在这里与长度计算一致. $\square$

习题 10.11. 设 $R \subseteq S$ 为 DVR 间的局部单射, π, τ 分别为统一化元. 证明存在整数 $e \geq 1$ 使 $v_S(x) = e v_R(x)$ 对全部 $x \in \text{Frac}(R)^*$ 成立. 计算 $k[t]_{(t)} \subseteq k[u]_{(u)}$ 、 $t = u^e$, 的这个整数.

解. 局部同态使 π 落入 S 的极大理想, 又因单射而非零, 故 $v_S(\pi) = e \geq 1$. R 中的单位在 S 仍是单位, 因为其逆也被映入. 写 $x = \pi^n a$ 、 $a \in R^*$ 、 $n \in \mathbb{Z}$, 便得公式. 例子中 $v_u(t) = v_u(u^e) = e$, 恰为所求整数; 结论不要求特征不整除 e . $\square$

习题 10.12. 在 $\mathbb{Z}$ 中取分式理想 $I = (6/35)$ 、 $J = (14/15)$. 求它们的和、交、积和各自的逆.

解. 统一分母为 105, 分子理想分别为 (18) 和 (98). 最大公因数为二, 最小公倍数为 882, 故

$$I + J = (2/105), \quad I \cap J = (42/5), \quad IJ = (4/25).$$

主分式理想的逆由生成元取倒数给出, 分别为 $(35/6)$ 和 $(15/14)$. $\square$

习题 10.13. 若 R 为 Dedekind 整环, I, J 为非零分式理想, 证明 $\text{Hom}_R(I, J) \simeq JI^{-1}$, 右边的元素通过乘法定义映射.

解. 任一 R 线性映射张量到 K 后成为一维 K 空间之间的线性映射, 因而是乘以某个 $x \in K$. 它取 I 到 J 当且仅当 $xI \subseteq J$. 乘以 I^{-1} 得这等价于 $xR \subseteq JI^{-1}$, 即 $x \in JI^{-1}$. 反向包含也直接由 $I^{-1}I = R$ 得到. 零映射对应 $x = 0$, 所以这是全部 Hom 模的同构. $\square$

习题 10.14. 设 R 为 Dedekind 整环。若 $I = \prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{n_i} \neq 0$, 其中 $n_i > 0$ 、各 $\mathfrak{p}_i$ 为不同的非零素理想, 证明

$$R/I \simeq \prod_{i=1}^r R/\mathfrak{p}_i^{n_i}, \quad \ell_R(R/I) = \sum_{i=1}^r n_i.$$

解. 不同极大理想的幂互素: 若 $a + b = 1$ 、 $a \in \mathfrak{p}_i, b \in \mathfrak{p}_j$, 展开 $(a + b)^{n_i + n_j - 1}$ 即见每项属于两幂之一。中国剩余定理给出直积同构。 $R/\mathfrak{p}^n$ 中每个 $s \notin \mathfrak{p}$ 都可逆, 因为 $R/\mathfrak{p}^n$ 只有一个极大理想。因此该商环同构于 $R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$, 它的 DVR 幂滤过有 n 个简单因子, 每个作为 R 模也同构于 $R/\mathfrak{p}$ 。长度为 n , 对有限直积相加得到结论。□

习题 10.15. 证明只有有限多个极大理想的 Dedekind 整环是主理想整环。此题见 [2, Exercise 11.7, p. 86]。

解. 域的情形显然。设极大理想为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$, 取非零理想 $I = \prod_i \mathfrak{p}_i^{n_i}$ 。每个 $\mathfrak{p}_i^{n_i}/\mathfrak{p}_i^{n_i+1} \neq 0$, 可选 $a_i \in \mathfrak{p}_i^{n_i} \setminus \mathfrak{p}_i^{n_i+1}$ 。中国剩余定理给 $a \in R$ 使 $a \equiv a_i \pmod{\mathfrak{p}_i^{n_i+1}}$ 同时成立, 故 $v_{\mathfrak{p}_i}(a) = n_i$ 。已列出所有非零素理想, 所以唯一分解给 $aR = I$ 。□

习题 10.16. 设 R 为 Dedekind 整环, S 为不含零的乘法集。证明 $\text{Cl}(R) \rightarrow \text{Cl}(S^{-1}R)$ 、 $[I] \mapsto [S^{-1}I]$, 满射, 且核由所有满足 $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$ 的素理想类生成。

解. 局部化后, 遇到 S 的素理想成为单位理想, 其余非零素理想与局部化环的非零素理想一一对应。因此分式理想群之间的映射删去前一类基元素, 是满射, 并将主理想映为主理想。若 $S^{-1}I = xS^{-1}R$, 则分式理想 $x^{-1}I$ 在所有避开 S 的素理想处的指数为零, 因而由遇到 S 的素理想及其逆组成。在类群中 $[x^{-1}I] = [I]$, 所以核恰由这些类生成。□

习题 10.17. 设 R 为整环, 且每个非零通常理想都可逆。证明 R 为 Dedekind 整环。

解. 可逆理想有限生成, 见命题 10.3.5 证明中的有限单位分解, 因此全部理想有限生成, R 为 Noether 环。若 R 非域, 每个极大理想 $\mathfrak{m} \neq 0$ 可逆, 在 $\mathfrak{m}$ 处局部主生成。于是 $R_{\mathfrak{m}}$ 是非域 Noether 局部整环, 极大理想主生成, 故为 DVR。由定理 10.3.2, R 是 Dedekind 整环。域也符合定义。□

习题 10.18. 在 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 令 $s = \sqrt{-5}$ 、 $\mathfrak{q} = (3, 1+s)$ 、 $\mathfrak{q}' = (3, 1-s)$ 。证明它们为不同素理想, 并计算 $\mathfrak{q}\mathfrak{q}'$ 及 $(1+s)$ 的素理想分解。

解. 两个商环均为 $\mathbb{F}_3$, 但 s 的像分别为 -1 与 1 , 故是不同素理想。乘积由 $9, 3(1+s), 3(1-s), 6$ 生成, 所有生成元属于 (3) , 而 $9-6=3$ 属于乘积, 故乘积为 (3) 。记 $\mathfrak{p} = (2, 1+s)$ 。因 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 都含 $1+s$, 有 $(1+s) \subseteq \mathfrak{p}\mathfrak{q}$, 这里使用不同极大理想的交等于积。在商环 $R/(1+s)$ 中有 $s = -1$, 原来的关系 $s^2+5=0$ 变成 $6=0$, 故 $R/(1+s) \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。中国剩余定理给 $|R/\mathfrak{p}\mathfrak{q}| = 2 \cdot 3 = 6$, 故两个有限指数子群相等, 即 $(1+s) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}$ 。□

习题 10.19. 对正文中的 $\mathfrak{p} = (2, 1+\sqrt{-5})$, 证明它是秩一有限投射模, 但不是自由模; 再求 $\mathfrak{p} \otimes_R \mathfrak{p}$ 的同构类型。

解. Dedekind 整环中非零理想可逆, 故有限投射且局部秩一。若自由, 其与分式域张量后维数一, 故只能自由秩一, 从而主生成, 和正文中的范数计算矛盾。乘法给出 $\mathfrak{p} \otimes_R \mathfrak{p} \simeq \mathfrak{p}^2 = (2) \simeq R$ 。因此非自由秩一投射模的张量平方可以自由。 $\square$

习题 10.20. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为次数 n 的数域, p 为素数。证明 $|\mathcal{O}_K/p\mathcal{O}_K| = p^n$ 。若 $p\mathcal{O}_K = \prod_i \mathfrak{p}_i^{e_i}$, 且 $|\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i| = p^{f_i}$, 证明 $\sum_i e_i f_i = n$ 。

解. 整数环是秩 n 的自由整数模, 模掉 p 后为 n 维 $\mathbb{F}_p$ 空间, 元素数为 p^n 。中国剩余定理分解商环。每个 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i^{e_i}$ 的幂滤过有 e_i 个同构于剩余域的因子, 因此其元素数为 $p^{e_i f_i}$ 。相乘并比较 p 的指数, 得到公式。 $\square$

习题 10.21. 设 k 为域。求 $f = (t-1)^3/(t^2(t+1))$ 在仿射直线各闭点的阶数, 分别讨论 $\text{char } k = 2$ 与不等于二的情形。再将环换成 $k[t, t^{-1}]$ 。

解. 特征不为二时, $0, 1, -1$ 是互异的 k 点, 阶数分别为 $-2, 3, -1$, 其余闭点为零。特征二时 $t+1 = t-1$, 约去后 $f = (t-1)^2/t^2$, 在 $0, 1$ 的阶数分别为 $-2, 2$, 其余为零。换成 Laurent 多项式环后, 点 (t) 被删除; 其他点和阶数保持, 只需从上述表中删去零点处的条目。 $\square$

习题 10.22. 若 A 为正规仿射曲线的坐标环, $f \in \text{Frac}(A)^*$, 证明 $f \in A$ 当且仅当所有闭点处 $v_{\mathfrak{p}}(f) \geq 0$; 证明 $f \in A^*$ 当且仅当各处阶数都为零。

解. A 等于全部极大理想局部环之交, 已在定理 10.3.2 证明。每个局部环是 DVR, 属于该环恰等价于赋值非负, 故得到第一结论。单位条件要求 f 和 f^{-1} 同时属于 A , 等价于各赋值同时非负和非正, 即全部为零。 $\square$

第十一章 分次环、Hilbert 函数与多项式

分次把模分成可以逐片计数的部分。本章先以分次正合列证明 Hilbert 级数的有理性，再说明标准分次下的最终多项式为何记录支集维数。局部环虽然未必分次，却能从理想幂构造伴随分次环；对这些分次片的累计长度进行比较，便得到 Hilbert–Samuel 定理。参数理想、曲线奇点与切锥的计算将说明，维数控制增长的次数，重数记录增长的首项，但这两个数字不能代替完整的局部结构。

本章目标

- 区分正分次与标准分次，正确处理齐次关系及次数平移。
- 从分次正合列计算 Hilbert 级数，判断何时存在最终的单个多项式。
- 说明 Hilbert 多项式、累计增长、维数与重数之间的关系。
- 构造伴随分次环，并用参数理想和切锥计算局部长度。

预备知识为第三章的有限性和长度、第五章的 Noether 正规化，以及第九章的维数和参数系。全章不预先使用完备化：局部增长证明需要的诱导滤过估计在引理 11.4.2 中直接由有限分次生成元建立。第十三章再将该估计加强为 Artin–Rees 等式。

可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[2, §13, Theorems 13.2–13.4, pp. 94–100] 阅读 Hilbert 级数与局部增长。使用不同资料时须先核对函数的约定：本章的 $h(n)$ 记单层长度， $\chi(n)$ 记累计长度；两者的多项式次数相差一，零维时还须单独处理。

11.1 分次环与分次模

多项式的全次数把一个无限维空间分成有限维的片。若方程齐次，取商以后仍可逐次计数；若方程不齐次，则通常只能先保留一个次数滤过。分次理论先研究前一种情形。本章的环都交换，分次环从次数零开始，分次模允许整数次数，但有限生成模的非零分次片总有一个共同的下界。

11.1.1 正分次与标准分次

定义 11.1.1. 设 A 为交换环。若其加法群具有满足以下条件的直和解

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n, \quad 1 \in A_0, \quad A_i A_j \subseteq A_{i+j}.$$

则称此分解为 A 的一个**正分次** (positive grading)。属于单个 A_n 的元素称为**次数 n 的齐次元素** (homogeneous element)。若 $A = A_0[A_1]$ ，且 A_1 是有限 A_0 模，称此分

次为**标准分次** (standard grading)。若 A 模 M 具有直和分解 $M = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} M_n$, 满足 $A_i M_j \subseteq M_{i+j}$, 则称 M 为分次 A 模。分次同态在本章均指保持次数的模同态。

正次数部分 $A_+ = \bigoplus_{n>0} A_n$ 是理想, 且 $A/A_+ \cong A_0$ 。多项式环的通常全次数给出标准分次; 若给变量赋正整数权 d_i , 令 $\deg x_i = d_i$, 也得到正分次, 但未必标准。例如 $k[x]$ 取 $\deg x = 2$, 奇数次分量全为零。

直和意味着每个元素只有有限个非零齐次分量。形式幂级数通常有无限多个分量, 因此不能把 $k[[x]]$ 当作这里的 $\bigoplus_{n \geq 0} kx^n$ 。它更适合用第十三章的滤过与完备化描述。

命题 11.1.2. 设 $A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ 为交换正分次环。若 A_0 是 Noether 环, A 由有限个正次数齐次元素作为 A_0 代数生成, 则 A 为 Noether 环, 每个 A_n 是有限 A_0 模。反之, 若正分次环 A 为 Noether 环, 则上述两个条件成立。

证明. 正向由推论 3.1.5 得到 Noether 性。若生成元次数为正数 $d_1, \dots, d_r$, 给定 n 时, 满足 $\sum d_i a_i = n$ 的非负整数组只有有限多组, 对应单项式生成 A_n 。

反向, $A_0 \cong A/A_+$ 是 Noether 环。对理想 A_+ 取有限组生成元, 再把各生成元分成齐次部分, 可得到有限组正次数齐次理想生成元 x_i 。若 $a \in A_n$ 、 $n > 0$, 在等式 $a = \sum f_i x_i$ 中只取次数 n 的部分, 得到 $a = \sum (f_i)_{n-\deg x_i} x_i$ 。各系数的次数低于 n , 对 n 归纳可知 $a \in A_0[x_1, \dots, x_r]$ 。□

11.1.2 齐次理想与分次展示

设 A 为交换正分次环, M 为分次 A 模。若子模 $N \subseteq M$ 包含其中每个元素的所有齐次分量, 则称 N 为**齐次子模** (graded submodule)。等价地, $N = \bigoplus_n (N \cap M_n)$, 或 N 可以由齐次元素生成。后一等价的反向使用了乘积次数相加: 把系数也分次后, 任意齐次分量仍是原齐次生成元的组合。取 $M = A$ 就得到齐次理想。

若 N 齐次, 商模以 $(M/N)_n = M_n/(N \cap M_n)$ 分次; 分次同态的核与像都是齐次子模, 正合性也可以在每个次数上检查。例如 $(x^2, xy) \subset k[x, y]$ 齐次, 而 $(x-1)$ 不是齐次理想: 它含 $x-1$, 却不含其常数部分 -1 。

命题 11.1.3. 设 A 为交换 Noether 正分次环, M 为有限生成分次 A 模。则 M 有有限组齐次生成元, 也有由齐次关系组成的有限展示。

证明. 把任意有限组生成元的全部齐次分量收集起来, 所得仍为有限组, 且生成 M 。设它们为 m_i , 次数为 a_i 。给自由模第 i 个基向量赋次数 a_i , 便有保持次数的自由满射 $F \rightarrow M$ 。其核 K 是齐次子模, 且由 Noether 性有限生成。再把 K 的有限组生成元拆为齐次部分, 就得到有限组齐次关系及相应的分次展示。□

若两个生成元次数不同, 同一个齐次关系中系数的次数也不同。关系的齐次性指“系数次数加上相应生成元次数”相同, 而不是要求一列矩阵的所有系数都有相同次数。

11.1.3 次数平移与有限生成

定义 11.1.4. 设 A 为交换正分次环, M 为分次 A 模, $a \in \mathbb{Z}$. 次数平移 $M(a)$ 定义为

$$M(a)_n = M_{n+a},$$

底层模与作用不变。特别地, $A(-a)$ 的元素 1 位于次数 a 。

于是命题 11.1.3 的展示可写成

$$\bigoplus_j A(-b_j) \longrightarrow \bigoplus_i A(-a_i) \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

相应关系矩阵第 (i, j) 项须齐次且次数为 $b_j - a_i$; 若此差为负, 该项只能为零。这一约定避免在后面级数公式中把平移指数写反。

设 A 由有限个正次数元素生成, M 的齐次生成元为 m_i , $\deg m_i = a_i$ 。逐次取分量有

$$M_n = \sum_i A_{n-a_i} m_i.$$

因此当 $n < \min_i a_i$ 时 $M_n = 0$, 而每个 M_n 都是有限 A_0 模。标准分次时, 还可选 c 使 $M_{n+1} = A_1 M_n$ 对 $n \geq c$ 成立: 只须令 $c \geq \max_i a_i$, 再用 $A_{j+1} = A_1 A_j$ 。这就是有限生成在逐次增长中的具体约束。

11.2 Hilbert 函数

对每一个次数分别计数, 比只说模“无限维”提供了更多信息。例如 $k[x]$ 的每个分次片只有一维, 而 $k[x, y]$ 的第 n 片有 $n+1$ 维。下面把这些数同时装进一个形式级数; 级数的运算只使用系数, 不涉及分析中的收敛。

11.2.1 分次片的维数与长度

本节设 $A = A_0[x_1, \dots, x_r]$ 为正分次环, A_0 为 Artin 环, $d_i = \deg x_i > 0$, M 为有限生成分次 A 模。由命题 11.1.2, A 是 Noether 环; 各 M_n 是有限 A_0 模, 故长度有限。

定义 11.2.1. 设 $A = A_0[x_1, \dots, x_r]$ 为交换正分次环, A_0 为 Artin 环, 各 x_i 的次数为正整数, M 为有限生成分次 A 模。 M 的 **Hilbert 函数** (Hilbert function) 及 **Hilbert 级数** (Hilbert series) 分别为

$$h_M(n) = \ell_{A_0}(M_n), \quad H_M(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_M(n) t^n \in \mathbb{Z}((t)).$$

这里只有有限多个负次幂。若 $A_0 = k$ 为域, 长度就是 k 维数。

短正合列 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 若保持次数, 则 $h_M(n) = h_L(n) + h_N(n)$, 从而 $H_M = H_L + H_N$ 。长度可加是因为将子模的合成列与商模合成列的逆像连接, 就得到中间项的合成列。次数平移则给出

$$H_{M(a)}(t) = t^{-a} H_M(t). \quad (11.1)$$

例如 $k[x_1, \dots, x_r]$ 取标准分次时, 次数 n 的单项式数为 $\binom{n+r-1}{r-1}$ 、 $r \geq 1$, 所以

$$H_{k[x_1, \dots, x_r]}(t) = \frac{1}{(1-t)^r}.$$

这也可直接把每个变量的几何级数相乘得到。若底环为任意 Artin 环 A_0 , 同一自由单项式基使分子乘上 $\ell_{A_0}(A_0)$ 。

11.2.2 Hilbert 级数的有理性

下面的 **Hilbert–Serre 定理** (Hilbert–Serre theorem) 把有限生成条件转化为级数分母的有限形式。

定理 11.2.2 (Hilbert–Serre). 设 $A = A_0[x_1, \dots, x_r]$ 为交换正分次环, A_0 为 Artin 环, $\deg x_i = d_i > 0$, M 为有限生成分次 A 模。则存在整系数 Laurent 多项式 $Q(t)$, 使

$$H_M(t) = \frac{Q(t)}{\prod_{i=1}^r (1-t^{d_i})}.$$

若 $M_n = 0$ 对 $n < 0$ 成立, 则可取 $Q(t) \in \mathbb{Z}[t]$ 。

证明. 对代数生成元个数 r 归纳。 $r = 0$ 时, M 是有限 A_0 模, 有限组齐次生成元的次数之外分量均为零, 所以级数为 Laurent 多项式。

令 $d = d_r$ 、 $K = (0 :_M x_r)$ 、 $L = M/x_r M$ 。乘 x_r 给出分次正合列

$$0 \longrightarrow K(-d) \longrightarrow M(-d) \xrightarrow{x_r} M \longrightarrow L \longrightarrow 0.$$

K, L 都有限生成, 并且被 x_r 零化, 故可视为由前 $r-1$ 个元素生成的代数上的有限分次模。逐片长度可加与(11.1)给出

$$(1-t^d)H_M(t) = H_L(t) - t^d H_K(t). \quad (11.2)$$

对右边应用归纳假设即得结论。若 M 没有负次分量, 则它的级数及所乘的分母都没有负次幂, 因此所得 Laurent 多项式实际上没有负次项。□

这里先证明 K 有限生成再作归纳, 是 Noether 性不可省略的一步。此证明可对照 [2, §13, Theorem 13.2, pp. 94–95]。

11.2.3 Hilbert 级数与增长

标准分次时, 分母全由 $1-t$ 构成。把公共因子约去, 可写

$$H_M(t) = \frac{Q(t)}{(1-t)^d}, \quad Q(1) \neq 0$$

或 $d = 0$ 、 H_M 本身为 Laurent 多项式。对于非零模, d 是在 $t = 1$ 处的极点阶数, 约定没有极点时 $d = 0$ 。下一节将证明它恰等于模支集的维数。

例如对 $A = k[x, y]$ 、 $M = A/(x^2)$ ，乘 x^2 在 A 上单射，故

$$H_M(t) = \frac{1-t^2}{(1-t)^2} = \frac{1+t}{1-t}.$$

所以 $h_M(0) = 1$ ，而 $h_M(n) = 2$ 对 $n \geq 1$ 成立。若改取 $A/(x^2, xy)$ ，标准单项式为 $1, x, y, y^2, \dots$ ，因而

$$H_{A/(x^2, xy)}(t) = \frac{1}{1-t} + t.$$

额外的嵌入部分只改变有限多个低次值，却不改变最终的常数一。

正权分次的一般情况不能直接声称最终是单个多项式。例如 $k[x]$ 、 $\deg x = 2$ 的级数为 $1/(1-t^2)$ ，函数在偶数处为一、奇数处为零。每个同余类可分别呈现多项式行为，但这不是下一节标准分次结论中的同一个多项式。

11.3 Hilbert 多项式

级数的有理性给出最终的多项式公式，但还没有解释为什么公式次数是一个几何维数。本节先从系数提取证明多项式性，再用齐次素理想滤过把问题化到整环上，最后用代数独立参数比较增长。这里始终要求标准分次，底环 A_0 为 Artin 环， $M \neq 0$ 为有限生成分次模。

11.3.1 Hilbert 函数的多项式性

命题 11.3.1. 设 A 为交换标准分次环， A_0 为 Artin 环， $M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模。若其 Hilbert 级数写成 $H_M(t) = Q(t)/(1-t)^d$ ，其中 $Q(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ 、 $d \geq 1$ 、 $Q(1) \neq 0$ ，则存在次数恰为 $d-1$ 的多项式 $P_M(X) \in \mathbb{Q}[X]$ ，使 $h_M(n) = P_M(n)$ 对充分大的 n 成立，其首项为

$$\frac{Q(1)}{(d-1)!} X^{d-1}.$$

若 $d = 0$ ，则 $h_M(n)$ 最终为零，约定 Hilbert 多项式为零。累计函数 $\sum_{j \leq n} h_M(j)$ 在两种情形下均最终是次数为 d 、首项系数为正的多项式。

证明. 写 $Q(t) = \sum_a q_a t^a$ ，只有有限项。公式 $(1-t)^{-d} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+d-1}{d-1} t^n$ 由 d 个几何级数相乘得到。于是当 n 大于所有出现的 a 时，

$$h_M(n) = \sum_a q_a \binom{n-a+d-1}{d-1}.$$

右边是多项式，其 n^{d-1} 系数为 $\sum_a q_a / (d-1)! = Q(1)/(d-1)!$ ，不为零。因左边非负，非零首项系数必须为正。累计级数为 $H_M(t)/(1-t)$ ，同一计算给出次数 d 及首项系数 $Q(1)/d!$ 。若 $d = 0$ ，只有有限片非零，累计函数最终为正整数 $\sum_j h_M(j)$ 。□

这一定理给出的是“大次数以后”的等式。前面的例 $A/(x^2, xy)$ 的 Hilbert 多项式为一，但第一个次数的额外项不能由这一个多项式恢复。

11.3.2 多项式次数与维数

引理 11.3.2. 设 A 为交换 Noether 正分次环, M 为有限生成分次 A 模。则 M 有有限齐次子模滤过, 其因子均形如 $(A/\mathfrak{p})(-a)$, 其中 $\mathfrak{p}$ 为 A 的齐次素理想、 $a \in \mathbb{Z}$ 。

证明. 在非零齐次元素的零化子中选极大元 $\mathfrak{p} = \text{Ann}_A(m)$, 它是齐次理想。若齐次 u, v 满足 $uv \in \mathfrak{p}, v \notin \mathfrak{p}$, 则 vm 是非零齐次元素, 零化子包含 $\mathfrak{p}$, 极大性迫使相等, 故 $u \in \mathfrak{p}$ 。这也推出一般的素性: 在 $A/\mathfrak{p}$ 中, 两个非零元素的最高非零齐次项之积不为零, 因而整个乘积不为零。所以 $Am \cong (A/\mathfrak{p})(-\deg m)$ 。

若此子模不等于 M , 在齐次商模中重复选择, 再取原像。每步使齐次子模严格增加, Noether 性保证有限步终止。□

定理 11.3.3. 设 A 为交换标准分次环, A_0 为 Artin 环, $M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模。令 $\dim_A M = \dim(A/\text{Ann}_A(M))$ 。则 $H_M(t)$ 在 $t = 1$ 处的极点阶数恰为 $\dim_A M$ 。若此维数为 $d > 0$, 则 $\deg P_M = d - 1$; 维数为零时, M 只有有限多个非零分次片。

证明. 由引理 11.3.2, H_M 是各 $H_{A/\mathfrak{p}}$ 的次数平移之和。每个非零因子的累计函数有正首项, 故和的增长次数是各次数的最大值, 不会抵消。同时, 短正合列的支集取并, 见命题 2.3.4, 所以 $\text{Supp } M = \bigcup V(\mathfrak{p})$, 支集维数也是各 $\dim A/\mathfrak{p}$ 的最大值。只须对标准分次整环 $B = A/\mathfrak{p}$ 证明结论。

$B_0 = A_0/(\mathfrak{p} \cap A_0)$ 是域, 因为 Artin 环的素理想都极大; 记这个域为 k 。每个 B_n 的 A_0 长度等于其 k 维数。先设 k 无限。写 $B = k[z_1, \dots, z_r]$ 、 $\deg z_i = 1$ 。若这些元素有代数关系, 其关系理想齐次, 故可选一个非零齐次关系 f 。正如定理 5.4.1 的无限域证明, 选 $c_i \in k$ 使 $f(c_1, \dots, c_{r-1}, 1) \neq 0$, 以 $z_i - c_i z_r$ 替换前 $r - 1$ 个生成元。这样 z_r 满足一个首一齐次关系, 故 B 有限于由前 $r - 1$ 个一次齐次元生成的子环。归纳得到一次代数独立元 $y_1, \dots, y_d$, 使 B 有限于 $P = k[y_1, \dots, y_d]$ 。这次代换始终保持次数。

取有限组齐次 P 模生成元, 次数为 a_i 。于是有分次单射 $P \hookrightarrow B$ 和分次满射 $\bigoplus_i P(-a_i) \twoheadrightarrow B$ 。累计维数被 P 的累计函数与有限个其平移之和夹住; 二者都以 n^d 的正倍数增长, 所以累计函数的多项式次数为 d 。另一方面, 定理 9.3.4 和定理 9.3.2 给出 $\dim B = \dim P = d$ 。

若 k 有限, 改用无限域 $k(u)$, 其中 u 超越。 $B \otimes_k k(u)$ 是 $B[u]$ 的一个局部化, 仍为整环, 且逐次维数不变。其分式域是 $\text{Frac}(B)(u)$, 在 $k(u)$ 上的超越次数等于 $\text{Frac}(B)$ 在 k 上的超越次数。由定理 9.3.3, 这次变基也不改变维数。应用刚证明的无限域情形即得结论。□

11.3.3 重数与首项系数的归一化

定义 11.3.4. 设 A 为交换标准分次环, A_0 为 Artin 环, $M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模。若 $d = \dim_A M > 0$, 把 Hilbert 多项式的首项写成

$$P_M(n) = \frac{e(M)}{(d-1)!} n^{d-1} + \text{低次项},$$

称 $e(M)$ 为这个分次模的**重数** (multiplicity)。若 $d = 0$, 约定 $e(M) = \sum_n \ell_{A_0}(M_n)$ 。

由前两项定理, 约去 $1-t$ 公因子后的分子满足 $e(M) = Q(1)$, 所以重数是正整数。对保持次数的短正合列, 若各项维数都不超过 d , 则次数 $d-1$ 的系数可加; 因此只把维数为 d 的项计入时, 重数可加。低维部分只影响低次项。

例如 $S = k[x_1, \dots, x_r]$, 若 $0 \neq f \in S$ 齐次且 $\deg f = a > 0$, 则

$$H_{S/(f)}(t) = \frac{1-t^a}{(1-t)^r} = \frac{1+t+\dots+t^{a-1}}{(1-t)^{r-1}}.$$

当 $r \geq 2$ 时维数为 $r-1$, 重数为 a ; 当 $r=1$ 时商的总维数为 a , 与零维约定一致。由两个次数 a, b 的齐次元依次作非零因子商, 可同样得到分子 $(1-t^a)(1-t^b)$ 与重数 ab 。这里要求第二个元在第一个商环上仍为非零因子, 否则乘法正合列的左端核不为零, 不能照用该乘积公式。

11.4 局部环中的增长

局部环未必本来分次, 但极大理想的幂提供了逐层近似。每层取商后, 乘法恰好保存阶数相加, 于是得到一个标准分次环。本节把这一构造与前面的计数联系起来, 并证明增长次数等于局部维数; 所需的子模滤过估计先在这里证明, 不借用后面的完备化理论。

11.4.1 伴随分次环

定义 11.4.1. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模。定义**伴随分次环** (associated graded ring) 及相应分次模

$$\mathrm{gr}_I(R) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}, \quad \mathrm{gr}_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M.$$

乘法由 $[a]_i [b]_j = [ab]_{i+j}$ 给出, 模作用同样定义。换代表元时多出的项落入高一阶, 因此这些运算良定义。

若 $I = (a_1, \dots, a_r)$, 则有标准分次满同态

$$(R/I)[X_1, \dots, X_r] \twoheadrightarrow \mathrm{gr}_I(R), \quad X_i \mapsto a_i + I^2.$$

这是因为 I^n 由这些生成元的 n 次乘积生成。若 M 有限生成, $\mathrm{gr}_I(M)$ 由 M/IM 中的有限组生成元在次数零生成。以下取 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为非零 Noether 局部环、 I 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想、 $M \neq 0$ 为有限模。此时 R/I 是 Artin 环, 因而可以对上述分次模使用 Hilbert 理论。

引理 11.4.2 (诱导滤过的控制). 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模、 $N \subseteq M$ 为子模。则存在 $c \geq 0$, 使对每个 $n \geq c$ 有

$$I^n N \subseteq I^n M \cap N \subseteq I^{n-c} N.$$

证明. 引入一个形式变量 t , 考虑正分次代数及分次模

$$\mathcal{R} = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n \subseteq R[t], \quad \mathcal{M} = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M t^n.$$

若 $I = (a_1, \dots, a_r)$, 则 $\mathcal{R} = R[a_1 t, \dots, a_r t]$, 由 Hilbert 基定理为 Noether 环。 M 的有限组生成元放在次数零, 就生成 $\mathcal{M}$ 作为 $\mathcal{R}$ 模。于是其齐次子模

$$\mathcal{N} = \bigoplus_{n \geq 0} (I^n M \cap N) t^n$$

有限生成。选齐次生成元 $z_j t^{d_j}$, 并取 $c \geq \max_j d_j$ 。比较次数 $n \geq c$ 的部分, 得到

$$I^n M \cap N = \sum_j I^{n-d_j} z_j \subseteq I^{n-c} N.$$

另一包含直接来自 $N \subseteq M$ 。零子模时可取 $c = 0$ 。 $\square$

这个引理只用 Hilbert 基定理和有限分次生成元, 尚未使用维数或完备化。第十三章将用同一构造证明更精确的 Artin-Rees 等式, 并系统研究两种滤过的拓扑。

11.4.2 Hilbert-Samuel 函数与多项式

定义 11.4.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $I \subseteq R$ 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想, M 为非零有限生成 R 模。定义单层长度与累计长度

$$h_{I,M}(n) = \ell_R(I^n M / I^{n+1} M), \quad \chi_{I,M}(n) = \ell_R(M / I^{n+1} M) \quad (n \geq 0).$$

累计函数 $\chi_{I,M}$ 称为 **Hilbert-Samuel 函数** (Hilbert-Samuel function); 本书始终用下标和 χ 区分它与单层函数。

长度均有限, 因为 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ 使每个 R/I^n 是 Artin 局部环。逐层取商得到

$$\chi_{I,M}(n) = \sum_{j=0}^n h_{I,M}(j). \quad (11.3)$$

R 长度与 R/I 长度在各层相同, 故命题 11.3.1 已经说明 $\chi_{I,M}$ 最终是一个首项为正的多项式。现在确定它的次数。

这一维数刻画称为 **Hilbert-Samuel 定理** (Hilbert-Samuel theorem)。

定理 11.4.4 (Hilbert-Samuel). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $I \subseteq R$ 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想, M 为非零有限生成 R 模, $d = \dim_R M = \dim(R / \text{Ann}_R(M))$ 。则对充分大的 n ,

$$\chi_{I,M}(n) = \frac{e_I(M)}{d!} n^d + \text{低次项}, \quad e_I(M) \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

特别地, $\dim \text{gr}_I(M) = d$ 。整数 $e_I(M)$ 称为 M 关于 I 的 Hilbert-Samuel 重数。

证明. 先记最终累计多项式的次数为 $\delta_I(M)$ 。取 $a \geq 1$ 使 $\mathfrak{m}^a \subseteq I \subseteq \mathfrak{m}$ 。于是

$$\chi_{\mathfrak{m},M}(n) \leq \chi_{I,M}(n) \leq \chi_{\mathfrak{m},M}(a(n+1) - 1).$$

两个界都是首项为正的多项式增长, 故 $\delta_I(M) = \delta_{\mathfrak{m}}(M)$ 。以下只研究 $I = \mathfrak{m}$, 并简记 $\delta(M)$ 。

先取 $M = R$ 。证明 $\dim R \leq \delta(R)$ 时, 对任意给定的严格素理想链长度 r 归纳, 证明 $r \leq \delta(R)$ 。 $r = 0$ 时直接成立。若链为 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$, 令 $B = R/\mathfrak{p}_0$, 其局部累计长度不超过 R 的对应长度, 所以 $\delta(B) \leq \delta(R)$ 。选 $0 \neq f \in \mathfrak{p}_1/\mathfrak{p}_0$, 令 $C = B/fB$ 。它有长度 $r - 1$ 的素链。对有限模中的子模 $fB \subseteq B$ 应用引理 11.4.2, 并用整环中乘 f 的同构 $B \cong fB$, 可取 $c \geq 1$ 使

$$\ell_B(fB/(fB \cap \mathfrak{m}_B^{n+1})) \geq \chi_{\mathfrak{m}_B, B}(n - c).$$

商映射给出的短正合列因此满足

$$\chi_{\mathfrak{m}_C, C}(n) \leq \chi_{\mathfrak{m}_B, B}(n) - \chi_{\mathfrak{m}_B, B}(n - c).$$

$C \neq 0$, 左边最终为正, 故 $\delta(B) \neq 0$; 右边是次数 $\delta(B) - 1$ 的多项式。归纳假设给出 $r - 1 \leq \delta(C) \leq \delta(B) - 1$, 所以 $r \leq \delta(R)$ 。对全部链取上确界, 得到所需下界。

反向令 $d = \dim R$ 。定理 9.4.2 给出由 d 个元素生成的 $\mathfrak{m}$ 准素理想 $\mathfrak{q}$ 。 $\text{gr}_{\mathfrak{q}}(R)$ 是 $(R/\mathfrak{q})[X_1, \dots, X_d]$ 的商, 因此单项式计数给出

$$\chi_{\mathfrak{m}, R}(n) \leq \chi_{\mathfrak{q}, R}(n) \leq \ell_R(R/\mathfrak{q}) \binom{n + d}{d}.$$

所以 $\delta(R) \leq d$ 。 $d = 0$ 时参数理想为零, R 已为 Artin 环, 同一界为常数, 论证仍成立。

一般有限模 M 令 $B = R/\text{Ann}_R(M)$, 并取生成元 $m_1, \dots, m_s$ 。有满射 $B^s \twoheadrightarrow M$, 也有单射

$$B \longrightarrow M^s, \quad b \longmapsto (bm_1, \dots, bm_s).$$

前者给出 $\chi_M(n) \leq s\chi_B(n)$ 。后者结合诱导滤过控制引理给出某个 c 使 $\chi_B(n - c) \leq s\chi_M(n)$ 。各长度在 R 与 B 上相同, 所以 $\delta(M) = \delta(B) = \dim B = d$ 。

最后, $\text{gr}_I(M)$ 的累计函数就是 $\chi_{I, M}$ 。由定理 11.3.3 和命题 11.3.1, 其维数为 d , 累计首项为 $Q(1)n^d/d!$, 其中约分后的整系数分子在一处取正整数值。令 $e_I(M) = Q(1)$ 即得结论; 零维情形取全部层长度之和。 $\square$

证明中以素理想链给出下界, 以参数理想给出上界, 两边都在原局部环内完成。完备化保持维数将在此定理之后证明, 不是本定理的输入。局部增长与维数的经典比较可对照 [2, §13, Theorems 13.3–13.4, pp. 98–100]。

11.4.3 参数理想、重数与切锥的例子

在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中, 令 $\mathfrak{q} = (x^a, y^b)$ 、 $a, b \geq 1$ 。模掉 $\mathfrak{q}^{n+1}$ 后, 单项式唯一写成 $x^{au+i}y^{bv+j}$, 其中 $0 \leq i < a$ 、 $0 \leq j < b$ 、 $u + v \leq n$ 。因此

$$\chi_{\mathfrak{q}, R}(n) = ab \binom{n + 2}{2}, \quad e_{\mathfrak{q}}(R) = ab.$$

局部化不改变这些商的 k 维数, 因为它们已经是极大理想幂零的局部环。特别地, $e_{(x, y)}(R) = 1$ 。参数理想不同, 重数可以不同; 不能只记一个没有注明理想的数字。

命题 11.4.5. 设 k 为域, $R_0 = k[x_1, \dots, x_r]_{(x_1, \dots, x_r)}$, $0 \neq f \in (x_1, \dots, x_r)R_0$, 最低非零齐次部分为 f_a . 令 $R = R_0/(f)$, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想. 则

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(R) \cong k[X_1, \dots, X_r]/(f_a).$$

证明. R_0 的分母常数项非零, 一个分式的最低齐次部分等于分子的最低齐次部分除以分母常数, 因此 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}_0}(R_0) \cong k[X_1, \dots, X_r]$. 商环的伴随分次是它模掉 (f) 中各非零元素的最低齐次部分生成的理想. 这个描述可直接取逐层商的核得到.

若 $g \neq 0$, 多项式伴随分次环为整环, 故最低项之积不为零; 于是 gf 的最低齐次部分是 $g_b f_a$, 其中 g_b 为 g 的最低齐次部分. 因理想 (f) 中每个元素都是这种乘积, 其初始理想恰为 (f_a) , 得到公式. $\square$

伴随分次环的素谱称为此点的**切锥** (tangent cone). 尖点 $y^2 = x^3$ 的切锥由 $Y^2 = 0$ 给出; 在特征不为二时, 结点 $y^2 = x^2(x+1)$ 的切锥由 $Y^2 - X^2 = 0$ 给出. 两者的 Hilbert 级数都是 $(1+t)/(1-t)$, 因此

$$h_{\mathfrak{m},R}(0) = 1, \quad h_{\mathfrak{m},R}(n) = 2 \ (n \geq 1), \quad \chi_{\mathfrak{m},R}(n) = 2n + 1,$$

重数都为二; 但前者切锥非约化, 后者切锥有两条不同直线. 相同重数不意味着相同切锥. 多方程的切锥计算需要控制全部初始关系, 不能只把原生成元各取最低项; 本卷附录 F 将讨论相应的局部标准基.

11.4.4 单层长度、累计长度与零维例外

若 $d = \dim_R M > 0$, 由(11.3)取差分可得

$$h_{I,M}(n) = \frac{e_I(M)}{(d-1)!} n^{d-1} + \text{低次项} \quad (n \gg 0).$$

累计次数为 d , 单层次数为 $d-1$, 两者共享同一个重数; 各自的阶乘归一化不同. 例如在二维多项式局部环上, 单层函数是 $n+1$, 累计函数是 $\binom{n+2}{2}$, 不能把这两种次数互换.

若 $d = 0$, M 有限长度, 某个 $\mathfrak{m}^N M$ 为零, 所以 $I^N M = 0$. 于是单层长度最终为零, 而累计长度最终恒等于 $\ell_R(M)$, 并有 $e_I(M) = \ell_R(M)$. 例如 $R = k[t]/(t^a)$ 的单层长度在 $0 \leq n < a$ 时为一, 以后为零, 累计长度为 $\min(n+1, a)$. 这里不能把 “ $d-1 = -1$ ” 当作一个非零多项式的次数.

本章小结

齐次生成元与齐次关系允许逐次取正合列. 乘以一个齐次元所得的核与余核, 使 Hilbert 级数按变量数递归, 得到有理表达式; 标准分次再使分母只含 $1-t$, 从而产生最终多项式. 正权分次虽然仍有有理级数, 却可能出现随同余类变化的计数.

齐次素理想滤过把增长与维数的比较归结为整环, Noether 正规化则用代数独立参数给出上下界. 局部情形改用理想幂的伴随分次: 素理想链和参数理想分别给出增长次数的两个方向, 最终得到累计长度的次数等于模的维数.

重数取决于所选理想和首项的归一化。相同维数、相同重数甚至相同 Hilbert 函数，都未必意味着同样的切锥或局部环。实际计算应保留所用滤过与全部初始关系；从这一点出发，下一步才适合讨论完备化如何保存这些逐层数据。

习题

习题 11.1. 给 $k[x, y]$ 赋权 $\deg x = 1, \deg y = 2$ 。求 Hilbert 级数与函数，并证明函数最终不是一个多项式。

解. 次数 n 的单项式为 $x^{n-2j}y^j$ ，其中 $0 \leq j \leq \lfloor n/2 \rfloor$ 。因此

$$H(t) = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)}, \quad h(n) = \lfloor n/2 \rfloor + 1.$$

若多项式 P 最终等于它，则增长速度使 P 为一次多项式，斜率为 $1/2$ 。在全部充分大的偶数上有 $P(n) = n/2 + 1$ ，多项式恒等原理迫使 $P(X) = X/2 + 1$ ，而奇数上的实际值为 $(n+1)/2$ ，矛盾。□

习题 11.2. 设 k 为无限域， $I \subseteq k[x_1, \dots, x_r]$ 为理想。证明 I 齐次，当且仅当对所有 $a \in k^\times$ 及 $f \in I$ ，都有 $f(ax_1, \dots, ax_r) \in I$ 。说明有限域上反向不成立。本题将 [2, §13, Exercise 13.1, p. 102] 的伸缩判据用于多项式环，并补充有限域反例。

解. 齐次理想包含每个 f 的齐次部分 f_d ，所以包含 $\sum_d a^d f_d$ 。反向对 $f = \sum_{d=0}^D f_d$ ，选 $D+1$ 个不同非零标量 a_i 。矩阵 $(a_i^d)_{i,d}$ 的 Vandermonde 行列式非零，因而每个 f_d 是这些伸缩后的多项式的 k 线性组合，属于 I 。在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中， $(x^q - x)$ 在所有非零标量伸缩下不变，因为 $a^q = a$ ；但它不包含齐次部分 $-x$ ，所以不是齐次理想。□

习题 11.3. 在标准分次 $S = k[x, y]$ 中，给出 $I = (x^2, xy)$ 的分次自由展示，计算 $H_I(t)$ 与 $H_{S/I}(t)$ 。

解. 关系 $ax^2 + bxy = 0$ 可在整环中约去 x ，得到 $ax + by = 0$ 。模掉 y 说明 $a = yc$ ，再得 $b = -xc$ 。因此有正合列

$$0 \rightarrow S(-3) \xrightarrow{c \mapsto (yc, -xc)} S(-2)^2 \rightarrow I \rightarrow 0.$$

两个生成元次数为二，关系的全次数为三，故平移如式所示。由(11.1)，

$$H_I(t) = \frac{2t^2 - t^3}{(1-t)^2}, \quad H_{S/I}(t) = \frac{1 - 2t^2 + t^3}{(1-t)^2} = \frac{1}{1-t} + t.$$

□

习题 11.4. 令 $A_0 = \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ 、 $a \geq 1$ ， $S = A_0[x_1, \dots, x_r]$ 、 $r \geq 1$ 标准分次。求 S_n 的 A_0 长度，并解释为何不能用它的元素个数代替长度。

解. A_0 的链 $(p^{a-1}) \subset \cdots \subset (p) \subset A_0$ 有 a 个简单因子, 故长度为 a . 单项式给出秩 $\binom{n+r-1}{r-1}$ 的自由基, 所以

$$\ell_{A_0}(S_n) = a \binom{n+r-1}{r-1}, \quad H_S(t) = \frac{a}{(1-t)^r}.$$

元素个数则为 $p^a \binom{n+r-1}{r-1}$, 短正合列中它相乘而不相加. Hilbert 级数的正合列公式依靠长度可加, 故不能这样替换. $\square$

习题 11.5. 令 $A = k[x, y]/(xy)$. 计算 $(0 :_A x)$ 、 A/xA , 并用 (11.2) 求 $H_A(t)$.

解. $(0 :_A x) = (y) \cong k[y](-1)$, 因为任一类可唯一写成 $c + xp(x) + yq(y)$, 乘 x 为零恰要求前两部分为零. 又 $A/xA \cong k[y]$. 所以

$$(1-t)H_A(t) = \frac{1}{1-t} - \frac{t^2}{1-t}, \quad H_A(t) = \frac{1+t}{1-t}.$$

若错误地把乘 x 当作单射, 就会漏掉核对应的 $t^2/(1-t)$. $\square$

习题 11.6. 令 $B = k[x^2, xy, y^2]$, 把三个生成元均定为次数一. 计算 Hilbert 函数、维数和重数, 并给出 B 的齐次方程.

解. B_n 由通常次数 $2n$ 的全部单项式组成, 故 $h_B(n) = 2n+1$, $H_B(t) = (1+t)/(1-t)^2$. 于是定理 11.3.3 给出维数二, 重数为二. 映射 $k[u, v, w] \rightarrow B$ 、 $(u, v, w) \mapsto (x^2, xy, y^2)$ 杀去 $uw - v^2$. 模掉此式后, 每个单项式可写成 $u^a v^b w^c$, 其中 $b = 0$ 或 1 , 因为可用 $v^2 = uw$ 降低 v 次数. 它们的像分别具有指数对 $(2a+b, 2c+b)$, 不同三元组产生不同单项式, 故线性无关. 于是核恰为 $(uw - v^2)$. $\square$

习题 11.7. 对 $a, b \geq 1$, 求标准分次环 $k[x, y, z]/(x^a, y^b)$ 的级数、最终 Hilbert 多项式与重数.

解. 标准单项式为 $x^i y^j z^l$, 其中 $0 \leq i < a$ 、 $0 \leq j < b$ 、 $l \geq 0$. 因此

$$H(t) = \frac{(1+t+\cdots+t^{a-1})(1+t+\cdots+t^{b-1})}{1-t}.$$

当 $n \geq a+b-2$ 时, 每个 (i, j) 都唯一对应 $l = n - i - j \geq 0$, 所以 $h(n) = ab$. 维数为一, 重数为 ab . 这个直接计数也核实了两个非零因子商的级数公式: x^a 在多项式环中为非零因子, y^b 在模掉 x^a 后仍为非零因子. $\square$

习题 11.8. 比较 $k[x, y]/(x)$ 与 $k[x, y]/(x^2, xy)$ 的 Hilbert 函数、Hilbert 多项式和累计函数. 它们的最终单层多项式是否确定全部累计多项式?

解. 前者的级数为 $1/(1-t)$, 后者为 $1/(1-t) + t$. 前者各次函数为一, 后者只有次数一处额外加一. 因此二者 Hilbert 多项式都为一; 累计函数分别为 $n+1$ 与 $n+2$ (后一式对 $n \geq 1$). 低次分量在累计函数中留下常数差, 所以单层最终多项式不确定累计多项式的常数项. $\square$

习题 11.9. 令 $M = (k[x]/(x^a))(-b)$, 其中 $a \geq 1, b \in \mathbb{Z}$. 求非零分次片、单层最终多项式及从全部低次开始累计的最终值。

解. M_n 在 $b \leq n \leq b+a-1$ 时为一维, 其余为零. 因此 $H_M(t) = t^b(1+t+\cdots+t^{a-1})$. 单层最终多项式为零, $\sum_{j \leq n} \dim_k M_j$ 最终等于 a , 且零维重数为 a . 即使 $b < 0$, 也须计入负次的非零片, 不能不加说明地从零次开始求和. $\square$

习题 11.10. 在 $R = k[t]_{(t)}$ 中, 令 $I = (t^a)$, $a \geq 1$. 构造分次同构 $\text{gr}_I(R) \cong (R/I)[T]$, 并求 $\chi_{I,R}(n)$.

解. 把 T 送到 $t^a + I^2$. 在次数 n , 映射为 $R/I \rightarrow I^n/I^{n+1}, \bar{r} \mapsto rt^{an} + I^{n+1}$. 它满射; 若像为零, 则 $rt^{an} \in (t^{a(n+1)})$, 整环中约去 t^{an} , 得到 $r \in (t^a)$, 所以单射. 各次映射保持乘法, 得到同构. 每片长度为 a , 故 $\chi_{I,R}(n) = a(n+1)$, 重数为 a . $\square$

习题 11.11. 令 $R = k[x, y, z]_{(x, y, z)}, I = (x^a, y^b, z^c)$, 其中 $a, b, c \geq 1$. 求 R/I^{n+1} 的长度及 $e_I(R)$.

解. 每个单项式唯一写成 $x^{au+i}y^{bv+j}z^{cw+l}$, 其中 $i < a, j < b, l < c$ 且均非负. 它不属于 I^{n+1} 当且仅当 $u+v+w \leq n$. 这样的三元组有 $\binom{n+3}{3}$ 个, 故长度为 $abc\binom{n+3}{3}$, 重数为 abc . 商中极大理想幂零, 常数项非零的多项式已经可逆, 所以局部化不改变该单项式基. $\square$

习题 11.12. 对 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(y^3 - x^5)$, 求极大理想进切锥、Hilbert 级数与累计长度; 无需限制域的特征.

解. 最低齐次部分为 y^3 , 故命题 11.4.5 给出 $\text{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X, Y]/(Y^3)$. 级数为 $(1+t+t^2)/(1-t)$, 单层长度依次为 $1, 2, 3, 3, \dots$, 累计长度在 $n=0$ 时为一, 在 $n \geq 1$ 时为 $3n$. 维数为一, 重数为三. 这个计算只用最低项与整环中乘积的最低项相乘, 不使用导数, 因而不需排除特征三或五. $\square$

习题 11.13. 令 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(x^2 + y^3, xy)$. 证明切锥不只由 X^2, XY 定义, 求其完整分次环和 R 的长度.

解. 用 $y(x^2 + y^3) - x(xy) = y^4$ 得到额外初始关系 Y^4 . 原商的任一元素可约成 $a + bx + cy + dy^2 + ey^3$. 这些五个类独立: 在五维向量空间上规定 $x^2 = -y^3, xy = 0, y^4 = 0$, 并按这些公式延伸乘法, 就得到交换结合代数; 结合性中涉及 x 的非平凡检查为 $x^2y = xyx = 0, x^3 = 0$, 其余是截断的 $k[y]$ 乘法. 此代数是原商的像且有该五元基, 所以原商中无额外线性关系. 其极大理想幂零, 局部化不再改变它. 极大理想的各层基依次为 $1, x, y, y^2, y^3$, 之后为零. 因此

$$\text{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X, Y]/(X^2, XY, Y^4), \quad H(t) = 1 + 2t + t^2 + t^3,$$

且长度为五. 若只保留两个原生成元的最低项, 会错误地得到无限维商. $\square$

习题 11.14. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $M \neq 0$ 有限, I 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想, $d = \dim_R M$. 证明 $e_{I^a}(M) = a^d e_I(M)$, 其中 $a \geq 1$.

解. 由定义

$$\chi_{I^a, M}(n) = \ell_R(M/I^{a(n+1)}M) = \chi_{I, M}(a(n+1) - 1).$$

把定理 11.4.4 的首项 $e_I(M)n^d/d!$ 代入, 变量的一次替换使首项系数乘 a^d , 即得结论。
 $d = 0$ 时两边均为 $\ell_R(M)$, 与 $a^0 = 1$ 一致。□

习题 11.15. 设 $I \subseteq J$ 为同一 Noether 局部环的两个极大理想准素理想, $M \neq 0$ 为有限模。证明 $e_I(M) \geq e_J(M)$, 并举严格不等的例子。

解. $I^{n+1}M \subseteq J^{n+1}M$ 使前一个商满射到后一个商, 故 $\chi_{I, M}(n) \geq \chi_{J, M}(n)$ 。两者由定理 11.4.4 具有相同次数 $d = \dim_R M$, 比较首项得到不等式。在 $k[t]_{(t)}$ 上取 $M = R$, $I = (t^2)$, $J = (t)$, 两重数分别为二和一。□

习题 11.16. 取 $R = k[t]_{(t)}$, $I = (t)$, $M = R$, $N = t^a R$, 其中 $a \geq 1$ 。求 $I^n M \cap N$, 并求使引理 11.4.2 对全部 $n \geq c$ 成立的最小 c 。

解. 两个主理想的交为 $t^{\max(n, a)}R$, 而 $I^{n-c}N = t^{n-c+a}R$ 。取 $c = a$ 时, 对 $n \geq a$ 两者相等。若 $c < a$, 取 $n \geq a$, 则要求 $t^n R \subseteq t^{n-c+a}R$, 但右边指数严格大于 n , 不成立。因此最小移位为 a 。这也直接展示了诱导滤过与子模自身的理想进滤过通常不逐层相同。□

第十二章 平坦性、基变换与下降

平坦性控制张量积对关系的影响。本章从理想张量判据出发，证明平坦性的局部性和有限展示平坦模的局部自由性。Fitting 理想将展示矩阵的子式变成内在不变量，用来描述纤维生成元数及局部自由条件；泛自由性则说明整基环上的有限代数数据可在一个稠密开集上同时简化。最后建立忠实平坦基变换的检测作用，并在选读节中证明带余循环数据的模如何下降。

本章目标

- 用有限生成理想检测平坦性，辨别无挠、平坦及局部自由的区别。
- 由有限展示计算 Fitting 理想，解释纤维维数所能和不能检测的性质。
- 理解泛自由性证明中首项有限性与清除有限个分母的作用。
- 用剩余纤维判断忠实平坦性，并将变基后的正合性、有限性推回原环。
- 选读：从双重基变换与余循环条件构造模下降的等化子。

预备知识是第二卷的模、有限展示及张量积，以及本卷前两章的局部化和第三章的 Nakayama 引理。平坦性的定义在此重述，所需判据均在本章证明，不以 Tor 或后续同调理论为前提。第 12.6* 节可留待需要拼接对象时再读；第十三章完备化的平坦性只调用第 12.1 节和第 12.5 节的结果。

理想判据、局部环上的有限平坦模及忠实平坦性可对照 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, §7, Theorems 7.2–7.10, pp. 47–52]；泛自由性的另一种证明及更一般形式见 [2, §24, Theorem 24.1, p. 186]。阅读 Fitting 判据时要保留理想等式本身，不能只保留它们定义的闭点集。

12.1 平坦性的判据

局部化保持正合性，但一般的标量扩张没有这个保证。平坦性正是要求张量积不把单射变坏。判断时无须逐一检查所有模之间的单射：只检查有限生成理想进入原环的包含就够了。这个一般判据的主要证明见第二卷定理 7.3.8；本节先给出一个经自由模子模归纳的第二证明，使局部检测的论证可以连续阅读，再建立素理想处的判据。

12.1.1 理想张量判据

定义 12.1.1. 设 R 为交换环， M 为 R 模。如果对任意 R 模之间的单射 $U \rightarrow V$ ，诱导映射 $U \otimes_R M \rightarrow V \otimes_R M$ 仍单射，就称 M 为**平坦模** (flat module)。若交换环同态 $R \rightarrow S$ 使 S 成为平坦 R 模，就称它为平坦同态。

张量积总是右正合：将 V/U 的生成元和线性关系代入张量积的定义，得到 $(V/U) \otimes_R M \cong (V \otimes_R M) / \text{im}(U \otimes_R M)$ 。所以此定义等价于张量函子保持短正合列。自由模平坦，因为与自由模张量就是取若干份直和；平坦模的直和及直和项也平坦，可逐分量检查核。

定理 12.1.2 (理想张量判据). 设 R 为交换环， M 为 R 模。则 M 平坦当且仅当对每个有限生成理想 $I \subseteq R$ ，乘法映射

$$I \otimes_R M \longrightarrow M, \quad a \otimes m \longmapsto am$$

单射。此时该映射把 $I \otimes_R M$ 识别为 IM 。

证明. 必要性直接应用定义于 $I \subseteq R$ 。为证充分性，先把假设推广到任意理想 I 。核中的张量 $z = \sum_{i=1}^r a_i \otimes m_i$ 来自 $I_0 = (a_1, \dots, a_r) \otimes_R M$ 中的同一个有限和。该有限和映到 M 中为零，由假设它在 $I_0 \otimes_R M$ 中已经为零，故 $z = 0$ 。

再证对任意子模 $N \subseteq R^n$ ，映射 $N \otimes_R M \rightarrow M^n$ 单射。对 n 归纳， $n = 1$ 是刚证的理想情形。投影到最后一坐标，令其在 N 上的像为理想 I ，核为 $N' \subseteq R^{n-1}$ 。右正合列

$$N' \otimes_R M \longrightarrow N \otimes_R M \longrightarrow I \otimes_R M \longrightarrow 0$$

说明：若 $z \in N \otimes_R M$ 映到 M^n 为零，则其在 $I \otimes_R M$ 中的像因理想判据为零，故来自某个 $z' \in N' \otimes_R M$ 。这个 z' 映到 M^{n-1} 为零，归纳假设给出 $z' = 0$ ，于是 $z = 0$ 。无限自由模的情形也成立，因为一个核元素只涉及有限多个 N 元素，它们的坐标支集包含于同一个有限自由直和项。

最后给定任意包含 $U \subseteq V$ ，取满射 $F \rightarrow V$ ，其中 F 自由，记核为 K ，并令 $G \subseteq F$ 为 U 的原像。若 $z \in U \otimes_R M$ 映到 $V \otimes_R M$ 为零，先将其提升为 $w \in G \otimes_R M$ 。它在 $F \otimes_R M$ 中的像来自 $K \otimes_R M$ ，所以减去这个来源在 $G \otimes_R M$ 中的像后，可使 w 在 $F \otimes_R M$ 中的像为零。刚证的自由模子模情形给出 $w = 0$ ，原来的 z 因而为零。故任意单射都被保持。□

这个证明只用张量积的右正合性、自由模及有限支集，不需要预先引入 Tor。同一判据见 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, §7, Theorem 7.7, p. 50]。

引理 12.1.3 (平坦模中的有限关系). 设 R 为交换环， M 为平坦 R 模。若 $a_j \in R$ 、 $m_j \in M$ 、 $1 \leq j \leq n$ ，满足 $\sum_{j=1}^n a_j m_j = 0$ ，则存在有限组 $y_l \in M$ 、 $b_{jl} \in R$ ，使

$$m_j = \sum_l b_{jl} y_l, \quad \sum_j a_j b_{jl} = 0 \quad \text{对每个 } l.$$

证明. 令 $\varphi: R^n \rightarrow R$ 将第 j 个基向量送到 a_j ，核为 K 。平坦性使 $K \otimes_R M \rightarrow M^n \rightarrow M$ 正合，所以元组 $(m_j)_j$ 是有限和 $\sum_l v_l \otimes y_l$ 的像。写 $v_l = (b_{jl})_j \in K$ ，便同时得到两组等式。□

12.1.2 平坦性的局部性

定理 12.1.4. 设 R 为交换环， M 为 R 模。下列条件等价： M 在 R 上平坦；对每个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$ ， $M_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上平坦；对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq R$ ，上述局部平坦性成立。

证明. 若 M 平坦, 对 $R_{\mathfrak{p}}$ 模之间的单射张量后再局部化, 仍单射; 利用张量积的平衡关系识别为与 $M_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的张量, 得到局部平坦性。

反向, 任取包含 $U \subseteq V$, 设 K 为 $U \otimes_R M \rightarrow V \otimes_R M$ 的核。由定理 2.1.4 及张量积局部化, 对每个极大理想有

$$K_{\mathfrak{m}} = \ker(U_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \rightarrow V_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}) = 0.$$

定理 2.4.1 于是给出 $K = 0$, 即 M 平坦。□

命题 12.1.5. 设 $R \rightarrow S$ 为交换环同态, M 为 R 模, N 为 S 模。若 M 在 R 上平坦, 则 $S \otimes_R M$ 在 S 上平坦。若 S 在 R 上平坦、 N 在 S 上平坦, 则 N 在 R 上平坦。

证明. 第一项对 S 模包含 $U \subseteq V$ 使用 $U \otimes_S (S \otimes_R M) \cong U \otimes_R M$; 右侧的单射由 M 平坦保证。第二项先与 S 张量, 再与 N 在 S 上张量, 每一步都保持单射, 复合由结合律等于与 N 在 R 上张量。□

12.1.3 局部化的平坦性与无挠模反例

局部化 $S^{-1}R$ 平坦, 因为 $M \otimes_R S^{-1}R \cong S^{-1}M$, 而定理 2.1.4 已证明右侧函子正合。整环上的平坦模必无挠: 对非零 $a \in R$, 映射 $R \xrightarrow{a} R$ 单射, 张量后得到乘 a 在 M 上单射。

反向通常不成立。令 $R = k[x, y]$ 、 $M = I = (x, y)$, 它是整环的子模, 因而无挠。但

$$z = x \otimes y - y \otimes x \in I \otimes_R I$$

在乘法映射下为零。它本身非零: 模掉 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 后, 像落在 $(I/\mathfrak{m}I) \otimes_k (I/\mathfrak{m}I)$, 其中 $\bar{x}, \bar{y}$ 是基, 所列两个不同基张量之差非零, 任意特征都如此。因此定理 12.1.2 说明 I 不平坦。

12.1.4 理想张量判据的局部检测形式

推论 12.1.6. 设 R 为交换环, M 为 R 模。为证明 M 平坦, 只需对每个有限生成理想 $I \subseteq R$ 及每个极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq R$, 证明

$$I_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \rightarrow M_{\mathfrak{m}}$$

单射。在 Noether 环上, 全部理想都有限生成。

证明. 该映射正是 $I \otimes_R M \rightarrow M$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的局部化。由定理 2.4.3, 所有这些局部映射单射便使原映射单射, 再用定理 12.1.2 即可。□

这里的检验仍在局部环上进行, 不能换成只看剩余域中的维数。取 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 、 $M = R/(\varepsilon)$, 唯一纤维是一维向量空间, 但 $(\varepsilon) \otimes_R M \rightarrow M$ 是从非零模到零的映射, 故不平坦。第 12.3 节将用 Fitting 理想记录这个纤维维数忽略的差别。

12.2 有限性与局部自由

平坦性不限制模的大小，例如无穷秩自由模仍平坦。有限展示则同时限制生成元和关系，使一点处的自由性可以扩大到一个邻域，再拼成有限投射性。本节先在局部环中证明自由性，随后解释有限展示为何用于从局部返回整体。

12.2.1 有限展示平坦模

设 R 为交换环， M 为 R 模。如果存在有限非负整数 a, b 及正合列 $R^a \rightarrow R^b \rightarrow M \rightarrow 0$ ，就称 M 有限展示。如果 M 同构于某个有限秩自由模的直和项，就称它为有限生成投射模。如果每个素理想都有一个主开邻域 $D(f)$ ，使 $M_f \cong R_f^r$ 、 r 为有限非负整数，就称 M 局部自由且秩有限； r 可随邻域改变。

定理 12.2.1. 设 R 为交换环。下列三类 R 模相同：

1. 有限展示平坦模；
2. 有限生成投射模；
3. 有限展示且在每个素理想处自由的模。

它们也恰为局部自由且秩有限的模；这里的局部自由要求在邻域上成立，不能仅把“有限展示”从第三项删去。

证明将在下面两小节完成。有限展示的用处不是使张量积右正合，而是使有限个关系可统一处理，使 Hom 与局部化相容。

12.2.2 局部环上的有限自由性

引理 12.2.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换局部环， M 为平坦 R 模。如果 $m_1, \dots, m_n \in M$ 在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像对域 $R/\mathfrak{m}$ 线性无关，则它们在 M 中对 R 线性无关。特别地，有限生成平坦模在交换局部环上自由。

证明. 对 n 归纳。若 $am_1 = 0$ ，由引理 12.1.3 写 $m_1 = \sum_l b_l y_l$ 、 $ab_l = 0$ 。因为 $m_1 \notin \mathfrak{m}M$ ，至少一个 $b_l \notin \mathfrak{m}$ ，为单位，于是 $a = 0$ 。

一般设 $\sum_i a_i m_i = 0$ 。有限关系引理给出 $m_i = \sum_l b_{il} y_l$ 、 $\sum_i a_i b_{il} = 0$ 。在最后一行，至少有一个 b_{nl} 是单位，否则 $m_n \in \mathfrak{m}M$ 。由这一列可写 $a_n = \sum_{i < n} c_i a_i$ ，故

$$\sum_{i < n} a_i (m_i + c_i m_n) = 0.$$

这 $n-1$ 个新元素在剩余域中仍线性无关：任何关系都会成为原 n 个独立像之间的关系。归纳假设给出 $a_i = 0$ 对 $i < n$ ，再得 $a_n = 0$ 。

若 M 有限生成，取 $M/\mathfrak{m}M$ 的有限基并提升为 m_i 。推论 3.2.5 即 Nakayama 生成元判据说明它们生成 M ；刚证的独立性说明它们是一组自由基。□

这一步实际上只要求模有限生成。有限展示在下一步扩大邻域时才不可替代。局部环上的结论及其有限关系证明，可对照 [2, §7, Theorem 7.10, pp. 51–52]。

12.2.3 有限生成投射模与局部自由模

引理 12.2.3. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模, $\mathfrak{p} \subseteq R$ 为素理想. 若 $M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}^r$, r 为非负整数, 则存在 $f \in R \setminus \mathfrak{p}$, 使 $M_f \cong R_f^r$.

证明. 选 M 中有限个元素, 其在 $\mathfrak{p}$ 处的像经乘单位后是一组基, 定义 $u: R^r \rightarrow M$. 余核有限生成且在 $\mathfrak{p}$ 处为零, 所以逐个清除生成元的分母, 得到 $f \notin \mathfrak{p}$, 使 u_f 满射.

以下在 R_f 上工作, 并暂省去局部化下标, 使 u 确为满射. 有限展示保证这个有限自由满射的核 K 有限生成. 具体地, 若另有有限展示 $R^a \xrightarrow{D} R^b \xrightarrow{v} M \rightarrow 0$, 分别将 u 的基像提升到 R^b 、把 v 的基像提升到 R^r , 得映射 $\alpha: R^r \rightarrow R^b$ 、 $\beta: R^b \rightarrow R^r$, 满足 $v\alpha = u$ 、 $u\beta = v$. 对 $z \in \ker u$, αz 属于 $\text{im } D$, 而 $z = \beta\alpha z + (1 - \beta\alpha)z$; 因此 $\ker u$ 由 βD 的有限列及 $1 - \beta\alpha$ 的有限列生成.

核 K 在 $\mathfrak{p}$ 处为零, 再清有限个分母. 恢复原环记号, 可取 $g \in R \setminus \mathfrak{p}$, 使 u_{fg} 同时单射和满射. $\square$

定理 12.2.1 的证明. 第一项由引理 12.2.2 推出第三项; 第三项由定理 12.1.4 推出第一项. 若 M 是有限自由模的直和项, 它平坦, 且有限展示: 设 $R^n = M \oplus N$, 两投影的像都有限生成, 核 N 因而给出 M 的有限展示. 所以第二项推出第一项.

反向, 设 M 满足第三项, 取有限自由满射 $F \rightarrow M$. 考虑

$$\text{Hom}_R(M, F) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, M)$$

的余核. 在任意极大理想处, 由定理 2.3.3 及 M 有限展示, 局部化后的 Hom 正是局部 Hom ; $M_{\mathfrak{m}}$ 自由使局部满射有截面, 故恒等映射在余核中的类处处为零. 由定理 2.4.1, 这个类本来就为零, 于是 $F \rightarrow M$ 有全局截面, M 为有限自由模的直和项.

第三项由引理 12.2.3 给出邻域局部自由. 反过来, 若在主开邻域上有限自由, 由谱拟紧性选有限覆盖 $D(f_i)$. 命题 2.4.4 先使 M 有限生成. 取 $R^n \rightarrow M$ 满射, 其核在每个 $D(f_i)$ 上是有限自由模的直和项, 故有限生成; 再次应用同一命题使核整体有限生成. 因此 M 有限展示, 并满足第三项. $\square$

局部自由的秩在每个平凡化邻域上恒定, 因而为局部常值函数; 若素谱连通, 秩为一个常数. 模仍未必整体自由: 从局部的基到一个全局基, 还需要在重叠处协调基变换. 选读的第 12.6* 节将把这种相容性写成具体数据.

12.3 Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由

有限展示把模写成一个有限矩阵的余核. 在域上, 矩阵的秩决定余核的维数; 在一般环上, 子式是否为零、是否生成单位理想, 比只看各点的数值保留更多信息. Fitting 理想就是把这些子式组织成与展示无关的不变量. 本节的环境均为交换环, 模均有限展示.

12.3.1 Fitting 理想的定义与基变换

定义 12.3.1. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模, 选取展示

$$R^m \xrightarrow{D} R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

记 $I_j(D)$ 为矩阵 D 的全部 j 阶子式生成的理想, 约定 $I_0(D) = R$, 超过行数或列数的子式理想为零。对 $i \geq 0$, 定义第 i 个 **Fitting 理想** (Fitting ideal) 为

$$\text{Fitt}_i(M) = I_{n-i}(D),$$

其中 $i \geq n$ 时取 R ; 另约定 $\text{Fitt}_{-1}(M) = 0$ 。

定理 12.3.2. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模。理想 $\text{Fitt}_i(M)$ 与有限展示的选择无关, 并且对任意交换环同态 $R \rightarrow S$ 及 $i \geq 0$ 都有

$$\text{Fitt}_i(S \otimes_R M) = \text{Fitt}_i(M)S.$$

此外 $\text{Fitt}_{i-1}(M) \subseteq \text{Fitt}_i(M)$ 。

证明. 先检查有限展示的三种变换。可逆行列变换不改变各阶子式理想: 展开变换后子式, 它是原同阶子式的线性组合; 再作逆变换得到反包含。添加一个已有关系的线性组合也不改变子式理想, 因为沿新增列的多线性展开把新子式写成旧子式的组合。

添加一个生成元并用一个关系把它表示为旧生成元的组合, 在可逆行变换后将矩阵变成 $\text{diag}(D, 1)$ 。对 $j \geq 1$, 新矩阵的 j 阶子式由 D 的 j 阶和 $j-1$ 阶子式生成; 前者包含于后者, 故 $I_j(\text{diag}(D, 1)) = I_{j-1}(D)$ 。同时目标自由模秩增加一, 所以 $I_{n-i}(D)$ 保持不变。约定中的零理想和单位理想也满足这一公式。

任意两个有限展示可通过这些变换及其逆变换联系起来。具体说, 将两组模生成元合并; 用原生成元表示新增生成元, 并添加相应的定义关系, 就得到共同的自由模满射。两套有限关系现在生成同一个核。把两套关系列合并, 每个新关系都是旧关系的组合, 因而不改变子式理想; 随后删去另一套冗余关系, 即完成比较。这也说明证明没有假定关系之间线性无关。

任意标量扩张保持展示的右正合性, 故 $S \otimes_R M$ 由同一矩阵的系数像展示。行列式是整系数多项式, 子式因而变成原子式的像, 得到基变换公式。最后, 将每个 j 阶子式沿一行展开, 得到 $I_j(D) \subseteq I_{j-1}(D)$, 即所述递增性。□

例如 $M = R/(a) \oplus R/(b)$ 的对角展示给出 $\text{Fitt}_0(M) = (ab)$ 、 $\text{Fitt}_1(M) = (a, b)$ 、 $\text{Fitt}_2(M) = R$ 。这组理想记录的不只是一个最大子式。

12.3.2 纤维生成元数的上半连续性

对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, 令

$$\mu_M(\mathfrak{p}) = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})).$$

它等于局部模 $M_{\mathfrak{p}}$ 的最少生成元数, 依据是推论 3.2.5 应用于局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 。在上述展示中, 它等于 $n - \text{rank } D(\mathfrak{p})$ 。矩阵在剩余域中的秩小于 $n - r + 1$, 当且仅当全部 $n - r + 1$ 阶子式落入 $\mathfrak{p}$ 。因此有以下精确等式。

命题 12.3.3. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模, 记 $\mu_M(\mathfrak{p}) = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$ 。对每个整数 $r \geq 1$,

$$\{\mathfrak{p} : \mu_M(\mathfrak{p}) \geq r\} = V(\text{Fitt}_{r-1}(M)).$$

特别地, μ_M 是上半连续的整值函数, 即其取值不小于每个给定整数的点集为闭集。 M 的支集为 $V(\text{Fitt}_0(M))$ 。

证明. 闭集公式由刚才的剩余域矩阵秩计算得到。支集公式再用 Nakayama 引理: 有限模 $M_{\mathfrak{p}}$ 为零当且仅当其剩余向量空间为零。 $\square$

例如 $M = k[t]/(t)$ 在原点的生成元数为一, 在其余点为零。闭集 $V(t)$ 正好是数值增大的位置。上半连续性说的是这种向特殊点增大的可能性, 并不保证所有点数值相同。

12.3.3 局部自由与常秩的 Fitting 判据

定理 12.3.4. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模, $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, $r \geq 0$ 为整数。模 M 在 $\mathfrak{p}$ 的某个主开邻域上自由且秩为 r , 当且仅当

$$\text{Fitt}_{r-1}(M)_{\mathfrak{p}} = 0, \quad \text{Fitt}_r(M)_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}.$$

因此 M 在整个素谱上局部自由且处处秩为 r , 当且仅当这两项在 R 中分别等于零和 R 。

证明. 自由模 R^r 的零关系展示直接给出所列理想。必要性由定理 12.3.2 成立。

反向先在局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上讨论。若 $r = 0$, $\text{Fitt}_0 = R_{\mathfrak{p}}$ 意味着展示矩阵有一个满行数可逆子矩阵, 故余核为零。若 $r > 0$, 剩余域秩计算先保证 $r \leq n$ 。单位理想条件保证存在一个 $n-r$ 阶单位子式, 因为局部环中一组非单位不能生成单位理想。交换行列并对这个可逆方块作消元, 可将矩阵化成

$$\begin{pmatrix} I_{n-r} & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}.$$

剩余的 E 有 r 行。它的每个元素, 差一个符号, 都是由单位方块加一行一列组成的 $n-r+1$ 阶子式, 故属于 $\text{Fitt}_{r-1} = 0$ 。于是 $E = 0$, 余核为 $R_{\mathfrak{p}}^r$ 。情形 $n = r$ 时这句话直接说全部矩阵元素为零。由引理 12.2.3, 自由性扩大到主开邻域。

若在全部素理想处满足条件, 则模 $\text{Fitt}_{r-1}(M)$ 和商模 $R/\text{Fitt}_r(M)$ 的全部局部化为零, 由定理 2.4.1 得到全局的两项理想等式。反向直接局部化。 $\square$

这里第一项要求理想本身为零, 不是只要求它包含于全部素理想。后一条件只说明其元素幂零, 不能排除模中尚存的关系。

12.3.4 子式理想、泛自由性与 Smith 形的适用条件

第二卷第 4.2 节在主理想整环上用子式理想确定 Smith 不变因子。若展示矩阵能化为对角形, 各 Fitting 理想正是适当个数对角元乘积所生成的理想; 一般环上的定义仍然有效, 却不保证矩阵可以对角化。

例如 $R = k[x, y]$, 模 $R/(x, y)$ 的一行展示为 $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$, 所以 $\text{Fitt}_0 = (x, y)$ 。若这个矩阵能通过可逆行列变换化成 $\begin{pmatrix} d & 0 \end{pmatrix}$, 同一理想必须为主理想 (d) , 与 (x, y) 非主矛盾。后者可由次数或互素性检查: 若 d 同时整除 x, y , 则 d 为单位, 而 $(x, y) \neq R$ 。

若 R 为整环, 任一有限展示模在分式域上当然自由。引理 12.2.3 把这一事实扩大到某个非空主开集。下一节将处理更强的情形: 模只须在一个有限型 R 代数上有限生成, 在 R 上的自由秩可以无限。

12.3.5 幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数

令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $M = R/(\varepsilon)$ 。素谱只有一点, 且该点的纤维维数为一, 因此纤维维数是常数。但一行展示 (ε) 给出

$$\text{Fitt}_0(M) = (\varepsilon) \neq 0, \quad \text{Fitt}_1(M) = R.$$

定理 12.3.4 说明 M 不是秩一自由模; 由引理 12.2.2, 它也不平坦。纤维只看见 $\varepsilon = 0$, 而 Fitting 理想仍保存这项非零幂零关系。

有一个可以成立的补充结论。若 R 约化, 且有限展示模的纤维维数处处为固定的 r , 则 $\text{Fitt}_{r-1}(M)$ 包含于所有素理想, 因约化性等于零; $\text{Fitt}_r(M)$ 不包含于任何素理想, 故等于 R 。于是 M 局部自由。若秩只局部常值, 可在相应开邻域分别应用同一论证。不能删除这里的约化性而保留原结论。

12.4 泛自由性与泛平坦性

设一个方程族的系数属于整环 A 。转到分式域以后, 有限关系中的非零系数都可以相除; 问题是能否只倒置有限个系数, 便在同一个开集上得到一组基。下面用首项与有限分母回答这个问题。证明所需的模单项式在此处建立, 不要求预先学习合冲模算法。

12.4.1 Noether 整环上的泛自由性定理

定理 12.4.1 (泛自由性). 设 A 为 Noether 整环, B 为有限型交换 A 代数, M 为有限生成 B 模。则存在 $0 \neq f \in A$, 使 M_f 作为 A_f 模自由。其自由秩允许为零或无限。

泛自由性 (generic freeness) 中的“泛”表示可以从基底去掉一个真闭集。这里没有要求 M 是有限 A 模; 例如 $B = M = A[x]$ 已经是自由 A 模, 但基 $1, x, x^2, \dots$ 为无限集。定理也允许整个模在局部化后消失, 例如 $M = A/(a)$ 、 $a \neq 0$, 倒置 a 后自由秩为零。

证明放在下一小节, 核心是为商模选出一组可同时保留的单项式。更一般的泛自由性结果可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[2, §24, Theorem 24.1, p. 186]; 这里给出的证明专门处理本章的有限展示数据。

12.4.2 有限自由模项序与分母清除

令 $K = \text{Frac}(A)$, $P = A[x_1, \dots, x_s]$ 。选满射 $P \rightarrow B$ 及有限组 B 模生成元, 得到 $M = P^q/N$ 。由 A 的 Noether 性和 Hilbert 基定理, 关系模 N 有限生成。

引理 12.4.2. 设 K 为域, s, q 为非负整数, $e_1, \dots, e_q$ 为 $K[x_1, \dots, x_s]^q$ 的标准基。给模单项式 $x^\alpha e_j$ 按全次数、指数的字典序、最后按 j 排序。这是良序, 且同乘一个单项式保

持大小。任一 $K[x_1, \dots, x_s]$ 子模 L 的非零元素的首单项式，均被有限多个来自 L 的首单项式之一整除；整除只在同一基向量 e_j 上比较。

证明. 给定次数的单项式只有有限多个，所以任一非空集合先选最小次数，再选其中最小项，得到良序；加同一个指数向量不改变比较结果。

所需有限性归结为 $\mathbb{N}^s$ 中逐坐标偏序的极小元有限。为证明这一点，先注意任一自然数序列都有无限不减子序列：某个值出现无限次时取常值子序列；否则各有限区间只出现有限次，逐次选更大的项。对 s 个坐标依次取子序列，可知 $\mathbb{N}^s$ 的任意无限序列包含两个按原次序排列且逐坐标不减的项。因此一个集合不可能有无限多个不同的极小元。又对任何 α ，其下方的有限盒子 $\{\beta: \beta \leq \alpha\}$ 中可选极小元，故每个元素都在某个极小元之上。这就是所需的 Dickson 型有限性。

分别对每个位置 j 的首项指数集合应用它，选出有限组极小首项，并取产生它们的 $g_i \in L$ 。全部其他首项都被这些首项之一整除。□

定理 12.4.1 的证明. 对 $L = K \otimes_A N \subseteq K[x_1, \dots, x_s]^q$ 应用引理，选 $g_1, \dots, g_t$ ，并把首项系数归一成一。逐次消去可被它们的首项整除的最大项，或把不能整除的最大项移入余式。每一步使尚待处理的首单项式严格下降，故有限步终止。对 L 中的元素，最后余式若非零，其首项一方面属于 L 的首项，另一方面不被任何所选首项整除，矛盾。因此这些 g_i 生成 L 。若 $L = 0$ ，下述空列表的论证同样成立。

取 N 的有限组 P 模生成元 $v_1, \dots, v_h$ 。每个 g_i 是 v_j 的 $K[x]$ 线性组合，每个 v_j 也是 g_i 的 $K[x]$ 线性组合。这里只涉及有限多个多项式及有限多个系数，故可选非零 $f \in A$ ，倒置它后使所有系数落在 A_f 。于是 $g_i \in N_f$ ，且它们生成 N_f ，首项系数仍为一。

称不被任何 g_i 的首单项式整除的模单项式为标准单项式。刚才的首项消去只除以首项系数一，故能直接在 $A_f[x]^q$ 中进行。这说明标准单项式的类生成 $P_f^q/N_f = M_f$ 作为 A_f 模。若这些类之间有一个非零有限线性关系，所得非零向量 $w \in N_f$ 在 $K[x]^q$ 中仍非零，因为 $A_f \subseteq K$ 。其首单项式是标准的，却又是 L 中元素的首单项式，与引理矛盾。因此标准单项式的类线性无关，组成所求自由基。□

有限性在此有两个不同用途：Dickson 型论证限制需要的首项数，关系模的有限生成性限制返回原环时需要清除的分母数。只说“清除分母”而不说明哪一组有限数据，不足以得到同一个 f 。

12.4.3 稠密主开集上的平坦性

推论 12.4.3 (泛平坦性). 设 A 为 Noether 整环， B 为有限型交换 A 代数， $M_1, \dots, M_r$ 为预先给定的有限组有限生成 B 模。存在同一个 $0 \neq f \in A$ ，使 B_f 与全部 $(M_i)_f$ 都是自由 A_f 模，因而平坦。

证明. 把有限 B 模 $B \oplus \bigoplus_i M_i$ 的每个直和项分别应用泛自由性，取所得非零元素的乘积为 f 。进一步局部化保留自由基，所以各项均自由。自由模平坦已在定义 12.1.1 之后直接证明。□

整环 A 的零素理想属于 $D(f)$, 且每个非空主开集 $D(g)$ 都与它相交, 因为 $fg \neq 0$ 。因此 $D(f)$ 稠密。这里得到了一个稠密主开集上的平坦性, 没有声称整个平坦点集一定由这一个主开集描述。

12.4.4 一般纤维与特殊纤维的代数描述

对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, 代数及模的纤维分别是

$$B(\mathfrak{p}) = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}), \quad M(\mathfrak{p}) = M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}).$$

零素理想处称为一般纤维, 使用的是 K 。若 M_f 已有 A_f 自由基 E , 则对每个 $\mathfrak{p} \in D(f)$, 同一组基的像给出 $M(\mathfrak{p}) \cong \kappa(\mathfrak{p})^{(E)}$ 。因此此开集上的模纤维具有同一基集的大小; 当 E 无限时, 不把它误写成某个有限的纤维维数。

例如 $A = k[t]$, $B = A[x]/(tx)$ 。在 $t \neq 0$ 处, $x = 0$, 所以 $B_t \cong A_t$; 在 $t = 0$ 处, 纤维却为 $k[x]$ 。作为 A 模, $x \neq 0$ 而 $tx = 0$, 故 B 有挠, 不平坦。若换成 $A[x]/(x^2 - t)$, 首一除法给出全局基 $1, x$, 因而处处平坦。即使在 $t = 0$ 处纤维为非约化环 $k[x]/(x^2)$, 平坦性仍成立; 平坦与纤维约化是两种不同的要求。

12.4.5 代数有限呈示、模有限展示时的非 Noether 推广

命题 12.4.4. 设 A 为任意整环, B 为有限呈示交换 A 代数, M 为有限展示 B 模。则存在 $0 \neq f \in A$, 使 M_f 作为 A_f 模自由; 其自由秩允许为零或无限。

证明. 写 $B = A[x_1, \dots, x_s]/(h_1, \dots, h_u)$, 并取有限展示 $B^v \rightarrow B^q \rightarrow M \rightarrow 0$ 。把第一映射的有限列提升到 P^q , 再加上 $h_a e_j$ ($1 \leq a \leq u, 1 \leq j \leq q$), 这些有限列恰好生成 $P^q \rightarrow M$ 的核: 任何核元素先模掉 $(h_a)P^q$, 成为 B^q 中给定关系的组合, 提升该组合后差只属于 $(h_a)P^q$ 。因此 M 在 P 上有限展示。

前述证明在得到有限组 v_j 后不再使用 A 的 Noether 性: 分式域仍存在, 模首项有限性在域上的多项式模中独立成立, 且只清除有限个分母。将该证明逐步应用便得结论。□

非 Noether 版本改变的是假设的表达: 不能仅凭“有限型代数、有限生成模”自动断言关系有限。有限呈示与有限展示分别保证代数关系和模关系都能由有限数据控制。这项推广不改变自由秩可以无限的结论。

12.5 忠实平坦性

平坦基变换保持已有的正合列, 却可能把非零模变成零。例如与 $\mathbb{Q}$ 张量会使有限挠交换群消失。若希望从变基后的计算推回原来的模, 还须保证信息没有这样丢失; 忠实平坦性正是这一附加要求。

12.5.1 正合性与消失的反映

定义 12.5.1. 设 $R \rightarrow S$ 为交换环同态。如果 S 为平坦 R 模, 且对每个 R 模 N , 从 $S \otimes_R N = 0$ 能推出 $N = 0$, 就称这个同态**忠实平坦** (faithfully flat)。

定理 12.5.2. 设 $R \rightarrow S$ 为平坦交换环同态。下列条件等价：

1. $R \rightarrow S$ 忠实平坦；
2. 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$, 有 $S/\mathfrak{m}S \neq 0$;
3. $\text{Spec } S \rightarrow \text{Spec } R$ 满射。

特别地, 非零局部环之间的平坦局部同态忠实平坦。

证明. 第一项对非零模 $R/\mathfrak{m}$ 使用定义, 就得到第二项。反过来, 设 $0 \neq x \in N$, 则 $Rx \cong R/I$, 其中 $I = \text{Ann}_R(x)$ 为真理想。选极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq I$, 则 S/IS 满射到非零的 $S/\mathfrak{m}S$, 故非零。平坦性使 $S \otimes_R Rx \rightarrow S \otimes_R N$ 单射, 因而后者非零。这证明第一、二项等价。

若忠实平坦, 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, 非零模 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的张量积也非零。非零环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 有素理想, 其在 S 中的收缩恰位于 $\mathfrak{p}$ 之上: 把纤维写成 $(R \setminus \mathfrak{p})^{-1}(S/\mathfrak{p}S)$, 由局部化素理想对应即可核验。所以谱映射满射。反向, 若存在 $\mathfrak{q} \subset S$ 收缩为 $\mathfrak{m}$, 则 $\mathfrak{m}S \subseteq \mathfrak{q} \neq S$, 于是第二项成立。

局部同态 $(R, \mathfrak{m}) \rightarrow (S, \mathfrak{n})$ 满足 $\mathfrak{m}S \subseteq \mathfrak{n}$, 剩余环非零, 故最后结论由第二项得到。□

这些判据可对照 [2, §7, Theorems 7.2–7.3, pp. 47–48]。检验局部同态时须同时确认平坦和 $\mathfrak{m}S \neq S$; 仅仅是局部环之间的一个任意同态并不够。

12.5.2 忠实平坦基变换下的性质检测

命题 12.5.3. 设 $R \rightarrow S$ 为忠实平坦交换环同态。下列各项中的模及模同态均在 R 上, 变基后在 S 上。

1. 模同态的单射、满射、同构以及模序列的正合性, 均可在与 S 张量后检测。
2. 对每个 R 模 M , 自然映射 $M \rightarrow S \otimes_R M$ 、 $m \mapsto 1 \otimes m$ 单射; 特别地 $R \rightarrow S$ 单射, 且对任意理想 I , 有 $IS \cap R = I$ 。
3. M 在 R 上平坦, 当且仅当 $S \otimes_R M$ 在 S 上平坦。
4. 若 $S \otimes_R M$ 在 S 上有限生成或有限展示, 则 M 分别在 R 上有限生成或有限展示。

证明. 平坦性使核、像和余核的短正合列仍然正合。例如 $S \otimes_R \ker u \cong \ker(1 \otimes u)$, 余核也相容, 故消失检测给出第一项中的单射、满射与同构。对一个复形 $L \rightarrow M \rightarrow N$, 同样把中间同调 $\ker v / \text{im } u$ 张量, 便得正合性检测。若原来还不知道 $vu = 0$, 先对 $\text{im}(vu)$ 使用同一检测, 得到它为零。

若 $m \neq 0$, 平坦性使 $S \otimes_R Rm$ 单射进入 $S \otimes_R M$ 。前者非零, 且由 $1 \otimes m$ 作为 S 模生成, 故 $1 \otimes m \neq 0$ 。这证明第二项的单射; 对 $M = R/I$ 应用它, 得到 $R/I \hookrightarrow S/IS$, 即理想收缩公式。

第三项的正向是命题 12.1.5。反向任取单射 $U \rightarrow V$ ，先用 S 的平坦性，继而用 $S \otimes_R M$ 的 S 平坦性，得到

$$S \otimes_R (U \otimes_R M) \longrightarrow S \otimes_R (V \otimes_R M)$$

单射。由第一项原映射单射，所以 M 平坦。

若 $S \otimes_R M$ 由有限多个张量和生成，收集这些和中出现的有限个 $m_i \in M$ ，令 $M_0 = \sum_i Rm_i$ 。则 $S \otimes_R (M/M_0) = 0$ ，故 $M = M_0$ ，证明有限生成下降。若变基模有限展示，先由刚证结论取 $R^n \twoheadrightarrow M$ ，核为 K 。平坦性给出 $S \otimes_R K$ 是 $S^n \rightarrow S \otimes_R M$ 的核，由命题 3.1.2 有限生成。再次下降有限生成性，得到 K 有限生成，故 M 有限展示。□

结合定理 12.2.1，有限生成投射性也可以忠实平坦地检测。不过“自由”本身不是以上结论的同义词；基变换可能使一个原本只有局部基的模获得全局基。

12.5.3 纤维与下降的动机

忠实平坦性在任意基变换和复合下保持。复合的证明是依次使用两个正合函子及两个消失检测。对基变换 $R \rightarrow R'$ ， $S' = R' \otimes_R S$ 在 R' 上平坦；若 N 为 R' 模且 $S' \otimes_{R'} N = 0$ ，结合律将它识别为 $S \otimes_R N = 0$ ，所以 $N = 0$ 。

若 $D(f_1), \dots, D(f_r)$ 覆盖 $\text{Spec } R$ ，则

$$R \longrightarrow S = \prod_{i=1}^r R_{f_i}$$

忠实平坦。有限直积作为模也是有限直和，故平坦；每个素理想至少属于一个 $D(f_i)$ ，局部化的素理想对应说明谱映射满射。单个真局部化一般不忠实，例如 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[1/2]$ 遗漏素理想 (2)，并使 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 消失。

在这个有限开覆盖的例子中，给定变基模相当于在每个开集上给定一个模。要把它们还原为一个全局模，必须说明在重叠的 $R_{f_i f_j}$ 上如何识别，并要求三重重叠上的识别相容。下一节把这个熟悉的拼接问题写成一般忠实平坦环同态上的代数条件。

12.6* 有限展示模的下降

本节为选读，后面的完备化不以它为前提。问题是：给定忠实平坦 R 代数 S 上的模 N ，什么时候能写成 $S \otimes_R M$ ？仅有 N 还不够；它在两个 S 因子上的拉回之间必须有指定的相容识别。我们先把这些数据写清楚，再用一个等化子实际构造 M 。

12.6.1 双重基变换与余循环条件

固定忠实平坦环同态 $R \rightarrow S$ ，令 $T = S \otimes_R S$ 。同一个 S 模 N 有两种变基：

$$N_1 = N \otimes_R S, \quad N_2 = S \otimes_R N.$$

在前者上， $(a \otimes b)(n \otimes s) = an \otimes bs$ ；在后者上， $(a \otimes b)(s \otimes n) = as \otimes bn$ 。这两种 T 模结构一般不能忽略下标而混写。

定义 12.6.1. 设 $R \rightarrow S$ 为忠实平坦交换环同态, N 为 S 模, $T = S \otimes_R S$. 赋予 $N_1 = N \otimes_R S$ 及 $N_2 = S \otimes_R N$ 自然的 T 模结构, 即两个 S 因子分别作用在相应位置. 若 T 线性同构 $\theta: N_1 \rightarrow N_2$ 满足下面的**余循环条件** (cocycle condition), 就称它为 N 上的**下降数据** (descent datum). 具体地, 把数据沿三个嵌入

$$T \longrightarrow S \otimes_R S \otimes_R S, \quad a \otimes b \longmapsto a \otimes b \otimes 1, a \otimes 1 \otimes b, 1 \otimes a \otimes b$$

变基, 分别得到从第一个位置移到第二个位置的 θ_{12} 、从第一个移到第三个的 θ_{13} 、从第二个移到第三个的 θ_{23} . 要求

$$\theta_{23}\theta_{12} = \theta_{13}.$$

带下降数据的模之间的态射, 是与这些同构相容的 S 线性映射。

若 $N = S \otimes_R M$, 标准下降数据为

$$\theta((s \otimes m) \otimes t) = s \otimes (t \otimes m).$$

它的逆把右边送回左边. 在三重张量积上, 两种复合都把位于第一个 S 因子旁的 m 移到第三个因子旁, 系数次序不变, 所以满足余循环条件。

为把一般条件用于计算, 令

$$\rho: N \longrightarrow S \otimes_R N, \quad \rho(n) = \theta(n \otimes 1), \quad \mu(s \otimes n) = sn.$$

ρ 是 R 线性映射, 满足

$$\begin{aligned} \rho(sn) &= (s \otimes 1)\rho(n), & \mu\rho(n) &= n, \\ (1 \otimes \rho)\rho(n) &= \sum_i s_i \otimes 1 \otimes n_i & \text{若 } \rho(n) &= \sum_i s_i \otimes n_i. \end{aligned} \quad (12.1)$$

第一式是 T 线性. 第三式就是把余循环条件用于 $n \otimes 1 \otimes 1$: 先移动到第二个位置, 再移动到第三个, 得到左边; 直接移到第三个得到右边. 第二式来自对角变基: 沿 $S \otimes_R S \rightarrow S$, $s \otimes t \mapsto st$ 拉回 θ , 得到 $u = \mu\rho$. 三重余循环条件在对角上变成 $u^2 = u$, 而 u 为同构, 故 $u = 1$. 反过来, 原同构可由 ρ 恢复为 $\theta(n \otimes t) = (1 \otimes t)\rho(n)$; 所以没有丢掉数据。

12.6.2 忠实平坦下降的模论形式

先解释忠实平坦性为何能够恢复本来就在 R 上的模。

引理 12.6.2. 设 $R \rightarrow S$ 为忠实平坦交换环同态, M 为任意 R 模. 则下列序列正合:

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{m \mapsto 1 \otimes m} S \otimes_R M \xrightarrow{d} S \otimes_R S \otimes_R M,$$

其中 $d(s \otimes m) = 1 \otimes s \otimes m - s \otimes 1 \otimes m$.

证明. 由命题 12.5.3, 可以先与 S 张量再检查. 新序列的首个映射将 $a \otimes m$ 送到 $a \otimes 1 \otimes m$, 乘合前两个 S 因子给出左逆, 故单射。

若 $z = \sum a_i \otimes b_i \otimes m_i$ 在后一个映射的核中, 则

$$\sum_i a_i \otimes 1 \otimes b_i \otimes m_i = \sum_i a_i \otimes b_i \otimes 1 \otimes m_i.$$

乘合前两个 S 因子, 得到 $z = \sum_i a_i b_i \otimes 1 \otimes m_i$, 恰好属于前一个映射的像。相反, 该像代入差映射显然为零。变基后的正合性因而成立, 并反映回原序列。□

定理 12.6.3 (忠实平坦模下降). 设 $R \rightarrow S$ 为忠实平坦交换环同态, N 为带下降数据 $\theta: N \otimes_R S \rightarrow S \otimes_R N$ 的 S 模, 记 $\rho(n) = \theta(n \otimes 1)$, 并令

$$M = \{n \in N : \rho(n) = 1 \otimes n\}.$$

则 M 是 R 子模, 且乘法映射

$$\varphi: S \otimes_R M \longrightarrow N, \quad s \otimes m \longmapsto sm$$

为保下降数据的同构。这个构造与基变换建立 R 模范畴和带下降数据的 S 模范畴之间的等价。若 N 有限展示, 则所得 M 有限展示。

证明. M 是两个 R 线性映射 ρ 与 $n \mapsto 1 \otimes n$ 的等化子, 即它们差的核。由 S 的平坦性, $S \otimes_R M$ 在 $S \otimes_R N$ 中恰为下列两个映射的等化子:

$$s \otimes n \longmapsto s \otimes \rho(n), \quad s \otimes n \longmapsto s \otimes 1 \otimes n.$$

(12.1)的第三式说明 $\rho(n)$ 落在这个等化子中, 故 ρ 给出 $N \rightarrow S \otimes_R M$ 的映射。第二式说明 $\varphi\rho = 1_N$ 。

反过来, 若 $z = \sum_i s_i \otimes n_i$ 属于上述等化子, 则 $\sum_i s_i \otimes \rho(n_i) = \sum_i s_i \otimes 1 \otimes n_i$ 。乘合前两个因子, 并用第一式, 得到

$$\rho\left(\sum_i s_i n_i\right) = \sum_i s_i \otimes n_i = z.$$

所以 $\rho\varphi$ 也是恒等映射, φ 为同构。对 $m \in M$, $\rho(sm) = s \otimes m$, 这正是标准数据在 $s \otimes m$ 上的公式, 故同构与原 θ 相容。

若 $u: N \rightarrow N'$ 与数据相容, 则 u 将 $\rho(n) = 1 \otimes n$ 的元素送入对应的 M' , 因而限制为 R 线性映射 $M \rightarrow M'$ 。它在 S 上的扩张通过 φ 恢复原 u 。若从 R 模 M_0 出发, 引理 12.6.2 恰说明标准数据的等化子是 M_0 的自然像, 故往返构造为自然同构。这证明范畴等价的对象与态射两部分。最后, $N \cong S \otimes_R M$, 有限展示由命题 12.5.3 第四项下降。□

证明并未先猜出一组全局基。它先用相容性选出能够来自原环的元素, 再借平坦性把“满足同一组等式”与基变换交换; 忠实性则保证从原环出发的对象与态射能完整恢复。

12.6.3 下降数据与基变换后对象

只有变基后的对象，通常不能唯一指定原对象。例如 $R = \mathbb{R}$ 、 $S = \mathbb{C}$ ，在 $N = \mathbb{C}$ 上可考虑两种半线性对合

$$\sigma_+(z) = \bar{z}, \quad \sigma_-(z) = -\bar{z}.$$

它们都满足 $\sigma(cz) = \bar{c}\sigma(z)$ 、 $\sigma^2 = 1$ ，分别选出不动实子空间 $\mathbb{R}$ 与 $i\mathbb{R}$ 。这里 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ ，映射为 $z \otimes w \mapsto (zw, z\bar{w})$ ；两种对合给出的就是不同的相容识别。在每种情况下， $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} N^\sigma \rightarrow N$ 都是同构。它们作为抽象实向量空间同构，但选出的实际子空间及识别不同。

开覆盖的例子更接近局部自由模。取上一节的 $S = \prod_i R_{f_i}$ ，则 $S \otimes_R S \cong \prod_{i,j} R_{f_i f_j}$ 。下降数据就是重叠处的同构 θ_{ij} ，余循环条件是三重重叠上的 $\theta_{jk}\theta_{ij} = \theta_{ik}$ 。等化子 M 由那些在重叠处相符的局部元素组组成。若各局部模自由而各识别由可逆矩阵给出，得到的是有限生成投射模；这些矩阵未必能由各个开集上的换基同时消去，所以不一定得到全局自由模。

因此下降定理的输入始终是“模及其下降数据”，而不是仅有一个 S 模或各个纤维的维数。有限展示使所得对象仍有有限关系描述，余循环条件负责不同局部描述之间的相容性，两者承担不同的工作。

本章小结

理想张量判据把全部模之间的单射归结为有限生成理想的包含，局部化又允许在各局部环中检查这些映射。有限平坦模在局部环上自由；有限展示进一步使一点处的基扩展到邻域，从而建立有限展示平坦、有限生成投射及有限秩局部自由之间的等价。

Fitting 理想由有限展示的子式定义，与展示无关且允许任意基变换。纤维生成元数的闭条件只记录子式落入哪些素理想；局部自由还要求相应的较大子式理想真正为零。泛自由性则先在分式域上选首项，再清除有限关系涉及的分母，以标准单项式给出一个可保留到主开集上的自由基。

忠实平坦性除保持正合外，还能检测模是否消失，因此能把正合性、有限性和平坦性推回原环。下降需要更完整的输入：双重基变换上的同构及三重基变换上的余循环条件。等化子选出相容元素，平坦性保证这些元素在变基后恰好恢复给定的模。

习题

习题 12.1. 设 R 为交换环、 $a \in R$ 。证明 $R/(a)$ 平坦，当且仅当存在 $b \in R$ 使 $a = a^2b$ 。并说明此时 (a) 由幂等元生成。

解. 若平坦，将 $(a) \subseteq R$ 与 $R/(a)$ 张量。所得映射 $(a)/(a)^2 \rightarrow R/(a)$ 恒为零，平坦性使其单射，故 $(a) = (a)^2$ ，即 $a = a^2b$ 。反向令 $e = ab$ ，则 $e^2 = a^2b^2 = ab = e$ ，且 $a = ae$ 、

$e \in (a)$, 故 $(a) = (e)$. 分解 $R = eR \oplus (1-e)R$ 给出 $R/(a) \cong (1-e)R$, 是自由模的直和项, 所以平坦. $\square$

习题 12.2. 设 R 为局部整环, $I \subseteq R$ 为非零有限生成理想. 证明 I 平坦当且仅当它是主理想. 再取 $R = k[x, y]_{(x, y)}$, 证明 $(x, y)^2 R$ 无挠但不平坦.

解. 若 I 平坦, 引理 12.2.2 使它成为有限自由模. 令 $K = \text{Frac } R$, 由于 $I \neq 0$, 有 $K \otimes_R I = K$, 故这个自由模秩只能为一, 于是 I 为主理想. 反向若 $I = (a)$, $a \neq 0$, 整环条件使 $R \xrightarrow{r \mapsto ra} I$ 为同构, 故平坦.

在给定的 R 上, $\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$ 的 k 基为 x^2, xy, y^2 的类: 一个局部分式模 $\mathfrak{m}^3$ 后, 只需将分母的非零常数项及其一次修正展开, 二次齐次部分仍唯一. 因此 $\mathfrak{m}^2$ 的最少生成元数为三, 不能为主理想, 由前半题不平坦. 它作为整环的子模仍无挠. $\square$

习题 12.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 局部, M 有限生成且平坦. 若 $m_1, \dots, m_r$ 为一组极小生成元, 证明任何关系 $\sum a_i m_i = 0$ 都只有零系数. 解释有限生成性在此结论中的具体作用.

解. 由推论 3.2.5, 极小生成组在剩余域上的像为基. 引理 12.2.2 的有限关系论证说明其提升线性无关, 故所有 $a_i = 0$. 有限生成性用于 Nakayama 引理, 以使剩余空间的一组基提升后生成整个模; 没有这一步, 剩余空间甚至可以为零而原平坦模非零, 例如 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$, $M = \mathbb{Q}$, 有 $pM = M$. $\square$

习题 12.4. 设 M 为有限生成投射 R 模. 证明其秩函数只取有限多个值, 每个定秩集合既开又闭. 若 $\text{Spec } R$ 连通, 得到什么结论?

解. 由定理 12.2.1, 每个点有一个使 M 自由的主开邻域. 素谱拟紧性给出有限个这样的邻域覆盖, 其自由秩只有有限多个. 每个定秩集合是相应邻域的并, 故开; 其补集是其他定秩集合的并, 也开, 故它闭. 连通时只有一个非空定秩集合, 因此秩处处相同; 这仍不声称模整体自由. $\square$

习题 12.5. 计算 $M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的全部 Fitting 理想, 并由它们求每个素理想处纤维的维数.

解. 对角矩阵 $\text{diag}(12, 18)$ 给出

$$\text{Fitt}_0(M) = (216), \quad \text{Fitt}_1(M) = (6), \quad \text{Fitt}_i(M) = \mathbb{Z} \ (i \geq 2).$$

在 (2)、(3) 处两个对角元都变成零, 纤维维数二; 其他素数处均为单位, 纤维为零; 零素理想处张量到 $\mathbb{Q}$ 也为零. 这与命题 12.3.3 的闭集公式一致. $\square$

习题 12.6. 令 $R = k[x, y]$, M 为矩阵 $D = \begin{pmatrix} x & y & 0 \\ 0 & x & y \end{pmatrix}$ 的余核. 求各 Fitting 理想、纤维生成元数与支集.

解. 二阶子式为 x^2, xy, y^2 , 一阶子式生成 (x, y) . 故 $\text{Fitt}_0 = (x, y)^2$, $\text{Fitt}_1 = (x, y)$, $\text{Fitt}_2 = R$. 原点之外矩阵满行秩, 纤维为零; 在 (x, y) 处矩阵全零, 纤维维数二. 支集正是原点. M 不为零, 因为此处的剩余向量空间不为零. $\square$

习题 12.7. 对有限展示模 M, N , 证明

$$\text{Fitt}_r(M \oplus N) = \sum_{i+j=r} \text{Fitt}_i(M) \text{Fitt}_j(N) \quad (r \geq 0).$$

解. 取目标自由秩分别为 m, n 的展示矩阵 D, E . 直和由块对角矩阵展示. 一个非零的 $m+n-r$ 阶子式必须从两个方块分别选择相等的行数与列数, 因而是某个 a 阶 D 子式与 b 阶 E 子式的乘积, $a+b=m+n-r$. 反向每个这样的乘积也是一个块子式. 令 $i=m-a, j=n-b$, 便有 $i+j=r$, 得到公式. 超出行列数及零阶的情形正由定义中的零理想、单位理想约定覆盖. $\square$

习题 12.8. 在 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$ 上, 比较 $M = R$ 与 $N = R/(\varepsilon^2)$ 的纤维维数和 Fitting 理想, 并判断平坦性.

解. 两者唯一纤维都是一维. 对 M , $\text{Fitt}_0(M) = 0$, $\text{Fitt}_1(M) = R$; 对 N , 对应理想为 $(\varepsilon^2) \neq 0$ 和 R . 所以 M 自由平坦, N 不自由, 由局部环上的有限平坦判据也不平坦. 两种第零 Fitting 理想定义相同闭集, 却不是相同理想, 差别正是被剩余域忽略的幂零关系. $\square$

习题 12.9. 设 R 为约化交换环, M 仅假定有限生成, 且纤维维数函数 $\mu_M(\mathfrak{p})$ 局部常值. 证明 M 有限生成投射. 这里没有预先假定有限展示, 不能直接调用 Fitting 判据.

解. 固定 $\mathfrak{p}$, 设其纤维维数为 r . 提升一组剩余域基, 清除分母后可用 M 中的 r 个元素定义 $u: R^r \rightarrow M$, 使 $u_{\mathfrak{p}}$ 满射, 依据是局部 Nakayama 生成元判据. $\text{coker } u$ 有限生成, 故存在 $f \notin \mathfrak{p}$, 使 u_f 满射; 再缩小主开邻域, 可令其上全部纤维维数均为 r .

任取 $z = (z_1, \dots, z_r) \in \ker u_f$. 对 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } R_f$, 张量得到从 $\kappa(\mathfrak{q})^r$ 到一个 r 维空间的满射, 故为同构. 因此各 z_i 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 中为零, 即属于 $\mathfrak{q}$. 遍历所有 $\mathfrak{q}$, 约化性给出 $z_i = 0$. 所以 u_f 还是单射, $M_f \cong R_f^r$. 模因而在邻域上局部自由且秩有限, 定理 12.2.1 遂给出有限生成投射性, 并同时导出有限展示性. $\square$

习题 12.10. 设 $B = \mathbb{Z}[x]/(2x^2 + x)$. 在一个明确的主开集上给出 B 的基, 并比较一般纤维与特征二的纤维.

解. 倒置二后, 关系化成首一的 $x^2 + x/2$, 多项式除法给出 $B[1/2]$ 的 $\mathbb{Z}[1/2]$ 基 $1, x$. 一般纤维 $\mathbb{Q}[x]/(2x^2 + x)$ 维数二, 特征二纤维却为 $\mathbb{F}_2[x]/(x) \cong \mathbb{F}_2$, 维数一. 因此不可能在包含素理想 (2) 的主开集上使 B 自由: 若自由, 其一般纤维将迫使自由秩为二, 特征二纤维也须为二维. $\square$

习题 12.11. 取 $A = k[t]$, $B = A[x]/(tx - 1)$. 求各纤维, 判断 $A \rightarrow B$ 的平坦性与忠实平坦性.

解. 关系说明 $x = t^{-1}$, 所以 $B \cong A_t$, 为平坦局部化. 在 $t \notin \mathfrak{p}$ 的点上, 纤维为 $\kappa(\mathfrak{p})$; 在 $\mathfrak{p} = (t)$ 上, 关系变成 $-1 = 0$, 纤维为零环. 因此不忠实平坦. 这表明平坦并不保证每个点都有非空纤维. $\square$

习题 12.12. 令 $A = k[t]$ 、 $B = A[x]$ 、 $M = (t, x) \subseteq B$ 。证明 M 作为 A 模自由，写出其基；同时证明它作为 B 模不是局部自由模。

解. 元素的常数项必须是 t 的倍数，其余 x 的系数任意。因此 $t, x, x^2, \dots$ 是 A 基，独立性来自多项式系数唯一性和 A 为整环。在 B 的极大理想 (t, x) 处，模的最少生成元数为二，而张量到 $k(t, x)$ 后秩为一。若在该点自由，自由秩既要等于二，又要在进一步局部化后等于一，矛盾。这里平坦性所相对的底环不同，两个判断不冲突。□

习题 12.13. 在 $A[x]^2$ 、 $A = k[t]$ 中，令 N 由 $txe_1 - e_2$ 、 xe_2 生成。证明倒置 t 后商模作为 A_t 模自由，给出一组基并比较 $t = 0$ 的纤维。

解. 倒置 t 后， $e_2 = tx e_1$ ，第二关系变成 $tx^2 e_1 = 0$ 。因此商同构于 $A_t[x]/(x^2)$ ，基为 $e_1, x e_1$ 。在 $t = 0$ 的纤维，第一关系为 $e_2 = 0$ ，第二关系随之消失，纤维成为 $k[x]e_1$ ，维数无限。倒置的非零系数恰决定哪一个关系可以消去生成元。□

习题 12.14. 令 $A = k[t_1, t_2, \dots]$ 、 $B = A[x]/(t_1 x^2 + x)$ 。验证非 Noether 版本泛自由性的假设，并直接找出所需的非零局部化元。

解. A 是整环，虽不是 Noether 环； B 有一个代数生成元和一个关系，故有限呈示。把 $M = B$ 当作 B 模，它秩一自由，当然有限展示。取 $f = t_1$ ，关系除以单位 t_1 后首一，得到 A_f 基 $1, x$ 。这直接核实命题 12.4.4，没有把 A 的有限关系问题交给 Noether 性。□

习题 12.15. 证明任意非零 k 代数 S 在域 k 上忠实平坦，不要求 S 有限维。若两个 k 线性映射变基到 S 后相等，说明它们本来就相等。

解. S 作为向量空间有非空基，所以为非零自由 k 模，张量是若干份直和，保持正合。唯一极大理想为零，剩余纤维就是非零的 S ，由定理 12.5.2 忠实平坦。两个映射的差 u 在变基后为零，其像的张量积为零，由平坦性及消失检测有 $\text{im } u = 0$ ，故两映射相同。□

习题 12.16. 说明平坦环同态 $\mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow \mathbb{Q}$ 为什么不忠实平坦，尽管源与目标都是局部环。这与本章的局部同态判据是否矛盾？

解. 该映射是局部化，所以平坦；但 $p\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ ，唯一闭点纤维为零，不忠实。它不是局部同态：源的极大理想 (p) 没有映入目标的极大理想零，因为 $p \neq 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 中为单位。判据同时要求映射本身局部，故无矛盾。□

习题 12.17. 设 $R \rightarrow S$ 忠实平坦， $I, J \subseteq R$ 。证明 $IS \subseteq JS$ 当且仅当 $I \subseteq J$ 。若进一步 S 为 Noether 环，证明 R 也为 Noether 环。

解. 正向收缩并用命题 12.5.3 的 $IS \cap R = I$ 、 $JS \cap R = J$ 即得；反向来自扩张保包含。对 R 的任意理想升链，扩张后在 Noether 环 S 中稳定，收缩公式使原链也稳定。因此 R 满足理想升链条件，为 Noether 环。□

习题 12.18. 设 $R \rightarrow S$ 忠实平坦, M 为任意 R 模, 且 $S \otimes_R M \cong S^n$. 证明 M 有限生成投射, 且局部秩处处为 n .

解. 由命题 12.5.3, 有限展示和平坦性均下降, 故定理 12.2.1 给出有限生成投射性. 对 $\mathfrak{p} \subset R$, 选位于其上的 $\mathfrak{q} \subset S$, 存在性由谱满射保证. $M_{\mathfrak{p}}$ 自由, 设秩为 r , 再变到 $\kappa(\mathfrak{q})$ 后既为 r 维又为 n 维, 故 $r = n$. 这里只得到局部自由, 不保证一个全局基. $\square$

习题 12.19. 证明 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[1/2] \times \mathbb{Z}[1/3]$ 忠实平坦. 由此说明一个交换群及其同态的哪些性质可在这两个局部化后同时检测.

解. 因 $(2, 3) = \mathbb{Z}$, $D(2), D(3)$ 覆盖素谱. 两个局部化平坦, 有限直积仍平坦; 每个素理想至少不含二或三, 谱映射满射, 故忠实平坦. 由命题 12.5.3, 群的零性、有限生成性、有限展示性和平坦性可以检测; 同态的单射、满射、同构及序列正合性也可以检测. 只检查其中一个局部化不够, 例如二阶群在倒置二后消失. $\square$

习题 12.20*. 在 $\mathbb{Q}$ 中直接证明 $\mathbb{Z}[1/2] \cap \mathbb{Z}[1/3] = \mathbb{Z}$, 并据此写出上题开覆盖中标准下降数据的等化子.

解. 若一个有理数同时可写成分母为二的幂及三的幂的分数, 则其既约分母同时整除这两种幂, 只能为一. 等化子因而是

$$\{(a, b) \in \mathbb{Z}[1/2] \times \mathbb{Z}[1/3] : a = b \text{ 在 } \mathbb{Z}[1/6] \text{ 中}\} = \{(n, n) : n \in \mathbb{Z}\}.$$

同一开集与自身的重叠只给出恒等条件, 两个不同开集的重叠给出上式中的等式. 这是引理 12.6.2 在这个覆盖上的具体计算. $\square$

习题 12.21*. 令 $R = k$, $S = k \times k$, 环映射取对角嵌入. 证明 S 模 $N = k \times 0$ 不可能带有下降数据.

解. S 是非零自由 k 模, 所以忠实平坦. 设存在数据, 定理 12.6.3 将给出 $N \cong S \otimes_k M$. 而任一这样的模在两个幂等分量上都是 M , 不可能一个分量为二维、另一个为零. 也可直接检查双重基变换: $S \otimes_k S \cong k^4$, 在第一位置为第一个分量、第二位置为第二个分量的那一因子上, N_1 维数一而 N_2 维数零, 所以根本不存在 θ 同构. $\square$

习题 12.22*. 设复向量空间 N 有半线性对合 σ , 即 $\sigma(cn) = \bar{c}\sigma(n)$, $\sigma^2 = 1$. 令 $M = N^\sigma$. 不用一般下降定理, 直接证明 $N = M \oplus iM$ 作为实向量空间, 并得到 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} M \cong N$.

解. 任取 n , 有分解

$$n = \frac{n + \sigma(n)}{2} + i \frac{n - \sigma(n)}{2i}.$$

两项系数都被 σ 固定. 若 $u = iv$ 且 $u, v \in M$, 施加 σ 得 $u = -iv$, 故 $2iv = 0$, 于是 $u = v = 0$. 所以直和成立; 复线性映射 $z \otimes m \mapsto zm$ 在实分解 $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ 下正是上述直和同构. $\square$

习题 12.23*. 设有限主开覆盖上每个局部模自由秩为 r , 在重叠处以矩阵 $G_{ij} \in \text{GL}_r(R_{f_i f_j})$ 表示从第 i 个坐标到第 j 个坐标的识别. 写出余循环条件和改变各局部基后的矩阵公式. 证明若可将所有矩阵同时变成单位矩阵, 则下降模自由.

解. 坐标约定为 $v_j = G_{ij}v_i$, 所以三重重叠上必须有 $G_{jk}G_{ij} = G_{ik}$ 。若第 i 个新基的列在旧基中组成矩阵 P_i , 则 $v_i = P_i v'_i$, 于是新矩阵为 $G'_{ij} = P_j^{-1}G_{ij}P_i$ 。若它们全部为单位, 匹配的局部向量逐坐标相等; 每个坐标由引理 12.6.2 唯一来自 R 。等化子因此为 R^r , 即下降模自由。一般余循环只保证相容, 并不保证存在这些 P_i 。□

习题 12.24*. 设 $R \rightarrow S$ 忠实平坦, M, M' 为 R 模。证明一个 S 线性映射 $u: S \otimes_R M \rightarrow S \otimes_R M'$ 来自 R 线性映射, 当且仅当它与标准下降数据相容。

解. 若 $u = 1 \otimes v$, 把 $(s \otimes m) \otimes t$ 代入标准数据公式, 两个次序都得到 $s \otimes (t \otimes v(m))$, 故相容。反向, 相容性使 u 将标准数据的等化子送入另一个等化子。由引理 12.6.2, 这些等化子分别是 M, M' 的自然像, 因而得到唯一的 R 线性映射 $v: M \rightarrow M'$ 。 S 线性性和 $1 \otimes m$ 的生成性使 $u = 1 \otimes v$ 。唯一性也可直接由 $M' \hookrightarrow S \otimes_R M'$ 的单射性验证。□

第十三章 滤过、Artin-Rees 与完备化

滤过把一个环或模按精度分层，完备化则保存全部相容的有限阶数据。本章先用 Rees 环的有限性证明 Artin-Rees 引理和局部 Krull 交定理，再直接从逆极限构造证明有限模完备化的正合性。在此基础上建立张量表示、完备环的 Noether 性及忠实平坦性，并用 Hilbert-Samuel 多项式证明局部维数保持。最后区分有限截断、完整形式对象与收敛解析对象所携带的信息。

本章目标

- 比较子模自身的理想进滤过与环境诱导的滤过，能指出 Artin-Rees 中有限性的作用。
- 用相容余类构造完备化，解释逆极限一般不保持满射的原因。
- 按正合性、张量表示、平坦性和剩余域检测的次序证明完备化的局部性质。
- 计算典型的幂级数完备化，并区分有限阶相等、形式相等和解析收敛。

本章使用第三章的 Noether 模与 Nakayama 引理、第 11.4 节的 Hilbert-Samuel 理论，以及第 12.1 节、第 12.5 节的平坦和忠实平坦判据。逆极限在正文直接定义；不要求导出逆极限或选读的模下降理论。除非另有说明，环均交换且有单位，“有限模”指有限生成模。

Artin-Rees、有限模的张量表示及完备化性质可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[2, §8, Theorems 8.5–8.14, pp. 59–62]。该书的证明将滤过与有限生成相联系，本章同时展开相容提升和逐阶消去的步骤，以说明完备性在何处真正起作用。

13.1 理想进滤过

多项式只含有限个系数，形式幂级数却要同时保存任意高阶的系数。把一个对象模掉 $I, I^2, I^3, \dots$ ，就是逐次保留更多信息的代数方法。本节先说明“两个元素相差很小”的含义；这里的“小”由理想的幂衡量，不依赖绝对值。

13.1.1 I 进拓扑与分离性

定义 13.1.1. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模。以

$$x + I^n M \quad (x \in M, n \geq 0)$$

为邻域基，得到 M 的 I 进拓扑 (I-adic topology)：一个集合是开集，是指其中每个点都包含在某个仍位于该集合内的上述邻域中。若 $\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0$ ，称此拓扑分离 (separated)。序列 x_j 收敛于 x ，是指对每个 n ，充分大的 j 都有 $x_j - x \in I^n M$ ；若对每个 n ，充分大的 i, j 都有 $x_i - x_j \in I^n M$ ，则称它为 Cauchy 序列。

由于 $I^{n+1}M \subseteq I^nM$, 这些集合确实给出拓扑。加法与取负连续; R 自身的 I 进拓扑还使乘法连续, 因为 I^n 是理想。两个点在每个商 M/I^nM 中都相同, 当且仅当它们的差属于 $\bigcap_n I^nM$ 。因此分离性恰好表示各阶商能够区分不同元素, 也等价于此拓扑为 Hausdorff 拓扑。

在 $k[x]$ 中, (x) 进收敛表示每个固定次数的系数最终不再改变。例如 $1+x+\cdots+x^j$ 是 Cauchy 序列, 却在 $k[x]$ 内没有极限。这说明分离性与极限是否存在是两个条件。另取 $R = k \times k$, $I = k \times 0$, 则 $I^n = I$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 拓扑不分离; 第二个坐标以外的信息已经在第一个商中被永久遗失。

命题 13.1.2. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模, 并在 M 上取 I 进拓扑。子模 $N \subseteq M$ 的闭包为

$$\overline{N} = \bigcap_{n \geq 0} (N + I^n M).$$

特别地, N 闭当且仅当 M/N 的 I 进拓扑分离。每个模同态都是相应理想进拓扑下的连续映射。

证明. 点 x 属于闭包, 恰指每个邻域 $x + I^n M$ 都与 N 相交, 等价于 $x \in N + I^n M$ 。又 $I^n(M/N) = (I^n M + N)/N$, 得到闭性的刻画。若 $f: M \rightarrow P$ 线性, 则 $f(I^n M) \subseteq I^n P$, 所以原点处连续; 平移后处处连续。□

13.1.2 模滤过与伴随分次

定义 13.1.3. 设 R 为交换环、 M 为 R 模。下降的子模列 $M = F^0 M \supseteq F^1 M \supseteq \cdots$ 称为一个模滤过 (module filtration)。给定理想 $I \subseteq R$, 若 $IF^n M \subseteq F^{n+1} M$ 对每个 $n \geq 0$ 成立, 则称它为 I 滤过; 若还有 $IF^n M = F^{n+1} M$ 对充分大的 n 成立, 则称它为稳定滤过 (stable filtration)。对 I 滤过, 相应伴随分次模为

$$\mathrm{gr}_F(M) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n M / F^{n+1} M.$$

它是 $\mathrm{gr}_I(R)$ 模, 作用由代表元相乘定义。

良定义需要同时检查两个代表元: 若 $a \in I^r$, $x \in F^n M$, 更换 a 增加的项属于 $I^{r+1}F^n M \subseteq F^{n+r+1} M$, 更换 x 增加的项也属于此子模。定义 11.4.1 中的滤过 $F^n M = I^n M$ 是从第一步就稳定的特例。

命题 13.1.4. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模, $F^n M$ 为从次数 $c \geq 0$ 起稳定的 I 滤过。则对 $n \geq c$ 有

$$F^n M = I^{n-c} F^c M, \quad I^n M \subseteq F^n M \subseteq I^{n-c} M.$$

因而 $F^n M$ 与 $I^n M$ 定义同一拓扑, 也给出同一个相容余类的极限对象。

证明. 第一个等式由稳定性归纳得到。由 $F^0 M = M$ 及 $IF^n M \subseteq F^{n+1} M$, 归纳得左侧包含; 右侧包含由第一个等式得到。每个滤过中的邻域都含有另一滤过的某个邻域, 因此拓扑相同。相容余类系统可以先投到较粗的商, 再用上述包含取回任意给定精度的余类; 相容性保证选择更细精度时答案不变。这两个转换互逆。□

伴随分次保存各阶新增的信息,但未必恢复原环。例如 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}_p[t]/(t^2)$ 的极大理想进伴随分次环都为 $\mathbb{F}_p[T]/(T^2)$, 原环的特征却分别为 p^2 与 p 。后面将把全部商及它们之间的映射一起保存,而不只保存相邻两层的差。

13.1.3 Rees 环与有限生成

定义 13.1.5. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模, $F^n M$ 为 I 滤过。引入形式变量 t , 定义 **Rees 环** (Rees algebra) 与 **Rees 模**

$$\mathcal{R}_I(R) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n \subseteq R[t], \quad \mathcal{R}_F(M) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n M t^n.$$

后者的作用为 $(at^r)(xt^n) = (ax)t^{r+n}$ 。这只是给各阶加上标记; 不要求原模中的元素本来具有次数。

命题 13.1.6. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模。则 $\mathcal{R}_I(R)$ 为 Noether 环。对 M 上的 I 滤过, $\mathcal{R}_F(M)$ 作为 $\mathcal{R}_I(R)$ 模有限生成当且仅当滤过稳定。

证明. 写 $I = (a_1, \dots, a_s)$, 则 $\mathcal{R}_I(R) = R[a_1 t, \dots, a_s t]$, 由 Hilbert 基定理与商环的 Noether 性得到结论。

若滤过从 c 起稳定, 选 $F^0 M, \dots, F^c M$ 各自的有限组生成元; 这些子模有限生成是因为 M 为 Noether 模。把这些生成元放入相应次数后, 由 $F^n M = I^{n-c} F^c M$ 可知它们生成全部 Rees 模。

反向可取齐次生成元 $x_j t^{d_j}$: 将任意有限组生成元分解成齐次部分, 所得有限组仍生成。设 $c = \max_j d_j$, 则

$$F^n M = \sum_j I^{n-d_j} x_j \quad (n \geq c).$$

于是 $F^{n+1} M = I F^n M$ 对 $n \geq c$ 成立。零模的情形直接成立。□

引理 11.4.2 的证明已经使用过 Rees 环。这里把它单独命名, 是为了强调有限性如何同时控制所有次数: 每一层分别有限生成还不够, 所需的是全部层能由有界次数内的有限组齐次元素生成。

13.2 Artin-Rees 引理

在子模 $N \subseteq M$ 内, “ I 的 n 次幂乘出的元素” 组成 $I^n N$; “在 M 中已经达到第 n 阶的元素” 组成 $N \cap I^n M$ 。这两者一般不相等。Artin-Rees 引理说明, 在 Noether 条件下, 它们的差异能由一个固定的次数偏移控制。

13.2.1 子模滤过与诱导滤过

取 $R = k[x]$ 、 $I = (x)$ 、 $M = R$ 、 $N = x^r R$, 其中 $r \geq 1$ 。直接计算得到

$$I^n N = x^{n+r} R, \quad N \cap I^n M = x^{\max(r, n)} R.$$

后一滤过到第 r 阶仍等于整个 N , 前一滤过已经缩小。因此子模的自身理想进滤过和由环境诱导的滤过需要分别处理。

令 $F^n N = N \cap I^n M$ 。它满足 $F^0 N = N$ 及 $IF^n N \subseteq F^{n+1} N$, 且其 Rees 模是 $\mathcal{R}_I(M)$ 的齐次子模。这个观察把滤过比较转化为一个有限生成问题。

13.2.2 Artin-Rees 引理及其证明

下述 **Artin-Rees 引理** (Artin-Rees lemma) 给出诱导滤过最终稳定的精确等式。

定理 13.2.1 (Artin-Rees). 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模、 $N \subseteq M$ 为子模。存在整数 $c \geq 0$, 使对所有 $n \geq c$ 都有

$$N \cap I^n M = I^{n-c}(N \cap I^c M).$$

特别地, N 自身的 I 进拓扑等于 M 在 N 上诱导的拓扑。

证明. 由命题 13.1.6, $\mathcal{R}_I(R)$ 为 Noether 环, $\mathcal{R}_I(M)$ 为有限模, 所以齐次子模

$$\mathcal{N} = \bigoplus_{n \geq 0} (N \cap I^n M) t^n$$

有限生成。仍由该命题, 滤过 $N \cap I^n M$ 从某个次数 c 起稳定, 逐次使用等式便得到所述公式。也可以具体看生成元: 取 $z_j t^{d_j}$ 且 $d_j \leq c$, 则次数 $n \geq c$ 的部分为 $\sum_j I^{n-d_j} z_j$ 。每项都属于 $I^{n-c}(N \cap I^c M)$, 反向包含由 $I^{n-c} I^c M \subseteq I^n M$ 得到。

最后,

$$I^n N \subseteq N \cap I^n M \subseteq I^{n-c} N \quad (n \geq c).$$

两个邻域系相互包含任意给定的足够小邻域, 故拓扑相同。□

引理 11.4.2 只需要上述两个包含关系。现在得到的等式还说明诱导滤过何时开始逐次由乘 I 生成。这里的 c 可以依赖 $N \subseteq M$ 和 I , 不能解释为对所有子模统一的常数; 前面 $N = x^r R$ 的例子中, 最小的 c 就是 r 。

13.2.3 Krull 交定理的局部版本

Krull 交定理 (Krull intersection theorem) 以 Jacobson 根条件保证有限模的分离性。

定理 13.2.2 (Krull 交定理). 设 R 为交换 Noether 环、 M 为有限生成 R 模、 $I \subseteq R$ 为理想。若 $I \subseteq J(R)$, 则

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0.$$

此时 M 的每个子模都闭。特别地, 对 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$, 每个有限模在极大理想进拓扑下分离。

证明. 令 $N = \bigcap_n I^n M$. 它作为 Noether 模的子模有限生成. 对 $N \subseteq M$ 使用定理 13.2.1, 在 $n = c + 1$ 时得到

$$N = N \cap I^{c+1} M = I(N \cap I^c M) = IN.$$

由定理 3.2.3 及 $I \subseteq J(R)$ 得 $N = 0$. 对任意子模 L , 商模 M/L 也有限生成, 因而分离; 命题 13.1.2 说明 L 闭. $\square$

有限性不能删去. 取 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ 、 $M = \mathbb{Q}$, 则 $p^n M = M$ 对所有 n 成立, 交并不为零. Jacobson 根条件也不能对一般环省略: $k \times k$ 的幂等理想 $k \times 0$ 的各次幂都相同.

本节还给出一种实用判断: 在 Noether 局部环中, 若对每个 n 都能使 $x \equiv y_n \pmod{\mathfrak{m}^n M}$, 其中所有 $y_n \in N$, 那么 $x \in N$. 这来自 N 的闭性; 它并不要求这些近似元本身已经构成唯一的表示.

13.3 完备化

只给出每个精度下的一个答案还不够: 高精度答案必须在取商后等于先前的低精度答案. 完备化把这种相容性直接写入定义. 它首先是一个由商模组成的逆极限; 其正合性与 Noether 性则需要另外证明.

13.3.1 完备化的逆极限定义

定义 13.3.1. 设 R 为交换环, $M_1 \xleftarrow{u_1} M_2 \xleftarrow{u_2} \cdots$ 为 R 模及 R 线性过渡映射组成的逆系统. 其逆极限 (inverse limit) 定义为

$$\lim_{\leftarrow n} M_n = \left\{ (x_n) \in \prod_{n \geq 1} M_n \mid u_n(x_{n+1}) = x_n \text{ 对所有 } n \right\}.$$

加法与标量作用逐坐标进行. 给定理想 $I \subseteq R$ 与 R 模 M , 取 $M_n = M/I^n M$ 和自然商映射, 得到 M 的完备化 (completion)

$$\widehat{M} = \lim_{\leftarrow n} M/I^n M.$$

自然映射 $\iota_M: M \rightarrow \widehat{M}$ 把 x 送到 $(x + I^n M)_n$. 若此映射为同构, 称 M 为 I 进完备模; 此处“完备”包含分离性.

逆极限的泛性质可以直接核对: 从模 P 到各 M_n 的相容映射 f_n , 唯一合成映射 $p \mapsto \left(f_n(p) \right)_n$. 另外, $\ker \iota_M = \bigcap_n I^n M$. 因此自然映射单射所需的正是分离性.

记 $K_n = \ker(\widehat{M} \rightarrow M/I^n M)$. 以 K_n 为邻域基时, $\widehat{M}$ 分离且完备: Cauchy 序列在每个商中的坐标最终固定, 这些固定坐标相容, 因而给出唯一极限; $\bigcap_n K_n = 0$ 来自逐坐标为零. 自然映射的像稠密, 因为任意第 n 个坐标都可由 M 中的元素表示. 此时尚未证明 $K_n = I^n \widehat{M}$; 不能直接把逆极限的拓扑与其理想进拓扑混为一谈.

环 $\widehat{R}$ 的加法、乘法逐商定义, $\widehat{M}$ 是 $\widehat{R}$ 模, 因为 $(a_n)(m_n) = (a_n m_n)$ 保持相容性. 模同态按各阶取商得到完备化同态, 并保持恒等映射与复合.

13.3.2 形式幂级数环

定义 13.3.2. 对任意交换环 A , 形式幂级数环 (formal power series ring) $A[[x_1, \dots, x_r]]$ 的元素是全部系数族 $\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^r} a_\alpha x^\alpha$. 加法逐系数定义, 乘法定义为

$$\left(\sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha} \right) \left(\sum_{\beta} b_{\beta} x^{\beta} \right) = \sum_{\gamma} \left(\sum_{\alpha+\beta=\gamma} a_{\alpha} b_{\beta} \right) x^{\gamma}.$$

对固定的多重指标 γ , 内层和只有有限项, 故不需要分析意义的收敛。

交换律、结合律及分配律可在每个固定系数上归结为有限和的同一运算, 常数级数 1 为单位。全次数小于 n 的截断给出同构

$$A[[x_1, \dots, x_r]] \cong \varprojlim_n A[x_1, \dots, x_r]/(x_1, \dots, x_r)^n. \quad (13.1)$$

相容截断唯一指定每个单项式的系数, 反过来每个系数族给出相容截断, 因此此式既证明双射, 也说明环运算为何相同。

命题 13.3.3. 设 A 为交换环。级数 $f \in A[[x_1, \dots, x_r]]$ 可逆, 当且仅当其常数项 a_0 在 A 中可逆。

证明. 若有逆, 比较常数项得到必要性。反向写 $f = a_0(1-h)$, 其中 h 常数项为零。级数 $\sum_{j \geq 0} h^j$ 有意义, 因为全次数小于 n 的项只受前 n 项影响。逐阶使用有限等比恒等式得到 $(1-h) \sum_{j \geq 0} h^j = 1$, 所以 $f^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j \geq 0} h^j$. $\square$

特别地, $k[[x_1, \dots, x_r]]$ 是极大理想为 $(x_1, \dots, x_r)$ 的局部环。局部多项式环 $k[x_1, \dots, x_r]_{(x_1, \dots, x_r)}$ 也有这个完备化: 在每个截断商中, 所有原点处不为零的多项式已经可逆, 所以先局部化不改变各阶商。整数环关于 (p) 的完备化则为 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, 其进位规则来自这些商环的运算, 不能把它误写成 $\mathbb{F}_p[[t]]$ 。

13.3.3 Noether 环上有限模完备化的正合性

引理 13.3.4. 设 R 为交换环, 给定三个 R 模逆系统及逐阶短正合列 $0 \rightarrow A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow 0$, 其中所有过渡映射与列中的映射交换。若过渡映射 $A_{n+1} \rightarrow A_n$ 全部满射, 则

$$0 \rightarrow \varprojlim A_n \rightarrow \varprojlim B_n \rightarrow \varprojlim C_n \rightarrow 0$$

正合。即使不假设满射, 左端及中间位置仍正合。

证明. 单射与中间的核可逐坐标检验。要证明右端满射, 给定相容的 (c_n) , 先选提升 b_1 。若已选 b_n , 任选 c_{n+1} 的提升 b'_{n+1} 。它投到 B_n 后与 b_n 之差落在 A_n , 由满射性可提升成 $a_{n+1} \in A_{n+1}$ 。令 $b_{n+1} = b'_{n+1} - a_{n+1}$, 就同时保持提升与相容性。递归构造出所需的 (b_n) 。 $\square$

定理 13.3.5. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想。对有限生成 R 模的短正合列 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$, 其 I 进完备化

$$0 \rightarrow \widehat{N} \rightarrow \widehat{M} \rightarrow \widehat{P} \rightarrow 0$$

仍正合。

证明. 把 N 看作 M 的子模. 逐阶真正正合的列是

$$0 \longrightarrow N/(N \cap I^n M) \longrightarrow M/I^n M \longrightarrow P/I^n P \longrightarrow 0.$$

其左侧过渡映射为自然商映射, 因而满射. 使用前一引理取逆极限, 右端得到 $\widehat{P}$, 中间得到 $\widehat{M}$. 左端来自诱导滤过; 定理 13.2.1 给出的 $I^n N \subseteq N \cap I^n M \subseteq I^{n-c} N$ 说明该滤过与自身滤过相互共尾. 按命题 13.1.4 的相容余类转换, 左端自然同构于 $\widehat{N}$, 得到结论. $\square$

这里没有断言任意逆极限右正合. 例如短正合列 $0 \rightarrow 2^n \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2^n \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 的逆极限右端为 $\mathbb{Z}_2$, 但 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 不满: 每个模 2^n 的环中 3 的逆元组成相容系统, 若它来自整数 a , 则整数 $3a - 1$ 被所有 2^n 整除, 从而等于零, 矛盾. 本例的左侧过渡映射为严格包含, 不满足引理的满射假设.

13.3.4 完备化的 Noether 性、完备性与张量表示

以下 R 均为 Noether 环, I 为固定理想, M 为有限生成模.

命题 13.3.6. 设 R 为交换 Noether 环、 $I, J \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模, 所有完备化均关于 I 进行. 在 $\widehat{M}$ 中有

$$\text{im}(\widehat{JM} \rightarrow \widehat{M}) = J\widehat{M}, \quad \widehat{M/JM} \cong \widehat{M}/J\widehat{M}.$$

特别地,

$$\widehat{M}/I^n \widehat{M} \cong M/I^n M, \quad \ker(\widehat{M} \rightarrow M/I^n M) = I^n \widehat{M}.$$

因此 $\widehat{M}$ 对 $I\widehat{R}$ 进拓扑完备且分离.

证明. 取 $J = (a_1, \dots, a_s)$. 映射 $M^s \rightarrow JM$ 、 $(m_j) \mapsto \sum_j a_j m_j$ 满射. 由完备化正合性, 其完备化仍满; 有限直和的完备化逐坐标等于完备化的直和, 所以它在 $\widehat{M}$ 中的像恰为 $\sum_j a_j \widehat{M} = J\widehat{M}$. 再完备化 $0 \rightarrow JM \rightarrow M \rightarrow M/JM \rightarrow 0$, 得到商的同构.

取 $J = I^n$. 模 $M/I^n M$ 在第 n 阶以后各商都不再改变, 故其完备化是自身. 于是得到第二组公式; 逆极限原有的邻域核正是理想的幂, 前面已证的完备性和分离性遂成为理想进完备性与分离性. $\square$

定理 13.3.7. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模, $\widehat{R}$ 与 $\widehat{M}$ 均表示 I 进完备化. 则自然映射

$$\widehat{R} \otimes_R M \longrightarrow \widehat{M}, \quad a \otimes m \mapsto a \iota_M(m)$$

是同构. 特别地, $\widehat{M}$ 为有限生成 $\widehat{R}$ 模.

证明. R 为 Noether 环, 故 M 有有限展示 $R^u \xrightarrow{A} R^v \rightarrow M \rightarrow 0$. 完备化正合性说明 $\widehat{M}$ 为矩阵 $A: \widehat{R}^u \rightarrow \widehat{R}^v$ 的余核. 张量积的右正合性说明 $\widehat{R} \otimes_R M$ 为同一矩阵的余核. 自然映射在自由模处就是逐坐标同构, 故在余核处也是同构. 这一论证只用张量积的右正合性, 没有预先假定 $\widehat{R}$ 平坦. $\square$

定理 13.3.8. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想, $\widehat{R}$ 为 I 进完备化。则 $\widehat{R}$ 是 Noether 环, 并且

$$\mathrm{gr}_{I\widehat{R}}(\widehat{R}) \cong \mathrm{gr}_I(R).$$

证明. 记 $B = \widehat{R}$, $K = IB$. 前面的商识别在相邻两阶之间相容, 取核得到 $K^n/K^{n+1} \cong I^n/I^{n+1}$, 且乘法相容。若 $I = (a_1, \dots, a_s)$, 此分次环是 $(R/I)[X_1, \dots, X_s]$ 的商, 故为 Noether 环。

设 $J \subseteq B$ 为任意理想。对每个非零 $f \in B$, 分离性使它有唯一阶数 $d \geq 0$, 即 $f \in K^d \setminus K^{d+1}$; 记其初始形式为 $\mathrm{in}(f)$ 。由所有 $f \in J$ 的初始形式生成的齐次理想有限生成, 故可选有限个 $f_1, \dots, f_r \in J$, 使它们的初始形式生成该理想, 记阶数为 d_i 。这一步可以选实际初始形式, 是因为原生成族中有限个已足以生成同一个理想。

给定 $f \in J$, 若其阶数为 n , 将初始形式表示成 $\sum_i \bar{a}_i \mathrm{in}(f_i)$, 其中 $\bar{a}_i$ 齐次次数为 $n - d_i$, 当 $n < d_i$ 时该项取零。提升为 $a_i \in K^{n-d_i}$, 则 $f - \sum_i a_i f_i \in J \cap K^{n+1}$ 。对这个余项重复。每次非零余项的阶数严格增加, 而 d_i 固定, 所以给每个 f_i 的系数增量趋于零, 并构成 Cauchy 级数。由 B 的完备性, 它们各有和 $b_i \in B$ 。分离性保证余项的极限为零, 因而 $f = \sum_i b_i f_i$ 。若中途余项为零, 论证提前结束。因此 $J = (f_1, \dots, f_r)$, 任意理想均有限生成, B 为 Noether 环。 $\square$

这个证明同时说明为什么“完备”有实质作用: 初始形式只能逐阶消去, 系数最后可能成为无穷和。有限阶消去若没有收敛到环中元素的保证, 就不能推出原理想由所选元素生成。

13.4 完备化的局部性质

上一节已经证明完备化保持有限模短正合列, 并把有限模的完备化写成张量积。本节才开始讨论平坦性; 这样, 平坦性是前面两个结果的推论, 而不是完备化正合性的假设。

13.4.1 完备化与张量积

对有限模 M , 定理 13.3.7 给出的同构与模同态相容: 若 $f: M \rightarrow N$, 两边都把 $a \otimes m$ 送到 $a \iota_N(f(m))$ 。因此可以把有限模之间的完备化映射统一视为沿 $R \rightarrow \widehat{R}$ 的标量扩张。

命题 13.4.1. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想, M, N 为有限生成 R 模, 所有完备化均关于 I 进行。则

$$\widehat{M \otimes_R N} \cong \widehat{M} \otimes_{\widehat{R}} \widehat{N}.$$

证明. 左边由张量表示等于 $\widehat{R} \otimes_R (M \otimes_R N)$ 。右边把两因子写成 $\widehat{R} \otimes_R M$ 、 $\widehat{R} \otimes_R N$, 映射

$$(a \otimes m) \otimes (b \otimes n) \mapsto ab \otimes (m \otimes n)$$

保持各个平衡关系, 逆映射为 $c \otimes (m \otimes n) \mapsto (c \otimes m) \otimes (1 \otimes n)$ 。在纯张量上检查两复合为恒等, 便得同构。 $\square$

有限生成条件在这里不能悄悄删去。例如对 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ 、 $M = \mathbb{Q}$ ，有 $\widehat{M} = 0$ ，因为 $p^n M = M$ ；但 $\widehat{R} \otimes_R M = \mathbb{Z}_p[1/p] \neq 0$ 。最后非零可由 $\mathbb{Z}_p$ 是整环看出：非零 p 进数有最低非零数位，相乘时阶数相加，故任何 p^n 都不是零因子。任意模的完备化因此并不等于沿完备环的普通标量扩张。

13.4.2 Noether 局部环完备化的忠实平坦性

定理 13.4.2. 若 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想，则其 I 进完备化 $\widehat{R}$ 是平坦 R 模。若 R 还是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，且 $I \subseteq \mathfrak{m}$ ，则 $R \rightarrow \widehat{R}$ 忠实平坦。特别地，极大理想进完备化忠实平坦。

证明. 对任意有限生成理想 $J \subseteq R$ ，映射

$$J \otimes_R \widehat{R} \rightarrow R \otimes_R \widehat{R} = \widehat{R}$$

由自然张量表示等同于 $\widehat{J} \rightarrow \widehat{R}$ 。定理 13.3.5 说明后一个映射单射。于是定理 12.1.2 给出平坦性。

若 R 局部且 $I \subseteq \mathfrak{m}$ ，则 $R/\mathfrak{m}$ 的 I 进滤过第一步就为零。由命题 13.3.6，

$$\widehat{R}/\mathfrak{m}\widehat{R} \cong R/\mathfrak{m} \neq 0.$$

R 只有这一个极大理想，故定理 12.5.2 给出忠实平坦性。□

其直接含义是：一个 R 模即使不是有限生成的，也不会张量到 $\widehat{R}$ 后从非零变成零；模映射的单射、满射及正合性也能在张量后检测。这里谈的是张量积函子。上一小节的 $M = \mathbb{Q}$ 例子恰好提醒我们，对任意模不能把它替换成完备化函子。

13.4.3 极大理想、剩余域与维数

命题 13.4.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环， $B = \widehat{R}$ 为极大理想进完备化。则 B 是 Noether 局部环，其极大理想为 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$ ，剩余域自然等于 k 。对每个 $r \geq 1$ 有

$$B/\mathfrak{n}^r \cong R/\mathfrak{m}^r, \quad \text{gr}_{\mathfrak{n}}(B) \cong \text{gr}_{\mathfrak{m}}(R).$$

证明. Noether 性和两项同构分别由定理 13.3.8 和命题 13.3.6 给出。商 $B/\mathfrak{n} = k$ 是域，所以 $\mathfrak{n}$ 为极大理想。若 $b \notin \mathfrak{n}$ ，选 $a \in R$ 使 $ab \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}}$ ，并写 $ab = 1 - u$ 、 $u \in \mathfrak{n}$ 。完备性使 $\sum_{j \geq 0} u^j$ 收敛，逐有限阶等比恒等式给出 $(1 - u) \sum_j u^j = 1$ 。故 b 可逆，其他元素都不能属于极大理想， B 为局部环。□

所有有限阶商及剩余域保持不变，并不表示原环与完备环相同。 $k[x]_{(x)}$ 中的元素是原点分母非零的有理函数，而 $k[[x]]$ 还包含大量并非有理函数的级数。维数保持是另一项需要证明的结论，将由本节末的长度增长比较给出。

13.4.4 由完备化正合性到忠实平坦性

上面的论证可按每步实际使用的假设回看。Artin-Rees 需要 Noether 环上的有限模，由此把诱导滤过换成子模自身的滤过；逆极限提升随即给出有限模正合性。有限展示和张量右正合性给出 $\widehat{M} \cong M \otimes_R \widehat{R}$ 。对有限生成理想取 $M = J$ ，便得到理想张量映射单射，进而推广为对所有模的平坦性。最后剩余域非零才负责“忠实”二字。

全局完备化未必忠实。例如 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ 平坦，但取素数 $q \neq p$ ， q 在 $\mathbb{Z}_p$ 中可逆，所以

$$(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p = 0.$$

这不违反局部结论，因为 $\mathbb{Z}$ 不是在 (p) 处的局部环；先局部化为 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 再完备化，便是忠实平坦映射。忠实性判断的是保留哪些模的信息，不是把“平坦”换成一个更强的形容词而不增加假设。

13.4.5 Hilbert-Samuel 理论与完备化的维数保持

定理 13.4.4. 对交换 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 及其极大理想进完备化 $B = \widehat{R}$ 、 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$ ，有

$$\dim B = \dim R, \quad e_{\mathfrak{n}}(B) = e_{\mathfrak{m}}(R).$$

更一般地，对非零有限 R 模 M ，

$$\dim_B \widehat{M} = \dim_R M, \quad e_{\mathfrak{n}}(\widehat{M}) = e_{\mathfrak{m}}(M).$$

证明. 命题 13.3.6 给出 $\widehat{M}/\mathfrak{n}^{r+1}\widehat{M} \cong M/\mathfrak{m}^{r+1}M$ 。两者的标量作用都通过同一个商环 $B/\mathfrak{n}^{r+1} \cong R/\mathfrak{m}^{r+1}$ 分解，所以子模及组成列完全相同，特别是

$$\ell_B(\widehat{M}/\mathfrak{n}^{r+1}\widehat{M}) = \ell_R(M/\mathfrak{m}^{r+1}M).$$

B 已证为 Noether 局部环， $\widehat{M}$ 已证有限且由忠实平坦性非零，故两侧都能应用定理 11.4.4。相等的累计函数给出相等的最终多项式，比较次数与首项即得维数和重数。取 $M = R$ 得环的结论。□

因此完备化保留局部长度增长及其决定的维数，却未必保留素理想分解的所有细节。例如曲线在形式邻域中可能分出原环中尚未分开的分支；维数相等并不声称两者素谱同胚。

13.5 有限阶近似与形式邻域

完备化由全部有限阶商组成，但一次计算通常只能得到其中有限多个。本节说明这类计算究竟确定什么，以及何时能够从所有阶的近似恢复原环中的结论。

13.5.1 有限阶商、截断数据与相容逆系统

设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环。 $R/\mathfrak{m}^N$ 保留点附近小于 N 阶的信息，称为一个有限阶邻域的坐标环；这些商的相容系统描述形式邻域 (formal neighbourhood)。此处只使用商环和逆极限，不假定读者已有形式概形知识。

在 $k[x, y]_{(x, y)}$ 中模掉 $(x, y)^3$, 得到基 $1, x, y, x^2, xy, y^2$. 相乘后删去全次数至少三的单项式, 即为商环乘法. 对尖点局部环 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(y^2 - x^3)$, 二阶邻域 $R/\mathfrak{m}^3$ 中变成关系 $y^2 = 0$; 直到模 $\mathfrak{m}^4$ 时, 右侧的三次项才重新可见. 一个低阶商无法单独区分所有高阶方程.

命题 13.5.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $\widehat{R}$ 为极大理想进完备化, $f_1, \dots, f_s \in R[X_1, \dots, X_r]$. 在 $\widehat{R}^r$ 中给定一个共同零点, 等价于给定对每个 $N \geq 1$ 的零点 $a_N \in (R/\mathfrak{m}^N)^r$, 且 a_{N+1} 模 $\mathfrak{m}^N$ 等于 a_N .

证明. 零点逐阶取商显然相容. 反向由逆极限定义, 各坐标的相容余类给出 $a \in \widehat{R}^r$. 多项式运算与取商交换, 所以每个 $f_i(a)$ 在所有有限阶商中为零; $\widehat{R}$ 分离, 故 $f_i(a) = 0$. $\square$

命题要求的是一组相容的选择, 不能把“每阶分别找到一个解”不加说明地当作已构成形式解. 保证或构造这种相容选择, 需要利用方程本身的条件; 简单根的逐阶提升将在第二十三章系统讨论.

13.5.2 有限阶、形式与收敛解析对象

在复数域上, 多项式、原点附近收敛的幂级数与任意形式幂级数分别给出

$$\mathbb{C}[x] \subseteq \mathbb{C}\{x\} \subseteq \mathbb{C}[[x]].$$

这里 $\mathbb{C}\{x\}$ 表示具有正收敛半径的幂级数环. $\sum_{n \geq 0} x^n$ 收敛但不是多项式; $\sum_{n \geq 0} n!x^n$ 是形式级数, 却在每个非零 x 处连通项趋零都不满足, 因此不收敛. 后一个判断来自相邻通项绝对值之比 $(n+1)|x|$ 最终大于二.

任意给定的形式级数模 x^N 都等于一个多项式. 因此有限阶数据不能判定它是否收敛. 完备化是代数上的逐阶补全, 不自动赋予解析意义; 若研究收敛性, 还必须另加系数估计或相应的解析定理.

13.5.3 完备化中理想的扩张与收缩

命题 13.5.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $B = \widehat{R}$ 为极大理想进完备化. 对每个理想 $J \subseteq R$, 有

$$JB \cap R = J, \quad B/JB \cong \widehat{R/J}.$$

后一完备化关于 $(\mathfrak{m} + J)/J$ 进行. 更一般地, 有限生成 R 模 M 的子模 N 满足: 一个 $x \in M$ 的像属于 $\text{im}(\widehat{N} \rightarrow \widehat{M})$, 当且仅当 $x \in N$; 这里各模均取 $\mathfrak{m}$ 进完备化.

证明. 定理 13.2.2 使 $R \rightarrow B$ 单射, 故可写交. 商识别已由命题 13.3.6 给出, 而 R/J 为有限模, Krull 交定理又使 $R/J \rightarrow \widehat{R/J}$ 单射. 因此 $x \in R$ 的像属于 JB 恰当且仅当 $x \in J$. 一般情形完备化 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$, 再使用 M/N 到其完备化的单射即可. $\square$

同一理想收缩等式也可由忠实平坦性和命题 12.5.3 得到. 前一证明突出所有阶近似与闭性的关系, 后一证明把它纳入标量扩张的统一结果. 两者都不声称 B 的每个理想都是某个 R 理想的扩张.

13.5.4 幂级数计算的输入形式与有效算法的适用范围

当输入为域 k 上的多项式并指定精度 N 时, 模 $(x_1, \dots, x_r)^N$ 的加法、乘法及求单位的逆只涉及有限个系数。若 k 的运算可有效执行, 这些是有限算法。例如对常数项为一的 $f = 1 - h$, 其模 $(x)^N$ 的逆可取

$$1 + h + \dots + h^{N-1} \pmod{(x)^N},$$

因为 $h \in (x)$ 。本节的截断计算均属于这种明确给出精度的任务。

若输入是代数幂级数, 必须同时给出定义方程、所选分支及取得所需系数的方法; 方程本身可能有多个分支, 甚至不能用选定参数表示成幂级数。任意形式级数则含有无限数据, 未必具有有限编码或可计算的系数序列。不能仅凭“它属于完备环”, 就声称存在读入这个对象并完成任意精确判等的有限算法。

即使允许逐个查询系数, 有限次查询也无法区分零级数与一个在所有已查询位置为零、在更高次数才非零的级数。因此截断计算给出的是指定精度内的确定结论; 要从中推断完整等式, 还须有额外的次数界、有限生成关系或已经证明的提升与唯一性结果。局部标准基如何提供这类有限控制, 将在本卷附录 F 中进一步讨论。

本章小结

Artin-Rees 的关键在于把无限多层子模组成一个有限生成的 Rees 模。它给出诱导滤过的稳定性, 使子模自身的拓扑与环境诱导的拓扑一致; 配合 Nakayama 引理, 便得到局部有限模的分离性和子模闭性。

完备化的正合性先在逐阶商中建立, 再通过相容提升和滤过比较得到。有限展示使完备化等于标量扩张, 理想张量判据随后给出平坦性, 非零剩余域最后给出局部忠实性。完备环的 Noether 性由初始形式的有限生成与收敛消去证明, 而维数保持由相同的 Hilbert-Samuel 函数证明。

形式对象保存所有相容截断; 单个截断只保存有限精度。局部理想的闭性允许从任意高精度的理想成员关系恢复原环中的成员关系, 却不能据此把任意形式级数视为可计算或收敛的函数。

习题

习题 13.1. 设 R 为 Noether 环, 理想 I, J 满足 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$ 。证明任意 R 模上的 I 进拓扑与 J 进拓扑相同, 且其完备化自然同构。

解. 取 $I = (a_1, \dots, a_r)$, 各 a_i 的某个幂属于 J 。若共同选择指数 c 使 $a_i^c \in J$, 则所有全次数至少 $r(c-1)+1$ 的单项式都有一个指数至少 c , 故 $I^{r(c-1)+1} \subseteq J$ 。交换 I, J 同理得 $J^b \subseteq I$ 。于是 $I^{an}M \subseteq J^nM$ 、 $J^{bn}M \subseteq I^nM$, 两组邻域相互共尾。将相容余类投到另一组商, 构成互逆的自然极限同构。□

习题 13.2. 在 $\mathbb{Z}$ 的 (2) 进拓扑中求 $3\mathbb{Z}$ 的闭包。比较在 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 中相应理想的情形。

解. 因为 $3\mathbb{Z} + 2^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, 闭包公式给出 $\overline{3\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$, 故这个真子模不闭. 局部化以后 3 成为单位, $3\mathbb{Z}_{(2)} = \mathbb{Z}_{(2)}$, 当然闭. 第一个环中 $(2) \not\subseteq J(\mathbb{Z})$, 所以没有违反 Krull 交定理的闭性结论. $\square$

习题 13.3. 设 k 为域, 令

$$R = k[x, y]/(x^2 - y^3, xy, y^4), \quad S = k[x, y]/(x^2, xy, y^4).$$

证明它们都是局部环, 极大理想均由 x, y 的像生成, 其伴随分次环同构; 再证明 R, S 不同构. 可比较平方为零的元素是否全部属于极大理想的平方.

解. 两环都有 k 基 $1, x, y, y^2, y^3$: 在 R 中用 $x^2 = y^3$ 消去 x^2 , 在 S 中用 $x^2 = 0$, 其余混合项和 y^4 均为零. 这些关系确实给出五维代数; 结合性只须额外核对 $x^2y = 0 = xyx$ 及 $x^3 = 0$. 因此上述标准形唯一. 两个理想 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 均满足 $\mathfrak{m}^2 = (y^2, y^3)$ 、 $\mathfrak{m}^3 = (y^3)$ 、 $\mathfrak{m}^4 = 0$, 且商为 k , 故是唯一极大理想. 两环的逐层乘法都给出 $k[X, Y]/(X^2, XY, Y^4)$.

若 $u \in R$ 满足 $u^2 = 0$, 先模掉 $\mathfrak{m}$ 得到常数项为零. 写 $u = ax + by + cy^2 + dy^3$, 则

$$u^2 = b^2y^2 + (a^2 + 2bc)y^3.$$

由基的独立性先得 $b = 0$, 再得 $a = 0$, 所以 $u \in \mathfrak{m}^2$. 但在 S 中, $x^2 = 0$ 且 $x \notin \mathfrak{m}^2$. 环同构保持极大理想及其平方, 因而这两个环不同构. 此例在任意特征下成立, 说明即使底域和全部分次片均相同, 分次环仍会遗失高阶乘法信息. $\square$

习题 13.4. 设 $a \in R$ 不是零因子, 证明 $\mathcal{R}_{(a)}(R) \cong R[T]$, 其中 T 对应 at . 若 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 、 $a = \epsilon$, 求此满射的核.

解. 映射 $R[T] \rightarrow R[t]$ 把 $\sum r_i T^i$ 送到 $\sum r_i a^i t^i$, 像即 Rees 环. 若 a 不是零因子, 则每个 a^i 也不是零因子, 逐系数比较得到核为零. 第二种情形中次数至少二全部消失, 次数一的系数须满足 $r_1 \epsilon = 0$, 即 $r_1 \in (\epsilon)$, 常数项须为零. 因此核为 $(\epsilon T, T^2)$. $\square$

习题 13.5. 对固定 $r \geq 0$, 令 $F^n M = I^{\max(n-r, 0)} M$. 证明这是稳定 I 滤过; 指出稳定开始的一个次数并比较其完备化.

解. 下降性明显. 当 $n < r$ 时, $IF^n M = IM \subseteq M = F^{n+1} M$; 当 $n \geq r$ 时, $IF^n M = I^{n-r+1} M = F^{n+1} M$. 所以可取稳定次数 r . 滤过只把原滤过向后推迟有限步, 与 $I^n M$ 相互共尾, 故给出相同拓扑和自然同构的完备化. $\square$

习题 13.6. 设 k 为域, 在 $R = k[x, y]$ 中取 $I = (x, y)$ 、 $N = (x^a, y^b) \subseteq M = R$, 其中 $a, b \geq 1$. 求 Artin-Rees 等式中最小的 c .

解. 令 $c = \max(a, b)$. 单项式逐项判断给出

$$N \cap I^n = x^a I^{n-a} + y^b I^{n-b} = I^{n-c}(x^a I^{c-a} + y^b I^{c-b}) \quad (n \geq c).$$

所以此 c 可行. 不妨 $b \geq a$. 若 $c' < b$, 取 $n = b$, 则 $y^b \in N \cap I^b$, 但它不属于 $I^{b-c'}(N \cap I^{c'})$: 后一单项式理想的每个不被 x 整除的生成单项式, y 次数至少为 $b + (b - c') > b$. 故最小值为 $\max(a, b)$. $\square$

习题 13.7. 设 R 为 Noether 整环、 $I \neq R$ 。证明 $\bigcap_n I^n = 0$ ，即使 I 不包含于 Jacobson 根也成立。

解. 令 $N = \bigcap_n I^n$ 。Artin-Rees 给出 $N = IN$ ，对有限模 N 的恒等自同态应用定理 3.2.1，其所得多项式在一处取值属于 $1 + I$ ，因而给出某个 $a \in I$ 使 $(1 - a)N = 0$ 。因 $I \neq R$ ，有 $1 - a \neq 0$ ；整环中可约去此元素，故 $N = 0$ 。这里用整环的非零因子性质替代了 $1 - a$ 为单位的条件。□

习题 13.8. 证明每个 $z \in \mathbb{Z}_p$ 唯一写成 $\sum_{i \geq 0} a_i p^i$ ，其中 $0 \leq a_i < p$ 。证明 z 可逆当且仅当 $a_0 \neq 0$ 。

解. 从第一个商选择唯一 a_0 ，再从第二个商中减去 a_0 ，剩余是唯一一个 $a_1 p$ ；相容性使这种逐位选择持续且唯一。反向任意这样的数位族给出相容截断。如果 $a_0 = 0$ ，则 z 在剩余域中为零，不能可逆。若 $a_0 \neq 0$ ，先选整数 b 使 $bz \equiv 1 \pmod{p}$ ，再用 $(1 - u)^{-1} = \sum_{j \geq 0} u^j$ 、 $u = 1 - bz \in p\mathbb{Z}_p$ 构造逆元。□

习题 13.9. 设 $m = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} > 1$ ，其中 p_i 是不同素数。求 $\mathbb{Z}$ 的 (m) 进完备化。

解. 中国剩余定理逐阶给出 $\mathbb{Z}/m^n \mathbb{Z} \cong \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{e_i n} \mathbb{Z}$ ，同构与过渡映射相容。逆极限与有限直积交换，因为相容条件逐坐标独立。指数列 $e_i n$ 在正整数中共尾，其极限与全部 p_i 次幂商的极限相同，所以完备化为 $\prod_i \mathbb{Z}_{p_i}$ 。□

习题 13.10. 设 R 是 Noether 且 I 进完备。证明每个有限 R 模 M 都 I 进完备。用 $M = \mathbb{Q}_p$ 说明有限性不能省略。

解. 定理 13.3.7 使自然映射等同于 $M \rightarrow R \otimes_R M$ ，因此是同构。另一方面，对 $R = \mathbb{Z}_p$ 、 $I = (p)$ 、 $M = \mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[1/p]$ ，有 $p^n M = M$ ，故 $\widehat{M} = 0 \neq M$ 。这里失败的首先是分离性。□

习题 13.11. 求 $R = k[x, y]_{(x, y)} / (y^2, x^3)$ 的完备化及其 k 维数。再求 $k[x, y]_{(x, y)} / (y^2 - x^3)$ 的完备化。

解. 第一环的极大理想四次幂为零，因为任何全次数至少四的单项式都被 x^3 或 y^2 整除，故它已完备。基为 $1, x, x^2, y, xy, x^2 y$ ，维数六；与 $k[[x, y]] / (y^2, x^3)$ 相同。第二环由商完备化公式得到 $k[[x, y]] / (y^2 - x^3)$ 。这一结论不以把每个形式级数直接代入一个有理函数为依据，而来自全部有限阶商的相容同构。□

习题 13.12. 设 $R = k[x]_{(x)}$ 、 $A = \text{diag}(x^2, x^4) : R^2 \rightarrow R^2$ 、 $M = \text{coker } A$ 。求 $\widehat{M}$ 的展示及长度。

解. 在 $\widehat{R} = k[[x]]$ 上保留同一个矩阵，得 $\widehat{M} \cong k[[x]] / (x^2) \oplus k[[x]] / (x^4)$ 。两直和项分别有 k 基 $1, x$ 与 $1, x, x^2, x^3$ ，故长度为六。原模已被 x^4 零化，各阶商最终恒定，所以自然映射 $M \rightarrow \widehat{M}$ 本来就是同构。□

习题 13.13. 取 $R = k \times k$ 、 $I = k \times 0$ 。求完备化映射，并直接证明它平坦而不忠实。

解. 所有 R/I^n 都等于第二个 k , 完备化就是投影 $(a, b) \mapsto b$. 作为 R 模, 第二因子为幂等元 $(0, 1)$ 生成的直和项, 因此投射且平坦. 非零模 $k \times 0$ 张量到第二因子后为零, 所以不忠实. 这也给出自然映射不单射的完备化例子. $\square$

习题 13.14. 在 $k[[x, y]]/(x, y)^4$ 中求 $1 - x - y^2$ 的逆, 写出所有全次数小于四的项.

解. 令 $h = x + y^2$, 所求为 $1 + h + h^2 + h^3$ 的三阶截断. 由于 $h^2 = x^2 + 2xy^2 + y^4$, $h^3 \equiv x^3 \pmod{(x, y)^4}$, 答案是 $1 + x + y^2 + x^2 + 2xy^2 + x^3$. 系数 2 在特征二时为零; 等比恒等式说明该式在任意特征都成立. $\square$

习题 13.15. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, A 是 $s \times r$ 矩阵, $b \in R^s$. 证明: 若 $Ax = b$ 在 $\widehat{R}^r$ 中有解, 则在 R^r 中也有解. 说明这个结论为何不保证选定的形式解本身属于 R^r .

解. 令 $N = \text{im}(A) \subseteq R^s$. 完备化正合性说明 $\widehat{\text{im}(A)} = \widehat{N}$ 在 $\widehat{R}^s$ 中的像. 形式解存在意味着 b 的像属于它, 由命题 13.5.2 得 $b \in N$, 即原环中有解. 解的选择可能相差核中的任意元素; 例如零方程 $0x = 0$ 的任意形式级数都是解, 却不必来自 R . $\square$

习题 13.16. 设 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(y^2 - x^3)$, $B = \widehat{R}$. 求两环的维数和极大理想进重数.

解. 命题 11.4.5 给出伴随分次环 $k[X, Y]/(Y^2)$, 其次数零维数一, 每个正次数维数二. 故累计长度为 $2n + 1$. 由 Hilbert-Samuel 定理, $\dim R = 1$, $e(R) = 2$. 完备化各阶商相同, 得到 $\dim B = 1$, $e(B) = 2$. 重数是此指定极大理想的重数. $\square$

习题 13.17. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $J \subseteq R$ 为理想. 证明 $f \in J$ 当且仅当对每个 N 有 $f \in J + \mathfrak{m}^N$. 给出只检查某个固定 N 不足的例子.

解. 反向在有限模 R/J 中使用定理 13.2.2, 正向显然. 对任意固定 N , 在 $R = k[x]_{(x)}$ 中取 $J = (x^{N+1})$, $f = x^N$. 则 $f \in J + (x)^N$, 却 $f \notin J$. 所以量词“每个 N ”不能替换成一个事先任意选定的精度. $\square$

习题 13.18. 设 $\text{char } k \neq 2$. 在 $k[[x]]$ 中构造常数项为一、满足 $u^2 = 1 + x$ 的唯一级数, 并说明在 $k = \mathbb{Q}$ 时它不属于 $\mathbb{Q}[x]_{(x)}$.

解. 写 $u = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n x^n$. 比较系数得 $2a_1 = 1$, 且对 $n \geq 2$, $2a_n = -\sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i}$. 由于 2 可逆, 递归唯一决定所有系数, 并保证每阶方程, 故给出唯一形式解. 若它在 $\mathbb{Q}(x)$ 中, 写成互素多项式比 P/Q , 则 $P^2 = (1+x)Q^2$. 不可约因子 $1+x$ 在左侧出现偶数次, 右侧出现奇数次, 矛盾. 于是形式解的存在并不一般下降为原局部环中非线性方程的解. $\square$

习题 13.19*. 设 k 为可数域. 证明存在 $f \in k[[x]]$ 在 $k(x)$ 上超越; 再证明 $k[[x, y]]$ 中的非零理想 $(y - f(x))$ 与 $k[x, y]_{(x, y)}$ 的交为零.

解. $k[x, T]$ 可数, 每个非零多项式在域 $k((x))$ 中只有有限个根, 因此在 $k(x)$ 上代数的级数只有可数多个. 所有系数仅取两个不同值的级数已不可数, 故可选超越 f , 减去其常数项后仍超越. 代入 $y = f(x)$ 定义连续满射 $k[[x, y]] \rightarrow k[[x]]$, 核为 $(y - f(x))$: 逐单项式使用 $y^j - f(x)^j$ 可被 $y - f(x)$ 整除, 系数和按全次数收敛. 若原局部环的 P/Q

落入此核, $Q(0,0) \neq 0$ 使 $Q(x, f(x))$ 可逆, 因此 $P(x, f(x)) = 0$ 。超越性迫使 $P = 0$ 。故该非零理想不是收缩理想的扩张, 说明并非完备环中的所有理想都来自原环。 $\square$

第十四章 Kähler 微分与无穷小结构

微分模将导子的乘法法则写成一个线性对象。本章构造普遍导子，证明商环、复合映射、局部化和基变换的微分公式，并用它们计算切空间。域扩张的可分性与平方零提升的唯一性都可由微分模检测；平展还要求平坦，光滑还涉及提升的存在性。通过方程、非约化环及不完美基域上的例子，可以看清这些条件各自保留的信息。

本章目标

- 从生成元与关系构造微分模，并把导子解释为平方零扩张中的截面。
- 正确使用两条微分正合列，保留左端未必单射这一限制。
- 由 Jacobian 矩阵计算有理点切空间，区分局部环余切空间与相对微分纤维。
- 证明有限域扩张的微分消失判据，计算纯不可分扩张的微分。
- 分清提升的存在性、唯一性与平坦性，并在标准例子中实际构造提升。

预备知识是多项式商、模与张量积、局部化及有限域扩张。第十二章的平坦性判据用于比较非分歧与平展，第七章的坐标环和双数例子则提供几何背景。这里不要求先掌握正则局部环或一般概形的光滑性；必要的一阶定义和计算均在本章给出。

微分模及两条正合列可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[2, §25, pp. 191–195]。阅读时宜先把一个具体多项式商的微分写出来，再检验基变换和局部化是否给出相同结果；一个抽象泛性质往往正是这些计算相互一致的原因。

14.1 导子与微分模

把方程中的变量作一个平方为零的改动，乘法展开时只剩常数项与一次项。导子记录的正是这个一次变化。微分模把所有可能的导子合并成一个普遍对象，使后面的商环、局部化和切空间计算都能从同一构造出发。这里研究的是代数本身允许的导子，不是在环上预先指定某一个微分算子。

14.1.1 基环上的线性导子

定义 14.1.1. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 为交换环同态， M 为 B 模。如果映射 $D: B \rightarrow M$ 对所有 $b, c \in B$ 、 $a \in A$ 都满足

$$D(b+c) = D(b) + D(c), \quad D(bc) = bD(c) + cD(b), \quad D(\varphi(a)) = 0,$$

就称 D 为 A 上的**导子** (derivation)。全体这样的映射记为 $\mathrm{Der}_A(B, M)$ 。点态相加及 $(bD)(c) = bD(c)$ 使它成为 B 模。

Leibniz 法则给出 $D(1) = 2D(1)$, 故 $D(1) = 0$, 并由归纳得到 $D(b^n) = nb^{n-1}D(b)$. 又 $D(\varphi(a)b) = \varphi(a)D(b)$, 所以导子确为 A 线性映射; 它通常不是 B 线性的, 否则 $D(b) = bD(1) = 0$. 例如 $d/dx : k[x] \rightarrow k[x]$ 是 k 导子, 而 $(d/dx)(x) = 1$, 并不满足 $k[x]$ 线性.

若 $\text{char } B = p > 0$, 则任何导子都满足 $D(b^p) = 0$. 这不是说所有导子都为零: 在 $k[x]$ 上, $D(x) = 1$ 的形式求导仍然存在. 它说明导子无法检测 p 次幂方向, 也预示了不可分扩张中的特殊现象.

命题 14.1.2. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态, M 为 B 模. 在加法群 $B \oplus M$ 上定义

$$(b, m)(c, n) = (bc, bn + cm).$$

这给出一个 A 代数, 单位为 $(1, 0)$, 理想 $0 \oplus M$ 的平方为零. 映射 $b \mapsto (b, D(b))$ 是投影到 B 的 A 代数截面, 当且仅当 $D \in \text{Der}_A(B, M)$.

证明. 三因子乘积的第二坐标都是 $bcu + bdn + cdm$, 其中第三因子为 (d, u) , 故结合律成立; 交换律、分配律和单位可直接由公式检验. 平方为零来自两因子的第一坐标同时为零. 截面必须有 $(b, D(b))$ 的形式, 保持加法、乘法以及 A 的像分别就是导子的三个条件. $\square$

这个环称为平方零扩张 $B \oplus M$. 它把“无穷小变化”变成确切的环运算; 这里的无穷小并非一个任意小的实数, 而是乘积被规定为零的理想元素.

14.1.2 微分模的泛性质

定理 14.1.3. 设 A 为交换环, B 为交换 A 代数. 存在 B 模 $\Omega_{B/A}$ 与 A 导子 $d : B \rightarrow \Omega_{B/A}$, 使对任意 B 模 M , 映射

$$\text{Hom}_B(\Omega_{B/A}, M) \longrightarrow \text{Der}_A(B, M), \quad h \longmapsto h \circ d$$

为自然双射. 二者组成的对象在唯一的保持 d 的同构意义下唯一, 称为 **Kähler 微分模** (module of Kähler differentials); d 称为 **普遍导子** (universal derivation).

证明. 记结构同态为 $\varphi : A \rightarrow B$. 取以集合 B 为指标的自由 B 模 $F = \bigoplus_{b \in B} Be_b$, 模掉下列元素生成的子模:

$$e_{b+c} - e_b - e_c, \quad e_{bc} - be_c - ce_b, \quad e_{\varphi(a)} \quad (b, c \in B, a \in A).$$

记所得商为 $\Omega_{B/A}$, 令 db 为 e_b 的像. 三个关系使 d 满足导子的三个公理. 对任意导子 D , 从自由模出发的唯一线性映射 $e_b \mapsto D(b)$ 恰好零化这些关系, 故下降为 $h : \Omega_{B/A} \rightarrow M$. 因各 db 生成微分模, 这个 h 唯一.

若另一对 (Ω', d') 也有此性质, 分别应用泛性质得到 $u : \Omega \rightarrow \Omega'$ 、 $v : \Omega' \rightarrow \Omega$, 满足 $ud = d'$ 、 $vd' = d$. 于是 $vud = d$, 唯一性给出 $vu = 1$, 同理 $uv = 1$. 对 M 的同态作复合即说明双射的自然性. $\square$

普遍性并不表示 d 是最容易手算的导子，而是任何导子都只能通过它再接一个线性映射。若 B 由 b_i 作为 A 代数生成，则 $\Omega_{B/A}$ 由 db_i 作为 B 模生成，因为乘法法则能把任意多项式的微分化成这些元素的线性组合。生成元之间的代数关系则会带来微分关系。

14.1.3 多项式环的微分模

命题 14.1.4. 设 A 为交换环， $n \geq 0$ 为整数， $P = A[X_1, \dots, X_n]$ 。则

$$\Omega_{P/A} = \bigoplus_{i=1}^n P dX_i, \quad df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial X_i} dX_i.$$

对任意 P 模 M 和元素 $m_1, \dots, m_n \in M$ ，存在唯一 A 导子 $D: P \rightarrow M$ 满足 $D(X_i) = m_i$ 。

证明. 在单项式上反复使用 Leibniz 法则，任何导子都必须满足所列公式。反向用该公式定义 $D(f) = \sum_i (\partial f / \partial X_i) m_i$ ，多项式形式偏导的乘法公式直接给出 Leibniz 法则，且它零化 A ，所以存在性也成立。于是自由模 $\bigoplus_i P dX_i$ 具有普遍导子的泛性质，等同于 $\Omega_{P/A}$ 。也可用导子 $\partial / \partial X_j$ 检查线性无关：它将假定关系 $\sum_i f_i dX_i = 0$ 送到 $f_j = 0$ 。□

例如在 $k[x, y]$ 中， $d(x^2y) = 2xy dx + x^2 dy$ 。若再施加关系 $y^2 = x^3$ ，则必有 $2y dy - 3x^2 dx = 0$ ；下一节将证明怎样获得全部这样的关系。对形式幂级数环则需要额外区分连续导子与任意代数导子，本章的多项式结论不未经证明地推广到无限级数。

14.2 基本正合列

给定代数的生成元以后，导子的值不能任意选择：它必须保持方程的微分关系。两条基本正合列分别处理“添加关系”和“改变基环”，局部化与基变换公式则使这些计算能够转到所需的局部环或基域。

14.2.1 商环的余法正合列

定理 14.2.1 (余法正合列). 设 A 为交换环， B 为交换 A 代数、 $J \subseteq B$ 为理想、 $C = B/J$ 。有 C 模正合列

$$J/J^2 \xrightarrow{\delta} C \otimes_B \Omega_{B/A} \longrightarrow \Omega_{C/A} \longrightarrow 0, \quad \delta(f + J^2) = 1 \otimes df.$$

模 J/J^2 称为相应商映射的**余法模** (conormal module)。不在列的左端添加未经证明的零。

证明. 若 $f \in J^2$ ，将它写成有限和 $\sum_i u_i v_i$ 、 $u_i, v_i \in J$ ，则 $df = \sum_i (u_i dv_i + v_i du_i)$ 在张量到 C 后为零，故 δ 良定义。又 $d(bf) = b df + f db$ ，第二项在 C 上为零，所以 δ 是 C 线性的。

将 $C \otimes_B \Omega_{B/A}$ 模掉全部 $1 \otimes df$ 、 $f \in J$ ，记商为 Q 。映射 $b + J \mapsto [1 \otimes db]$ 良定义，因为改变代表元只增加一个被模掉的微分。它是 A 导子。若 $D: C \rightarrow M$ 是任意 A 导

子, 复合 $B \rightarrow C$ 后的导子对应一个 $C \otimes_B \Omega_{B/A} \rightarrow M$, 且零化各 df , 故唯一通过 Q . 于是 Q 有 $\Omega_{C/A}$ 的泛性质, 得到所需正合列. $\square$

推论 14.2.2. 设 A 为交换环, $f_1, \dots, f_s \in A[X_1, \dots, X_n]$, $B = A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$, x_i 为变量的像. 则有展示

$$B^s \xrightarrow{J_f} B^n \rightarrow \Omega_{B/A} \rightarrow 0, \quad (J_f)_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(x).$$

因此有限呈示交换代数的微分模为有限展示模。

证明. 对 $P = A[X]$ 的商应用余法正合列, $\Omega_{P/A}$ 为以 dX_i 为基的自由模. 若 $f = \sum_i g_i f_i$, 在 B 上有 $df = \sum_i g_i df_i$, 因为含 $f_i dg_i$ 的项消失. 因此全部微分关系由各 df_i 生成, 给出所列有限矩阵. $\square$

左端不一定单射. 例如在特征 p 的域上取 $B = k[t]$, $J = (t^p)$. 模 J/J^2 是非零的循环 B/J 模, 而 $\delta(t^p) = pt^{p-1}dt = 0$, 所以整个余法映射为零。

14.2.2 复合环映射的微分序列

定理 14.2.3. 设 $A \rightarrow B \xrightarrow{g} C$ 为交换环同态, 则有 C 模正合列

$$C \otimes_B \Omega_{B/A} \xrightarrow{\alpha} \Omega_{C/A} \xrightarrow{\beta} \Omega_{C/B} \rightarrow 0,$$

其中 $\alpha(c \otimes db) = c d(g(b))$, $\beta(d_{C/A}c) = d_{C/B}c$.

证明. 复合 $B \rightarrow C \xrightarrow{d_{C/A}} \Omega_{C/A}$ 是 A 导子, 故给出 α . 在 $\Omega_{C/A}$ 中模掉各 $d(g(b))$ 生成的子模后, 普遍导子就零化 B 的像, 因此成为 B 导子. 任意 B 导子首先是 A 导子, 并零化这些指定元素, 所以唯一经过此商. 该商即 $\Omega_{C/B}$, 证明正合性. $\square$

改变基环意味着将更多元素视为常数, 所以末端微分模是中间微分模的商. 首箭头则可能不单射. 例如 $A = k$, $B = k[t^p] \subseteq C = k[t]$, $\text{char } k = p$ 时, B 作为多项式环有非零微分 $d(t^p)$, 但其在 $\Omega_{C/k}$ 中的像为零。

14.2.3 微分模的局部化与基变换

命题 14.2.4. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态, $S \subseteq B$ 为乘法集. 则

$$\Omega_{S^{-1}B/A} \cong S^{-1}\Omega_{B/A}, \quad d(b/s) = \frac{db}{s} - \frac{b ds}{s^2}.$$

若同时局部化基环, 则把 A 中变成可逆的元素在 B 中一并局部化后, 同一公式仍成立。

证明. 对取值于任意 $S^{-1}B$ 模 M 的 A 导子 $D: B \rightarrow M$, 等式 $D(s \cdot s^{-1}) = 0$ 迫使其延拓满足上述分式公式. 检查良定义: 若 $b/s = b'/s'$, 则存在 $t \in S$ 使 $t(s'b - sb') = 0$. 取导数并在 M 中将 t, s, s' 视为单位; 由于 $s'b - sb' = 0$ 在局部化后成立, 得到

$$s'Db + bDs' - sDb' - b'Ds = 0.$$

连同 $s'b = sb'$, 整理即得两个分式公式相等。对分式加法和乘法展开可得加法性与 Leibniz 法则: 乘法中的导数项恰分成对第一个和第二个因子的两部分。故延拓存在且唯一。它还零化 A 中所增添的逆元, 因为 $D(a^{-1}) = -a^{-2}D(a) = 0$ 。由普遍性得到所述同构。 $\square$

命题 14.2.5. 设 B 为交换 A 代数, $A \rightarrow A'$ 为交换环同态, 令 $B' = A' \otimes_A B$ 。有自然同构

$$\Omega_{B'/A'} \cong B' \otimes_B \Omega_{B/A}.$$

不需要 A' 在 A 上平坦。

证明. 从右侧到左侧的映射由 $1 \otimes db \mapsto d(1 \otimes b)$ 定义。反向先在纯张量上定义

$$D(a' \otimes b) = (a' \otimes 1) \otimes db.$$

由于 $d(ab) = a db$ 对 $a \in A$ 成立, 此公式保持张量平衡关系, 因此对任意有限和良定义。它零化 A' , 并由 $d(bc) = b dc + c db$ 满足乘法法则, 所以对应 $\Omega_{B'/A'}$ 到右侧的映射。两复合固定所有 $d(1 \otimes b)$ 或 $1 \otimes db$, 而这些元素分别生成两侧, 故互为逆。 $\square$

这两个公式允许先在多项式商上写出 Jacobian 展示, 再局部化到指定点, 或改变基域后重新考察方程。它们保持微分的计算, 却不自动保证原代数的约化性、正则性或光滑性在所有基变换下都保持。

14.3 切空间与 Jacobian 矩阵 (雅可比矩阵)

一条曲线在一个点附近可能有几条分支, 也可能含有重根; 只看点集不能分辨这些现象。把点的坐标改成 $a_i + v_i \varepsilon$, 其中 $\varepsilon^2 = 0$, 方程留下的一次关系便限制了允许的方向。先从有理点说明这个计算, 再讨论剩余域不是基域的情形。

14.3.1 极大理想模平方与余切空间

定义 14.3.1. 设 k 为域, B 为有限型交换 k 代数, $a: B \rightarrow k$ 为一个 k 代数同态, $\mathfrak{m} = \ker a$ 。以 a 赋予 k 一个 B 模结构。向量空间

$$T_a(B) = \operatorname{Der}_k(B, k)$$

称为 B 在这个 k 有理点处的 **Zariski 切空间** (Zariski tangent space); $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是该点的余切空间。这里的 B 可以含有非零幂零元, 不要求它是某个点集的约化坐标环。

命题 14.3.2. 设 k 为域, B 为交换 k 代数, $a: B \rightarrow k$ 为 k 代数同态, $\mathfrak{m} = \ker a$ 。则有自然同构

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} k \otimes_B \Omega_{B/k}, \quad \bar{b} \mapsto 1 \otimes db,$$

以及

$$\operatorname{Der}_k(B, k) \cong \operatorname{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k).$$

若以局部环 $B_{\mathfrak{m}}$ 代替 B , 所得余切空间及切空间相同。

证明. 对 $b, c \in \mathfrak{m}$, $1 \otimes d(bc) = 0$, 故第一个映射良定义. 每个 $b \in B$ 都写成 $a(b) + (b - a(b))$, 其中后项属于 $\mathfrak{m}$, 所以这个映射满射. 反向定义

$$D : B \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \quad D(b) = b - a(b) \pmod{\mathfrak{m}^2}.$$

将 $b = a(b) + b_0$ 、 $c = a(c) + c_0$ 相乘, 模掉 $\mathfrak{m}^2$ 后得到 $D(bc) = a(b)D(c) + a(c)D(b)$. 故 D 是取值于剩余域模的 k 导子, 由微分模泛性质诱导逆映射. 第二个同构由同一泛性质及第一个同构得到.

若 $s \notin \mathfrak{m}$, 它在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上的乘法就是非零标量 $a(s)$, 已经可逆. 因此局部化不改变该商; 由局部化正合性, 它又等于 $\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}})^2$. 导子的分式延拓公式也给出相同的切空间. $\square$

上述导子还有直接的点的解释. 给定 $D \in T_a(B)$, 映射

$$B \longrightarrow k[\varepsilon]/(\varepsilon^2), \quad b \longmapsto a(b) + D(b)\varepsilon$$

是一个模 ε 后等于 a 的 k 代数同态; 乘法相容性恰是导子的公式. 反过来, 每个这样的同态都唯一给出一个 D . 因此切向量记录的是点向双数环中的一阶延伸.

14.3.2 仿射方程的切空间计算

定理 14.3.3. 设 k 为域, $B = k[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$, 且 $a = (a_1, \dots, a_n) \in k^n$ 满足所有 $f_i(a) = 0$. 令

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(a) \right)_{1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq n}.$$

则在变量坐标给出的识别下,

$$T_a(B) = \ker \left(J_f(a) : k^n \rightarrow k^s \right), \quad \dim_k T_a(B) = n - \text{rank } J_f(a).$$

这个矩阵称为所给方程组的 **Jacobian 矩阵** (Jacobian matrix), 亦称雅可比矩阵.

证明. 推论 14.2.2 给出 $B^s \rightarrow B^n \rightarrow \Omega_{B/k} \rightarrow 0$. 张量到 k 后仍右正合, 再取 k 线性对偶, 得到

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_k(k \otimes_B \Omega_{B/k}, k) \longrightarrow k^n \xrightarrow{J_f(a)} k^s.$$

前一命题把左端识别为切空间, 因而得到核的描述及维数公式. 具体说, 一个方向 $v = (v_j)$ 满足

$$f_i(a_1 + v_1\varepsilon, \dots, a_n + v_n\varepsilon) = f_i(a) + \varepsilon \sum_j \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(a) v_j = 0;$$

二次以上的改变量因 $\varepsilon^2 = 0$ 全部消失. 这也直接解释了每一行约束的含义. $\square$

例如在 $B = k[x, y]/(xy - 1)$ 中, 每个有理点 (a, b) 都有 $ab = 1$, Jacobian 行为 (b, a) , 秩为一, 所以切空间由 $bv_x + av_y = 0$ 给出, 是一维的. 在尖点曲线 $y^2 = x^3$ 的原点, Jacobian 行 $(-3x^2, 2y)$ 为零, 故切空间是整个 k^2 , 任意特征都如此. 曲线 $xy = 0$

的原点也有二维切空间, 虽然它有两分支, 而尖点只有一条。这说明切空间维数能发现某些异常, 却不能单独数出分支。

还须保留方程中的幂零结构。 $k[t]/(t^2)$ 只有一个域值点, 但该点切空间为一维; 约化后的坐标环 k 则有零切空间。两者的点集相同, 一阶延伸却不同。若已经把理想替换成根理想再计算, 便无法恢复丢掉的方向。

14.3.3 非完美基域上的切空间

对一般点 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } B$, 剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 未必等于 k 。局部环自身的余切空间 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}})^2$ 与相对微分的纤维 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_B \Omega_{B/k}$ 是两个不同对象。对 $B_{\mathfrak{p}} \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$ 应用余法正合列及微分局部化, 得到

$$\frac{\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}}{(\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}})^2} \longrightarrow \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_B \Omega_{B/k} \longrightarrow \Omega_{\kappa(\mathfrak{p})/k} \longrightarrow 0. \quad (14.1)$$

当点为 k 有理点时, 前一命题给出了左箭头为同构的额外论证; 不能仅凭这条右正合列, 在任意点处也补上同构号。

例 14.3.4. 设 p 为素数、 $k = \mathbb{F}_p(s)$, 其中 s 为超越元。令

$$L = k[u]/(u^p - s).$$

由于 s 在 k 中不是 p 次幂, $u^p - s$ 不可约, 故 L 为域。其唯一局部环的极大理想为零, 局部环余切空间也为零。但微分展示给出

$$\Omega_{L/k} = L du,$$

因为 $d(u^p - s) = 0$ 。这里相对微分纤维非零, 完全来自剩余域扩张的不可分性。若扩域到 $K = k(s^{1/p})$, 则

$$K \otimes_k L \cong K[v]/(v^p), \quad v = u - s^{1/p},$$

几何点处出现一维切空间以及非零幂零元。

不可约性的一个直接检验如下。在代数闭包中, $T^p - s = (T - \alpha)^p$ 。若 α 的最小多项式次数 $r < p$, 它只能为 $(T - \alpha)^r$, 其 T^{r-1} 系数使 $r\alpha \in k$, 从而 $\alpha \in k$, 与 s 非 p 次幂矛盾。最后一事实可由有理函数在 $s = 0$ 处的零点阶数核验: p 次幂的阶数是 p 的倍数, s 的阶数则为一。

这一区别在不完美基域上尤其必要。局部环是域, 因而在环论意义下最简单, 却不能据此断言它相对于给定基域光滑。后面的正则局部环与光滑性判据将分别处理环自身的性质和扩张基域后的性质; 本章的微分计算已经显示两者为何不能合并。

14.4 可分性与光滑性初步

对域扩张, 微分模检测元素之间是否存在不可分关系; 对一般环同态, 它检测平方零改动的唯一性。两者都属于一阶信息, 却不能代替平坦性或提升的存在性。本节证明所需的微分判据, 并把非分歧、光滑和平展的条件分别写明。一般的提升定理留到第二十三章, 这里不把那些尚待证明的等价条件当作依据。

14.4.1 有限代数域扩张的微分模

先看一个代数元。设 $L = K(\alpha)$, $f \in K[T]$ 为 α 的首一不可约多项式。由于 $L = K[T]/(f)$, 推论 14.2.2 给出

$$\Omega_{L/K} \cong L d\alpha / (f'(\alpha) d\alpha). \quad (14.2)$$

若 f 可分, $f'(\alpha) \neq 0$ 在域中为单位, 故微分模为零。若 f 不可分, 其不可约性迫使 $f' = 0$, 于是微分模为一维。一般有限扩张不一定由一个元素生成; 不能把这个单生成元计算直接当作一般情形的证明。

引理 14.4.1. 设 $K \subseteq L$ 为特征 $p > 0$ 的有限域扩张, 令 $F = KL^p$ 为由 K 及所有 p 次幂生成的子域。存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in L$, 使

$$[L : F] = p^r, \quad \Omega_{L/K} \cong \bigoplus_{i=1}^r L d\alpha_i.$$

其中 $r = 0$ 恰好表示 $L = KL^p$ 。

证明. 每个 K 导子都零化 L^p , 再由四则运算法则零化 F , 所以 K 导子与 F 导子相同, 微分模也相同。逐次选取尚未落入已生成子域的 α_i , 直至生成 L/F 。每次都有 $\alpha_i^p \in F$, 且对应最小多项式为 $T^p - \alpha_i^p$: 若次数小于 p , 在代数闭包中它为 $(T - \alpha_i)^j$, $0 < j < p$, 其下一项系数便使 α_i 已属于前一子域, 矛盾。因此每步次数为 p , 而有限次数保证过程终止。

于是 $\prod_i \alpha_i^{e_i}$, $0 \leq e_i < p$, 组成 F 基。自然满射

$$F[X_1, \dots, X_r] / (X_1^p - \alpha_1^p, \dots, X_r^p - \alpha_r^p) \longrightarrow L$$

两侧维数都是 p^r , 故为同构。关系的微分全部为零, 推论 14.2.2 遂给出所列自由基。□

定理 14.4.2. 设 L/K 为有限域扩张。则

$$\Omega_{L/K} = 0 \iff L/K \text{ 可分}.$$

若 L/K 为特征 $p > 0$ 的非平凡有限纯不可分扩张, 则 $\Omega_{L/K} \neq 0$ 。

证明. 若扩张可分, 对任意 $\alpha \in L$, 其最小多项式 f 满足 $f'(\alpha) \neq 0$ 。微分等式 $f'(\alpha)d\alpha = 0$ 因而给出 $d\alpha = 0$ 。这些元素生成微分模, 所以该模为零。

先证非平凡纯不可分情形。设 L/K 的指数不超过 e , 即 $L^{p^e} \subseteq K$; 有限生成性保证存在同一个 e 。若 $L = KL^p$, 反复取 p 次幂并代回便得 $L = KL^{p^j}$ 对所有 $j \geq 1$ 成立, 特别地 $L = K$, 矛盾。因此 $KL^p \subsetneq L$, 前一引理给出至少一个非零微分。

最后设 L/K 不可分。令 E 为 L 中对 K 可分的元素组成的子域; 可分代数扩张对复合及子扩张封闭, 保证这些元素对四则运算封闭。 E/K 有限可分。对任意 $\alpha \in L$, 其不可约多项式在特征 p 下唯一写成 $g(T^{p^a})$, 其中 $g' \neq 0$ 。多项式 g 仍不可约, 否则将其分解代入 T^{p^a} 就得到原多项式的分解; 故 g 可分, α^{p^a} 对 K 可分并属于 E 。于是 L/E 纯不可分; 由于原扩张不可分, 它非平凡。复合微分正合列给出

$$L \otimes_E \Omega_{E/K} \longrightarrow \Omega_{L/K} \longrightarrow \Omega_{L/E} \longrightarrow 0.$$

左端由已证的可分情形为零，右端由刚证的纯不可分情形非零，所以中间项非零。特征零没有不可分代数扩张，不需此分情形。□

这里使用的只是通常的域论中可分元素组成子域的事实，微分判据本身已就地证明。对可分扩张的提升性质，可参照松村英之的《Commutative Ring Theory》[2, §25, Theorem 25.3, pp. 195–196]；下一小节将说明“提升”究竟要求什么。

14.4.2 非分歧与光滑的基本概念

定义 14.4.3. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态。对任意交换 A 代数 C 、满足 $J^2 = 0$ 的理想 $J \subseteq C$ ，以及 A 代数同态 $u: B \rightarrow C/J$ ，考虑使下式复合等于 u 的 A 代数同态 $\tilde{u}$ ：

$$B \xrightarrow{\tilde{u}} C \longrightarrow C/J.$$

若每组这样的数据都有提升，称 $A \rightarrow B$ **形式光滑** (formally smooth)；若每组数据至多有一个提升，称其**形式非分歧** (formally unramified)；若每组数据恰有一个提升，称其**形式平展** (formally étale)。

“至多一个”允许没有提升，“至少一个”允许有多个，必须分开判断。只用平方零理想已足以检验任意幂零理想：若 $J^N = 0$ ，可沿 C/J 、 C/J^2 、...、 $C/J^N = C$ 逐次提升，因为 J^i/J^{i+1} 的平方为零；存在性、唯一性分别逐次传递。

定义 14.4.4. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态，且 B 可写成 $A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$ ，其中生成元和关系均有限。此时称 B 是有限呈示 A 代数。在这个有限呈示范围内，若映射形式光滑，称其**光滑** (smooth)；若形式非分歧，称其**非分歧** (unramified)；若 B 作为 A 模平坦且 $\Omega_{B/A} = 0$ ，称其**平展** (étale)。

本节固定在有限呈示范围内讨论后面三个名称；不据此改写一般文献中用“有限型”表述非分歧的更宽定义。平展的上述平坦性判据与“有限呈示且形式平展”等价，这是第二十三章将建立的一般结果；当前只在下文的具体代数上直接核验两套条件。

例如多项式代数 $A[X_1, \dots, X_n]$ 光滑：把每个 $u(X_i)$ 任意提升到 C ，即可唯一按这些已选的像延拓为代数同态。若 $n > 0$ ，选择本身通常不唯一，所以不能据此称形式非分歧。局部化 A_f 则形式平展： f 在 C/J 中的像为单位时，它在 C 中也是单位；若 $ab = 1 + j$ 、 $j^2 = 0$ ，则 $b(1 - j)$ 就是 a 的逆。局部化的泛性质因而给出唯一提升。再用 $A_f = A[T]/(fT - 1)$ 、局部化平坦性及 $\Omega_{A_f/A} = 0$ ，也可直接核验其平展性。

14.4.3 微分模消失与平展性的条件

定理 14.4.5. 设 $A \rightarrow B$ 为任意交换环同态，不加有限性条件。该映射形式非分歧，当且仅当 $\Omega_{B/A} = 0$ 。

证明. 设 $J^2 = 0$ ，且 $v, w: B \rightarrow C$ 为同一个 $u: B \rightarrow C/J$ 的两个提升。差 $D = v - w$ 取值于 J 。由于 $J^2 = 0$ ， u 使 J 成为一个 B 模：取 $u(b)$ 的任意提升乘 J ，结果不依赖选择。展开

$$v(b)v(c) - w(b)w(c) = w(b)D(c) + w(c)D(b) + D(b)D(c)$$

可见最后一项为零, 故 D 是 A 导子。如果 $\Omega_{B/A} = 0$, 微分模泛性质使 $D = 0$, 两个提升相同。

反向在平方零扩张 $C = B \oplus \Omega_{B/A}$ 中比较 $b \mapsto (b, 0)$ 与 $b \mapsto (b, db)$ 。命题 14.1.2 说明两者都是恒等同态 $B \rightarrow B$ 的提升。形式非分歧使它们相同, 故所有 $db = 0$ 。这些元素生成 $\Omega_{B/A}$, 所以该模为零。□

这项等价也解释了它的局限: 微分模消失控制两个已存在的提升之间的差, 不能凭空产生提升, 更不自动保证平坦。

例 14.4.6. 设 k 为域, 取商映射 $A = k[t] \rightarrow B = k = A/(t)$ 。任意 A 导子 $B \rightarrow M$ 都为零, 因为 B 的每个元素都来自基环, 因此 $\Omega_{B/A} = 0$, 且该映射有限呈示、形式非分歧。但它不平坦: 单射 $A \xrightarrow{t} A$ 张量到 B 后变成非零模 B 上的零映射。

它也不是形式光滑。把 $C = k[t]/(t^2)$ 看成 A 代数, 令 $J = (t)/(t^2)$ 。恒等映射 $B = k \rightarrow C/J = k$ 不可能提升为 A 代数映射 $B \rightarrow C$, 因为 t 在 B 中为零, 在 C 中却非零。故它是非分歧而非平展的具体例子。

14.4.4 有限呈示映射的形式非分歧、非分歧与平展性

把目前已证和留待以后证明的关系区分开, 可以避免在使用名称时偷偷加入假设。对有限呈示交换环同态 $A \rightarrow B$, 本节已经得到

$$\begin{aligned}\Omega_{B/A} = 0 &\iff \text{形式非分歧} \iff \text{非分歧}, \\ \text{平展} &\iff \text{平坦且} \Omega_{B/A} = 0.\end{aligned}$$

第二行使用刚给出的平展判据作为本章定义。有限呈示且形式平展与第二行等价、一般光滑映射必平坦等结果, 均为后续提升理论的内容; 本章的证明不调用它们。

命题 14.4.7. 设 A 为交换环, $f \in A[T]$ 为正次数首一多项式, 令 $B = (A[T]/(f))_g$, 其中 g 是商环中的一个元素, t 为 T 的像。若 $f'(t)$ 在 B 中可逆, 则 $A \rightarrow B$ 平展, 并且形式平展。

证明. 商环由首一除法具有有限 A 基 $1, t, \dots, t^{\deg f - 1}$, 因而平坦; 再局部化仍对 A 平坦, 由命题 12.1.5 成立。添加一个生成元及关系 $gU - 1$ 表明 B 有限呈示, 而 $\Omega_{B/A} = B dt / (f'(t)dt) = 0$ 。所以映射平展。

直接检查提升。设 $J^2 = 0$, 给定 $u: B \rightarrow C/J$ 。取 $x \in C$ 提升 $u(t)$, 则 $f(x) \in J$, 且 $f'(x)$ 为单位, 因为它模 J 后为单位。令

$$x' = x - f'(x)^{-1}f(x).$$

平方零条件使 Taylor 展开恰好为 $f(x') = f(x) + f'(x)(x' - x) = 0$ 。选取代表 g 的多项式 $G \in A[T]$ 。因为 $G(x')$ 模 J 为单位, 它本身为单位; 而 $f(x') = 0$ 保证这个值不依赖代表的选择。于是 $T \mapsto x'$ 唯一延拓为 $B \rightarrow C$ 。若另一根 x'' 给出同一模 J 的像, 则 $0 = f(x'') - f(x') = f'(x')(x'' - x')$, 故 $x'' = x'$ 。由生成元及局部化泛性质, 整个提升唯一。□

这种一元计算通常称为标准平展代数的基本情形。条件必须在实际局部化的环内检查。例如 $A = k[s]$ 、 $B = A[t]/(t^2 - s)$ 总是秩二自由，但微分模为 $(B/(2t)) dt$ 。若 $\text{char } k \neq 2$ ，倒置 t 后导数为单位，得到平展映射；在 $t = 0$ 处导数不能相除。若 $\text{char } k = 2$ ，导数处处为零，非零的局部化也不满足这个非分歧条件。

光滑的类似计算允许自由方向。设 $B = (A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r))^g$ ，其中 $r \leq n$ ，且前 r 个变量对应的 Jacobian 子式在 B 中可逆。给定平方零提升问题，先任取所有变量的提升 x_j ，误差向量 $(f_i(x))_{i=1}^r$ 的各分量落入 J 。保持后 $n - r$ 个变量不变，用可逆的 $r \times r$ 子矩阵解线性方程

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(x) \right)_{1 \leq i, j \leq r} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_r \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_r(x) \end{pmatrix}.$$

所得 $h_j \in J$ 使修正后的方程精确为零， g 仍可逆。故这个有限呈示代数形式光滑，也就是光滑。这里确实给出了提升的存在性；不能把这段证明缩成“微分模是自由的，所以光滑”。

14.4.5 可分与纯不可分扩张的微分计算

取有限域扩张时，平坦性没有额外障碍，因为向量空间总自由。有限扩张也有限呈示：选有限组域生成元，得到有限型 K 代数，关系理想由多项式环的 Noether 性有限生成。因此定理 14.4.2 立即给出：有限域扩张平展当且仅当可分。

例如 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 有 $\Omega = 0$ ，因为 $2\sqrt{2}$ 为单位。相反，若 $k = \mathbb{F}_p(s)$ 、 $L = k(\alpha)$ 、 $\alpha^{p^e} = s$ 、 $e \geq 1$ ，则

$$\Omega_{L/k} = L d\alpha.$$

最小多项式 $T^{p^e} - s$ 的不可约性可用 s 在 $\mathbb{F}_p[s]$ 中的 Eisenstein 判据检验。扩张次数为 p^e ，微分维数却一直为一，因此微分维数不是不可分次数的对数。它测量的是独立的一阶方向，未记录每个方向的全部幂次深度。

这些纯不可分例子确实不光滑，可以直接构造提升障碍，而不借助尚未建立的光滑性定理。以 $L = k[u]/(u^p - s)$ 为例，置 $f = T^p - s$ 、 $C = k[T]/(f^2)$ 、 $J = (f)/(f^2)$ 。有 $J^2 = 0$ 、 $C/J = L$ 。若恒等同态 $L \rightarrow C/J$ 有提升， u 的像必为 $T + h$ 、 $h \in J$ 。但

$$(T + h)^p - s = T^p - s + h^p = f \neq 0 \quad \text{在 } C \text{ 中},$$

因为 $p \geq 2$ 使 $h^p = 0$ ，而 $f \notin (f^2)$ 。这与 $u^p = s$ 矛盾，所以映射不形式光滑。

多方向的例子是

$$k = \mathbb{F}_p(s, t), \quad L = k(\alpha, \beta), \quad \alpha^p = s, \quad \beta^p = t.$$

有 $[L : k] = p^2$ 及 $\Omega_{L/k} = L d\alpha \oplus L d\beta$ 。这里可把 L 识别为有理函数域 $\mathbb{F}_p(\alpha, \beta)$ ：不同模 p 的指数类在多项式恒等式中不会相消，所以 $\alpha^i \beta^j$ 、 $0 \leq i, j < p$ ，对 $k = \mathbb{F}_p(\alpha^p, \beta^p)$ 线性无关，并显然生成。对应的两个关系微分都为零，给出所列基。

在这一例子中, 原来的 L 是域, 扩到 L 本身后却有

$$L \otimes_k L \cong L[\varepsilon, \eta]/(\varepsilon^p, \eta^p).$$

把右边变量分别送到第二因子的 α, β 减去第一因子的相应元素, 便得到满射; 两侧 L 维数都是 p^2 , 所以为同构。域扩张的不可分性在此表现为基变换后的一阶方向和幂零结构; 这也延续了例 14.3.4 中“环自身简单, 却不相对光滑”的区别。

本章小结

导子对乘积的一阶变化满足 Leibniz 法则, 微分模把这些变化统一为一个泛性质。多项式环的微分自由, 添加关系后则以关系的偏导数形成展示矩阵。余法正合列与复合微分正合列都只保证右正合, 局部化和基变换公式也不替代其他性质所需的条件。

在有理点处, 微分模的剩余纤维是极大理想模平方, 切空间是它的对偶, 也就是 Jacobian 矩阵的核。一般剩余域还会贡献自身的相对微分, 不可分闭点表明两种余切对象可能不同。对有限域扩张, 微分为零恰好等价于可分; 纯不可分扩张中的非零微分可用指数为一的子扩张明确计算。

微分消失等价于形式非分歧, 即平方零提升的唯一性。它不保证提升存在, 也不保证平坦。有限呈示范围内, 平展还要求平坦; 标准平展例子的提升则由一次精确的 Newton 修正给出。后续光滑性理论将系统建立这些判据之间的关系, 本章的计算已经说明不能省去哪些条件。

习题

习题 14.1. 设 k 为域、 $D: k[x] \rightarrow k[x]$ 为形式求导。求 $\ker D$, 分别讨论特征零与特征 $p > 0$ 。再求 $k[x, y]$ 上同时被两个偏导子零化的多项式。

解. 写 $f = \sum_n a_n x^n$, 则 $Df = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$ 。特征零时核为 k , 特征 p 时只有指数被 p 整除的项可以保留, 故核为 $k[x^p]$ 。两个变量的情形逐项比较系数, 得到特征零时为 k , 特征 p 时为 $k[x^p, y^p]$ 。这里系数可来自不完美域, 不能把 $k[x^p]$ 无条件写成 $k[x]$ 中所有 p 次幂的集合。□

习题 14.2. 在 $P = k[x_1, \dots, x_n]$ 上令 $E = \sum_i x_i \partial / \partial x_i$ 。证明每个 d 次齐次多项式满足 $E(f) = df$ 。说明正特征时 $E(f) = 0$ 为什么不能推出 f 为常数。

解. 对 x^α , 有 $E(x^\alpha) = (\sum_i \alpha_i) x^\alpha$ 。同次齐次项都有 $\sum_i \alpha_i = d$, 线性相加得到公式。在特征 p 时, 任意正次数为 p 倍数的齐次多项式都被零化。例如 $x_1^{p-1} x_2$ 非常数, 甚至不必是 p 次幂, 却满足 $E(f) = 0$ 。□

习题 14.3. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态, C 为交换 A 代数, $J^2 = 0$ 。给定 $u: B \rightarrow C/J$, 并假定已有一个提升 $v: B \rightarrow C$ 。证明全部提升恰为 $v + D$, 其中 $D \in \text{Der}_A(B, J)$, J 的 B 模结构由 u 给出。

解. 任意两个提升的差为取值于 J 的导子, 证明见定理 14.4.5 中的差公式. 反过来, $(v + D)(b)(v + D)(c)$ 的二次改变量 $D(b)D(c)$ 为零, 其余一次项由导子法则合并为 $D(bc)$, 所以 $v + D$ 保持乘法, 也保持加法、单位和 A . 它模 J 后等于 u . 不同导子给出不同提升, 因此选定一个提升后, 全部提升与这个导子模一一对应; 若没有初始提升, 仅有导子模并不能证明存在性. $\square$

习题 14.4. 设 k 为域、 $n \geq 2$ 、 $B = k[t]/(t^n)$. 计算 $\Omega_{B/k}$ 的 k 维数, 并计算余法映射 $(t^n)/(t^{2n}) \rightarrow B dt$ 的核.

解. 微分展示为 $\Omega_{B/k} = B dt/(nt^{n-1}dt)$. 若 $n \neq 0$ 在 k 中, 维数为 $n-1$; 若 $n = 0$, 维数为 n . 余法模以 t^n 的类为一个 B 自由基, 映射等同于乘 nt^{n-1} . 当 $n \neq 0$ 时, 其核由 t 生成; 当 $n = 0$ 时, 整个余法模都是核. 两种情形中都不能给该正合列的左端添加零. $\square$

习题 14.5. 设 k 为域, $B = k[x^{\pm 1}, y^{\pm 1}]$. 证明 $dx/x, dy/y$ 为 $\Omega_{B/k}$ 的自由基, 计算任意整数 a, b 对应的 $d(x^a y^b)$.

解. 多项式微分局部化后, dx, dy 仍为自由基; 分别乘单位 x^{-1}, y^{-1} 得到所述新基. 由 $d(x^{-1}) = -x^{-2}dx$ 及整数幂的归纳,

$$d(x^a y^b) = x^a y^b \left(a \frac{dx}{x} + b \frac{dy}{y} \right).$$

公式中的整数解释为其在 k 中的像, 因此正特征时仍有效. $\square$

习题 14.6. 设 B, C 为交换 A 代数, $D = B \otimes_A C$. 证明

$$\Omega_{D/A} \cong (D \otimes_B \Omega_{B/A}) \oplus (D \otimes_C \Omega_{C/A}).$$

解. 取任意 D 模 M . 一个 A 导子 $\delta: D \rightarrow M$ 限制到 $B \otimes 1, 1 \otimes C$, 给出两个导子 δ_B, δ_C . 它被这两者决定, 因为

$$\delta(b \otimes c) = (1 \otimes c)\delta_B(b) + (b \otimes 1)\delta_C(c).$$

反过来, 此公式保持 A 平衡关系, 且乘法展开验证 Leibniz 法则, 所以每一对导子都唯一延拓. 右侧直和代表这两个导子的自由选择, 因而具有 $\Omega_{D/A}$ 的泛性质, 得到同构. $\square$

习题 14.7. 设 k 为域, $m \geq 2$, 环同态 $k[u] \rightarrow k[t]$ 由 $u \mapsto t^m$ 给定. 计算 $\Omega_{k[t]/k[u]}$, 并判断在何处局部化后微分模为零.

解. 把 $k[t]$ 写成 $k[u][T]/(T^m - u)$, 得到 $\Omega_{k[t]/k[u]} = k[t] dt/(mt^{m-1}dt)$. 若 $m \neq 0$ 在 k 中, 微分模在素理想 $\mathfrak{p}$ 处为零当且仅当 $t \notin \mathfrak{p}$: 此时系数为单位; 若 $t \in \mathfrak{p}$, 系数落入局部极大理想, 余模非零. 若 $m = 0$, 微分模自由秩一, 在每个素理想处均非零. $\square$

习题 14.8. 设 $\text{char } k \neq 2, 3$, $B = k[x, y]/(y^2 - x^3)$. 证明 $\omega = 2x dy - 3y dx$ 是 $\Omega_{B/k}$ 中的非零挠元, 且 $y\omega = x^2\omega = 0$.

解. 微分关系为 $2y dy = 3x^2 dx$, 由 $y^2 = x^3$ 立即算得所列两个乘积为零. 为证 $\omega \neq 0$, 用尖点坐标环的识别 $B = k[t^2, t^3] \subset k[t]$. 若 $\omega = 0$, 展示中的唯一关系生成元使某个 $h \in B$ 满足 $-3y = -3hx^2$, $2x = 2hy$. 后一式在分式域中给出 $h = t^{-1}$, 但 $B \subseteq k[t]$, 不含 t^{-1} , 矛盾. 因此 $\omega \neq 0$, 而 $y \neq 0$ 在整环 B 中, 确为挠元. $\square$

习题 14.9. 设 $\text{char } k = 2$, $B = k[x, y]/(y - x^2)$. 计算每个 k 有理点的切空间, 并解释 $\partial(x^2)/\partial x = 0$ 为什么不使该曲线具有二维切空间.

解. 点为 (a, a^2) , Jacobian 行为 $(0, 1)$, 所以切空间是 $\{(v, 0) : v \in k\}$, 维数一. 方程对 y 的偏导仍为单位, 给出非零约束. 事实上 $B \cong k[x]$, 微分关系只是 $dy = 0$, 余下 dx 自由; 不能只检查某一个偏导数. $\square$

习题 14.10. 设 k 为域, $B = k[x, y, z]/(xyz)$. 求每个 k 有理点的切空间维数, 按恰有一个坐标为零和至少两个坐标为零分类.

解. Jacobian 行为 (yz, xz, xy) . 若恰有一个坐标为零, 另外两个非零, 三项中恰有一项非零, 矩阵秩一, 切空间维数二; 若至少两个坐标为零, 整行全零, 切空间维数三. 满足方程的点至少有一个零坐标, 这两类穷尽所有有理点. 计算不需要对 k 的特征加限制. $\square$

习题 14.11. 设 k 为域, $r \geq 2$, $B = k[x, y]/(x, y)^r$. 求唯一有理点处的切空间维数及 $\dim_k B$. 说明前者能否恢复后者.

解. 唯一极大理想为 $\mathfrak{m} = (x, y)$, 而 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基为 $\bar{x}, \bar{y}$, 所以切空间维数二. B 的基由全次数小于 r 的单项式组成, 故 $\dim_k B = \sum_{d=0}^{r-1} (d+1) = r(r+1)/2$. 不同 r 给出相同切空间维数而不同的代数维数, 说明切空间只保存一阶信息. $\square$

习题 14.12. 设 k 为域, 考虑尖点参数化 $\nu: t \mapsto (t^2, t^3)$. 直接求 $t = a$ 处诱导的切空间映射. 证明它在 $a = 0$ 处为零, 在 $a \neq 0$ 处单射.

解. 把 $a + v\varepsilon$ 代入得到 $(a^2 + 2av\varepsilon, a^3 + 3a^2v\varepsilon)$, 故切映射为 $v \mapsto (2av, 3a^2v)$. 它满足尖点的切方程, 因为 $-3a^4(2av) + 2a^3(3a^2v) = 0$. 在零点两坐标均为零; 若 $a \neq 0$, 整数二和三不可能同时在域中为零, 至少一项系数非零, 故映射单射. 参数化在点集上单射不保证其每一点的切映射单射. $\square$

习题 14.13. 比较 $B = k[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$ 在特征不为二和特征二时的微分模及有理点切空间. 在特征二时求该环的约化商.

解. 总有 $\Omega_{B/k} = (B dx \oplus B dy)/(2x dx + 2y dy)$. 特征不为二时, 在每个有理点 (a, b) 上, a, b 不同时为零, 故切空间维数一. 特征二时, 关系多项式为 $(x+y-1)^2$, 微分关系为零, 所以微分模自由秩二, 所有有理点的切空间维数二. 约化商是 $k[x, y]/(x+y-1) \cong k[x]$, 它在对应点的切空间维数一. 这说明改变特征可能把一个方程变成重方程. $\square$

习题 14.14. 设 $k \subseteq K$, $L = K(\alpha)$, 其中 α 对 K 可分, 最小多项式为 $f(T) = \sum_i a_i T^i$. 给定 k 导子 $D: K \rightarrow L$, 证明它唯一延拓为 $\tilde{D}: L \rightarrow L$, 并写出 $\tilde{D}(\alpha)$.

解. 求导 $f(\alpha) = 0$ 迫使

$$\widetilde{D}(\alpha) = -f'(\alpha)^{-1} \sum_i D(a_i) \alpha^i.$$

右边有意义, 因为可分性使 $f'(\alpha) \neq 0$. 在 $K[T]$ 上, 把系数按 D 求导、把 T 的导数指定为该值, 得到取值于 L 的导子, 它零化 f . 对任意 hf , Leibniz 法则使导数在代入 α 后也为零, 所以它下降到 $K[T]/(f) = L$. 其在系数及生成元上的值均已被迫确定, 故唯一. $\square$

习题 14.15. 令 $k = \mathbb{F}_p(s)$, $L = k(\alpha)$ 、 $E = k(\beta)$, 其中 $\alpha^p = s$ 、 $\beta^p = \alpha$. 计算复合微分正合列的三个非零候选项和两条箭头.

解. 有 $\Omega_{L/k} = L d\alpha$ 、 $\Omega_{E/k} = E d\beta$ 、 $\Omega_{E/L} = E d\beta$. 第一箭头将 $1 \otimes d\alpha$ 送到 $d(\beta^p) = 0$, 故为零; 第二箭头将 $d\beta$ 送到 $d\beta$, 为同构. 因此该列为 $E \xrightarrow{0} E \xrightarrow{1} E \rightarrow 0$. 即使各域扩张次数都有限, 首箭头仍可完全丢失一个微分方向. $\square$

习题 14.16. 令 $k = \mathbb{F}_p(s)$, 在代数闭包中置 $L = \bigcup_{n \geq 0} k(s^{1/p^n})$. 证明 L/k 不是可分扩张, 但 $\Omega_{L/k} = 0$. 这为什么不反驳本章定理?

解. 元素 $s^{1/p}$ 的最小多项式为 $T^p - s$, 不可分. 另一方面, 任一 $b \in L$ 属于某个 $\mathbb{F}_p(s^{1/p^n})$, 其有理函数表达式可在下一层逐项取 p 次根, 故 $b = c^p$ 对某个 $c \in L$ 成立. 任意 k 导子都零化 b , 所以普遍导子的所有值均为零, 微分模为零. 该扩张次数无限, 而定理 14.4.2 明确要求有限扩张. $\square$

习题 14.17. 令 $B = \mathbb{Z}[t]/(t^2 - t - 1)$. 证明 $B[1/5]$ 在 $\mathbb{Z}[1/5]$ 上平展, 并证明特征五纤维不是非分歧代数.

解. 首一除法给出基 $1, t$, 故自由平坦. 微分关系为 $(2t-1)dt = 0$, 而在 B 中 $(2t-1)^2 = 4t^2 - 4t + 1 = 5$. 倒置五后 $2t-1$ 为单位, 所以微分模为零, 有限呈示条件也成立. 模五后, $t^2 - t - 1 = (t-3)^2$, 纤维为 $\mathbb{F}_5[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 其微分模为 $(\mathbb{F}_5[\varepsilon]/(\varepsilon)) d\varepsilon \neq 0$, 故不非分歧. $\square$

习题 14.18. 在 $C = \mathbb{Q}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中, 求满足 $x^2 = 1 + \varepsilon$ 且 $x \equiv 1 \pmod{\varepsilon}$ 的全部元素. 若把 $\mathbb{Q}$ 改成特征二的域, 会发生什么?

解. 写 $x = 1 + a\varepsilon$, 则 $x^2 = 1 + 2a\varepsilon$, 唯一解为 $1 + \varepsilon/2$. 这正是对误差 $-\varepsilon$ 用导数二作一次修正. 特征二时, 所有这样的平方都等于一, 因此没有解; 不是有多个解, 而是给定提升根本不存在. $\square$

习题 14.19. 设 k 为域, $A = k[t]$, $B = A[x]/(t)$. 证明 $\Omega_{B/A}$ 自由秩一, 但 B 不在 A 上平坦, 且 $A \rightarrow B$ 不形式光滑.

解. 关系 t 来自基环, 其相对微分为零, 所以 $\Omega_{B/A} = B dx$. 但乘 t 在 A 上单射, 在非零模 B 上为零, 故不平坦. 取 $C = k[t, x]/(t^2)$ 、 $J = (t)$, 则 $C/J = B$. 恒等同态 $B \rightarrow C/J$ 没有 A 代数提升, 因为那将要求 C 中非零的 t 为零. 可见即使微分模非零且自由, 也不能单凭这一条件断言光滑. $\square$

习题 14.20. 设 A 为交换环, $B = A[x, y]/(xy - 1)$ 。直接证明 $A \rightarrow B$ 形式光滑; 并在一个明确的平方零扩张中构造同一映射的两个不同提升, 说明它一般不形式非分歧。

解. 给定 $B \rightarrow C/J$, 其中 $J^2 = 0$, x 的像为单位。任取它的提升 $u \in C$, 仍为单位, 令 $x \mapsto u$, $y \mapsto u^{-1}$, 即得提升。为展示不唯一, 取 $A = k$ 为域, $C = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 基点为 $x, y \mapsto 1$ 。一组提升为 $(1, 1)$, 另一组为 $(1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon)$, 乘积均为一, 且两组不同。 $\square$

习题 14.21. 设 $A \rightarrow B$ 形式光滑、形式非分歧或形式平展。对任意交换 A 代数 A' , 证明 $A' \rightarrow A' \otimes_A B$ 分别具有同一形式性质。

解. 给定 A' 代数 C 、平方零理想 J , 一个 A' 代数映射 $A' \otimes_A B \rightarrow C/J$ 由其在 B 上的 A 代数限制决定。原来的形式性质给出该限制提升到 C 的存在性、至多唯一性或恰好唯一性。任一这样的提升与固定的结构映射 $A' \rightarrow C$ 在 A 上相同; 张量积的泛性质因而唯一给出 $A' \otimes_A B \rightarrow C$ 。这两种描述互逆, 所要求的性质随之保持。 $\square$

习题 14.22. 设交换环同态 $A \rightarrow B \rightarrow D$ 中的两个映射均形式光滑, 或均形式非分歧, 或均形式平展。证明复合映射分别具有同一性质。

解. 给定 A 代数平方零提升问题 $D \rightarrow C/J$, 先限制到 B 。形式光滑时先提升 $B \rightarrow C$, 把 C 视为这个结构下的 B 代数, 再利用 $B \rightarrow D$ 的形式光滑性提升整个 D 映射。形式非分歧时, 两个 D 提升限制到 B 必相同, 因此是同一 B 代数结构下的两个提升, 再由第二映射的唯一性相等。两种性质同时成立便得到形式平展的结论。 $\square$

第三编

同调方法与局部环的结构

本编导读

本编导读待撰写。

第十五章 正则序列与 Koszul 复形

15.1 正则序列

15.1.1 模上非零因子与逐次商

待撰写。

15.1.2 正则序列的次序

待撰写。

15.1.3 局部条件与理想包含条件

待撰写。

15.1.4 局部有限模正则序列的非退化约定

待撰写。

15.2 Koszul 复形

15.2.1 外代数上的 Koszul 微分

待撰写。

15.2.2 一元情形与张量积构造

待撰写。

15.2.3 符号约定与微分平方为零

待撰写。

15.3 Koszul 正合性

15.3.1 正则序列给出的自由消解

待撰写。

15.3.2 Noether 局部有限模的反向判据

待撰写。

15.3.3 Koszul 同调与非正则性

待撰写。

15.4 几何和计算例子

15.4.1 超曲面与完全交模型

待撰写。

15.4.2 小长度正则序列的显式计算

待撰写。

15.4.3 外代数与 Tor 的联系

待撰写。

第十六章 深度与局部上同调的预备

16.1 深度

16.1.1 极大正则序列的长度

待撰写。

16.1.2 深度的存在性与有限性

待撰写。

16.1.3 深度与维数的不等式

待撰写。

16.2 Ext 刻画

16.2.1 剩余域的 Ext 与深度检测

待撰写。

16.2.2 Ext 刻画与正则序列定义的等价性

待撰写。

16.2.3 局部化与有限生成假设

待撰写。

16.3 深度引理

16.3.1 短正合列中的深度不等式

待撰写。

16.3.2 合冲模的深度

待撰写。

16.3.3 沿消解逐步比较深度

待撰写。

16.4 Serre 条件

16.4.1 模的 S_k 条件

待撰写。

16.4.2 局部化后的深度要求

待撰写。

16.4.3 S_1 、 S_2 与嵌入分支

待撰写。

第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式

17.1 局部极小自由消解

17.1.1 极小生成元与极小微分

待撰写。

17.1.2 剩余域张量后的简化

待撰写。

17.1.3 Betti 数与消解终止性

待撰写。

17.2 投射维数

17.2.1 有限模的投射维数

待撰写。

17.2.2 Ext 、 Tor 与投射维数判据

待撰写。

17.2.3 维数平移

待撰写。

17.2.4 局部有限模的同调消失判据

待撰写。

17.3 Auslander–Buchsbaum 公式

17.3.1 Noether 局部环与非零有限模的假设

待撰写。

17.3.2 有限投射维数条件

待撰写。

17.3.3 Auslander–Buchsbaum 公式的证明

待撰写。

17.4 应用与反例

17.4.1 商环、理想与合冲模的计算

待撰写。

17.4.2 有限投射维数假设的必要性

待撰写。

17.4.3 正则局部环的同调刻画初步

待撰写。

第十八章 正则局部环

18.1 正则性的等价观点

18.1.1 维数与极大理想的最小生成元数

待撰写。

18.1.2 伴随分次环的结构

待撰写。

18.1.3 参数系与正则序列

待撰写。

18.2 同调刻画

18.2.1 剩余域的有限投射维数

待撰写。

18.2.2 Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据

待撰写。

18.2.3 正则局部环的整体维数

待撰写。

18.3 局部化与完备化

18.3.1 正则性的局部化

待撰写。

18.3.2 正则性与完备化

待撰写。

18.3.3 正则局部环的整性

待撰写。

18.4 正则局部环的阶乘性

18.4.1 唯一分解与高度一素理想的主性

待撰写。

18.4.2 行列式线与主开集上的可逆模

待撰写。

18.4.3 正则参数、维数归纳与秩一模

待撰写。

18.4.4 局部主性与主开集上的自由性

待撰写。

18.4.5 正则局部环阶乘性的证明及其与除子的联系

待撰写。

18.5 几何解释

18.5.1 正则点与切空间维数

待撰写。

18.5.2 正则性与基域上的光滑性

待撰写。

18.5.3 非完美域上的区分例子

待撰写。

第十九章 Cohen–Macaulay 环与完全交

19.1 Cohen–Macaulay 模

19.1.1 深度等于维数

待撰写。

19.1.2 Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义

待撰写。

19.1.3 参数系与正则序列

待撰写。

19.2 结构性质

19.2.1 商去正则元素

待撰写。

19.2.2 Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化

待撰写。

19.2.3 正则局部环的 Cohen–Macaulay 性

待撰写。

19.3 完全交

19.3.1 正则环中正则序列定义的商

待撰写。

19.3.2 完全交的 Koszul 消解

待撰写。

19.3.3 完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系

待撰写。

19.4 典型实例

19.4.1 超曲面与零维局部环

待撰写。

19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分支

待撰写。

19.4.3 参数、重数与几何交

待撰写。

第二十章 正规性与 Serre 判别法

20.1 R_k 与 S_k 条件

20.1.1 余维上的正则性

待撰写。

20.1.2 深度条件的局部化表述

待撰写。

20.1.3 余维一与高余维的条件比较

待撰写。

20.2 Serre 正规性判据

20.2.1 Noether 环上的 R_1 与 S_2 条件

待撰写。

20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据

待撰写。

20.2.3 非零因子与深度方法

待撰写。

20.3 余维一观点

20.3.1 正规整环与高度一局部化

待撰写。

20.3.2 Weil 除子与类群

待撰写。

20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸

待撰写。

20.4 奇点比较

20.4.1 正规但非正则的例子

待撰写。

20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子

待撰写。

20.4.3 正规化与奇点消解

待撰写。

20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性

20.5.1 双对偶、反射性与高度一局部数据

待撰写。

20.5.2 分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群

待撰写。

20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型

待撰写。

20.5.4 局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解

待撰写。

第二十一章 分次自由消解与合冲模

21.1 合冲模

21.1.1 关系之间的关系

待撰写。

21.1.2 分次极小自由消解

待撰写。

21.1.3 分次 Betti 数

待撰写。

21.2 Hilbert 合冲定理

21.2.1 多项式环的有限整体维数

待撰写。

21.2.2 Hilbert 合冲定理及其证明

待撰写。

21.2.3 自由消解长度与变量数

待撰写。

21.3 消解与 Hilbert 级数

21.3.1 消解的交错和公式

待撰写。

21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数

待撰写。

21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围

待撰写。

21.4 计算方法

21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法

待撰写。

21.4.2 全局模项序与 Schreyer 构造

待撰写。

21.4.3 具体理想的消解计算与验证

待撰写。

21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释

21.5.1 单位微分项、可缩直和项与极小化

待撰写。

21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数

待撰写。

21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书

待撰写。

21.5.4 Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表

待撰写。

第四编

交换代数进阶与几何初步

本编导读

本编导读待撰写。

第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环

22.1 局部上同调

22.1.1 支集挠子函子

待撰写。

22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较

待撰写。

22.1.3 局部上同调的消失与深度

待撰写。

22.2 典范模

22.2.1 典范模的定义与存在条件

待撰写。

22.2.2 完备局部环上的局部对偶

待撰写。

22.2.3 典范模的存在性问题

待撰写。

22.2.4 内射包络、Matlis 对偶与有限模和 Artin 模

待撰写。

22.2.5 Cohen–Macaulay 商环的典范模

待撰写。

22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶

待撰写。

22.2.7 正则局部覆盖与 Cohen 结构定理

待撰写。

22.3 Gorenstein 环

22.3.1 Noether 局部环的有限自内射维数

待撰写。

22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性

待撰写。

22.3.3 完全交的 Gorenstein 性

待撰写。

22.4 对偶与例子

22.4.1 Artin Gorenstein 环

待撰写。

22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子

待撰写。

22.4.3 对偶复形简介

待撰写。

第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展

23.1 Hensel 引理

23.1.1 单根提升与因式分解提升

待撰写。

23.1.2 完备局部环的 Hensel 性

待撰写。

23.1.3 Hensel 化与完备化

待撰写。

23.2 形式性质

23.2.1 平方零扩张上的提升问题

待撰写。

23.2.2 形式光滑、形式非分歧与形式平展

待撰写。

23.2.3 有限呈示条件的作用

待撰写。

23.3 光滑与平展

23.3.1 光滑映射的标准局部模型

待撰写。

23.3.2 平展映射的平坦性与非分歧性

待撰写。

23.3.3 局部同胚直觉与平展的代数条件

待撰写。

23.4 局部性质的比较与反例

23.4.1 尖点正规化的局部计算

待撰写。

23.4.2 光滑性、正则性与可分性

待撰写。

23.4.3 代数几何中的不同拓扑

待撰写。

23.4.4 尖点正规化的微分模与非分歧性

待撰写。

23.4.5 尖点纤维的长度与非平坦性

待撰写。

23.4.6 尖点外的同构与局部性质的比较

待撰写。

第二十四章^{*} 概形与射影方法初步

24.1 结构层

24.1.1 基本开集上的局部化

待撰写。

24.1.2 仿射概形的结构层

待撰写。

24.1.3 局部环空间与态射

待撰写。

24.2 模与层

24.2.1 模对应的拟凝聚层

待撰写。

24.2.2 局部自由层与向量丛

待撰写。

24.2.3 局部化相容性与黏合

待撰写。

24.3 Proj 构造

24.3.1 齐次素理想

待撰写。

24.3.2 标准开集与射影空间

待撰写。

24.3.3 分次模与射影几何

待撰写。

24.4 概形理论专题简介

24.4.1 分离性、有限型与固有性

待撰写。

24.4.2 层上同调简介

待撰写。

24.4.3 概形理论的进一步学习

待撰写。

附录

附录 A 代数数论初步：理想、整数环与分歧

A.1 整闭包的算术意义

待撰写。

A.2 数域整数环、判别式与理想分解

待撰写。

A.3 素数处的局部化与完备化

待撰写。

A.4 类域论与全局解析方法导读

待撰写。

附录 B 计算交换代数专题

B.1 系数、表示与复杂度

B.1.1 多项式、分式、幂级数截断与有限展示模的表示
待撰写。

B.1.2 Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数
待撰写。

B.1.3 有效系数环的可判定性与运算条件
待撰写。

B.1.4 算术复杂度、次数增长与系数膨胀
待撰写。

B.2 高效 Gröbner 算法

B.2.1 F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数
待撰写。

B.2.2 FGLM 零维换序与 Gröbner walk
待撰写。

B.2.3 模方法、坏素数、重构与原域验证
待撰写。

B.2.4 算法实现与结果验证
待撰写。

B.3 分解、参数与组合

B.3.1 准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题
待撰写。

B.3.2 综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层

待撰写。

B.3.3 一般参数、特殊化与退化分支

待撰写。

B.3.4 单项式理想、组合结构与分解的非唯一性

待撰写。

B.4 模与自由消解的计算

B.4.1 Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表

待撰写。

B.4.2 局部计算中的项序与结果验证

待撰写。

B.4.3 计算机代数系统中的环与局部化

待撰写。

B.4.4 多项式环与局部环中理想成员判定的比较

待撰写。

附录 C 奇点与交换代数专题

C.1 卓越性、形式纤维与普适链性质

待撰写。

C.2 Frobenius 方法与正特征奇点

待撰写。

C.3 余切复形、切复形与形变问题

待撰写。

C.4 交理论、乘数理想与高阶局部对偶

待撰写。

附录 D 局部环、幂级数与结构定理

D.1 局部对象的比较

D.1.1 代数、Hensel、完备与解析局部环

待撰写。

D.1.2 Hensel 化与完备化的泛性质

待撰写。

D.1.3 代数、形式与收敛幂级数

待撰写。

D.1.4 局部对象间的环同态与比较关系

待撰写。

D.2 Cohen 结构定理

D.2.1 完备局部环、系数环与系数域

待撰写。

D.2.2 等特征情形的形式幂级数商表示

待撰写。

D.2.3 混合特征情形与 Cohen 环

待撰写。

D.2.4 完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型

待撰写。

D.3 Weierstrass 方法与局部计算

D.3.1 形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理

待撰写。

D.3.2 Hironaka 型标准基、初始指数与局部有限映射

待撰写。

D.3.3 曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过

待撰写。

D.3.4 形式解、收敛解与代数解

待撰写。

D.4 形式纤维、卓越性与逼近

D.4.1 完备化的形式纤维与卓越性

待撰写。

D.4.2 卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近

待撰写。

D.4.3 有限阶逼近、收敛性与代数化

待撰写。

D.4.4 奇点与消解理论导读

待撰写。

附录 E 微分代数与微分消去

E.1 微分结构与基本对象

E.1.1 导子、常数、微分理想与分式域延拓

待撰写。

E.1.2 微分多项式、微分阶与微分域扩张

待撰写。

E.1.3 微分代数、Kähler 微分与 DG 代数

待撰写。

E.2 有限性与微分代数几何的基本概念

E.2.1 Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件

待撰写。

E.2.2 微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数

待撰写。

E.2.3 低阶微分方程、常数域与解析解

待撰写。

E.3 特征集与有效消去的代表方法

E.3.1 导数排序、导变量、初式、分离与伪约化

待撰写。

E.3.2 Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解

待撰写。

E.3.3 消去算例与分母、初式、分离子的退化分支

待撰写。

E.4 线性微分理论与相关专题

E.4.1 线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 理论

待撰写。

E.4.2 微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数

待撰写。

E.4.3 微分代数几何、维数多项式与模型论导读

待撰写。

附录 F 局部标准基、幂级数与切锥计算

F.1 局部化、局部序与标准基

F.1.1 全局序、局部序、混合序与相应局部化

待撰写。

F.1.2 首项理想与标准基的定义

待撰写。

F.1.3 标准基、标准单项式与局部最小生成元

待撰写。

F.2 Mora 弱正规形的动机

F.2.1 局部约化中的无穷过程

待撰写。

F.2.2 单位乘子、弱正规形与理想成员判定

待撰写。

F.2.3 Mora 方法的算例与进一步讨论

待撰写。

F.3 形式幂级数与切锥

F.3.1 Hironaka 型标准基、形式除法与收敛性

待撰写。

F.3.2 伴随分次环、初始齐次理想与切锥

待撰写。

F.3.3 尖点、加厚点与重数计算

待撰写。

F.4 局部计算的应用

F.4.1 有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算

待撰写。

F.4.2 模的标准基、合冲模与局部自由消解

待撰写。

F.4.3 幂级数结构与局部算法专题导读

待撰写。

附录 G 实代数与半代数几何

G.1 半代数集合与量词消去

G.1.1 半代数集合与半代数映射

待撰写。

G.1.2 Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去

待撰写。

G.1.3 低维投影算例与柱状代数分解

待撰写。

G.2 实根理想与实零点定理

G.2.1 实理想、实根理想与实零点集

待撰写。

G.2.2 平方和方程的实消失理想

待撰写。

G.2.3 实零点定理与实谱的基本对象

待撰写。

G.3 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题

G.3.1 非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和

待撰写。

G.3.2 Motzkin 多项式与 Artin 定理

待撰写。

G.3.3 平方和表示的系数域、分母与定义域

待撰写。

G.4 正性证书与 Positivstellensatz

G.4.1 预序、二次模与多项式不等式证书

待撰写。

G.4.2 Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz

待撰写。

G.4.3 Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较

待撰写。

G.5 计算、优化及其与其他分支的联系

G.5.1 Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解

待撰写。

G.5.2 Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书

待撰写。

G.5.3 半代数拓扑、Nash 几何、o-minimal 几何与矩问题

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

- [1] R. Hartshorne. Algebraic Geometry. Graduate Texts in Mathematics 52. Springer, 1977. doi: [10.1007/978-1-4757-3849-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3849-0).
- [2] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8. Corrected paperback edition. Cambridge University Press, 1989. isbn: 9780521367646.
- [3] B. Sturmfels. Solving Systems of Polynomial Equations. CBMS Regional Conference Series in Mathematics 97. American Mathematical Society, 2002. doi: [10.1090/cbms/097](https://doi.org/10.1090/cbms/097).

中文索引

Artin 环	34	根理想	7
Artin 模	34	Going-down 定理	67
Artin-Rees 引理	198	Going-up 定理	66
伴随分次环	167	Gröbner 基	113
标准单项式	113	光滑	219
标准分次	162	关联素理想	48
闭点	11	孤立关联素理想	54
Buchberger 乘积判据	117	行列式技巧	36
Buchberger 判据	116	合成列	38
不可约理想	53	Hilbert 函数	163
不可约分支	11	Hilbert 级数	163
不可约空间	10	Hilbert-Samuel 定理	168
参数理想	141	Hilbert-Samuel 函数	168
参数系	141	Hilbert-Serre 定理	164
乘法矩阵	125	I 进拓扑	195
饱和	20	Incomparability 定理	66
态射	94	Jacobian 矩阵	216
单项式序	112	Jacobson 根	36
导子	211	简单模	38
导子理想	84	基本开集	9
Dedekind 整环	152	极大理想	5
Dickson 引理	114	几何点	97
泛自由性	182	极小准素分解	54
仿射代数簇	92	局部环	26
仿射代数集	92	局部同态	26
非分歧	219	Kähler 微分模	212
分次逆字典序	112	可逆理想	153
分次字典序	112	Krull 高度定理	138
分离	195	Krull 交定理	198
分式理想	153	Krull 维数	135
Fitting 理想	180	Krull 主理想定理	138
符号幂	53	零点理想	77
赋值	147	零化子	22
秩	149	离散赋值	27
赋值环	148	离散赋值环	27, 148
高度	135	根	7

理想类群	155	特殊化	11
Lying-over 定理	66	统一化元	151
幂零根	7	凸子群	149
长度	38	完备化	199
局部化	17	稳定滤过	196
模滤过	196	下降数据	187
零因子	50	纤维	96
维数	136	纤维代数	21
Nagata 环	80	消去定理	119
Nakayama 引理	37	消去理想	119
逆极限	199	形式非分歧	219
拟紧空间	10	形式光滑	219
Noether 环	34	形式邻域	204
Noether 模	34	形式幂级数环	200
Noether 拓扑空间	11	形式平展	219
Noether 正规化定理	69	雅可比矩阵	216
Picard 群	155	一般点	11
平坦模	175	一般化	11
平展	219	湮灭子	22
普遍导子	212	有理单变量表示	127
强零点定理	77	有限映射	70
嵌入关联素理想	54	有限长度模	38
嵌入维数	142	有限呈现模	34
齐次元素	161	有限扩张	63
齐次子模	162	有限生成模	33
切锥	170	有限展示模	34
全序交换群	147	约化 Gröbner 基	117
Rabinowitsch 技巧	77	约化环	7
Rees 环	197	余法模	213
弱零点定理	76	余切空间	100
S 多项式	115	余循环条件	187
剩余域	6	Zariski 切空间	215
首单项式	112	Zariski 拓扑	9
首项	112	Zariski 引理	74
首项理想	113	正分次	161
首项系数	112	整扩张	63
双有理扩张	80	整	63
数域	154	整闭包	65
素理想	5	整闭整环	65
素理想回避引理	7	正规仿射簇	99
素理想滤过	49	正规式	114
素理想谱	9	正规整环	65
		正规化	78

整数环	154	主开集	9
正则参数系	142	准素理想	51
正则函数	94	准素子模	55
正则局部环	142	卓越环	80
支集	22	字典序	112
忠实平坦	184	总分式环	78
重数	166	坐标环	78

外文索引

affine algebraic set	92	fibre algebra	21
affine variety	92	finite extension	63
annihilator	22	finite morphism	70
Artin–Rees lemma	198	finitely generated module	33
Artinian module	34	finitely presented module	34
Artinian ring	34	Fitting ideal	180
associated graded ring	167	flat module	175
associated prime	48	formal neighbourhood	204
		formal power series ring	200
basic open subset	9	formally smooth	219
birational extension	80	formally unramified	219
Buchberger criterion	116	formally étale	219
Buchberger product criterion	117	fractional ideal	153
		generalization	11
closed point	11	generic freeness	182
cocycle condition	187	generic point	11
completion	199	geometric point	97
composition series	38	going-down theorem	67
conductor ideal	84	going-up theorem	66
conormal module	213	graded lexicographic order	112
convex subgroup	149	graded reverse lexicographic order	112
coordinate ring	78	graded submodule	162
cotangent space	100	Gröbner basis	113
		height	135
Dedekind domain	152	Hilbert function	163
derivation	211	Hilbert series	163
descent datum	187	Hilbert–Samuel theorem	168
determinant trick	36	Hilbert–Serre theorem	164
Dickson’s lemma	114	Hilbert–Samuel function	168
dimension of a module	136	homogeneous element	161
discrete valuation	27		
discrete valuation ring	27	I-adic topology	195
		ideal class group	155
elimination ideal	119	incomparability theorem	66
elimination theorem	119	initial ideal	113
embedded associated prime	54	integral	63
embedding dimension	142	integral closure	65
excellent ring	80	integral extension	63
		integrally closed domain	65
faithfully flat	184		
fiber	96		

inverse limit	199	parameter ideal	141
invertible ideal	153	Picard group	155
irreducible component	11	positive grading	161
irreducible ideal	53	primary ideal	51
irreducible space	10	primary submodule	55
isolated associated prime	54	prime avoidance lemma	7
		prime filtration	49
Jacobian matrix	216	prime ideal	5
Jacobson radical	36	prime spectrum	9
Krull dimension	135	quasi-compact space	10
Krull intersection theorem	198		
Krull's height theorem	138	Rabinowitsch trick	77
Krull's principal ideal theorem	138	radical ideal	7
		radical of an ideal	7
leading coefficient	112	rank of a valuation	149
leading monomial	112	rational univariate representation	127
leading term	112	reduced Gröbner basis	117
length of a module	38	reduced ring	7
lexicographic order	112	Rees algebra	197
local homomorphism	26	regular function	94
local ring	26	regular local ring	142
localization of a module	17	regular system of parameters	142
lying-over theorem	66	residue field	6
		ring of integers	154
maximal ideal	5		
minimal primary decomposition	54	S-polynomial	115
module filtration	196	saturation with respect to a multiplicative	
module of finite length	38	set	20
module of Kähler differentials	212	separated	195
monomial order	112	simple module	38
morphism of algebraic sets	94	smooth	219
multiplication matrix	125	specialization	11
multiplicity	166	stable filtration	196
		standard grading	162
Nagata ring	80	standard monomial	113
Nakayama's lemma	37	strong Nullstellensatz	77
nilradical	7	support	22
Noether normalization theorem	69	symbolic power	53
Noetherian module	34	system of parameters	141
Noetherian ring	34		
Noetherian topological space	11	tangent cone	170
normal affine variety	99	total ring of fractions	78
normal domain	65	totally ordered abelian group	147
normal form	114		
normalization	78	uniformizer	151
number field	154	universal derivation	212
		unramified	219

valuation	147	Zariski tangent space	215
valuation ring	148	Zariski topology	9
vanishing ideal	77	Zariski's lemma	74
		zero divisor on a module	50
weak Nullstellensatz	76	étale	219

符号索引

$\kappa(\mathfrak{m}) = R/\mathfrak{m}$: 极大理想处的剩余域	6	$\mathcal{O}_{X,a}$: 代数集在点 a 处的正则函数芽环	95
$\sqrt{I}$: 理想的根	7	$\text{LM}(f), \text{LC}(f), \text{LT}(f)$: 首单项式、首项系数	
$\text{Nil}(R)$: 环的幂零根	7	与首项	112
R_{red} : 环的约化商	7	$\text{in}_{\prec}(I)$: 理想关于指定单项式序的首项理想	113
$\text{Spec } R$: 交换环的素理想谱	9	$\text{NF}_G(f)$: 关于 Gröbner 基的正规式	114
$V(I)$: 包含理想 I 的素理想组成的闭集	9	$\dim R$: 环的 Krull 维数	136
$D(f)$: 素谱中的基本开集	9	$\text{ht } \mathfrak{p}, \text{ht } I$: 素理想与真理想的高度	136
$S^{-1}M, M_{\mathfrak{p}}, M_f$: 模的局部化	18	$\dim_R M$: 模的支集维数	136
$I : S^{\infty}$: 理想关于乘法集的饱和	20	$\text{edim } R$: 局部环的嵌入维数	142
$\kappa(\mathfrak{p})$: 素理想处的剩余域	21	$v_{\mathfrak{p}}(I)$: 理想在素理想处的阶数	152
$\text{Supp}_R M$: 模的支集	22	I^{-1} : 分式理想的逆理想	153
$\text{Ann}_R M$: 模的零化子	22	$\mathcal{O}_K$: 数域的整数环	154
$J(R)$: 交换环的 Jacobson 根	36	$\text{Cl}(R)$: Dedekind 整环的理想类群	155
$\mu_R(M)$: 局部环上有限模的最少生成元个数	37	$\text{Pic}(R)$: 秩一有限投射模的 Picard 群	155
$\ell_R(M)$: 模的长度	38	$M(a)$: 分次模的次数平移	163
$\text{Ass}_R(M)$: 模的关联素理想集合	48	$h_M(n), H_M(t)$: 分次 Hilbert 函数与级数	163
$\mathfrak{p}^{(n)}$: 素理想的符号幂	53	$\text{gr}_I(R), \text{gr}_I(M)$: 理想进伴随分次环与模	167
$Z_k(I)$: 理想 I 在 k^n 中的公共零点集	76	$h_{I,M}(n), \chi_{I,M}(n)$: 单层长度与累计 Hilbert–Samuel 函数	168
$I(X)$: 点集 X 上恒为零的多项式组成的理想	77	$\text{Fitt}_i(M)$: 模的第 i 个 Fitting 理想	180
$k[X]$: 仿射代数集 X 的坐标环	78	$\mathcal{R}_I(R)$: 理想的 Rees 环	197
$Q(A)$: 约化环的总分式环	78	$\mathcal{R}_F(M)$: 滤过的 Rees 模	197
$\tilde{A}$: 环 A 的正规化	78	$\varprojlim_n M_n$: 模逆系统的逆极限	199
$\mathfrak{c}_{B/A}$: 扩张 $A \subseteq B$ 的导子理想	84	$\widehat{R}, \widehat{M}$: 指定理想进拓扑下的完备化	199
$D_X(f)$: 代数集上的主开集	93	$\text{Der}_A(B, M)$: 从代数到模的相对导子	211
$\text{MaxSpec } A$: 环的极大理想集合, 赋予素谱的子空间拓扑	93	$\Omega_{B/A}, d_{B/A}$: Kähler 微分模与普遍导子	212
		$T_a(B)$: 有理点处的 Zariski 切空间	215