

代数学

第五卷

表示论：有限群、箭图与 Lie 代数

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

把一个正方形转过四分之一周，四个顶点换了位置，平面上的每个向量也跟着转动。前者给出顶点集的置换，后者给出一个线性变换；我们观察的是同一个群，却得到两种不同的描述。若只关心某个顶点去了哪里，置换已经足够。若想知道有没有保持不变的直线，或者几个作用能否拆成更小的部分，矩阵和向量空间更便于动手。这就是表示论的朴素想法：让一个代数对象作用在线性空间上，再由这些作用认识它。

这里的“线性”并不是把原来的问题简单改写成矩阵。两个不同的表示可能属于同一个群，一个表示也可能看不见群中的某些元素；换基后的矩阵虽然不同，描述的表示却可以相同。因此要研究的不只是矩阵本身，还有保持作用的线性映射、不变子空间和不可约分解。表示足够小的时候，人们可以列出矩阵逐项计算；表示多起来以后，便需要能够把许多计算合并的工具。

这门学问的一段来历很能说明它为何重视计算。1896年，戴德金¹在给弗罗贝尼乌斯²的信中提出群行列式及其分解问题；Frobenius沿着这个问题发展出广义群特征标。当时的出发点并不是今天课本里“先给矩阵，再取迹”的讲法 [4, Section 4.11]。现代教材改从表示及其迹讲起，有了更清楚的结构，也没有丢掉那个最初的疑问：群的乘法如何在一个可以分解、可以计算的表达式里显出来？

第一编从有限群表示和群代数入手。先看正则表示、置换表示等熟悉的例子，再证明适当特征条件下的完全可约性。随后用特征标的正交关系计算不可约表示，用诱导和限制在群与子群之间传递信息，最后讨论双陪集、Clifford 理论³和诱导定理。特征标表可以回答一些关于表示的问题，却不能代替群的全部结构；本编会区分表中能够读出的信息与仍需另证的事实。

第二编先到对称群。分拆、Young 图⁴与 Specht 模⁵，使“寻找不可约表示”变成一个兼有代数与组合意味的问题：一幅方格图既记录维数，也约束限制、诱导和张量运算。模特征的表示提醒我们，复表示里的完全可约性不能任意搬到别的域上。之后转向箭图：几个点、几支箭头，看起来比群简单，表示却已经可以有丰富的分解情形。路径代数把箭头上的线性映射组织成模，维数向量和反射方法进一步揭示分类与图形之间的联系。

¹戴德金 (Richard Dedekind, 1831-1916)，德国数学家，建立代数数论的理想理论，并研究无穷集合与实数基础。

²弗罗贝尼乌斯 (Ferdinand Georg Frobenius, 1849-1917)，德国数学家，奠定有限群的特征标理论，并研究矩阵与代数结构。

³克利福德 (Alfred Hobbitzelle Clifford, 1908-1992)，美国数学家，研究有限群表示限制到正规子群的结构，亦在半群论中有重要工作。

⁴杨 (Alfred Young, 1873-1940)，英国数学家，以表和对称化方法研究对称群的表示。

⁵施佩希特 (Wilhelm Specht, 1907-1985)，德国数学家，研究群论和表示论，建立以其名字命名的对称群模。

第三编讨论 Lie 代数。索菲斯·李⁶研究连续变换群和微分方程时，逐渐发展出研究无穷小变换的办法；这段历史也提醒我们，Lie 代数虽然能够用矩阵括号举例，其问题最初并非为矩阵分类而设 [4, Section 2.10]。本编先建立定义、可解性、半单性和 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示，再以泛包络代数和 PBW 定理连接 Lie 代数与结合代数。Cartan 子代数⁷、根系、Weyl 群⁸及 Dynkin 图⁹给出半单情形的组织方法；最高权理论和 Weyl 特征标公式则回答不可约表示怎样命名、维数与权重怎样计算。

第四编进一步讨论范畴 $\mathcal{O}$ 、Lie 代数上同调、Hopf 代数¹⁰、代数群和不变量理论。从上同调解释扩张，到用坐标环记录群运算，再到由不变多项式构造商，前几卷的模、正合性与交换代数在这里有了新的用途。将这些专题置于卷末，是为了使已有基础的读者能够继续深究，而不让初读有限群表示或最高权理论的人预先背负全部工具。

五篇附录各有侧重。组合代数与反射群延续 Young 表、计数和对称的讨论；量子群、簇代数与范畴化用小秩计算展示新的代数结构。Lie 群、算术表示与几何表示论的简介说明，加入拓扑或几何条件以后，表示问题会怎样改变。最后两篇附录从微分算子和微分模出发，把线性方程的解空间与代数群联系起来。具体模型尽量展开计算，需要额外理论的一般结论则注明所用条件和出处。

不同分支各有自己的起点。本卷不要求读者依目录学完所有专题，再开始自己关心的问题。下表按问题给出几段可以各自完成的阅读范围；第十章的 Gabriel 定理¹¹是箭图分类的核心。

所要学习的问题	阅读范围	完成这一段后能够做什么
有限群的表示与应用	第 1–4 章；第 5.1、5.5 节	计算特征标，使用诱导与限制，并证明 Burnside 可解性定理。
Brauer 整诱导的证明	第 1–4 章后读第 5.1–5.4 节	从表示环的整性与有理诱导走到 Brauer 整诱导。
对称群的表示与张量	第 6–7 章	构造 Specht 模，计算分支与张量分解，并建立 Schur–Weyl 对偶。
箭图的有限型分类	第 9.1–9.4 节与第 10 章	从路径代数模走到反射函子和 Gabriel 定理；第 9.5 节的带关系代数可后读。
复半单 Lie 代数的有限维表示	第 11–16 章、第 17.1–17.3 节、第 18–19 章	对给定的复半单 Lie 代数构造并分类有限维简单模，计算特征标；第 17.4 节另处理 Lie 代数本身的分类。
有限群的不变量	第 1–2 章及多项式基础后读第 22.1–22.4 节	证明任意特征下的有限生成；特征零时再用次数界、Molien 公式计算生成元、关系与分次维数。

⁶索菲斯·李 (Marius Sophus Lie, 1842-1899)，挪威数学家，系统研究连续变换群及其与微分方程的联系。

⁷埃利·嘉当 (Élie Cartan, 1869-1951)，法国数学家，研究 Lie 群和微分几何，并完成复半单 Lie 代数的分类。

⁸赫尔曼·外尔 (Hermann Weyl, 1885-1955)，德国数学家，研究半单群表示、调和分析及数学物理。

⁹尤金·登金 (Евгений Борисович Дынкин, 1924-2014)，俄裔美国数学家，研究 Lie 代数的分类和概率论。

¹⁰海因茨·霍普夫 (Heinz Hopf, 1894-1971)，德裔瑞士数学家，研究代数拓扑中的同伦与同调；Hopf 代数的名称源于他的工作。

¹¹加布里埃尔 (Pierre Gabriel, 1933-2015)，法国数学家，研究交换范畴、表示论和箭图的有限型分类。

各段还需要不同的前置知识。下表把开始阅读、追究技术证明和继续专题所需的内容分开；表中未列出的整卷内容，不因章号较早便自动成为先修。

内容	开始阅读	追究技术证明	继续专题
有限群与对称群	第一卷的群作用、共轭、Sylow 理论与商群；第二卷的线性空间、模与张量积	第 5.4 节另需第 5.1 节的表示环与整性；第 6 章的标准基在本卷证明	模特征表示另读第 8 章的分解数与 Brauer 特征标
箭图	基础模论与线性代数；第 9.1–9.4 节从具体表示建立工具	第 10.1 节就地建立 ADE 二次型与反射；不需预读第 16–17 章的根系	第 9.5 节的基本代数与关系另需第二卷的投射覆盖、幂等元和 Morita 理论
Lie 代数	线性算子、矩阵交换子及域的基础；第 11 章从定义开始	第 16.1 节的共轭论证涉及多项式映射、有限整扩张与局部化；第 19.3 节的形式级数在节内定义	第 20.3 节就地建立上同调复形，研究 Ext 时再补第四卷的导出函子；第 21 章的代数群补读第三卷的仿射坐标环
有限群不变量	有限群表示、多项式环和有限生成模的基础	实际执行第 22.4 节的 Gröbner 消去，可补第一卷附录 F 或第三卷第 8 章	第 22.5 节另需第 7 章的 Schur–Weyl 对偶；第 22.6–22.7 节需第 21 章的代数群语言
微分专题附录	附录 E 可从第三卷附录 E.1 的微分域语言及模、张量和矩阵知识进入	附录 E 的 Picard–Vessiot 存在性与附录 D 的解析对应各有额外输入	附录 D 的特征簇、正则性和 Stokes 现象需进一步的几何与分析知识

阅读时还要随时看清底域和特征。有限群的复表示可以借平均算子分解，模特征表示却可能留下不可分解的扩张；复半单 Lie 代数的最高权理论，也不能无条件照搬到正特征。“特征不整除群阶”或“特征为零”等假设决定着结论能否成立，须与所用结果一同记住。读者也可以试着寻找去掉条件后的第一个反例。

学习表示论不妨从小对象反复练习。给循环群和正方形的对称群写出作用矩阵，算出迹并比较共轭类；给一支箭头 $V \rightarrow W$ 选不同秩的线性映射，看哪些表示同构；给 $\mathfrak{sl}_2$ 的小维数模写出三个标准算子的作用。第一次计算是为得到答案，第二次则可以追问答案中哪些部分与基的选择无关。等这一步想清楚了，再读一般定理，符号通常会亲近许多。

从有限群的特征标表走到根系与最高权，符号和工具已经丰富了许多。最值得保留的仍是开头正方形所提示的两种眼光：既看见一个对称在具体对象上做了什么，也看见许多不同作用背后共享的结构。希望读者终能带着这两种眼光，在有限群、箭图与 Lie 代数之间找到自己的问题；也愿本卷的计算与证明，能帮助读者把最初的疑问写成一个可以认真研究的数学问题。

R. EverStarine
2026 年 9 月 26 日

目录

序言	iii
第一编 有限群的表示与特征标	1
本编导读	3
第一章 表示、群代数与完全可约性	5
1.1 表示与模	5
1.2 典型表示	7
1.3 Maschke 定理	9
1.4 Schur 引理与分解	11
习题	14
第二章 特征标与正交关系	18
2.1 特征标	18
2.2 正交关系	20
2.3 群代数的分解	22
2.4 特征标表	23
习题	26
第三章 诱导表示与 Frobenius 互反律	30
3.1 限制与诱导	30
3.2 Frobenius 互反律	32
3.3 诱导特征标	34
3.4 函子关系	37
习题	40
第四章 双陪集、Mackey 理论与 Clifford 理论	47
4.1 双陪集	47
4.2 Mackey 分解	49
4.3 正规子群与 Clifford 理论	51
4.4 射影表示初步	53
习题	58
第五章 Artin 诱导、Brauer 诱导与群论应用	64
5.1 表示环、代数整数性与类和	64

5.2	Artin 有理诱导	68
5.3	Brauer 诱导	70
5.4	初等子群检测与 Brauer 整诱导的证明	72
5.5	共轭类、特征标约束与 Burnside 可解性定理	76
5.6	群论应用与三种 Burnside 定理的比较	79
	习题	81
第二编 对称群、模表示与箭图		89
本编导读		91
第六章 对称群的表示		92
6.1	分拆与 Young 图	92
6.2	Specht 模	94
6.3	Garnir 关系与标准基	96
6.4	不可约分类	99
6.5	分支规则与钩长公式的证明	103
6.6	钩长公式与分支规则的应用	106
	习题	108
第七章 对称函数与 Schur–Weyl 对偶		114
7.1	对称函数	114
7.2	Frobenius 特征映射	118
7.3	Schur–Weyl 对偶	122
7.4	张量分解	125
	习题	129
第八章* 模表示与 Brauer 特征标		136
8.1	半单性的失效	136
8.2	投射与块	139
8.3	Brauer 特征标	141
8.4	模表示理论补充	145
	习题	147
第九章 箭图与有限维代数的表示		156
9.1	箭图与路径代数	156
9.2	表示与模	158
9.3	区间表示与线性定向箭图	160
9.4	箭图表示的同调初步	163
9.5	基本代数、Ext 箭图与关系	166
	习题	169

第十章*	箭图、反射函子与 Gabriel 定理	176
10.1	Euler 型与维数向量	176
10.2	反射函子	180
10.3	Gabriel 定理	183
10.4	表示型与几乎分裂序列	187
	习题	190
第三编	Lie 代数、根系与最高权	197
本编导读		199
第十一章	Lie 代数及其表示	201
11.1	定义与例子	201
11.2	子代数、理想与商	203
11.3	表示与模	205
11.4	结构问题	207
	习题	210
第十二章	幂零、可解与三角化	215
12.1	Engel 定理	215
12.2	Lie 定理	217
12.3	根与结构	219
12.4*	Levi 分解	221
	习题	223
第十三章	Killing 型与半单 Lie 代数	227
13.1	不变双线性型	227
13.2	Cartan 判据	229
13.3	半单分解	231
13.4	经典例子	233
	习题	236
第十四章	$\mathfrak{sl}_2$ 及其表示	241
14.1	$\mathfrak{sl}_2$ 的结构	241
14.2	最高权模	243
14.3	有限维表示	245
14.4	结构应用	248
	习题	249
第十五章	泛包络代数与 PBW 定理	255
15.1	泛包络代数	255

15.2 滤过与 PBW	257
15.3 具体计算	260
15.4 诱导模初步	261
习题	264
第十六章 Cartan 子代数与根分解	269
16.1 Cartan 子代数	269
16.2 根空间分解	273
16.3 根弦与反射	274
16.4 根系公理	276
习题	279
第十七章 Weyl 群、Dynkin 图与分类	282
17.1 Weyl 群	282
17.2 Cartan 矩阵与 Dynkin 图	285
17.3 根系分类	286
17.4* 从根系到 Lie 代数	290
习题	293
第十八章 最高权与有限维不可约表示	297
18.1 完全可约性	297
18.2 权与最高权	300
18.3 Verma 模	303
18.4 最高权分类	305
习题	309
第十九章 Weyl 特征标公式与张量问题	314
19.1 形式特征标	314
19.2 Casimir 作用与 Freudenthal 递推	316
19.3 Weyl 分母、反对称性与形式算子	319
19.4 Weyl 特征标公式	322
19.5 维数与重数	325
19.6 与组合表示论的联系	327
习题	330
第四编 高级表示论与代数对称	335
本编导读	337
第二十章* 范畴 $\mathcal{O}$ 与 Lie 代数上同调	339
20.1 范畴 $\mathcal{O}$	339

20.2 中心作用	342
20.3 Lie 代数上同调	345
20.4 BGG 方法	349
习题	352
第二十一章* Hopf 代数与仿射代数群	356
21.1 余代数与 Hopf 代数	356
21.2 代数群的坐标环	359
21.3 有理表示	361
21.4 代数群结构初步	363
21.5 型、对合与古典群	365
习题	368
第二十二章* 不变量理论与商	372
22.1 群作用与不变多项式	372
22.2 有限生成与次数界	374
22.3 Hilbert 级数与 Molien 公式	376
22.4 生成元、关系与 Gröbner 计算	378
22.5 经典不变量与协变式	380
22.6 仿射商与轨道闭包	384
22.7* 约化群与几何不变量理论初步	386
习题	391
附录	397
附录 A 组合代数与反射群	399
A.1 Coxeter 群、长度与 Bruhat 序	399
A.2 对称函数、Young 表与组合恒等式	402
A.3 代数组合中的计数方法	405
A.4 Hecke 代数与 Kazhdan–Lusztig 理论	408
习题	412
附录 B 量子群、簇代数与范畴化	416
B.1 量子群与 Hopf 代数	416
B.2 簇代数的变异与小秩例子	418
B.3 表示论中的范畴化	420
B.4 参数特殊化与理论的适用范围	421
习题	422
附录 C Lie 群、算术表示与几何表示论简介	425
C.1 Lie 代数表示与 Lie 群表示的积分	425

C.2	紧 Lie 群与 Peter–Weyl 理论	428
C.3	p 进群与连续表示	431
C.4	旗簇、层与 D-模的几何方法	433
	习题	435
附录 D	微分算子、D-模与几何解析方法	439
D.1	从微分模到 D-模	439
D.2	代数、形式与解析解	443
	习题	448
附录 E	微分模与微分 Galois 理论	451
E.1	微分模与线性方程	451
E.2	Picard–Vessiot 扩张与对应	453
E.3	算例与可解性	457
E.4	张量结构与解空间上的表示	461
	习题	464
后记		i
参考文献		iii
中文索引		v
外文索引		ix
符号索引		xiii

表目录

表 2-1 八阶二面体群与四元数群的共同特征标数值	24
表 2-2 S_3 的特征标表	25
表 2-3 S_4 的特征标表	25
表 2-4 A_4 的特征标表	26

算法目录

算法 19-1	Freudenthal 权重数计算	319
算法 22-1	Reynolds 平均生成元搜索	378
算法 A-1	Robinson–Schensted 行插入与逆插入	404

第一编

有限群的表示与特征标


本编导读

本编研究有限群在线性空间上的作用。群可以有許多互不同构的表示，一个表示也可能遗漏群的部分结构；问题是怎样找到不可约成分、比较不同表示，并从它们的数值约束反过来认识群。我们从具体矩阵开始，逐步建立特征标、诱导、双陪集和整诱导理论，最后用这些工具证明一个群论中的结构定理。

第一章给出表示与群代数模的对应，构造正则、置换、对偶和张量表示，证明 Maschke 定理¹²和 Schur 引理¹³。本章允许一般底域，并分别说明“特征不整除群阶”对完全可约性的作用，以及“底域代数闭”对不可约表示自同态环的影响。第二章转到复数域，从平均投影建立正交关系，计算重数、中心幂等元和小群的特征标表。

第三章把子群表示诱导到整个群，给出张量和函数两种模型，并用 Frobenius 互反计算重数。诱导的维数、作用矩阵、特征标公式和传递性都有具体表达式，读者可在 S_3 的二阶、三阶子群上逐项检验。第四章继续分析诱导后限制的双陪集分块，再研究不可约表示限制到正规子群时的共轭轨道和重数；射影表示用来记录延拓时出现的标量障碍。

第五章包含两项不同的整性问题。Artin 定理¹⁴允许有理系数，Brauer 定理¹⁵进一步用初等子群消去整体分母。后者的证明先把诱导像组织成表示环的理想，再逐个素数进行检测；所需代数整数与有限环扩张的论证都在本章准备。随后证明 Burnside 的 $p^a q^b$ 阶群可解性定理¹⁶，明确区分它与轨道计数公式、不可约矩阵代数定理。



图中箭头串起表示的分解、特征标、诱导与双陪集分析；第 5 章把这些工具用于特征标的整数表达和群的可解性问题。

¹²马施克 (Heinrich Maschke, 1853-1908)，德国数学家，研究有限群与微分几何；其完全可约性定理是群表示论的基本结果。

¹³舒尔 (Issai Schur, 1875-1941)，德籍数学家，研究群表示、矩阵理论与数论。

¹⁴阿丁 (Emil Artin, 1898-1962)，奥地利裔数学家，研究类域论、代数和表示论。

¹⁵布劳尔 (Richard Brauer, 1901-1977)，德裔美国数学家，创立模表示论，并研究群的特征标。

¹⁶伯恩赛德 (William Burnside, 1852-1927)，英国数学家，研究有限群及其表示，著有《Theory of Groups of Finite Order》。

有限群表示还通向不变量理论：第二十二章的第 22.1—22.4 节计算有限群不变环及其 Hilbert 级数¹⁷，第 22.4 节的 Gröbner 消去可与第一卷附录 F 对照，第 22.5 节则把第七章的 Schur–Weyl 对偶用于矩阵不变量。回到本编，第 5.4 节通过表示环的逐素数检测证明整诱导，第 5.5 节把特征标整性用于 Burnside 可解性定理。

所需群论为子群、共轭、商群、Sylow 定理¹⁸与有限群作用；线性代数包括迹、特征值、直和与张量的基本运算。所需表示论构造和证明在本卷展开。先计算习题中的具体例子，再读一般证明，有助于理解条件的用途；遇到特征、底域或左右作用的改变，应重新核对公式。

初读可配合 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[4, Chapters 4–5]。本编使用普通复特征标建立 Brauer 整诱导理论。正特征标在第 8 章定义，它用于研究模表示的合成因子，与整诱导定理讨论的问题不同。

¹⁷希尔伯特 (David Hilbert, 1862-1943)，德国数学家，证明不变量有限生成定理，并对数学基础和数论作出重要贡献。

¹⁸西罗 (Peter Ludwig Mejdell Sylow, 1832-1918)，挪威数学家，研究有限群的素数幂阶子群及其存在和共轭性质。

第一章 表示、群代数与完全可约性

本章从有限群的线性作用建立表示与群代数模，研究不变子空间、完全可约性和不可约表示的同态，并说明底域特征为何影响分解。

本章目标

- 在群作用、矩阵及群代数模三种描述之间转换，正确核验同态与同构。
- 构造置换、正则、一维、对偶、张量及外幂表示。
- 用平均投影分解表示，指出群阶可逆性在证明中的作用。
- 将平均法用于各次齐次多项式，计算 Reynolds 算子及简单不变环。
- 用 Schur 引理判断交织空间，区分等型分量与所选的简单直和项。

设 k 为域，让二元群的非单位元在 k^2 上交换两个坐标，它的矩阵是

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

在复数域上，向量 $(1, 1)$ 与 $(1, -1)$ 分别张成 S 的两个不变直线，整个空间是它们的直和；若 k 的特征为 2，这两条直线重合，原来的拆法失效。同一个群与同一个矩阵形式，因底域改变而有不同的分解行为。要理解何时能把一个表示拆成不可约的部分，先要把群的作用写成线性变换，再考察不变子空间是否总有不变补空间。

本章以群、商群和有限维线性代数为基础。模、张量及外代数只使用其基本构造，所需的群作用公式均在正文中给出。具体矩阵表示及其不变子空间会使可约性与完全可约性的差别直接显现。

可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[4, Proposition 2.3.9, Corollary 2.3.10, Section 4.1, pp. 59–61]。该书从一般代数的表示讲起，再讨论有限群；本章先讨论群作用，一般底域上分解所涉及的除代数条件另在使用处说明。

1.1 表示与模

一个群可以置换顶点，也可以旋转平面。表示论把后一类作用推广到任意向量空间：每个群元素给出一个可逆线性变换，群乘法对应变换复合。以下从作用的定义讲起，再把它改写成群代数模；这两种说法记录的是同一组运算。

1.1.1 群的线性表示

定义 1.1.1. 设 G 为群， k 为域， V 为有限维 k 向量空间。若映射 $\rho: G \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 满足

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h) \quad (g, h \in G), \quad \rho(1) = 1_V,$$

则称 (V, ρ) 为 G 的一个 k -**线性表示** (linear representation), $\dim_k V$ 称为其**次数** (degree of a representation)。通常简写 $gv = \rho(g)v$ 。若 ρ 单射, 称表示**忠实** (faithful representation)。

选择 V 的基后得到矩阵。换基矩阵为 P 时, 全部矩阵同时变成 $P^{-1}\rho(g)P$; 不能对不同群元素各自选一个无关的换基。零维空间也给出零表示, 但后面“不可约”总排除零表示。

定义 1.1.2. 设 k 为域, G 为群, (V, ρ) 、 (W, σ) 为 G 的有限维 k 表示。若 k 线性映射 $T: V \rightarrow W$ 满足

$$T\rho(g) = \sigma(g)T \quad (g \in G),$$

则称 T 为表示同态, 也称**交织算子** (intertwining operator)。这类映射组成的 k 向量空间记为 $\text{Hom}_G(V, W)$ 。若其中有可逆映射, 则称两表示同构。

若 T 可逆, 上述等式乘以 T^{-1} 就表明逆也是交织算子。表示同构因而恰好是不依赖所选基的“同时相似”。例如循环群 $C_m = \langle r \mid r^m = 1 \rangle$ 的表示由一个矩阵 A 给定, 唯一要求为 $A^m = I$ 。给一组群生成元指定矩阵时, 同样必须核验全部生成关系。

1.1.2 群代数模与表示的等价

定义 1.1.3. 设 G 为有限群, k 为域。以形式符号 $g \in G$ 为基的向量空间

$$k[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in k \right\}$$

上, 若将群乘法按双线性延伸, 即令

$$\left(\sum_g a_g g \right) \left(\sum_h b_h h \right) = \sum_{g,h} a_g b_h (gh),$$

则所得含么结合 k 代数称为 G 的**群代数** (group algebra)。其单位是群单位元对应的基向量。

结合律在基向量上就是群的结合律, 双线性将它推广到全部元素。若 G 非交换, 群代数通常也非交换。不要把基向量 g 与一个任意线性组合混同; 虽然每个基向量都可逆, 群代数却一般不是除环。

命题 1.1.4. 设 G 为有限群, k 为域。在一个有限维 k 空间 V 上, G 的线性表示与么性左 $k[G]$ 模结构一一对应。表示同态恰为相应的 $k[G]$ 模同态。

证明. 由表示定义

$$\left(\sum_g a_g g \right) v = \sum_g a_g \rho(g)v.$$

分配律直接成立, 表示的乘法等式给出 $(ab)v = a(bv)$, 单位作用为恒等, 所以得到模。反过来, 从模限制到基向量 g , 它与 g^{-1} 的作用互逆, 故得到可逆线性变换, 模结合律给出群同态。两次构造在基向量上互逆, 线性延伸后在全部群代数上互逆。最后, 线

性映射与每个 $\rho(g)$ 交换，当且仅当与所有这些作用的线性组合交换，这正是模同态条件。□

因此核、像、商和直和都可以在表示或模的语言中讨论。本卷始终使用左作用；群代数张量积的右模结构会在诱导表示的定义中另行写出。

1.1.3 子表示、商表示及直和

定义 1.1.5. 设 k 为域， G 为群， (V, ρ) 为 G 的有限维 k 表示。若线性子空间 $U \subseteq V$ 满足 $\rho(g)U \subseteq U$ 对所有 $g \in G$ 成立，称 U 为子表示 (subrepresentation)。若 $V \neq 0$ 且子表示只有零与自身，称 V 不可约 (irreducible representation)。若 V 可写成不可约子表示的有限直和，称其完全可约 (completely reducible representation)，也称半单表示。空直和对应零表示。

由于也对 g^{-1} 成立，不变条件实际上给出 $\rho(g)U = U$ 。商作用为 $g(v+U) = gv+U$ ，改变代表所产生的差仍在 U ，故良定义。直和 $V \oplus W$ 逐分量作用；交织算子的核与像同样不变。不可约与不能分成两个非零子表示的直和不是同一个条件，后者称为不可分解 (indecomposable representation)。

命题 1.1.6. 设 k 为域， G 为群， V 为 G 的有限维 k 表示， $U \subseteq V$ 为子表示。 U 有不变补空间，当且仅当存在 G 线性映射 $p: V \rightarrow U$ 满足 $p|_U = 1_U$ 。此外， V 完全可约当且仅当它的每个子表示都有不变补空间。

证明. 若 $V = U \oplus W$ 且两项不变，沿 W 的投影与群作用交换。反向， $p^2 = p$ ，故 $V = U \oplus \ker p$ ，核不变。

若每个子表示都可补，对维数归纳：非零空间中选维数最小的非零不变子空间，它不可约；取补后继续归纳。反向设 $V = S_1 \oplus \cdots \oplus S_r$ 为不可约直和，对 r 归纳证明任意子表示 U 可补。若某个 $S_i \subseteq U$ ，则 $U = S_i \oplus (U \cap \bigoplus_{j \neq i} S_j)$ ，用归纳完成。若没有这样的 S_i ，而 $U \neq 0$ ，取 U 内不可约子表示 T 。至少一个坐标投影 $T \rightarrow S_i$ 非零；其核和像不变，故为同构。因此

$$V = T \oplus \bigoplus_{j \neq i} S_j, \quad U = T \oplus \left(U \cap \bigoplus_{j \neq i} S_j \right),$$

再次归纳。 $U = 0$ 直接取 V 为补。□

1.2 典型表示

抽象定义允许许多不同作用。最常用的表示往往直接来自一个有限集合：把集合元素改成向量空间的基，置换便成为线性变换。另一些表示则从已有表示通过对偶和张量构造得到。以下各项都写明作用公式，以便后面计算迹和不变子空间。

1.2.1 正则表示和置换表示

设有限群 G 作用于有限集合 X 。在以 $e_x, x \in X$ ，为基的 k 空间 $k[X]$ 上定义 $ge_x = e_{gx}$ ，得到置换表示 (permutation representation)。矩阵每行每列各有一个一，

其余位置为零。 $X = G$ 且采用左平移时, 得到**正则表示** (regular representation), 也就是 $k[G]$ 在自身上的左乘作用。

正则表示忠实, 因为 $g \cdot 1 = g$, 不同基向量不相等。对一般 X , 不动向量

$$V^G = \{v \in k[X] \mid gv = v \text{ 对所有 } g \in G\}$$

在同一个轨道上的系数必须相同。因此每个轨道的基向量之和给出一组不动空间的基, $\dim_k k[X]^G$ 等于轨道数, 任意特征均成立。

例 1.2.1. 设 S_n 置换 k^n 的标准基, $n \geq 2$ 。令

$$L = k(e_1 + \cdots + e_n), \quad W = \left\{ \sum_i a_i e_i \mid \sum_i a_i = 0 \right\}.$$

两者都是子表示。当 $n \not\equiv 0 \pmod{k}$ 时, $k^n = L \oplus W$; 当 $\text{char } k \mid n$ 时, 却有 $L \subseteq W$ 。

证明. 置换不改变系数和, 故两者不变。常数向量 $a \sum_i e_i$ 的系数和为 na 。若 n 可逆, 交为零且维数相加为 n , 得到直和; 否则整个 L 都在 W 中。□

1.2.2 一维表示及交换化

一维 k 表示就是群同态 $\lambda: G \rightarrow k^\times$, 称为**一维表示** (one-dimensional representation)。像群交换, 所以 $\lambda(ghg^{-1}h^{-1}) = 1$ 。记 $G' = [G, G]$ 为所有交换子生成的子群, 则 λ 唯一经由 G/G' 分解。反过来, $G/G' \rightarrow k^\times$ 的同态与商映射复合就给出一维表示。这直接说明一维表示只能观察群的交换化。

在复数域上, $C_m = \langle r \rangle$ 的一维表示为

$$\lambda_j(r) = \exp(2\pi i j/m), \quad 0 \leq j < m.$$

在实数域上, 有限群的一维表示的值只能为 ± 1 ; 阶为奇数的群因而只有平凡实一维表示。同一个群换底域以后, 可用的一维表示会改变。

若 λ 为一维表示, $\rho^\lambda(g) = \lambda(g)\rho(g)$ 仍满足表示乘法法则, 称为用 λ 扭曲。子空间在扭曲前后不变的条件相同, 因此不可约性不变。例如对称群的符号表示可将一个不可约表示变成另一个, 而不改变次数。

1.2.3 对偶、张量积和外幂表示

设 V, W 是群 G 在域 k 上的有限维表示。对偶空间 $V^* = \text{Hom}_k(V, k)$ 上定义

$$(g\varphi)(v) = \varphi(g^{-1}v), \quad g(v \otimes w) = gv \otimes gw. \quad (1.1)$$

前式给出**对偶表示** (dual representation), 后式给出**张量积表示** (tensor product representation)。逆元不可省略: 计算

$$g(h\varphi)(v) = \varphi(h^{-1}g^{-1}v) = ((gh)\varphi)(v)$$

才得到左表示的次序。对偶矩阵是 $\rho(g^{-1})^\top$ ，没有共轭；复共轭只会在另行选择 Hermitian 内积后出现。

外幂上的作用由

$$g(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = gv_1 \wedge \cdots \wedge gv_r$$

定义，因为线性变换保持交替关系，故能从张量幂下降到商空间。特别地，最高外幂是一维表示 $g \mapsto \det \rho(g)$ 。在特征二，外代数仍按 $v \wedge v = 0$ 定义，不能仅用反交换公式替代交替条件。

命题 1.2.2. 设 k 为域， G 为群， V, W 为 G 的有限维 k 表示。在 $\text{Hom}_k(V, W)$ 上置 $(gT)(v) = gT(g^{-1}v)$ ，其中 $g \in G$ 、 $T \in \text{Hom}_k(V, W)$ 、 $v \in V$ ，则自然映射

$$W \otimes_k V^* \longrightarrow \text{Hom}_k(V, W), \quad w \otimes \varphi \mapsto (v \mapsto \varphi(v)w)$$

是表示同构，且其不动空间恰为 $\text{Hom}_G(V, W)$ 。

证明. 选 V 的基 v_i 及对偶基 φ_i ，逆映射为 $T \mapsto \sum_i T(v_i) \otimes \varphi_i$ ，与所选基无关，因为它是给定自然映射的唯一逆。两侧作用于纯张量后均将 v 送到 $\varphi(g^{-1}v)gw$ ，故同构与作用相容。最后 $gT = T$ 等价于 $T(gv) = gT(v)$ ，即交织条件。□

1.3 Maschke 定理

线性空间中的子空间总有补空间，但任意选择的补未必被群保持。有限群允许对所有群元素取平均；只要群阶在底域中可逆，就能把一个普通投影改成与群作用相容的投影。这个除法条件决定了完全可约性是否成立。

1.3.1 特征与群阶的互素条件

对有限群 G ，若 $\text{char } k = 0$ ，或 $\text{char } k = p > 0$ 且 $p \nmid |G|$ ，则 $|G| \cdot 1_k \neq 0$ ，可以在 k 中除以 $|G|$ 。此时，在任意有限维表示 V 上定义

$$E_V = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g).$$

对 $h \in G$ ，左乘或右乘 h 只是重排求和项，故 $\rho(h)E_V = E_V = E_V\rho(h)$ 。因此像包含于 V^G ，而不动向量经此映射保持不变，于是 $E_V^2 = E_V$ ，像恰为 V^G 。

这里的分母是真正的标量逆，不是一个形式记号。若特征整除群阶，同一分子 $\sum_g \rho(g)$ 仍有意义，却可能在不动空间上为零，所以不再给出投影。

1.3.2 平均投影与 Maschke 定理

定理 1.3.1 (Maschke). 设 G 为有限群， k 为域，且 $|G| \neq 0$ 于 k 。 G 的每个有限维 k 表示 V 的任意子表示 U 都有不变补空间，因而每个这样的表示完全可约。

证明. 取一个普通线性投影 $p: V \rightarrow U$ ，使 $p|_U = 1_U$ ，定义

$$\bar{p} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)p\rho(g^{-1}).$$

每一项的像都在 U , 因为 U 不变。对 $u \in U$, 先有 $\rho(g^{-1})u \in U$, 再经 p 不变, 所以每一项将 u 送回 u , 得到 $\bar{p}|_U = 1_U$ 。对任意 h , 将求和指标 g 改成 hg , 得 $\rho(h)\bar{p}\rho(h^{-1}) = \bar{p}$ 。于是 $\bar{p}$ 是 G 线性投影, 命题 1.1.6 给出 $V = U \oplus \ker \bar{p}$, 并推出完全可约性。□

这就是 **Maschke 定理** (Maschke's theorem)。平均只修正投影, 没有假定已经知道不可约表示有哪些。因此它先提供分解的存在性, 分类和重数仍需其他工具。

命题 1.3.2. 设 G 为有限群, $\rho: G \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为有限维复表示。 V 上存在被 G 保持的正定 Hermitian 内积; 相对于其标准正交基, 每个 $\rho(g)$ 都是酉矩阵。

证明. 任选正定 Hermitian 内积 $(\cdot, \cdot)_0$, 约定第一变量共轭线性、第二变量线性。置

$$(v, w) = \frac{1}{|G|} \sum_g (\rho(g)v, \rho(g)w)_0.$$

非零 v 的每个加数都为正实数, 所以正定; 两变量的线性规则不变, 重排求和给出不变性。取标准正交基即得酉矩阵。若 U 不变, 其正交补也不变, 因为 $(u, gw) = (g^{-1}u, w) = 0$ 。这另给出复数情形的不变补空间。□

1.3.3 多项式上的平均与 Reynolds 算子

线性作用还会作用于多项式。设 V 是有限维 k 表示, 取对偶空间的一组基 $x_1, \dots, x_n$, 写

$$k[V] := \text{Sym}(V^*) = k[x_1, \dots, x_n].$$

对偶作用 $g\ell = \ell \circ \rho(g^{-1})$ 唯一延伸为这个多项式环的代数自同构。在向量处求值时, 公式为

$$(gf)(v) = f(\rho(g^{-1})v).$$

这里先按线性替换定义形式多项式上的作用; 尤其当 k 有限时, 不能把两个多项式在全部 k 点取值相同当成多项式相等。逆元则保证 $g(hf) = (gh)f$ 。

定义 1.3.3. 设 k 为域, G 为群, $\rho: G \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 为有限维表示。在 $k[V] = \text{Sym}(V^*)$ 上, 将对偶作用 $g\ell = \ell \circ \rho(g^{-1})$ 延伸为代数自同构, 其中 $\ell \in V^*$ 、 $g \in G$ 。满足 $gf = f$ 对所有 $g \in G$ 成立的多项式 $f \in k[V]$, 称为**不变多项式** (invariant polynomial)。它们组成的 k 子代数

$$k[V]^G = \{ f \in k[V] \mid gf = f \text{ 对所有 } g \in G \}$$

称为该作用的**不变环** (invariant ring)。若 G 有限且 $|G| \neq 0$ 于 k , 则映射

$$\mathcal{R}(f) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} gf$$

称为 **Reynolds 算子** (Reynolds operator)。¹

¹雷诺 (Osborne Reynolds, 1842-1912), 爱尔兰数学家、物理学家, 以流体流动中的雷诺数和湍流研究著称。

线性替换保持全次数，故 $k[V]_d$ 是有限维表示。把本节开头的平均投影分别用于每个 $k[V]_d$ ，可知 $\mathcal{R}$ 保持次数，像恰为 $k[V]^G$ ，且 $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$ 。对于 $a \in k[V]^G$ ，逐项使用 $g(af) = ag(f)$ ，还有

$$\mathcal{R}(af) = a\mathcal{R}(f).$$

所以平均可以同乘以不变多项式交换，但一般不保持任意乘积。

例 1.3.4. 设 $\text{char } k \neq 2$ ，令 C_2 在 k^2 上作用为 $(u, v) \mapsto (-u, v)$ 。在对偶坐标 x, y 中，

$$\mathcal{R}(f) = \frac{f(x, y) + f(-x, y)}{2}.$$

它删掉所有含奇数次 x 的单项式，所以不变环为 $k[x^2, y]$ 。这个生成结论来自逐个单项式的计算，不仅来自平均公式。例如 $\mathcal{R}(x) = 0$ ，却有 $\mathcal{R}(x^2) = x^2$ ，因此 $\mathcal{R}$ 不是环同态。

这里已能把不变多项式按次数作为表示来研究。至于怎样找到有限个生成元、确定它们之间的全部关系，以及能否由不变量区分两个轨道，留待第二十二章讨论。

1.3.4 模特征情形的反例

若 k 的特征为 p ，在 $C_p = \langle r \rangle$ 上取

$$\rho(r) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

写为 $I + N$ ，其中 $N^2 = 0$ 。二项式展开给出 $(I + N)^p = I$ ，所以这是表示。直线 ke_1 不变。任何补直线可由 $ae_1 + e_2$ 生成；若它不变， r 在这条一维空间上的标量的 p 次方为一，在特征 p 下只能是一。但是

$$\rho(r)(ae_1 + e_2) = (a + 1)e_1 + e_2 \neq ae_1 + e_2,$$

故不存在不变补。这个表示可约但不可分解。

命题 1.3.5. 设 G 为有限群， k 为域。若 $\text{char } k \mid |G|$ ，则正则表示 $k[G]$ 不完全可约。因此 G 的全部有限维 k 表示完全可约，当且仅当群阶在 k 中可逆。

证明. 增广映射 $\varepsilon : k[G] \rightarrow k$ 、 $\sum a_g g \mapsto \sum a_g$ ，在目标采用平凡作用时为满的表示同态。若它有 G 线性截面，单位的一的像 v 必为不动向量。正则作用迫使 $v = c \sum_g g$ ，所以 $\varepsilon(v) = c|G| = 0$ ，不能等于一。于是其核没有不变补，正则表示不完全可约。反方向正是定理 1.3.1。□

1.4 Schur 引理与分解

完全可约性让我们能够拆开表示，还须知道拆出的成分是否唯一。交织算子给出这个问题的答案：两个不可约成分之间的非零映射必可逆，而一个不可约表示的自同态环一般是除代数。只有在合适的底域上，才能再把它缩成标量。

1.4.1 不可约表示的自同态环

引理 1.4.1 (Schur). 设 G 为群, k 为域, V, W 为非零不可约有限维 k 表示。每个非零 $T \in \text{Hom}_G(V, W)$ 都是同构。因此不相同构时 $\text{Hom}_G(V, W) = 0$, 而 $\text{End}_G(V)$ 是一个有限维 k 除代数。

证明. $\ker T$ 与 $\text{im } T$ 都是子表示。非零性及不可约性使它们分别等于零和 W , 所以 T 双射, 逆仍与作用交换。对 $V = W$ 就得到每个非零自同态可逆; 它作为 $\text{End}_k(V)$ 的线性子空间有限维。□

这称为 **Schur 引理 (Schur's lemma)**。其第一部分不要求群有限, 也不需要完全可约性; 它只比较已经不可约的表示。

1.4.2 代数闭域与一般域

推论 1.4.2. 设 k 代数闭, G 为群, V 为非零不可约有限维 k 表示。则

$$\text{End}_G(V) = k 1_V.$$

特别地, 有限交换群在代数闭域上的不可约表示都是一维的。

证明. 对 $T \in \text{End}_G(V)$, 代数闭性保证存在特征值 $\lambda \in k$ 。 $T - \lambda I$ 不可逆, 由 Schur 引理只能为零。若群交换, 每个 $\rho(g)$ 都是交织算子, 因而都是标量, 于是每条直线不变。不可约性迫使维数为一。□

底域条件不能省去。例如实空间 $\mathbb{R}^2$ 上, 令 C_3 的生成元作用为旋转 120° 的矩阵。它没有实特征向量, 所以没有不变实直线, 表示不可约。与旋转交换的实矩阵却为

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

构成与 $\mathbb{C}$ 同构的实除代数, 而非只有实标量。复化后旋转出现两个不同特征值, 表示分裂成两个一维复表示。

即使底域代数闭, 结论“自同态只有标量”也不能无条件反推不可约。例如以后会见到某些非半单代数的不可分解模, 其自同态也只有标量。本卷在有限群、群阶可逆的条件下使用这个逆向判据时, 会同时使用 Maschke 分解。

1.4.3 与半单代数理论的联系

命题 1.4.3. 设 G 为有限群, k 为代数闭域, $|G| \neq 0$ 于 k , V 为 G 的有限维 k 表示。若

$$V \simeq \bigoplus_{i=1}^r S_i^{\oplus m_i}$$

且 S_i 为两两不同构的不可约有限维 k 表示、 m_i 为非负整数, 则

$$m_i = \dim_k \text{Hom}_G(S_i, V), \quad \text{End}_G(V) \simeq \prod_{i=1}^r M_{m_i}(k).$$

相应的等型分量 (isotypic component) V_i , 即 V 中所有同构于 S_i 的简单子表示之和, 是内在确定的; 其内部拆成 m_i 个简单直和项通常不唯一。

证明. 把同态分别投到各个直和坐标, Schur 引理使不同类型间的块为零, 相同类型间的块为标量。因此 $\text{Hom}_G(S_i, V) \simeq k^{m_i}$, 并得到自同态的分块矩阵公式。

任意同构于 S_i 的子表示向其他类型的坐标投影都为零, 所以它全在所选分解的 $S_i^{\oplus m_i}$ 中; 反过来, 这些坐标子表示已生成整个块。故所有同型简单子表示之和恰为该块, 不依赖所选分解。求值映射

$$S_i \otimes_k \text{Hom}_G(S_i, V) \longrightarrow V_i, \quad v \otimes f \mapsto f(v)$$

在所选分解下就是 m_i 份 S_i 的恒等识别, 因而是自然同构。任意改变重数空间的基都会改变内部简单直和项, 却不改变 V_i 。□

在一般域上, 令 $D_i = \text{End}_G(S_i)$ 。同一分块论证给出 $\text{End}_G(V) \simeq \prod_i M_{m_i}(D_i)$, 而重数须从

$$\dim_k \text{Hom}_G(S_i, V) = m_i \dim_k D_i$$

读出, 不能删掉除代数的维数。这里已经看见半单代数理论中的矩阵块和除代数; 本章所需的分解与重数判断均由平均投影和 Schur 引理直接得到。

引理 1.4.4. 设 G 为有限群, k 为域, $|G| \neq 0$ 于 k 。每个不可约有限维 k 表示都同构于正则表示的某个直和项, 因此不可约表示只有有限多个同构类型。

证明. 对不可约 S 选 $0 \neq v \in S$ 。映射 $k[G] \rightarrow S, a \mapsto av$, 像是非零子表示, 故满射。由 Maschke 定理, 其核有不变补, 所以 S 是正则表示的直和项。把有限维正则表示分成有限个不可约项; 任意不可约 S 向这些项的至少一个投影非零, Schur 引理使它同构于该项。因而该有限列表已经穷尽所有类型。□

本章小结

群代数把有限个群作用线性组合起来, 表示与左模因而给出等价描述。置换和正则表示从群作用直接构造, 对偶和张量则从已有表示产生新表示; 每种构造都须保留正确的作用次序。

群阶可逆时, 平均将普通投影改成不变投影, 所有有限维表示完全可约。模特征中的增广映射不分裂, 说明分解结论不能脱离特征条件。不可约与不可分解在这里也必须区分。

把平均逐次用于对称代数, 就得到保持次数的 Reynolds 算子。它是到不变多项式的投影, 并对不变子环线性; 反射的例子说明这种投影一般不是环同态。生成元与关系的问题因此需要在平均之外继续研究。

Schur 引理控制不可约之间的同态, 代数闭性进一步把自同态除代数化成标量。等型分量及其重数由表示本身确定, 而同型成分内部的直和分解依赖选择。下一章将用迹与正交关系把这些重数变成可计算的数值。

习题

习题 1.1. 设 k 中 m 可逆, 且 $T^m - 1$ 在 k 上分裂。证明 C_m 的每个有限维 k 表示都能选基使全部作用矩阵同时对角, 并用生成元的特征空间写出分解。

解. 生成元矩阵 A 满足 $A^m = I$ 。多项式 $T^m - 1$ 与导数 mT^{m-1} 互素, 故分裂为互异一次因子。最小多项式也无重根, 所以 $V = \bigoplus_{\lambda^m=1} \ker(A - \lambda I)$ 。群元素均为生成元的幂, 在每个该特征空间上以 λ^j 作用; 对各空间分别选基使得同时对角化。□

习题 1.2. 在 $\mathbb{C}^2$ 上令 C_2 生成元分别作用为 $\text{diag}(1, -1)$ 和 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。写出两表示之间的同构及全部交织算子。

解. 取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 有 $BP = PA$, 且 $\det P = -2 \neq 0$, 所以 P 给同构。任意交织 T 的第一列须属于 B 的一特征空间, 第二列属于负一特征空间, 故

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ a & -b \end{pmatrix}.$$

它可逆恰好要求 $ab \neq 0$ 。□

习题 1.3. 设 G 为有限群, k 为域, V 为有限维表示。证明在 1 处求值的映射 $T \mapsto T(1)$ 给出 $\text{Hom}_G(k[G], V) \simeq V$ 。不假设群阶可逆。

解. 交织条件给出 $T(g) = gT(1)$, 再由线性性得到 $T(a) = a \cdot T(1)$, 所以该求值映射是单射。给定 $v \in V$, 公式 $a \mapsto av$ 定义左模同态, 在 1 处取值为 v , 故满射。两构造都是线性的, 且对 V 的表示同态相容。□

习题 1.4. 证明有限群有忠实一维复表示, 当且仅当它是循环群。

解. 忠实一维表示将群嵌入 $\mathbb{C}^\times$ 。设群阶为 m , 每个像的 m 次方为一, 故像是由 $\exp(2\pi i/m)$ 生成的循环群的子群, 仍循环。反向将 C_m 的生成元送到这个本原单位根, 得到忠实表示。□

习题 1.5. 设有限群 G 作用于有限集合 X, Y 。证明 $\dim_k \text{Hom}_G(k[X], k[Y])$ 等于对角作用下 $Y \times X$ 的轨道数, 任意域均成立。计算 S_n 在自然 n 点置换表示上的自同态维数, 其中 $n \geq 2$ 。

解. 矩阵条目标记为 $a_{y,x}$, 交织条件恰为 $a_{gy,gx} = a_{y,x}$ 。每个轨道上可自由选一个常数, 各轨道指示矩阵线性无关且生成全部交织算子, 所以维数为轨道数。 S_n 在有序点集上有对角与非对角两个轨道, 故维数二; 矩阵可写为 $aI + bJ$, 其中 J 的全部条目为一。□

习题 1.6. 在 $\mathbb{F}_2^3$ 中, 设 S_3 置换三个坐标。证明和为零的二维子空间不可约, 虽然底域特征整除 $|S_3|$ 。

解. 该子空间的非零向量为 $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)$, 群在三者上传递。一个不变的一维子空间只有一个非零向量, 若存在就要求该向量被全群固定, 矛盾。因此此二维表示不可约。Maschke 条件失效只是说并非全部表示完全可约, 不是说不可约表示不再存在。□

习题 1.7. 设有限群 G 的阶在 k 中可逆。证明对短正合表示列 $0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$, 取不动空间后仍短正合。

解. 核及单射可以直接在原列中检验。对 $w \in W^G$ 选任一提升 $v \in V$, 平均 $v_0 = |G|^{-1} \sum_g gv$ 不动, 且映到 $|G|^{-1} \sum_g gw = w$ 。因此右端满射。这个提升证明明确使用了群阶的逆元。□

习题 1.8. 证明有限维表示的自然映射 $V \rightarrow V^{**}$ 、 $v \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(v))$, 是表示同构。说明对偶作用中的逆元如何保证等变性。

解. 有限维线性代数使求值映射双射。对 $g \in G$, 双对偶中 g 作用于求值泛函的值为 $(g^{-1}\varphi)(v) = \varphi(gv)$, 正好是 gv 对应的求值泛函。若在第一次对偶中漏掉逆元, 复合的作用次序就不再是左群作用, 此计算也无法保持给定的等变关系。□

习题 1.9. 设 V 为 d 维表示。证明 $\sum_i v_i \otimes \varphi_i \in V \otimes V^*$ 与所选对偶基无关且为不动向量; 求值映射 $v \otimes \varphi \mapsto \varphi(v)$ 将它送到什么? 当 $\text{char } k \mid d$ 时, 这一复合为什么不能给出平凡表示的分裂?

解. 在命题 1.2.2 的自然识别下, 这个张量对应恒等算子, 因此与基无关且不动。求值映射在该张量上的值等于对应算子的迹, 即 $d \cdot 1_k$ 。若该值为零, 则从 k 送入这个不动向量、再经求值映射回到 k 的复合为零, 不能是恒等映射。这里仅否定这对具体映射构成分裂, 不排除使用其他映射得到补空间。□

习题 1.10. 对 $d \geq 1$ 的 d 维 k 表示 V , 证明自然同构

$$\Lambda^{d-1}V \simeq V^* \otimes \Lambda^d V$$

与群作用相容。

解. 将 $u \in \Lambda^{d-1}V$ 送到 $v \mapsto v \wedge u$ 的线性映射, 得到 $\Lambda^{d-1}V \rightarrow \text{Hom}_k(V, \Lambda^d V)$ 。在一组基下, 删去第 i 个基向量的楔积映为带符号的第 i 个对偶基乘最高楔积, 因此双射, 任意特征均成立。群作用保持楔积, 故映射等变; 再用有限维 Hom 与张量的自然识别即得所述同构。□

习题 1.11. 设 k 特征为 p , $G = C_p$ 。证明 $k[G] \simeq k[t]/(t^p)$, 并求正则表示的全部子表示。它是否不可分解?

解. 把 t 送到 $r-1$, 由 $(r-1)^p = r^p - 1 = 0$ 得满同态; 两侧维数 p , 故同构。子表示就是理想。任一非零理想中取最低非零次数最小的元素 $t^j u$, 其中 u 常数项非零, 因有限等比求逆而可逆, 所以理想含 t^j , 而其他元素都为它的倍数。故全部子表示为 (t^j) , $0 \leq j \leq p$ 。这些子模成一条链, 任意两个非零子模有非零交, 因此正则表示不可分解; 当 $p > 1$ 时它却不是不可约。□

习题 1.12. 设 $|G|$ 在 k 中可逆, $e = |G|^{-1} \sum_g g$ 。证明 e 为中心幂等元, $\ker \varepsilon = k[G](1-e)$, 并写出群代数的直和分解。

解. 左右乘群元素都固定群元素之和, 且 $e^2 = e$, 所以 e 中心. 对任意 a , 有 $ae = \varepsilon(a)e$. 若 $\varepsilon(a) = 0$, 则 $a = a(1 - e)$; 反向 $\varepsilon(1 - e) = 0$, 得核等式. 因此

$$k[G] = ke \oplus k[G](1 - e).$$

第一项为平凡表示, 第二项为增广理想; 正交幂等元同时给出代数直积分解. $\square$

习题 1.13. 在 $\mathbb{F}_3^2$ 上令 C_4 生成元作用为 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 证明此表示不可约, 并计算自同态环.

解. $A^2 = -I, A^4 = I$. 多项式 $T^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 无根, 所以 A 没有不变直线, 表示不可约. 解矩阵交换方程得到全部自同态为 $aI + bA$. 于是

$$\text{End}_{C_4}(V) \simeq \mathbb{F}_3[T]/(T^2 + 1),$$

是九元域. 这个除代数比标量域大, 正好显示 Schur 标量结论需要代数闭性. $\square$

习题 1.14. 设 S 为有限群 G 的不可约复表示. 分类 $S \oplus S$ 的不可约子表示, 说明为什么两个坐标子空间并非唯一的简单直和项.

解. 任意不可约子表示至少有一个非零坐标投影, 故由 Schur 引理同构于 S . 其嵌入由一对标量 $(a, b) \neq (0, 0)$ 给出, 即 $v \mapsto (av, bv)$. 两对标量给同一个像, 当且仅当相差一个共同非零倍数, 所以这些子表示由射影直线 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 参数化. 两条不同参数对应的子表示交为零, 维数相加为 $2 \dim S$, 从而给出许多不同的直和分解. $\square$

习题 1.15. 设有限群 G 有忠实不可约复表示. 证明 $Z(G)$ 循环.

解. 中心元素的作用与全群作用交换, 故由 Schur 引理都是标量. 忠实性使中心到这些非零标量的同态单射. 因此中心同构于 $\mathbb{C}^\times$ 的有限子群, 由习题 1.4 的单位根论证为循环群. $\square$

习题 1.16. 设 V 为不可约复表示. 证明两种不变正定 Hermitian 内积仅相差一个正实数倍.

解. 固定第一种内积, 存在唯一线性算子 A , 使第二种写成 $(v, Aw)_1$. 两内积均不变, 故 A 与群作用交换; Schur 引理使 $A = cI$. 在任意非零向量上比较两个正实范数平方, 得到 $c > 0$. 因此两内积相差正实数倍. $\square$

习题 1.17. 设 $C_5 = \langle r \rangle$, ζ 为本原五次单位根. 若 V 的生成元矩阵为 $\text{diag}(\zeta, \zeta^{-1})$, 分解 $V \otimes V$, $\Lambda^2 V$ 及 V^* .

解. 取特征基 v_+, v_- , 张量基的权分别为 $\zeta^2, 1, 1, \zeta^{-2}$. 因此 $V \otimes V = \lambda_2 \oplus 1^{\oplus 2} \oplus \lambda_{-2}$. 最高楔积的权为一, 所以 $\Lambda^2 V$ 平凡. 对偶的两个权互换, 故 $V^* \simeq V$. 这些分解来自具体权空间, 不以维数吻合代替同构. $\square$

习题 1.18. 设 $\zeta \in \mathbb{C}$ 为本原三次单位根, $G = C_3 = \langle s \rangle$ 在 $V = \mathbb{C}^2$ 上的生成元矩阵为 $\text{diag}(\zeta, \zeta^{-1})$. 以 x, y 为对偶坐标, 对整数 $a, b \geq 0$ 计算 $\mathcal{R}(x^a y^b)$, 并求全次数 $0 \leq d \leq 4$ 的不变齐次多项式空间的基. 另将全部二次齐次多项式组成的表示分解为一维表示.

解. 对偶作用为 $s(x) = \zeta^{-1}x$ 、 $s(y) = \zeta y$, 所以

$$\mathcal{R}(x^a y^b) = \frac{1 + \zeta^{b-a} + \zeta^{2(b-a)}}{3} x^a y^b = \begin{cases} x^a y^b, & a \equiv b \pmod{3}, \\ 0, & a \not\equiv b \pmod{3}. \end{cases}$$

后一情形用到三次单位根之和 $1 + \zeta + \zeta^2 = 0$. 单项式是各齐次部分的基, 且均为特征向量, 因而按同余条件选出的单项式给出不动空间的全部基. 次数依次为零至四时, 可以取

$$\{1\}, \quad \emptyset, \quad \{xy\}, \quad \{x^3, y^3\}, \quad \{x^2 y^2\}.$$

全部二次多项式以 x^2, xy, y^2 为基, 生成元在这三个向量上的特征值依次为 $\zeta, 1, \zeta^2$. 因此它是三个不同一维表示的直和, 不动项恰为 $\mathbb{C}xy$. 这些有限次数的计算尚未单独证明整个不变环的生成定理. $\square$

习题 1.19. 设 k 特征为 p , $1 \leq d \leq p$, N 为一个 d 阶幂零 Jordan 块. 证明 $r \mapsto I + N$ 给出 C_p 的不可分解表示, 并求其不动空间维数.

解. $(I + N)^p = I + N^p = I$, 所以群关系成立. 不动空间是 $\ker N$, 维数一. 若表示是两个非零子表示的直和, N 在每一项上幂零, 故每项都有非零核, 两核直和会使 $\dim \ker N \geq 2$, 矛盾. 因此不可分解; $d = 1$ 时还不可约, $d > 1$ 时有真子表示 $\ker N$. $\square$

第二章 特征标与正交关系

本章用迹构造复特征标，证明正交关系与不可约特征标的完备性，并从具体表示计算若干小群的特征标表及其信息边界。

本章目标

- 计算直和、张量、对偶和外平方的特征标，始终核对工作域。
- 用内积计算 Hom 空间维数与分解重数，理解列正交所需的完备性。
- 从特征标构造中心幂等元，并解释群代数的矩阵块。
- 实际建立小群的特征标表，区分数值约束、存在性和群同构问题。

一个复表示给每个群元素指定一张矩阵，但同时换基会改变这些矩阵的外观。迹却不随换基改变，因此可以先问：只知道每个群元素的迹，究竟能恢复多少表示信息？对交换坐标的二元群，恒等元与交换元的迹分别是 2 和 0；若把这个表示分成平凡表示与符号表示，两者的迹相加正好给出这两个数。一般群中，这种「由迹读出分解」需要正交关系保证，还须确认已经找到全部不可约表示，才能正确填写特征标表。

本章只讨论有限维复表示。上一章的 Maschke 定理和 Schur 引理是主要工具；所需内积及共轭约定在本章固定。表格应从具体表示和正交计算得出，而不能把一组满足部分数值关系的行直接宣布为已经存在的表示。

Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[4, Sections 4.5–4.8, pp. 66–73] 提供正交关系、酉表示、矩阵系数与小群特征标表的集中叙述。本章内积采用第一变量共轭线性；不同文献把共轭放在另一变量时， Hom 公式中的次序要相应转换。

2.1 特征标

一个表示给每个群元素一个矩阵，但矩阵条目随换基而改变。迹在相似变换下不变，又与直和和张量积相容，因此可以把整组矩阵压缩成一个群上的函数。本章固定有限群的有限维复表示；正特征下，不能仅凭这些迹确定表示的同构类型。

2.1.1 迹、类函数与表示同构

定义 2.1.1. 设 G 为有限群， $\rho: G \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为有限维复表示。函数

$$\chi_V: G \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \chi_V(g) = \text{tr } \rho(g)$$

称为 V 的**特征标** (character)。非零不可约表示的特征标称为不可约特征标。

有 $\chi_V(1) = \dim V$ 。因为 $\rho(hgh^{-1}) = \rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}$ ，迹的相似不变性使特征标在每个共轭类上取常值。群上在共轭类上常值的复函数称为**类函数** (class function)；它们组成空间 $\text{CF}(G)$ ，维数等于共轭类个数。

同构表示的特征标相同，但逆命题此时还没有得到。只有先证明不可约特征标的正交性，才能从特征标中读出不可约分解的重数，继而恢复表示的同构类型。不能把这项结论误当成迹的定义的一部分。

2.1.2 直和、张量与对偶的特征标

命题 2.1.2. 设 G 为有限群， V, W 为 G 的有限维复表示， $g \in G$ 。则

$$\chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W, \quad \chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W, \quad \chi_{V^*}(g) = \chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}.$$

若 G 作用于有限集合 X ，则对每个 $g \in G$ ，相应复置换表示 $\mathbb{C}[X]$ 的特征标为 g 在 X 中的不动点数。

证明. 直和矩阵分块对角，迹相加；张量矩阵的对角元为两矩阵对角元的两两乘积，故迹相乘。对偶作用矩阵为逆矩阵的转置，所以其迹为 $\chi_V(g^{-1})$ 。若 g 的阶为 m ， $\rho(g)$ 满足 $T^m - 1$ ，这个复多项式无重根，故矩阵可对角化，特征值均为单位根；它们的逆正是复共轭，给出最后等式。置换矩阵的对角元仅在基元素被固定时为一，其余为零，所以迹等于不动点数。□

例如 S_3 在三个字母上的置换特征标，在单位元、换位、三轮换上依次取 3, 1, 0。其不动直线的特征标恒为一，和为零的二维补表示因而有值 2, 0, -1。下一节将从这些数值确认该二维表示不可约。

外平方与对称平方也能从原特征标计算：

$$\chi_{\Lambda^2 V}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2}, \quad \chi_{\text{Sym}^2 V}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)}{2}. \quad (2.1)$$

确实，若 $\rho(g)$ 的特征值为 λ_i ，外平方的特征值为 $i < j$ 的 $\lambda_i \lambda_j$ ，对称平方还包含各 λ_i^2 。展开 $(\sum_i \lambda_i)^2$ 即得两式。这些具体公式使用了复数域中二可逆的条件。

2.1.3 复表示的基本约定

类函数空间采用 Hermitian 内积

$$\langle f, h \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{f(g)} h(g). \quad (2.2)$$

它在第一变量共轭线性、第二变量线性，与本书向量空间内积的约定一致。若共轭类代表为 $g_1, \dots, g_r$ ，类大小为 c_j ，则

$$\langle f, h \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{j=1}^r c_j \overline{f(g_j)} h(g_j).$$

类函数空间可以包含完全不是特征标的函数；例如一个任意负常数不能是非零表示在单位元处的值。后面的正交基定理会表明，类函数成为实际特征标的条件是不可约基下的系数全部为非负整数。允许整数而不要求非负，则得到虚特征标。

若在特征 p 下直接取 k 值迹，平凡表示的 p 重直和与零表示都给出零函数，却不同构。特征整除群阶时，表示还可能不完全可约。这两种困难不能靠继续套用本章复数内积消除；模表示与 Brauer 特征标在第 8 章讨论。

2.2 正交关系

正交关系来自对线性映射取平均。平均后得到交织算子，Schur 引理迫使它在不同不可约表示之间为零，在相同表示上为标量。选取矩阵单位就把这个结论变成矩阵条目及特征标的求和公式。

2.2.1 矩阵系数正交关系

定理 2.2.1 (矩阵系数正交). 设 G 为有限群, ρ 与 σ 为 G 的不可约有限维复表示, 均在不变内积的标准正交基下写成酉矩阵。若它们不同构, 则对相应范围内的矩阵指标 i, a, j, b 有

$$\frac{1}{|G|} \sum_g \sigma(g)_{ia} \overline{\rho(g)_{jb}} = 0.$$

若采用同一个 d 维表示及同一组基, 则

$$\frac{1}{|G|} \sum_g \rho(g)_{ia} \overline{\rho(g)_{jb}} = \frac{1}{d} \delta_{ij} \delta_{ab}.$$

证明. 对 $T: V_\rho \rightarrow V_\sigma$ 定义

$$P(T) = \frac{1}{|G|} \sum_g \sigma(g) T \rho(g^{-1}).$$

重排求和表明它是交织算子。不同构时由 Schur 引理为零; 相同表示时为标量矩阵 cI , 取迹给出 $cd = \text{tr } T$, 故 $c = \text{tr } T/d$ 。取 T 为第 a, b 项为一的矩阵单位。平均式的 i, j 条目为所列求和, 因为酉性使 $\rho(g^{-1})_{bj} = \overline{\rho(g)_{jb}}$; 右边是 $\delta_{ab} \delta_{ij}/d$, 得到两式。□

这还说明同一不可约表示的 d^2 个矩阵系数线性无关: 它们互相正交, 且每个范数平方为 $1/d > 0$ 。矩阵系数一般不是类函数, 只有取对角元之和才得到特征标。

2.2.2 行正交与列正交

定理 2.2.2. 设 G 为有限群, V, W 为有限维复表示。则

$$\langle \chi_V, \chi_W \rangle_G = \dim_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(V, W).$$

特别地, 不可约特征标两两正交且范数为一。

证明. 在 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ 上, 对共轭作用 $T \mapsto \rho_W(g) T \rho_V(g^{-1})$ 取平均。平均算子 P 为投影, 像恰为不动空间 $\text{Hom}_G(V, W)$, 所以 $\text{tr } P$ 等于该空间维数。由命题 1.2.2 及张量迹公式, 该作用在 g 处的迹为 $\chi_W(g) \chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)} \chi_W(g)$ 。对 g 求平均即得等式。不可约时, 再用引理 1.4.1 和推论 1.4.2, 同构时 Hom 维数为一, 不同构时为零。□

推论 2.2.3. 设 G 为有限群, V 为 G 的有限维复表示, S_i 为两两不同构的不可约复表示, m_i 为非负整数。若 V 的不可约分解为 $\bigoplus_i S_i^{\oplus m_i}$, 则

$$\langle \chi_{S_i}, \chi_V \rangle_G = m_i, \quad \langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = \sum_i m_i^2.$$

因此非零 V 不可约当且仅当最后一数为一; 两个复表示同构当且仅当特征标相同。

证明. Maschke 定理保证存在分解; 迹在直和上相加, 所以 $\chi_V = \sum_i m_i \chi_{S_i}$ 。逐项用刚证的正交关系即可得到公式。重数唯一确定分解的同构类型, 而 $\sum_i m_i^2 = 1$ 恰好表示只有一个重数为一, 其他为零。□

这些是特征标表的行正交关系。列正交还需要知道不可约特征标已经填满类函数空间, 不能仅从一组正交向量直接假定它们是基。

2.2.3 不可约特征标与类函数空间的基

定理 2.2.4. 设 G 为有限群。其全部不可约复特征标组成复类函数空间 $\text{CF}(G)$ 关于特征标内积 $\langle, \rangle_G$ 的标准正交基。因而不可约复表示的同构类型数等于共轭类数。

证明. 由引理 1.4.4, 不可约类型只有有限个; 正交性已经给出线性无关。若类函数 f 与全部不可约特征标正交, 令

$$z_f = \sum_{g \in G} f(g^{-1})g \in \mathbb{C}[G].$$

因系数为类函数, z_f 位于群代数中心。它在任一不可约 S_i 上由 Schur 引理作用为 $a_i I$, 而

$$(\dim S_i) a_i = \sum_g f(g^{-1}) \chi_i(g) = |G| \langle \chi_i, f \rangle_G = 0.$$

故在每个不可约上作用为零。正则表示是这些不可约的直和, 所以 z_f 在正则表示上也为零; 作用于单位基向量得到 $z_f = 0$, 于是所有系数 $f(g^{-1}) = 0$ 。所以正交补为零, 给定正交组确为整个类函数空间的基。□

定理 2.2.5 (列正交). 设 G 为有限群, 全部不可约复特征标为 $\chi_1, \dots, \chi_r$ 。对 $g, h \in G$, 有

$$\sum_{i=1}^r \chi_i(g) \overline{\chi_i(h)} = \begin{cases} |C_G(g)|, & g, h \text{ 共轭}, \\ 0, & g, h \text{ 不共轭}. \end{cases}$$

证明. 取各共轭类代表 g_j , 令类大小 $c_j = |G|/|C_G(g_j)|$ 。由行正交, 方阵

$$U_{ij} = \sqrt{c_j/|G|} \chi_i(g_j)$$

满足 $U \bar{U}^T = I$ 。方阵的右逆也为左逆, 故 $\bar{U}^T U = I$, 写出各项再取复共轭即得不同代表的公式。同一共轭类的取值相同, 因此推广到任意 g, h 。□

行正交计算表示重数, 列正交计算中心化子阶。单位元的一列特别给出

$$\sum_i \chi_i(1)^2 = |G|.$$

这一平方和也可以从正则表示的具体分解得到, 下一节将保留那个更有结构的信息。

2.3 群代数的分解

正则表示包含全部不可约类型，并且它的迹很容易计算。两者结合，把不可约次数与群阶联系起来。随后再用中心幂等元从群代数中直接取出各个等型分量，说明特征标不仅记录数字，也能构造投影。

2.3.1 正则特征标

定理 2.3.1. 设 G 为有限群， $\chi_1, \dots, \chi_r$ 为全部不可约复特征标，次数为 $d_i = \chi_i(1)$ ，相应表示为 S_i 。正则特征标满足

$$\chi_{reg}(g) = \begin{cases} |G|, & g = 1, \\ 0, & g \neq 1, \end{cases} \quad \mathbb{C}[G] \simeq \bigoplus_i S_i^{\oplus d_i}.$$

特别地， $\sum_i d_i^2 = |G|$ 。

证明. 左平移 $x \mapsto gx$ 只有在 $g = 1$ 时有不动点，所以置换特征标给出第一式。由推论 2.2.3， S_i 在正则表示中的重数为

$$\langle \chi_i, \chi_{reg} \rangle_G = \overline{\chi_i(1)} = d_i.$$

于是得到分解。比较两侧维数即得平方和。 $\square$

如果已经构造了一组两两不同构的不可约表示，且它们的次数平方和等于群阶，那么列表已经完备：任何遗漏的不可约还会给正则分解增加一个正的平方。反过来，平方和吻合本身不能证明候选表示不可约，也不能排除列表重复；这两项需要先核验。

2.3.2 不可约表示维数的平方和

定理 2.3.2. 设 G 为有限群， $S_1, \dots, S_r$ 为全部不同构的不可约有限维复表示， $d_i = \dim_{\mathbb{C}} S_i$ ，记 ρ_i 为 S_i 的作用及其在 $\mathbb{C}[G]$ 上的线性延伸。由作用定义的复代数同态

$$\Phi : \mathbb{C}[G] \longrightarrow \prod_{i=1}^r \text{End}_{\mathbb{C}}(S_i), \quad a \longmapsto (\rho_i(a))_i$$

为同构。因此 $\mathbb{C}[G] \simeq \prod_i M_{d_i}(\mathbb{C})$ 。

证明. 各作用保持乘法和单位，故是代数同态。若 a 的全部像为零，它零化每个不可约，因而由正则分解也零化 $\mathbb{C}[G]$ ；作用于一得到 $a = 0$ 。所以 Φ 单射。两侧复维数分别为 $|G|$ 和 $\sum_i d_i^2$ ，由定理 2.3.1 相等，有限维线性代数使它满射。 $\square$

不选 S_i 的基时，右端写成自同态代数，作用同态本身有明确意义；写成具体矩阵代数则需要选基。一般底域下可能出现非平凡除代数，正特征整除群阶时还会失去半单性，所以这个复群代数公式不能原样用于所有域。

2.3.3 中心幂等元及块的半单情形

定理 2.3.3. 设 G 为有限群, $S_1, \dots, S_r$ 为全部不同构的不可约有限维复表示, 其特征标为 χ_i , $d_i = \chi_i(1)$. 令

$$e_i = \frac{d_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g^{-1})g. \quad (2.3)$$

则 $e_i \in \mathbb{C}[G]$ 是两两正交的中心幂等元, $\sum_i e_i = 1$, 并且在 G 的任意有限维复表示 V 中, $e_i V$ 正是类型 S_i 的等型分量. 理想 $\mathbb{C}[G]e_i$ 同构于 $M_{d_i}(\mathbb{C})$.

证明. 因系数在共轭类上常值, e_i 位于中心. 在不可约 S_j 上, 其作用为标量, 取迹得到

$$\text{tr } \rho_j(e_i) = d_i \langle \chi_i, \chi_j \rangle_G = d_i \delta_{ij}.$$

除以 d_j 可知它在 S_i 上为一, 在其他 S_j 上为零. 借定理 2.3.2 的单射性, 作用上的平方、相互乘积与和的等式在群代数中也成立. 对一般 V 用不可约分解, 得到等型投影. 最后 $\Phi(e_i)$ 仅在第 i 个矩阵因子为单位, 故相应理想恰是那个因子. $\square$

不能再写成两个非零正交中心幂等元之和的非零中心幂等元, 称为本原中心幂等元; 由上面的矩阵乘积分解, 各 e_i 恰为全部这类元素. 它们对应的直和因子称为群代数的**块 (block of a group algebra)**. 在当前复半单情形, 每个块只有一个不可约类型; 模特征情形的块可能包含多个简单类型, 不能把当前特点写成块的一般定义.

中心还可直接用共轭类和描述. 对每个共轭类 C , 令 $z_C = \sum_{g \in C} g$. 一个群代数元素与全部群元素交换, 当且仅当其系数在各共轭类上相同, 所以这些 z_C 构成中心的一组基. 中心幂等元基与类和基给出同一个空间的两种描述; 第五章将进一步考察类和乘法的整数系数.

2.4 特征标表

计算特征标表时, 先确定共轭类, 再从具体表示获得候选行, 用内积确认不可约性, 最后用次数平方和检查是否遗漏. 本节逐个完成这些步骤. 所有表示均在复数域上, 表中同时列出共轭类大小, 避免把普通欧氏内积误作特征标内积.

2.4.1 循环群、二面体群与四元数群

对 $C_m = \langle r \rangle$, 群交换, 所有不可约表示一维. 令 $\zeta = \exp(2\pi i/m)$, 则

$$\chi_j(r^a) = \zeta^{ja}, \quad 0 \leq j, a < m.$$

这些行互异, 已经有 m 个, 次数平方和为 m , 所以列表完整. 正交关系也可由等比求和 $\sum_{a=0}^{m-1} \zeta^{(i-j)a} = m\delta_{ij}$ 直接看到.

令 $D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$, 其中 $n \geq 3$, 下标为群阶. 取 $\zeta = \exp(2\pi i/n)$, 定义

$$\rho_j(r) = \begin{pmatrix} \zeta^j & 0 \\ 0 & \zeta^{-j} \end{pmatrix}, \quad \rho_j(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵满足群关系。若 $2j \not\equiv 0 \pmod{n}$, 两个旋转特征值不同, 而反射交换对应特征直线, 所以表示不可约。其特征标为

$$\chi_j(r^a) = \zeta^{ja} + \zeta^{-ja} = 2 \cos(2\pi ja/n), \quad \chi_j(r^a s) = 0.$$

j 与 $n-j$ 给出同一表示, 其他值不同。一维表示由 $r \mapsto a, s \mapsto b$ 给出, 关系要求 $a^n = 1, a^2 = b^2 = 1$ 。当 n 奇数时有两个一维表示和 $(n-1)/2$ 个二维表示; 当 n 偶数时有四个一维表示和 $(n-2)/2$ 个二维表示。两种情况下次数平方和均为 $2n$, 所以穷尽不可约类型。

旋转的共轭类为 $\{r^a, r^{-a}\}$, 相同元素时只算一个。反射的指数在共轭下相差偶数; 因此 n 奇数时反射成一个类, n 偶数时分成偶指数与奇指数两类。这给出将上述公式排成完整特征标表所需的全部列。

四元数群 $Q_8 = \{\pm 1, \pm \mathbf{i}, \pm \mathbf{j}, \pm \mathbf{k}\}$ 的四个一维表示来自商 $Q_8/\{\pm 1\} \simeq C_2 \times C_2$ 。另一个表示由

$$\rho(\mathbf{i}) = \begin{pmatrix} \mathbf{i} & 0 \\ 0 & -\mathbf{i} \end{pmatrix}, \quad \rho(\mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

给出。它们平方均为 $-I$, 且反交换, 满足四元数关系; 前一个的特征直线被后一个交换, 故不可约。次数平方和 $4 + 4 = 8$, 列表完整。表 2-1 把它与正方形对称群并排识别。

表 2-1: 八阶二面体群与四元数群的共同特征标数值

D_8 代表	1	r^2	r	s	rs
Q_8 代表	1	-1	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$
类大小	1	1	2	2	2
$\lambda_{1,1}$	1	1	1	1	1
$\lambda_{1,-1}$	1	1	1	-1	-1
$\lambda_{-1,1}$	1	1	-1	1	-1
$\lambda_{-1,-1}$	1	1	-1	-1	1
χ	2	-2	0	0	0

2.4.2 S_3 、 S_4 与 A_4 的特征标表

对 S_3 , 共轭类由轮换型给出, 大小为 1, 3, 2。平凡与符号表示给出两行; 三点置换表示减去平凡直和项, 得到次数二的表示, 特征标为 2, 0, -1。其范数平方为 $(4+2)/6 = 1$, 故不可约, 且平方和 $1 + 1 + 4 = 6$ 已穷尽, 得到表 2-2。

对 S_4 , 五种轮换型的类大小为 1, 6, 3, 8, 6。四点置换表示减去平凡项, 得到标准表示 W , 其特征标为 3, 1, -1, 0, -1。直接按类大小计算范数平方为一。与符号表示张量得到另一不同的次数三表示。

表 2-2: S_3 的特征标表

代表	1	(12)	(123)
类大小	1	3	2
1	1	1	1
sgn	1	-1	1
χ	2	0	-1

集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 分成两个无序二元组共有三种方式。 S_4 在这三种配对上的作用给出满同态 $S_4 \rightarrow S_3$, 核为

$$\{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

拉回复次数二标准表示仍不可约：一个拉回不变子空间也是整个像群 S_3 的不变子空间。配对置换的迹减去一给出这一行的值 $2, 0, 2, -1, 0$ 。加上平凡、符号两行，平方和 $1 + 1 + 9 + 9 + 4 = 24$ ，得到全部不可约，见表 2-3。

表 2-3: S_4 的特征标表

代表	1	(12)	(12)(34)	(123)	(1234)
类大小	1	6	3	8	6
1	1	1	1	1	1
sgn	1	-1	1	1	-1
χ_W	3	1	-1	0	-1
χ_W^{sgn}	3	-1	-1	0	1
ψ	2	0	2	-1	0

对 A_4 ，三个双换位组成一个类。三轮换在 A_4 中的中心化子仍为它生成的三阶群，所以每类大小四，八个三轮换分成两个类。一轮换与其逆不共轭于 A_4 ：在 S_4 中把 (123) 变为逆的元素都在奇置换 (23) 乘其三阶中心化子的陪集中。商 $A_4/V_4 \simeq C_3$ 给出三个一维特征标。 S_4 标准表示限制后取值 $3, -1, 0, 0$ ，范数平方为 $(9 + 3)/12 = 1$ ，故仍不可约。平方和为 $3 + 9 = 12$ ，见表 2-4，其中 $\omega = \exp(2\pi i/3)$ 。

2.4.3 特征标表的信息与局限

从次数列及其平方和可以恢复群阶；列的范数给出中心化子阶，从而给出共轭类大小。一维表示的数目等于交换化的阶：交换化的复群代数全部不可约都一维，再用正则分解即可得到这一计数。特征标表也决定任意两个已知表示的张量积分解，只需逐点相乘后与各不可约行取内积。

命题 2.4.1. 设 G 为有限群， $\rho: G \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为 d 维复表示，其特征标为 χ 。则

$$\ker \rho = \{g \in G \mid \chi(g) = d\}.$$

表 2-4: A_4 的特征标表

代表	1	(12)(34)	(123)	(132)
类大小	1	3	4	4
1	1	1	1	1
λ	1	1	ω	ω^2
λ^2	1	1	ω^2	ω
θ	3	-1	0	0

证明. 一个方向直接取迹。反过来, $\rho(g)$ 可对角化, 特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 均在单位圆上。若其和为正实数 d , 则 $\sum_i \operatorname{Re} \lambda_i = d$, 而每项至多为一, 所以每项实部都为一, 即所有 $\lambda_i = 1$ 。可对角化性便使 $\rho(g) = I$ 。零表示的核为全群, 该公式也成立。□

但普通特征标表不能确定群到同构。表 2-1 中的两群有相同表, D_8 却有五个阶二元素, 而 Q_8 只有一个。一个表的列给出共轭类上的函数值, 不自动包含各类取平方后落到哪一列的全部信息。若要计算(2.1)中的平方类, 就须再有这些群结构数据。

本章小结

迹与群的共轭作用相容, 所以特征标落在类函数空间中。平均交织算子给出正交性, 中心群代数元素的作用再证明完备性。不可约特征标因此构成一组可用于计算的基, 分解重数就是内积, 列的范数则给出中心化子阶。

正则表示中每个不可约的重数等于它的次数, 这既给出平方和, 也给出复群代数的矩阵分解。中心幂等元把数值信息重新变成作用在任意表示上的投影; 同一个群可以用共轭类和或用不可约类型组织它的中心。

制作特征标表时, 需要计算共轭类大小, 证明候选表示不可约, 并核对它们是否穷尽全部不可约类型。特征标表能判断复表示同构, 却不能单独确定群同构; 下一章将从子群构造表示, 为得到新的特征标提供比直接猜表更系统的方法。

习题

习题 2.1. 设有限群的 $d > 0$ 维复表示特征标为 χ 。证明 $|\chi(g)| \leq d$, 且等号成立当且仅当 $\rho(g)$ 为标量。注意这与 $\chi(g) = d$ 的核判据不同。

解. 特征值 λ_i 均在单位圆上, 三角不等式给出界。若和的模为 d , 令其辐角为 θ , 则 $\sum_i \operatorname{Re}(e^{-i\theta} \lambda_i) = d$, 各项至多为一, 故各项均为一。于是全部特征值相同; $\rho(g)$ 可对角化, 故为标量。反向标量的模必为一, 所以等号成立。只有这个标量是一时, 才有 $\chi(g) = d$ 。□

习题 2.2. 令 V 为 S_3 的二维不可约复表示。分解 $V \otimes V$ 、 $\Lambda^2 V$ 和 $\operatorname{Sym}^2 V$ 。

解. 在单位元、换位、三轮换三列, $\chi_V = (2, 0, -1)$, 所以张量特征标为 $(4, 0, 1)$. 与三条不可约行取内积, 重数均为一, 故

$$V \otimes V \simeq 1 \oplus \text{sgn} \oplus V.$$

外平方为行列式表示. 二维标准表示的行列式等于三点置换表示的行列式, 因为删去的平凡直和项行列式为一, 所以为符号表示. 于是 $\text{Sym}^2 V \simeq 1 \oplus V$. $\square$

习题 2.3. 令 W 为 S_4 的三维标准复表示, ψ 为经 $S_4/V_4 \simeq S_3$ 拉回的二维不可约表示. 分解 $W \otimes W$.

解. 按正文五列顺序, 张量特征标为 $(9, 1, 1, 0, 1)$. 它等于 $1 + \chi_W + \chi_W \text{sgn} + \psi$, 逐列相加可核验. 因此

$$W \otimes W \simeq 1 \oplus W \oplus (W \otimes \text{sgn}) \oplus \psi.$$

各项次数相加为九; 同构由特征标判据给出, 不只是维数比较. $\square$

习题 2.4. 令 θ 为 A_4 的三维不可约特征标, λ 为非平凡一维特征标. 求 $\theta\lambda$ 和 θ^2 的不可约展开.

解. θ 在两个三轮换类为零, 另两列 $\lambda = 1$, 所以 $\theta\lambda = \theta$. 由 $\omega + \omega^2 = -1$, 逐列有

$$\theta^2 = 1 + \lambda + \lambda^2 + 2\theta.$$

在单位元与双换位处右端分别为九与一, 在三轮换处为零, 恰为左端. 系数为实际分解重数. $\square$

习题 2.5. 将 S_4 的五个不可约复表示限制到 A_4 , 求其分解.

解. 平凡和符号表示都限制为平凡表示. 两个三维表示在偶置换上取值相同, 都限制为 θ . 二维表示的限制在 A_4 四列为 $(2, 2, -1, -1)$, 正好是 $\lambda + \lambda^2$. 这些等式结合特征标同构判据给出全部分解. 限制可以使不同的不可约表示合并, 也可以使一个不可约表示分裂. $\square$

习题 2.6. 在 $\mathbb{C}[S_3]$ 中, 记 $c = (123)$. 写出平凡、符号和二维表示的三个中心幂等元, 说明二维投影为什么不含换位项.

解. 令 T 为三个换位的群代数和. 由(2.3),

$$e_1 = \frac{1}{6}(1 + T + c + c^2), \quad e_{\text{sgn}} = \frac{1}{6}(1 - T + c + c^2), \quad e_V = \frac{1}{3}(2 - c - c^2).$$

它们和为一. 二维特征标在换位处为零, 所以投影中不出现那些基向量. 把 e_V 作用于三点置换表示时, 像为系数和为零的平面, 核为常数直线. $\square$

习题 2.7. 对 $C_m = \langle r \rangle$ 及本原 m 次单位根 ζ , 证明

$$e_j = \frac{1}{m} \sum_{a=0}^{m-1} \zeta^{-ja} r^a$$

满足 $re_j = \zeta^j e_j$, $e_j e_\ell = \delta_{j\ell} e_j$, 并求 r^a 关于这些元素的展开.

解. 将求和指标平移一位, 得到第一式。继而 $e_j e_\ell = m^{-1} \sum_a \zeta^{-ja} \zeta^{\ell a} e_\ell = \delta_{j\ell} e_\ell$, 其中用有限等比求和。又 $\sum_j e_j = 1$, 乘以 r^a 得

$$r^a = \sum_{j=0}^{m-1} \zeta^{ja} e_j.$$

这些公式是群代数基与不可约分量坐标之间的有限 Fourier 变换¹。 $\square$

习题 2.8. 在不可约酉矩阵表示 ρ_i 中定义

$$u_{ab}^{(i)} = \frac{d_i}{|G|} \sum_g \rho_i(g^{-1})_{ba} g.$$

证明它在第 i 个矩阵块中的像是矩阵单位 E_{ab} , 在其他块为零, 并求这些元素的乘法。

解. 第 j 个像的 u, v 条目为 $d_i |G|^{-1} \sum_g \overline{\rho_i(g)_{ab}} \rho_j(g)_{uv}$ 。由矩阵系数正交, 结果为 $\delta_{ij} \delta_{ua} \delta_{vb}$ 。群代数作用同态是单射, 故矩阵单位的乘法在原代数中成立:

$$u_{ab}^{(i)} u_{cd}^{(j)} = \delta_{ij} \delta_{bc} u_{ad}^{(i)}, \quad e_i = \sum_a u_{aa}^{(i)}.$$

$\square$

习题 2.9. 证明有限群全部不可约复表示的核之交为单位子群。由此说明任意有限群都有忠实完全可约复表示。

解. 若 g 落在全部核中, 它在全部不可约上恒等, 因而在正则表示上恒等。正则作用忠实, 所以 $g = 1$ 。有限个不可约表示各取一份的直和, 其核恰为这些核之交, 故给出忠实完全可约表示; 也可以直接取正则表示。 $\square$

习题 2.10. 设 χ_i 遍历有限群 G 的不可约复特征标。证明 $g \in Z(G)$ 当且仅当 $|\chi_i(g)| = \chi_i(1)$ 对每个 i 成立。

解. 中心元素在每个不可约上为标量, 故满足模长条件。反向由习题 2.1, 模长等式使各 $\rho_i(g)$ 为标量矩阵。它们与所有 $\rho_i(h)$ 交换; 借群代数矩阵分解的单射性, 得到 $gh = hg$ 对全部 h 成立, 所以 g 在中心。 $\square$

习题 2.11. 对 D_8 与 Q_8 的二维不可约复表示, 分别求对称平方中平凡表示的重数, 解释为什么两群普通特征标表相同却仍得到不同答案。

解. 按表 2-1 的列顺序, 原特征标均为 $(2, -2, 0, 0, 0)$ 。在 D_8 中, 旋转类平方为 r^2 , 两反射类平方为一; 因此对称平方特征标为 $(3, 3, -1, 1, 1)$, 平均为一。在 Q_8 中, 三个非中心类平方均为 -1 , 故对称平方特征标为 $(3, 3, -1, -1, -1)$, 平均为零。平方类映射不同, 而它不是这张普通数值表自身包含的数据。 $\square$

习题 2.12. 对 D_{10} , 记反射符号一维表示为 ε , 二维不可约为 V_1, V_2 , 其旋转特征标分别为 $\zeta^a + \zeta^{-a}$ 、 $\zeta^{2a} + \zeta^{-2a}$ 。分解 $V_1^{\otimes 2}$ 和 $V_1 \otimes V_2$ 。

¹傅里叶 (Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830), 法国数学家、物理学家, 研究热传导并发展三角级数方法。

解. 在旋转上, 第一乘积为 $\zeta^{2a} + \zeta^{-2a} + 2$, 在反射上为零; 常数旋转值二、反射值零恰是 $1 + \varepsilon$, 故 $V_1^{\otimes 2} \simeq V_2 \oplus 1 \oplus \varepsilon$. 第二乘积在旋转上为 $\zeta^{3a} + \zeta^{-3a} + \zeta^a + \zeta^{-a}$, 因模五有 $3 \equiv -2$, 等于 $\chi_2 + \chi_1$, 反射上也相等. 因此 $V_1 \otimes V_2 \simeq V_1 \oplus V_2$. $\square$

习题 2.13. 求 S_4 作用于四元素集合全部二元子集的置换表示的不可约分解.

解. 固定二元子集的个数在五个共轭类上分别为 6, 2, 2, 0, 0: 换位和双换位都固定其对应的两块二元集合, 三轮换和四轮换没有固定二元子集. 该行等于 $1 + \chi_W + \psi$, 所以置换表示为 $1 \oplus W \oplus V_\psi$. 维数为六, 三个重数均为一. $\square$

习题 2.14. 在 S_3 的三列上给类函数 $f = (1, 0, 1)$. 证明它处处取非负整数值, 却不是实际复表示的特征标, 也不是虚特征标.

解. 计算得 $\langle 1, f \rangle = \langle \text{sgn}, f \rangle = 1/2$, 而与二维行的内积为零. 因此 $f = \frac{1}{2}(1 + \text{sgn})$. 实际特征标的不可约系数须为非负整数, 虚特征标须为整数; 两个条件均不满足. 函数取值的整数性不能代替基下系数的整数性. $\square$

习题 2.15. 设 G, H 为有限群. 证明 $G \times H$ 的全部不可约复表示为外张量 $V_i \boxtimes W_j$, 其中 (g, h) 作用为 $\rho_i(g) \otimes \sigma_j(h)$.

解. 外张量特征标为 $\chi_i(g)\psi_j(h)$. 内积的有限双和分离成两因子, 故这些行两两正交且范数一, 从而不可约并互不同构. 其次

$$\sum_{i,j} (\dim V_i \dim W_j)^2 = \left(\sum_i (\dim V_i)^2 \right) \left(\sum_j (\dim W_j)^2 \right) = |G| \cdot |H|.$$

平方和判据说明没有遗漏. $\square$

习题 2.16. 写出 $C_2 \times C_2$ 的全部不可约复表示, 证明没有一个忠实, 但其中两个不同的非平凡表示的直和忠实.

解. 设生成元为 a, b . 四个不可约由 $(a, b) \mapsto (\epsilon, \delta)$, $\epsilon, \delta \in \{\pm 1\}$ 给出. 平凡表示的核为全群, 三个非平凡表示的核分别为三个二阶子群, 均不忠实. 任意两个不同的二阶子群交为单位群, 所以对应两个非平凡表示的直和核为一, 因而忠实. $\square$

习题 2.17. 在 $\mathbb{C}[Q_8]$ 中用 z 表示群元素 -1 对应的基向量. 证明 $e = (1 - z)/2$ 是二维不可约表示对应的中心幂等元, 并写出该块的一组基.

解. 四个一维表示在 z 处均为一, 二维表示在 z 处为 $-I$. 所以 e 在前四者上为零, 在二维表示上为一, 正是所求投影. 块由 e, ei, ej, ek 生成, 它们展开后分别支撑在互不相交的四对 $\{g, zg\}$ 上, 故线性无关. 块维数四, 与 $M_2(\mathbb{C})$ 的维数相同; 注意公式中的标量负号与基向量 z 是不同对象. $\square$

习题 2.18. 求 S_3 在互不相同的有序字母对上的置换表示分解, 并以不动空间维数核对轨道数.

解. 六个有序对上作用传递, 固定某一有序对的群元素只能同时固定两个字母, 从而为单位. 因此这是正则作用. 也可逐项计算特征标为 $(6, 0, 0)$, 分解为 $1 + \text{sgn} + 2\chi_V$. 平凡表示重数为一, 不动空间一维, 和只有一个轨道相符. $\square$

第三章 诱导表示与 Frobenius 互反律

本章由群代数上的张量构造诱导表示，证明 Frobenius 互反律和诱导特征标公式，并研究传递性、张量恒等式及诱导与余诱导的关系。

本章目标

- 说明诱导张量积中的左右模结构与平衡关系，选取陪集代表写出作用矩阵。
- 写出 Frobenius 互反同构及其逆，并用它计算诱导、限制中的不可约重数。
- 证明诱导特征标公式，利用固定点与轨道数计算置换特征标。
- 从循环子群诱导构造二面体群的不可约表示，辨认可约和重复同构的情形。
- 对传递性、张量恒等式与诱导—余诱导同构检查良定义、等变性和自然性，说明有限指数在哪里起作用。

设 G 为有限群， $H \leq G$ ，而 W 是域 k 上的 H -表示。想让 G 中的元素也作用在 W 所生成的空间上，可以先写形式符号 $g \otimes w$ ，再要求 $gh \otimes w = g \otimes hw$ 。这条关系把同一左陪集中的重复写法识别起来；选定左陪集代表后，所得空间便是若干份 W 的直和。群元素怎样在这些份之间移动，可由陪集分解直接算出。更重要的是，从这个空间到一个 G -表示的等变映射，只需在 $1 \otimes W$ 上给出适合的 H -等变映射。这正是诱导与限制之间互反关系的来源。

本章使用群代数模、线性映射、张量积及前两章的复特征标理论。群代数上的张量积关系和伴随公式将在本章具体推导。代数构造均先在任意域上进行，涉及特征标内积、重数与不可约分解时再明确转到复数域。

陪集代表上的数据便于计算矩阵和迹，从 $1 \otimes W$ 出发的映射则便于证明泛性质与自然同构。Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》讨论诱导、诱导特征标与互反律 [4, Sections 5.8–5.10, pp. 105–109]，其函数模型与这里张量模型的关系在第 3.4 节说明。

3.1 限制与诱导

一个群的作用限制到子群上，不需要增加任何数据。反向的任务却不能仅靠给原空间补写几个矩阵来完成：子群的表示未必能在同一空间上延拓。诱导的办法是允许空间增大，把子群已给定的作用作为关系保留下来，再让整个群自由地作用。本节先把这些关系写成商空间，随后选择陪集代表得到可计算的模型。以下构造适用于任意域，暂不要求群阶在域中可逆。

3.1.1 群代数上的扩张标量

定义 3.1.1. 设 k 为域, G 为有限群, $H \leq G$ 。若 V 为左 $k[G]$ -模, 把作用仅限于 H , 所得左 $k[H]$ -模称为 V 的**限制表示** (restricted representation), 记为 $\text{Res}_H^G V$ 。若 W 为左 $k[H]$ -模, 把 $k[G]$ 以左右乘法看成 $(k[G], k[H])$ -双模, 则

$$\text{Ind}_H^G W := k[G] \otimes_{k[H]} W, \quad g(a \otimes w) = ga \otimes w$$

给出一个左 $k[G]$ -模, 称为 W 的**诱导表示** (induced representation)。

这里的张量积可以直接构造如下。先取域上的张量积 $k[G] \otimes_k W$, 再模去所有

$$ah \otimes w - a \otimes hw \quad (a \in k[G], h \in H, w \in W)$$

生成的线性子空间。群元素生成 $k[H]$, 所以商空间中的关系也包含 $ab \otimes w = a \otimes bw$, 其中 $b \in k[H]$ 。左乘 g 把上述关系送到同样形式的关系, 因而作用良定义; $g_1(g_2(a \otimes w)) = (g_1 g_2)a \otimes w$, 且单位元作用为恒等。

这一商构造还说明怎样从诱导空间定义线性映射。一个 k -双线性映射 $B : k[G] \times W \rightarrow U$ 能唯一写成 $B(a, w) = F(a \otimes w)$, 当且仅当

$$B(ab, w) = B(a, bw) \quad (b \in k[H]).$$

必要性来自张量关系; 充分性来自 B 所诱导的域上张量积映射在被模去的子空间上为零。后面的同构都将实际检查这条平衡关系。

若 $u : W \rightarrow W'$ 为 H -同态, 则 $a \otimes w \mapsto a \otimes u(w)$ 保持关系, 并与 G 作用交换。于是诱导不只作用于表示, 也作用于表示之间的同态; 它保持恒等映射与复合。限制则把一个 G -同态原样看成 H -同态。这就是后文把两者称为函子的具体含义。

3.1.2 陪集模型

选择左陪集 G/H 的一组代表 T 。每个 $g \in G$ 唯一写成 th , 其中 $t \in T$ 、 $h \in H$ 。所以 $k[G] = \bigoplus_{t \in T} tk[H]$ 是右 $k[H]$ -模的直和分解; 这里使用左陪集, 正是因为张量积中群代数位于右模一侧。

命题 3.1.2. 设 k 为域, G 为有限群, $H \leq G$, W 为左 $k[H]$ -模, T 为左陪集 G/H 的代表集。映射

$$\bigoplus_{t \in T} W \longrightarrow \text{Ind}_H^G W, \quad (w_t)_{t \in T} \mapsto \sum_{t \in T} t \otimes w_t$$

是 k -线性同构。在此模型中, 若 $gt = t'h$, 其中 $t' \in T$ 、 $h \in H$, 则 g 把第 t 个分量中的 w 送到第 t' 个分量中的 hw 。

证明. 把 $a \in k[G]$ 唯一写为 $a = \sum_{t \in T} tb_t$, $b_t \in k[H]$ 。给 (a, w) 指定向量族 $(b_t w)_t$, 得到一个双线性映射。把 a 换成 ab 时, 各系数变为 $b_t b$, 所以这与把 w 换成 bw 的结果相同。它因而通过张量积, 给出所述映射的逆。作用公式来自 $g(t \otimes w) = gt \otimes w = t'h \otimes w = t' \otimes hw$ 。□

代表元的改变只改变坐标, 不改变诱导表示。例如把 t 换成同一陪集中的 th_t , 则旧坐标 w_t 在新代表下应写成 $h_t^{-1}w_t$, 因为 $t \otimes w_t = th_t \otimes h_t^{-1}w_t$ 。这条变换也解释了为何不能把各陪集上的空间看成带有预先指定基的副本。

推论 3.1.3. 设 G 为有限群, $H \leq G$, k 为任意域。诱导函子 $\text{Ind}_H^G : k[H]\text{-Mod} \rightarrow k[G]\text{-Mod}$ 与限制函子 $\text{Res}_H^G : k[G]\text{-Mod} \rightarrow k[H]\text{-Mod}$ 都保持短正合列, 其中各模范畴均取左模。诱导还保持直和, 并且对每个左 $k[H]$ -模 W , $\text{Ind}_H^G W = 0$ 当且仅当 $W = 0$ 。证明。限制不改变底向量空间和底映射, 所以核、像不变。选定 T 后, 诱导一个同态就是在每个 t 分量上应用该同态; 核与像均逐分量计算。因此短正合性保持, 直和也可逐分量交换。代表集非空, 故诱导空间为零恰好要求每个副本 W 为零。 $\square$

3.1.3 诱导表示的维数与显式矩阵

若 W 有限维, 由命题 3.1.2 立即得到

$$\dim_k \text{Ind}_H^G W = [G : H] \dim_k W. \quad (3.1)$$

更具体地, 设 $T = \{t_1, \dots, t_m\}$, $w_1, \dots, w_d$ 是 W 的基。按 $t_i \otimes w_j$ 排列诱导空间的基。对固定 g , 写

$$gt_i = t_{\sigma_g(i)} h_i(g), \quad h_i(g) \in H.$$

若 ρ 为 W 的矩阵表示, 则 g 的矩阵在第 i 个块列中仅有一个非零块, 位于第 $\sigma_g(i)$ 个块行, 等于 $\rho(h_i(g))$ 。这给出了有限次群乘法和子群矩阵计算构成的具体程序。

例 3.1.4. 在 $G = S_3 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$ 中, 取 $H = \langle r \rangle$ 。设 k 为域, $\lambda \in k^\times$ 满足 $\lambda^3 = 1$, 并令 $W = kw$, $rw = \lambda w$ 。选择左陪集代表 $1, s$, 诱导表示在 $1 \otimes w, s \otimes w$ 下的矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

确实, $rs = sr^{-1}$, 而 s 交换两个代表。矩阵满足 $R^3 = S^2 = I$ 及 $SRS = R^{-1}$, 与群关系一致。若 $k = \mathbb{C}$ 、 $\lambda \neq 1$, 则 R 有两个不同特征值。任何一维不变子空间都须为其坐标特征线, 但 S 交换两条线, 故该二维表示不可约。取 $\lambda = 1$ 时则得到 S_3/H 上的置换表示; 在复数域上, 它分解为平凡表示与符号表示。

最后注意, “诱导”与“延拓”回答不同问题。延拓要求在原空间上定义整个 G 的作用; 诱导的空间则按(3.1)扩大。上例中 $\lambda \neq 1$ 的一维 H -表示不能在一维空间中延拓: 若能延拓, 标量之间交换, 关系 $srs = r^{-1}$ 将迫使 $\lambda = \lambda^{-1}$, 与 λ 为三次本原单位根矛盾。

3.2 Frobenius 互反律

诱导空间虽然比原空间大, 但从它出发的等变映射不需要逐个指定陪集上的取值。只要知道 $1 \otimes W$ 上的取值, 整个映射就由 G 等变性确定。本节把这件事写成一个自然同构; 转到复数域后, 它又把诱导表示的分解重数变为子群上的计算。

3.2.1 Hom 空间伴随

定理 3.2.1 (Frobenius 互反律). 设 k 为域, G 为有限群, $H \leq G$, W 为左 $k[H]$ -模, V 为左 $k[G]$ -模. 存在对 W, V 自然的 k -线性同构

$$\mathrm{Hom}_{k[G]}(\mathrm{Ind}_H^G W, V) \cong \mathrm{Hom}_{k[H]}(W, \mathrm{Res}_H^G V). \quad (3.2)$$

它把 F 送到 $w \mapsto F(1 \otimes w)$; 逆映射把 u 送到 $a \otimes w \mapsto a \cdot u(w)$ 。

证明. 若 F 为 G -同态, 则对 $h \in H$,

$$F(1 \otimes hw) = F(h \otimes w) = hF(1 \otimes w),$$

所以其限制确为 H -同态. 反之, 若 u 为 H -同态, 则双线性映射 $(a, w) \mapsto a \cdot u(w)$ 满足

$$ab \cdot u(w) = a \cdot u(bw) \quad (b \in k[H]),$$

故通过张量积; 所得 F_u 与左乘 G 的作用交换。

从 u 出发再限制, 得到 $F_u(1 \otimes w) = u(w)$ 。从 F 出发再延伸, 则 $a \cdot F(1 \otimes w) = F(a \otimes w)$, 恢复 F 。因此两映射互逆. 记正向同构为 Φ 。若 $\alpha: W' \rightarrow W$ 为 H -同态, $\beta: V \rightarrow V'$ 为 G -同态, 则

$$\Phi(\beta \circ F \circ \mathrm{Ind} \alpha) = \beta \circ \Phi(F) \circ \alpha.$$

确实, 两边在 w' 处的取值都是 $\beta F(1 \otimes \alpha(w'))$ 。这说明同构分别与 W 变量中的前复合及 V 变量中的后复合相容, 即具有两变量自然性。□

上述结果称为 **Frobenius 互反律** (Frobenius reciprocity)。用伴随的语言, 诱导是限制的左伴随; (3.2) 及其两条具体公式给出了这一关系的含义。

其中有两种值得记住的映射. 取 $V = \mathrm{Ind}_H^G W$, 恒等映射对应于 H -同态 $w \mapsto 1 \otimes w$ 。取 $W = \mathrm{Res}_H^G V$, 恒等映射则对应于 G -同态

$$k[G] \otimes_{k[H]} V \longrightarrow V, \quad g \otimes v \longmapsto gv.$$

后一映射总是满射, 因为每个 v 都是 $1 \otimes v$ 的像; 但它通常不是同构, 维数已经能看出这一点。

3.2.2 特征标内积形式

现在把基域改为 $\mathbb{C}$, 并假定表示有限维. 沿用定理 2.2.2 的约定: 类函数内积对第一变量共轭线性, 即

$$\langle \alpha, \beta \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\alpha(g)} \beta(g), \quad \langle \chi_U, \chi_V \rangle_G = \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[G]}(U, V).$$

限制表示的特征标是函数的限制; 把 $\mathrm{Ind}_H^G W$ 的特征标简记为 $\mathrm{Ind}_H^G \chi_W$ 。下一节将给出只用 χ_W 的函数值计算它的公式。

推论 3.2.2. 设 G 为有限群, $H \leq G$, W 为有限维复 H -表示, V 为有限维复 G -表示。则

$$\langle \text{Ind}_H^G \chi_W, \chi_V \rangle_G = \langle \chi_W, \text{Res}_H^G \chi_V \rangle_H. \quad (3.3)$$

同时有交换两个变量后的等式 $\langle \chi_V, \text{Ind}_H^G \chi_W \rangle_G = \langle \text{Res}_H^G \chi_V, \chi_W \rangle_H$ 。

证明. 定理 2.2.2 把第一条等式两边分别化为(3.2)两侧的 Hom 空间维数, 而定理 3.2.1 给出其同构。第二条等式由第一条取复共轭得到; 不能在未说明内积约定时直接调换参数。□

3.2.3 重数计算

若 U 为不可约复 G -表示, 则由 Maschke 定理及 Schur 引理, 它在 $\text{Ind}_H^G W$ 中的重数等于

$$[\text{Ind}_H^G W : U] = \langle \chi_W, \text{Res}_H^G \chi_U \rangle_H. \quad (3.4)$$

方括号在此表示直和分解中的重数。若 W 也不可约, 右边就是 W 在 $\text{Res}_H^G U$ 中的重数。诱导与限制因此不是互逆操作, 却共享同一张重数表的两个方向。

例 3.2.3. 取 $G = S_3$, $H = \langle (12) \rangle$, 在复数域上计算。设 $\mathbf{1}, \varepsilon$ 分别为 G 的平凡表示与符号表示, U 为自然置换表示 $\mathbb{C}^3$ 中坐标和为零的二维子空间。其特征标在单位元、换位、三轮换上的值依次为 $2, 0, -1$: 置换矩阵的迹等于固定坐标数, 再减去常向量子空间上的迹 1 即得。于是

$$\langle \chi_U, \chi_U \rangle_G = \frac{4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1}{6} = 1,$$

故由推论 2.2.3, U 不可约。又 $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6$, 由定理 2.3.1, 这三个表示穷尽 S_3 的不可约表示。

记 H 的非平凡一维表示为 η 。限制到 H 后, $\mathbf{1}, \varepsilon, U$ 分别成为 $\mathbf{1}, \eta, \mathbf{1} \oplus \eta$ 。对 U , 这是因为换位的平方为 1, 在复数域上可对角化, 且迹为 0, 两个特征值只能各为 $1, -1$ 一次。(3.4) 于是给出

$$\text{Ind}_H^G \mathbf{1} \cong \mathbf{1} \oplus U, \quad \text{Ind}_H^G \eta \cong \varepsilon \oplus U.$$

两边维数均为 3, 也与(3.1)一致。

还有一个常用的特殊情形。若 $W = \mathbf{1}_H$, 则

$$[\text{Ind}_H^G \mathbf{1}_H : U] = \dim_{\mathbb{C}} U^H, \quad U^H = \{u \in U : hu = u \text{ 对所有 } h \in H\}.$$

因为从平凡表示到 $\text{Res}_H^G U$ 的同态完全由一个 H -不变向量决定。这一公式把置换表示中的重数与子群固定向量联系起来, 并不要求先列出整张特征标表。

3.3 诱导特征标

陪集模型不仅能写出矩阵, 也能直接求迹。一个群元素把不同陪集上的分量互相交换时, 这些分量对迹没有贡献; 只有固定陪集才留下对角块。以下涉及特征标内积与不可约分解时均在复数域上工作。

3.3.1 诱导特征标公式

定理 3.3.1 (诱导特征标公式). 设 G 为有限群, $H \leq G$, W 为有限维复 H -表示, 特征标为 ψ . 对左陪集 G/H 的任一代表集 T , $\text{Ind}_H^G W$ 的特征标满足

$$(\text{Ind}_H^G \psi)(g) = \sum_{\substack{t \in T \\ t^{-1}gt \in H}} \psi(t^{-1}gt) \quad (3.5)$$

$$= \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}gx \in H}} \psi(x^{-1}gx), \quad g \in G. \quad (3.6)$$

证明. 由命题 3.1.2, g 把第 t 个分量送到第 t' 个分量, 其中 $gt = t'h$. 若 $t' \neq t$, 该块不在对角线上, 对迹贡献为零. 若 $t' = t$, 则 $h = t^{-1}gt \in H$, 其对角块就是 h 在 W 上的作用, 迹为 $\psi(t^{-1}gt)$. 逐块相加得到第一式.

将 t 换成同一左陪集中的 th 后, 共轭元素变成 $h^{-1}t^{-1}gth$. 条件是否属于 H 不变, 而 ψ 是 H 上的类函数, 所以函数值不变. 对整个群求和时, 每个左陪集恰有 $|H|$ 个元素, 除以 $|H|$ 即得第二式. $\square$

第一式的逐块求迹论证在任意域上也成立. 第二式含有除以 $|H|$ 的运算, 在特征整除 $|H|$ 时不能直接作为域内公式使用. 本节固定复数域, 因而没有这一障碍. 其标准形式可对照 Etingof 等人的 Theorem 5.9.1 及 Remark 5.9.2[4, Section 5.9, pp. 106–107]; 该书使用右陪集函数模型, 把代表元取逆便得到这里的方向.

(3.6)也适用于任意复类函数 $\alpha: H \rightarrow \mathbb{C}$, 并定义一个线性映射 Ind_H^G 到 G 的类函数空间. 把 g 换成 gyg^{-1} , 再把求和变量 x 换成 yx , 可见所得函数对共轭不变. 对任意 G 上的类函数 β , 有限求和换序给出

$$\begin{aligned} \langle \text{Ind}_H^G \alpha, \beta \rangle_G &= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \sum_{x \in G} \sum_{h \in H} \overline{\alpha(h)} \beta(xhx^{-1}) \\ &= \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \overline{\alpha(h)} \beta(h) = \langle \alpha, \text{Res}_H^G \beta \rangle_H. \end{aligned}$$

这证明了(3.3)对所有复类函数仍成立, 不必先把它们写成特征标的线性组合.

公式还给出两个快速检查: 若 g 不共轭于 H 中任何元素, 则诱导特征标在 g 处为零; 在 $g = 1$ 处, 它的值为 $[G:H]\psi(1)$, 恰是诱导空间的维数.

3.3.2 置换特征标

命题 3.3.2. 设有限群 G 作用在有限集 X 上, $\mathbb{C}[X]$ 以 X 为基并由 G 置换这组基. 其置换特征标 (permutation character) π_X 满足

$$\pi_X(g) = |X^g|, \quad X^g = \{x \in X : gx = x\}, \quad g \in G.$$

若 $H \leq G$ 且 $X = G/H$ 带左乘作用, 则 $\mathbb{C}[X] \cong \text{Ind}_H^G \mathbf{1}_H$, 其中 $\mathbf{1}_H$ 为平凡复 H -表示. 此外, 记 $\mathbf{1}_G$ 为平凡复 G -表示的特征标, 则

$$\langle \mathbf{1}_G, \pi_X \rangle_G = |G \setminus X|, \quad \langle \pi_X, \pi_X \rangle_G = |G \setminus (X \times X)|,$$

右边分别为轨道数, $X \times X$ 上使用对角作用。

证明. 置换矩阵的对角元在对应基向量固定时为 1, 否则为 0, 故迹为固定点数。对 $X = G/H$, 映射 $g \otimes 1 \mapsto e_{gH}$ 保持 $gh \otimes 1 = g \otimes 1$ 的关系, 且把命题 3.1.2 中的基双射到陪集基, 因而是 G -同构。

$\mathbb{C}[X]$ 的不变向量在同一轨道上有相同系数, 所以不变空间以各轨道的基向量之和为基, 维数等于轨道数。定理 2.2.2 将其维数写成第一内积。又 $\pi_X(g)$ 为实数, 且 $(X \times X)^g = X^g \times X^g$, 故

$$\langle \pi_X, \pi_X \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|^2 = \langle \mathbf{1}_G, \pi_{X \times X} \rangle_G.$$

把已经证明的轨道数公式用于 $X \times X$ 即得第二式。 $\square$

推论 3.3.3. 设有限群 G 传递地作用在有限集 X 上, 且 $|X| \geq 2$ 。复置换表示中的子空间

$$U_X = \left\{ \sum_{x \in X} a_x e_x : \sum_{x \in X} a_x = 0 \right\}$$

不可约, 当且仅当 G 在不同点的有序对集合上也传递, 即原作用为二重传递 (doubly transitive) 作用。

证明. 复数域中 $|X| \neq 0$, 所以常向量空间与 U_X 直和为 $\mathbb{C}[X]$ 。传递性使平凡表示的重数为 1, 故

$$\langle \pi_X - \mathbf{1}_G, \pi_X - \mathbf{1}_G \rangle_G = |G \setminus (X \times X)| - 1.$$

由推论 2.2.3, 非零表示 U_X 不可约恰好要求右边为 1。对角线本身是一个轨道, 因此总轨道数为 2, 恰好等价于所有不同点的有序对构成另一个轨道。 $\square$

例如 S_n 在 n 个字母上的自然作用于 $n \geq 2$ 时二重传递, 因而坐标和为零的 $(n-1)$ -维复表示不可约。这给出一族无需逐个计算特征标表的不可约表示。

3.3.3 从子群构造不可约表示

诱导不保证保持不可约性; 例 3.2.3 中的两个一维表示都诱导成可约表示。实际构造时可以先求诱导特征标, 再利用范数为 1 的判据。若诱导后限制的分解容易看出, (3.3) 还会进一步缩短计算。

例 3.3.4. 设 $n \geq 3$, 取阶为 $2n$ 的二面体群

$$G = D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle, \quad H = \langle r \rangle.$$

固定 n 次本原单位根 $\zeta \in \mathbb{C}$ 。对 $j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 令 $\lambda_j(r) = \zeta^j$, 并记 $V_j = \text{Ind}_H^G \lambda_j$ 。陪集代表 $1, s$ 给出

$$r \mapsto \begin{pmatrix} \zeta^j & 0 \\ 0 & \zeta^{-j} \end{pmatrix}, \quad s \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $\text{Res}_H^G V_j \cong \lambda_j \oplus \lambda_{-j}$ 。循环群的这两个一维特征标相同，当且仅当 $2j = 0$ 于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。由 Frobenius 互反律及一维特征标的正交性，

$$\langle \chi_{V_j}, \chi_{V_j} \rangle_G = \langle \lambda_j, \lambda_j + \lambda_{-j} \rangle_H = \begin{cases} 1, & 2j \neq 0, \\ 2, & 2j = 0. \end{cases}$$

所以 $2j \neq 0$ 时 V_j 不可约。交换两个基向量给出 $V_j \cong V_{-j}$ ；反之，限制的不可约分解唯一性表明 $V_i \cong V_j$ 只能在 $i = j$ 或 $i = -j$ 时成立。

若 $2j = 0$ ，则 r 为标量矩阵， s 的两个特征向量给出两种一维表示： $r \mapsto \zeta^j$ ， $s \mapsto 1$ 或 -1 。当 n 为奇数时，这样得到两种一维表示及 $(n-1)/2$ 种二维不可约表示；当 n 为偶数时，得到四种一维表示及 $(n-2)/2$ 种二维不可约表示。两种情形的维数平方和分别为

$$2 + 4 \frac{n-1}{2} = 2n, \quad 4 + 4 \frac{n-2}{2} = 2n.$$

由定理 2.3.1，已经列尽全部不可约复表示。这个例子说明哪些一维表示诱导后不可约，哪些给出同构的诱导表示，以及哪些诱导表示会分解。

一般子群的诱导后限制未必像循环正规子群这样容易分解。下一章将用双陪集把它拆成若干较小的诱导表示，从而把本节的范数检验发展为系统的不可约性判据。

3.4 函子关系

诱导常常要和另一项构造接连使用：沿子群链诱导两次，把一个表示先张量再诱导，或研究映入诱导空间的同态。只比较维数不足以处理这些问题。本节分别写出相容于群作用的映射与逆映射；所有代数同构仍在任意域上成立。

3.4.1 诱导的传递性

定理 3.4.1 (诱导的传递性). 设 k 为域， $K \leq H \leq G$ 为有限群的子群链， U 为左 $k[K]$ -模。存在自然的左 $k[G]$ -模同构

$$\text{Ind}_H^G (\text{Ind}_K^H U) \cong \text{Ind}_K^G U, \quad a \otimes (b \otimes u) \mapsto ab \otimes u \quad (a \in k[G], b \in k[H], u \in U).$$

证明. 映射对 a, b, u 多线性。内层的关系 $bc \otimes u = b \otimes cu$ ， $c \in k[K]$ ，在目标中成为 $abc \otimes u = ab \otimes cu$ 。外层的关系 $ah \otimes (b \otimes u) = a \otimes (hb \otimes u)$ ， $h \in k[H]$ ，在目标中两边都等于 $ahb \otimes u$ 。所以映射良定义，且与 G 的左乘作用交换。

逆映射为 $c \otimes u \mapsto c \otimes (1 \otimes u)$ 。对 $d \in k[K]$ ，有

$$cd \otimes (1 \otimes u) = c \otimes (d \otimes u) = c \otimes (1 \otimes du),$$

故它也保持张量关系。一个方向的复合显然为恒等；另一个方向使用 $ab \otimes (1 \otimes u) = a \otimes (b \otimes u)$ ，同样恢复原元。对 K -同态 $U \rightarrow U'$ ，两条映射仅把最后一个分量送到其像，因此同构自然。□

选择 G/H 的左陪集代表 T 及 H/K 的左陪集代表 S , 则 $\{ts : t \in T, s \in S\}$ 是 G/K 的左陪集代表集。上述同构把 $t \otimes (s \otimes u)$ 送到 $ts \otimes u$, 因而也明确说明了两层陪集坐标与一层坐标如何对应。其维数等式就是 $[G : H][H : K] = [G : K]$, 但同构还保留了全部群作用。

3.4.2 张量恒等式

若 V_1, V_2 为同一群的表示, 域上张量积使用对角作用 $g(v_1 \otimes v_2) = gv_1 \otimes gv_2$ 。下面需要把这个作用与诱导张量积中的平衡关系分开。

定理 3.4.2 (张量恒等式). 设 k 为域, G 为有限群, $H \leq G$, W 为左 $k[H]$ -模, V 为左 $k[G]$ -模。以下同构对两个表示自然:

$$\mathrm{Ind}_H^G (W \otimes_k \mathrm{Res}_H^G V) \cong (\mathrm{Ind}_H^G W) \otimes_k V. \quad (3.7)$$

它在 $g \in G$ 的纯张量上由

$$g \otimes (w \otimes v) \mapsto (g \otimes w) \otimes gv$$

给出; 右边使用 G 的对角作用。

证明. 群元素是 $k[G]$ 的基, 所以给定公式可先按 g 线性延伸。对 $h \in H$, 它在 $gh \otimes (w \otimes v)$ 处的值为

$$(gh \otimes w) \otimes ghv = (g \otimes hw) \otimes g(hv),$$

这正是在 $g \otimes (hw \otimes hv)$ 处的值, 故保持 $k[H]$ 上的平衡关系。对 $x \in G$, 将 g 换成 xg 后的像为 $(xg \otimes w) \otimes xgv$, 等于原像受到 x 的对角作用, 故它是 G -同态。

逆映射在群元素上为

$$(g \otimes w) \otimes v \mapsto g \otimes (w \otimes g^{-1}v).$$

其良定义需要检查 $gh \otimes w = g \otimes hw$ 。从前者出发, 像为

$$gh \otimes (w \otimes h^{-1}g^{-1}v) = g \otimes (hw \otimes g^{-1}v),$$

与从后者出发相同。两种复合分别消去 $g^{-1}g$ 与 gg^{-1} , 故为恒等。 H -同态与 G -同态均与对应的作用交换, 所以逐个代入这两条公式也验证了两变量自然性。□

这里的名称为**张量恒等式 (tensor identity)**, 也常按其用途称投影公式。复数域的特征标取值满足张量积对应逐点相乘, 故(3.7)给出

$$\mathrm{Ind}_H^G (\psi \cdot \mathrm{Res}_H^G \chi) = (\mathrm{Ind}_H^G \psi) \cdot \chi.$$

这个等式对任意复类函数 ψ, χ 也成立: 在(3.6)中, $\chi(x^{-1}gx) = \chi(g)$, 可直接将该因子提出求和。

例如令 $H = \{1\}$ 、 $W = k$, 可得 $k[G] \otimes_k V$ 上的对角作用同构于 $\dim_k V$ 个正则表示的直和 (V 有限维时)。这不是半单性结论; 定理 3.4.2 中的显式映射说明, 即使 $\mathrm{char} k$ 整除 $|G|$, 该同构仍然成立。

3.4.3 有限群情形诱导与余诱导的关系

诱导描述从一个构造空间出发的同态。若要描述映入一个构造空间的同态，自然出现的是 Hom 空间。

定义 3.4.3. 设 k 为域， G 为有限群， $H \leq G$ ， W 为左 $k[H]$ -模。把 $k[G]$ 以左乘看成左 $k[H]$ -模，定义

$$\text{Coind}_H^G W := \text{Hom}_{k[H]}(k[G], W), \quad (gf)(a) = f(ag).$$

这里 $g \in G$ 、 $f \in \text{Hom}_{k[H]}(k[G], W)$ 、 $a \in k[G]$ 。所得左 $k[G]$ -模称为 W 的余诱导表示 (coinduced representation)。

该作用保持左 H -线性，因为 $f(hag) = hf(ag)$ ；它满足 $(g_1(g_2f))(a) = f(ag_1g_2) = ((g_1g_2)f)(a)$ 。等价地，余诱导空间由函数 $f: G \rightarrow W$ 组成，满足

$$f(hx) = hf(x), \quad (gf)(x) = f(xg). \quad (3.8)$$

函数在群元素上的取值唯一线性延拓到群代数。这时使用的是右陪集 $H \backslash G$ ；它与前面的左陪集模型不可混用。

命题 3.4.4. 设 k 为域， G 为有限群， $H \leq G$ ， V 为左 $k[G]$ -模， W 为左 $k[H]$ -模。存在自然同构

$$\text{Hom}_{k[G]}(V, \text{Coind}_H^G W) \cong \text{Hom}_{k[H]}(\text{Res}_H^G V, W).$$

其正向映射为 $F \mapsto (v \mapsto F(v)(1))$ ，逆映射把 u 送到 $F_u(v)(x) = u(xv)$ 。

证明. 若 F 为 G -同态，则 $F(hv)(1) = (hF(v))(1) = F(v)(h) = hF(v)(1)$ ，故取值于 1 得到 H -同态。反之， $F_u(v)(hx) = u(hxv) = hu(xv)$ ，所以 $F_u(v)$ 满足 (3.8)；并且 $F_u(gv)(x) = u(xgv) = (gF_u(v))(x)$ ，故 F_u 为 G -同态。

在 1 处求值恢复 $u(v)$ ；反向恢复 F 则使用 $F(xv)(1) = (xF(v))(1) = F(v)(x)$ 。前复合 G -同态与后复合 H -同态均可直接移入取值公式，因此该对应两个变量自然。□

定理 3.4.5. 设 k 为任意域， G 为有限群， $H \leq G$ 。对每个左 $k[H]$ -模 W ，存在自然的 $k[G]$ -模同构

$$\text{Ind}_H^G W \cong \text{Coind}_H^G W.$$

这一同构不要求 $|G|$ 或 $|H|$ 在 k 中可逆。

证明. 定义 $p_H: k[G] \rightarrow k[H]$ ，保留群代数元素在 H 上的系数，删去其余项。对 $h_1, h_2 \in H$ ，有 $p_H(h_1ah_2) = h_1p_H(a)h_2$ ，因为左右乘 H 中元素均保持 H 及其补集。令

$$\Theta(a \otimes w)(x) = p_H(xa)w \quad (x \in G).$$

$\Theta(a \otimes w)(hx) = hp_H(xa)w$ ，故其值确在余诱导空间中。又 $p_H(xah)w = p_H(xa)hw$ ，所以它保持张量关系。 G 等变性则来自

$$\Theta(ga \otimes w)(x) = p_H(xga)w = (g\Theta(a \otimes w))(x).$$

选择左陪集代表 T 。其逆元组成右陪集代表集 T^{-1} 。对 $s, t \in T$, $s^{-1}t \in H$ 当且仅当 $s = t$, 所以

$$\Theta(t \otimes w)(s^{-1}) = \begin{cases} w, & s = t, \\ 0, & s \neq t. \end{cases}$$

一个满足(3.8)的函数由它在 T^{-1} 上的值唯一确定。因此 Θ 的逆为

$$f \mapsto \sum_{t \in T} t \otimes f(t^{-1}).$$

这条和式有限；它在 T^{-1} 上逐个恢复函数值，因而恢复整个函数。 Θ 的定义本身不依赖 T ，故逆映射也不依赖所选代表。对 H -同态 $W \rightarrow W'$ ，保留系数再作用与先送到 W' 的结果相同，证明自然性。整个构造没有任何除法。□

由命题 3.4.4 及定理 3.4.5，有限群情形还得到

$$\mathrm{Hom}_{k[G]}(V, \mathrm{Ind}_H^G W) \cong \mathrm{Hom}_{k[H]}(\mathrm{Res}_H^G V, W). \quad (3.9)$$

因此诱导既是限制的左伴随，也是其右伴随；两个方向的 Hom 公式各有自己的具体映射，并非把箭头任意倒转所得。

Etingof 等人的 Definition 5.8.1 直接使用(3.8)作为诱导模型，其 Theorem 5.10.1 因而首先给出右侧伴随公式 [4, Sections 5.8, 5.10, pp. 105–109]。定理 3.4.5 说明了两种叙述的对应。这里有限指数的作用在逆映射的有限求和中已经清楚出现；对无限指数子群，任意函数与有限支集函数通常给出不同对象，不能不加条件地沿用这个同构。

本章小结

诱导空间 $k[G] \otimes_{k[H]} W$ 把子群作用写进平衡关系，左陪集代表则把这个商空间分成若干 W 的副本。由此得到维数、显式矩阵、正合性与诱导特征标公式；这些结论的条件并不完全相同，尤其不能把含有除以群阶的特征标计算照搬到相应的正特征中。

Frobenius 互反律首先是 Hom 空间的自然同构。复表示半单性把它转为重数计算，但同构本身不依赖半单性。置换特征标把迹变成固定点数，把内积变成轨道数；二重传递作用和循环子群上的一维表示因而能产生具体的不可约表示。

传递性与张量恒等式说明诱导与其他构造的相容性。由等变函数构成的余诱导是限制的右伴随；陪集数有限时，这些函数也能由有限张量和表示，因此诱导既是限制的左伴随，也是右伴随。下一章进一步计算诱导后限制的结构，其分块由双陪集决定。

习题

习题 3.1. 设 $G = \langle r \rangle$ 为六阶循环群， $H = \langle r^2 \rangle$, $\lambda^3 = 1$ 于 $\mathbb{C}$ 。令一维 H -表示满足 $r^2 w = \lambda w$ 。求其诱导表示中 r 的矩阵，并列出不可约分解。

解. 取左陪集代表 $1, r$, 基为 $1 \otimes w, r \otimes w$, 则

$$r \mapsto \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $\mu^2 = \lambda$, 两特征值为 $\mu, -\mu$, 互不相同, 且均满足六次方为 1. 相应特征向量可取 $\mu(1 \otimes w) + r \otimes w$ 与 $-\mu(1 \otimes w) + r \otimes w$. 诱导表示因此是两种一维 G -表示 $r \mapsto \mu, r \mapsto -\mu$ 的直和; 它们恰好都是给定 H -表示的一维延拓. $\square$

习题 3.2. 设 $k = \mathbb{F}_2, G = C_4 = \langle r \rangle, H = \langle r^2 \rangle$. 证明 $\text{Ind}_H^G \mathbf{1}_H$ 的维数为 2, 有一个平凡子表示和一个平凡商表示, 却不是二者的直和.

解. 在陪集基 e_1, e_2 上, r 交换两基向量. $r - I \neq 0$, 但 $(r - I)^2 = 0$. 其核为直线 $k(e_1 + e_2)$, 且该直线也等于其像, 因此这条子表示及其商上的作用都平凡. 若表示是两个平凡表示之和, r 应为恒等, 与实际矩阵矛盾. 任意可能的平凡补空间都应包含于 $\ker(r - I)$, 也直接排除了分裂. $\square$

习题 3.3. 设 k 为域, G 为有限群, $H \leq G, \rho: H \rightarrow \text{GL}_k(W)$ 为有限维表示. 设 $T = \{t_i\}$ 是 G/H 的左陪集代表集, $T' = \{t_i h_i\}$, 其中 $h_i \in H$. 给 W 固定一组基, 证明由这两组代表所得诱导矩阵满足 $M'(g) = D^{-1}M(g)D$ 对 $g \in G$ 成立, 其中 D 的第 i 个对角块为 $\rho(h_i)$.

解. 新基向量 $t_i h_i \otimes w_j$ 在旧基中的坐标为 $t_i \otimes \rho(h_i)w_j$. 因此若用列向量记录坐标, 则旧坐标等于 D 乘新坐标. 先施加作用再改回新坐标, 得到 $M'(g) = D^{-1}M(g)D$. 特别地, 陪集代表改变造成的是同时相似变换, 而不是改变表示的同构类. $\square$

习题 3.4. 设 k 为域, $H \leq G$ 为有限群. 证明正则表示满足

$$\text{Res}_H^G k[G] \cong k[H]^{\oplus [G:H]}, \quad \text{Ind}_H^G k[H] \cong k[G].$$

说明第一式应使用哪一侧的陪集代表.

解. 第一式是左 $k[H]$ -模的分解, 故选择右陪集 $H \backslash G$ 的代表集 S , 得到 $k[G] = \bigoplus_{s \in S} k[H]s$. 每项映射 $b \mapsto bs$ 为左 $k[H]$ -模同构. 第二式由 $a \otimes b \mapsto ab$ 给出, 平衡关系保证良定义; 其逆为 $a \mapsto a \otimes 1$, 因为 $ab \otimes 1 = a \otimes b$. 两映射都与 G 的左乘相容. $\square$

习题 3.5. 设 k 为域, $H \leq G$ 为有限群, W 为 $k[H]$ -模. 给出 $(\text{Ind}_H^G W)^G \cong W^H$ 的显式同构, 不假定群阶可逆.

解. 取包含 1 的左陪集代表集 T . 对 $w \in W^H$, 向量 $\sum_{t \in T} t \otimes w$ 在 G 作用下只发生分量置换, 因为每个出现的 H 元素都固定 w , 故该向量 G -不变.

反之, 设 $v = \sum_t t \otimes w_t$ 不变. $h \in H$ 固定陪集 H , 所以 1 分量表明 $hw_1 = w_1$. 对 $t \in T$, 在 $tv = v$ 中比较 t 分量: 只有原来的 1 分量会被 t 送入该分量, 故 $w_t = w_1$. 因此逆映射是取 1 分量. 所有公式均不含平均除法. $\square$

习题 3.6. 对群 L 的 k -表示 M , 定义余不变商空间 $M_L = M / \text{span}_k \{\ell m - m : \ell \in L, m \in M\}$. 若 $H \leq G$ 为有限群, 证明 $(\text{Ind}_H^G W)_G \cong W_H$, 并写出同构.

解. 令 $\epsilon: k[G] \rightarrow k$ 为系数和映射. 公式 $a \otimes w \mapsto \epsilon(a)[w]$ 对 H 平衡, 因为 $[hw] = [w]$; 对 G 作用不变, 因而降到余不变商. 逆映射为 $[w] \mapsto [1 \otimes w]$, 其良定义来自 $[1 \otimes hw] = [h \otimes w] = [1 \otimes w]$. 在商中 $[g \otimes w] = [1 \otimes w]$, 故两个方向的复合均为恒等. $\square$

习题 3.7. 设 k 为域, $H \leq G$ 为有限群. 证明诱导把投射 $k[H]$ -模送到投射 $k[G]$ -模, 也把内射 $k[H]$ -模送到内射 $k[G]$ -模. 可分别用满射的提升性质和沿单射的延伸性质定义投射性、内射性.

解. 若 P 投射, 给定 G -满射 $X \rightarrow Y$ 及 $\text{Ind } P \rightarrow Y$, 由定理 3.2.1, 后一个映射对应于 $P \rightarrow \text{Res } Y$. 限制保持满射, 故投射性给出到 $\text{Res } X$ 的提升. 互反同构的自然性把它送回到 X 的提升, 所以 $\text{Ind } P$ 投射.

若 I 内射, 给定 G -单射 $X \rightarrow Y$ 及 $X \rightarrow \text{Ind } I$, 由 (3.9), 后一个映射对应于 $\text{Res } X \rightarrow I$. 限制保持单射, 故可延伸到 $\text{Res } Y \rightarrow I$, 再由自然性转回 $Y \rightarrow \text{Ind } I$. 这里使用有限群的诱导—余诱导同构, 不能只靠左伴随公式证明第二项. $\square$

习题 3.8. 设 $G = A_4$, $H = \langle (123) \rangle$, $N = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$. 令 ω 为三次本原单位根, $\lambda_j((123)) = \omega^j$, $j = 0, 1, 2$. 求三个 $\text{Ind}_H^G \lambda_j$ 的不可约复分解.

解. N 正规且 G/N 为三阶循环群; $H \cap N = \{1\}$, 故 $H \rightarrow G/N$ 为同构. 于是 λ_j 各自延拓为 G 的一维表示 θ_j , 该延拓在 N 上平凡.

取四个字母的置换表示中坐标和为零的三维子表示 U . 其特征标在单位元、三个非平凡 N 元素和八个三轮换上分别为 $3, -1, 0$. 因此特征标范数平方为 $(9+3)/12 = 1$, U 不可约. 三种一维表示与 U 的维数平方和为 $3+9 = 12$, 故穷尽全部不可约表示. 限制到 H 时, χ_U 的值为 $3, 0, 0$, 从而 $\text{Res}_H^G U \cong \lambda_0 \oplus \lambda_1 \oplus \lambda_2$. Frobenius 互反律给出

$$\text{Ind}_H^G \lambda_j \cong \theta_j \oplus U \quad (j = 0, 1, 2).$$

每个右边维数为 $4 = [G : H]$. $\square$

习题 3.9. 设 k 为域, G 为有限群, $H \leq G$, W 为 d 维左 $k[H]$ -模, ρ 为它在所选基下的矩阵表示. 取左陪集代表 $t_1, \dots, t_m$, 对 $g \in G$ 唯一写成 $gt_i = t_{\sigma_g(i)} h_i(g)$, 其中 $\sigma_g \in S_m$, $h_i(g) \in H$. 证明

$$\det(g | \text{Ind}_H^G W) = \text{sgn}(\sigma_g)^d \prod_i \det \rho(h_i(g)).$$

符号 ± 1 在域 k 中理解.

解. 诱导矩阵是先在第 i 个块上施加 $\rho(h_i(g))$, 再按 σ_g 置换维数为 d 的块. 因此对角块部分的行列式是所列乘积. 交换两个长为 d 的块产生 d^2 次基向量交换, 符号为 $(-1)^{d^2} = (-1)^d$; 把 σ_g 写成换位之积, 得到块置换符号 $\text{sgn}(\sigma_g)^d$. 在特征 2 时所有符号都等于 1, 公式仍成立. $\square$

习题 3.10. 设 $G = Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, $H = \langle i \rangle$. 令一维复表示 λ 满足 $\lambda(i) = \sqrt{-1}$. 计算 $\text{Ind}_H^G \lambda$ 的特征标, 证明它不可约.

解. H 为指数二正规子群, 取代表 $1, j$. 共轭 $j^{-1}ij = i^{-1}$, 所以限制到 H 的特征标为 $\lambda + \lambda^{-1}$, 在 $1, -1, \pm i$ 上分别为 $2, -2, 0$. H 外元素不共轭于 H 中元素, 故诱导特征标在 $\pm j, \pm k$ 上为零. 范数平方为 $(4+4)/8 = 1$, 所以它不可约. 特别地, 中心元 -1 虽固定所有陪集, 却作用为 $-I$, 说明“固定陪集数”只适用于诱导平凡表示的特殊情形. $\square$

习题 3.11. 令 S_4 作用在四个字母的六个二元素子集上. 求置换特征标, 并证明该置换表示分解为平凡表示、三维标准表示和一个二维不可约表示的直和.

解. 按循环型 $1^4, 2\ 1^2, 2^2, 3\ 1, 4$ 排列, 固定二元素子集数依次为 $6, 2, 2, 0, 0$, 共轭类大小分别为 $1, 6, 3, 8, 6$, 所以置换特征标 π 的范数平方为 $(36+24+12)/24 = 3$. 作用传递, 平凡表示重数为 1.

三维标准表示 U 不可约, 由推论 3.3.3 可知. 其特征标为 $3, 1, -1, 0, -1$, 故 $\langle \chi_U, \pi \rangle = (18+12-6)/24 = 1$. Maschke 定理可取这两项的补表示 W , 其特征标为 $2, 0, 2, -1, 0$, 范数平方为 $(4+12+8)/24 = 1$. 所以 W 不可约, 得到所求分解. $\square$

习题 3.12. 令 C_n 在自身上正则作用, $n \geq 2$. 计算它在有序对上的轨道数, 并判断复置换表示的坐标和为零子空间何时不可约.

解. 把群写成加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 同时平移不改变 (a, b) 的差 $b-a$, 而差相同的两个有序对能经平移互相得到, 故有 n 个轨道. 由命题 3.3.2, 置换特征标范数平方为 n , 去掉唯一平凡分量后范数平方为 $n-1$. 因此该 $(n-1)$ -维子空间不可约当且仅当 $n=2$. 这说明传递作用本身不足以保证推广子空间不可约. $\square$

习题 3.13. 设 $n \geq 3$ 为整数, $D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$, $H = \langle r \rangle$, $\zeta \in \mathbb{C}$ 为本原 n 次单位根. 对 $j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 令 $\lambda_j(r) = \zeta^j$, $V_j = \text{Ind}_H^{D_{2n}} \lambda_j$; 这里允许 $2j=0$, 因而 V_j 未必不可约. 对 $i, j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 证明

$$V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_j \cong V_{i+j} \oplus V_{i-j}.$$

进一步在 D_{10} 中分解 $V_1 \otimes V_1$ 与 $V_1 \otimes V_2$.

解. 在旋转 r^a 上, $\chi_{V_j}(r^a) = \zeta^{ja} + \zeta^{-ja}$. 两这样的值相乘恰好为 $\chi_{V_{i+j}}(r^a) + \chi_{V_{i-j}}(r^a)$. 在反射上四个 V 的特征标均为零, 等式仍成立. 复表示由特征标决定, 故得同构. 对 $n=5$, 有 $V_{-j} \cong V_j$, $V_0 = \mathbf{1} \oplus \varepsilon$, 其中 ε 在旋转上为 1、在反射上为 -1 . 于是

$$V_1 \otimes V_1 \cong V_2 \oplus \mathbf{1} \oplus \varepsilon, \quad V_1 \otimes V_2 \cong V_2 \oplus V_1.$$

$\square$

习题 3.14. 在 $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$ 中, 设 $K = \langle r^2 \rangle \leq H = \langle r \rangle$. 令 K 的复一维表示 η 满足 $\eta(r^2) = -1$. 利用诱导传递性求 $\text{Ind}_K^{D_8} \eta$ 的分解.

解. $\text{Ind}_K^H \eta$ 中 r 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其两个特征值为 $\sqrt{-1}$ 与 $-\sqrt{-1}$, 故分解为 H 的一维表示 $\lambda_1 \oplus \lambda_3$. 由定理 3.4.1 及诱导保持直和, 所求表示为 $V_1 \oplus V_3$. 例 3.3.4 说明 $V_1 \cong V_3$, 且它们为二维不可约表示, 故答案为 $V_1^{\oplus 2}$. 总维数为 $4 = [D_8 : K]$. $\square$

习题 3.15. 设 k 为域, $H \leq G$ 为有限群, V 为 $k[G]$ -模. 证明若 $[G : H]$ 在 k 中可逆, 则映射 $\epsilon_V : \text{Ind}_H^G \text{Res}_H^G V \rightarrow V$ 、 $g \otimes v \mapsto gv$ 有 G -线性右逆. 再给出指数不可逆时它不分裂的例子.

解. 取左陪集代表集 T , 定义 $j(v) = \sum_{t \in T} t \otimes t^{-1}v$. 把 t 换成 th 时相应项不变; 对 $g \in G$, 用 $gt = t'h$ 重编号可得 $g(t \otimes t^{-1}v) = t' \otimes t'^{-1}gv$, 故 j 为 G -同态. 又 $\epsilon_V j(v) = [G : H]v$, 所以 $[G : H]^{-1}j$ 为所求右逆.

取 $G = C_p$ 、 $H = \{1\}$ 、 $k = \mathbb{F}_p$ 、 $V = k$ 平凡. 此时 ϵ_V 是正则模的系数和映射. 正则模中的不变向量都是 $\sum_{g \in G} g$ 的标量倍数, 其系数和为 $p = 0$. 若存在右逆, $1 \in k$ 必须映到系数和为 1 的不变向量, 矛盾. $\square$

习题 3.16. 设 k 为域, $H \leq G$ 为有限群, W 为有限维 $k[H]$ -模; 对偶作用为 $(h\varphi)(w) = \varphi(h^{-1}w)$. 构造自然同构 $\text{Ind}_H^G(W^*) \cong (\text{Ind}_H^G W)^*$.

解. 在两个诱导空间之间定义配对, 对 $g, t \in G$ 令

$$B(g \otimes \varphi, t \otimes w) = \begin{cases} \varphi(g^{-1}tw), & g^{-1}t \in H, \\ 0, & g^{-1}t \notin H. \end{cases}$$

第一变量的关系 $gh \otimes \varphi = g \otimes h\varphi$ 对应于两边共同的值 $\varphi(h^{-1}g^{-1}tw)$, 第二变量的平衡关系由 $th \otimes w = t \otimes hw$ 直接保持. 左乘同一个 $x \in G$ 时, $(xg)^{-1}(xt) = g^{-1}t$, 所以配对 G -不变. 选择同一组左陪集代表后, 不同陪集块之间配对为零, 同一块是 W^* 与 W 的求值配对, 故非退化. 它把第一空间同构到第二空间的对偶, 并与对偶的反变映射相容, 得到自然同构. $\square$

习题 3.17. 对有限群 G 及平凡子群 $H = \{1\}$, 把 $\text{Coind}_1^G k$ 看成所有函数 $G \rightarrow k$. 记 δ_s 为在 s 处取 1、其余处为零的函数. 求 $g\delta_s$, 并说明正则模的群元素基 t 在定理 3.4.5 下对应哪个函数.

解. $(g\delta_s)(x) = \delta_s(xg)$ 非零当且仅当 $x = sg^{-1}$, 故 $g\delta_s = \delta_{sg^{-1}}$. 自然同构把 t 送到 $x \mapsto p_1(xt)$, 这正是 $\delta_{t^{-1}}$. 于是 $g\delta_{t^{-1}} = \delta_{t^{-1}g^{-1}} = \delta_{(gt)^{-1}}$, 与左正则作用吻合. 若误把 t 对应到 δ_t , 一般不能得到这种等变性. $\square$

习题 3.18. 设 k 为域, G 为有限群, $H \leq G$, V 为左 $k[G]$ -模, W 为左 $k[H]$ -模, $u : \text{Res}_H^G V \rightarrow W$ 为 H -同态, T 为 G/H 的左陪集代表集. 证明右侧互反同构(3.9)的逆把 u 送到

$$v \mapsto \sum_{t \in T} t \otimes u(t^{-1}v),$$

并写出从 G -同态到 u 的反向公式.

解. 由命题 3.4.4, u 首先给出函数 $x \mapsto u(xv)$. 定理 3.4.5 的逆把该函数送到 $\sum_t t \otimes u(t^{-1}v)$, 正是所求公式. 若替换 t 为 th , 其项变成 $th \otimes u(h^{-1}t^{-1}v) = t \otimes u(t^{-1}v)$, 所以不依赖代表. 反向先施加 Θ 再在 1 处取值; 当 $1 \in T$ 时, 这就是取 $F(v)$ 的 1 分量. 对 $F(v) = \sum_t t \otimes w_t(v)$, 所得 $u(v) = w_1(v)$. $\square$

习题 3.19. 设 k 为域, G 为有限群, $H \leq G$, V 为左 $k[G]$ -模, $a \in \text{End}_{k[H]}(V)$, T 为 G/H 的左陪集代表集。证明

$$\text{Tr}_H^G(a) := \sum_{t \in T} tat^{-1}$$

不依赖左陪集代表集 T , 并属于 $\text{End}_{k[G]}(V)$ 。此处群元素表示其在 V 上的算子。若 a 已为 G -同态, 求此和式。

解. 因为 a 与每个 $h \in H$ 交换, $(th)a(th)^{-1} = tat^{-1}$, 故代表元选择无关。对 $g \in G$, $g\text{Tr}_H^G(a)g^{-1}$ 是用左陪集代表集 gT 计算的同一和式, 所以等于原和式。这恰好表示它与全部 G 作用交换。若 a 本来就与 G 交换, 则每一项等于 a , 和式为 $[G:H]a$ 。这个相对迹是算子的和; 不要把它误认为标量值的矩阵迹。□

习题 3.20. 设 $0 \rightarrow W' \rightarrow W \rightarrow W'' \rightarrow 0$ 为有限群 H 在域 k 上的表示短正合列, $H \leq G$ 且 G 有限。证明该列分裂, 当且仅当诱导到 G 后的短正合列分裂。

解. 若原列有 H -线性截面, 诱导它便得到 G -线性截面。反之, 对任何 H -模 M , 映射 $i_M: m \mapsto 1 \otimes m$ 把 M 嵌入 $\text{Res}_H^G \text{Ind}_H^G M$, 且有 H -线性投影 p_M 返回此分量: 在陪集 H 上取原向量, 在其他陪集上取零。 H 的左乘同时保持 H 和 $G \setminus H$, 因此投影确为 H -线性, 并对 M 中的同态自然。

若诱导列有截面 $s: \text{Ind } W'' \rightarrow \text{Ind } W$, 则 $p_W s i_{W''}: W'' \rightarrow W$ 为 H -同态。记原满射为 q , 利用自然性及诱导截面条件可得 $qp_W s i_{W''} = p_{W''}(\text{Ind } q) s i_{W''} = p_{W''} i_{W''} = 1$ 。故原列分裂。□

习题 3.21. 设 $G = C_3$, $H = \{1\}$, 在实数域上取二维旋转表示 U , 生成元作用为平面中转角 $2\pi/3$ 的旋转。证明 U 不可约, $\mathbb{R}[G] \cong \mathbb{R} \oplus U$, 但 $\dim_{\mathbb{R}} \text{Hom}_{\mathbb{R}[G]}(U, \mathbb{R}[G]) = 2$ 。解释为什么这不违背 Frobenius 互反律。

解. 旋转矩阵没有实特征值, 因而没有一维实不变子空间, U 不可约。又

$$\mathbb{R}[G] \cong \mathbb{R}[t]/(t^3 - 1) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}[t]/(t^2 + t + 1) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{C}.$$

第二因子作为实表示同构于 U , 故重数为 1。与该旋转交换的实线性算子, 识别平面为 $\mathbb{C}$ 后恰为复数乘法, 所以 $\text{End}_{\mathbb{R}[G]}(U) \cong \mathbb{C}$, 实维数为 2。从 U 到平凡表示的同态为零, 于是所述 Hom 空间维数为 2。

右侧互反同构给出 $\text{Hom}_{\mathbb{R}[G]}(U, \text{Ind}_1^G \mathbb{R}) \cong \text{Hom}_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R})$, 右边也有实维数 2。互反同构完全成立; 失效的是把实 Hom 维数不加修正地当作不可约重数, 而复数域中 Schur 引理给出的标量自同态条件在这里不成立。□

习题 3.22. 把群代数张量诱导与 Hom 余诱导的定义用于 $G = \mathbb{Z}$, $H = \{0\}$, $k = \mathbb{F}_2$ 。证明两空间不可能同构为 k -向量空间, 并指出定理 3.4.5 证明中哪一步不再适用。

解. 诱导空间是 $\mathbb{F}_2[\mathbb{Z}]$, 即整数集上的有限支集函数。对每个有限支集只有有限种系数选择, 而整数的有限子集全体可数, 所以它的底集合可数。余诱导是全部函数 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_2$, 其底集合不可数: 枚举整数后用对角法, 就能构造一个不属于任何给定可数函数表的函数。故两者连底集合都不能双射, 更不可能有线性同构。

原来的 Θ 仍把诱导元素送到相应的有限支集函数，但不能覆盖任意函数。逆公式中的 $\sum_{t \in T} t \otimes f(t^{-1})$ 对无限支集函数成为无限和，而代数张量积没有定义这种无限求和。 $\square$

第四章 双陪集、Mackey 理论与 Clifford 理论

本章研究诱导与限制怎样组合，以及不可约表示在正规子群上如何分解。双陪集把陪集作用分成轨道，Mackey 公式把每个轨道写成一个新的诱导表示，由此计算交织空间并判定诱导表示的不可约性。Clifford 理论进一步说明，正规子群上的不可约成分组成一个共轭轨道，整个表示可从惯性群上的等型分量恢复。最后用因子集描述表示延拓的障碍，并在重数空间上建立射影表示。

本章目标

- 能由陪集作用求双陪集、交集子群及每个分块的维数。
- 写出 Mackey 分解的显式映射，说明两种伴随在交织空间公式中的作用。
- 能计算正规子群上不可约成分的轨道、惯性群与重数，并应用 Clifford 对应。
- 能构造标量因子集，检验余圈恒等式，判断延拓障碍及其对重数空间的影响。

预备知识为有限群的陪集与正规子群、复表示的完全可约性和 Schur 引理，以及第三章中的诱导、限制、余诱导和 Frobenius 互反性。前两节的模分解允许任意基域；不可约性判据和后两节的结构定理在复数域上讨论。

取 $G = S_3$ ，令 H 为由一个换位生成的二元子群。从 H 的平凡表示诱导到 G ，得到以三个左陪集为基的置换表示；再限制回 H 时，其中一个陪集固定，另两个互换。原来一次诱导所得的空间，限制后便按陪集轨道分成两块。一般子群 $H, K \leq G$ 之间，轨道会由双陪集编号，每块又来自较小子群上的诱导，这就是 Mackey 分解¹的出发点。若 H 正规，还可追问一个不可约 G -表示限制到 H 后，不同不可约成分为何随共轭一起移动。

4.1 双陪集

把一个 H -表示诱导到 G ，再只观察子群 K 的作用时，原来由 G/H 标记的各个向量空间并不会任意混合。哪些空间能够互相到达，取决于 K 在陪集集上的轨道。双陪集正是这些轨道的另一种写法。

4.1.1 双陪集分解

定义 4.1.1. 设 G 为有限群， $H, K \leq G$ ， $x \in G$ 。集合

$$KxH = \{kxh : k \in K, h \in H\}$$

¹马凯 (George Whitelaw Mackey, 1916-2006)，美国数学家，研究群表示与调和分析，建立诱导表示的重要方法。

称为由 x 确定的 **双陪集** (double coset)。所有这些集合组成的集合记为 $K \backslash G / H$ 。这个记号表示一个商集，一般没有商群结构。

关系 $y = kxh$ 是等价关系：单位元给出自反性，等式 $x = k^{-1}yh^{-1}$ 给出对称性，两次这样的表达式相接给出传递性。因此，不同双陪集互不相交，它们的并为 G 。

命题 4.1.2. 设 G 为有限群， $H, K \leq G$ ， $x \in G$ 。在左陪集集 G/H 上令 K 左乘作用。包含 xH 的轨道为 KxH/H ，其稳定子群为

$$L_x = K \cap xHx^{-1}.$$

映射 $kL_x \mapsto kxH$ 给出 K -集合的同构

$$K/L_x \longrightarrow KxH/H.$$

特别地，

$$|KxH| = \frac{|K| \cdot |H|}{|K \cap xHx^{-1}|}. \quad (4.1)$$

证明. 元素 $k \in K$ 固定 xH ，当且仅当 $x^{-1}kx \in H$ ，即 $k \in L_x$ 。而 $k_1xH = k_2xH$ 当且仅当 $k_2^{-1}k_1 \in L_x$ ，所以所给映射良定义、单射，并由轨道的定义而满射。它与左乘作用相容。轨道含有 $[K : L_x]$ 个左 H -陪集，每个陪集含有 $|H|$ 个元素，得到公式。□

于是，选取双陪集代表元，就是在 K 作用于 G/H 的每个轨道中选一个点。即使 $H = K$ ，交集也仍须写成 $H \cap xHx^{-1}$ ，不能把共轭后的子群忽略。

4.1.2 诱导后限制的几何分块

设 k 为任意域， W 为有限维左 $k[H]$ -模。诱导表示采用

$$\text{Ind}_H^G W = k[G] \otimes_{k[H]} W.$$

选取左陪集代表元 t 后，它作为向量空间等于 $\bigoplus_{tH \in G/H} t \otimes W$ 。若 $a \in K$ ，则 a 把 $t \otimes W$ 送到 atH 所对应的空间。因此，每一个 K -轨道内的全部空间之和都是 K -不变子空间。

命题 4.1.3. 设 G 为有限群， $H, K \leq G$ ， k 为域， W 为有限维左 $k[H]$ -模。对每个双陪集 $D = KxH$ ，令 $k[D]$ 为以 D 为基的子空间。它具有左 $k[K]$ 、右 $k[H]$ 作用，且有左 $k[K]$ -模直和分解

$$\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G W = \bigoplus_{D \in K \backslash G / H} k[D] \otimes_{k[H]} W.$$

其中 $D = KxH$ 所对应的分量的维数为

$$[K : K \cap xHx^{-1}] \dim_k W.$$

证明. 群元素基按互不相交的双陪集分组，得到 $k[G] = \bigoplus_D k[D]$ 。左右作用都保持各个 D ，故这是双模的直和。对右 $k[H]$ -模作张量积，直和的包含与投影仍互为分裂，得到所述直和。

每个 D 是 $[K : K \cap xHx^{-1}]$ 个左 H -陪集之并。选取这些陪集的代表元后， $k[D]$ 是同样秩的自由右 $k[H]$ -模；张量积因而是同样多个 W 的直和。□

这个分块不要求特征不整除群阶。它来自群元素基的划分，与表示是否完全可约无关；下节将在每一块内重新识别一个诱导表示。

4.1.3 小群的双陪集计算

先取 $G = S_3$ 、 $H = K = \langle (12) \rangle$ 。左陪集 gH 可由点 $g(3)$ 标记， H 在三点集上的轨道为 $\{3\}$ 与 $\{1, 2\}$ 。因此双陪集代表元可取 1 和 $x = (13)$ 。对应的交集分别为 H 和

$$H \cap xHx^{-1} = \langle (12) \rangle \cap \langle (23) \rangle = \{1\}.$$

两个双陪集的大小为 2 与 4，恰好覆盖 S_3 。若 $W = k$ 是平凡表示，则三维置换表示限制到 H 后分成一个固定点的平凡表示，以及两点自由轨道的正则表示。

再取 $G = S_4$ ，让 $H = K = S_{\{1,2,3\}}$ 固定 4。 G/H 同样可识别为四点集，轨道为 $\{4\}$ 与 $\{1, 2, 3\}$ 。代表元取 1 和 $x = (34)$ ，后者的交集为固定 3, 4 的二阶子群 $\langle (12) \rangle$ 。所以双陪集大小为 6 与 18，诱导平凡表示的两块维数为 1 与 3。

这些计算提供了一种实际方法：先寻找容易理解的陪集作用，再算轨道和稳定子群。直接枚举 kxh 往往会重复产生同一个元素，而轨道方法同时给出分块数、代表元和每块大小。

4.2 Mackey 分解

双陪集分块中的 $x \otimes W$ 受交集 $K \cap xHx^{-1}$ 作用。这个作用不是原封不动地把 W 限制到交集：必须先通过 x 把交集搬回 H 。将这一点写清以后，Mackey 公式便可由一个显式张量映射得到。

4.2.1 双陪集公式

定义 4.2.1. 设 G 为有限群， $H \leq G$ ， k 为域， $\rho : H \rightarrow \mathrm{GL}_k(W)$ 为有限维表示， $x \in G$ 。在同一向量空间 W 上定义 xHx^{-1} 的作用

$$\rho^x(a) = \rho(x^{-1}ax) \quad (a \in xHx^{-1}).$$

所得表示记为 xW ，称为 W 的**共轭表示** (conjugate representation)。

这个方向约定与左陪集相配合：在诱导表示中， $a(x \otimes w) = x \otimes \rho(x^{-1}ax)w$ 。此外，先取 yW 再取其 x -共轭，所得表示为 ${}^{xy}W$ 。

定理 4.2.2 (Mackey 分解). 设 G 为有限群， $H, K \leq G$ ， k 为任意域， W 为有限维左 $k[H]$ -模。取 $K \backslash G/H$ 的一组代表元 X ，并令 $L_x = K \cap xHx^{-1}$ 。则有左 $k[K]$ -模同构

$$\mathrm{Res}_K^G \mathrm{Ind}_H^G W \cong \bigoplus_{x \in X} \mathrm{Ind}_{L_x}^K \mathrm{Res}_{L_x}^{xHx^{-1}} ({}^xW). \quad (4.2)$$

这一分解称为 **Mackey 分解** (Mackey decomposition)，公式也称为 Mackey 双陪集公式。

证明. 根据命题 4.1.3, 只须识别每一块. 固定 x , 把 xW 限制到 L_x , 定义

$$\begin{aligned}\Phi_x : k[K] \otimes_{k[L_x]} {}^xW &\longrightarrow k[KxH] \otimes_{k[H]} W, \\ a \otimes w &\longmapsto ax \otimes w.\end{aligned}$$

对 $\ell \in L_x$, 有

$$a\ell x \otimes w = ax(x^{-1}\ell x) \otimes w = ax \otimes \rho(x^{-1}\ell x)w.$$

这正是源端平衡关系的像, 故映射良定义; 左 K -线性直接来自左乘. 目标中的生成元 $axh \otimes w$ 等于 $\Phi_x(a \otimes hw)$, 所以映射满射. 两端维数都为 $[K : L_x] \dim_k W$, 因而它是同构. 对所有 x 取直和即得结论. $\square$

选取别的代表元会改变上式各项的具体写法, 却不改变命题 4.1.3 中由双陪集本身确定的子空间. 公式的作用是把子空间写成熟悉的诱导模.

4.2.2 交织算子空间的计算

定理 4.2.3 (交织空间公式). 设 G 为有限群, $H, K \leq G$, k 为域, U, W 分别为有限维左 $k[K]$ -模、左 $k[H]$ -模. 取双陪集集 $K \backslash G / H$ 的代表元集 X , 对 $x \in X$ 令 $L_x = K \cap xHx^{-1}$. 有 k 向量空间同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{k[G]}(\mathrm{Ind}_K^G U, \mathrm{Ind}_H^G W) \\ \cong \bigoplus_{x \in X} \mathrm{Hom}_{k[L_x]}(\mathrm{Res}_{L_x}^K U, \mathrm{Res}_{L_x}^{xHx^{-1}}({}^xW)).\end{aligned}\tag{4.3}$$

证明. 定理 3.2.1 把左侧识别为 $\mathrm{Hom}_{k[K]}(U, \mathrm{Res}_K^G \mathrm{Ind}_H^G W)$. 将定理 4.2.2 代入第二个变量, 便得到各个 $\mathrm{Hom}_{k[K]}(U, \mathrm{Ind}_{L_x}^K {}^xW)$ 的直和.

此时诱导出现在 Hom 的第二个变量, 不能再次直接使用同一方向的左伴随. 定理 3.4.5 说明有限群的诱导与余诱导自然同构; 命题 3.4.4 给出的右伴随性质把这一项识别为 $\mathrm{Hom}_{k[L_x]}(\mathrm{Res}_{L_x}^K U, {}^xW)$. $\square$

在复数域上, 取特征标后, 公式也计算两个诱导特征标的内积. 取 $K = H$ 、 $U = W = \mathbf{1}_H$, 每一项都是一维空间, 故

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{End}_{\mathbb{C}[G]}(\mathbb{C}[G/H]) = |H \backslash G / H|.$$

例如, S_n 在 n 个点上的置换表示对应 $H = S_{n-1}$; 当 $n \geq 2$ 时只有两个双陪集, 所以它的自同态空间维数为 2. 平凡表示出现一次, 其余直和项的重数平方和因而为 1, 得到一个不可约的 $(n-1)$ 维分量.

4.2.3 不可约性判据

定理 4.2.4 (Mackey 不可约性判据). 设 G 为有限群, $H \leq G$, W 为非零有限维复 H -表示. 则 $\mathrm{Ind}_H^G W$ 不可约, 当且仅当 W 不可约, 且对每个不等于 H 的双陪集 HxH , 令 $L_x = H \cap xHx^{-1}$ 后有

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[L_x]}(\mathrm{Res}_{L_x}^H W, \mathrm{Res}_{L_x}^{xHx^{-1}}({}^xW)) = 0.$$

证明. 定理 1.3.1 说明有限群的复表示完全可约。若一个非零表示分解为互不同构不可约表示 V_i 的 $\bigoplus_i V_i^{\oplus m_i}$, 则命题 1.4.3 给出其自同态空间维数为 $\sum_i m_i^2$; 这个数等于 1, 恰好意味着表示不可约。

对定理 4.2.3 取 $K = H$ 、 $U = W$, 代表元 $x = 1$ 的项就是 $\text{End}_{\mathbb{C}[H]} W$ 。所有直和项的维数非负, 且这一项至少为 1。因此总维数为 1, 当且仅当这一项维数为 1 而其余项都为零。再次使用完全可约性与上述维数公式, 前一条件等价于 W 不可约。 $\square$

不可约性判据中的基域条件不能从前面的模同构公式中自动删去。在模特征下, 表示可能不是完全可约的; 此时自同态空间一维并不足以推出不可约。

例 4.2.5. 设 $G = D_{2n} = \langle r, s : r^n = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$, 其中 $n \geq 3$, 且 $H = \langle r \rangle$ 。令 ζ 为本原 n 次单位根, 取 $\lambda_j(r) = \zeta^j$ 。因为 H 正规, 双陪集代表元为 $1, s$, 交集均为 H , 并且 ${}^s\lambda_j = \lambda_{-j}$ 。所以 $\text{Ind}_H^G \lambda_j$ 不可约, 当且仅当 $2j \not\equiv 0 \pmod{n}$ 。

在基 $1 \otimes 1, s \otimes 1$ 下, 两个生成元的矩阵为

$$r \mapsto \begin{pmatrix} \zeta^j & 0 \\ 0 & \zeta^{-j} \end{pmatrix}, \quad s \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 $2j \equiv 0$ 时, 向量 $(1, 1)$ 和 $(1, -1)$ 各自生成不变直线, 诱导表示分成两个一维表示。这也从矩阵上解释了判据中的例外。

4.3 正规子群与 Clifford 理论

一个不可约表示限制到子群后通常会分解。子群正规时, 共轭作用把这些分量联系起来: 它们不能来自彼此无关的若干共轭轨道。本节在复数域上证明这一结构, 并由其中一个等型分量恢复整个表示。

4.3.1 不可约表示限制到正规子群

先回顾命题 1.4.3 中的等型分量。对有限群 N 的有限维复表示 V , 以及不可约复 N -表示 W , 令 V_W 为 V 中所有同构于 W 的 N -子模之和; 若没有这种子模, 就令 $V_W = 0$ 。

由定理 1.3.1, V 是各个非零 V_W 的直和, 而且 $V_W \cong W^{\oplus e_W}$ 。这个子空间不依赖所选的不可约直和分解: 任意简单子模到不同类型分量的投影均为零, 因为引理 1.4.1 说明不同不可约表示之间没有非零同态。同样的理由说明, 任意 N -子模 $U \subseteq V$ 都有

$$U = \bigoplus_{[W]} (U \cap V_W). \quad (4.4)$$

事实上, 先把 U 分解为简单子模, 每个简单子模都只落在一种等型分量中。

定理 4.3.1 (Clifford 限制定理). 设 G 为有限群, $N \trianglelefteq G$, V 为不可约有限维复 G -表示, W 为 $\text{Res}_N^G V$ 的一个不可约成分。则限制表示中的不可约类型恰好组成 W 在 G 共轭作用下的一个轨道, 而且所有类型的重数相等。

这一结论及其后续对应构成 **Clifford 理论** (Clifford theory) 的基本部分。

证明. 由于 N 正规, gW 仍是 N -表示. 若 $A \subseteq V$ 是同构于 W 的 N -子模, 则

$$n(ga) = g(g^{-1}ng)a \quad (n \in N, a \in A)$$

说明 $gA \cong {}^gW$. 对所有这样的 A 求和, 得到

$$gV_W = V_{{}^gW}. \quad (4.5)$$

因此, 同一共轭轨道对应的等型分量之和是非零 G -子模. V 不可约, 迫使这个和等于 V , 故不可能出现第二个轨道。

若 $V_W \cong W^{\oplus e}$, 则等式右边由左边的线性同构得到 $V_{{}^gW} \cong ({}^gW)^{\oplus e}$. 所以各个类型出现相同的重数 e . $\square$

证明中的完全可约性用于限制到 N 的表示和它的子模, 由复数域上的 Maschke 定理保证. 若要推广到其他特征, 需要另行检验这一步。

4.3.2 共轭轨道与惯性群

定义 4.3.2. 设 G 为有限群, $N \trianglelefteq G$, W 为不可约有限维复 N -表示. 子集

$$I_G(W) = \{g \in G : {}^gW \cong W\}$$

称为 W 在 G 中的**惯性群** (inertia group)。

共轭构成 G 在不可约同构类上的作用, 所以 $I_G(W)$ 是子群. 每个 $n \in N$ 都属于它: 若 W 的作用为 ρ , 则 $\rho(n)$ 把 nW 交织到 W . 因此 $N \subseteq I_G(W)$, 轨道由左陪集 $G/I_G(W)$ 标记。

推论 4.3.3. 设 G 为有限群, $N \trianglelefteq G$, V 为不可约有限维复 G -表示, W 为 $\text{Res}_N^G V$ 的一个不可约成分. 令 $I = I_G(W)$, 令 e 为 W 在该限制表示中的重数. 若 χ, θ 分别是 V, W 的特征标, 则

$$\text{Res}_N^G V \cong \bigoplus_{gI \in G/I} ({}^gW)^{\oplus e}, \quad \chi|_N = e \sum_{gI \in G/I} \theta^g,$$

其中 $\theta^g(n) = \theta(g^{-1}ng)$, $n \in N$, 各和取 G/I 的一组左陪集代表元. 特别地,

$$\dim_{\mathbb{C}} V = e[G : I] \dim_{\mathbb{C}} W.$$

证明. 定理 4.3.1 给出一个共轭轨道及相同重数. 轨道中的类型恰由 G/I 标记, 因而得到模分解. 对作用矩阵取迹得到特征标等式, 在单位元处取值得到维数等式. $\square$

例如, S_3 的二维不可约表示限制到 $N = A_3$ 后, 是两个非平凡一维表示之和. 若 $\theta((123)) = \exp(2\pi i/3)$, 则换位把 θ 变成 θ^{-1} , 二者不同, 因而 $I_{S_3}(\theta) = A_3$. 这正是例 4.2.5 中 $n = 3$ 的情形。

4.3.3 等型分解

定理 4.3.4 (Clifford 对应). 设 G 为有限群, $N \trianglelefteq G$, W 为不可约有限维复 N -表示, $I = I_G(W)$. 诱导给出以下两类有限维表示的同构类之间的双射:

1. 限制到 N 时含有 W 的不可约复 I -表示 U ;
2. 限制到 N 时含有 W 的不可约复 G -表示 V .

正向映射为 $U \mapsto \text{Ind}_I^G U$, 逆映射为 $V \mapsto V_W$, 其中 V_W 为 $\text{Res}_N^G V$ 中的 W -等型分量. 特别地, V_W 是不可约 I -表示, 而自然映射

$$\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[I]} V_W \longrightarrow V, \quad g \otimes v \mapsto gv \quad (4.6)$$

是 G -同构。

证明. 先给定第二类中的 V . 等式(4.5)说明 V_W 是 I -不变的. 若 $0 \neq U \subseteq V_W$ 是 I -子模, 则选取 G/I 的代表元后, $\bigoplus_{gI} gU$ 是 G -子模: 任何群元素左乘代表元, 只会改变代表元并带出一个 I 中的因子. 这个和非零, 所以等于 V . 不同 gU 落在不同的 N -等型分量, 取其中的 W -等型部分便有 $U = V_W$. 故 V_W 不可约。

映射(4.6)的平衡关系由 I -作用保证. 它的像包含所有 gV_W , 故满射; 源端的各个陪集分量映到目标中不同的等型分量, 而且每一分量上的映射均为线性同构. 因此它也单射。

反过来, 设 U 属于第一类. 对有限群 I 及其正规子群 N 应用定理 4.3.1, 由于 I 固定 W 的同构类, 得到 $U|_N \cong W^{\oplus e}$. 令 $Y = \text{Ind}_I^G U$. 作为 N -模, 它的陪集分解为

$$Y = \bigoplus_{gI \in G/I} g \otimes U,$$

每一项的类型是 ${}^g W$, 不同陪集的类型互不相同。

若 $0 \neq Z \subseteq Y$ 是 G -子模, 等式(4.4)说明它与某个 $g \otimes U$ 有非零交. 用 g^{-1} 作用, 把非零交移到 $1 \otimes U$. 于是 $Z \cap (1 \otimes U)$ 是非零 I -子模, 必等于 $1 \otimes U$. 再用 G 作用, 得到 $Z = Y$. 所以 Y 不可约. 它的 W -等型分量恰为 $1 \otimes U$, 故两种构造互为逆; 同构也在取等型分量时被保留. $\square$

Clifford 对应把问题从 G 缩到惯性群 I . 当 $I = N$ 时, W 本身已经诱导出不可约 G -表示; 当 $I = G$ 时, 限制只含一种类型, 但重数 e 仍可能大于 1. 后一种情形需要研究 W 能否延拓, 以及重数空间上究竟有怎样的作用。

4.4 射影表示初步

惯性群中的元素都把 W 变成同构的表示, 但为每个元素分别选一个同构, 并不保证这些同构按照群乘法相乘. 差出的标量恰好记下延拓的障碍. 本节从这些标量出发研究这一问题。

4.4.1 表示延拓的障碍

定义 4.4.1. 设 I 为有限群, $N \trianglelefteq I$, W 为有限维复向量空间, $\rho: N \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 为表示。若表示 $\tilde{\rho}: I \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 在 N 上等于 ρ , 则称它为 ρ 到 I 的**延拓** (extension of a representation)。

延拓保持原来的向量空间, 维数不变; 它与一般会增大维数的诱导是不同的构造。如果 ρ 能延拓, 则对 $g \in I$, 矩阵 $\tilde{\rho}(g)$ 实现 $W \cong {}^gW$, 故 W 的同构类必须被 I 固定。下面精确考察这个必要条件还差什么。

定理 4.4.2 (延拓的标量障碍). 设 I 为有限群, $N \trianglelefteq I$, $\rho: N \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 为不可约有限维复表示, 并假定 ${}^gW \cong W$ 对所有 $g \in I$ 成立。令 $Q = I/N$, 选取商映射的集合截面 $s: Q \rightarrow I$, 满足 $s(1) = 1$, 并对 $p, q \in Q$ 记

$$c(p, q) = s(p)s(q)s(pq)^{-1} \in N.$$

可以选取 $T_q \in \text{GL}_{\mathbb{C}}(W)$, 使 $T_1 = 1_W$, 且

$$T_q \rho(n) T_q^{-1} = \rho(s(q)ns(q)^{-1}) \quad (n \in N). \quad (4.7)$$

存在唯一标量 $\alpha(p, q) \in \mathbb{C}^\times$, 使

$$T_p T_q = \alpha(p, q) \rho(c(p, q)) T_{pq}. \quad (4.8)$$

这些标量满足

$$\alpha(1, q) = \alpha(q, 1) = 1, \quad \alpha(p, q)\alpha(pq, r) = \alpha(q, r)\alpha(p, qr) \quad (p, q, r \in Q). \quad (4.9)$$

表示 W 能延拓到 I , 当且仅当存在 $b: Q \rightarrow \mathbb{C}^\times$, $b(1) = 1$, 使

$$b(p)b(q)\alpha(p, q) = b(pq) \quad (p, q \in Q). \quad (4.10)$$

证明. 共轭不变性给出满足(4.7)的可逆交织映射。 $T_p T_q$ 和 $\rho(c(p, q)) T_{pq}$ 都实现由 $s(p)s(q)$ 所给的共轭, 所以二者之比与 $\rho(N)$ 对易。推论 1.4.2 说明该比值为唯一非零标量, 得到(4.8)。

每个 $g \in I$ 唯一写成 $ns(q)$ 。定义可逆算子

$$P(ns(q)) = \rho(n) T_q.$$

若 $g = ns(p)$ 、 $h = ms(q)$, 则

$$\begin{aligned} P(g)P(h) &= \rho(ns(p)ms(p)^{-1}) T_p T_q \\ &= \alpha(p, q) \rho(ns(p)ms(p)^{-1}c(p, q)) T_{pq} \\ &= \alpha(p, q) P(gh). \end{aligned}$$

对三个元素比较 $(P(g)P(h))P(\ell)$ 与 $P(g)(P(h)P(\ell))$, 并消去可逆的 $P(gh\ell)$, 就得到(4.9)中的第二个等式; 单位元处的等式来自 $T_1 = 1_W$ 。

如果存在 b 满足(4.10), 则 $\tilde{\rho}(ns(q)) = \rho(n)b(q)T_q$ 按上述乘法计算是群表示, 而且在 N 上等于 ρ 。反过来, 若有延拓, 则 $\tilde{\rho}(s(q))$ 与 T_q 实现同一个共轭。Schur 引理给出 $\tilde{\rho}(s(q)) = b(q)T_q$, 再比较两者乘法便得到(4.10)。 $\square$

不能把“不变”直接换成“可延拓”。取

$$I = Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm ij\}, \quad N = \{\pm 1\},$$

并令 $\rho(-1) = -1$ 。 N 在中心，故这个一维表示被全部 I 固定。但任何一维 Q_8 -表示都把交换子送到 1，而 $iji^{-1}j^{-1} = -1$ ，所以它不能延拓。这个障碍在下一小节可以直接算成一个不对称的标量函数。

4.4.2 因子集与 2-余圈

定义 4.4.3. 设 Q 为有限群， $E \neq 0$ 为有限维复向量空间。若映射 $R: Q \rightarrow \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(E)$ 满足 $R(1) = 1_E$ ，并对每个 $p, q \in Q$ 存在非零标量 $\alpha(p, q)$ ，使

$$R(p)R(q) = \alpha(p, q)R(pq),$$

则称 R 为 Q 的**射影表示** (projective representation)，称 α 为所选矩阵的**因子集** (factor set)。若 E 没有非零真子空间同时被所有 $R(q)$ 保持，则称这个射影表示不可约。

把矩阵模去非零标量后，射影表示给出群同态 $Q \rightarrow \mathrm{PGL}(E)$ 。反之，这样的群同态选取矩阵代表后就给出因子集；代表不同，因子集也可能不同。

定义 4.4.4. 设 Q 为有限群， $\alpha: Q \times Q \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 为函数。若对所有 $p, q, r \in Q$ 有

$$\alpha(1, q) = \alpha(q, 1) = 1, \quad \alpha(p, q)\alpha(pq, r) = \alpha(q, r)\alpha(p, qr),$$

则称 α 为系数作用平凡的**归一化 2-余圈** (normalized 2-cocycle)。若存在 $a: Q \rightarrow \mathbb{C}^\times$ ， $a(1) = 1$ ，使

$$\alpha(p, q) = \frac{a(p)a(q)}{a(pq)} \quad (p, q \in Q),$$

则称 α 为一个**2-余边** (2-coboundary)。

矩阵乘法的结合律说明每个因子集都是归一化 2-余圈。将 $R(q)$ 改成 $b(q)R(q)$ ，因子集变成

$$\alpha'(p, q) = \frac{b(p)b(q)}{b(pq)}\alpha(p, q). \quad (4.11)$$

所以定理 4.4.2 可表述为：延拓存在，当且仅当所得因子集是一个 2-余边。

命题 4.4.5. 设 I 为有限群， $N \trianglelefteq I$ ， $\rho: N \rightarrow \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 为同构类被 I 固定的不可约有限维复表示。令 $Q = I/N$ ，取商映射的截面 $s: Q \rightarrow I$ ， $s(1) = 1$ ，以及算子 $T_q \in \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ ，使 $T_1 = 1_W$ 且 $T_q \rho(n) T_q^{-1} = \rho(s(q)ns(q)^{-1})$ 对 $q \in Q, n \in N$ 成立。对 $p, q \in Q$ ，记 $c(p, q) = s(p)s(q)s(pq)^{-1}$ ，由 $T_p T_q = \alpha(p, q)\rho(c(p, q))T_{pq}$ 确定因子集 $\alpha: Q \times Q \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 。更换交织算子或截面后，新因子集 α' 满足 α'/α 是一个 2-余边。因此，“能否延拓”的判断不依赖这些选择。

证明。固定截面时，任意另一组交织算子由 Schur 引理写成 $T'_q = b(q)T_q$ ，其因子集由(4.11)给出。

若改用 $s'(q) = d(q)s(q)$, 其中 $d(q) \in N$ 、 $d(1) = 1$, 先选 $T'_q = \rho(d(q))T_q$ 。对同一个群元素, 写成 $ns(q) = n's'(q)$ 就有 $n = n'd(q)$, 从而 $\rho(n)T_q = \rho(n')T'_q$ 。所以证明中定义的 $P(g)$ 完全不变, 因子集也不变。再作其他交织算子选择时, 才按前一段改变一个余边。 $\square$

回到 Q_8 。把 $Q = Q_8/N$ 写成 $\mathbb{F}_2^2$, 取 $s(a, b) = i^a j^b$ 及 $T_{(a,b)} = 1$ 。这里

$$\alpha((a, b), (c, d)) = (-1)^{ac+bd+bc}.$$

指数按模 2 计算。这是双线性式, 所以直接展开也可验证余圈恒等式。取 $p = (1, 0)$ 、 $q = (0, 1)$, 得到 $\alpha(p, q) = 1$ 而 $\alpha(q, p) = -1$ 。交换群上的余边 $a(p)a(q)/a(pq)$ 对称, 故这个因子集不是余边。

4.4.3 与群上同调、交叉积的联系

把所有归一化 2-余圈按逐点相乘组成交换群, 再模去 2-余边子群, 就得到记为 $H^2(Q, \mathbb{C}^\times)$ 的群。这里 $\mathbb{C}^\times$ 上的 Q -作用是平凡的。它是群上同调的一个具体低阶形式; 当前的延拓障碍就是 $[\alpha]$ 。

同一个因子集还可写成一个代数的乘法。给定有限群 Q 和归一化 2-余圈 α , 在以 u_q 为基的复向量空间上定义

$$u_p u_q = \alpha(p, q) u_{pq}.$$

归一化条件使 u_1 为单位元, 余圈恒等式恰好使乘法结合; 各个 u_q 都可逆。这个代数称为**扭曲群代数** (twisted group algebra), 记为 $\mathbb{C}^\alpha[Q]$ 。它是系数域上作用平凡的交叉积。给出一个非零有限维左 $\mathbb{C}^\alpha[Q]$ -模, 等价于给出因子集为 α 的射影表示: 令 u_q 按 $R(q)$ 作用即可。重标定基 u_q 与 (4.11) 完全对应。

定理 4.4.6 (重数空间上的射影表示). 设 I 为有限群, $N \trianglelefteq I$, $\rho: N \rightarrow \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 为同构类被 I 固定的不可约有限维复表示。令 $Q = I/N$, 取商映射的截面 $s: Q \rightarrow I$ 、 $s(1) = 1$, 以及算子 $T_q \in \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$, 使 $T_1 = 1_W$ 且

$$T_q \rho(n) T_q^{-1} = \rho(s(q) n s(q)^{-1}) \quad (n \in N, q \in Q).$$

对 $p, q \in Q$, 记 $c(p, q) = s(p)s(q)s(pq)^{-1}$, 以

$$T_p T_q = \alpha(p, q) \rho(c(p, q)) T_{pq}$$

确定因子集 $\alpha: Q \times Q \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 。给定正整数 e , 满足 $\mathrm{Res}_N^I U \cong W^{\oplus e}$ 的非零有限维复 I -表示 U , 等价地由 e 维复向量空间 E 上因子集为 α^{-1} 的射影 Q -表示 $S: Q \rightarrow \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(E)$ 给出, 其作用为

$$ns(q) \mapsto \rho(n) T_q \otimes S(q) \quad \text{作用在 } W \otimes_{\mathbb{C}} E \text{ 上.} \quad (4.12)$$

而且 U 不可约, 当且仅当 S 不可约。

证明. 先给定 U , 记其表示为 π , 并令 $E = \text{Hom}_{\mathbb{C}[N]}(W, U)$. 由于 $U|_N \cong W^{\oplus e}$ 且 $\text{End}_N(W) = \mathbb{C}$, 求值映射

$$W \otimes E \longrightarrow U, \quad w \otimes f \longmapsto f(w)$$

由命题 1.4.3 是 N -同构, 且 $\dim E = e$. 定义

$$S(q)f = \pi(s(q))fT_q^{-1}.$$

由(4.7), 对 $n \in N$ 有

$$\begin{aligned} (S(q)f)\rho(n) &= \pi(s(q))f\rho(s(q)^{-1}ns(q))T_q^{-1} \\ &= \pi(n)\pi(s(q))fT_q^{-1} = \pi(n)(S(q)f). \end{aligned}$$

所以此复合仍是 N -线性映射, 确实属于 E . 求值映射把 $T_q \otimes S(q)$ 的作用变成 $\pi(s(q))$, 从而得到(4.12).

将这个等式对 p, q 相乘. 左侧的群作用相乘为 $\pi(c(p, q))\pi(s(pq))$, 右侧的第一个张量因子满足(4.8). 消去可逆算子 $\rho(c(p, q))T_{pq}$, 得到

$$S(p)S(q) = \alpha(p, q)^{-1}S(pq).$$

反过来, 若 S 满足此等式, 则(4.12)中两个因子产生的标量互相抵消, 因而给出普通的 I -表示; 在 N 上它是 $\rho(n) \otimes 1_E$.

最后, $W \otimes E$ 的每个 N -子模都是 $W \otimes F$ 的形式, 其中 $F \subseteq E$: 将该子模分解为 W 的直和, 并对它应用同一个求值同构即可. 由于每个 T_q 可逆, 子空间 $W \otimes F$ 被 I 保持, 当且仅当 F 被所有 $S(q)$ 保持. 这就证明了不可约性的等价. $\square$

结合定理 4.3.4, 先在惯性群中求这些射影表示, 再诱导到 G , 便得到限制中含有 W 的全部不可约表示. 若障碍为零, 可以重标定 T_q , 使它们给出 W 的延拓; 此时 $\alpha = 1$, 重数空间上的表示也成为普通的商群表示.

本章小结

双倍集 $K \backslash G/H$ 描述 K 在 G/H 上的轨道, 交集 $K \cap xHx^{-1}$ 则是相应点的稳定子群. Mackey 分解把这一集合分解提升为任意域上的模同构; 配合诱导与余诱导的伴随性质, 便可把两个诱导表示之间的交织空间化为交集子群上的计算. 在复数域上, 自同态空间的维数又给出不可约性判据.

当 N 正规时, 一个不可约 G -表示限制到 N 后, 只出现一个共轭轨道, 轨道中各类型的重数相等. Clifford 对应说明, 其中一个等型分量是惯性群的不可约表示, 诱导它就能恢复原表示. 惯性群固定不可约类型, 却未必允许在原空间上延拓作用; 这种差别由一个标量 2-余圈记录. 重数空间上的射影表示以该余圈的倒数为因子集, 使两个射影作用的标量相互抵消, 最终形成普通表示.

习题

习题 4.1. 设 G 为有限群, $H \trianglelefteq G$, $K \leq G$. 证明 KH 是子群, 且每个双陪集 KxH 等于右陪集 KHx . 求双陪集个数以及每块的大小, 并解释为什么所有交集子群相同.

解. 正规性给出 $(k_1 h_1)(k_2 h_2) = k_1 k_2 (k_2^{-1} h_1 k_2) h_2 \in KH$, 逆元也可写成 K 中元素乘 H 中元素, 所以 $KH \leq G$. 由于 $xHx^{-1} = H$, 有 $KxH = KHx$. 这实际上是 KH 的右陪集, 因而双陪集个数为 $[G : KH]$, 每块大小为 $|KH| = |K| \cdot |H| / |K \cap H|$. 交集 $K \cap xHx^{-1} = K \cap H$ 不依赖 x . $\square$

习题 4.2. 在 $D_8 = \langle r, s : r^4 = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$ 中取 $H = \langle s \rangle$. 求 $H \backslash D_8 / H$. 若 $\varepsilon(s) = -1$, 把 $\text{Res}_H^{D_8} \text{Ind}_H^{D_8} \varepsilon$ 分解为不可约复 H -表示.

解. 三个双陪集为 H 、 $HrH = \{r, r^3, rs, r^3s\}$ 、 $Hr^2H = r^2H$, 大小为 2, 4, 2. 代表元 1, r , r^2 对应的交集分别为 $H, \{1\}, H$, 因为 $rsr^{-1} = r^2s$, 而 r^2 在中心. Mackey 分解给出

$$\varepsilon \oplus \text{Ind}_{\{1\}}^H \mathbb{C} \oplus \varepsilon \cong \mathbf{1}_H \oplus \varepsilon^{\oplus 3}.$$

中间一项是二阶群的正则表示, 其两个特征向量分别为两个基向量之和与之差. $\square$

习题 4.3. 令 $G = S_4$, H 为固定 4 的子群, $K = \langle (12) \rangle$. 求 $K \backslash G / H$ 的代表元和交集子群, 并计算 $\dim_k \text{Hom}_{k[G]}(k[G/K], k[G/H])$, 其中 k 是任意域.

解. 把 G/H 识别为四点集, K 的轨道为 $\{1, 2\}$ 、 $\{3\}$ 、 $\{4\}$. 可取代表元 (14) , (34) , 1. 第一点的稳定子群为 $\{1\}$, 后两点的稳定子群为 K , 所以这些也是对应的交集子群. 对定理 4.2.3 取两个平凡表示, 每个直和项均为 $\text{Hom}_{k[L_x]}(k, k) = k$, 故维数为 3, 不受 k 的特征影响. $\square$

习题 4.4. 设 k 的特征为 3, $G = S_3$, $H = \langle (12) \rangle$, $N = A_3$. 用 Mackey 公式计算 $\text{Res}_N^G \text{Ind}_H^G k$, 并证明所得 N -模不是完全可约的.

解. N 在三点集 G/H 上传递, 且稳定子群为 $N \cap H = \{1\}$. 因此只有一个双陪集, 限制表示同构于 $k[N]$. 若 $a = (123)$, 则

$$k[N] \cong k[t]/(t^3 - 1) = k[t]/(t - 1)^3.$$

乘 $t - 1$ 是非零幂零算子. 在任何简单 $k[N]$ -模上, 它的核非零且为子模, 故它只能为零; 所以若正则模完全可约, $t - 1$ 必在整个正则模上为零, 与上述计算矛盾. 这说明 Mackey 同构本身并不以半单性为前提. $\square$

习题 4.5. 设 G 为有限群, $H < G$. 若存在 $x \notin H$ 使 $H \cap xHx^{-1} = \{1\}$, 证明对每个非零有限维复 H -表示 W , $\text{Ind}_H^G W$ 都可约.

解. 在交织空间公式中, $x = 1$ 的项至少一维, 所给 x 的项是底层向量空间之间的 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(W, W)$, 维数为 $(\dim W)^2 > 0$. 所以诱导表示的自同态空间维数至少为 2. 它是完全可约的, 故由命题 1.4.3 不能不可约. 这里不必事先假设 W 不可约. $\square$

习题 4.6. 设 G 为有限群, $N \trianglelefteq G$, W 为不可约复 N -表示, $I = I_G(W)$. 证明

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{End}_G(\text{Ind}_N^G W) = [I : N].$$

若 W' 是另一个不可约复 N -表示, 证明 $\text{Ind}_N^G W$ 与 $\text{Ind}_N^G W'$ 之间存在非零同态, 当且仅当 W' 与 W 共轭.

解. 双陪集 $N \backslash G / N$ 就是 G/N , 每个交集都是 N . 交织公式中的项为 $\text{Hom}_N(W, {}^g W)$, 由 Schur 引理, 它在 $g \in I$ 时一维, 在其他情形为零. 故总维数为 $[I : N]$. 对两个不同的表示应用同一公式, 直和项为 $\text{Hom}_N(W, {}^g W')$, 其非零条件恰为 $W \cong {}^g W'$, 得到第二个断言. $\square$

习题 4.7. 设 $V = \{(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{C}^4 : \sum_i z_i = 0\}$, 赋予 S_4 的坐标置换作用. 证明 V 不可约, 而它限制到固定 4 的 S_3 后出现维数不同的不可约成分. 说明这与 Clifford 限制定理没有矛盾.

解. S_4 在四点上的置换表示包含一次平凡表示, 且由双陪集计算, 其自同态空间维数为 2. 故其补空间 V 不可约. 限制到 S_3 时, 有分解

$$V = \mathbb{C}(1, 1, 1, -3) \oplus \{(z_1, z_2, z_3, 0) : z_1 + z_2 + z_3 = 0\}.$$

前一项平凡, 后一项是三点置换表示去掉平凡项后的二维不可约表示, 其不可约性由相同的两双陪集计算得到. 这个 S_3 不是 S_4 的正规子群, 所以不可约成分不必形成同维的共轭轨道. $\square$

习题 4.8. 令 $N = \{1, a, b, c\} \trianglelefteq S_4$, 其中 $a = (12)(34)$ 、 $b = (13)(24)$ 、 $c = (14)(23)$. 取上题的三维表示 V , 并令 $\lambda(a) = 1$ 、 $\lambda(b) = \lambda(c) = -1$. 求 V_λ 和 $I_{S_4}(\lambda)$, 并把 V 写成一个一维表示的诱导.

解. 向量 $v = (1, 1, -1, -1)$ 满足 $av = v$ 、 $bv = cv = -v$, 故 $\mathbb{C}v \subseteq V_\lambda$. 对另两个分拆 $13|24$ 、 $14|23$ 取对应的正负向量, 得到三条线性无关的特征直线, 因此 $V_\lambda = \mathbb{C}v$, 其余两条是另外两个非平凡特征标的等型分量.

惯性群必须固定 $\ker \lambda = \{1, a\}$, 等价于在共轭下固定 a . 它就是保持无序分拆 $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ 的子群 I , 阶为 8. I 在 $\mathbb{C}v$ 上的特征标 η 对保持两块的元素取 1, 对交换两块的元素取 -1 . Clifford 对应给出 $V \cong \text{Ind}_I^{S_4} \eta$, 维数为 $[S_4 : I] = 3$. $\square$

习题 4.9. 在 $\mathbb{C}^2$ 上令

$$\rho(i) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \rho(j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $i^2 = -1$. 证明它们给出 Q_8 的不可约表示, 并分别对正规子群 $\langle i \rangle$ 和 $\{\pm 1\}$ 计算 Clifford 轨道、惯性群和重数.

解. 两个矩阵的平方都是 $-I_2$, 且反对易, 因此满足 Q_8 的关系. 第一个矩阵的两个特征值不同, 任何共同不变直线只能是其一条坐标特征线, 但第二个矩阵交换这两条线, 所以表示不可约.

对 $\langle i \rangle$, 限制为特征标 $i \mapsto i$ 与 $i \mapsto -i$ 之和。 j 交换二者, 惯性群为 $\langle i \rangle$, 重数 $e = 1$ 。对中心 $\{\pm 1\}$, 只有特征标 $-1 \mapsto -1$, 出现重数 $e = 2$, 其惯性群为全部 Q_8 。同一个表示的轨道长度和重数会随正规子群的选择而改变。□

习题 4.10. 设 G 为有限群, $N \leq Z(G)$, V 为不可约复 G -表示。证明存在唯一一维特征标 $\lambda: N \rightarrow \mathbb{C}^\times$, 使 n 在 V 上按 $\lambda(n)I_V$ 作用。给出它与 Clifford 限制公式中 e 和 I 的关系。

解. 每个 $\rho(n)$ 与整个 $\rho(G)$ 对易, 故推论 1.4.2 使它为唯一标量 $\lambda(n)$ 。群乘法说明 $\lambda(nm) = \lambda(n)\lambda(m)$, 所以它是一维特征标。限制为 $\lambda^{\oplus \dim V}$, 从而 $I = G$ 、 $e = \dim V$ 。中心上的同构类型虽然只有一个, 重数仍可大于 1, 上题的 Q_8 就给出例子。□

习题 4.11. 设 $N \trianglelefteq I$ 为有限群的正规子群, ρ 为不可约复 N -表示, 并已有个延拓 $\tilde{\rho}$ 。证明所有延拓都唯一写成

$$g \mapsto \lambda(gN)\tilde{\rho}(g),$$

其中 $\lambda: I/N \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 为一维特征标。

解. 给定另一延拓 σ , $\sigma(g)$ 与 $\tilde{\rho}(g)$ 实现同一个 N 的共轭作用, 因此它们的比值与 $\rho(N)$ 对易。Schur 引理给出唯一标量 $\lambda(g)$, 使 $\sigma(g) = \lambda(g)\tilde{\rho}(g)$ 。比较 gh 上的乘法得到 $\lambda(gh) = \lambda(g)\lambda(h)$, 在 N 上两延拓相同使 $\lambda|_N = 1$, 故它下降为 I/N 的特征标。反过来, 用任意这样的特征标相乘仍是延拓, 且表达式唯一。□

习题 4.12. 设 I 为有限群, $N \trianglelefteq I$, 且 I/N 为阶 d 的循环群。证明每个同构类被 I 固定的不可约复 N -表示都能延拓到 I 。

解. 选取 $t \in I$, 使 tN 生成 I/N , 并选可逆 T 满足 $T\rho(n)T^{-1} = \rho(tnt^{-1})$ 。 T^d 与 $\rho(t^d)$ 实现同一个共轭, 所以 $T^d = a \cdot \rho(t^d)$, 其中 $a \in \mathbb{C}^\times$ 。取 $b \in \mathbb{C}^\times$ 满足 $b^d = a^{-1}$, 令 $S = bT$, 便有 $S^d = \rho(t^d)$ 。

每个群元素唯一写成 nt^j , 其中 $0 \leq j < d$ 。定义 $\tilde{\rho}(nt^j) = \rho(n)S^j$ 。乘法中先用 $S^j\rho(m)S^{-j} = \rho(t^jmt^{-j})$ 移动 N 中的因子; 若指数越过 d , 再以 $S^d = \rho(t^d)$ 作相同的归并。于是 $\tilde{\rho}(gh) = \tilde{\rho}(g)\tilde{\rho}(h)$, 且它在 N 上等于 ρ 。复数中 d 次根的存在是这一步调整所用的条件。□

习题 4.13. 设 $G = S_3$, $N = A_3$, $\lambda((123)) = \zeta$, 其中 $\zeta \neq 1$ 为三次单位根。证明 λ 不能延拓到 G , 并说明上一题的循环商群条件为何没有给出矛盾。

解. 换位把 (123) 共轭为其逆, 因此把 λ 变成不同的 λ^{-1} 。若 λ 有一维延拓, 则共轭在一维标量矩阵上不起作用, 迫使 $\zeta = \zeta^{-1}$, 矛盾。虽然 $G/N \cong C_2$ 为循环群, 但上一题还要求不可约类型被整个 G 固定; 这里惯性群只有 N 。□

习题 4.14. 令 $Q = \mathbb{F}_2^2$, 并定义 $\alpha((a, b), (c, d)) = (-1)^{bc}$ 。证明 α 是归一化 2-余图但不是余边。再令

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

证明 $u_{(a,b)} \mapsto X^a Y^b$ 给出 $\mathbb{C}^\alpha[Q] \cong M_2(\mathbb{C})$, 并求其不可约射影表示的维数。

解. 函数的指数 bc 对两个变量双线性, 展开三个变量即得余圈等式, 单位元处也为 1. 但 $\alpha((1, 0), (0, 1)) = 1$, 反向为 -1 , 而交换群的余边对称, 所以它不是余边.

$X^2 = Y^2 = I_2$ 且 $YX = -XY$, 故矩阵乘法恰好满足给定的因子集. 四个矩阵 I_2, X, Y, XY 线性无关, 分别张成对角和非对角的全部矩阵, 因此映射是代数同构. 为直接看出简单模的形式, 设 E 是非零简单 $M_2(\mathbb{C})$ -模, 选 $0 \neq v \in E_{11}E$; 若原先只有 $E_{22}E$ 非零, 用 E_{12} 即移到这里. $v, E_{21}v$ 线性无关, 其线性生成空间被所有矩阵单位保持, 故由简单性等于 E . 所以只有一个不可约类型, 维数为 2. $\square$

习题 4.15. 设 $Q = \mathbb{F}_2^2$ 为加法群, $\alpha((a, b), (c, d)) = (-1)^{bc}$ 为复标量因子集. 比较 α 与 Q_8 延拓障碍产生的因子集 $\beta((a, b), (c, d)) = (-1)^{ac+bd+bc}$, 各指数按模 2 计算. 求一个显式函数 $f: Q \rightarrow \mathbb{C}^\times$, 使 $\beta = (\delta f)\alpha$, 其中 $(\delta f)(p, q) = f(p)f(q)/f(p+q)$. 解释为何两者描述同一个非零障碍类.

解. 取 $f(a, b) = i^{a+b}$, 其中 a, b 用 0, 1 表示. 模 2 加法发生进位时,

$$\frac{f(a, b)f(c, d)}{f(a+c, b+d)} = (-1)^{ac+bd}.$$

分母的参数按模 2 相加. 因此 $\beta = (\delta f)\alpha$, 它们相差余边, 代表同一个类. 这个类非零, 因为上一题已由不对称性证明 α 不是余边. 相应扭曲群代数通过重标定基同构. $\square$

习题 4.16. 设有限群 Q 有一个 d 维射影复表示 R , 因子集为 α . 证明 α^d 是余边. 如果 $[\alpha]$ 在余圈模余边的群中有有限阶 m , 证明 $m \mid d$, 并应用于前两题.

解. 对 $R(p)R(q) = \alpha(p, q)R(pq)$ 取行列式, 得到

$$\alpha(p, q)^d = \frac{\det R(p) \det R(q)}{\det R(pq)}.$$

右侧就是函数 $q \mapsto \det R(q)$ 的余边, 所以 $[\alpha]^d = 1$. 阶的定义给出 $m \mid d$. 前两题中 $\alpha^2 = 1$ 且类非零, 所以其类的阶为 2, 任何具有该因子集的非零射影表示都具有偶数维数; 构造出的二维表示达到最小可能维数. $\square$

习题 4.17. 设有限群 Q 上的归一化余圈 α 取值于 m 次单位根群 μ_m . 在 $\mu_m \times Q$ 上定义

$$(z, p)(w, q) = (zw\alpha(p, q), pq).$$

证明它是一个群, 且 $\mu_m \times \{1\}$ 是中心子群. 证明因子集为 α 的射影表示 R 可以提升为这个群的普通表示.

解. 三项乘法的标量部分相等, 恰好等价于余圈等式; 单位元为 $(1, 1)$. 把余圈等式用于 (p, p^{-1}, p) , 得到 $\alpha(p, p^{-1}) = \alpha(p^{-1}, p)$, 因此逆元为

$$(z, p)^{-1} = (z^{-1} \cdot \alpha(p, p^{-1})^{-1}, p^{-1}).$$

归一化条件说明 $(z, 1)$ 与所有元素对易; 投影到 Q 的核正是这个中心子群. 定义 $\widetilde{R}(z, p) = z \cdot R(p)$, 则 $\widetilde{R}(z, p)\widetilde{R}(w, q) = zw\alpha(p, q)R(pq)$, 与群乘法相容. 这一表示把中心元素 $(z, 1)$ 送到 zI . $\square$

习题 4.18. 设 Q 为有限交换群, α 为归一化复标量 2-余圈。证明扭曲群代数 $\mathbb{C}^\alpha[Q]$ 的中心由满足

$$\alpha(p, q) = \alpha(q, p) \quad \text{对所有 } q \in Q$$

的那些 u_p 张成, 并求习题 4.14 中代数的中心。

解. 写 $z = \sum_p a_p u_p$. 对固定 q , 因为 Q 交换, 比较 zu_q 与 $u_q z$ 的基向量 u_{pq} 的系数, 得到

$$a_p(\alpha(p, q) - \alpha(q, p)) = 0.$$

所以 $a_p \neq 0$ 的必要充分条件正是题中的全部等式。对 $Q = \mathbb{F}_2^2, \alpha((a, b), (c, d)) = (-1)^{bc}$, 分别取 $(c, d) = (1, 0), (0, 1)$, 条件迫使 $b = 0, a = 0$ 。故中心只有 $\mathbb{C}u_{(0,0)}$, 与 $M_2(\mathbb{C})$ 的标量中心一致。□

习题 4.19. 设 N, Q 为有限群, $G = N \times Q$ 。利用本章的重数空间构造, 证明 G 的每个不可约复表示都唯一写成 $W \otimes E$, 其中 W, E 分别是 N, Q 的不可约复表示, 作用为 $(n, q)(w \otimes e) = nw \otimes qe$ 。

解. 把 N 识别为第一因子。它的每个不可约类型均被 G 固定, 因为第二因子与它对易, 第一因子的共轭只改变同构表示。Clifford 限制定理使任何不可约 G -表示限制为 $W^{\oplus e}$, 且 W 的同构类型唯一。用 $(n, q) \mapsto \rho_W(n)$ 延拓 W , 可在商群 Q 上取所有 $T_q = 1$, 因子集为 1。定理 4.4.6 遂给出普通 Q -表示 $E = \text{Hom}_N(W, V)$, 并说明 V 不可约当且仅当 E 不可约。求值同构给出所述张量积, 也保证 E 的类型唯一。反过来, 每一对不可约 W, E 都由该定理给出不可约张量积。□

习题 4.20. 设 G 为有限群, $N \trianglelefteq G$, W 为不可约复 N -表示, $I = I_G(W)$ 。让 $U_1, \dots, U_r$ 遍历限制到 N 时含有 W 的不可约 I -表示, 写 $U_j|_N \cong W^{\oplus e_j}$ 。证明

$$\sum_{j=1}^r e_j^2 = [I : N].$$

解释它在因子集非平凡时说明了什么。

解. 把完全可约的 $\text{Ind}_N^I W$ 分解为不可约表示。由 Frobenius 互反性, U_j 的重数为 $\dim \text{Hom}_N(W, U_j|_N) = e_j$, 其他不可约表示的重数为零。因此

$$[I : N] \dim W = \dim \text{Ind}_N^I W = \sum_j e_j \dim U_j = \sum_j e_j^2 \dim W.$$

消去非零的 $\dim W$ 得到公式。由重数空间定理, e_j 是同一个反因子集的全部不可约射影表示的维数, 因此即使障碍非零, 仍有相应的平方和公式; 不能把这些射影表示直接换成普通商群表示。□

习题 4.21. 设 k 的特征为 3, 让 S_3 在

$$A = \{(x, y, z) \in k^3 : x + y + z = 0\}$$

上置换坐标。证明 A 可约, 但 $\text{End}_{k[S_3]} A = k$ 。由此说明 Mackey 不可约性判据的证明为何使用完全可约性。

解. 非零向量 $(1, 1, 1)$ 属于 A , 其生成的直线被全群固定, 所以二维空间 A 可约. 取基 $u = (1, -1, 0)$ 、 $v = (0, 1, -1)$. 在此基下, (123) 与 (12) 的矩阵分别为

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若算子 F 与 C 对易, 写 $F(u) = au + bv$, 则 $F(v) = F(Cu) = CF(u) = -bu + (a-b)v$, 故 $F = aI + bC$. 它还与 T 对易, 当且仅当 $b(CT - TC) = 0$. 矩阵 $CT - TC$ 非零, 例如在 u 上的值为 $-u - 2v \neq 0$, 于是 $b = 0$. 所以所有群模自同态都是标量. 自同态空间一维在缺少完全可约性时, 并不能排除真子表示. $\square$

习题 4.22. 设 $G = \langle r, s : r^7 = s^3 = 1, srs^{-1} = r^2 \rangle$, 并令 $N = \langle r \rangle$. 求 N 的非平凡一维复特征标在 G 共轭下的轨道, 构造由它们得到的不可约三维表示, 并证明这些表示与三个一维表示穷尽 G 的不可约复表示.

解. 取本原七次单位根 ζ , 写 $\lambda_j(r) = \zeta^j$. 由于 $s^{-1}rs = r^4$, 共轭把 j 送到 $4j$. 六个非零指数分成 $\{1, 2, 4\}$ 与 $\{3, 5, 6\}$ 两个轨道, 各特征标的惯性群都是 N . Clifford 对应给出两个三维不可约表示 $\text{Ind}_N^G \lambda_1$ 、 $\text{Ind}_N^G \lambda_3$; 它们限制到 N 的类型不同, 故不同构.

若一个不可约 G -表示限制到 N 含有平凡特征标, Clifford 限制定理说明整个 N 都平凡作用, 因此该表示来自 $G/N \cong C_3$, 共有三个一维类型. 若限制中含有非平凡特征标, 则它属于上述两个轨道之一, 且惯性群等于 N , Clifford 对应说明它只能是相应的三维诱导表示. 所有情形因而已经穷尽. $\square$

第五章 Artin 诱导、Brauer 诱导与群论应用

本章研究从子群诱导特征标的有理与整数表达，证明 Artin 和 Brauer 诱导定理，并由特征标整性推得 Burnside 的 $p^a q^b$ 阶群可解性定理。

本章目标

- 使用表示环、次数及不可约系数，区分实际特征标与虚特征标。
- 证明特征标值与类和标量的整性，并说明次数整除的来源。
- 区分有理系数诱导、有理值特征标及仅从平凡表示诱导的不同结论。
- 掌握 p -初等子群的定义，逐步排除整诱导中的每个素数分母。
- 用 Clifford 理论证明 p -群的单项式性，将整诱导化为来自一维表示的诱导。
- 从素数幂大小的共轭类构造正规子群，证明 Burnside 可解性定理，并判断哪些群满足其条件。

设 G 为有限群。其复正则特征标从平凡子群诱导而来；它在单位元的值是群阶，在其余元素处却全为零。若只从这个子群诱导，便看不出别的不可约特征标在非单位元处的取值。改从较大的子群诱导，所得函数会在更多共轭类上留下信息；但究竟要允许哪些子群、哪些系数，才能组合出所需的特征标？有理系数与整数系数给出不同的答案。这个问题引出 Artin 与 Brauer 两种诱导定理，也迫使我们认真检查特征标值的整性及诱导在各共轭类上的行为。

本章使用前四章的复特征标、诱导公式、张量恒等式及 Clifford 对应，也使用有限群的 Sylow 定理。所需代数整数与有限交换环的引理在章内证明。第 5.4 节从特征标计算转入表示环的局部化与极大理想检测，证明 Brauer 整诱导定理；第 5.5 节再用整性方法证明 Burnside 定理。

参考阅读中，Etingof 等的《Introduction to Representation Theory》[4, Sections 5.2–5.4, Section 5.26] 分别讨论整性、Burnside 证明和 Artin 诱导；Serre 的《Linear Representations of Finite Groups》[14, Chapter 10, pp. 74–80] 集中讨论 Brauer 诱导。本章逐素数证明使用表示环极大理想的求值描述，并把相关环论步骤展开。

5.1 表示环、代数整数性与类和

特征标的加法来自直和，乘法来自张量积。允许相减以后，诱导问题便可以放进一个环中讨论。整数系数的诱导比有理系数的诱导要求更强，需要研究特征标格、单位根和有限生成的整系数模。本节介绍这些工具。

5.1.1 表示环

定义 5.1.1. 设 G 为有限群, $\text{Irr}(G)$ 为其复不可约特征标的集合。所有有限和

$$R_{\mathbb{C}}(G) := \bigoplus_{\chi \in \text{Irr}(G)} \mathbb{Z}\chi$$

在类函数的逐点加法、乘法下组成的环, 称为 G 的复表示环 (representation ring), 以下简记为 $R(G)$ 。其元素称为虚特征标 (virtual character)。乘法单位是平凡特征标 1_G , 而不是正则特征标。

乘积确实仍在上述整数格内: 若 V, W 为复表示, 则 $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W$, 将 $V \otimes W$ 分解成不可约表示便得到非负整数系数。每个虚特征标都能写成 $\chi_V - \chi_W$; 此记号只记录直和的形式差, 不声称存在一个维数可能为负的向量空间。

次数映射 $\dim : R(G) \rightarrow \mathbb{Z}, \alpha \mapsto \alpha(1)$ 是环同态。其核称为增广理想。次数非负的虚特征标未必是实际特征标: 在 C_2 中, 若非平凡一维特征标为 ε , 则 $2 \cdot 1 - \varepsilon$ 的次数为 1, 但不可约展开有负系数。由正交关系, $\alpha \in R(G)$ 是实际特征标, 当且仅当对所有不可约 $\chi, \langle \chi, \alpha \rangle_G \geq 0$ 。本章内积对第一变量共轭线性。

5.1.2 特征标值的代数整数性

定义 5.1.2. 设 $z \in \mathbb{C}$ 。若存在 $n \geq 1$ 及整数 $a_0, \dots, a_{n-1}$, 使

$$z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0 = 0,$$

则称 z 为代数整数 (algebraic integer)。

下面的判据避免每遇到一个和或积便重新猜测其首一方程。

引理 5.1.3 (有限生成模的整性判据). 设 $A \subset B$ 为含同一单位的交换环, B 作为 A -模由有限多个元素生成。每个 $b \in B$ 都满足某个首一 A -系数多项式。特别地, 若 $B \subset \mathbb{C}$ 且 B 是有限生成的 $\mathbb{Z}$ -模, 则 B 中每个元素都是代数整数。

证明. 选取模生成元 $u_1, \dots, u_r$, 写成 $bu_j = \sum_i a_{ij}u_i$ 。矩阵 $bI - (a_{ij})$ 的伴随矩阵恒等式说明, 首一多项式 $F(T) = \det(TI - (a_{ij}))$ 的值 $F(b)$ 零化每个 u_j 。由于 1 是这些生成元的 A -线性组合, $F(b) \cdot 1 = 0$, 故 $F(b) = 0$ 。此论证不要求生成元线性无关。□

命题 5.1.4. 设 G 为有限群, m 为各元素阶的最小公倍数, $\zeta_m = e^{2\pi i/m}$ 。每个复虚特征标 $\alpha \in R(G)$ 的值均属于 $\mathbb{Z}[\zeta_m]$, 并且都是代数整数。

证明. 任一表示矩阵 $\rho(g)$ 满足 $\rho(g)^m = I$ 。由于 $T^m - 1$ 在 $\mathbb{C}$ 中无重根, $\rho(g)$ 可对角化, 其特征值都是 ζ_m 的幂。取迹及整数线性组合便得 $\alpha(g) \in \mathbb{Z}[\zeta_m]$ 。环 $\mathbb{Z}[\zeta_m]$ 由 $1, \zeta_m, \dots, \zeta_m^{m-1}$ 生成, 应用引理 5.1.3 即可。□

代数整数不必是实数, 更不必是通常的整数。循环群的一维特征标可以取单位根为值; 整性限制的是它满足的多项式, 而非其在实轴上的位置。

5.1.3 表示环中的诱导法

对有限群的子群 $H \leq G$, 限制是环同态 $\text{Res}_H^G : R(G) \rightarrow R(H)$, 诱导首先是加法群同态 $\text{Ind}_H^G : R(H) \rightarrow R(G)$. 由定理 3.4.2, 它们满足

$$\alpha \text{Ind}_H^G \beta = \text{Ind}_H^G (\text{Res}_H^G \alpha \cdot \beta), \quad \alpha \in R(G), \quad \beta \in R(H). \quad (5.1)$$

这条张量恒等式说明诱导像虽然未必含单位, 却受到整个表示环乘法的控制。

命题 5.1.5. 设 G 为有限群, $\mathcal{F}$ 为它的一族子群, $R(H)$ 表示有限群 H 的复表示环。令

$$I_{\mathcal{F}}(G) = \sum_{H \in \mathcal{F}} \text{Ind}_H^G R(H).$$

则 $I_{\mathcal{F}}(G)$ 是 $R(G)$ 的理想。因此所有虚特征标均属于这个诱导像之和, 当且仅当 $1_G \in I_{\mathcal{F}}(G)$ 。

证明. 定义已经给出加法子群。(5.1) 把一个诱导生成元与任意 $\alpha \in R(G)$ 的乘积仍写成来自同一个 H 的诱导。若理想含 1_G , 则含每个 $\alpha = \alpha 1_G$; 反向显然。□

诱导一般不保持乘法。若 $H = 1 < G$, 则 $\text{Ind}_1^G 1$ 是次数 $|G|$ 的正则特征标。其平方的次数为 $|G|^2$, 而 $\text{Ind}_1^G(1 \cdot 1)$ 的次数只有 $|G|$ 。

5.1.4 分圆域与特征标的域

$\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 称为相应的分圆域 (cyclotomic field)。对复特征标 χ , 由全部值生成的域 $\mathbb{Q}(\chi(g) : g \in G)$ 称为其特征标值域。命题 5.1.4 说明它包含于一个有限分圆扩张; 这并不立即给出一组使全部表示矩阵也落在该值域中的基。

引理 5.1.6. 设 $m \geq 1$ 为整数, $\zeta_m = e^{2\pi i/m}$, a 为与 m 互素的整数。代换 $\zeta_m \mapsto \zeta_m^a$ 给出 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 的自同构 σ_a 。对有限群 G 的复虚特征标 α , 若 m 是 G 的指数, 则对每个 $g \in G$ 有

$$\sigma_a(\alpha(g)) = \alpha(g^a).$$

证明. 补充自同构存在性的理由。先说明将用到的有理首一因子判据。有限多个代数整数生成的环是有限生成的 $\mathbb{Z}$ -模: 依次用各自的首一方程约去高次幂即可。因此由引理 5.1.3, 这些数的和、积也都是代数整数。若既约分数 u/v , $v > 0$ 满足首一整方程, 清除分母便得 $v \mid u^n$, 故 $v = 1$ 。一个首一整系数多项式的首一有理因子的系数, 是原多项式部分根的整系数对称式, 既有理又为代数整数, 因而仍是整数。

分圆多项式 $\Phi_m(T)$ 以所有本原 m 次单位根为根; 递推分解 $T^m - 1 = \prod_{d|m} \Phi_d(T)$ 及首一多项式的整系数除法给出 $\Phi_m \in \mathbb{Z}[T]$ 。取 ζ_m 的首一不可约多项式 f , 由刚证的因子判据有 $f \in \mathbb{Z}[T]$, 且 $f \mid \Phi_m$ 。

若素数 $\ell \nmid m$ 而 ζ_m^ℓ 不是 f 的根, 令 $h \neq f$ 为它在 Φ_m 中的首一不可约因子。因为 $h(\zeta_m^\ell) = 0$, 有 $f(T) \mid h(T^\ell)$ 。模 ℓ 约化后, $\bar{f} \mid \bar{h}(T)^\ell$, 故 $\bar{f}, \bar{h}$ 有非平凡公因子。可是 $fh \mid T^m - 1$, 这将使 $T^m - 1$ 模 ℓ 后有重因子, 与其导数 mT^{m-1} 互素矛盾。因此 ζ_m^ℓ 仍是 f 的根。对每一个已得到的本原根重复论证, 可覆盖全部与 m 互素的正整数次幂, 故 $f = \Phi_m$ 。这些根给出所需自同构, 其逆由 a 模 m 的逆元给出。最后, 将特征标值写成单位根的整数线性组合, 逐项施行 σ_a 即得公式。□

上述论证由代数整数的封闭性得到首一有理因子的整系数性，再由模素数约化证明分圆多项式不可约。特征标值域与表示矩阵的定义域仍须分别考虑。

5.1.5 单位根、中心类和与标量作用的整性

设 $K_1, \dots, K_r$ 为 G 的共轭类，取 $g_j \in K_j$ 。在群代数中记 $z_j = \sum_{g \in K_j} g$ 。这些类和 (class sum) 构成 $Z(\mathbb{C}[G])$ 的一组基：群代数元素位于中心，恰好意味着其系数在共轭类上不变。并且

$$z_i z_j = \sum_k a_{ijk} z_k, \quad a_{ijk} \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

其中 a_{ijk} 等于把 K_k 中某个固定元素写成 xy 、 $x \in K_i, y \in K_j$ 的方法数；同时共轭给出不同固定元素之间的双射。

命题 5.1.7 (中心标量的整性). 设 G 为有限群， χ 为次数 d 的复不可约特征标， $g \in G$ ， K 为 g 的共轭类。类和 $z_K = \sum_{x \in K} x \in \mathbb{C}[G]$ 在对应不可约表示上作用为标量

$$\omega_\chi(K) = \frac{|K| \cdot \chi(g)}{d},$$

且此标量是代数整数。

证明. 类和位于中心，由推论 1.4.2，在复不可约表示上的作用为标量。取迹得到 $d \cdot \omega_\chi(K) = |K| \cdot \chi(g)$ 。整系数类和格 $\bigoplus_j \mathbb{Z} z_j$ 是含单位的环，并且是有限生成的 $\mathbb{Z}$ -模。引理 5.1.3 给出类和满足的首一整系数方程；施行表示后，标量 $\omega_\chi(K)$ 满足同一方程。□

这比特征标值本身的整性更强，因为式中除以了次数 d 。Burnside 证明将把这个分母与共轭类大小的互素条件结合。

5.1.6 代数整数的基本运算与有理数判别

引理 5.1.8. 代数整数的和、差、积仍为代数整数；有理数是代数整数，当且仅当它是整数。若代数整数 α 的首一极小多项式为 $f \in \mathbb{Q}[T]$ ，则 $f \in \mathbb{Z}[T]$ ，因而全部共轭根的乘积是整数。

证明. 若 α, β 分别满足次数 r, s 的首一整系数方程，则环 $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ 由 $\alpha^i \beta^j, 0 \leq i < r, 0 \leq j < s$ 有限生成。引理 5.1.3 同时处理和、差、积。若既约分数 $u/v, v > 0$ 满足次数 n 的首一整系数方程，乘以 v^n 得 $v \mid u^n$ ，所以 $v = 1$ 。

最后， f 的每个根也是 α 所满足的那个首一整系数多项式的根，因而都是代数整数。 f 的系数是这些根的整数多项式，又属于 $\mathbb{Q}$ ，由刚证的两项结论可知均为整数。根的乘积就是带符号的常数项。□

推论 5.1.9 (Frobenius 次数整除定理). 有限群 G 的每个复不可约特征标的次数 d 都整除 $|G|$ 。

证明. 设该特征标为 χ 。由定理 2.2.2 与推论 1.4.2，有 $\langle \chi, \chi \rangle_G = 1$ 。按共轭类求和得

$$\frac{|G|}{d} = \sum_j \frac{|K_j| \cdot \chi(g_j)}{d} \overline{\chi(g_j)}.$$

右侧各因子由命题 5.1.7 及命题 5.1.4 均为代数整数。因此 $|G|/d$ 是有理代数整数，由引理 5.1.8 属于 $\mathbb{Z}$ 。□

整性与次数整除可参阅 Etingof 等 [4, Sections 5.2–5.3, pp. 93–98]。后文只需上述有限生成模的整性判据、类和与有理数判别，不预设一般整扩张理论。

5.2 Artin 有理诱导

每个群元素都在一个循环子群里。单靠这句话无法拼合实际表示，却足以检测类函数是否为零。借助 Frobenius 互反，把这种检测转置过来，便得到诱导的有理张成结论。

5.2.1 Artin 诱导定理

定理 5.2.1 (Artin 有理诱导). 设 G 为有限群。每个复虚特征标 $\alpha \in R(G)$ 都能写成

$$\alpha = \sum_{j=1}^s a_j \operatorname{Ind}_{C_j}^G \lambda_j, \quad a_j \in \mathbb{Q},$$

其中 $C_j \leq G$ 为循环子群， λ_j 为 C_j 的一维复特征标。等价地，这些诱导特征标张成 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G)$ 。

Artin 诱导定理 (Artin's induction theorem) 在这里是关于系数的结论；它没有断言 $\alpha(g)$ 为有理数。

证明. 先在复类函数空间中证明张成。若类函数 f 与每个 $\operatorname{Ind}_C^G \lambda$ 正交，则由推论 3.2.2, $\operatorname{Res}_C^G f$ 与循环群 C 的每个不可约特征标正交。互反等式也适用于任意类函数：定理 2.2.4 把类函数写成不可约特征标的复线性组合，等式可按半线性延拓。因此 $f|_C = 0$ 。对每个 $g \in G$ 取 $C = \langle g \rangle$ ，便得 $f(g) = 0$ 。有限维内积空间中正交补为零，所以这些诱导特征标复线性张成全部类函数。

取不可约特征标为基，把全部循环子群的一维诱导特征标写为列向量，所得矩阵的元素是非负整数。刚证的结论说该矩阵满行秩，因而存在一个行数阶的非零整数子式。用对应方阵求解任一不可约特征标的坐标，逆矩阵的元素均为有理数。这就将复张成加强为有理张成，再对整数线性组合使用加法即可。□

最后一步必须使用整数矩阵；仅证明复线性张成，尚未自动说明一个指定向量的坐标是有理数。Etingof 等 [4, Theorem 5.26.1, Remark 5.26.2 and Corollary 5.26.3, pp. 141–142] 给出了相应的子群检测表述。

5.2.2 有理系数与整数系数

推论 5.2.2. 设 G 为有限群， $R(G)$ 为其复表示环，令 $I_{\text{cyc}}(G) = \sum_{C \leq G, C \text{ 循环}} \operatorname{Ind}_C^G R(C)$ 。加法商群

$$R(G)/I_{\text{cyc}}(G)$$

有限；特别地，存在同一个正整数 N ，使全部 $\alpha \in R(G)$ 均满足 $N\alpha \in I_{\text{cyc}}(G)$ 。

证明. 由定理 5.2.1, 对有限多个不可约特征标分别清除有理系数的分母, 再取这些分母的公倍数 N . 于是 $NR(G) \subset I_{\text{cyc}}(G)$, 所述商群是有限群 $R(G)/NR(G)$ 的商. $\square$

分母确实可能无法只靠循环子群去掉. 取四元交换群 $G = C_2 \times C_2$. 每个循环子群的阶为 1 或 2, 从它诱导的一维特征标的次数为 4 或 2. 因此循环诱导的任意整数线性组合都有偶数次数, 不可能等于 1_G . 若 H_1, H_2, H_3 是三个二阶子群, 则

$$1_G = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \text{Ind}_{H_i}^G 1_{H_i} - \frac{1}{2} \text{Ind}_1^G 1. \quad (5.2)$$

在单位元处右侧等于 $(6-4)/2 = 1$; 每个非单位元恰属一个 H_i , 相应置换特征标取值 2, 其余项取值 0. 这逐点核验了公式, 也显示负系数与分母的不同职责.

5.2.3 循环子群诱导与有理张成

命题 5.2.3. 设 G 为有限群, $\mathcal{F}$ 为对 G -共轭封闭的一族子群, $R(G)$ 为复表示环, $\text{Irr}(H)$ 为 H 的不可约复特征标集合. 下列条件等价: 每个 $g \in G$ 属于某个 $H \in \mathcal{F}$; 所有 $\text{Ind}_H^G \theta$, $H \in \mathcal{F}$, $\theta \in \text{Irr}(H)$ 有理张成 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G)$.

证明. 若子群覆盖 G , 则与全部诱导正交类函数在每个 H 上为零, 因而恒为零. 定理 5.2.1 证明中的整数矩阵秩论证给出有理张成.

反之, 若 g 不属于任何 $H \in \mathcal{F}$, 共轭封闭性说明 g 也不能共轭到这些子群中. 定理 3.3.1 的求和集合为空, 所以全部诱导特征标在 g 处均为零. 其有理线性组合便不可能得到在 g 处取值 1 的平凡特征标. $\square$

循环子群不需要互不相交, 也不需要每个元素只被覆盖一次. 这里使用的是限制能检测零函数; 重叠部分不会破坏正交补论证. 但这种检测只给出有理系数结果, 整系数结论还需要下一节的整性论证.

5.2.4 一般特征标诱导与有理值版本

若要求仅从 1_G 诱导, 得到的都是置换特征标, 因而必为整数值. 它们的有理线性组合也只能是有理值. 对有限群 G 中的元素 u, v , 若存在与 $|u|$ 互素的整数 a , 使 v 共轭于 u^a , 则称 u, v 有理共轭; 这等价于它们生成的循环子群共轭.

命题 5.2.4 (有理值版本). 设 G 为有限群. 所有在 G 的有理共轭类上常值的函数 $f: G \rightarrow \mathbb{Q}$, 由 $\text{Ind}_C^G 1_C$ 在 $\mathbb{Q}$ 上张成, 其中 $C \leq G$ 遍历循环子群, 1_C 为平凡复特征标. 特别地, 每个取值于 $\mathbb{Q}$ 的复虚特征标都有这种表达.

证明. 从循环子群共轭类中选代表 $C_1, \dots, C_s$, 各取生成元 c_i , 按 $|C_i|$ 从大到小排列. 置换特征标 $\pi_j = \text{Ind}_{C_j}^G 1$ 在 c_i 处非零, 恰好在某个共轭的 C_j 包含 C_i 时发生. 因此矩阵 $(\pi_j(c_i))$ 为三角矩阵: 同阶的不同代表之间该值为零, 对角元是 $[N_G(C_i) : C_i] > 0$. 矩阵为整系数且可逆, 故每一组有理数值都能由这些 π_j 的有理线性组合得到. 一个有理共轭类恰对应一个循环子群共轭类, 所以这已覆盖所述函数空间.

若虚特征标 α 为有理值, 由引理 5.1.6 得 $\alpha(g^a) = \alpha(g)$, 其中 a 与群指数互素. 若只给定 a 与 $|g|$ 互素, 可在同一模 $|g|$ 剩余类中选择与群指数互素的整数: 对未整除 $|g|$

的素因子另规定非零剩余类，再用中国剩余定理。于是 α 在有理共轭类上常值，应用前一结论即可。□

例如 $C_3 = \langle c \rangle$ 的特征标 $\lambda(c) = e^{2\pi i/3}$ 不能由平凡特征标的循环诱导有理张成，因为它不是有理值；但它就是 $\text{Ind}_{C_3}^{C_3} \lambda$ ，完全符合定理 5.2.1。两种表述的区别在于允许使用哪些子群特征标，不能把“有理系数”改说成“有理表示”。

5.3 Brauer 诱导

四元交换群的例子说明，循环子群有时太小，不能整系数地生成表示环。需要加入的不是任意复杂的子群，而是把一个素数幂阶部分与一个互素的循环部分并列起来。本节确定目标及其准确范围，证明集中在下一节。

5.3.1 初等子群与一维特征标

定义 5.3.1. 设 p 为素数， E 为有限群。若 E 同构于 $P \times C$ ，其中 P 是有限 p -群， C 是阶与 p 互素的循环群，则称 E 为 p -初等群 (p -elementary group)。若存在某个素数 p 使此条件成立，则称 E 为初等群 (elementary group)。有限群 G 中具有上述结构的子群称为相应的初等子群。

允许 $P = 1$ 或 $C = 1$ 。因此全部有限 p -群都是 p -初等群；每个循环群对每一个素数 p 都是 p -初等群，只需把其阶分成 p 部分与互素部分。初等群不一定交换，例如 $Q_8 \times C_3$ 是 2-初等群。

从一维特征标 $\lambda: H \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 诱导得到的特征标称为**单项式特征标** (monomial character)。取左陪集代表后，诱导表示的每个群元素把每个基向量送到另一基向量的非零标量倍，所以矩阵每行、每列恰有一个非零元。名称来自这个具体矩阵形状，并不意味着诱导结果总不可约。

5.3.2 Brauer 诱导定理的整系数版本

定理 5.3.2 (Brauer 整诱导). 设 G 为有限群。每个复虚特征标 $\alpha \in R(G)$ 都是从初等子群的复特征标诱导而得的特征标的整数线性组合。进一步，存在初等子群 $H_1, \dots, H_t \leq G$ 、它们的一维复特征标 λ_i 及整数 n_i ，使

$$\alpha = \sum_{i=1}^t n_i \text{Ind}_{H_i}^G \lambda_i.$$

这就是本章所用的 **Brauer 诱导定理** (Brauer's induction theorem)。整系数结论将在命题 5.4.5 证明，再由命题 5.4.8 化为一维特征标的诱导。

这是表示环中的加法恒等式。若 α 是实际表示的特征标，右侧仍可能有负系数；把正负部分移到两边才得到实际表示的同构。定理也未声称每个不可约表示单独就是一个一维表示的诱导。

5.3.3 Brauer 诱导定理的版本辨析

Artin 定理允许循环子群、一般一维特征标和有理系数；Brauer 定理扩大子群族，以此把系数收紧为整数。如果只保留平凡特征标，则所有诱导都是整数值函数，不能产生 C_3 的非实一维特征标。故“只从平凡表示诱导”不能作为这里的 Brauer 定理。

初等群 $P \times C$ 与初等交换 p -群 C_p^r 是不同概念：前者允许非交换 P 和互素循环因子。把直积放宽为某些半直积，会得到别的诱导定理中使用的子群族；本章始终使用上述直积定义。Serre 的书中将相应整诱导集中放在 Chapter 10，可作为进一步阅读 [14, Chapter 10, pp. 74–80]。

5.3.4 p -初等群的定义

定义中的直积具有可操作的内部判据： E 中存在子群 P, C ，满足 $E = PC$ 、 $P \cap C = 1$ 、每个 P 元素与每个 C 元素交换，且阶与循环性满足定义 5.3.1。此时 $(x, c) \mapsto xc$ 是群同构。

命题 5.3.3. 设 p 为素数， P 为有限 p -群， C 为阶与 p 互素的有限循环群， $E = P \times C$ 。每个子群 $H \leq E$ 都是 p -初等群，具体地

$$H = (H \cap P) \times (H \cap C),$$

其中把 P, C 视作 E 的两个自然子群。

证明. 对 $h = xc \in H$ ， $x \in P, c \in C$ ，元素 x, c 的阶互素。中国剩余定理给出整数 a ，使 $a \equiv 1 \pmod{|x|}$ 、 $a \equiv 0 \pmod{|c|}$ ，所以 $h^a = x \in H$ ，继而 $c = x^{-1}h \in H$ 。因此 $H = (H \cap P)(H \cap C)$ 。两因子交换且交为 1，第二个因子是循环群的子群，阶仍与 p 互素。□

例如 S_3 不是初等群：其中心为 1，且它的阶不是素数幂；若它是 $P \times C$ 且 $C \neq 1$ ，则 C 必在中心，矛盾。不过其二阶、三阶子群都是初等子群，已经足以给出整诱导。

5.3.5 从初等子群到一维特征标的诱导

设 $E = P \times C$ 。对复不可约 E -表示 V ，由推论 1.4.2，中心中的 C 作用为一个一维特征标 λ 。任何 P -不变子空间自动也被这个标量作用保持，所以 $V|_P$ 不可约。故 V 的特征标为 $(x, c) \mapsto \theta(x)\lambda(c)$ ，其中 $\theta \in \text{Irr}(P)$ 。

剩下的任务是证明 p -群的不可约特征标可从较小子群的一维特征标诱导。一旦写出 $\theta = \text{Ind}_Q^P \mu$ ，就有

$$\theta \otimes \lambda = \text{Ind}_{Q \times C}^{P \times C} (\mu \otimes \lambda).$$

右侧子群仍是 p -初等群。这一步所需的 p -群结论将在定理 5.4.7 证明；再由诱导传递性与从 E 到 G 的诱导复合。

5.3.6 Brauer 诱导与模表示的关系

本章始终讨论复表示。下一节会把特征标值模某个素理想约化到特征 p 的域中,但这只是对一个交换数环取商,并不把表示空间或群代数改为特征 p 上的对象。模表示在 $p \mid |G|$ 时通常不完全可约。

第八章的 Brauer 特征标只在 p -正则元素上定义,并处理特征 p 的表示;这里的 Brauer 诱导则是全部群元素上的普通复特征标恒等式。名字相同,所研究的对象却不同。

5.4 初等子群检测与 Brauer 整诱导的证明

Artin 定理已经给出有限指数的子格。现在必须证明这个指数没有任何素因子。我们逐个素数 p 只允许分母与 p 互素,再证明 p -初等子群的诱导已经生成整个表示环。论证中所需的交换环知识将在使用处给出证明。

证明可以分四步读:先用张量恒等式说明诱导像是理想;再把局部化后表示环的极大理想写成模 p 的特征标值检测,并将检测元素约化为 p -正则部分;随后在相应中心化子中构造 p -初等子群,排除诱导理想落入任何极大理想;最后对每个素数重复这一步,从有限指数回到整系数等式。前两步准备检测工具,第三步消去固定素数的障碍,最后一步才排除全部分母。

5.4.1 诱导像与复表示环

固定有限群 G 与素数 p , 记 $\mathcal{E}_p(G)$ 为全部 p -初等子群, 并令

$$I_p(G) = \sum_{E \in \mathcal{E}_p(G)} \text{Ind}_E^G R(E).$$

由命题 5.1.5, 这是 $R(G)$ 的理想。每个循环子群都是 p -初等群, 因此推论 5.2.2 给出

$$I_{\text{cyc}}(G) \subset I_p(G) \subset R(G), \quad [R(G) : I_p(G)] < \infty. \quad (5.3)$$

还需排除这个有限指数中的素因子 p 。

记 $\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : p \nmid b\}$ 。对加法群 M , 记 $M_{(p)} = \mathbb{Z}_{(p)} \otimes_{\mathbb{Z}} M$, 可将元素写成 x/s , 其中 $p \nmid s$; 判据 $x/1 = 0$ 等价于存在这样的 s 使 $sx = 0$ 。我们将证明

$$I_p(G)_{(p)} = R(G)_{(p)}.$$

这并不要求单独固定一个 p 就能在整数上生成 $R(G)$; 它只说明最终的障碍不含 p 部分。

5.4.2 限制检测、局部化与整性引理

需要先把表示环的极大理想解释为模素数的特征标值检测。以下引理特意保留一般交换环的表述, 证明却只用有限生成元与行列式。

引理 5.4.1 (有限扩张中的极大理想提升). 设 $A \subset B$ 为含同一单位的交换环, 且 B 为有限生成 A -模. 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$, 存在极大理想 $\mathfrak{n} \subset B$ 使 $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$.

证明. 令 $S = A \setminus \mathfrak{m}$. 分式环 $A_{\mathfrak{m}} = S^{-1}A$ 的非单位恰组成理想 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$, 且 $A_{\mathfrak{m}} \subset S^{-1}B$ 仍为单射. 因此 $S^{-1}B \neq 0$, 并为有限生成 $A_{\mathfrak{m}}$ -模.

若 $\mathfrak{m}B = B$, 则有限生成模 $M = S^{-1}B$ 满足 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}M = M$. 取模生成元 $u_1, \dots, u_r$, 写成 $u_j = \sum_i c_{ij}u_i$, 其中全部 $c_{ij} \in \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$. 伴随矩阵恒等式说明 $\det(I - (c_{ij}))$ 零化 M . 这个行列式模 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 为 1, 故为单位, 迫使 $M = 0$, 矛盾. 因此 $\mathfrak{m}B \neq B$. 取包含它的极大理想 $\mathfrak{n}$. 其收缩是包含 $\mathfrak{m}$ 的真理想, 只能等于 $\mathfrak{m}$. $\square$

存在极大理想只需通常的链并与 Zorn 引理¹: 真理想的链之并仍不含 1. 在本节中 $B/\mathfrak{m}B$ 还是域 $A/\mathfrak{m}$ 上的有限维非零代数, 也可直接从真理想的维数中取最大者.

引理 5.4.2 (极大理想的求值描述). 设 G 为有限群, m 为其指数, $\zeta_m = e^{2\pi i/m}$, $O = \mathbb{Z}[\zeta_m]$, p 为素数, $R(G)$ 为复表示环. 下标 (p) 表示反演所有与 p 互素整数的局部化. 对 $R(G)_{(p)}$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 存在 $g \in G$ 及 $O_{(p)}$ 的极大理想 $\mathfrak{q}$, 使剩余域 $O_{(p)}/\mathfrak{q}$ 的特征为 p , 且

$$\mathfrak{m} = \{ \alpha \in R(G)_{(p)} : \alpha(g) \in \mathfrak{q} \}.$$

证明. 设共轭类数为 r . 在每个共轭类代表处取值给出单射环同态

$$R(G)_{(p)} \longrightarrow B = O_{(p)}^r.$$

单射性来自特征标作为类函数的相等判据; 由命题 5.1.4, 各分量的特征标值都属于 $O_{(p)}$, 故这确实是到 B 的求值映射. O 为有限生成 $\mathbb{Z}$ -模, 所以 B 为有限生成 $\mathbb{Z}_{(p)}$ -模, 从而也是有限生成 $R(G)_{(p)}$ -模. 引理 5.4.1 把 $\mathfrak{m}$ 提升为 B 的极大理想.

有限直积的极大理想只在一个分量上取极大理想: 各分量的单位幂等元在域商中只能取 0 或 1, 它们的和是 1, 且彼此乘积为零, 因此恰有一个取 1. 这便给出某个代表 g 及 $O_{(p)}$ 的极大理想 $\mathfrak{q}$.

最后, 域 $O_{(p)}/\mathfrak{q}$ 对 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的像是整的, 整性由引理 5.1.3 给出. 若域 L 整于子整环 D , 则 D 本身是域: 对 $0 \neq a \in D$, 把 $a^{-1} \in L$ 的首一整方程乘以适当的 a 的幂, 就得到 $a^{-1} \in D$. 因此 $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}_{(p)}$ 为极大理想, 只能是 $p\mathbb{Z}_{(p)}$. 剩余域的特征遂为 p . $\square$

群元素 g 有唯一分解 $g = su = us$, 其中 s, u 均为 g 的幂, $|s|$ 与 p 互素, $|u|$ 为 p 的幂. 这由循环群 $\langle g \rangle$ 的阶的互素分解得到. 这样的 s 称为 g 的 p -正则部分; 阶与 p 互素的元素称为 p -正则元素 (p -regular element).

引理 5.4.3. 设 G 为有限群, p 为素数, m 为 G 的指数, $\zeta_m = e^{2\pi i/m}$, $O = \mathbb{Z}[\zeta_m]$, $R(G)$ 为复表示环, 下标 (p) 表示反演所有与 p 互素整数的局部化. 设 $\mathfrak{q} \subset O_{(p)}$ 为剩余特征是 p 的极大理想. 若 $g \in G$ 有分解 $g = su = us$, 其中 s, u 均为 g 的幂、 $|s|$ 与 p 互素、 $|u|$ 为 p 的幂, 则每个 $\alpha \in R(G)_{(p)}$ 均满足

$$\alpha(g) \equiv \alpha(s) \pmod{\mathfrak{q}}.$$

¹佐恩 (Max August Zorn, 1906-1993), 德国数学家, 提出与选择公理等价的极大原理, 并研究代数结构.

证明. 对实际表示, 交换且可对角化的矩阵 $\rho(s), \rho(u)$ 可同时对角化: 先按 $\rho(s)$ 的特征空间分解, 再在每个被 $\rho(u)$ 保持的空间内对角化. 共同特征向量上的特征值分别记作 ξ, η , 其中 $\eta^{p^a} = 1$. 在特征 p 的剩余域中, $T^{p^a} - 1 = (T - 1)^{p^a}$, 故 $\eta \equiv 1$. 于是 $\xi\eta \equiv \xi$, 求迹即得结论. 再取整数线性组合并除以与 p 互素的分母, 便覆盖全部 α . $\square$

5.4.3 从有理诱导到整系数诱导

定理 5.4.4 (逐素数的整诱导). 设 G 为有限群, p 为素数, $R(G)$ 为复表示环, 令 $I_p(G) = \sum_{E \leq G, E \text{ 为 } p\text{-初等}} \text{Ind}_E^G R(E)$. 下标 (p) 表示反演所有与 p 互素整数的局部化, 则

$$I_p(G)_{(p)} = R(G)_{(p)}.$$

因此有限指数 $[R(G) : I_p(G)]$ 与 p 互素。

证明. 若理想 $I_p(G)_{(p)}$ 为真理想, 则它包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中. 由引理 5.4.2 及引理 5.4.3, 存在 p -正则元素 s 及剩余特征为 p 的 $\mathfrak{q} \subset O_{(p)}$, 使

$$\alpha \in \mathfrak{m} \iff \alpha(s) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

我们构造一个 p -初等诱导, 使其在 s 处不满足此同余。

令 $C = \langle s \rangle$, 在中心化子 $C_G(s)$ 中取 Sylow p -子群 P . 由于 C 在该中心化子内居中, 且 $|C|$ 与 $|P|$ 互素,

$$E = CP = C \times P$$

为 p -初等子群; 整数 $d = [C_G(s) : E]$ 与 p 互素. 对 C 的一维特征标 λ , 将其延拓为 E 上在 P 处平凡的特征标 $\tilde{\lambda}$. 诱导公式定理 3.3.1 给出

$$(\text{Ind}_E^G \tilde{\lambda})(s) = d \sum_{t \in s^G \cap C} \lambda(t). \quad (5.4)$$

详细地说, E 中与 s 共轭的元素阶与 p 互素, 故其 P 分量为 1, 恰落在 C 内. 对每个固定的 $t \in s^G \cap C$, 满足 $x^{-1}sx = t$ 的 $x \in G$ 有 $|C_G(s)|$ 个, 除以 $|E|$ 即得上式。

集合 $T = s^G \cap C$ 非空. 若对所有 $\lambda \in \text{Irr}(C)$, 和 $S_\lambda = \sum_{t \in T} \lambda(t)$ 都属于 $\mathfrak{q}$, 取 $t_0 \in T$, 利用循环群的有限几何级数可得

$$\sum_{\lambda \in \text{Irr}(C)} S_\lambda \cdot \lambda(t_0)^{-1} = \sum_{t \in T} \sum_{\lambda \in \text{Irr}(C)} \lambda(tt_0^{-1}) = |C|.$$

左侧模 $\mathfrak{q}$ 为零, 右侧却因 $p \nmid |C|$ 非零, 矛盾. 故至少一个 $S_\lambda \notin \mathfrak{q}$. 整数 d 模 $\mathfrak{q}$ 也非零, 于是 (5.4) 不属于 $\mathfrak{q}$. 这与该诱导属于 $I_p(G)_{(p)} \subset \mathfrak{m}$ 矛盾, 故理想等于全环。

由 (5.3), 商 $R(G)/I_p(G)$ 有限. 若其阶被 p 整除, 它含有阶为 p 的元素, 而这样的元素不会在仅反演与 p 互素整数后消失. 这与刚证的局部化商为零矛盾, 故指数与 p 互素. $\square$

命题 5.4.5. 设 G 为有限群, $I(G)$ 为全部初等子群的复表示环诱导像之和. 则 $I(G) = R(G)$.

证明. $I(G)$ 包含循环诱导, 由推论 5.2.2, 加法商群 $A = R(G)/I(G)$ 有限. 对每个素数 p , 它又是 $R(G)/I_p(G)$ 的商, 而定理 5.4.4 说明后者阶与 p 互素. 故 $|A|$ 与每个素数互素, 只能等于 1, 于是 $A = 0$. $\square$

这里先用 Artin 得到有限指数, 再逐素数排除指数, 正是从“某个整数倍可诱导”到“本身可整诱导”的差别.

推论 5.4.6 (初等子群上的虚特征标判据). 设 G 为有限群, $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ 为类函数. 则 $f \in R(G)$, 当且仅当对每个初等子群 $E \leq G$, 限制 $f|_E$ 属于 $R(E)$.

证明. 正向来自实际表示的限制及可加性. 反向中, 命题 5.4.5 把每个不可约 χ 写成 $\sum_j n_j \text{Ind}_{E_j}^G \theta_j$, 其中 $n_j \in \mathbb{Z}$, $\theta_j \in R(E_j)$. 于是

$$\langle \chi, f \rangle_G = \sum_j n_j \langle \theta_j, f|_{E_j} \rangle_{E_j} \in \mathbb{Z}.$$

这里使用 Frobenius 互反及两个虚特征标的内积为整数. 以不可约特征标为正交规范基展开 f , 所有系数均为整数, 故 $f \in R(G)$. $\square$

5.4.4 初等群表示与一维表示的诱导

下面用普通复表示论把定理化为一维特征标的诱导.

定理 5.4.7. 设 p 为素数, P 为有限 p -群. P 的每个复不可约特征标 θ 都可写成 $\text{Ind}_Q^P \mu$, 其中 $Q \leq P$, μ 为 Q 的一维复特征标.

证明. 按 $|P|$ 归纳. 若表示有非平凡核 N , 它来自较小 p -群 P/N 的不可约表示. 由归纳假设, 这个表示等于某个 $\bar{Q} \leq P/N$ 的一维特征标 $\bar{\mu}$ 的诱导. 取原像 $Q \leq P$, 令 $\mu(q) = \bar{\mu}(qN)$. 映射

$$\mathbb{C}[P] \otimes_{\mathbb{C}[Q]} \mathbb{C}_\mu \longrightarrow \mathbb{C}[P/N] \otimes_{\mathbb{C}[\bar{Q}]} \mathbb{C}_{\bar{\mu}}, \quad g \otimes z \longmapsto (gN) \otimes z$$

与张量平衡关系相容, 因为 $\mu(q) = \bar{\mu}(qN)$, 并与 P 作用相容. 陪集双射 $P/Q \simeq (P/N)/\bar{Q}$ 说明它把一组陪集基双射到另一组, 故为同构. 于是原表示为 $\text{Ind}_Q^P \mu$.

以下设表示 ρ 忠实. 若 P 交换, 由推论 1.4.2, 全部 $\rho(g)$ 为标量, 不可约性迫使维数为 1; 这也包含归纳起点 $P = 1$.

设 P 非交换. 非平凡有限 p -群中心非平凡, 因为类方程中非中心共轭类的大小均被 p 整除, 故中心的阶亦被 p 整除. 将此结论用于非平凡 p -群 $P/Z(P)$, 选取 $xZ(P) \neq 1$ 位于其中心. 子群 $A = \langle Z(P), x \rangle$ 交换且正规: 对任意 $g \in P$, 有 $gxg^{-1} \in xZ(P)$. 又因 $x \notin Z(P)$, A 不包含于 $Z(P)$.

把 $\rho|_A$ 分解成一维权空间. 若只出现一个特征标, 则 A 作用为标量; 忠实性会使 $A \subset Z(P)$, 矛盾. 故至少出现两个权. 取其中一个 λ , 其惯性群 $J = I_P(\lambda)$ 为真子群; 这是因为定理 4.3.1 断言不可约表示中的所有权构成一个 P -轨道. 由定理 4.3.4, 相应权空间给出不可约 J -表示 U , 且 $\rho \simeq \text{Ind}_J^P U$. 对较小的 p -群 J 应用归纳假设, 得 $U \simeq \text{Ind}_Q^J \mu$. 定理 3.4.1 遂给出 $\rho \simeq \text{Ind}_Q^P \mu$. $\square$

命题 5.4.8. 有限初等群 E 的每个复不可约特征标都是其某个初等子群的一维复特征标的诱导.

证明. 写 $E = P \times C$. 在不可约表示中, 中心子群 C 作用为某个一维特征标 λ , 而限制到 P 是不可约表示 θ : 若有真 P -不变子空间, 标量的 C -作用也保持它, 与 E -不可约性矛盾. 由定理 5.4.7, $\theta = \text{Ind}_Q^P \mu$. 取 P/Q 的陪集基, 便有

$$\theta \otimes \lambda = \text{Ind}_{Q \times C}^{P \times C} (\mu \otimes \lambda).$$

其中 $Q \times C$ 仍是 p -初等群, 且 $\mu \otimes \lambda$ 是它的一维特征标, 得到所需表达. $\square$

定理 5.3.2 的证明. 由命题 5.4.5, 任意 $\alpha \in R(G)$ 是初等子群虚特征标诱导的整数线性组合; 把这些虚特征标展开为不可约特征标的整数线性组合, 便得到定理的第一项结论. 对每个不可约初等子群特征标应用命题 5.4.8, 将其写成同一初等群内某个初等子群的一维诱导. 最后用定理 3.4.1 把两次诱导合成一次, 即得全部系数仍为整数的一维表述. $\square$

5.4.5 负系数与虚特征标的例子

取 $G = S_3$, 其不可约特征标为 $1, \varepsilon, \chi$, 次数分别为 $1, 1, 2$. 设 $C_2 = \langle (12) \rangle$, $C_3 = \langle (123) \rangle$, 取 C_3 的非平凡一维特征标 λ . 由限制及 Frobenius 互反,

$$\text{Ind}_{C_2}^{S_3} 1 = 1 + \chi, \quad \text{Ind}_{C_3}^{S_3} \lambda = \chi.$$

第一式也可从三点置换表示中分离常数向量得到; 第二式在三类上的值依次为 $2, 0, -1$. 所以

$$1 = \text{Ind}_{C_2}^{S_3} 1 - \text{Ind}_{C_3}^{S_3} \lambda. \quad (5.5)$$

两个子群都循环, 因而都是允许的初等子群. 此式移项后表示一个三维实际表示同构于一维平凡表示与一个二维表示的直和; 负号没有制造负维数的表示空间.

S_3 自身不是初等群, 所有初等子群都是真子群, 故每个一维诱导的次数至少为 2. 因此 1 不可能是这些诱导的非负整数线性组合. 这也说明负系数不是上述公式偶然写得不巧, 而是整诱导定理必须允许的现象.

5.5 共轭类、特征标约束与 Burnside 可解性定理

整性还能把“某个共轭类很小”变成正规子群的存在性. 以下从特征标正交、命题 5.1.7 与代数整数的基本运算出发.

5.5.1 Burnside 的 $p^a q^b$ 阶群可解性定理

对群 G , 记 $G' = \langle xyx^{-1}y^{-1} : x, y \in G \rangle$, 递归定义 $G^{(0)} = G$, $G^{(n+1)} = (G^{(n)})'$. 若某个 $G^{(r)} = 1$, 则称 G 为可解群 (solvable group). 这一定义等价于存在各商交换的有限正规列: 导出列本身给出一个方向; 反过来, 若一个正规列的末商交换, 则 G' 包含于其前一项, 逐层便使导出列降到 1.

定理 5.5.1 (Burnside 可解性定理). 设 p, q 为素数, a, b 为非负整数. 每个阶为 $p^a q^b$ 的有限群 G 都是可解群.

此结论称为 **Burnside 可解性定理** (Burnside's $p^a q^b$ theorem)。允许 $a = 0, b = 0$ ；若 $p = q$ ，结论仍归入素数幂阶情形。证明在本节先建立共轭类工具，再于第 5.5.4 小节完成。

定理并不说 G 交换，也不说全部 Sylow 子群正规。例如 S_3 阶为 $2 \cdot 3$ ，其导出群为 A_3 ，故可解，但三阶以外的 Sylow 子群并不正规。这里的目标是在导出列中逐步消去非交换部分。

5.5.2 类和作用与特征标消失引理

引理 5.5.2 (单位根平均值). 设 $d \geq 1$ 为整数， $\xi_1, \dots, \xi_d$ 为复单位根。若

$$\alpha = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_d}{d}$$

是代数整数，则或者 $\alpha = 0$ ，或者 $\xi_1 = \dots = \xi_d$ 。

证明. 若这些单位根不全相同，三角不等式的等号条件给出 $|\alpha| < 1$ 。选取公倍数 m ，使各 ξ_i 都属于 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 。 α 的每个代数共轭仍是 d 个单位根的平均，故绝对值不超过 1。这里的共轭描述可这样核验： $\mathbb{Q}(\alpha)$ 到 $\mathbb{C}$ 的任一嵌入都可延拓到 $\mathbb{Q}(\alpha, \zeta_m)$ ，只需把 ζ_m 在前一域上的极小多项式的系数施行嵌入，再选一个复根；在该根处求值给出商域上的延拓。延拓保持 $\zeta_m^m = 1$ ，因而保持“是单位根”这一性质。

若 $\alpha \neq 0$ ，其全部共轭根的乘积非零；由引理 5.1.8 该乘积为整数。但其中一个因子的绝对值严格小于 1，其余不超过 1，故乘积的绝对值严格小于 1，矛盾。□

引理 5.5.3 (消失或标量作用). 设 G 为有限群， $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为次数 d 的复不可约表示，特征标为 χ ， $g \in G$ 。设 $K = g^G$ 且 $\gcd(d, |K|) = 1$ 。则或者 $\chi(g) = 0$ ，或者 $\rho(g)$ 为标量矩阵。

证明. 取整数 a, b ，使 $a|K| + bd = 1$ 。由命题 5.1.7， $|K| \cdot \chi(g)/d$ 是代数整数； $\chi(g)$ 也由命题 5.1.4 为代数整数。因此

$$\frac{\chi(g)}{d} = a \cdot \frac{|K| \cdot \chi(g)}{d} + b \cdot \chi(g)$$

是代数整数。这正是互素条件的使用处。 $\rho(g)$ 可对角化，其特征值 $\xi_1, \dots, \xi_d$ 为单位根；由引理 5.5.2，或者它们的和为零，或者全部相同。后者连同可对角化性给出标量矩阵。□

不能删去互素条件。例如 S_3 的二维不可约表示在三循环处取值 -1 ，并非零；对应矩阵的两个特征值为互不相同的本原三次单位根，所以不是标量。该共轭类大小为 2，恰与表示次数有公因子。

5.5.3 非交换单群的素数幂大小共轭类

命题 5.5.4. 设 G 为有限群，某个共轭类 K 的大小为 p^r ，其中 p 为素数、 $r \geq 1$ 。则 G 有非平凡真正规子群。特别地，有限非交换单群没有这样的共轭类。

证明. 取 $g \in K$, 则 $g \neq 1$. 由定理 2.3.1, 正则特征标在非单位元处为零, 故

$$0 = \sum_{\chi \in \text{Irr}(G)} \chi(1)\chi(g). \quad (5.6)$$

我们先证明存在非平凡不可约 χ , 满足 $p \nmid \chi(1)$ 且 $\chi(g) \neq 0$. 否则, (5.6) 除去平凡特征标的贡献 1, 其余可能非零的项的次数均被 p 整除, 从而

$$-\frac{1}{p} = \sum_{\substack{\chi \in \text{Irr}(G) \\ p \nmid \chi(1)}} \frac{\chi(1)}{p} \chi(g)$$

为代数整数. 这与引理 5.1.8 的有理数判别矛盾.

取这样的 χ 及表示 ρ . 因为 $\gcd(\chi(1), p^r) = 1$ 且 $\chi(g) \neq 0$, 引理 5.5.3 说明 $\rho(g)$ 为标量. 所有 K 中的元素共轭于 g , 所以它们在 ρ 下给出同一个标量. 令

$$N = \langle xy^{-1} : x, y \in K \rangle.$$

共轭保持 K , 故 $N \triangleleft G$; 又 $N \subset \ker \rho$. 由于 ρ 非平凡, $\ker \rho \neq G$, 所以 $N \neq G$. 而 $|K| > 1$ 给出不同的 x, y , 此时 $xy^{-1} \neq 1$, 所以 $N \neq 1$. $\square$

大小为 1 的类须另行处理, 它对应中心元素. 有限非交换单群的中心只能为 1: 中心若非平凡, 单性使整个群交换; 有限交换单群则必为素数阶循环群. 因此非交换单群的非单位元既不能有大小为 1 的类, 也不能有更大的素数幂大小的类.

5.5.4 Sylow 中心、群阶归纳与可解扩张

先记录可解性的群论运算, 避免把归纳的最后一步藏在一句“因此可解”中.

引理 5.5.5. 设 G 为群, $N \triangleleft G$. 若 N 与 G/N 都可解, 则 G 可解. 可解群的子群和商群也可解. 对每个素数 p , 每个有限 p -群都可解.

证明. 若 $(G/N)^{(r)} = 1$, 商映射保持交换子, 故 $G^{(r)} \subset N$. 若 $N^{(s)} = 1$, 则 $G^{(r+s)} \subset N^{(s)} = 1$. 子群 $H \leq G$ 满足 $H^{(i)} \subset G^{(i)}$, 而满同态把导出列映为商群的导出列, 由此得到另外两项稳定性.

对有限 p -群 P 按阶归纳. 若 $P \neq 1$, 其类方程中非中心类的大小均被 p 整除, 故 $|Z(P)|$ 被 p 整除, 中心非平凡. 若 $Z(P) = P$, 群交换; 否则 $P/Z(P)$ 阶较小, 由归纳假设可解. 中心自身交换, 再由已经证明的扩张性质得 P 可解. $\square$

定理 5.5.1 的证明. 平凡群可解; 若 $a = 0$, $b = 0$ 或 $p = q$, 由引理 5.5.5 的有限 p -群结论可得. 以下设 $p \neq q$ 且 $a, b > 0$, 按 $|G|$ 归纳.

若 G 有非平凡真正规子群 N , 则 N 与 G/N 的阶仍只含素因子 p, q , 且都小于 $|G|$. 归纳假设使两者可解, 再由引理 5.5.5 得 G 可解. 只需排除 G 为单群的情形. 它不可能是交换单群, 因为交换单群只有一个素因子.

取 Sylow p -子群 P . 由 p -群的类方程, 选 $1 \neq x \in Z(P)$. 于是 $P \subset C_G(x)$, 故

$$|x^G| = [G : C_G(x)]$$

是 q 的幂。若这个指数为 1, 则 $x \in Z(G) \setminus \{1\}$, 与非交换单性矛盾; 若指数大于 1, 则命题 5.5.4 给出非平凡正规子群, 同样矛盾。因此 G 不可能为单群, 归纳即得可解性。□

这个证明需要的是在 Sylow 子群的中心中取元素, 不要求所取 Sylow 子群在 G 中正规。整性与共轭类步骤可对照 Etingof 等 [4, Theorems 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, Lemmas 5.4.5, 5.4.7, pp. 98–100]; 这里的最后一步以 Sylow 中心显式构造所需共轭类。

5.5.5 Burnside 三类定理的辨析

本节证明的结论以群阶仅含两个素因子为假设, 结论是可解性。轨道计数公式则研究有限集合上的群作用:

$$|G \backslash X| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

它来自对固定点对 (g, x) 的双重计数, 不涉及群是否可解。第三个同名结果是不可约矩阵代数定理: 代数闭域上, 有限维向量空间上的不可约含么矩阵子代数等于全部自同态代数。它讨论矩阵代数的大小, 也没有上述群阶条件。下一节通过应用进一步比较这些不同结论。

5.6 群论应用与三种 Burnside 定理的比较

可解性是一个结构结论, 尚未给出具体群的分类。使用它时, 通常再取极小或极大正规子群, 把群拆成较简单的扩张。与此同时, 特征标方法还可以研究置换作用和矩阵代数; 应当分清每次得到了什么。

5.6.1 $p^a q^b$ 阶群可解性定理的应用

推论 5.6.1. 设 p, q 为素数, $a, b \geq 0$ 为整数, G 为阶大于 1 且 $|G| = p^a q^b$ 的有限群。则 G 有素数阶循环商群, 并且其每个单合成因子都是阶为 p 或 q 的循环群。特别地, 有限非交换单群的阶至少含三个不同素因子。

证明. 由定理 5.5.1, G 可解。取极大真正规子群 N , 则 G/N 为非平凡单群, 并由引理 5.5.5 仍可解。非平凡单可解群必须交换: 其导出群若为自身, 导出列不会终止; 否则单性使导出群为 1。有限交换单群为素数阶循环群, 阶又整除 $|G|$, 故只能为 p 或 q 。对子群的简单商同样应用此论证, 即得全部合成因子结论。最后一项是定理 5.5.1 的直接逆否应用。□

这并不使扩张自动分裂, 也不能由合成因子的清单恢复乘法。例如 C_4 与 $C_2 \times C_2$ 都有两个 C_2 合成因子, 却不同构。表示论给出的限制常要与具体正规子群及共轭作用一起使用。

5.6.2 与 Burnside 矩阵代数定理的比较

为便于对照, 给出矩阵版本及一个有限维证明; 它不参加上一节的可解性论证。

定理 5.6.2 (Burnside 矩阵代数定理). 设 k 为代数闭域, $V \neq 0$ 为有限维 k -向量空间, $A \subset \text{End}_k(V)$ 为含恒等映射的 k -子代数. 若 V 没有非零真 A -不变子空间, 则 $A = \text{End}_k(V)$.

Burnside 矩阵代数定理 (Burnside's matrix algebra theorem) 的假设中没有有限群, 也没有两个素因子.

证明. 首先, 每个与 A 交换的自同态 T 都是标量. 由于 k 代数闭, T 有特征值 λ , 非零子空间 $\ker(T - \lambda I)$ 为 A -不变, 故等于 V .

需要一个简单模的初等事实. 把 V^r 写成坐标简单 A -模的直和. 对任意子模 W , 从这些坐标模中取一个最大的子集, 使其直和 U 满足 $U \cap W = 0$. 若 $U + W \neq V^r$, 便有一个坐标简单模 S 不包含于 $U + W$; 由简单性, $S \cap (U + W) = 0$, 所以可以把 S 加入所选子集而仍与 W 零交, 矛盾. 故 $V^r = W \oplus U$. 特别地, 若 $W \neq V^r$, 投影到 U 中一个坐标简单模给出非零 A -线性映射 $V^r \rightarrow V$, 且零化 W .

现取 V 的基 $v_1, \dots, v_d$, 考察

$$M = \{(av_1, \dots, av_d) : a \in A\} \subset V^d.$$

它是 A -子模. 若 $M \neq V^d$, 前一事实给出零化 M 的非零 A -线性映射 $\ell : V^d \rightarrow V$. 它在每个坐标上由第一段为标量, 故 $\ell(w_1, \dots, w_d) = \sum_i c_i w_i$, 其中 c_i 不全为零. 对 $a = I$ 即得 $\sum_i c_i v_i = 0$, 与基的线性无关性矛盾. 因此 $M = V^d$. 任意指定各 v_i 的像都能由某个 $a \in A$ 实现, 故 A 是全部自同态代数. $\square$

对复不可约有限群表示 ρ , 代数 $A = \text{span}_{\mathbb{C}} \rho(G)$ 满足上述条件, 所以群矩阵的线性生成空间就是全部矩阵代数. 这并不声称群像 $\rho(G)$ 等于全部可逆矩阵, 更不推出 G 可解. 若底域不是代数闭域, 结论可能失败: $\mathbb{C}$ 通过实线性乘法作用在 $\mathbb{R}^2$ 上不可约, 但所得二维实子代数不等于四维的 $M_2(\mathbb{R})$.

5.6.3 由特征标约束推出群结构

命题 5.6.3. 设 G 为有限可解群, $N \triangleleft G$ 为非平凡极小正规子群. 则存在素数 ℓ 与正整数 r , 使 $N \simeq C_\ell^r$. 若另有素数 p, q 及非负整数 a, b 满足 $|G| = p^a q^b$, 则 ℓ 为 p 或 q .

证明. 由引理 5.5.5, N 可解. 其导出群 N' 是 N 的特征子群, 因而在 G 中正规. 极小性说明 $N' = 1$ 或 $N' = N$; 后一情形使非平凡的 N 的导出列永不终止, 故 N 交换. 选一个整除 $|N|$ 的素数 ℓ . 有限交换群中所有 ℓ -幂阶元素组成非平凡特征子群, 极小性使其等于 N , 所以 N 为交换 ℓ -群. 其子群 $N[\ell] = \{x : x^\ell = 1\}$ 同样非平凡且特征, 故等于 N . 用群乘法作加法、用整数次幂作 $\mathbb{F}_\ell$ 的标量作用, N 成为有限维 $\mathbb{F}_\ell$ -向量空间, 因而 $N \simeq C_\ell^r$. 最后由阶的整除性得到 $\ell \in \{p, q\}$. $\square$

从小共轭类到正规子群的联系也有显式构造. 命题 5.5.4 中的 $N = \langle xy^{-1} : x, y \in K \rangle$ 只由共轭类 K 决定; 它在找到的不可约表示下全被送到恒等矩阵. 以 S_3 的三元换位类为例, 其大小为 3, 两个不同换位的商是三循环, 所构造的 N 正是 A_3 . 因此证明不只是排除单性, 有时还直接指出一个有用的正规子群.

5.6.4 群论推论、适用范围与同名定理

轨道计数公式也可完全放在特征标语言中。若有限群 G 作用在有限集合 X 上, 置换特征标为 $\pi_X(g) = |X^g|$ 。不变向量在各轨道上系数恒定, 因此其维数为轨道数; 也可直接计算

$$\dim \mathbb{C}[X]^G = \langle 1_G, \pi_X \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

从双重计数看, 每个轨道的贡献是 $\sum_{x \in \mathcal{O}} |G_x| = |\mathcal{O}| \cdot |G_x| = |G|$, 同样得到公式。

三种结论于是各有明确用途: 轨道计数求不变向量的维数或轨道数; 矩阵代数定理识别不可约作用所张成的全部代数; $p^a q^b$ 定理由类和整性推出群的可解性。前两者对 A_5 一样适用, 但 $|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ 已超出第三者的两个素因子假设。对阶含三个以上素因子的群, 仅凭本章定理既不能断言可解, 也不能断言不可解。

本章小结

表示环是以不可约特征标为基的整数格, 张量积给出乘法。特征标值由单位根相加而成, 类和标量也满足首一整系数方程; 将这些整性与有理数判别结合, 便得到不可约次数整除群阶。

Artin 诱导由循环子群上的限制检测零类函数, 再利用整数矩阵的秩获得有理张成。它允许一般的一维特征标; 若只从平凡特征标诱导, 则必须相应限制为在有理共轭类上常值的函数。循环诱导格的有限指数可能大于 1, 不能把清分母误当成整系数结论。

Brauer 诱导扩大到初等子群。对每个素数, 表示环的极大理想都可通过将特征标在某个 p -正则元素处的取值模去一个素理想来检测; 中心化子中的 Sylow 子群与该元素生成的循环群组成所需初等子群。有限 Fourier 求和排除了诱导理想落入极大理想的可能, 再由逐素数检测回到整数。Clifford 对应给出的 p -群单项式性则将初等子群的特征标进一步写成一维特征标的诱导。

Burnside 可解性定理沿独立的论证使用整性: 次数与类大小互素时, 特征标或消失, 或对应矩阵为标量; 正则特征标之和随后从素数幂大小的类中检出正规子群。Sylow 中心和可解扩张完成按群阶的归纳。其结论、轨道计数公式和不可约矩阵代数定理分别处理群结构、群作用计数和线性算子代数, 不宜只凭同名而互相替代。

习题

习题 5.1. 设 $C_n = \langle c \rangle$, 一维特征标 λ 满足 $\lambda(c) = e^{2\pi i/n}$ 。证明 $R(C_n) \simeq \mathbb{Z}[T]/(T^n - 1)$, 并在此描述次数映射及其核。

解. 循环群的不可约特征标为 $1, \lambda, \dots, \lambda^{n-1}$, 乘法使指数模 n 相加。因此 $T \mapsto \lambda$ 给出满同态。商环中的每个元素唯一写成次数小于 n 的整系数多项式, 而这些特征标在加法群中线性无关, 所以同态单射。次数把每个 λ^j 送到 1, 对应 $f(T) \mapsto f(1)$ 。整系数除法给出 $f(1) = 0$ 当且仅当 f 被 $T - 1$ 整除, 故核由 $T - 1$ 的剩余类生成。□

习题 5.2. 设 S_3 的不可约特征标为 $1, \varepsilon, \chi$, 次数为 $1, 1, 2$ 。计算其表示环乘法, 并判断 $\chi - \varepsilon$ 是否为实际特征标。

解. 在单位、换位、三循环三类上, $\varepsilon = (1, -1, 1)$ 、 $\chi = (2, 0, -1)$ 。逐点乘法给出

$$\varepsilon^2 = 1, \quad \varepsilon\chi = \chi, \quad \chi^2 = 1 + \varepsilon + \chi.$$

三者为加法基, 故这些关系确定整个环。 $\chi - \varepsilon$ 次数为 1, 但 $\langle \varepsilon, \chi - \varepsilon \rangle = -1$, 不可约系数为负, 因此不是实际特征标。□

习题 5.3. 令 $\zeta = e^{2\pi i/5}$, $a = \zeta + \zeta^{-1}$ 。求 a 的首一整系数极小多项式, 并说明代数整数不必是整数。

解. 由 $1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0$, 有 $a^2 = \zeta^2 + \zeta^{-2} + 2 = 1 - a$, 故 $a^2 + a - 1 = 0$ 。多项式 $T^2 + T - 1$ 的判别式为 5, 不是有理数平方, 因此在 $\mathbb{Q}[T]$ 中不可约。于是 a 是次数为 2 的代数整数而非有理数, 当然也非整数。□

习题 5.4. 在 $\mathbb{Z}[S_3]$ 中, 令 T 为三个换位的和, C 为两个三循环的和。计算 T^2, TC, C^2 , 并求二者在二维不可约表示上的标量作用。

解. 同一换位相乘给出单位, 不同换位的有序乘积各三次给出两种三循环; 换位与三循环的六个乘积各两次给出三个换位; 三循环相乘则给出两次单位及各一次三循环。因此

$$T^2 = 3 \cdot 1 + 3C, \quad TC = 2T, \quad C^2 = 2 \cdot 1 + C.$$

二维特征标在换位处为 0, 在三循环处为 -1, 由中心标量公式得 T 作用为 0、 C 作用为 -1。这些标量也满足所算乘法关系。□

习题 5.5. 设 $|P| = p^a$ 。证明每个复不可约表示的次数都是 p 的幂; 若 $P \neq 1$ 且存在次数 $d > 1$ 的不可约表示, 说明为什么 $d^2 < |P|$ 。

解. 由推论 5.1.9, $d \mid p^a$, 所以 $d = p^b$ 。由正则分解, 全部不可约次数的平方和为 $|P|$ 。除了所取不可约表示, 还至少有平凡表示, 其平方贡献为 1, 故 $d^2 + 1 \leq |P|$, 从而严格小于 $|P|$ 。□

习题 5.6. 四元数群 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 的二维复不可约特征标在 $1, -1$ 处分别为 2, -2, 其余取值为 0。证明它不能由二维实表示实现, 因而也不能由二维有理表示实现。

解. 若有这样的实表示, -1 的矩阵为 $-I$: 它阶为 2、可对角化且迹为 -2。因此 i, j 的矩阵 A, B 满足 $A^2 = B^2 = -I$ 、 $AB = -BA$ 。选取非零 v , 则 v, Av 实线性无关, 可把 A 写成 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。反交换条件迫使 $B = \begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix}$, 故 $B^2 = (u^2 + v^2)I$, 不可能为 $-I$ 。有理模型扩标量后会给实模型, 亦被排除。特征标值都是整数, 并未保证矩阵可在其值域上实现。□

习题 5.7. 令 $G = C_2 \times C_2$ 。证明循环子群诱导格 $I_{\text{cyc}}(G)$ 恰由偶数次数的虚特征标组成, 故 $R(G)/I_{\text{cyc}}(G) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

解. 用四个一维特征标为加法基 $e_1, \dots, e_4$. 每个二阶子群的一维诱导是两个限制相同的特征标之和; 三个二阶子群给出四元素集合的三个配对, 故全部 $e_i + e_j$, $i \neq j$, 都是这样的诱导. 它们次数均为偶数. 反过来, 若 i, j, k 不同, 则

$$e_i - e_j = (e_i + e_k) - (e_j + e_k), \quad 2e_i = (e_i + e_j) + (e_i + e_k) - (e_j + e_k).$$

因此任何坐标和为偶数的整数向量都在该格中. 次数模 2 的映射便给出所述商群. $\square$

习题 5.8. 设 $G = C_p^r$, $r \geq 2$, $\mathcal{L}$ 为其全部阶为 p 的子群. 求使 $N1_G \in I_{\text{cyc}}(G)$ 成立的最小正整数 N , 并给出一个表达.

解. 每个非平凡循环子群的指数为 p^{r-1} , 平凡子群的指数为 p^r , 所以所有循环诱导的次数都被 p^{r-1} 整除, 必要条件是 $p^{r-1} \mid N$. 子群数 $L = |\mathcal{L}| = (p^r - 1)/(p - 1)$, 每个非单位元恰属一个这样的子群. 于是逐点可验

$$p^{r-1}1_G = \sum_{H \in \mathcal{L}} \text{Ind}_H^G 1_H - \frac{L-1}{p} \text{Ind}_1^G 1.$$

在非单位元处两侧均为 p^{r-1} , 在单位元处右侧为 $Lp^{r-1} - (L-1)p^{r-1}$. 又 $(L-1)/p$ 为整数, 故最小值正是 p^{r-1} . $\square$

习题 5.9. 只使用 S_3 的子群 $1, C_2, C_3$ 的平凡特征标诱导, 求平凡特征标 1 的有理表达. 说明即使所有不可约特征标均为有理值, 整数系数仍可能不足.

解. 记三个诱导分别为 ρ, π_2, π_3 , 则 $\rho = 1 + \varepsilon + 2\chi$, $\pi_2 = 1 + \chi$, $\pi_3 = 1 + \varepsilon$. 故

$$1 = \pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 - \frac{1}{2}\rho.$$

若 $1 = a\rho + b\pi_2 + c\pi_3$ 且 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 比较 χ, ε 系数得 $b = -2a, c = -a$, 再比较平凡系数得 $-2a = 1$, 矛盾. 允许非平凡子群特征标后, (5.5) 才给出整数表达. $\square$

习题 5.10. 求 C_5 上在有理共轭类中常值的有理函数空间, 并用置换特征标写出任意这样的函数. 比较它与全部复类函数空间的维数.

解. 有理共轭类只有 $\{1\}$ 与四个非单位元组成的集合, 故该有理空间维数为 2. 若函数在这两处的值分别为 $a, b \in \mathbb{Q}$, 则

$$f = b1_{C_5} + \frac{a-b}{5} \text{Ind}_1^{C_5} 1.$$

而 C_5 交换, 每个元素单独成共轭类, 全部复类函数空间维数为 5. 减少到两个参数来自有理共轭条件, 不是来自循环群特征标不足. $\square$

习题 5.11. 分别对 S_3 与 C_6 , 判断只从全部 Sylow 子群的表示诱导, 能否有理张成整个复表示环.

解. S_3 的元素阶只有 1, 2, 3, 每个元素都属于某个 Sylow 子群, 且全部 Sylow 子群对共轭封闭. 由命题 5.2.3, 有理张成成立. C_6 的生成元不属于二阶或三阶 Sylow 子群, 且群交换, 不能通过共轭进入它们. 全部所述诱导在这个生成元处为零, 故不能张成平凡特征标. $\square$

习题 5.12. 对 C_6 、 $C_2^2 \times C_3$ 、 Q_8 、 S_3 ，分别判断它们是否为 2-初等群、3-初等群。

解. $C_6 = C_2 \times C_3$ 两种都是。 $C_2^2 \times C_3$ 为 2-初等群，但不是 3-初等群，因为其与 3 互素的部分为非循环的 C_2^2 。 Q_8 为 2-初等群；若为 3-初等群，其 3 部分只能平凡，从而全群必须循环，矛盾。 S_3 两种都不是：若有非平凡互素循环直因子，则该因子位于中心，而 $Z(S_3) = 1$ ；若此因子平凡，全群又须为素数幂阶群。□

习题 5.13. 证明有限 p -初等群的任意商群仍为 p -初等群；并说明同样的说法不能把“直积”随意改成“半直积”后仍当作定义。

解. 设 $E = P \times C$ ， $N \triangleleft E$ 。由命题 5.3.3， $N = (N \cap P) \times (N \cap C)$ ，两个交分别在对应因子中正规，故

$$E/N \simeq P/(N \cap P) \times C/(N \cap C).$$

第一因子为 p -群，第二因子循环且阶与 p 互素。另一方面， $S_3 = C_3 \rtimes C_2$ 是非平凡半直积，却不是初等群；交换两个因子的要求在定义及证明中都有实质作用。□

习题 5.14. 在 S_3 中，对 $p = 2, 3$ 分别列出各共轭类的 p -正则部分，并对三个不可约特征标验证模 p 约化公式。

解. 按 $1, (12), (123)$ 排列，三个特征标为 $1 = (1, 1, 1)$ 、 $\varepsilon = (1, -1, 1)$ 、 $\chi = (2, 0, -1)$ ，均为整数值。 $p = 2$ 时换位的正则部分为 1，而三循环保持不变；于是需比较换位与单位元两列，逐项差为 $0, -2, -2$ ，均被 2 整除。 $p = 3$ 时三循环的正则部分为 1，换位不变；三循环列与单位元列之差为 $0, 0, -3$ ，均被 3 整除。□

习题 5.15. 令 $G = C_2^2$ ，计算 $I_p(G)$ 在 $p = 2$ 及奇素数 p 时的指数。这与逐素数整诱导定理如何相容？

解. $p = 2$ 时全群 G 自身为 2-初等群，恒等诱导即给 $I_2(G) = R(G)$ 。若 p 为奇素数，任何子群的 p 部分都平凡，所以 p -初等子群恰是循环子群。习题 5.7 的直接格计算给出指数 2。因此 $I_p(G)$ 未必在整数上等于 $R(G)$ ，但其指数确实与该奇素数 p 互素；反演 2 后等式成立。□

习题 5.16. 设 $C = \langle c \rangle$ 阶为 5， $T = \{c, c^{-1}\}$ 。在特征 2 的域中取一个五阶单位根 z 。比较平凡特征标与 $\lambda_j(c) = z^j$ 给出的和 $\sum_{t \in T} \lambda_j(t)$ ，说明整诱导证明中为什么不能固定只用平凡特征标。

解. 平凡特征标给出 $1 + 1 = 0$ 。对 $1 \leq j \leq 4$ ，若 $z^j + z^{-j} = 0$ ，则在特征 2 中得 $z^{2j} = 1$ ，与 z 阶为 5 矛盾。因此四个非平凡特征标均给出非零和。Fourier 检测允许选择某个一维特征标是必要的；平凡特征标的求和可能被剩余特征消去。□

习题 5.17. 用包含 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ 说明：极大理想提升引理中的有限生成假设不能直接删去。这里是否还有元素满足的首一整方程？

解. $\mathbb{Q}$ 是域，唯一极大理想为 0，在 $\mathbb{Z}$ 中的收缩仍为 0，并非 (p) 。因此任意素数理想 $(p) \subset \mathbb{Z}$ 都不能提升为 $\mathbb{Q}$ 的极大理想。环 $\mathbb{Q}$ 不是有限生成的 $\mathbb{Z}$ -模，也不整于 $\mathbb{Z}$ ：例如 $1/p$ 不是代数整数。问题不是模 (p) 后选错了理想，而是 $p\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ ，此时整个纤维已经为零。□

习题 5.18. 设 A 为有限交换群。证明 $A_{(p)}$ 恰保留 A 的 p -主分量, 并用一个例子说明只检测固定的一个素数不能推出 $A = 0$ 。

解. 若元素阶与 p 互素, 该阶在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中可逆, 所以元素局部化后为零。若元素阶为 p^r , 则与 p 互素的整数在这个循环群上乘法可逆, 故不会使它消失。由有限交换群的主分量分解, $A_{(p)}$ 与 p -主分量同构。也可直接对 $|A| = p^r s$, $p \nmid s$, 用 Bézout 等式把每个元素拆为分别被 p^r 和 s 零化的两部分。若 $q \neq p$, 非零群 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 在 p 处局部化为零, 说明须逐素数检测。□

习题 5.19. 在 S_3 中令 $f = -1 + \varepsilon + \chi$, 其中 ε 为符号特征标、 χ 为二维不可约特征标。证明 f 限制到每个初等子群都是实际特征标, 但 f 自身不是实际特征标。由此说明 Brauer 判据为何只断言“虚特征标”。

解. S_3 不是初等群, 其初等子群只有 1、二阶子群、三阶子群及其共轭。在 C_2 上, ε 为非平凡一维特征标 η , 而 $\chi|_{C_2} = 1 + \eta$, 故 $f|_{C_2} = 2\eta$ 。在 C_3 上, $\varepsilon|_{C_3} = 1$, $\chi|_{C_3} = \lambda + \lambda^2$, 故 $f|_{C_3} = \lambda + \lambda^2$ 。平凡子群上 f 次数为 2。这些均为实际特征标, 但 f 在平凡不可约特征标上的系数是 -1 , 故全群上不是实际特征标。□

习题 5.20. 分类四元数群 Q_8 的二维不可约特征标 θ 的全部一维诱导来源, 即求出所有 (H, λ) , 使 $H \leq Q_8$ 、 λ 一维且 $\text{Ind}_H^{Q_8} \lambda = \theta$ 。说明其他一维特征标在这些子群上诱导后如何分解。

解. 比较次数得 $[Q_8 : H] = 2$, 故 $|H| = 4$ 。这样的子群恰为 $\langle i \rangle, \langle j \rangle, \langle k \rangle$, 都循环。先取 $H = \langle i \rangle$, 陪集代表为 $1, j$, 且 $jij^{-1} = i^{-1}$ 。诱导特征标在 H 上为 $\lambda + \lambda^{-1}$, 在其外为零。若 $\lambda(i) = \pm\sqrt{-1}$, 则在 $1, -1$ 处取值 $2, -2$, 在其余处为零, 恰为 θ 。两个另外的子群同理, 各有两个忠实一维特征标可用, 故共有六组来源。

若 $\lambda(i) = 1$ 或 -1 , 它不是忠实特征标, 并且共轭固定它。它在 Q_8 上恰有两个一维延拓: 令 i 的像为所给的 ± 1 , 令 j 的像分别为 $1, -1$, 这些赋值均满足群的关系。由 Frobenius 互反, 两种延拓各出现一次, 且次数和已经为 2, 所以诱导恰为这两个一维特征标的直和, 不再不可约。对 $\langle j \rangle, \langle k \rangle$ 的结论由相同计算得到。□

习题 5.21. 令 $E = Q_8 \times C_3$, θ 为 Q_8 的二维不可约特征标, ν 为 C_3 的非平凡一维特征标。写出 $\theta \otimes \nu$ 的一维诱导表达及全部特征标值。

解. 取 $H = \langle i \rangle$ 、 $\lambda(i) = \sqrt{-1}$, 由陪集基或命题 5.4.8 的构造,

$$\theta \otimes \nu = \text{Ind}_{H \times C_3}^{Q_8 \times C_3} (\lambda \otimes \nu).$$

对子群 $H \times C_3$, H 为 2-群且 C_3 为互素循环因子, 仍是允许的 2-初等群。若 c 为 C_3 生成元、 $\nu(c) = \zeta_3$, 则特征标在 $(1, c^j)$ 处为 $2\zeta_3^j$, 在 $(-1, c^j)$ 处为 $-2\zeta_3^j$, 在其余元素处为零。□

习题 5.22. 用 S_3 的二阶、三阶子群的一维特征标整诱导表达符号特征标 ε , 并证明任何这样的表达都不可能只含非负系数。

解. 令 η 为 C_2 的非平凡一维特征标, λ 为 C_3 的非平凡一维特征标. Frobenius 互反给出 $\text{Ind}_{C_2}^{S_3} \eta = \varepsilon + \chi$, 而 $\text{Ind}_{C_3}^{S_3} \lambda = \chi$. 故

$$\varepsilon = \text{Ind}_{C_2}^{S_3} \eta - \text{Ind}_{C_3}^{S_3} \lambda.$$

S_3 的初等子群都是真子群, 一维诱导的次数至少为 2, 所以任何非零非负整数线性组合的次数至少为 2, 不能等于 $\varepsilon(1) = 1$. $\square$

习题 5.23. 证明两个单位根的平均 $(1+i)/2$ 不是代数整数, 并计算它的极小多项式及共轭乘积.

解. 设 $z = (1+i)/2$, 则 $z^2 - z + 1/2 = 0$. 判别式为 -1 , 该首一二次多项式在 $\mathbb{Q}[T]$ 中不可约, 所以是极小多项式. 其常数项为 $1/2$, 不是整数; 由引理 5.1.8, z 不可能是代数整数. 两个共轭根的乘积正是 $(1+i)(1-i)/4 = 1/2$, 展示了平均值证明中整数乘积条件不可缺少. $\square$

习题 5.24. 从 A_4 在四个字母上的置换表示中除去平凡表示, 得次数为 3 的特征标 χ . 证明它不可约; 再用双换位说明消失或标量作用引理中的互素假设不能删除.

解. 在单位、三个双换位、八个三循环处, χ 的值分别为 $3, -1, 0$. 于是 $\langle \chi, \chi \rangle = (9+3)/12 = 1$, 故不可约. 双换位在四维置换表示上的特征值为 $1, 1, -1, -1$, 去掉一个平凡方向后为 $1, -1, -1$. 所以其迹为 $-1 \neq 0$, 矩阵亦非标量. 双换位的共轭类大小为 3, 与次数 3 不互素, 正落在引理假设之外. $\square$

习题 5.25. 设 $D_{14} = \langle r, s : r^7 = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$, 下标表示群阶. 求反射的共轭类, 并计算由这个类中元素之商生成的正规子群.

解. 由 $r^a s r^{-a} = r^{2a} s$, 且 2 在模 7 下可逆, 七个反射 $r^j s$ 构成同一个共轭类 K , 大小为 7. 两个反射之商为 $(r^i s)(r^j s)^{-1} = r^{i-j}$, 遍历全部旋转. 因此 $\langle xy^{-1} : x, y \in K \rangle = \langle r \rangle$, 是阶为 7 的非平凡真正规子群. 把旋转送到 1、反射送到 -1 的一维表示正好零化这个子群, 与正文中的标量作用构造一致. $\square$

习题 5.26. 设有限群 G 满足 $G' = G$, 且 $|G|$ 至多含两个不同素因子. 证明 $G = 1$. 再证明每个非平凡有限可解群都有非平凡一维复特征标.

解. 由定理 5.5.1, G 可解. 但 $G' = G$ 使全部导出项都等于 G , 只有 $G = 1$ 才能终止于 1. 对任意非平凡有限可解群, 导出群必须是真子群, 所以交换化 G/G' 非平凡; 取其一素数阶商并选非平凡一维复特征标, 提升到 G 就得到非平凡一维特征标. 因此非平凡有限可解群并非只具有次数大于一的非平凡特征标. $\square$

习题 5.27. 求 A_4 的导出列, 并说明 $p^a q^b$ 阶群的可解性不保证全部 Sylow 子群正规.

解. 四元交换子群 V_4 由单位与三个双换位组成, 正规且商 $A_4/V_4 \simeq C_3$, 故 $A'_4 \subset V_4$. A_4 不交换, 所以 $A'_4 \neq 1$; 三个双换位在 A_4 中共轭, V_4 内任何包含其中一个的正规子群必须包含全部三个. 因此 $A'_4 = V_4$, 再有 $V'_4 = 1$. 导出列为 $A_4, V_4, 1$. 八个三循环组成四个不同三阶子群, 故 Sylow 3-子群不正规, 尽管 $|A_4| = 2^2 \cdot 3$ 且群可解. $\square$

习题 5.28. 设有限可解群 G 的极小非平凡正规子群为 $N \simeq C_p^r$ 。证明共轭给出不可约的 $\mathbb{F}_p$ -线性作用 $G \rightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{F}_p)$ 。在 A_4 的 V_4 上解释这一作用。

解. 把 N 的群运算视作加法, 整数次幂给出 $\mathbb{F}_p$ 标量作用。群自同构保持两者, 所以共轭为线性作用。任意 G -不变向量子空间是 N 的子群, 并被全部 G -共轭保持, 因而是 G 的正规子群。极小性使它只能为 0 或 N , 故作用不可约。对 A_4 , V_4 中三个非单位元是 $\mathbb{F}_2^2$ 的三个非零向量, 三循环通过共轭循环置换它们, 没有保持某一条一维子空间; 于是这个二维作用确为不可约。□

习题 5.29. 令实四元数除环 $\mathbb{H}$ 通过左乘作用于实向量空间 $\mathbb{H}$ 。证明这是不可约实矩阵子代数, 但不等于 $\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H})$ 。

解. 若非零实子空间 W 被全部左乘保持, 取 $0 \neq w \in W$ 。对任意 $y \in \mathbb{H}$, 因四元数可逆, $y = (yw^{-1})w \in W$, 所以 $W = \mathbb{H}$ 。故左乘代数作用不可约。该子代数的实维数为 4, 而全部自同态代数实维数为 $4^2 = 16$, 两者不相等。这是底域未代数闭时的失败情形; 除环的非标量右乘也解释了标量交换子结论为何不成立。□

习题 5.30. 设 k 为含 n 个不同元素 $a_1, \dots, a_n$ 的域。令 $D = \mathrm{diag}(a_1, \dots, a_n)$, 令 S 循环置换标准基。直接证明由 D, S 生成的含么 k -代数为 $M_n(k)$ 。

解. Lagrange 插值多项式²

$$f_i(T) = \prod_{j \neq i} \frac{T - a_j}{a_i - a_j}$$

满足 $f_i(D) = E_{ii}$, 所以所有坐标投影均在代数中。对任意 i, j , 选 $0 \leq r < n$ 使 $S^r e_j = e_i$, 则 $E_{ii} S^r E_{jj} = E_{ij}$ 。全部矩阵单位都在所生成代数中, 而它们是 $M_n(k)$ 的基, 故结论成立。□

习题 5.31. 设 ℓ 为素数, C_ℓ 通过循环旋转作用在长为 ℓ 的二进制串上。求轨道数, 并解释它是某个置换表示中平凡表示的重数。

解. 单位旋转固定全部 2^ℓ 个串。每个非单位旋转在位置集合上是一个 ℓ -循环, 所以固定串必须所有位相同, 恰有两种。因此轨道数为

$$\frac{2^\ell + 2(\ell - 1)}{\ell}.$$

置换特征标在每个旋转处等于其固定串数, 和 1_{C_ℓ} 的内积便是上述平均, 即平凡表示的重数。□

习题 5.32. 设 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 是有限群的非零复不可约表示, 令 $Z_\rho = \{g \in G: \rho(g) \text{ 为标量}\}$ 。证明 Z_ρ 为正规子群, 且 $Z_\rho / \ker \rho = Z(G / \ker \rho)$ 。忠实情形有何结论?

解. 非零标量矩阵组成 $\mathrm{GL}(V)$ 的中心子群, 其原像 Z_ρ 因而正规。若 $\rho(g)$ 为标量, 它与每个 $\rho(h)$ 交换, 故 $g \ker \rho$ 位于商群中心。反过来, 若这个陪集居中, 则 $\rho(g)$ 与全部表示矩阵交换, 由 Schur 引理是标量。两边相等, 且 $\ker \rho \subset Z_\rho$, 故得到所述商群等

²拉格朗日 (Giuseppe Lodovico Lagrangia, 后用 Joseph-Louis Lagrange, 1736-1813), 意大利裔法国数学家, 发展变分法, 并著有《分析力学》。

式。若表示忠实, 则 $Z_\rho = Z(G)$; 在非交换单群的非平凡不可约表示中, 标量元素只能是单位。□

习题 5.33. 设 G 为有限非交换单群, $g \neq 1$ 。证明存在非平凡不可约复特征标 χ , 使 $\gcd(\chi(1), |g^G|) > 1$ 。

解. 反设全部非平凡不可约次数均与 $|g^G|$ 互素。每个非平凡不可约表示的核为正规真子群, 故由单性为 1。由引理 5.5.3, 若 $\chi(g) \neq 0$, 则 g 在一个忠实不可约表示中作用为标量, 从而位于 $Z(G) = 1$, 矛盾。因此所有非平凡不可约特征标在 g 处均为零。正则特征标分解遂在 $g \neq 1$ 处给出 $0 = 1$, 矛盾。这一结论约束类大小与次数的公共素因子, 而不只是分别要求它们整除群阶。□

第二编

对称群、模表示与箭图

本编导读

有限群的一般表示论提供了分解、特征标与诱导的方法；要把它们用于具体分类，还需要利用对象本身的结构。本编先研究对称群，借分拆和表把表示写成可以计算的模；随后转向模特征和箭图，考察完全可约性失效以后，怎样描述不可分解项及其扩张。

第 6、7 章组成“组合构造与张量运算”单元，回答怎样显式构造表示并计算其维数与乘法。第六章先构造 Specht 模，在整数系数上证明标准基，再用不变配对与支配序完成特征零分类。限制滤过、分支与钩长公式随后给出维数计算。第七章借助对称函数计算这些表示：Frobenius 特征映射把诱导乘积转成函数乘法，Schur–Weyl 对偶把同一分拆与张量幂上的一般线性群作用联系起来。

第 8—10 章组成“非半单现象与不可分解分类”单元，研究完全可约性失效后，合成因子之外还须记录什么。第八章从循环 p 群的不可分解模出发，介绍投射覆盖、Cartan 矩阵与块，再用离散赋值环中的格说明普通表示如何约化。Brauer 特征标保留合成因子的整数重数，但不能区别全部非分裂扩张；本章的具体矩阵与格例子会说明这种限制。这里的 Brauer 特征标与第五章的特征零 Brauer 诱导定理分别定义，不能混用。

箭图部分从第九章开始。前四节从模、张量积和有限维线性代数出发，建立投射表示与一阶扩张；第 9.5 节再联系第二卷第 15—16 章的根、幂等元提升与 Morita 理论³。路径乘积统一按映射复合的方向书写，全部采用左模。第十章在有限无环箭图及代数闭基域的条件下证明 Gabriel 定理；ADE 图、整数根和反射都在该章建立。

阅读与计算可以相互穿插：在对称群中检查低阶标准表和钩长；在箭图中先把一支箭按秩分解，再检查几支箭的复合秩和扩张空间。Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[4, Sections 5.12–5.23, Chapter 6] 可用于对照这两个部分；模表示的约化与 Brauer 特征标另见本编第 8 章所列资料。各章习题包括具体计算及条件失效的例子，解答附在题后。

³森田紀一（假名：もりたきいち，罗马音：Kiiti Morita，1915-1995），日本数学家，建立以模范畴等价为核心的森田理论。

第六章 对称群的表示

本章由 Young 图与填表构造 Specht 模，证明标准基定理，并在特征零下完成对称群不可约表示的分类、分支规则及钩长维数公式。

本章目标

- 区分 Young 表、行表类与列交错元，能在置换模和群代数左理想之间转换。
- 能实际使用 Garnir 关系，并说明标准化为何终止、标准基为何在整数及任意系数环上成立。
- 分别证明 Specht 模的不可约性、不同形状的非同构性及分类的完备性，指出特征条件的作用。
- 能构造删格滤过、应用限制与诱导分支，并用钩长公式核验维数。

预备知识为有限群的置换表示、Maschke 定理、Schur 引理、不可约复特征标与共轭类计数，以及诱导与限制的 Frobenius 互反性。组合构造在交换含幺环上进行；不可约分类和直和分支明确限于特征零。

先在 $\mathbb{Q}$ 上看 S_3 的形状 $(2, 1)$ ：按第二行所填的数字可列出三个行表类。对列作交错求和后，所得向量只张成一个二维空间；标准表恰有两个，似乎给出了它的一组基。但「向量个数等于维数」在更大分拆和一般系数环上不能充当证明：首先须说明所有非标准表都能化简，再证明化简结果没有隐藏关系。Specht 模正把这种填表与交错构造变成对称群的表示，标准基定理将为随后的不可约分类和维数计算奠定基础。

6.1 分拆与 Young 图

对称群的共轭类由轮换长度决定。令人感兴趣的是，同一组整数资料也能标记它的不可约表示。不过，共轭类与表示并不是把名称一一配上便有了联系：我们还要从每一个分拆构造出一个向量空间和群作用，再证明这些空间不可约且没有遗漏。

6.1.1 分拆、Young 图与标准表

定义 6.1.1. 设 n 为非负整数。有限的非增正整数列 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ 满足 $\sum_i \lambda_i = n$ 时，称为 n 的一个分拆 (partition)，记为 $\lambda \vdash n$ ； $n = 0$ 时允许空列。集合

$$[\lambda] = \{(i, j) : 1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq \lambda_i\}$$

称为其 **Young 图** (Young diagram)。第一个坐标由上向下表示行，第二个坐标由左向右表示列。从 $[\lambda]$ 到 $\{1, \dots, n\}$ 的双射称为形状为 λ 的 **Young 表** (Young tableau)。若每行从左向右、每列从上向下都严格递增，则称其为**标准 Young 表** (standard Young tableau)。

只要求列递增时称为列标准表；只要求行递增时称为行标准表。这两个条件不可混同。例如形状 $(3, 2)$ 的表

$$t = \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & \end{array}, \quad u = \begin{array}{ccc} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \end{array}$$

都列标准，只有 t 标准。图的格子仍固定在原位，置换作用改变的是格内的数字。

定义 6.1.2. 设 n 为非负整数， λ, μ 为 n 的分拆，并在各序列的末尾补零。令 $\lambda'_j = \#\{i : \lambda_i \geq j\}$ ，则 $\lambda' = (\lambda'_1, \lambda'_2, \dots)$ 去掉末尾的零后称为 λ 的**共轭分拆** (conjugate partition)。若对每个正整数 a 都有

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_a \geq \mu_1 + \dots + \mu_a,$$

便称 λ 在**支配序** (dominance order) 下大于或等于 μ ，记为 $\lambda \supseteq \mu$ 。

转置 Young 图便得到共轭分拆，所以 $(\lambda')' = \lambda$ 。支配序是偏序：反对称性由各个部分和相减得到。它一般不是全序，例如 $(4, 1, 1)$ 与 $(3, 3)$ 的第一部分和及前两部分和呈相反的大小关系。

引理 6.1.3. 设 $n \geq 1$ 为整数， $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r) \vdash n$ ，约定 $\lambda_{r+1} = 0$ ， t 为形状 λ 的标准表。数字 n 所在的格子 (i, λ_i) 满足 $\lambda_i > \lambda_{i+1}$ 。删去这个格子，得到一个大小为 $n-1$ 的标准表。反之，任何满足该条件的格子都能由这个过程出现。

证明. 最大数字右边、下边都不能还有格子，因此它在行末，而且下一行更短。删去后仍保持行列递增。反过来，给删格后的任意标准表补上数字 n ，新格子的左边、上边数字均小于 n ，右边、下边没有格子，所以仍为标准表。□

满足引理条件的格子称为**可移方格** (removable box)，删去它以后仍是 Young 图。可移方格的位置将给出表示限制到 S_{n-1} 时的各个成分。

6.1.2 共轭类与分拆

命题 6.1.4. 对每个整数 $n \geq 1$ ， S_n 的共轭类与 n 的分拆一一对应：把置换写成不交轮换之积，并把轮换长度按非增次序排列。若分拆 $\lambda \vdash n$ 中数字 j 出现 m_j 次，则对应的中心化子阶与共轭类大小分别为

$$z_\lambda = \prod_{j \geq 1} j^{m_j} m_j!, \quad \frac{n!}{z_\lambda}.$$

证明. 共轭把轮换 $(a_1 \dots a_j)$ 变成 $(g(a_1) \dots g(a_j))$ ，所以保持各个轮换的长度。反过来，长度相同的两组轮换可以逐个配对，再逐位置定义一个置换 g ，这个 g 就把第一组共轭到第二组。

与给定置换对易的元素必须把一个轮换轨道送到同长度轨道。长度为 j 的 m_j 个轨道可以有 $m_j!$ 种排列，每个轨道的像又由一个起点确定，有 j 种选择；各个长度之间相互独立，得到中心化子的阶。轨道与稳定子群公式给出共轭类大小。□

例如 S_4 的五个分拆为 $(4), (3, 1), (2, 2), (2, 1, 1), (1, 1, 1, 1)$ ，相应共轭类大小为 $6, 8, 3, 6, 1$ 。它们的和为 24。这里用分拆描述的是轮换类型；后面用分拆标记 Specht 模，是另一项需要证明的构造。

6.1.3 Young 子群

定义 6.1.5. 设 n 为非负整数, $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r) \vdash n$, t 为形状 λ 的 Young 表。使每一行的数字集合分别保持不变的置换组成子群 $R_t \leq S_n$, 使每一列的数字集合分别保持不变的置换组成子群 $C_t \leq S_n$, 分别称为 t 的行群与列群。按行依次填入 $1, \dots, n$ 所得表的行群记为

$$S_\lambda = S_{\lambda_1} \times \cdots \times S_{\lambda_r} \leq S_n,$$

称为相应的 **Young 子群** (Young subgroup); 这里各个因子置换互不相交连续数字段。

行群的阶为 $\prod_i \lambda_i!$, 列群的阶为 $\prod_j \lambda_j!$ 。若置换同时保持每行和每列, 便固定每一个行列交点, 故

$$R_t \cap C_t = \{1\}. \quad (6.1)$$

对任意 $g \in S_n$, 有 $R_{gt} = gR_tg^{-1}$ 和 $C_{gt} = gC_tg^{-1}$ 。因此表的具体填数会改变子群在 S_n 中的位置, 却不会改变它们的共轭类型。

6.2 Specht 模

若只要求同一行内的数字不分先后, Young 表就给出一种集合划分, 因而产生一个置换表示。但这个置换表示通常很大, 也并不不可约。Specht 模在其中选取列方向交替变号的线性组合, 使行对称与列反对称同时参与构造。

6.2.1 行表类置换模与列交错元

定义 6.2.1. 设 R 为交换含么环, n 为非负整数, $\lambda \vdash n$ 。若两个形状为 λ 的 Young 表的每一行数字集合分别相同, 则称这两个表行等价; 表 t 的等价类记为 $\{t\}$, 称为一个 **行表类** (tabloid)。令 M_R^λ 为以全部这些表类为基的自由 R -模, 规定左 S_n 作用

$$g\{t\} = \{gt\} \quad (g \in S_n).$$

记 C_t 为表 t 的列群, 在群代数 $R[S_n]$ 中令

$$b_t = \sum_{c \in C_t} \text{sgn}(c)c, \quad e_t = b_t\{t\}.$$

线性组合 e_t 称为这个 **行表类的列交错元** (polytabloid), 以下在对象明确时简称列交错元。由所有 e_t 生成的 R -子模

$$S_R^\lambda = \sum_t R e_t \subseteq M_R^\lambda$$

称为形状 λ 的 **Specht 模** (Specht module)。

因为 $gb_tg^{-1} = b_{gt}$, 所以 $ge_t = e_{gt}$; 上述子模确实被 S_n 保持。任何两个同形状表由某个置换联系, 因此一个 e_t 就在 $R[S_n]$ 作用下生成整个 S_R^λ 。 M_R^λ 的基数为 $n! / \prod_i \lambda_i!$, 并且

$$M_R^\lambda \cong R[S_n] \otimes_{R[S_\lambda]} R,$$

其中右边的 R 采用平凡作用；同构把 $g \otimes 1$ 送到按行填数表的表类 $g\{t\}$ 。

例 6.2.2. 对 $\lambda = (2, 1)$ ，用 v_i 表示第二行只有数字 i 的行表类。表

$$t = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ & 3 \end{array}$$

的列群为 $\{1, (13)\}$ ，所以 $e_t = v_3 - v_1$ 。遍取表后得到所有 $v_i - v_j$ ，从而

$$S_R^{(2,1)} = \{a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 : a_1 + a_2 + a_3 = 0\}.$$

它以 $v_2 - v_1, v_3 - v_1$ 为自由基，在任意 R 上秩均为 2。

6.2.2 特征零下的 Young 对称化子

定义 6.2.3. 设 k 为特征零域， n 为非负整数， $\lambda \vdash n$ ， t 为形状 λ 的 Young 表， R_t, C_t 分别为其行群、列群。在 $k[S_n]$ 中令

$$a_t = \sum_{r \in R_t} r, \quad b_t = \sum_{c \in C_t} \text{sgn}(c)c, \quad c_t = b_t a_t.$$

本书把 c_t 称为 **Young 对称化子** (Young symmetrizer)，并固定先作行求和、再作列反对称化的乘法次序。

单独的 $a_t/|R_t|$ 与 $b_t/|C_t|$ 都是幂等元；它们的乘积一般还不是幂等元。不同文献也会采用 $a_t b_t$ ，或预先除去两个子群的阶。阅读公式时须同时核对乘法次序与归一化。本书采用的表类模型与 $b_t a_t$ 直接对应：

命题 6.2.4. 设 R 为交换含么环， n 为非负整数， $\lambda \vdash n$ ， t 为形状 λ 的 Young 表， R_t, C_t 分别为其行群、列群。令 $a_t = \sum_{r \in R_t} r$ ， $b_t = \sum_{c \in C_t} \text{sgn}(c)c$ ，记 M_R^λ 为行表类置换模、 S_R^λ 为 Specht 模。存在左 $R[S_n]$ -模同构

$$M_R^\lambda \longrightarrow R[S_n]a_t, \quad \{gt\} \longmapsto ga_t,$$

它把 S_R^λ 同构地送到 $R[S_n]b_t a_t$ 。

证明. $\{g_1 t\} = \{g_2 t\}$ 当且仅当 $g_2^{-1}g_1 \in R_t$ ，这时 $g_1 a_t = g_2 a_t$ 。不同左陪集上的元素和具有互不相交的群元素支集，因此选取陪集代表后，所有 ga_t 在任意 R 上线性无关，并生成左理想。映射于是良定义且为同构。它与左乘相容，并把 $e_t = b_t \{t\}$ 送到 $b_t a_t$ ，故也识别两者生成的子模。□

这里的同构甚至没有用到特征零。特征零的作用将在不可约性和幂等元归一化时出现；不能把含分母的归一化照搬到任意特征。

6.2.3 Specht 模的基本性质

命题 6.2.5. 设 R 为交换含么环， n 为非负整数， $\lambda \vdash n$ ， t 为形状 λ 的 Young 表， C_t 为其列群， $e_t \in M_R^\lambda$ 为对应的列交错元。对 $c \in C_t$ ，有

$$e_{ct} = \text{sgn}(c)e_t.$$

此外, e_t 中基向量 $\{t\}$ 的系数为 1, 故当 $R \neq 0$ 时 $e_t \neq 0$ 。形状 (n) 与 (1^n) 的 Specht 模分别是平凡表示与符号表示。

证明. 等式 $cb_t = \text{sgn}(c)b_t$ 由列群求和中重排下标得到, 再用 $e_{ct} = ce_t$ 。若 $c \in C_t$ 满足 $\{ct\} = \{t\}$, 则 $c \in R_t \cap C_t$, 由 (6.1) 知 $c = 1$, 所以指定系数恰为 1。

单行时只有一个行表类, 列群平凡; 单列时行群平凡, 反对称和在每个置换下乘以其符号, 且由一个非零向量生成。两种情形分别给出所述一维表示。□

把每一列内部的数字排成递增次序, 最多改变列交错元的符号。因此研究全部 e_t 时可以先限制到列标准表; 行内的乱序则需要下一节的 Garnir 关系¹, 不能用相同的符号法直接消去。

6.2.4 Young 表与表类模型的符号

这三种对象处于不同层次: t 是每个格子都有指定数字的表; $\{t\}$ 忘掉各行内部次序, 是置换模的一个基向量; e_t 则是多个这样的基向量带符号相加所得的向量。一般不能把 e_t 当成另一个等价类。

例如例 6.2.2 中的 $e_t = v_3 - v_1$ 同时涉及第二行为 3 和第二行为 1 的两个表类。英文 **multitableau** 指由若干表组成的另一类组合对象, 不是这里的列交错元; 本章保留后者原文, 避免仅从词形推断构造。

现在已经知道 Specht 模由有限多个显式向量生成, 却还不知道它们之间的关系。例如 $(2, 1)$ 形状共有六个表, 但模的秩只有二。下一节要证明, 恰好选取所有标准表所对应的 e_t , 就得到一组基, 而且这个结论首先在整数环上成立。

标准基定理需要分别证明生成性和线性无关性。Garnir 关系把非标准表改写成次序严格下降的表, 由有限性得到生成性; 行中小数字的分布则给出一个对角元为 1 的三角矩阵, 用来证明线性无关。仅仅计算标准表的数目, 还不能得到这两项结论。

6.3 Garnir 关系与标准基

本节先在整数系数下处理关系。这样既能避免用除法掩盖特征限制, 也能同时得到任意域和任意交换环上的标准基。整个过程只移动表中数字, 不改变 Young 图的形状。

6.3.1 Garnir 关系与标准列交错元基

引理 6.3.1 (Garnir 关系). 设 n 为非负整数, $\lambda \vdash n$, λ' 为共轭分拆, t 为形状 λ 的 Young 表。在相邻的第 $j, j+1$ 列中, 分别选数字子集 A, B , 并假定

$$|A| + |B| > \lambda'_j.$$

¹加尼尔 (Henri Georges Garnir, 1921-1985), 比利时数学家, 研究代数与分析, 以对称群表示中的关系式著称。

令 $H = S_A \times S_B \leq S_{A \cup B}$, 选取左陪集 $S_{A \cup B}/H$ 的代表元集 D , 其中包含单位元。记 e_u 为表 u 的列交错元, 则在整数行表类置换模 $M_{\mathbb{Z}}^{\lambda}$ 中有

$$\sum_{\sigma \in D} \text{sgn}(\sigma) e_{\sigma t} = 0. \quad (6.2)$$

同一等式经系数映射后, 在任意交换含么环上仍成立。它称为 **Garnir 关系** (Garnir relation)。

证明. 记 $\gamma = \sum_{\pi \in S_{A \cup B}} \text{sgn}(\pi) \pi$. 对任意 $c \in C_t$, 数字集合 $A \cup B$ 在 ct 中仍全部位于这两列, 因而位于前 λ'_j 行。由所假定的不等式, 其中必有两个数字处于同一行; 交换这两个数字的换位 $\tau \in S_{A \cup B}$ 固定 $\{ct\}$. 在 $\gamma\{ct\}$ 的求和中把 π 与 $\pi\tau$ 配成一对, 两项符号相反、向量相同, 故它们相消。因此 $\gamma e_t = 0$ 。

另一方面, 按左陪集分组得

$$\gamma = \sum_{\sigma \in D} \text{sgn}(\sigma) \sigma \sum_{h \in H} \text{sgn}(h) h.$$

H 包含在 C_t 中, 故内层和作用于 e_t 时得到 $|A|!|B|!e_t$ 。于是

$$|A|!|B|! \sum_{\sigma \in D} \text{sgn}(\sigma) e_{\sigma t} = 0.$$

自由交换群 $M_{\mathbb{Z}}^{\lambda}$ 无挠, 故可消去这个非零整数, 得到(6.2)。这是整数系数向量恒等式, 随后可映到任意 R ; 这一顺序并未在 R 中除以阶乘。□

定理 6.3.2 (标准基). 设 R 为交换含么环, n 为非负整数, $\lambda \vdash n$. 所有形状为 λ 的标准表 t 所给的列交错元 e_t , 构成 Specht 模 S_R^{λ} 的一组 R -基。因而 $S_{\mathbb{Z}}^{\lambda}$ 是有限秩自由交换群, 且自然映射

$$R \otimes_{\mathbb{Z}} S_{\mathbb{Z}}^{\lambda} \longrightarrow S_R^{\lambda}$$

为同构。

证明. 先证明生成性。利用命题 6.2.5, 可先把每列排成递增次序。对列标准表 t , 把第一列从上到下的数字、第二列从上到下的数字依次接起来, 所得长度为 n 的列字记为 $w(t)$, 按通常字典序比较。可能的列字只有有限多个。

若 t 还不是标准表, 则某一行有相邻逆序 $t(i, j) > t(i, j+1)$ 。取

$$\begin{aligned} A &= \{t(i, j), t(i+1, j), \dots, t(\lambda'_j, j)\}, \\ B &= \{t(1, j+1), \dots, t(i, j+1)\}. \end{aligned}$$

由于两列递增, A 中每个数字都大于 B 中每个数字, 且 $|A| + |B| = \lambda'_j + 1$ 。在 Garnir 关系中单独移出单位元项, 得到

$$e_t = - \sum_{\substack{\sigma \in D \\ \sigma \neq 1}} \text{sgn}(\sigma) e_{\sigma t}. \quad (6.3)$$

一个非单位陪集满足 $\sigma A \neq A$, 所以新的第 j 列从 A 中移出若干数字, 并换入同样多个来自 B 的较小数字; 前 $j-1$ 列不变。将新表的每列重新排序后, 列字严格小于 $w(t)$ 。

列排序只改变列交错元的符号。因此重复(6.3)时, 每一条重写链的列字都严格下降; 有限性保证过程终止。终止项不能还有相邻行逆序, 所以全部为标准表, 生成性得证。

再证明线性无关。对任意行表类 $\{u\}$, 令

$$N_u(a, m) = \#\{\text{前 } a \text{ 行中不大于 } m \text{ 的数字}\}.$$

这只依赖表类。若 t 标准, 则对每个 $c \in C_t$ 都有

$$N_{ct}(a, m) \leq N_t(a, m) \quad \text{对所有 } a, m. \quad (6.4)$$

事实上, 第 j 列中不大于 m 的数字在 t 中占据最上面的若干位置, 若其个数为 q_j , 则前 a 行贡献 $\min(a, q_j)$; 列置换以后的贡献不会更大。对各列相加即得不等式。

在标准表集合上, 用所有这些不等式定义偏序。若双向成立, 则每一行中小于等于每个 m 的数字个数都相同, 因此各行的数字集合相同; 标准表各行递增, 故两个表相同。把这个有限偏序延伸为全序。在 e_t 的表类展开中, 若标准表 u 的表类 $\{u\}$ 出现, 则(6.4)说明 u 不大于 t ; 而 $\{t\}$ 的系数由命题 6.2.5 知为 1。于是只取标准表所对应的那些表类坐标, 得到一个对角元全为 1 的三角矩阵。它在任意交换环上可逆, 所以这些 e_t 线性无关。

最后, 生成性所用系数全为整数; 自然映射把整数标准基变成 R 上刚证的标准基, 故为同构。□

6.3.2 表的次序、标准化终止与生成性

上述证明给出实际的标准化算法。输入为一个填数表, 或若干列交错元的有限 R -线性组合; 输出为标准列交错元的线性组合。每次先排序各列并记下符号, 再找到一处相邻行逆序, 取证明中规定的两段数字, 按(6.3)展开, 最后合并相同标准表的系数。这个算法只用加减法, 不要求能在 R 中求逆。

例 6.3.3. 对列标准而非标准的表

$$t = \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ & 3 \end{array}$$

取 $A = \{2, 3\}$ 、 $B = \{1\}$, 左陪集代表可取 $1, (12), (13)$ 。Garnir 关系为 $e_t - e_{(12)t} - e_{(13)t} = 0$ 。令

$$u = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ & 3 \end{array}, \quad v = \begin{array}{cc} 1 & 3 \\ & 2 \end{array}.$$

则 $(12)t = u$, 而 $(13)t$ 在第一列交换上下数字后变成 v , 所以

$$e_t = e_u - e_v.$$

在例 6.2.2 的记号下, 这正是 $v_3 - v_2 = (v_3 - v_1) - (v_2 - v_1)$ 。

算法终止并不自动保证计算很快。每次 Garnir 展开可能产生多个新项, 本章只证明有限步骤内能完成重写, 不给出随 n 增长的复杂度界。

6.3.3 首项三角性与整系数线性无关性

在独立性证明中，起作用的不仅是“存在一个首项”，还包括首项系数是单位 1。若这个系数只是某个非零整数，约化到正特征后可能消失；这里的三角矩阵在所有系数环上仍可逆。因此标准基不因特征改变而丢失，但由它给出的表示却可能变得可约。

记形状 λ 的标准表数为 f^λ 。标准基定理现在才允许我们写

$$\text{rank}_{\mathbb{Z}} S_{\mathbb{Z}}^\lambda = f^\lambda, \quad \dim_k S_k^\lambda = f^\lambda$$

对任意域 k 成立。后面计算 f^λ 的公式用于求维数；标准基的存在已经证明，不可约分类将另作论证。

6.4 不可约分类

标准基解决的是向量空间的大小，尚未说明群作用能否保持一个更小的非零子空间。本节在表类基上引入不变配对；列反对称化对这个配对有一种特别简单的秩一作用，从而控制 Specht 模的所有子模。

6.4.1 特征零下的不可约性

在 M_R^λ 上把不同行表类规定为正交，并令每个基向量与自身的配对为 1，得到对称双线性型

$$B\left(\sum_u a_u \{u\}, \sum_u d_u \{u\}\right) = \sum_u a_u d_u.$$

群作用置换这组基，所以 $B(gv, gw) = B(v, w)$ 。这里采用双线性型；在复数域上不把它与共轭线性的 Hermitian 内积混为一谈。

引理 6.4.1. 设 R 为交换含么环， n 为非负整数， $\lambda \vdash n$ ， t 为形状 λ 的 Young 表， C_t 为其列群。记 M_R^λ 为行表类置换模， $b_t = \sum_{c \in C_t} \text{sgn}(c)c$ ， $e_t = b_t \{t\}$ ， B 为以行表类基为标准正交基的对称双线性型。对任意 $v \in M_R^\lambda$ ，有

$$b_t v = B(v, e_t) e_t. \quad (6.5)$$

证明. 先令 $v = \{u\}$ 。若 t 的某一列有两个数字位于 u 的同一行，交换它们的换位既属于 C_t 又固定 $\{u\}$ ；把列群求和配成符号相反的二项，即得 $b_t \{u\} = 0$ 。

若不存在这样的两个数字，则 u 的第一行共有 λ_1 个数字，它们恰从 t 的每列各取一个。可用列置换把这些数字送到 t 的第一行。删去已匹配的第一行，对剩余各列与第二行重复：第二行必须恰从尚非空的每列各取一个。逐行进行，得到 $c \in C_t$ 使 $\{u\} = \{ct\}$ 。于是 $b_t \{u\} = \text{sgn}(c)e_t$ 。这证明 $b_t v$ 总是 e_t 的标量倍数。

因为 c 与 c^{-1} 符号相同， b_t 关于 B 自伴随。故 $b_t v$ 中 $\{t\}$ 的系数为 $B(b_t v, \{t\}) = B(v, b_t \{t\}) = B(v, e_t)$ 。而 e_t 中 $\{t\}$ 的系数为 1，所求标量即为此数。□

定理 6.4.2 (子模定理). 设 k 为任意域， n 为非负整数， $\lambda \vdash n$ ， M_k^λ 为行表类置换模， $S_k^\lambda \subseteq M_k^\lambda$ 为 Specht 模， U 为 M_k^λ 的左 $k[S_n]$ -子模。则至少有下列一项成立：

$$S_k^\lambda \subseteq U, \quad U \subseteq (S_k^\lambda)^\perp,$$

其中正交补取在 M_k^λ 中, B 为以行表类基为标准正交基的对称双线性型。

证明. 若第二项不成立, 因为全部 e_t 生成 S_k^λ , 存在 $u \in U$ 与某个 t 使 $B(u, e_t) \neq 0$. 由(6.5), $b_t u = B(u, e_t)e_t \in U$. 域中非零标量可逆, 故 $e_t \in U$; 这个向量的 S_n -轨道生成整个 Specht 模, 所以第一项成立。□

命题 6.4.3. 设 k 为特征零域, n 为非负整数, $\lambda \vdash n$, M_k^λ 为行表类置换模, S_k^λ 为其中的 Specht 模。以 M_k^λ 的行表类基为标准正交基的对称双线性型 B , 在 S_k^λ 上非退化, 且 S_k^λ 作为左 $k[S_n]$ -模绝对不可约。

证明. 在整数标准基中写出 B 的 Gram 矩阵 G_λ , 其条目为整数。把它看作实矩阵时, 由定理 6.3.2, 这些基向量在实表类空间中线性无关, 而表类配对为正定型。因此 $\det G_\lambda$ 是非零整数。它在任意特征零域中的像仍非零, 故限制型非退化。

若 $0 \neq U \subseteq S_k^\lambda$ 是子模, 子模定理或者给出 $S_k^\lambda \subseteq U$, 或者给出 $U \subseteq S_k^\lambda \cap (S_k^\lambda)^\perp = 0$. 后者不可能, 故 $U = S_k^\lambda$. 对 k 的任何扩域, 标准基与同一个非零 Gram 行列式仍成立, 所以上述不可约性在扩域后保持, 即为绝对不可约。□

6.4.2 不同分拆与非同构表示

命题 6.4.4. 设 k 为特征零域, n 为非负整数, $\lambda, \mu \vdash n$, S_k^λ, S_k^μ 为相应 Specht 左 $k[S_n]$ -模, M_k^λ, M_k^μ 为相应行表类置换模。若 $\text{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, M_k^\mu) \neq 0$, 则 $\lambda \supseteq \mu$. 此外,

$$\dim_k \text{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, M_k^\mu) = 1.$$

特别地, $S_k^\lambda \cong S_k^\mu$ 当且仅当 $\lambda = \mu$.

证明. 固定一个 λ -表 t , 并令 $\varphi: S_k^\lambda \rightarrow M_k^\mu$ 非零。因为 e_t 生成整个模, $\varphi(e_t) \neq 0$. 列群对 e_t 按符号作用, 因此

$$b_t \cdot \varphi(e_t) = \varphi(b_t e_t) = |C_t| \cdot \varphi(e_t) \neq 0.$$

所以至少有一个 μ -行表类 $\{u\}$ 满足 $b_t \{u\} \neq 0$. 与秩一引理中的配对消去相同, u 的任何一行不能含有 t 同一列的两个数字。前 a 行从第 j 列至多取 $\min(a, \lambda'_j)$ 个数字, 故

$$\mu_1 + \cdots + \mu_a \leq \sum_j \min(a, \lambda'_j) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_a.$$

这就是支配条件。

当 $\mu = \lambda$ 时, 引理 6.4.1 又说明 $b_t \cdot \varphi(e_t) \in k e_t$. 因 $|C_t|$ 可逆, $\varphi(e_t)$ 为 e_t 的标量倍数; 由生成性, φ 是包含映射的标量倍数。包含映射确实非零, 故 Hom 空间恰为一维。

最后, 若两个 Specht 模同构, 把同构与 $S_k^\mu \subseteq M_k^\mu$ 复合, 得到 $\lambda \supseteq \mu$; 用逆同构得到 $\mu \supseteq \lambda$. 支配序的反对称性给出 $\lambda = \mu$. 反方向显然成立。□

6.4.3 分类完备性

定理 6.4.5 (对称群的不可约分类). 设 k 为特征零域, $n \geq 0$ 为整数。全部 Specht 模 S_k^λ , 其中 $\lambda \vdash n$, 是互不同构的绝对不可约左 $k[S_n]$ -模, 并穷尽所有不可约有限维左 $k[S_n]$ -模。

证明. 不可约性和非同构性已经分别由命题 6.4.3 及命题 6.4.4 证明. 先取 $k = \mathbb{C}$. 命题 6.1.4 说明共轭类数等于分拆数, 而定理 2.2.4 说明不可约复表示的类型数等于共轭类数. 我们已经为每个分拆构造出互不同构的不可约表示, 因此没有其他复不可约类型.

为把完备性推广到任意特征零域, 不能直接使用只对复表示证明的类函数论. 改用整数标准基写出所有表示矩阵, 得到一个在有理数上定义的代数同态

$$\Phi_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}[S_n] \longrightarrow \prod_{\lambda \vdash n} \text{End}_{\mathbb{Q}}(S_{\mathbb{Q}}^{\lambda}).$$

扩张到复数后, 此映射单射: 若群代数元素在所有不可约上作用为零, Maschke 定理使它在正则表示上也作用为零; 作用于单位元即知该元素为零. 由定理 2.2.5 在单位共轭类处得到的维数平方和, 目标维数为 $\sum_{\lambda} (f^{\lambda})^2 = n!$, 所以这个单射还是同构.

因此 $\Phi_{\mathbb{Q}}$ 在所选基中是方阵, 其有理行列式非零. 在任意特征零域 k 中, 这个行列式的像仍非零, 故

$$k[S_n] \cong \prod_{\lambda \vdash n} M_{f^{\lambda}}(k). \quad (6.6)$$

一个不可约模只能由这组正交中心幂等元中的一个非零作用, 所以只属于一个矩阵块. 矩阵代数 $M_d(k)$ 的不可约模只有列向量模: 取非零 $E_{ii}v$, 映射 $k^d \rightarrow V$ 、第 j 个基向量映到 $E_{ji}v$, 由矩阵单位关系是非零模同态; 列向量模简单, 其像在不可约 V 中必为全体. 这证明(6.6)所列的 Specht 模也穷尽 k 上全部类型. $\square$

这里先证明“每个都是不可约”及“彼此不同”, 最后才计数. 没有前两项, 参数个数与共轭类个数相等并不能证明分类.

6.4.4 Young 对称化子的归一化与幂等元

标准基使 Gram 行列式、基域扩张与群作用矩阵都有整系数的共同来源. 它也使 Young 对称化子可以精确归一化:

命题 6.4.6. 设 k 为特征零域, n 为非负整数, $\lambda \vdash n$, t 为形状 λ 的 Young 表, R_t, C_t 分别为其行群、列群. 令 $a_t = \sum_{r \in R_t} r$, $b_t = \sum_{c \in C_t} \text{sgn}(c)c$, $c_t = b_t a_t \in k[S_n]$, 并记 f^{λ} 为形状 λ 的标准表数. 则

$$c_t^2 = \frac{n!}{f^{\lambda}} c_t,$$

且 $\frac{f^{\lambda}}{n!} c_t$ 是一个幂等元, 它生成的左理想同构于 Specht 模 S_k^{λ} .

证明. 由命题 6.2.4, 计算 c_t^2 等价于计算 $b_t a_t e_t$. 秩一公式给出 $b_t a_t e_t = B(a_t e_t, e_t) e_t$. 记这个整数系数为 α , 便有 $c_t^2 = \alpha c_t$.

在实表类空间中, a_t 自伴随且 $a_t^2 = |R_t| a_t$, 所以

$$\alpha = \frac{B(a_t e_t, a_t e_t)}{|R_t|} > 0.$$

严格不等号的理由是 $a_t e_t$ 中 $\{t\}$ 的系数为 $|R_t|$: 每个行置换都固定 $\{t\}$, 而 e_t 在该处系数为 1. 因此 $\alpha \neq 0$.

右乘 c_t/α 是 $k[S_n]$ 上的投影，像是 $k[S_n]c_t$ ，其维数为 f^λ 。由 $R_t \cap C_t = \{1\}$ ， c_t 中单位元系数为 1，所以在群元素基下，右乘 c_t/α 的每个对角元都是 $1/\alpha$ ，迹为 $n!/\alpha$ 。投影的迹等于像的维数，得到 $\alpha = n!/f^\lambda$ 。□

这项构造可与 Etingof 等人的 Young 对称化子证明对照 [4, Sections 5.12–5.13, pp. 110–113]。该书采用预先归一化的行、列求和及相反乘法次序，因而相应的倍数也随约定改变；本节的归一化是在当前模型内算出的。

6.4.5 正特征中的配对退化与可约性

子模定理本身允许任意特征；不可约性证明需要的额外事实是 Specht 模上配对非退化。非零整数 Gram 行列式在正特征中可能变成零，这正是不能照搬证明的位置。

例 6.4.7. 设 k 为特征 3 的域。由例 6.2.2， $S_k^{(2,1)}$ 是三点置换模中的坐标和为零子空间。向量 $v_1 + v_2 + v_3$ 非零，因 $3 = 0$ 而属于这个二维子空间，并生成一维平凡子模，所以 $S_k^{(2,1)}$ 可约。在基 $v_2 - v_1, v_3 - v_1$ 中，

$$G_{(2,1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det G_{(2,1)} = 3.$$

其根恰好是上述平凡子模。标准基仍有两个向量，退化的是配对与不可约性。

6.4.6 Young 置换模分解的支配三角性

由于 $M_k^\mu = \text{Ind}_{S_\mu}^{S_n} k$ ，Frobenius 互反性把它与 Young 子群不动向量联系起来。在特征零下，完全可约性和 Specht 模的绝对不可约性又说明，一个不可约模在 M_k^μ 中的重数等于 $\dim_k \text{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, M_k^\mu)$ 。因此命题 6.4.4 给出三角性：

$$M_k^\mu \cong S_k^\mu \oplus \bigoplus_{\substack{\lambda \supseteq \mu \\ \lambda \neq \mu}} (S_k^\lambda)^{\oplus m_{\lambda\mu}}, \quad m_{\lambda\mu} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

这里尚未计算所有重数，但对角重数已经精确等于 1。后面建立 Frobenius 特征映射时，正是这项有方向的三角性帮助识别 Schur 函数。

6.4.7 维数平方和的核验

分类还给出一个事后检验维数的方法：

$$n! = \sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2.$$

左边来自群的阶，右边来自各个标准表集合的大小。这个恒等式在分类完成时已经成立；钩长公式将使每一项都能迅速算出。它适合检查是否漏了分拆或算错维数，却不能在不可约性和非同构性证明时单独充当分类论证。

6.5 分支规则与钩长公式的证明

把 S_n 中固定数字 n 的子群识别为 S_{n-1} 。在标准表中, n 只能占据可移方格; 我们将证明, 删去这个方格不仅递推地计数标准表, 也准确描述 Specht 模的限制。先建立模的滤过, 再在特征零下利用完全可约性分裂它。

6.5.1 限制滤过与可移方格的分支

定理 6.5.1 (限制分支). 设 R 为交换含么环, $n \geq 1$ 为整数, $\lambda \vdash n$, S_R^λ 为 Specht 左 $R[S_n]$ -模, $S_{n-1} \leq S_n$ 为固定数字 n 的子群。把 λ 的可移方格按行号由小到大记为 $x_1, \dots, x_q$, 令 $\mu^{(j)} = \lambda \setminus x_j$ 。则 $\text{Res}_{S_{n-1}}^{S_n} S_R^\lambda$ 有自然滤过

$$0 = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \dots \subseteq F_q = S_R^\lambda, \quad F_j/F_{j-1} \cong S_R^{\mu^{(j)}}.$$

其中 F_j 由数字 n 位于 $x_1, \dots, x_j$ 的全部标准 e_t 生成。特别地, 若 $R = k$ 为特征零域, 则

$$\text{Res}_{S_{n-1}}^{S_n} S_k^\lambda \cong \bigoplus_{x \text{ 为可移方格}} S_k^{\lambda \setminus x}. \quad (6.7)$$

证明. 设 x_j 在第 r_j 行。在表类置换模中, 令 L_r 由数字 n 位于前 r 行的全部行表类生成。由于 S_{n-1} 固定 n , 每个 L_r 都是该子群下的不变子模。

若标准表 t 中的 n 位于可移方格 (r, λ_r) , 则该格所在列的高度恰为 r 。列置换只能把 n 移到这一列的前 r 行, 所以 $e_t \in L_r$ 。由此已有 $F_j \subseteq S_R^\lambda \cap L_{r_j}$ 。

对一个可移行 r , 定义 R -线性映射

$$d_r : M_R^\lambda \longrightarrow M_R^{\lambda \setminus (r, \lambda_r)} :$$

若一个行表类的第 r 行含 n , 就删掉这个数字; 否则送到零。删除以行的数字集合定义, 与行内次序无关, 且与 S_{n-1} 作用相容。对于标准表 t , 若 n 在第 r 行, 则只有固定 n 的列置换在 $d_r(e_t)$ 中留下贡献; 这些置换恰是删格后的列群, 所以

$$d_r(e_t) = e_{t \setminus n}. \quad (6.8)$$

若 n 所在可移行小于 r , 则 $d_r(e_t) = 0$ 。

现证明上面的包含是等号。将 $v \in S_R^\lambda \cap L_{r_j}$ 按标准基展开。假如有系数非零的标准表把 n 放在大于 r_j 的行, 取其中最大的行号 s 。由于 $v \in L_{r_j}$, 有 $d_s(v) = 0$; 展开中行号小于 s 的项均被 d_s 消去, 行号等于 s 的项由 (6.8) 变成形状 $\lambda \setminus (s, \lambda_s)$ 的互不相同标准列交错元。它们由定理 6.3.2 线性无关, 故这些系数都为零, 矛盾。因此 $F_j = S_R^\lambda \cap L_{r_j}$, 尤其 F_j 是子模。

限制 d_{r_j} 到 F_j 。上述公式说明它的核恰为 F_{j-1} : 其余标准基向量的像是互不相同的标准基向量。而删格后的每个标准表补上 n 都成为原形状的标准表, 故映射满射。这证明滤过商的同构。最后, 在特征零域上, $(n-1)!$ 可逆, 定理 1.3.1 使每个短正合列分裂, 遂得 (6.7)。□

滤过由固定数字所在行的条件确定, 不需要选择不变补空间。特征零下的直和同构则一般没有这样的唯一性; 在模特征中, 滤过仍存在, 却不能据此断言各层必能直和分开。

6.5.2 标准表递推与钩长公式

由引理 6.1.3, 标准表数满足

$$f^\varnothing = 1, \quad f^\lambda = \sum_{x \text{ 为可移方格}} f^{\lambda \setminus x}. \quad (6.9)$$

下面从这个递推推出乘积公式, 不借用后文的对称函数或 Frobenius 特征映射。

引理 6.5.2. 设 n 为非负整数, $\lambda \vdash n$, f^λ 为形状 λ 的标准表数。取不小于 λ 长度的正整数 r , 将 λ 末尾补零至 r 项, 并令 $l_i = \lambda_i + r - i$ 。则

$$f^\lambda = n! \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq r} (l_i - l_j)}{\prod_{i=1}^r l_i!}. \quad (6.10)$$

证明. 记等式右边为 $D(\lambda)$ 。当 $n = 0$ 时, $l_i = r - i$, Vandermonde 乘积²恰为 $\prod_i (r - i)!$, 所以 $D(\varnothing) = 1$ 。

对 $n > 0$, 若第 i 行末格可移, 则删格把 l_i 换成 $l_i - 1$, 直接相除得到

$$\frac{D(\lambda \setminus x_i)}{D(\lambda)} = \frac{l_i}{n} \prod_{j \neq i} \frac{l_i - l_j - 1}{l_i - l_j}.$$

当该行不可移时, 相应表达式为零: 若 $i < r$ 且 $\lambda_i = \lambda_{i+1}$, 则 $l_i - l_{i+1} = 1$, 乘积中有零因子; 若 $i = r$ 且 $\lambda_r = 0$, 则 $l_r = 0$ 。所以要证明 D 满足(6.9), 只须证明

$$\sum_{i=1}^r l_i \prod_{j \neq i} \frac{l_i - l_j - 1}{l_i - l_j} = \sum_i l_i - \frac{r(r-1)}{2} = n. \quad (6.11)$$

令 $P(z) = \prod_i (z - l_i)$ 。不同的 l_i 互异, 因而有理函数 $z \cdot P(z-1)/P(z)$ 的部分分式只可能含这些点对应的一阶分母; 在 l_i 处的留数为

$$\frac{l_i \cdot P(l_i - 1)}{P'(l_i)} = -l_i \prod_{j \neq i} \frac{l_i - l_j - 1}{l_i - l_j}.$$

这里“留数”只指部分分式中 $1/(z - l_i)$ 的系数, 不需要复分析。另一方面, 在形式变量 z^{-1} 中展开,

$$\begin{aligned} \frac{P(z-1)}{P(z)} &= \prod_i \left(1 - \frac{1}{z - l_i} \right) \\ &= 1 - \frac{r}{z} + \frac{r(r-1)/2 - \sum_i l_i}{z^2} + O(z^{-3}). \end{aligned}$$

这里 $O(z^{-3})$ 只表示关于 z^{-1} 的次数至少为 3 的形式幂级数。乘以 z 后, z^{-1} 的系数等于全部部分分式系数之和。代入刚算的系数即得(6.11)。因此 D 与 f 有同一个初值和同一个降低格子数的递推, 对 n 归纳得到所求公式。□

²范德蒙德 (Alexandre-Théophile Vandermonde, 1735-1796), 法国数学家, 研究行列式与对称函数。

定义 6.5.3. 设 λ 为分拆, λ' 为共轭分拆, $[\lambda]$ 为 Young 图, $x = (i, j) \in [\lambda]$. 由 x 、它右方同行的格子及下方同列的格子组成的集合称为该格的钩, 其格子数

$$h_\lambda(i, j) = \lambda_i - j + \lambda'_j - i + 1$$

称为钩长 (hook length)。

定理 6.5.4 (钩长公式). 设 n 为非负整数, $\lambda \vdash n$, k 为任意域, $h_\lambda(x)$ 为 Young 图 $[\lambda]$ 中方格 x 的钩长。形状 λ 的标准表数 f^λ , 以及 Specht 模 S_k^λ 的 k -维数, 等于

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{x \in [\lambda]} h_\lambda(x)}. \quad (6.12)$$

这个等式称为钩长公式 (hook-length formula)。

证明. 标准表数与维数的相等已经由标准基定理给出。只须把(6.10)改写为钩长乘积。仍取 $l_i = \lambda_i + r - i$ 。固定第 i 行, 对该行的第 j 格令

$$q_j = j - 1 + r - \lambda'_j, \quad h_\lambda(i, j) = l_i - q_j.$$

这些 q_j 严格递增, 且属于 $\{0, \dots, l_i - 1\}$ 。它们不等于任何 l_a : 若 $l_a = q_j$, 则 $\lambda_a - j + 1 = a - \lambda'_j$; 当 $a \leq \lambda'_j$ 时左边为正、右边非正, 当 $a > \lambda'_j$ 时左边非正、右边为正, 均矛盾。

对 $a > i$, 有 $0 \leq l_a < l_i$, 且这些数互异。在长度为 l_i 的整数区间中, 已有 λ_i 个 q_j 及 $r - i$ 个 l_a , 总数恰为 l_i , 所以它们正好将该区间分完。因此

$$\prod_{j=1}^{\lambda_i} h_\lambda(i, j) = \frac{l_i!}{\prod_{a>i} (l_i - l_a)}.$$

对 i 连乘, 得到

$$\prod_{x \in [\lambda]} h_\lambda(x) = \frac{\prod_i l_i!}{\prod_{i<a} (l_i - l_a)}.$$

代入(6.10)即得(6.12)。 □

Etingof 等人在 [4, Section 5.17, pp. 118–119] 中也把 Vandermonde 形式改写成钩长乘积, 其前一步使用 Frobenius 特征标公式; 本节的前一步由标准表递推给出。

6.5.3 钩形、两行与低阶分拆的维数

钩形分拆 $\lambda = (n - r, 1^r)$, 其中 $0 \leq r < n$, 左上角的钩长是 n , 其余第一行的钩长为 $n - r - 1, \dots, 1$, 第一列其余钩长为 $r, \dots, 1$ 。因此

$$f^{(n-r, 1^r)} = \frac{n!}{n(n-r-1)!r!} = \binom{n-1}{r}. \quad (6.13)$$

也可直接计数: 左上角必为 1, 只需从 $2, \dots, n$ 选 r 个数字放到第一列, 行列内均按递增次序排定。

对于两行分拆 $(n-r, r)$, 其中 $0 \leq r \leq n/2$, 取两个参数 $l_1 = n-r+1, l_2 = r$, 由(6.10)得到

$$f^{(n-r, r)} = \frac{n!(n-2r+1)}{(n-r+1)!r!} = \binom{n}{r} - \binom{n}{r-1}, \quad (6.14)$$

约定 $\binom{n}{-1} = 0$. 例如 $f^{(3,2)} = 10 - 5 = 5$, $f^{(3,3)} = 20 - 15 = 5$. 这两项分别计算 S_5 与 S_6 的表示维数, 不能用它们说明同一个群的等维表示未必同构。

若要比同群的一个群的表示, 可取特征零域 k 上的两个 S_5 模 $S_k^{(3,2)}$ 与 $S_k^{(2,2,1)}$. 两个图形互为转置, 对应格子的钩长相同, 钩长乘积均为 24, 所以两者的维数均为 $5!/24 = 5$. 但两个分拆不同, 由命题 6.4.4, 这两个 $k[S_5]$ 模并不同构. 因此, 即使群、基域和维数都相同, 也不能只凭维数判定表示同构。

6.5.4 Frobenius 互反与诱导分支

推论 6.5.5 (诱导分支). 设 k 为特征零域, $n \geq 1$ 为整数, $\mu \vdash n-1$, S_k^μ 为 Specht 左 $k[S_{n-1}]$ -模, $S_{n-1} \leq S_n$ 为固定数字 n 的子群. 则

$$\text{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} S_k^\mu \cong \bigoplus_{\substack{\lambda \vdash n \\ \lambda \setminus \mu \text{ 为一个方格}}} S_k^\lambda,$$

各项重数都为 1。

证明. 由分类与 Maschke 定理, 诱导模可以分成 Specht 模的直和. 绝对不可约性说明每个 Specht 模的自同态环为 k , 所以 S_k^λ 的重数等于

$$\dim_k \text{Hom}_{k[S_n]} (\text{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} S_k^\mu, S_k^\lambda).$$

定理 3.2.1 把它化为 $\dim_k \text{Hom}_{k[S_{n-1}]} (S_k^\mu, \text{Res } S_k^\lambda)$. 由定理 6.5.1 和不同形状的非同构性, 这个数恰在删去 λ 的一个可移方格能得到 μ 时为 1, 否则为 0. $\square$

6.6 钩长公式与分支规则的应用

公式的用途不止是得到一个整数. 钩长乘积、标准表递推和表示的分支分解分别从图形、组合和群作用三方面描述同一维数; 交叉检查它们, 可以发现遗漏的可移格, 也能帮助我们选取便于计算的模型。

6.6.1 钩长公式的应用

考虑 $\lambda = (3, 2, 1)$. 按各格原位置排列, 钩长为

$$\begin{array}{ccc} 5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & \\ 1 & & \end{array}.$$

因此钩长乘积为 45, 对应的 S_6 -不可约表示维数为 $6!/45 = 16$. 钩长计算中, 每个格子本身只数一次; 不能把同行格数与同列格数直接相加而忘记减去重复的格子。

转置图形保持所有钩长的多重集合, 所以 $f^\lambda = f^{\lambda'}$ 。例如 $(4, 1, 1)$ 与 $(3, 1, 1, 1)$ 的维数都为 10。这一维数相等可以直接从公式读出; 它本身尚未说明两种表示之间存在何种张量关系。

6.6.2 限制、诱导与迭代分支

$(3, 2, 1)$ 有三个可移格, 故特征零下

$$\text{Res}_{S_5}^{S_6} S^{(3,2,1)} \cong S^{(2,2,1)} \oplus S^{(3,1,1)} \oplus S^{(3,2)}.$$

三项维数为 5, 6, 5, 合计 16。反过来, 从 $(3, 2)$ 添格得到

$$\text{Ind}_{S_5}^{S_6} S^{(3,2)} \cong S^{(4,2)} \oplus S^{(3,3)} \oplus S^{(3,2,1)},$$

维数为 $9 + 5 + 16 = 30 = 6 \cdot 5$, 与诱导模维数相符。

推论 6.6.1. 设 k 为特征零域, m, n 为满足 $0 \leq m \leq n$ 的整数, $\lambda \vdash n, \mu \vdash m$, S_k^λ, S_k^μ 为相应 Specht 模, $S_m \leq S_n$ 为固定 $m+1, \dots, n$ 的子群。 S_k^μ 在 $\text{Res}_{S_m}^{S_n} S_k^\lambda$ 中的重数等于从 μ 出发每次添一格到达 λ 的图形链条数。若 $[\mu] \subseteq [\lambda]$, 这个数也等于在差图 $[\lambda] \setminus [\mu]$ 中填入 $m+1, \dots, n$, 使行列均递增的表的个数; 若没有该包含关系, 重数为零。

证明. 连续应用定理 6.5.1, 每次删格所给成分重数均为 1, 所以最终重数恰为经过 μ 的删格链条数。反向读取链条, 在从大小 $a-1$ 到大小 a 新添的格子写 a 。Young 图只能向右或向下扩张, 所以每个新数字都大于它左边、上边已经填入的数字, 得到所述表。

反之, 给定这种填法, 依次保留 $[\mu]$ 及数字不超过 a 的格子。行列递增保证所得格子集向左、向上封闭, 所以它仍是 Young 图; 这恢复了原来的添格链条。两种操作互逆。 $\square$

差图称为**斜 Young 图** (skew Young diagram)。这里仅用标准填数计算迭代分支重数, 并未预先使用下一章的斜 Schur 函数理论。

6.6.3 标准表与具体维数计算

标准基还能直接给出生成元的矩阵。对 $S^{(2,1)}$, 取

$$u = e_{\frac{1}{3} 2} = v_3 - v_1, \quad v = e_{\frac{1}{2} 3} = v_2 - v_1.$$

置换 $s_1 = (12)$ 、 $s_2 = (23)$ 满足

$$s_1 u = u - v, \quad s_1 v = -v, \quad s_2 u = v, \quad s_2 v = u.$$

因此在有序基 u, v 中,

$$\rho(s_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \rho(s_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这两个整矩阵直接满足 $\rho(s_i)^2 = I$ 与 $\rho(s_1)\rho(s_2)\rho(s_1) = \rho(s_2)\rho(s_1)\rho(s_2)$ 。其迹在单位元、换位、三轮换上分别为 2, 0, -1, 与第一编的 S_3 特征标表一致。即使换到特征 3, 这些矩阵仍定义一个表示, 只是它会出现例 6.4.7 中的不变直线。

再看特征零下的 $S^{(2,2)}$ 。它有两个标准表

$$t_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad t_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

令 x, y, z 分别表示无序配对 $12|34, 13|24, 14|23$, 得到一个三点置换模。把 $(2, 2)$ -行表类的两行视为无序的两对, 给出等变映射 $M^{(2,2)} \rightarrow kx \oplus ky \oplus kz$ 。直接展开四项列反对称和可得

$$e_{t_1} \mapsto 2(x - z), \quad e_{t_2} \mapsto 2(y - z).$$

因 2 可逆, 这两个像构成坐标和为零平面的基。于是二维 Specht 模就是 S_4 在三种配对上的置换表示去掉平凡直线后的部分。这个模型还表明 Klein 四元子群在其上平凡作用。

6.6.4 低阶分拆与分支维数恒等式

S_4 的五个不可约维数按分拆次序为

$$\begin{array}{c|ccccc} \lambda & (4) & (3, 1) & (2, 2) & (2, 1, 1) & (1^4) \\ \hline f^\lambda & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 \end{array}, \quad 1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 = 24.$$

例如 $(2, 2)$ 虽有两行, 但只有第二行末格可移, 故它限制到 S_3 后仍为一个 $S^{(2,1)}$; $(3, 1)$ 有两个可移格, 限制则为 $S^{(2,1)} \oplus S^{(3)}$ 。

对 S_5 , 按

$$(5), (4, 1), (3, 2), (3, 1, 1), (2, 2, 1), (2, 1, 1, 1), (1^5)$$

排列, 维数为 $1, 4, 5, 6, 5, 4, 1$, 平方和为 120。做这种核验时, 应当先分别列出全部分拆及各自的钩长, 再求和; 如果只凭平方和反推一张维数表, 就失去了检验各个构造的作用。

本章小结

Specht 模把行方向的对称和列方向的反对称放进同一个表示。Garnir 关系按严格下降的列字完成标准化, 表类展开的三角性则保证标准列交错元线性无关。因此标准表给出一组整系数基, 改变系数环时不需要重新寻找基。

在特征零下, 表类配对限制到 Specht 模仍非退化, 子模定理遂给出不可约性; 支配序排除不同分拆间的同构, 最后用共轭类数完成分类。限制到 S_{n-1} 时, 最大数字所在的可移格组织出一个滤过, 完全可约性把它分裂成删格直和。钩长公式从标准表递推得到, 是计算维数的结果, 而不是前面分类证明的假设。

习题

习题 6.1. 设 $\lambda = (4, 2, 1)$ 。求共轭分拆、全部可移方格、行群与列群的阶, 以及 M_k^λ 的维数。

解. 共轭分拆为 $(3, 2, 1, 1)$, 可移方格是 $(1, 4), (2, 2), (3, 1)$. 行群阶为 $4!2!1! = 48$, 列群阶为 $3!2!1!1! = 12$. 行等价类与行群左陪集一一对应, 所以维数为 $7!/48 = 105$. 这些数均来自集合基, 与域的特征无关. $\square$

习题 6.2. 在 S_8 中, 求轮换类型为 $(3, 2, 2, 1)$ 的共轭类大小. 求这个类型的置换的阶与符号.

解. 中心化子阶为 $3 \cdot 2^2 \cdot 2! = 24$, 故类大小为 $8!/24 = 1680$. 不交轮换之积的阶为长度的最小公倍数, 因而为 6. 三轮换为偶置换, 两个二轮换的符号相乘也为正, 所以总体符号为 1. $\square$

习题 6.3. 在形状 $(2, 1)$ 中, 取 $t = \frac{1}{3} \begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 与 $u = \frac{2}{3} \begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}$. 证明它们的行表类相同, 而在任意非零交换环上, 对应列交错元不同.

解. 二者第一行都是集合 $\{1, 2\}$, 第二行都是 $\{3\}$, 所以表类相同. 用第二行数字标记基向量, 有 $e_t = v_3 - v_1$, $e_u = v_3 - v_2$, 差为 $v_2 - v_1$. 这是两个不同自由基向量之差, 在非零环上不为零. 因此列反对称化所需的资料超过行等价类本身. $\square$

习题 6.4. 设 R 为交换含么环, $n \geq 3$. 证明 $S_R^{(n-1, 1)}$ 等于 n 点置换模中的坐标和为零子模, 并写出一组自由基.

解. 用 v_i 标记第二行只含 i 的行表类. 每个表只有第一列含两格, 若其中上、下数字分别为 j, i , 则 $e_t = v_i - v_j$. 因此 Specht 模由全部差向量生成, 包含于坐标和为零子模. 反过来, 若 $\sum_i a_i = 0$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = \sum_{i=1}^{n-1} a_i (v_i - v_n).$$

这些 $n-1$ 个差向量独立, 因为各个 v_i 的系数直接读出 a_i . 故它们给出所求基. $\square$

习题 6.5. 把形状 $(3, 1)$ 的表 $t = \frac{2}{4} \begin{smallmatrix} 1 & 3 \\ 2 \end{smallmatrix}$ 对应的 e_t 用标准列交错元表示, 并指出一次 Garnir 重写中用到的数字集合.

解. 取 $A = \{2, 4\}$, $B = \{1\}$, 代表元为 $1, (12), (14)$, 故 $e_t = e_{(12)t} + e_{(14)t}$. 第一项的表为 $\frac{1}{4} \begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 \end{smallmatrix}$. 第二项的第一列为上 2、下 1, 排序后变为 $\frac{1}{2} \begin{smallmatrix} 4 & 3 \\ 1 \end{smallmatrix}$, 同时出现负号. 再交换只含一格的第二、第三列中的数字, 不改变第一列及表类, 所以该列交错元等于 $e_{\frac{1}{2} \begin{smallmatrix} 3 & 4 \\ 2 \end{smallmatrix}}$. 因此

$$e_t = e_{\frac{1}{4} \begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 \end{smallmatrix}} - e_{\frac{1}{2} \begin{smallmatrix} 3 & 4 \\ 2 \end{smallmatrix}}.$$

也可用第二行数字基核验为 $v_4 - v_2 = (v_4 - v_1) - (v_2 - v_1)$. $\square$

习题 6.6. 将形状 $(2, 2)$ 的两个标准列交错元展开为表类基, 并从展开式直接证明它们在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上仍独立.

解. 用 $\{ab|cd\}$ 记录两行数字集合. 对 $t_1 = \frac{1}{3} \begin{smallmatrix} 2 \\ 4 \end{smallmatrix}$, $t_2 = \frac{1}{2} \begin{smallmatrix} 3 \\ 4 \end{smallmatrix}$, 有

$$\begin{aligned} e_{t_1} &= \{12|34\} - \{23|14\} - \{14|23\} + \{34|12\}, \\ e_{t_2} &= \{13|24\} - \{23|14\} - \{14|23\} + \{24|13\}. \end{aligned}$$

第一式在 $\{12|34\}$ 处的系数为 1, 第二式在该处为 0; 在 $\{13|24\}$ 处情形相反。因此任何关系 $ae_{t_1} + be_{t_2} = 0$ 都迫使 $a = b = 0$, 即使系数环有零因子也一样。 $\square$

习题 6.7. 证明任意 S_n 元素在整系数标准基上的矩阵属于 $GL_{f^\lambda}(\mathbb{Z})$ 。由此证明特征零 Specht 模的特征标取整数值。

解. 群元素把 e_t 送到 e_{gt} , Garnir 标准化只用整数系数, 所以作用矩阵的条目为整数。逆置换也有整矩阵, 两个矩阵乘积为单位阵, 故原矩阵在整数环上可逆, 其行列式为 1 或 -1 。特征标是该整矩阵的迹, 因此为整数; 把矩阵送到任意特征零域不会改变这个整数来源。 $\square$

习题 6.8. 取形状 $(2, 1)$ 的任意表 t 。证明 Young 对称化子在整数群代数中满足 $c_t^2 = 3c_t$, 但在 $\mathbb{F}_3[S_3]$ 中是非零的平方零元。这与标准基定理是否矛盾?

解. 特征零下, 标准表数为 2, 故命题 6.4.6 给出 $c_t^2 = (3!/2)c_t = 3c_t$ 。两边都是整系数群代数元素, 等式在 $\mathbb{Q}[S_3]$ 成立即说明每个整数系数都相同, 故也在 $\mathbb{Z}[S_3]$ 成立。约化模 3 后平方为零, 但单位元的系数仍为 1, 所以元素非零。标准基定理只断言 Specht 模自由及其基的形式, 并未断言对称化子在任意特征都可归一化成幂等元, 故无矛盾。 $\square$

习题 6.9. 在特征零域上, 证明

$$\text{Hom}_{S_6}(S^{(4,1,1)}, M^{(3,3)}) = 0,$$

$$\text{Hom}_{S_6}(S^{(3,3)}, M^{(4,1,1)}) = 0.$$

再说明支配条件成立时, 为何不能仅凭本章的条件就宣称相应 Hom 必非零。

解. $(4, 1, 1)$ 的前两项和为 $5 < 6$, 所以它不支配 $(3, 3)$; $(3, 3)$ 的第一项 $3 < 4$, 所以也不支配 $(4, 1, 1)$ 。两项消失均由命题 6.4.4 的逆否命题得到。该命题对不同形状只证明了非零 Hom 的必要条件, 没有证明充分性; 把必要条件倒过来使用还需要另一个证明。 $\square$

习题 6.10. 设 k 为域, $n \geq 3$, 且 $n \neq 0$ 于 k 。证明 n 点置换模分解为平凡直线与 $S_k^{(n-1,1)}$ 的直和。若 $\text{char } k \mid n$, 说明这个特定平凡直线为什么不能作为补空间。

解. 令 $\mathbf{v} = v_1 + \cdots + v_n$ 。向量 $w = \sum_i a_i v_i$ 唯一分解为

$$w = \frac{\sum_i a_i}{n} \mathbf{v} + \left(w - \frac{\sum_i a_i}{n} \mathbf{v} \right).$$

第二项的坐标和为零, 第一项属于固定直线。二者交为零, 因为 $c\mathbf{v}$ 的坐标和为 nc 。当特征整除 n 时, $\mathbf{v}$ 本身坐标和为零, 固定直线反而包含在 Specht 模中, 所以不能成为它的补空间。 $\square$

习题 6.11. 设 k 为域, $n \geq 3$ 。在 $S_k^{(n-1,1)}$ 的基 $v_1 - v_n, \dots, v_{n-1} - v_n$ 中计算表类配对的 Gram 行列式。证明特征不整除 n 时这个 Specht 模不可约, 特征整除 n 时可约。

解. 对角项为 2, 非对角项为 1, 所以矩阵为 $I_{n-1} + J_{n-1}$, 其中 J 各项均为 1. 在整数上, 其特征值为 n 一次、1 共 $n-2$ 次, 故行列式为 n ; 这个整数多项式恒等式可约化到任意域. 若 $n \neq 0$, 配对非退化, 子模定理与正文的论证同样给出不可约性, 并不需要特征零. 若 $n = 0$, 上题的非零平凡直线包含在该模中; 因模维数 $n-1 \geq 2$, 它是真子模, 故可约. $\square$

习题 6.12. 计算 $S_{\mathbb{Z}}^{(2,2)}$ 在两个标准列交错元基下的 Gram 矩阵. 求出在哪些素数特征下此配对退化, 并求特征 3 时的根.

解. 每个标准向量有四项系数为 ± 1 , 故各自的平方范数为 4. 两者共有的两项系数均为 -1 , 所以配对为 2. Gram 矩阵与行列式为

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad 12.$$

故且仅在特征 2 或 3 退化. 特征 3 下矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 根由 $e_{t_1} + e_{t_2}$ 生成. 特征 2 时矩阵为零; 配对退化本身不能反向推出所有相应 Specht 模必可约. $\square$

习题 6.13. 设 k 为特征零域. 证明每个 S_k^λ 同构于其对偶, 并推出 $\chi^\lambda(g) = \chi^\lambda(g^{-1})$.

解. 映射 $v \mapsto B(v, -)$ 从 S_k^λ 到其线性对偶, 由非退化性为同构. 对偶作用定义为 $(g\varphi)(w) = \varphi(g^{-1}w)$, 而不变性给出 $B(gv, w) = B(v, g^{-1}w)$, 所以映射等变. 对偶矩阵为原来逆矩阵的转置, 其迹等于 $\chi^\lambda(g^{-1})$; 同构表示特征标相等, 得到结论. $\square$

习题 6.14. 设 k 为特征零域. 写出 $k[S_4]$ 的矩阵代数分解, 并求其中心维数及交换子所生成的线性子空间的维数.

解. 维数列表给出

$$k[S_4] \cong k \times M_3(k) \times M_2(k) \times M_3(k) \times k.$$

各矩阵块中心均为标量, 故中心维数为 5. $M_d(k)$ 中交换子都迹为零; 反过来, $E_{ij} = [E_{ii}, E_{ij}]$ 对 $i \neq j$ 成立, $E_{ii} - E_{jj} = [E_{ij}, E_{ji}]$, 这些矩阵生成全部迹零子空间. 因此交换子线性生成空间的维数为 $0 + 8 + 3 + 8 + 0 = 19$. $\square$

习题 6.15. 在特征零域上分解 $\text{Res}_{S_5}^{S_6} S^{(4,2)}$, 并独立核验两边维数.

解. 可移格为第一行末格与第二行末格, 故限制为 $S^{(3,2)} \oplus S^{(4,1)}$. 两行公式给出 $f^{(4,2)} = \binom{6}{2} - \binom{6}{1} = 9$, 而 $f^{(3,2)} = 5$ 、 $f^{(4,1)} = 4$, 所以 $9 = 5 + 4$. $\square$

习题 6.16. 在特征零域上分解 $\text{Ind}_{S_4}^{S_5} S^{(2,1,1)}$, 并核验其维数.

解. 可以添格的位置分别产生 $(3, 1, 1)$ 、 $(2, 2, 1)$ 和 $(2, 1, 1, 1)$; 不能在第三行末添格而不同时增长第二行. 诱导分支给出这三个 Specht 模各一次. 其维数分别为 6, 5, 4, 和为 15; 原模是维数 $\binom{3}{2} = 3$ 的钩形表示, 诱导指数为 5, 故总维数同样为 15. $\square$

习题 6.17. 在特征 2 的域上, 把 $S^{(2,1)}$ 限制到固定数字 3 的 S_2 . 证明分支滤过的两个商均为平凡一维表示, 但该限制不是两个平凡表示的直和.

解. 在正文的有序基 $u = v_3 - v_1, v = v_2 - v_1$ 中, 生成元 (12) 的矩阵约化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 子空间 kv 固定, 商空间也固定; 它正是最高可移行给出的滤过层, 符号表示在特征 2 等于平凡表示. 但是生成元并非单位算子, 两个平凡表示的直和中每个群元素都必须为单位算子, 因此分裂不成立. $\square$

习题 6.18. 计算 $f^{(3,3,3)}$, 并说明为什么 $f^{(3,3,3)} = f^{(3,3,2)}$. 后一个等式是否说明两个不同阶对称群上的表示同构?

解. 九个钩长按行是 $(5, 4, 3), (4, 3, 2), (3, 2, 1)$, 乘积为 8640, 所以 $f^{(3,3,3)} = 9!/8640 = 42$. 矩形只有右下角一格可移, 故标准表递推或限制分支给出 $f^{(3,3,2)} = 42$. 两个模原本分别属于 S_9 与 S_8 的表示范畴; 正确结论是前者限制到 S_8 后同构于后者, 不能省去限制操作. $\square$

习题 6.19. 用钩长公式求 $f^{(4,2,1)}$, 再逐个计算其删格分支的维数, 核验递推.

解. 钩长按行是 $(6, 4, 2, 1), (3, 1), (1)$, 乘积为 144, 所以维数为 $7!/144 = 35$. 三个删格形状为 $(3, 2, 1), (4, 1, 1), (4, 2)$, 维数分别为 16, $\binom{5}{2} = 10, 9$, 因此 $35 = 16 + 10 + 9$. 钩形 $(4, 1, 1)$ 的总大小为 6, 代入公式时应使用它自身的总大小. $\square$

习题 6.20. 在特征零域上, 把 $S^{(3,2,1)}$ 从 S_6 限制到 S_4 , 求所有不可约重数.

解. 第一步产生 $(2, 2, 1), (3, 1, 1), (3, 2)$. 第二步中, $(2, 2, 1)$ 给出 $(2, 1, 1)$ 与 $(2, 2)$, $(3, 1, 1)$ 给出 $(2, 1, 1)$ 与 $(3, 1)$, $(3, 2)$ 给出 $(2, 2)$ 与 $(3, 1)$. 因此

$$\text{Res}_{S_4}^{S_6} S^{(3,2,1)} \cong (S^{(3,1)})^{\oplus 2} \oplus (S^{(2,2)})^{\oplus 2} \oplus (S^{(2,1,1)})^{\oplus 2}.$$

维数为 $2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 16$. 一步限制无重数, 不意味着多步限制也无重数. $\square$

习题 6.21. 设 k 为特征零域, $n \geq 2$. 不使用钩长公式, 证明 S_n 只有平凡表示和符号表示两个一维表示, 并说明哪些 Specht 模为一维.

解. 一维表示取值于交换群 $k^\times$, 所以共轭的换位有相同的像 a . 换位平方为单位, 故 $a^2 = 1$, 在特征零域中只能 $a = 1$ 或 $a = -1$. 换位生成 S_n , 所以表示由该值唯一决定, 分别为平凡或符号表示. 这两个表示在一个换位上的取值不同, 故不同构. 已经构造出的 $S^{(n)}$ 与 $S^{(1^n)}$ 分别给出它们; 分类的非同构性排除其他一维 Specht 模. $\square$

习题 6.22. 用三种无序配对的置换模型, 计算 S_4 的 $S^{(2,2)}$ 特征标在下列轮换类型上的值:

$$1^4, \quad (2, 1, 1), \quad (2, 2), \quad (3, 1), \quad (4).$$

解. 配对置换模分成平凡直线与二维坐标和为零空间, 所以目标特征标等于固定配对数减 1. 单位元固定三个配对; 换位 (12) 只固定 12|34; 双换位 (12)(34) 固定三个; 三轮换循环排列三种配对而没有固定点; 四轮换 (1234) 只固定 13|24. 因此所求值依次为

$$2, \quad 0, \quad 2, \quad -1, \quad 0.$$

$\square$

习题 6.23. 设 k 为特征 2 的域. 证明 $S_k^{(2,1)}$ 仍绝对不可约, 并与特征 3 的情形比较.

解. 整数 Gram 行列式为 3, 在特征 2 中为 1, 故配对非退化。子模定理适用于任意域, 因此该二维模不可约; 任意扩域后行列式仍为 1, 所以绝对不可约。特征 3 时行列式为零, 并出现由 $v_1 + v_2 + v_3$ 生成的非零真子模。因此“特征整除群阶”只说明不能统一使用 Maschke 定理, 并不说明每一个具体 Specht 模都必不可约。□

习题 6.24. 设 $\mu \vdash n-1$ 。证明纯组合恒等式

$$\sum_{\lambda: \lambda \setminus \mu \text{ 为一格}} f^\lambda = n f^\mu.$$

说明为什么只用删格递推的形式, 不能不加论证地把这个式子看作同一个递推。

解. 在复数域上, 诱导模 $\text{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} S^\mu$ 的维数等于指数 n 乘 f^μ 。由诱导分支, 它是式中各个 S^λ 各一次的直和, 比较维数得到等式。各个维数已经等于标准表数, 所以这是关于整数的组合恒等式。删格递推固定大图形、对其所有小图形求和; 本式固定小图形、对所有大图形求和, 求和方向不同。Frobenius 互反性正是本章把两个方向联系起来的额外论证。□

第七章 对称函数与 Schur–Weyl 对偶

本章以对称函数、Schur 函数与 Frobenius 特征映射连接对称群表示和多项式计算，再由张量幂上的交换作用建立 Schur–Weyl 对偶及其分解公式。

本章目标

- 在初等、完全、幂和与 Schur 基之间作计算，区分稳定对称函数与固定变量数的多项式。
- 证明特征映射的等距性及诱导乘法公式，并据此读取 Specht 特征标。
- 用极化计算张量幂中心化子，理解双中心化子结论所需的半单性。
- 按分拆行数判断 Schur 函子是否为零，并用 Pieri 规则计算张量积。

在特征不为 2 的域上，向量空间 V 的张量平方可用交换因子的算子 $u \otimes v \mapsto v \otimes u$ 分成对称与交错两部分。对称函数中也有 $s_{(1)}^2 = s_{(2)} + s_{(1,1)}$ 这样的分解。两边的下标同是分拆，等式是否只是记号上的巧合？如果让对称群置换张量因子，同时让一般线性群作用在每个因子上，这两个作用彼此交换。由此可以尝试把对称群的特征标、Schur 函数以及线性群的表示放在同一张计算图中。

本章使用上一章已证的 Specht 分类及 Young 置换模的支配三角性，也使用第一编的特征标正交关系与诱导表示。对称函数先在有理系数上讨论，再按需要复化；Schur–Weyl 对偶及 Schur 函子则在任意特征零域上成立。

有限群与有限维线性代数的计算最终给出一般线性群的一族不可约表示；更一般的分类在后文讨论。特征标公式、双中心化子及 Schur 多项式的联系可对照 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[4, Sections 5.14–5.15, pp. 114–118, Sections 5.18–5.19, pp. 119–122, Sections 5.21–5.22, pp. 128–130]。

7.1 对称函数

一个置换的共轭类由各长度的轮换数决定，对称多项式的基也常以分拆编号。要联系这两种参数，须先定义与变量个数变化相容的运算。本节中的无穷多个变量只是一种逐次稳定的记法，不涉及无穷级数的解析收敛。

7.1.1 初等、完全与幂和对称函数

定义 7.1.1. 设 $n \geq 0$ 为整数。对每个整数 $N \geq 0$ 给定一个 N 元、 n 次齐次有理系数对称多项式 f_N 。若对所有 $N \geq 0$ 有

$$f_{N+1}(x_1, \dots, x_N, 0) = f_N(x_1, \dots, x_N).$$

则称相容族 $(f_N)_{N \geq 0}$ 为 n 次**对称函数** (symmetric function)。这些相容族构成有理向量空间 $\Lambda_{\mathbb{Q}}^n$ 。令

$$\Lambda_{\mathbb{Q}} = \bigoplus_{n \geq 0} \Lambda_{\mathbb{Q}}^n.$$

逐个变量数相乘给出这个空间上的分次代数结构。将系数扩充为复数, 记为 $\Lambda_{\mathbb{C}}$ 。

对分拆 $\lambda \vdash n$, 令 $m_{\lambda}(x_1, \dots, x_N)$ 为指数多重集等于 λ (补零) 的不同单项式之和; 若 $\ell(\lambda) > N$, 规定它为零。对称多项式在同一变量置换轨道上的单项式系数相同, 所以 m_{λ} 构成 $\Lambda_{\mathbb{Q}}^n$ 的一组基。特别地, 固定次数 n 后, 取 $N \geq n$ 已能检测任意恒等式; 无须同时处理无限多个非零项。

定义 7.1.2. 在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中, 对整数 $r \geq 1$, 由每个有限变量数 N 下的多项式

$$e_r = \sum_{i_1 < \dots < i_r} x_{i_1} \cdots x_{i_r}, \quad h_r = \sum_{i_1 \leq \dots \leq i_r} x_{i_1} \cdots x_{i_r}, \quad p_r = \sum_i x_i^r$$

组成的相容族, 依次称为**初等对称函数** (elementary symmetric function)、**完全对称函数** (complete symmetric function) 和**幂和对称函数** (power-sum symmetric function); 各求和指标均在 $\{1, \dots, N\}$ 中取值。规定 $e_0 = h_0 = 1$, 而 $e_r = h_r = 0$ 对 $r < 0$ 成立。对分拆 λ , 用 $e_{\lambda}, h_{\lambda}, p_{\lambda}$ 分别表示按其各部分相乘。

例如 $h_2 = m_{(2)} + m_{(1,1)}$, $e_2 = m_{(1,1)}$, $p_2 = m_{(2)}$ 。完全对称函数允许指标重复, 初等对称函数不允许; 这个差别后来对应对称幂与外幂。

命题 7.1.3. 设 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 为有理系数对称函数代数, e_r, h_r, p_r 分别为初等、完全、幂和对称函数, t 为形式变量。在 $\Lambda_{\mathbb{Q}}[[t]]$ 中有

$$E(t) := \sum_{r \geq 0} e_r t^r = \prod_i (1 + x_i t), \quad H(t) := \sum_{r \geq 0} h_r t^r = \prod_i (1 - x_i t)^{-1}, \quad (7.1)$$

$$E(-t)H(t) = 1, \quad H(t) = \exp \left(\sum_{r \geq 1} \frac{p_r}{r} t^r \right). \quad (7.2)$$

乘积按每个有限变量数下的相容多项式族理解。对每个非负整数 n , 三族 $e_{\lambda}, h_{\lambda}, p_{\lambda}$, 其中 $\lambda \vdash n$, 分别为 $\Lambda_{\mathbb{Q}}^n$ 的基。

证明. 在有限变量中展开每个因子即可得到前两式; 乘积相消得到第三式。对 H 取形式对数, 用 $-\log(1-z) = \sum_{r \geq 1} z^r/r$ 得最后一式。每个系数只需有限次运算, 故这些形式恒等式也在稳定族中成立。

先说明 e_{λ} 的基性质。在 N 个变量中取字典序 $x_1 > \dots > x_N$ 。任意非零对称多项式的首项指数可写成 $a_1 \geq \dots \geq a_N \geq 0$ 。乘积

$$e_1^{a_1 - a_2} e_2^{a_2 - a_3} \cdots e_N^{a_N}$$

的首项恰为 $x_1^{a_1} \cdots x_N^{a_N}$, 系数为一。依次减去相应倍数, 首项严格下降; 固定总次数只有有限个单项式, 故过程终止, 得到生成性。不同的上述乘积有不同首项, 故线性无关。取 $N \geq n$, 得到稳定的次数 n 结论。

由 $E(-t)H(t) = 1$, $h_r = (-1)^{r-1}e_r$ 加上只含 $e_1, \dots, e_{r-1}$ 的多项式; 这是可逆三角变换。因此 h_r 也自由生成。对最后一式求导并乘以 t , 得到

$$rh_r = \sum_{i=1}^r p_i h_{r-i}. \quad (7.3)$$

其中 $p_r = rh_r$ 加上较低指标的多项式; 由于系数域为 $\mathbb{Q}$, 还可反向除以 r 。所以 p_r 同样自由生成, 三族的次数 n 单项式均为基。□

有理系数在幂和基的结论中不可省略。例如 $h_2 = (p_1^2 + p_2)/2$, 一般不能把完全对称函数写成幂和的整系数多项式。

7.1.2 Schur 函数及行列式公式

令 $\delta_N = (N-1, N-2, \dots, 0)$ 。对严格递减的非负整数列 α , 记

$$a_\alpha(x) = \det(x_i^{\alpha_j})_{1 \leq i, j \leq N}, \quad \Delta_N(x) = a_{\delta_N}(x) = \prod_{i < j} (x_i - x_j).$$

交错多项式在 $x_i = x_j$ 时为零, 因而被每个 $x_i - x_j$ 整除。这些一次因子两两互素, 所以被它们的乘积整除。

定义 7.1.4. 设 λ 为分拆, $\ell(\lambda)$ 为其长度, $N \geq \ell(\lambda)$ 为整数, 并把 λ 补零到 N 项。在 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_N]$ 中, 对称多项式

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_N) = \frac{\det(x_i^{\lambda_j + N - j})_{1 \leq i, j \leq N}}{\prod_{1 \leq i < j \leq N} (x_i - x_j)}$$

称为相应的 **Schur 多项式** (Schur polynomial)。当 $N < \ell(\lambda)$ 时规定其为零。它们形成的相容族称为 **Schur 函数** (Schur function), 仍记 s_λ 。

分子交错, 所以上述商确为多项式; 交换两个变量时分子、分母同时变号, 故商对称。若最后一个变量为零且 $\lambda_N = 0$, 展开分子、分母的最后一行, 剩余行列式各提出 $\prod_{i < N} x_i$, 恰得到 $N-1$ 元版本。若 $\lambda_N > 0$, 分子被 $\prod_i x_i^{\lambda_N}$ 整除, 商也如此, 代入 $x_N = 0$ 为零。这就证明了定义中的相容性。

引理 7.1.5 (Cauchy 恒等式). 设 $x = (x_i)$ 、 $y = (y_j)$ 为两组独立形式变量, s_λ 为有理系数 Schur 函数, p_μ 为幂和对称函数的分拆乘积。按每个有限变量数下的形式幂级数、逐次理解无穷和, 有

$$\prod_{i,j} (1 - x_i y_j)^{-1} = \sum_{\lambda} s_{\lambda}(x) s_{\lambda}(y) = \sum_{\mu} \frac{p_{\mu}(x) p_{\mu}(y)}{z_{\mu}}, \quad (7.4)$$

$$z_{\mu} = \prod_{r \geq 1} r^{m_r(\mu)} \cdot m_r(\mu)!.$$

两和均遍历全部分拆; 这里 $m_r(\mu)$ 为分拆 μ 中部分 r 的重数。

证明. 先取两组各 N 个变量. Cauchy 行列式恒等式¹为

$$\det \left(\frac{1}{1 - x_i y_j} \right)_{i,j=1}^N = \frac{\Delta_N(x) \Delta_N(y)}{\prod_{i,j} (1 - x_i y_j)}.$$

确实, 通分后的分子分别对两组变量交错; 其关于每个 x_i 、每个 y_j 的次数至多 $N-1$ 。除去两组 Vandermonde 因子后只能剩常数。该常数为 1: 在每个条目中展开 $\sum_{a \geq 0} x_i^a y_j^a$, 行列式最低的非零总次数来自互异指数 $0, \dots, N-1$, 其贡献就是 $\Delta_N(x) \Delta_N(y)$ 。

再对这个级数行列式使用行列式的多线性展开。重复指数的项为零, 互异指数按递减顺序排列后得到

$$\det \left(\sum_{a \geq 0} x_i^a y_j^a \right)_{i,j=1}^N = \sum_{\alpha_1 > \dots > \alpha_N \geq 0} a_{\alpha}(x) a_{\alpha}(y).$$

每个 α 唯一写为 $\lambda + \delta_N$ 。除去 Vandermonde 因子, 得到第一条展开。不同变量数可先补变量, 再令多余变量为零。

另一方面, 对乘积取形式对数, 得 $\sum_{r \geq 1} p_r(x) p_r(y)/r$ 。指数化后, 第 r 项选取 m_r 次的系数为 $1/(r^{m_r} m_r!)$ 。逐个 r 相乘, 得到最后一条展开。□

下面的 Jacobi–Trudi 公式²把 Schur 函数写成完全对称函数的行列式, 并由此证明其基性质。

定理 7.1.6 (Jacobi–Trudi 公式). 设 λ 为分拆, $N \geq \ell(\lambda)$ 为整数, 把 λ 补零至 N 项, s_{λ} 为 Schur 函数, h_r 为完全对称函数。在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中有

$$s_{\lambda} = \det(h_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i, j \leq N}. \quad (7.5)$$

其中 $h_0 = 1$, 负指标的 h_r 为零。对每个非负整数 n , $s_{\lambda} (\lambda \vdash n)$ 构成 $\Lambda_{\mathbb{Q}}^n$ 的基。

证明. 将(7.4)乘以 $\Delta_N(y)$, 并取 $y_1^{\lambda_1 + N - 1} \dots y_N^{\lambda_N}$ 的系数。右端中 $a_{\mu + \delta_N}(y)$ 只有在 $\mu = \lambda$ 时贡献一, 因为其指数列严格递减; 所得系数是 $s_{\lambda}(x)$ 。左端可写成

$$\det(y_i^{N-j})_{i,j=1}^N \prod_{i=1}^N \left(\sum_{r \geq 0} h_r(x) y_i^r \right).$$

展开行列式后, 该系数恰为 $\sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod_i h_{\lambda_i - i + \sigma(i)}(x)$, 即所需行列式。对任意有限变量数均成立, 故得到稳定恒等式。

最后, 在 $N \geq n$ 个变量中, 乘以 Δ_N 将 n 次对称多项式一一对应到次数 $n + N(N-1)/2$ 的交错多项式。后者按单项式的变量置换轨道分组, 每个非零轨道恰由一个严格递减指数列代表, 因此以 $a_{\lambda + \delta_N}$ 为基。除以 Δ_N , 得到 s_{λ} 的基性质。□

¹柯西 (Augustin-Louis Cauchy, 1789-1857), 法国数学家, 在分析、复函数论和代数方面作出奠基性贡献。

²雅可比 (Carl Gustav Jacob Jacobi, 1804-1851), 德国数学家, 研究椭圆函数与行列式; 特鲁迪 (Nicola Trudi, 1811-1884), 意大利数学家, 研究行列式与分析。

例如

$$s_{(r)} = h_r, \quad s_{(2,1)} = h_2 h_1 - h_3, \quad s_{(2,2)} = h_2^2 - h_1 h_3.$$

又 $s_{(1^r)} = e_r$: 从(7.5)沿首行展开, 所得行列式 D_r 满足

$$D_r = h_1 D_{r-1} - h_2 D_{r-2} + \cdots + (-1)^{r-1} h_r, \quad D_0 = 1.$$

这正是 $E(-t)H(t) = 1$ 对 e_r 给出的递推及初值。所以单行和单列分别给出前面两种对称函数。

7.1.3 次数分次与内积

定义 7.1.7. 设 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 为有理系数对称函数代数, p_{λ} 为幂和基, $m_r(\lambda)$ 为分拆 λ 中部分 r 的重数, $z_{\lambda} = \prod_{r \geq 1} r^{m_r(\lambda)} \cdot m_r(\lambda)!$ 。在 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 上, 以

$$\langle p_{\lambda}, p_{\mu} \rangle = \delta_{\lambda\mu} z_{\lambda}$$

确定一个对称双线性配对, 称为 **Hall 配对** (Hall pairing)。³在 $\Lambda_{\mathbb{C}}$ 上, 沿同一正交基改用第一变量共轭线性、第二变量线性的正定内积, 称为相应的 Hall 内积。不同次数的齐次分量相互正交。

本章涉及复特征标时始终使用后一种内积; 有理系数上的计算在两种约定下相同。比如 $\langle h_2, h_2 \rangle = 1$, 而 $\langle p_1^2, p_1^2 \rangle = 2$ 。幂和基便于读取循环型, Schur 基则会对应不可约表示。

命题 7.1.8. 在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 上, 对任意分拆 λ, μ 对应的 Schur 函数 s_{λ}, s_{μ} , Hall 配对满足

$$\langle s_{\lambda}, s_{\mu} \rangle = \delta_{\lambda\mu}.$$

复化后, Schur 函数同样构成各齐次分量的一组标准正交基。

证明. 固定次数 n 。以 p_{λ} 为基时, 配对矩阵为对角矩阵 $D = \text{diag}(z_{\lambda})$; 因而张量 $\sum_{\lambda} p_{\lambda} \otimes p_{\lambda}/z_{\lambda}$ 的系数矩阵是逆矩阵 D^{-1} 。一般地, 若一个非退化配对在基 v_i 下的矩阵为 G , 同一张量就写成 $\sum_{i,j} (G^{-1})_{ij} v_i \otimes v_j$: 这是换基矩阵两次相乘的直接结果。

引理 7.1.5 证明这个张量在 Schur 基下为 $\sum_{\lambda} s_{\lambda} \otimes s_{\lambda}$ 。其系数矩阵是单位矩阵, 所以配对矩阵也是单位矩阵。所有换基系数为有理数, 复化并在第一变量取共轭后结论不变。 $\square$

7.2 Frobenius 特征映射

幂和函数适合记录轮换长度: 一个 r 轮换对应一个 p_r , 互不相交的轮换对应乘积。然而同一循环型的共轭类大小不同, 直接把特征标值作为系数会破坏内积。中心化子阶 z_{μ} 正好给出所需的归一化。

³菲利普·霍尔 (Philip Hall, 1904-1982), 英国数学家, 研究群论与对称函数。

7.2.1 对称群表示环与对称函数

定义 7.2.1. 设 n 为非负整数, f 为 S_n 上的复类函数, $f(\mu)$ 表示它在循环型 $\mu \vdash n$ 上的值, z_μ 为该循环型的中心化子阶, $p_\mu \in \Lambda_{\mathbb{C}}^n$ 为幂和对称函数的分拆乘积。定义

$$\text{ch}_n(f) = \sum_{\mu \vdash n} \frac{f(\mu)}{z_\mu} p_\mu.$$

从复类函数空间 $\text{CF}(S_n)$ 到复对称函数的 n 次齐次分量 $\Lambda_{\mathbb{C}}^n$ 的这个线性映射称为 **Frobenius 特征映射** (Frobenius characteristic map)。对有限维复 S_n -表示 U , 也记 $\text{ch}(U) = \text{ch}_n(\chi_U)$ 。

这里的 z_μ 与引理 7.1.5 一致。事实上, 与一个循环型为 μ 的置换交换的置换, 可以交换等长轮换, 再在每个轮换内部独立转动。因此其中心化子阶为 $\prod_r r^{m_r(\mu)} \cdot m_r(\mu)!$, 共轭类大小为 $n!/z_\mu$ 。

命题 7.2.2. 对任意非负整数 n , Frobenius 特征映射 $\text{ch}_n : \text{CF}(S_n) \rightarrow \Lambda_{\mathbb{C}}^n$ 是复向量空间同构。对任意复类函数 $f, g \in \text{CF}(S_n)$, 以第一变量共轭线性的 Hall 内积配对它们的像, 有

$$\langle \text{ch}_n(f), \text{ch}_n(g) \rangle = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \overline{f(\sigma)} g(\sigma) = \sum_{\mu \vdash n} \frac{\overline{f(\mu)} g(\mu)}{z_\mu}.$$

这里 $f(\mu), g(\mu)$ 为循环型 μ 上的值, z_μ 为相应中心化子阶。并且平凡表示与符号表示的像分别为完全对称函数 h_n 、初等对称函数 e_n 。

证明. 各循环型的示性函数构成类函数基, 像是非零倍数的 p_μ , 所以映射为同构。Hall 内积对幂和基的对角公式立即给出所写等式; 共轭类大小解释了两种求和形式。

平凡表示的像为 $\sum_{\mu \vdash n} p_\mu / z_\mu$ 。把所有 n 汇总, 其生成函数为

$$\prod_{r \geq 1} \left(\sum_{a \geq 0} \frac{p_r^a t^{ra}}{r^a a!} \right) = \exp \left(\sum_{r \geq 1} \frac{p_r t^r}{r} \right) = H(t).$$

符号在循环型 μ 上的值为 $\prod_r (-1)^{(r-1)m_r(\mu)}$ 。相应地把上式中 p_r 换成 $(-1)^{r-1} p_r$, 得到 $E(t)$, 所以次数 n 项为 e_n 。□

普通表示环 $R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 的乘法来自同一个群上的张量积。本节还需要另一种乘法, 它会改变对称群的次数; 这两种运算不能混用。

7.2.2 诱导乘积与对称函数乘法

定义 7.2.3. 设 $R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 为对称群 S_n 的复表示环, $\mathcal{R} = \bigoplus_{n \geq 0} R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 。给定非负整数 a, b 、有限维复 S_a -表示 U 和 S_b -表示 W , 记 $[U], [W]$ 为其在表示环中的类, $U \boxtimes W$ 为 $S_a \times S_b$ 在 $U \otimes_{\mathbb{C}} W$ 上按各因子分别作用的表示。把 $S_a \times S_b$ 按前 a 个与后 b 个字母的置换嵌入 S_{a+b} , 定义

$$[U] * [W] = [\text{Ind}_{S_a \times S_b}^{S_{a+b}}(U \boxtimes W)],$$

并对虚表示双线性延拓。这称为**诱导乘积** (induction product)。次数零的平凡表示是单位。

命题 7.2.4. 设 a, b 为非负整数, f, g 分别为 S_a, S_b 的复类函数, $(f \boxtimes g)(\sigma, \tau) = f(\sigma)g(\tau)$, $S_a \times S_b \leq S_{a+b}$ 按两个连续字母块嵌入。对 Frobenius 特征映射, 有

$$\text{ch}_{a+b}(\text{Ind}_{S_a \times S_b}^{S_{a+b}}(f \boxtimes g)) = \text{ch}_a(f) \text{ch}_b(g).$$

因而诱导乘积使 $\mathcal{R} = \bigoplus_{n \geq 0} R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 成为分次交换环, Frobenius 特征映射保持该乘法。

证明. 固定循环型 $\nu \vdash a+b$ 的置换 σ 。陪集空间 $S_{a+b}/(S_a \times S_b)$ 可以看作全部 a 元子集。诱导特征标的求和只有在 σ 保持该子集时才有贡献; 这样的子集必为若干完整轮换之并。若它及其补集的循环型分别为 α, β , 则

$$m_r(\alpha) + m_r(\beta) = m_r(\nu), \quad |\alpha| = a, \quad |\beta| = b,$$

而选择这些轮换的方法数为

$$\prod_r \binom{m_r(\nu)}{m_r(\alpha)} = \frac{z_\nu}{z_\alpha z_\beta}.$$

每种选择贡献 $f(\alpha)g(\beta)$ 。所以诱导类函数在 ν 处的值除以 z_ν , 等于

$$\sum_{\alpha \cup \beta = \nu} \frac{f(\alpha)g(\beta)}{z_\alpha z_\beta}.$$

这正是右端幂和乘积中 p_ν 的系数, 证明了等式。类函数上的特征映射单射, 而右端乘法结合、交换且有次数零的单位, 因此同样性质在虚表示上成立。□

设 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_r) \vdash n$, Young 置换模为

$$M^\mu = \text{Ind}_{S_{\mu_1} \times \dots \times S_{\mu_r}}^{S_n} 1.$$

由刚证明的乘法公式及 $\text{ch}(1_{S_a}) = h_a$, 有

$$\text{ch}(M^\mu) = h_\mu. \quad (7.6)$$

同样的记法可用于任意非负整数组合: 重排各部分只改变块的排列, 诱导表示同构; 零部分可以删去。

定理 7.2.5. 设 n 为非负整数, $\lambda \vdash n$, S^λ 为对应的复 Specht 左 $\mathbb{C}[S_n]$ -模, s_λ 为 Schur 函数, ch_n 为 Frobenius 特征映射, 记 $\text{ch}(S^\lambda) = \text{ch}_n(\chi_{S^\lambda})$ 。则

$$\text{ch}(S^\lambda) = s_\lambda. \quad (7.7)$$

因此直和映射 $\text{ch} = \bigoplus_{n \geq 0} \text{ch}_n$ 将带诱导乘积的 $\mathcal{R} = \bigoplus_{n \geq 0} R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 同构到 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中以 s_λ 为整数基的子环, 并将不可约表示的类对应到 Schur 基。

证明. 取 $N \geq n$, 将 λ 补零到 N 项。由 Jacobi-Trudi 公式和(7.6), s_λ 是下列虚特征标的像:

$$\theta_\lambda = \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \chi_{M^{\alpha(\sigma)}}, \quad \alpha_i(\sigma) = \lambda_i - i + \sigma(i).$$

含负部分的项规定为零；其他项将 $\alpha(\sigma)$ 重排成分拆 $\mu(\sigma)$ 。

对任意 k ，有

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i(\sigma) = \sum_{i=1}^k \lambda_i + \sum_{i=1}^k \sigma(i) - \frac{k(k+1)}{2} \geq \sum_{i=1}^k \lambda_i.$$

重排后的前 k 项和不会减小，故 $\mu(\sigma)$ 支配 λ 。若 $\sigma \neq 1$ ，存在一个 k 使 $\{\sigma(1), \dots, \sigma(k)\} \neq \{1, \dots, k\}$ ，此时上式严格，故 $\mu(\sigma) \neq \lambda$ 。

现在应用命题 6.4.4: M^μ 只含支配 μ 的 Specht 类型，并且 S^μ 的重数是一。因此

$$\theta_\lambda = \chi_{S^\lambda} + \sum_{\eta \triangleright \lambda} c_\eta \chi_{S^\eta}, \quad c_\eta \in \mathbb{Z},$$

其中 $\triangleright$ 表示严格支配。另一方面，特征映射等距且 Schur 函数范数为一，故

$$1 = \langle s_\lambda, s_\lambda \rangle = \langle \theta_\lambda, \theta_\lambda \rangle = 1 + \sum_{\eta \triangleright \lambda} c_\eta^2.$$

最后一式使用的是已经在定理 6.4.5 建立的不可约分类与特征标正交性。于是全部 $c_\eta = 0$ ，得到 $\theta_\lambda = \chi_{S^\lambda}$ 。证明没有用 Schur 函数反过来建立 Specht 分类。整数基及乘法结论随后由诱导乘积公式得到。□

7.2.3 特征标计算的组化

推论 7.2.6 (Frobenius 特征标公式). 设 n 为非负整数， $\lambda, \mu \vdash n$ ， S^λ 为复 Specht 模， $\chi_{S^\lambda}(\mu)$ 为其特征标在循环型 μ 上的值， z_μ 为相应中心化子阶。取整数 $N \geq n$ ，把 λ 补零至 N 项，令 $x = (x_1, \dots, x_N)$ 、 $\delta_N = (N-1, \dots, 0)$ 、 $\Delta_N(x) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$ 。对这些变量中的 Schur 多项式和幂和多项式，有

$$p_\mu(x) = \sum_{\lambda \vdash n} \chi_{S^\lambda}(\mu) s_\lambda(x), \quad \chi_{S^\lambda}(\mu) = [x^{\lambda + \delta_N}] \Delta_N(x) p_\mu(x).$$

等价地， s_λ 中 p_μ 的系数乘以 z_μ ，就是 $\chi_{S^\lambda}(\mu)$ 。

证明. 由 (7.7)， $\langle p_\mu, s_\lambda \rangle = \chi_{S^\lambda}(\mu)$ 。这些特征标值为实数：一个置换与其逆具有相同循环型，而有限群特征标满足 $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$ 。所以交换内积的两个参数不会改变该值。在 Schur 标准正交基下展开 p_μ ，得第一式。乘以 Δ_N ，不同严格递减指数列的交错式互不混淆，读取 $x^{\lambda + \delta_N}$ 的系数便得第二式。□

例如

$$h_2 = \frac{p_1^2 + p_2}{2}, \quad h_3 = \frac{p_1^3 + 3p_1p_2 + 2p_3}{6}, \quad s_{(2,1)} = \frac{p_1^3 - p_3}{3}.$$

由于 $z_{(1^3)} = 6$ 、 $z_{(2,1)} = 2$ 、 $z_{(3)} = 3$ ，立即读出 S_3 的二维特征标为 $(2, 0, -1)$ 。

对四次情形，

$$s_{(2,2)} = h_2^2 - h_1h_3 = \frac{p_1^4}{12} + \frac{p_2^2}{4} - \frac{p_1p_3}{3}.$$

按循环型 $(1^4), (2, 1, 1), (2, 2), (3, 1), (4)$ 排列, 特征标值为 $(2, 0, 2, -1, 0)$ 。同一个行列式因而同时编码维数、换位上的迹以及较长轮换上的迹。

若实际计算 S^λ 在指定循环型上的特征标, 可以先用 Jacobi–Trudi 求 s_λ , 再用(7.3)逐个把所需 h_r 化成幂和, 最后读取一个系数。不需要预先求整张特征标表。Etingof 等人的叙述在 [4, Sections 5.14–5.15, pp. 114–118] 中以 Young 置换模、三角性及 Cauchy 行列式建立相应公式; 这里已把等距性与诱导乘法一并写出, 以便继续处理张量分解。

7.3 Schur–Weyl 对偶

张量幂中有两种不同的对称性: 可以同时改变每个因子中的向量, 也可以重新排列因子。二者交换很容易验证; 要证明它们互为中心化子, 还须证明全部与一种作用交换的线性算子都能由另一种作用线性生成。本节用半单代数的矩阵块和极化完成这一步。

7.3.1 张量幂上的对称群与一般线性群作用

设 k 为特征零域, V 为 $d \geq 1$ 维 k 向量空间, $n \geq 1$, 记 $T = V^{\otimes n}$ 。定义两个左作用:

$$P_\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(n)}, \quad R_g = g^{\otimes n},$$

其中 $\sigma \in S_n$ 、 $g \in \mathrm{GL}(V)$ 。逆号保证 $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$; 若省掉它, 就会写成反向乘法。逐个因子计算给出 $P_\sigma R_g = R_g P_\sigma$ 。

记两种作用在线性自同态代数中张成的代数

$$A = \mathrm{im}(k[S_n] \longrightarrow \mathrm{End}_k(T)), \quad B = \mathrm{span}_k\{g^{\otimes n} \mid g \in \mathrm{GL}(V)\}.$$

B 确为含单位的子代数, 因为 $g^{\otimes n} h^{\otimes n} = (gh)^{\otimes n}$ 。这里讨论的是像代数; 两个原始作用有核, 并不妨碍它们的像成为彼此的中心化子。

7.3.2 特征零下的双中心化子定理

引理 7.3.1 (分裂半单代数的双中心化子). 设 k 为域, E 为有限维非零 k 向量空间, $A \subseteq \mathrm{End}_k(E)$ 为含单位的分裂半单子代数, 即 $A \simeq \prod_i M_{r_i}(k)$ 。令 $C = \mathrm{End}_A(E)$ 。则 C 也是分裂半单代数, 且

$$\mathrm{End}_C(E) = A.$$

更具体地, 若 S_i 遍历 A 的简单左模的同构类代表, 并令 $L_i = \mathrm{Hom}_A(S_i, E)$, 以 $c \cdot f = c \circ f$ 定义左 C 作用, 则

$$E \simeq \bigoplus_i S_i \otimes_k L_i, \quad A \simeq \prod_i \mathrm{End}_k(S_i), \quad C \simeq \prod_i \mathrm{End}_k(L_i).$$

所有 L_i 均非零, 并且是 C 的全部互不同构简单模。

证明. 分裂半单性给出 E 的简单直和分解. A 在 E 上忠实, 因为 A 已是自同态代数的子代数; 若某个简单类型未出现, 其矩阵块的单位元就会零化 E , 与忠实性矛盾. 因此各 $L_i \neq 0$. 求值映射 $s \otimes f \mapsto f(s)$ 给出第一式.

与 A 交换的算子须保持其中心幂等元划出的各块. 块内与所有矩阵单位 $E_{ab} \otimes 1$ 交换的算子恰为 $1 \otimes U$, 其中 $U \in \text{End}_k(L_i)$: 先与 E_{aa} 交换排除非对角块, 再与 E_{ab} 交换使所有对角块相同. 因此得到 C 的乘积描述. 反过来, 重复这个矩阵单位计算, 与全部 $1 \otimes \text{End}_k(L_i)$ 交换的算子正是 $\text{End}_k(S_i) \otimes 1$, 即 A .

最后, 每个 L_i 是第 i 个全矩阵代数的列向量简单模, 不同块由中心幂等元区分. 这些也是乘积矩阵代数的全部简单模. $\square$

本引理说明, 只要算出一侧的中心化子, 另一侧的等式就可由半单性推出. 但“两个作用交换”本身只给包含关系, 不足以调用这个结论.

7.3.3 分解及维数条件

由定理 6.4.5, $k[S_n]$ 在特征零时是分裂半单代数, 简单模为 S_k^λ . 因此先不判断一般线性群一侧的不可约性, 也已有自然分解

$$T \simeq \bigoplus_{\lambda \vdash n} S_k^\lambda \otimes_k L_\lambda(V), \quad L_\lambda(V) = \text{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, T). \quad (7.8)$$

一般线性群在重数空间上作用为 $g \cdot f = g^{\otimes n} \circ f$. 这个定义良定, 正是因为 $g^{\otimes n}$ 与 S_n 作用交换; 求值映射与两个作用均相容.

例如 $n = 2$ 时, 两个 Specht 模分别是平凡模与符号模. 投影 $(1 + P_{(12)})/2$ 、 $(1 - P_{(12)})/2$ 把 $V^{\otimes 2}$ 分成对称和反对称张量. 一般分拆对应的重数空间可以看作这两种构造的推广; 接下来将证明它们除了为零的情形以外都是不可约表示.

7.3.4 半单性、极化与中心化子计算

引理 7.3.2 (极化). 设 k 为特征零域, U 为有限维 k 向量空间, $n \geq 1$. 置换张量因子作用下的不变子空间 $(U^{\otimes n})^{S_n}$, 由纯幂 $u^{\otimes n}$ ($u \in U$) 线性生成.

证明. 平均投影把纯张量的生成集送到对称化张量的生成集. 对 $u_1, \dots, u_n \in U$, 有极化恒等式

$$\sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{n-|J|} \left(\sum_{j \in J} u_j \right)^{\otimes n} = \sum_{\sigma \in S_n} u_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes u_{\sigma(n)}.$$

展开左端, 一项若只使用真子集 I 中的指标, 其系数为 $\sum_{J \supseteq I} (-1)^{n-|J|} = 0$. 若使用全部 n 个指标, 在 n 个位置中每个指标必须恰出现一次, 系数为一. 这证明恒等式. 除以 $n!$, 每个平均纯张量都成为纯幂的线性组合; 特征零保证可以作此除法. $\square$

定理 7.3.3 (Schur-Weyl 对偶). 设 k 为特征零域, V 为有限维非零 k 向量空间, $n \geq 1$ 为整数. 在 $T = V^{\otimes n}$ 中, S_n 按置换张量因子作左作用. 令 A 为这个 $k[S_n]$ 作用的像, B 为全部 $g^{\otimes n}$ ($g \in \text{GL}_k(V)$) 的 k -线性生成空间, S_k^λ 为分拆 $\lambda \vdash n$ 的 Specht 模, $L_\lambda(V) = \text{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, T)$, 其一般线性群作用为 $g \cdot f = g^{\otimes n} \circ f$. 则

$$\text{End}_A(T) = B, \quad \text{End}_B(T) = A.$$

两者均为分裂半单代数。在自然分解 $T \cong \bigoplus_{\lambda \vdash n} S_k^\lambda \otimes_k L_\lambda(V)$ 中, 非零 $L_\lambda(V)$ 是互不同构的不可约有限维 $\mathrm{GL}_k(V)$ 表示。

证明. 令 $U = \mathrm{End}_k(V)$ 。自然映射

$$U^{\otimes n} \longrightarrow \mathrm{End}_k(V^{\otimes n}), \quad a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \mapsto (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \mapsto a_1 v_1 \otimes \cdots \otimes a_n v_n)$$

是向量空间同构: 选择 V 的基, 两侧相应的张量矩阵单位一一对应。共轭 $F \mapsto P_\sigma F P_\sigma^{-1}$ 在左侧对应置换 U 的张量因子。所以 $\mathrm{End}_A(T)$ 对应 $(U^{\otimes n})^{S_n}$ 。

由引理 7.3.2, 后者由 $a^{\otimes n}$ 、 $a \in U$ 生成。还需把任意 a 换成可逆算子。多项式 $\det(a + tI)$ 不是零多项式, 所以只有有限多个 $t \in k$ 使 $a + tI$ 不可逆。域 k 无限, 可取 $n+1$ 个互异的可用值 $t_0, \dots, t_n$ 。向量值多项式 $(a + tI)^{\otimes n}$ 次数至多 n , 由 Lagrange 插值, 其在 $t = 0$ 的值 $a^{\otimes n}$ 是这 $n+1$ 个可逆算子张量幂的线性组合。因此 $\mathrm{End}_A(T) \subseteq B$ 。反向包含已由两个作用交换得到, 所以相等。

A 是分裂半单群代数 $k[S_n]$ 的商, 仍为若干全矩阵块的乘积。现在对 $E = T$ 使用引理 7.3.1, 得到另一中心化子等式及 B 的分裂半单性。该引理还说明各非零重数空间是 B 的互不同构简单模。一个子空间对所有 $g^{\otimes n}$ 不变, 当且仅当对它们的线性生成代数 B 不变; 群交织映射与 B 交织映射也相同。因此这恰是一般线性群表示的不可约性及非同构性。□

这一证明只用 Specht 分类、矩阵单位和极化, 全部计算在有限群表示及向量空间的线性映射中完成。有关双中心化子及可逆矩阵张量幂的论证, 也可参阅 [4, Theorem 5.18.1, Proposition 5.19.1 and Corollary 5.19.2, pp. 120–122]。

7.3.5 分拆行数限制与作用的忠实性

命题 7.3.4. 设 k 为特征零域, V 为 $d \geq 1$ 维 k 向量空间, $n \geq 1$ 为整数, $\lambda \vdash n$, S_k^λ 为 Specht 模, $L_\lambda(V) = \mathrm{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, V^{\otimes n})$, 其中 S_n 置换张量因子。一般线性群在该 Hom 空间上以 $g \cdot f = g^{\otimes n} \circ f$ 作用。对 $g \in \mathrm{GL}_k(V)$, 设 $x_1, \dots, x_d$ 为其在 k 的代数闭包中的特征值, 按重数列出, s_λ 为 Schur 多项式。则

$$\mathrm{tr}(g \mid L_\lambda(V)) = s_\lambda(x_1, \dots, x_d).$$

空间 $L_\lambda(V)$ 非零当且仅当 $\ell(\lambda) \leq d$ 。在此条件下, 把 λ 补零到 d 项, 有

$$\dim_k L_\lambda(V) = s_\lambda(1, \dots, 1) = \prod_{1 \leq i < j \leq d} \frac{\lambda_i - \lambda_j + j - i}{j - i}. \quad (7.9)$$

证明. 设 $\sigma \in S_n$ 的循环型为 μ 。按 V 的一组基计算迹, 每个轮换使相应矩阵指标首尾连接, 一个 r 轮换贡献 $\mathrm{tr}(g^r)$ 。因此

$$\mathrm{tr}(g^{\otimes n} P_\sigma) = \prod_r \mathrm{tr}(g^r)^{m_r(\mu)} = p_\mu(x_1, \dots, x_d).$$

另一方面, 对(7.8)取迹, 得

$$p_\mu(x) = \sum_{\lambda \vdash n} \chi_{S^\lambda}(\mu) \mathrm{tr}(g \mid L_\lambda(V)).$$

推论 7.2.6 给出同样的展开，其系数为 $s_\lambda(x)$ 。 S_n 的特征标表可逆，故比较得到所需迹公式。该比较在任意特征零域都合法：Specht 模来自有理系数模型，特征标表及其正交逆矩阵具有有理系数；所用对称函数恒等式也在 $\mathbb{Q}$ 上成立。故无需把一般的 k 嵌入复数域。

令 $g = I$ ，得到维数等于 $s_\lambda(1^d)$ 。若 $\ell(\lambda) > d$ ，有限变量 Schur 多项式为零，所以该空间维数为零。若 $\ell(\lambda) \leq d$ ，在交错式商中先代入 $x_i = q^{i-1}$ 。对指数 $\lambda_j + d - j$ 使用 Vandermonde 公式，再约去分母，得到

$$s_\lambda(1, q, \dots, q^{d-1}) = q^{\sum_i (i-1)\lambda_i} \prod_{i < j} \frac{1 - q^{\lambda_i - \lambda_j + j - i}}{1 - q^{j-i}}.$$

每个商在 $q = 1$ 的值是相应指数之比，得到(7.9)。所有分子、分母都是正整数，因此该有理数严格为正；它又是已经算出的维数，故 $L_\lambda(V) \neq 0$ 。□

例如 $\dim V = 2$ 时，三次张量幂只出现 (3) 与 $(2, 1)$ ，不出现三行的 $(1, 1, 1)$ 。其重数空间维数分别为四与二，Specht 维数分别为一与二，所以

$$2^3 = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2.$$

这是两边维数的乘积之和，不能把重数空间的维数直接当成 Specht 模的维数。

命题 7.3.5. 设 k 为特征零域， V 为 $d \geq 1$ 维 k 向量空间， $n \geq 1$ 为整数。 S_n 在 $V^{\otimes n}$ 上置换张量因子， $\mathrm{GL}_k(V)$ 以 $g \mapsto g^{\otimes n}$ 作用。则 $k[S_n]$ 的作用忠实，当且仅当 $d \geq n$ 。当 $n \geq 2$ 时，群 S_n 的作用忠实，当且仅当 $d \geq 2$ 。一般线性群作用的核为

$$\{cI_V \mid c \in k^\times, c^n = 1\}.$$

证明. 群代数的核是未出现的 Specht 类型所对应矩阵块之和。由命题 7.3.4，所有分拆都出现当且仅当 $d \geq n$ ；当 $d < n$ 时至少遗漏 (1^n) ，所以得到第一条。

若 $d = 1$ ，所有因子置换都作用为恒等。若 $d \geq 2$ ，选独立向量 u, v 。对非恒等 σ ，取被它移动的位置 i ，构造只在第 i 位放 v 、其他位置放 u 的基张量。置换后 v 的位置改变，所得张量不同，故群作用忠实。

最后，若 $g^{\otimes n} = I$ ，则 $(gv)^{\otimes n} = v^{\otimes n}$ 对每个 $v \neq 0$ 成立，因而 gv 与 v 共线：若不共线，可取线性泛函在 v 上为零、在 gv 上非零，对张量的各因子应用该泛函便产生矛盾。一个线性算子若保持每条直线，必为标量；在基向量及两两之和上比较即可证明各标量相同。于是 $g = cI$ ，再代回得到 $c^n = 1$ 。反向显然。□

特别地，在 $d = 2 < n$ 时，对称群本身仍可忠实作用，而群代数作用已经不忠实。群元素之间互不相同，并不意味着这些元素的作用矩阵线性无关。

7.4 张量分解

Schur-Weyl 对偶给每个分拆配置了一个重数空间。改变向量空间或施加线性映射时，这些空间也会相容地改变，因而形成函子。对称函数的乘法随后给出其张量积规则；需要注意，这种乘法对应对称群一侧的诱导，不能误认为同一对称群上的内部张量积。

7.4.1 Schur 函子

定义 7.4.1. 设 k 为特征零域, n 为非负整数, $\lambda \vdash n$, 固定一个 Specht 左 $k[S_n]$ -模 S_k^λ . 对有限维 k 向量空间 V , 在 $V^{\otimes n}$ 上采用置换张量因子的左 S_n 作用, 令

$$\mathbb{S}_\lambda(V) = \text{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, V^{\otimes n}).$$

对有限维 k 向量空间之间的线性映射 $f: V \rightarrow W$, 以及 $u \in \mathbb{S}_\lambda(V)$, 令

$$\mathbb{S}_\lambda(f)(u) = f^{\otimes n} \circ u.$$

这称为分拆 λ 对应的 **Schur 函子** (Schur functor). 空分拆对应常值空间 k ; 正次数时规定 $\mathbb{S}_\lambda(0) = 0$.

因为 $f^{\otimes n}$ 与因子置换相容, 上述复合仍为 S_n 同态. 恒等映射和复合也被保持, 所以确实得到函子. 选定基时, 其作用由 f 的矩阵条目的 n 次齐次多项式给出; 通常它不是关于 f 的线性运算. 例如 $\text{Sym}^2(f+g)$ 中有交叉项, 不能写成两个平方的和.

这个定义中的空间就是上一节的 $L_\lambda(V)$. 因此它在非零时是不可约的一般线性群表示, 特征标为 s_λ , 且 $\ell(\lambda) > \dim V$ 时为零. 在不同维数下使用同一分拆, 不需要重新定义构造.

定义 7.4.2. 设 a, b 为非负整数, $\lambda \vdash a$, $\mu \vdash b$. 在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中, 用 Schur 基展开乘积:

$$s_\lambda s_\mu = \sum_{\nu \vdash a+b} c_{\lambda\mu}^\nu s_\nu.$$

系数 $c_{\lambda\mu}^\nu$ 称为 **Littlewood-Richardson 系数** (Littlewood-Richardson coefficient).⁴

命题 7.4.3. 设 k 为特征零域, a, b 为非负整数, $\lambda \vdash a$, $\mu \vdash b$, $c_{\lambda\mu}^\nu$ 为 Schur 函数乘积的 Littlewood-Richardson 系数, S^η 表示 k 上相应的 Specht 左模, $\boxtimes$ 表示外张量积, $S_a \times S_b \leq S_{a+b}$ 按两个连续字母块嵌入. 则所有 $c_{\lambda\mu}^\nu$ 是非负整数, 且

$$\text{Ind}_{S_a \times S_b}^{S_{a+b}}(S^\lambda \boxtimes S^\mu) \simeq \bigoplus_{\nu \vdash a+b} (S^\nu)^{\oplus c_{\lambda\mu}^\nu}.$$

对任意有限维 k 向量空间 V , 以 $\mathbb{S}_\eta$ 记 Schur 函子, 还有 $\text{GL}_k(V)$ -表示的同构

$$\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathbb{S}_\mu(V) \simeq \bigoplus_{\substack{\nu \vdash a+b \\ \ell(\nu) \leq \dim V}} \mathbb{S}_\nu(V)^{\oplus c_{\lambda\mu}^\nu}. \quad (7.10)$$

证明. 第一式由诱导乘积公式及 Specht-Schur 对应得到; 其系数是半单表示的实际分解重数, 所以是非负整数.

每个非零 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 可选为 $V^{\otimes a}$ 中一个一般线性群直和项, $\mathbb{S}_\mu(V)$ 同样可选为 $V^{\otimes b}$ 的直和项. 张量所得是 $V^{\otimes(a+b)}$ 的直和项, 故由 Schur-Weyl 对偶完全可约, 全部不可约项都形如右侧. 对角矩阵上的特征标为 $s_\lambda(x)s_\mu(x)$. 有限变量 Schur 多项式中, 行数

⁴利特尔伍德 (Dudley Ernest Littlewood, 1903-1979) 与理查森 (Archibald Read Richardson, 1881-1954) 均为英国数学家, 合作研究对称群表示与对称函数的乘法系数。

不超过 $\dim V$ 的部分线性无关, 所以其展开系数只能为 $c_{\lambda\mu}^{\nu}$ 。在任意特征零域上, 这个比较仍在分裂半单的有理系数模型及其扩张上成立; 也可以把迹视为对角元素的多项式, 利用域无限逐项比较系数。□

上述论证解释了分解系数的表示意义, 一般 Littlewood–Richardson 表格规则尚需另作证明。下面证明最常用的单行、单列情形, 再计算一个出现重数二的例子。

7.4.2 Pieri 规则与 Littlewood–Richardson 低阶例子

定义 7.4.4. 设分拆 μ 的 Young 图包含分拆 λ 的 Young 图。差图 μ/λ 若每列至多有一格, 称为**横条** (horizontal strip); 若每行至多有一格, 称为**竖条** (vertical strip)。其大小是新增格数 $|\mu| - |\lambda|$ 。

下面的 Pieri 规则⁵用横条、竖条描述 Schur 函数分别乘以单行、单列函数的结果。

定理 7.4.5 (Pieri 规则). 在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中, 记 s_{λ} 为 Schur 函数、 h_r, e_r 分别为完全、初等对称函数。对分拆 λ 和整数 $r \geq 0$, 有

$$s_{\lambda} h_r = \sum_{\mu/\lambda \text{ 为大小 } r \text{ 的横条}} s_{\mu}, \quad (7.11)$$

$$s_{\lambda} e_r = \sum_{\mu/\lambda \text{ 为大小 } r \text{ 的竖条}} s_{\mu}. \quad (7.12)$$

每项的系数均为一。

证明. 取 $N \geq |\lambda| + r$, 令 $\alpha = \lambda + \delta_N$ 。先证横条公式。交错多项式 $a_{\alpha} h_r$ 可唯一写成严格递减非负指数列 β 对应的 a_{β} 的线性组合。其系数等于单项式 x^{β} 的系数。由于 h_r 中每个次数 r 的单项式系数都是一, 该系数为

$$\sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^N \mathbf{1}_{\{\beta_i \geq \alpha_{\sigma(i)}\}} = \det(\mathbf{1}_{\{\beta_i \geq \alpha_j\}})_{i,j=1}^N,$$

其中已限定 $|\beta| = |\alpha| + r$ 。

α, β 都严格递减。因此矩阵第 i 行先为若干个零, 随后全为一; 其第一个一的位置 q_i 随 i 不减。如果有零行或重复行, 行列式为零。其余情形的 N 个不同起始位置只能依次为 $1, \dots, N$, 即 $q_i = i$, 矩阵上三角且对角元全为一。这个条件等价于

$$\beta_1 \geq \alpha_1, \quad \alpha_i \leq \beta_i < \alpha_{i-1} \quad (2 \leq i \leq N).$$

写 $\beta = \mu + \delta_N$, 它化为

$$\mu_i \geq \lambda_i, \quad \mu_i \leq \lambda_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

恰好表示新增格子不能在同一列重复, 即横条条件。除以 Δ_N , 得到第一式。

⁵皮耶里 (Mario Pieri, 1860-1913), 意大利数学家, 研究几何基础, 其名字也见于对称函数的乘法规则。

再证竖条公式。以 Alt 表示对变量置换带符号求和；则 $a_\alpha = \text{Alt}(x^\alpha)$ 。因为 e_r 对称，

$$a_\alpha e_r = \sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, N\} \\ |J|=r}} a_{\alpha+1_J}.$$

原指数相邻至少相差一，增加零或一后仍不增。若有相等指数，交错式为零；否则仍严格递减，不需要重新排列，也不产生负号。非零项正好满足 $\mu_i - \lambda_i \in \{0, 1\}$ 且 μ 为分拆，也就是每行至多增加一格。每个 μ 来自唯一的 J ，系数为一。再除以 Δ_N 即得第二式。稳定检测保证有限变量证明给出对称函数恒等式。□

例如

$$s_{(2,1)} h_2 = s_{(4,1)} + s_{(3,2)} + s_{(3,1,1)} + s_{(2,2,1)}.$$

$(3, 2)$ 的新增格位于第一行第三列和第二行第二列，属于横条；不能把“横条”误解为全部新格须在同一行。

例 7.4.6. 利用 $s_{(2,1)} = h_2 h_1 - h_3$ ，计算 $s_{(2,1)}^2$ 。先按横条规则乘 h_2 ，得到上面的四项，再逐项添一格：

$$\begin{aligned} s_{(2,1)} h_2 h_1 &= s_{(5,1)} + 2s_{(4,2)} + 2s_{(4,1,1)} + s_{(3,3)} + 3s_{(3,2,1)} \\ &\quad + s_{(3,1,1,1)} + s_{(2,2,2)} + s_{(2,2,1,1)}. \end{aligned}$$

另一方面，

$$s_{(2,1)} h_3 = s_{(5,1)} + s_{(4,2)} + s_{(4,1,1)} + s_{(3,2,1)}.$$

相减得到

$$\begin{aligned} s_{(2,1)}^2 &= s_{(4,2)} + s_{(4,1,1)} + s_{(3,3)} + 2s_{(3,2,1)} \\ &\quad + s_{(3,1,1,1)} + s_{(2,2,2)} + s_{(2,2,1,1)}. \end{aligned} \quad (7.13)$$

因此一般 Littlewood-Richardson 系数不一定是零或一。对三维空间，只保留至多三行的项；它们的维数依次为 27, 10, 10, 8, 1，其中八维项出现两次，合计 64，与 $\dim \mathbb{S}_{(2,1)}(k^3)^2 = 8^2$ 相符。

7.4.3 Schur 函子与对称幂、外幂

命题 7.4.7. 设 k 为特征零域， V 为有限维 k 向量空间， $n \geq 1$ 为整数， $\mathbb{S}_\lambda$ 为分拆 λ 对应的 Schur 函子。则自然地有

$$\mathbb{S}_{(n)}(V) \simeq \text{Sym}^n V, \quad \mathbb{S}_{(1^n)}(V) \simeq \bigwedge^n V.$$

因而对任意分拆 λ 与非负整数 r ，张量积 $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \text{Sym}^r V$ 按横条分解， $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \bigwedge^r V$ 按竖条分解；行数超过 $\dim V$ 的项删去。

证明. $S^{(n)}$ 为平凡模, 故 $\mathbb{S}_{(n)}(V)$ 是对称张量子空间. 对称幂的商映射 $q : V^{\otimes n} \rightarrow \text{Sym}^n V$, 在该子空间上是同构, 其逆为

$$v_1 \cdots v_n \mapsto \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(n)}.$$

右式对因子排列不变, 所以良定; 与商映射复合为恒等, 对已对称张量再平均也为恒等. 故两个复合都正确, 且与线性映射相容.

$S^{(1^n)}$ 为符号模, 故相应 Hom 空间识别为反对称张量. 外幂的商映射在此子空间上的逆为

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \mapsto \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(n)}.$$

有两个相等向量时, 右端按交换它们的置换配对相消, 所以通过外幂的定义关系; 两次复合同样为恒等. 最后把这两种识别代入(7.10), 并使用定理 7.4.5, 即得所述分解. $\square$

例如

$$\text{Sym}^2 V \otimes V \simeq \text{Sym}^3 V \oplus \mathbb{S}_{(2,1)}(V), \quad \bigwedge^2 V \otimes V \simeq \mathbb{S}_{(2,1)}(V) \oplus \bigwedge^3 V.$$

因此同一个 $\mathbb{S}_{(2,1)}$ 同时出现在“先对称两个因子”和“先反对称两个因子”这两种构造中. 对称、反对称只是一般 Young 对称性的两端情形.

这些分解由有限群与张量计算得到. 研究一般线性 Lie 代数时, 分拆还会作为最高权出现, 从而给出另一种解释. Schur 多项式的迹与维数计算可对照 [4, Sections 5.21–5.22, pp. 128–130].

本章小结

循环型决定幂和基, 不可约特征标决定 Schur 基; Frobenius 特征映射把这两组信息放在同一个分次代数中. 其等距性来自中心化子阶 z_μ , 乘法相容性来自把轮换分配到两个不变子集的计数. Jacobi–Trudi 公式与 Young 置换模的三角性进一步确定了不可约类型的标签, 而不只是证明两边维数相等.

张量幂上的因子置换与同时线性变换彼此交换. 极化证明它们已经给出全部中心化子; 半单矩阵块再产生双向对应. 分拆超过空间维数的行数时, 相应重数空间为零, 群代数作用因此可能不忠实, 即使对称群本身仍忠实作用.

Schur 函子的张量积由 Schur 函数乘法控制. 单行与单列乘法分别按横条、竖条展开, Pieri 规则给出计算低阶 Littlewood–Richardson 系数的方法. 一般系数还可解释为诱导重数.

习题

习题 7.1. 求 $\dim_{\mathbb{Q}} \Lambda_{\mathbb{Q}}^5$. 再求将对称函数代入两个变量的映射在次数五上的核, 并说明取多少个变量可以保证对所有次数五的对称函数单射.

解. 五的分拆为 $(5), (4, 1), (3, 2), (3, 1, 1), (2, 2, 1), (2, 1, 1, 1), (1^5)$, 故维数为七。两个变量中, 前三个单项式对称函数仍互相独立, 其余四个为零。因此核以这四个 m_λ 为基, 维数四。取五个变量时全部七个基元素均存在且独立, 所以单射; 少于五个变量时 $e_5 = m_{(1^5)}$ 被送到零, 因此五也是最少的数目。 $\square$

习题 7.2. 将 h_4 与 e_4 写成幂和函数的多项式, 并由此计算 $\langle h_4, e_4 \rangle$ 。

解. 由指数生成函数取四次项,

$$h_4 = \frac{p_1^4 + 6p_1^2 p_2 + 3p_2^2 + 8p_1 p_3 + 6p_4}{24},$$

$$e_4 = \frac{p_1^4 - 6p_1^2 p_2 + 3p_2^2 + 8p_1 p_3 - 6p_4}{24}.$$

五种循环型的 z_μ 依次为 24, 4, 8, 3, 4。Hall 内积因而为

$$\frac{24 - 36 \cdot 4 + 9 \cdot 8 + 64 \cdot 3 - 36 \cdot 4}{24^2} = 0.$$

这也与 $h_4 = s_{(4)}$ 、 $e_4 = s_{(1^4)}$ 正交一致。 $\square$

习题 7.3. 用行列式求 $s_{(3,1)}$, 再把它代入两个变量 x, y 。求 $s_{(3,1)}(1, 1)$ 与 $s_{(3,1)}(1)$ 。

解. Jacobi-Trudi 给出 $s_{(3,1)} = h_3 h_1 - h_4$ 。两变量中 $h_3 h_1 - h_4 = x^3 y + x^2 y^2 + x y^3 = xy(x^2 + xy + y^2)$ 。所以两项取值分别为三与零; 后一结论也由分拆有两行、而变量只有一个得到。 $\square$

习题 7.4. 证明完全对称函数基与单项式对称函数基在 Hall 配对下互为对偶:

$$\langle h_\lambda, m_\mu \rangle = \delta_{\lambda\mu}.$$

解. 在 Cauchy 乘积中先按 y 的单项式展开:

$$\prod_{i,j} (1 - x_i y_j)^{-1} = \prod_j \left(\sum_{r \geq 0} h_r(x) y_j^r \right) = \sum_\lambda h_\lambda(x) m_\lambda(y).$$

最后一式将同一变量置换轨道的单项式合并, 每个轨道的系数为 $h_\lambda(x)$ 。同一个 Cauchy 核又为 $\sum_\nu p_\nu(x) p_\nu(y) / z_\nu$, 是 Hall 配对的逆矩阵张量。因此在第二因子的 m_λ 基下, 第一因子的系数恰为对偶基, 即 h_λ , 得到结论。 $\square$

习题 7.5. 令代数自同构 $\omega: \Lambda_{\mathbb{Q}} \rightarrow \Lambda_{\mathbb{Q}}$ 由 $\omega(p_r) = (-1)^{r-1} p_r$ 确定。证明它为保次数的等距对合, 并交换 h_r 与 e_r 。

解. 幂和自由生成, 所以该赋值唯一延拓为代数自同构; 再施一次各生成元都不变, 因此 $\omega^2 = 1$ 。它将 p_λ 乘以符号 $(-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)}$, 故保持幂和基的正交范数, 因而等距。对 $H(t)$ 的指数表达式施 ω , 得到 $E(t)$, 所以 $\omega h_r = e_r$; 再施一次得到反向等式。 $\square$

习题 7.6. 设 1_μ 为 S_n 中循环型 μ 的示性函数。求 $\text{ch}(1_\mu)$ 与 p_μ 对应的类函数, 并说明后一类函数一般不是实际表示的特征标。

解. 由定义, $\text{ch}(1_\mu) = p_\mu/z_\mu$, 故 p_μ 对应 $z_\mu 1_\mu$. 若 $\mu \neq (1^n)$, 该类函数在单位元处为零, 却在指定共轭类上非零. 实际表示若在单位元处迹为零, 则维数为零, 特征标处处为零, 所以这里不是实际特征标. 它仍是虚特征标, 因为由 Frobenius 公式, 其不可约展开系数为整数 $\chi_{S^\lambda}(\mu)$. $\square$

习题 7.7. 设 U 为 S_n 的复表示. 用习题 7.5 中的 ω 证明

$$\text{ch}(U \otimes \text{sgn}) = \omega \text{ch}(U).$$

计算 S_3 的 $S^{(2,1)}$ 张量符号表示后是否改变.

解. 循环型 μ 上, 符号为 $(-1)^{n-\ell(\mu)}$, 而 ωp_μ 恰乘同一个符号. 逐项代入特征映射定义得到公式. $s_{(2,1)} = (p_1^3 - p_3)/3$ 在 ω 下不变, 所以该二维表示张量符号后同构于自身. $\square$

习题 7.8. 分解 $\text{Ind}_{S_2 \times S_2}^{S_4}(\text{sgn} \boxtimes 1)$, 并核对维数.

解. 特征映射给出 $e_2 h_2 = s_{(1,1)} h_2$. 从两格竖列添大小二的横条, 得到 $(3,1)$ 与 $(2,1,1)$, 所以分解为 $S^{(3,1)} \oplus S^{(2,1,1)}$. 两者维数均为三, 和为六, 恰为指数 $[S_4 : S_2 \times S_2]$. $\square$

习题 7.9. 设 $0 \leq r \leq n/2$. 分解 S_n 在全部 r 元子集上的复置换表示, 并说明它是否有重复的不可约类型.

解. 一个 r 元子集的稳定子群为 $S_r \times S_{n-r}$, 故特征映射为 $h_r h_{n-r}$. 在长度 $n-r$ 的单行上添 r 格横条, 只能得到 $(n-i, i)$, 其中 $0 \leq i \leq r$. 这些形状都确实可以得到, 而且系数为一. 因此置换表示为 $\bigoplus_{i=0}^r S^{(n-i, i)}$, 没有重复类型. $\square$

习题 7.10. 以 S_2 的平凡表示为例, 说明 Frobenius 特征映射不把同一个对称群上的张量积送到普通的对称函数乘法.

解. $1_{S_2} \otimes 1_{S_2} \simeq 1_{S_2}$, 其像为次数二的 h_2 . 普通乘积 h_2^2 却是次数四的 $s_{(4)} + s_{(3,1)} + s_{(2,2)}$, 对应从 $S_2 \times S_2$ 到 S_4 的诱导. 次数已不同, 因而两种乘法不可能混同. $\square$

习题 7.11. 对 $n \geq 2$, 用 $s_{(n-1,1)} = h_{n-1} h_1 - h_n$ 证明

$$\chi_{S^{(n-1,1)}}(\sigma) = m_1(\sigma) - 1,$$

其中 $m_1(\sigma)$ 为 σ 的不动点数.

解. $h_{n-1} h_1$ 对应从 $S_{n-1} \times S_1$ 诱导的平凡表示, 即 n 个字母的置换表示. 其特征标等于不动字母数 m_1 . 减去 h_n 对应的平凡特征标一, 得到所求式. 这同时说明该 Specht 模就是去掉常数直线后的标准表示. $\square$

习题 7.12. 对 $n \geq 4$, 证明

$$\chi_{S^{(n-2,2)}}(\sigma) = \binom{m_1(\sigma)}{2} + m_2(\sigma) - m_1(\sigma),$$

其中 $m_2(\sigma)$ 为二轮换数.

解. σ 固定的二元子集或者由两个不动点组成, 或者是某个二轮换的支集, 所以二元子集置换特征标为 $\binom{m_1}{2} + m_2$. 由横条规则, 该置换表示为 $S^{(n)} \oplus S^{(n-1,1)} \oplus S^{(n-2,2)}$. 前两项特征标之和为 $1 + (m_1 - 1) = m_1$, 减去即得公式. $\square$

习题 7.13. 证明 $p_1^n = \sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda s_\lambda$, 其中 $f^\lambda = \dim S^\lambda$. 据此解释 $\langle p_1^n, p_1^n \rangle = n!$.

解. $p_1 = h_1$ 对应 S_1 的平凡表示, n 次诱导乘积就是从平凡子群到 S_n 诱导, 即正则表示. 正则表示的 Specht 重数为其维数, 给出所求展开. Schur 正交性随后给出范数平方为 $\sum_{\lambda} (f^\lambda)^2 = n!$. 也可直接由幂和范数 $z_{(1^n)} = n!$ 得到同样数值. $\square$

习题 7.14. 设 $V = \mathbb{C}^2$, $T = V^{\otimes 3}$. 求对称群作用像 A 及一般线性群作用生成代数 B 的维数, 并说明为什么不能把两个数相乘来计算 $\dim \text{End}(T)$.

解. 只出现 $(3), (2, 1)$. 相应 Specht 维数为一、二, 重数空间维数为四、二. 所以 $\dim A = 1^2 + 2^2 = 5$, $\dim B = 4^2 + 2^2 = 20$. 而 $\dim \text{End}(T) = 8^2 = 64$, 不是一百. 两个代数在各等型块中分别作用于不同因子, 但在不同块上不是任意组合; 乘法映射 $A \otimes B \rightarrow \text{End}(T)$ 还有交叉块被送到零, 不能据此相乘维数. $\square$

习题 7.15. 在二维复空间中, 取 $A = B = \mathbb{C}I$. 检验它们相互交换, 但不满足 Schur-Weyl 型的双中心化子结论, 并指出缺少什么.

解. 标量矩阵与一切矩阵交换, 所以两者当然相互交换. 然而 $\text{End}_A(\mathbb{C}^2) = M_2(\mathbb{C}) \neq B$. A 虽然半单, 但 B 并未取为它的全部中心化子. 因此半单性与交换关系合在一起仍不够; 还须实际证明其中一个中心化子等式. $\square$

习题 7.16. 在特征零域上, 将

$$u \otimes u \otimes v + u \otimes v \otimes u + v \otimes u \otimes u$$

写成三个向量的三次纯幂的线性组合.

解. 展开 $(u+v)^{\otimes 3} - (u-v)^{\otimes 3}$, 含偶数个 v 的项相消, 含一个 v 的三项各出现两次, 另有 $2v^{\otimes 3}$. 因此所求表达式为

$$\frac{1}{2}((u+v)^{\otimes 3} - (u-v)^{\otimes 3} - 2v^{\otimes 3}).$$

这里张量乘法不交换, 所以展开时须保留三个不同的位置. $\square$

习题 7.17. 设 $\dim_{\mathbb{C}} V = 2$. 证明 $\mathbb{C}[S_3] \rightarrow \text{End}(V^{\otimes 3})$ 的核恰由

$$a = \sum_{\sigma \in S_3} \text{sgn}(\sigma) \sigma$$

线性生成, 而 S_3 本身仍忠实作用.

解. 唯一未出现的分拆是 $(1, 1, 1)$, 它的矩阵块一维; 因而核一维. $a/6$ 是符号类型的中心投影, 作用像为三阶反对称张量, 而 $\bigwedge^3 V = 0$, 所以 a 在核中. 它的单位元系数为一, 故非零, 必生成整个核. 另一方面, 两个独立向量已可构造只有一个特殊位置的基张量来检测任意非恒等置换, 故群作用忠实. $\square$

习题 7.18. 对 $d \geq 1$, 分别求 $\mathrm{GL}_d(\mathbb{R})$ 在二次与三次张量幂上的核, 再与复数域比较。

解. 核由满足 $c^n = 1$ 的标量 cI 组成. 实数域上二次幂的核为 $\{I, -I\}$, 三次幂的核只有 I . 复数域上分别有两个和三个标量根, 所以三次张量表示在实数域上忠实, 在复数域上不忠实. 这里讨论的是有理点群的作用, 不能忽略底域. $\square$

习题 7.19. 对 $d \geq 1$, 求 $\dim \mathbb{S}_{(2,1)}(k^d)$ 与 $\dim \mathbb{S}_{(2,2)}(k^d)$, 其中 k 为特征零域。

解. 在 d 个一处, $h_r(1^d) = \binom{d+r-1}{r}$, 因为它数次数 r 的单项式. 代入两个 Jacobi-Trudi 公式,

$$\begin{aligned}\dim \mathbb{S}_{(2,1)}(k^d) &= \binom{d+1}{2}d - \binom{d+2}{3} = \frac{d(d^2-1)}{3}, \\ \dim \mathbb{S}_{(2,2)}(k^d) &= \binom{d+1}{2}^2 - d\binom{d+2}{3} = \frac{d^2(d^2-1)}{12}.\end{aligned}$$

$d = 1$ 时均为零, 与两行限制相符; $d = 3$ 时分别为八与六. $\square$

习题 7.20. 设 k 为特征零域, V 为 $d \geq 1$ 维 k 向量空间, λ 为至多有 d 行的分拆, r 为非负整数, $\det V = \bigwedge^d V$, $\lambda + (r^d)$ 表示补零后各部分加 r . 证明 $\mathrm{GL}_k(V)$ -表示同构

$$\mathbb{S}_{\lambda+(r^d)}(V) \simeq \mathbb{S}_{\lambda}(V) \otimes (\det V)^{\otimes r}.$$

解. 在交错式商中, 各指数同时增加 r , 分子提出 $(x_1 \cdots x_d)^r$, 故

$$s_{\lambda+(r^d)}(x) = (x_1 \cdots x_d)^r s_{\lambda}(x).$$

$\det V = \bigwedge^d V$ 为一维表示. 右侧是 $V^{\otimes(|\lambda|+rd)}$ 的直和项, 因而完全可约, 其特征标恰为左侧 Schur 多项式. 该张量次数的 Schur 特征标线性无关, 所以表示同构. $\square$

习题 7.21. 设 k 为特征零域, V 为二维 k 向量空间, a, b 为满足 $a \geq b \geq 0$ 的整数, $\det V = \bigwedge^2 V$. 证明

$$\mathbb{S}_{(a,b)}(V) \simeq \mathrm{Sym}^{a-b} V \otimes (\det V)^{\otimes b},$$

并求其维数。

解. 从单行分拆 $(a-b, 0)$ 开始, 向两行同时添 b 格, 即得 (a, b) . 用习题 7.20 中的行列式计算, 特征标为 $(xy)^b h_{a-b}(x, y)$, 所以得到所述同构. 行列式因子一维, 而二维空间的 r 次对称幂以 $x^{r-i}y^i$, $0 \leq i \leq r$ 为基, 所以维数为 $a-b+1$. $\square$

习题 7.22. 设 k 为特征零域, V 为有限维 k 向量空间, $a, b \geq 1$ 为整数. 分解 $\mathrm{GL}_k(V)$ -表示 $\mathrm{Sym}^a V \otimes_k \bigwedge^b V$, 并在 $\dim_k V = b$ 时简化答案。

解. 在单行 (a) 上添 b 格竖条, 第一行或者添一格, 或者不添, 得到

$$\mathrm{Sym}^a V \otimes \bigwedge^b V \simeq \mathbb{S}_{(a+1, 1^{b-1})}(V) \oplus \mathbb{S}_{(a, 1^b)}(V).$$

当 $\dim V = b$ 时, 第二项有 $b+1$ 行而为零. 第一种形状 $(a+1, 1^{b-1})$ 对每行同时减一后成为 $(a, 0, \dots, 0)$, 故第一项为 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \det V$. 这与左侧 $\bigwedge^b V = \det V$ 的直接计算一致. $\square$

习题 7.23. 设 k 为特征零域, V 为有限维 k 向量空间. 分别分解 $\mathrm{GL}_k(V)$ -表示 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes_k \mathrm{Sym}^2 V$ 与 $\bigwedge^2 V \otimes_k \bigwedge^2 V$, 并说明二维空间中哪些项消失.

解. 横条与竖条规则给出

$$\begin{aligned} h_2^2 &= s_{(4)} + s_{(3,1)} + s_{(2,2)}, \\ e_2^2 &= s_{(2,2)} + s_{(2,1,1)} + s_{(1,1,1,1)}. \end{aligned}$$

分别把 s_λ 换成 $S_\lambda(V)$ 得到分解. 二维时第一式三项均存在, 维数为五、三、一, 总计九; 第二式只剩 $S_{(2,2)}(V) = (\det V)^{\otimes 2}$, 维数为一. $\square$

习题 7.24. 令 V 为二维特征零空间. 从 (7.13) 求 $S_{(2,1)}(V)^{\otimes 2}$, 再用一般线性群的二维表达式核对.

解. 删去三行及更多行的分拆, 得到

$$S_{(2,1)}(V)^{\otimes 2} \simeq S_{(4,2)}(V) \oplus S_{(3,3)}(V).$$

另一方面, $S_{(2,1)}(V) \simeq V \otimes \det V$, 其平方为 $V^{\otimes 2} \otimes (\det V)^{\otimes 2}$. 将 $V^{\otimes 2}$ 分成 $\mathrm{Sym}^2 V \oplus \det V$, 得到 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes (\det V)^{\otimes 2}$ 与 $(\det V)^{\otimes 3}$, 正对应上述两项. 维数为 $3+1=4$. $\square$

习题 7.25. 设 V, W 为特征零域上的有限维空间. 证明自然同构

$$\mathrm{Sym}^2(V \otimes W) \simeq (\mathrm{Sym}^2 V \otimes \mathrm{Sym}^2 W) \oplus \left(\bigwedge^2 V \otimes \bigwedge^2 W \right),$$

并写出 $\bigwedge^2(V \otimes W)$ 的对应分解.

解. 把 $(V \otimes W)^{\otimes 2}$ 重排成 $V^{\otimes 2} \otimes W^{\otimes 2}$. 交换两个 $V \otimes W$ 因子, 对应 $P_V \otimes P_W$. 两个交换算子的特征值都是 ± 1 , 相同符号相乘为正, 异号相乘为负. 因此正特征空间给出题中分解, 负特征空间给出

$$\bigwedge^2(V \otimes W) \simeq (\mathrm{Sym}^2 V \otimes \bigwedge^2 W) \oplus \left(\bigwedge^2 V \otimes \mathrm{Sym}^2 W \right).$$

所有重排与投影均与线性映射相容, 所以同构自然. $\square$

习题 7.26. 设 $V = k$, $\lambda = (2)$, 其中 k 为特征零域. 直接说明 S_λ 保持映射复合, 却不把映射之和变成映射之和. 再求 $S_\lambda(cI_V)$ 对一般 $\lambda \vdash n$ 的作用.

解. 一维空间上的线性映射由标量 a 表示, 对称平方将它送到 a^2 . 所以 $(ab)^2 = a^2b^2$, 但取 $a = b = 1$ 时 $(a+b)^2 = 4 \neq 2 = a^2 + b^2$. 一般地, $(cI)^{\otimes n} = c^n I$, 故对整个 Hom 重数空间也作用为 $c^n I$. 函子性要求保持复合, 不要求关于态射加法线性. $\square$

习题 7.27. 设 g 为特征零域上有限维空间的可逆算子, 记 $t_r = \mathrm{tr}(g^r)$. 证明

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(\mathrm{Sym}^3 g) &= \frac{t_1^3 + 3t_1t_2 + 2t_3}{6}, \\ \mathrm{tr}\left(\bigwedge^3 g\right) &= \frac{t_1^3 - 3t_1t_2 + 2t_3}{6}. \end{aligned}$$

对三维单个么幂 Jordan 块计算这两个迹.

解. 对称幂与外幂的特征标为 h_3, e_3 。将幂和 p_r 代入 t_r , 使用其指数生成函数的三次项, 得到两个公式; 它们对不可对角化的 g 同样成立, 因为三角化后的对角特征值仍计算全部幂的迹。三维幺幂 Jordan 块满足 $t_1 = t_2 = t_3 = 3$, 故两个值为十与一。 $\square$

习题 7.28. 设 k 的特征为二, $V = k^2$, 取基 u, v 。证明非零张量 $u \otimes v + v \otimes u$ 在对称平方商映射 $V^{\otimes 2} \rightarrow \text{Sym}^2 V$ 下为零。由此说明正文把对称张量与对称幂相互识别的证明为何不能直接搬到此处。

解. 两个基张量互不相同, 所以其和非零; 交换它们后和不变, 故它是对称张量。在对称平方中二者都映到 uv , 和映到 $2uv = 0$ 。因此商映射在对称张量子空间上不单射。正文的逆需要除以 $2!$, 在特征二中不存在; 不变子空间与对称商空间不能再由那组平均映射识别。 $\square$

第八章* 模表示与 Brauer 特征标

本章研究底域特征整除群阶时的有限群表示，借投射覆盖与块分析不可分解模，再以 Brauer 特征标比较模特征与特征零的表示信息。

本章目标

- 能构造半单性失效的例子，区分简单模、不可分解模及其根层。
- 能计算循环 p 群的模、投射覆盖、基座和 Cartan 矩阵。
- 从中心本原幂等元得到块，并在小群的群代数中验证块分解。
- 能在 p -正则共轭类上计算 Brauer 特征标，并由格约化确定分解数。
- 能按定义计算 Brauer 映射及具体块的缺陷群，明确特征标记录合成因子的范围。

预备知识为有限群表示、群代数、合成列及有限维代数的根；投射覆盖的构造使用第二卷的幂等元提升。Brauer 特征标部分另固定一个适当的分裂 p -模系统，届时会说明特征零域、离散赋值环及剩余域各自的作用。

设 $G = C_p = \langle g \rangle$ ，而域 k 的特征为素数 p 。在群代数中令 $u = g - 1$ ，则 $u^p = g^p - 1 = 0$ ，并有 $kG \cong k[u]/(u^p)$ 。这个代数的逐次商 $u^j kG / u^{j+1} kG$ 都是一维平凡表示，但乘 u 的作用把它们接成一个不能直接拆开的模。简单成分因而不决定整个表示，特征零下用平均投影取得不变补空间的办法也失效。投射覆盖、块与 Brauer 特征标将分别记录这里留下的结构和数值信息。投射覆盖及有限维代数 Cartan 矩阵的基础构造，可对照 [4, Sections 9.1–9.3, pp. 209–212]。

引用 Webb 著作时，本章采用作者 2016 年 2 月 23 日公开稿的节号与结果编号。作者说明该稿与正式刊本的数学内容相同；稿件页码与刊本页码另有区别，以下引用使用节号。格约化与 Brauer 特征标见 [16, Sections 9.4, 10.1, Section 12.5]。

8.1 半单性的失效

当底域的特征整除群阶时，平均投影中的除法不再有意义。表示仍然可以有合成列，但这些简单商之间的扩张未必分裂；因此研究简单模还不够，还须研究不可分解模及其根层。本章以循环 p 群为反复计算的例子，始终区分直和分解与合成因子。

8.1.1 特征 p 整除群阶的情形

定义 8.1.1. 设 G 为有限群， k 为特征 $p > 0$ 的域。 G 的有限维 k 表示称为特征 p 的模表示 (modular representation)。本章重点讨论 $p \mid |G|$ 的情形；若 $p \nmid |G|$ ，定理 1.3.1 仍保证完全可约。

由命题 1.3.5, 当 $p \mid |G|$ 时, 增广映射

$$\varepsilon : kG \longrightarrow k, \quad \sum_g a_g g \longmapsto \sum_g a_g$$

没有 kG 线性截面。具体地, 一个不动元必须为 $c \sum_g g$, 它的增广为 $c|G| = 0$, 所以不能提升目标中的一。这既给出不完全可约的正则模, 也给出取不动空间不保持满射的例子。

最小的矩阵例子是 $C_p = \langle s \rangle$ 在 k^2 上作用为

$$s \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第一坐标轴和商都为平凡表示, 但没有不变补。这个表示与平凡二维表示有相同的两个简单合成因子, 却不同构: 前者的生成元不是恒等。后面定义的 Brauer 特征标会记录合成因子的重数, 不会额外记录这条扩张是否分裂。

8.1.2 群代数的根与不可分解模

设 A 为有限维含么 k 代数。其 Jacobson 根可写为全部简单左模的零化子的交, 记为 $J = J(A)$ 。若 M 为有限维左模, 则 JM 是其根 (radical of a module), 即全部极大子模的交; 商 M/JM 称为顶 (top of a module)。根层 $J^i M / J^{i+1} M$ 记录从顶逐步向下的简单成分。它们通常不能在原模中同时选成直和项。

命题 8.1.2. 设 k 为域, A 为有限维含么 k 代数, $J = J(A)$ 。则 J 幂零, A/J 半单。对任意有限维左 A 模 M , 全部根层 $J^i M / J^{i+1} M$ 都是半单模, 且 $JM = M$ 蕴涵 $M = 0$ 。
证明. 取左正则模 A 的有限合成列, 设长度为 ℓ 。 J 零化每个简单商, 故乘以 J 将每一步送入前一步, 迭代得到 $J^\ell A = 0$, 即 $J^\ell = 0$ 。有限维代数的半单商结构由第二卷定理 15.1.4 及该节建立的半单商分解给出: A/J 为有限个除环上矩阵代数的直积。每个根层被 J 零化, 是 A/J 模, 因而半单。最后若 $JM = M$, 则 $M = J^\ell M = 0$ 。 $\square$

上述最后一步是这里需要的 Nakayama 引理¹。它也说明为什么顶不能为零: 任何非零有限维模都有非零的顶。有限维模按不可分解项的直和分解及其唯一性可用第二卷定理 12.4.2; 该定理的有限长度条件在此由有限维性满足。不可分解模的各根层则可能包含多种简单模。

命题 8.1.3. 设 p 为素数, P 为有限 p -群, k 为特征 p 的域, $\varepsilon : kP \rightarrow k$ 为增广映射 $\sum_g a_g g \mapsto \sum_g a_g$ 。唯一的简单左 kP -模是平凡一维模 k , 且

$$J(kP) = \ker \varepsilon, \quad kP/J(kP) \cong k.$$

因此 kP 是局部代数。

¹中山正 (假名: なかやまだし, 罗马音: Tadashi Nakayama, 1912-1964), 日本数学家, 研究环论和群表示论。

证明. 按 $|P|$ 归纳. 若 $P \neq 1$, 第一卷定理 4.2.5 给出 $p \mid |Z(P)|$: 类方程中各非中心类的大小都被 p 整除. 取中心中一个非单位元, 再取其适当的 p 次幂, 便得阶恰为 p 的元 z . 在简单模 S 上, $z-1$ 是模自同态, 且 $(z-1)^p = z^p - 1 = 0$. Schur 引理使非零自同态可逆, 幂零自同态不可能可逆, 所以 $z-1$ 作用为零. 于是 S 通过较小的 $P/\langle z \rangle$ 作用, 归纳使它平凡. 平凡作用下简单性又迫使维数为一. 根是这个唯一简单模的零化子, 恰为增广理想. 模掉根是域, 所以非单位元恰为根, 代数局部. $\square$

例如一个非循环 p 群仍然只有一个简单模, 但其不可分解模远不止一种. 简单类型的数目很少, 并不意味着扩张和直和分解的分类也很短.

8.1.3 循环 p 群的基本例子

定理 8.1.4. 设 p 为素数, k 为特征 p 的域, $r \geq 1$ 为整数, $G = C_{p^r} = \langle s \rangle$, 并记 $m = p^r$. 则

$$kG \cong k[t]/(t^m), \quad t \mapsto s-1.$$

全部有限维不可分解左 kG -模的同构类代表恰为

$$M_d = k[t]/(t^d), \quad 1 \leq d \leq m.$$

每个有限维左 kG -模唯一分解成这些模的直和, 唯一性指各项同构类的重数唯一. 记 $J = J(kG)$, 则对 $i \geq 0$ 及 $1 \leq a, b, d \leq m$ 有

$$J^i M_d = t^i M_d, \quad \text{soc}(M_d) = kt^{d-1}, \quad \dim_k \text{Hom}_{kG}(M_a, M_b) = \min(a, b).$$

其中基座 (socle) $\text{soc}(M_d)$ 是全部简单子模之和.

证明. 特征 p 中重复使用 $(x-1)^p = x^p - 1$, 得到 $(s-1)^m = 0$. 由 $s = 1+t$ 可知所给代数同态满射, 两侧维数都是 m , 故同构. 模结构因此由满足 $T^m = 0$ 的线性算子 T 决定. 幂零算子的 Jordan 链分解, 或第二卷定理 4.3.2 在 $k[t]$ 上的应用, 给出模为 $k[t]/(t^d)$ 的直和, 且 $d \leq m$. 这里多项式只有不可约因子 t , 所以不要求 k 代数闭. M_d 的自同态由 T 的像决定, 环为 $k[t]/(t^d)$. 这个环的常数项非零元素可用有限几何级数求逆, 常数项零元素幂零, 故它局部, 没有非平凡幂等元. 因此 M_d 不可分解; 不同 d 的维数不同. 任一分解中, 大小至少为 j 的块数等于

$$\dim \ker T^j - \dim \ker T^{j-1},$$

所以块的重数唯一. 根层由 $J = (t)$ 直接给出; 简单子模被 t 零化, 而 $\ker(t: M_d \rightarrow M_d) = kt^{d-1}$, 得到基座. 最后, $M_a \rightarrow M_b$ 的同态由一个满足 $t^a v = 0$ 的 $v \in M_b$ 决定, 这个核的维数为 $\min(a, b)$. $\square$

这些模的全部子模也成一条链. 因为 M_d 是 $k[t]$ 的循环商模, 子模对应包含 (t^d) 的理想, 恰为 (t^j) , $0 \leq j \leq d$. 例如 M_3 的根层各为一个平凡模, 却不是三个平凡模的直和; 其不动空间只有一维, 后者有三维.

8.2 投射与块

非半单模往往不能拆成简单模，但仍可用投射模覆盖它。不可分解投射模由简单顶来区分，Cartan 矩阵记录它们内部的合成因子；块则把整个代数分成互不联系的部分。本节先把这三种层次分别说清，再在小群中计算。

8.2.1 不可分解投射模

若 P 为有限维左 A 模，且每个到 P 的满射都分裂，便称 P 投射；等价地，从 P 出发的同态可沿任意满射提升。有限生成情形中，这又等价于 P 是有限自由模的直和因子。将满射 $A^n \rightarrow P$ 分裂即可得到后一条件，反向的提升可先在自由模上逐基选取。

定义 8.2.1. 设 k 为域， A 为有限维含么 k 代数， P, M 为有限维左 A -模。若 $\pi: P \rightarrow M$ 为满射模同态， P 投射，并且 $\ker \pi$ 是多余子模，即 $U + \ker \pi = P$ 对子模 $U \subseteq P$ 只能在 $U = P$ 时成立，就称 π 为 M 的**投射覆盖** (projective cover)。

命题 8.2.2. 设 k 为域， A 为有限维含么 k 代数， $J = J(A)$ ， P, M 为有限维左 A -模，且 P 投射、 $\pi: P \rightarrow M$ 为满射模同态。 π 是投射覆盖，当且仅当 $\ker \pi \subseteq JP$ ，也当且仅当它诱导的映射 $P/JP \rightarrow M/JM$ 为同构。

证明. 若 $N = \ker \pi$ 多余，则任何极大子模都包含 N ，否则与 N 的和为 P ，矛盾。故 $N \subseteq JP$ 。反过来，若 $N \subseteq JP$ 且 $U + N = P$ ，则 $P/U = J(P/U)$ ，由命题 8.1.2 为零。最后 $\pi(JP) = JM$ ，商映射的核为 $(N + JP)/JP$ ，得到等价性。□

对 $A = k[t]/(t^m)$ ，自然满射 $A \rightarrow M_d$ 是投射覆盖，因为核 (t^d) 包含在根 (t) 中。当 $d < m$ 时它不分裂：若分裂，循环模 A 就有非平凡直和分解，与其局部自同态环矛盾。所以这些较短的不可分解模都不是投射模。

8.2.2 投射覆盖与 Cartan 矩阵

定理 8.2.3. 设 k 为域， A 为有限维含么 k 代数，且对正整数 $s, n_1, \dots, n_s$ 有

$$A/J(A) \cong \prod_{i=1}^s M_{n_i}(k).$$

取简单左 A -模的同构类代表 $S_1, \dots, S_s$ ，其中 $\dim_k S_i = n_i$ ，记 $[M : S_i]$ 为 S_i 在有限维左 A -模 M 的合成列中的重数。则每个 S_i 有不可分解投射覆盖 $P_i \rightarrow S_i$ ，且作为左 A -模有

$$A \cong \bigoplus_i P_i^{\oplus n_i}, \quad \dim_k \operatorname{Hom}_A(P_i, M) = [M : S_i]$$

对任意有限维左 A 模 M 成立。全部有限维投射模均为这些 P_i 的直和，各 P_i 的类型由顶 S_i 唯一确定。

证明. 利用根的幂零性及第二卷定理 15.3.4，把商中各矩阵块的对角矩阵单位提升为一组完整正交幂等元 e_{ij} ， $1 \leq j \leq n_i$ 。令 $P_{ij} = Ae_{ij}$ 。它们是正则模的直和因子，顶为简单列模 S_i ，且自然商的核为 Je_{ij} ，由命题 8.2.2 为覆盖。顶简单也使 P_{ij} 不可分解：若它分成两个非零项，两项的顶都非零，会分解这个简单顶。同一个简单模的两个覆盖

必在目标上同构。确实, 投射性给相互提升 $u: P \rightarrow P', v: P' \rightarrow P$, 复合 vu 在顶上为恒等。于是 $P = vu(P) + JP$, 对商用根幂零性得到 $vu(P) = P$; 有限维性使 vu 可逆。同理 uv 可逆, 从而 u 为同构。故 P_{ij} 只依赖 i , 记为 P_i , 正交分解给出正则模公式。一般 M 的顶是简单模的直和。取相应 P_i 之和, 通过投射性把到顶的同构提升为到 M 的映射; 余核的顶为零, 故余核为零, 且核包含来源的根。这构造了 M 的覆盖。若 M 投射, 这个覆盖分裂, 而多余的核在分裂中只能为零, 所以 M 就是这些 P_i 的直和。最后 $\text{Hom}_A(P_i, S_j)$ 的维数为 δ_{ij} , 因为所有映射都通过简单顶, 再用分裂假设下的 Schur 引理。函子 $\text{Hom}_A(P_i, -)$ 正合, 沿 M 的合成列逐步取维数, 便得到重数公式。 $\square$

定义 8.2.4. 设 k 为域, A 为有限维含么 k 代数, 且 $A/J(A) \cong \prod_{i=1}^s M_{n_i}(k)$, 其中 s, n_i 为正整数。取全部简单左 A -模的不同构代表 S_i , 以及它们的有限维投射覆盖 $P_i \rightarrow S_i$, 以 $[P_j: S_i]$ 表示合成因子的重数, 记

$$c_{ij} = [P_j: S_i] = \dim_k \text{Hom}_A(P_i, P_j).$$

矩阵 $C_A = (c_{ij})$ 称为 A 的 **Cartan 矩阵** (Cartan matrix of an algebra)。本章按“行对应简单模, 列对应投射覆盖”排列; 它不是后来由根系定义的另一种 Cartan 矩阵。

在循环 p^r 群的例子中, 唯一的 P_1 是 $kG = M_{p^r}$, 故 Cartan 矩阵为一阶矩阵 (p^r) 。这个数字记录合成长度, 不是不可分解投射模的种类数。

8.2.3 块分解的基本概念

定义 8.2.5. 设 k 为域, A 为有限维含么 k 代数, $b \in Z(A)$ 为非零幂等元。若 b 不能再写成两个非零正交中心幂等元之和, 就称 b 为块幂等元, 称以 b 为单位的代数 Ab 为 A 的一个块 (block)。

反复分解中心幂等元, 维数下降使过程终止, 得到

$$1 = b_1 + \cdots + b_\ell, \quad A \cong \prod_{\nu=1}^{\ell} Ab_\nu.$$

这个分解唯一到重排: 若另有 $1 = \sum c_\mu$, 则 $b_\nu = \sum_\mu b_\nu c_\mu$ 是正交中心幂等分解, 本原性使恰有一项非零, 再对 c_μ 同样分析, 就使两组块对应相等。任何模都有 $M = \bigoplus_\nu b_\nu M$, 不可分解模只属于其中一个块。不同块之间的模同态为零, 扩张也分裂, 因为对扩张中项分别乘各 b_ν 即给出分解。

例 8.2.6. 设 k 为特征二的域, $G = S_3 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$ 。令

$$e = 1 + r + r^2, \quad f = 1 - e.$$

有 $e^2 = e$, 且 e 中心, 故 f 也是中心幂等元。理想 kGe 以 e, se 为基, 乘法由 $(se)^2 = e$ 给出, 所以它同构于 kC_2 , 是二维局部块。

另一块是矩阵代数。取二维表示

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

有 $R^3 = S^2 = I$ 、 $SRS = R^{-1}$ ，且 $I + R + R^2 = 0$ ，所以 e 作用为零， f 作用为恒等。矩阵 I, R, S, RS 线性无关：比较一个线性组合的四个条目即可依次令四个系数为零。因而 $kGf \rightarrow M_2(k)$ 满射；来源维数为四，故同构。于是恰有两个简单模，分别为平凡模 S_1 和上述二维模 S_2 。后者已经投射，前者的覆盖为 kGe ，因此

$$C_{kS_3} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这里 $p \mid |S_3|$ ，却仍有一个半单矩阵块。模特征使整个群代数不半单，并不要求每个块都非半单。

8.3 Brauer 特征标

正特征中的矩阵迹会把整数重数约化模 p ，所以丢掉一部分信息。Brauer 特征标改为先提升适当的单位根，再在特征零中相加。为了让这种提升与普通表示的约化对应，必须同时说明基域、赋值环和整数格；只说“把矩阵模 p ”并不足以定义分解数。

8.3.1 p -正则元素

定义 8.3.1. 设 G 为有限群， p 为素数。若 $g \in G$ 的阶与 p 互素，就称 g 为 p -正则元素 (p -regular element)。全体此类元素记为 $G_{p'}$ ；其余元素称为 p -奇异元素。这个集合在共轭下稳定，但通常不是子群。

设 k 的特征为 p ， g 的阶为 m 且 $p \nmid m$ 。在任一表示上， g 的最小多项式整除 $X^m - 1$ ；后者与导数 mX^{m-1} 互素，所以在分裂域上 g 可对角化，特征值都是阶与 p 互素的单位根。这正是定义 Brauer 特征标时选择这些元素的原因。

引理 8.3.2. 设 G 为有限群， p 为素数， k 为特征 p 的域， V 为有限维左 kG -模。每个 $g \in G$ 唯一写成 $g = g_p g_{p'} = g_{p'} g_p$ ，其中两因子都属于 $\langle g \rangle$ ，前者的阶为 p 的幂，后者的阶与 p 互素。并且

$$\mathrm{tr}_k(g|V) = \mathrm{tr}_k(g_{p'}|V).$$

证明. 在阶为 $p^a m$ 、 $p \nmid m$ 的循环群中，中国剩余定理将指数分成模 p^a 与模 m 的两部分，给出存在与唯一性。扩到代数闭包不改变迹。此时 $g_{p'}$ 对角化，而 g_p 与它交换，故保持其每个特征空间。在这些空间上， $(g_p - I)^{p^a} = 0$ ，所以 g_p 的特征值全为一。若某特征空间上 $g_{p'}$ 的值为 λ ，则 g 在该空间的迹为 λ 乘该空间维数，与 $g_{p'}$ 相同。相加即得。□

这里的等式只比较 k 中的迹，并没有恢复被模 p 丢掉的整数。比如 p 个平凡模的直和，在所有群元素上的 k 值迹都是零，却当然不是零模。

8.3.2 普通特征标与 Brauer 特征标

定义 8.3.3. 设 p 为素数, $\mathcal{O}$ 为离散赋值环, 其分式域 K 的特征为零, 唯一非零极大理想为 (π) , 剩余域 $k = \mathcal{O}/(\pi)$ 的特征为 p . 三元组 $(K, \mathcal{O}, k)$ 称为一个 p -模系统 (p -modular system). 对有限群 G , 若 KG 与 kG 的半单商均为相应基域上全矩阵代数的直积, 就称它为 G 的分裂 p -模系统。

这里用到的环性质是: $\mathcal{O}$ 是主理想整环, 有限生成无挠模自由, 每个非零元素等于单位乘以某个 π 的幂。本节把这样的系统作为给定数据。

为讨论分解矩阵, 以下使用分裂 p -模系统, 并进一步假设 K 含有所有 $|G|$ 次单位根。分裂域与模系统的准备可参阅 [16, Section 9.2, Theorem 9.2.6, Section 9.4]。分裂条件是这些证明的前提, 任意有限域未必满足它。

引理 8.3.4. 设 G 为有限群, $(K, \mathcal{O}, k)$ 为 p -模系统, 且 K 含有全部 $|G|$ 次单位根。若正整数 $m \mid |G|$ 且 $p \nmid m$, 则约化映射给出 K 中 m 次单位根与 k 中 m 次单位根的群同构。记相应唯一提升为 $\lambda \mapsto \hat{\lambda}$ 。

证明. 单位根的赋值为零, 所以都在 $\mathcal{O}^\times$ 中。多项式 $X^m - 1$ 在 K 中分成 m 个一次因子, 模 π 后仍是这些因子的乘积; 而在特征 p 中它仍可分, 所以这些根的约化两两不同, 并给出全部根。约化保持乘法, 故得到群同构。□

这些提升落在特征零的分圆域中。固定一个将该分圆域嵌入 $\mathbb{C}$ 的映射, 以下把提升后的单位根看成复单位根。选择一旦固定, 所有表示和张量运算都使用同一个提升。

定义 8.3.5. 设 G 为有限群, p 为素数, $(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p -模系统, K 含有全部 $|G|$ 次单位根, 且已固定这些单位根到复数的对应。记 $G_{p'}$ 为 p -正则元素集合, $\lambda \mapsto \hat{\lambda}$ 为约化映射 $\mathcal{O} \rightarrow k$ 所确定的阶与 p 互素单位根的唯一提升, 再按固定对应看成复单位根。对有限维左 kG -模 M , 令 $d = \dim_k M$ 。对 $g \in G_{p'}$, 将 g 在 M 上的特征值按重数写为 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 。函数 $\varphi_M : G_{p'} \rightarrow \mathbb{C}$, 由

$$\varphi_M(g) = \hat{\lambda}_1 + \dots + \hat{\lambda}_d$$

确定, 称为 M 的 **Brauer 特征标** (Brauer character)。其定义域只取 $G_{p'}$, 值在特征零中; 简单左 kG -模的 Brauer 特征标称为不可约 Brauer 特征标。

命题 8.3.6. 设 G 为有限群, p 为素数, $(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p -模系统, K 含有全部 $|G|$ 次单位根, 并固定这些根到复数的对应。设 L, M, N 为有限维左 kG -模, S_i 为全部简单左 kG -模的不同构代表, φ_X 表示模 X 的 Brauer 特征标, $[M : S_i]$ 表示合成因子的重数。这些特征标在 p -正则共轭类上为常数, 且对 p -正则元素 $g \in G$ 有

$$\varphi_M(1) = \dim_k M, \quad \varphi_{M \otimes N} = \varphi_M \varphi_N, \quad \varphi_{M^*}(g) = \varphi_M(g^{-1}) = \overline{\varphi_M(g)}.$$

对短正合列 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$, 有 $\varphi_M = \varphi_L + \varphi_N$ 。因而

$$\varphi_M = \sum_i [M : S_i] \varphi_{S_i}.$$

证明. 共轭矩阵有相同的特征值, 单位元的全部特征值为一, 得到前两个直接性质. 张量积的特征值为所有两两乘积; 单位根提升是群同态, 故其提升也两两相乘, 给出乘法公式. 对偶把特征值取逆, 而复单位根的逆为其共轭, 得到对偶公式. 将一个 p -正则元素生成的循环群限制到给定正合列. 因为该循环群的阶可逆, Maschke 定理使列在这个子群上分裂, 所以中项的特征值多重集为两端的并. 逐个提升后相加便得加法性; 沿合成列归纳得到最后一式. $\square$

在特征二的二维 S_3 模中, 三循环的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 其 k 值迹为一. 然而其两个特征值是非平凡三次单位根, 提升到复数后之和为 -1 . 因此 Brauer 特征标的值是 -1 , 不能把域中的迹 “一” 随意提升成复数一. 这些定义和性质可对照 [16, Section 10.1, Lemma 10.1.1, Proposition 10.1.3].

8.3.3 分解映射与分解数

定义 8.3.7. 设 G 为有限群, p 为素数, $(K, \mathcal{O}, k)$ 为 p -模系统, (π) 为 $\mathcal{O}$ 的极大理想, V 为有限维左 KG -模. 若 $L \subseteq V$ 是被 G 保持的有限自由 $\mathcal{O}$ 子模, 且其一组 $\mathcal{O}$ 基也是 V 的 K 基, 就称 L 为 V 中的一个满的 G -稳定格 (lattice). 商 $L/\pi L$ 是一个有限维左 kG -模, 称为该格的约化.

定理 8.3.8 (Brauer–Nesbitt). 设 G 为有限群, p 为素数, $(K, \mathcal{O}, k)$ 为 p -模系统, (π) 为 $\mathcal{O}$ 的极大理想, V 为有限维左 KG -模. 则 V 有满的 G -稳定格; 任意两个这种格 L_1, L_2 的约化 $L_1/\pi L_1, L_2/\pi L_2$ 具有相同的简单左 kG -模合成因子及重数, 但不必同构.

证明. 先任取 K 基 $v_1, \dots, v_d$, 令 L 为所有 gv_i 的 $\mathcal{O}$ 线性生成空间. 它有限生成、无挠且被 G 保持; 由主理想整环上的模结构, 它自由, 清分母可知其秩恰为 d , 所以是满格. 两满格可通约: 分别把一组格基用另一组表示, 给有限多个系数清去 π 的负幂, 就能把某个 $\pi^a L_1$ 包含于 L_2 , 再夹在 L_2 的某个 π 次幂之上. 乘以 π^a 给出原格与缩放格的 $\mathcal{O}G$ 模同构, 所以只需比较 $L_1 \subseteq L_2$. 商 L_2/L_1 有有限长度, 可以沿合成列在两格间插入有限多个稳定格, 归约到 L_2/L_1 简单的情形. 因为这个商被某个 π 次幂零化, 而 π 在简单商上的乘法若非零就满射, 故只能被 π 本身零化. 因此 $\pi L_2 \subseteq L_1$, 得到链

$$L_2 \supseteq L_1 \supseteq \pi L_2 \supseteq \pi L_1.$$

两个约化的合成因子共有 $L_1/\pi L_2$ 这一部分, 剩余的商分别为 L_2/L_1 和 $\pi L_2/\pi L_1$. 乘以 π 给出这两个商的模同构: 满射显然, 核等式由格无挠得到. 所以两约化的合成因子多重集相同; 沿插入的有限链传递即得一般结论. $\square$

这条格无关性称为 Brauer–Nesbitt 定理²的格约化形式, 见 [16, Theorem 9.4.8]. 必须保留 “合成因子” 这一表述: 取 $G = C_2$ 、 $\mathcal{O} = \mathbb{Z}_{(2)}$ 、 $V = \mathbb{Q}G$, 格 $\mathcal{O}\{1, s\}$ 的约化是不可分解的正则模, 格 $\mathcal{O}(1+s) \oplus \mathcal{O}(1-s)$ 的约化却是两个平凡模的直和.

定义 8.3.9. 设 G 为有限群, p 为素数, $(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p -模系统, (π) 为 $\mathcal{O}$ 的极大理想. 令 $G_0(kG)$ 为以有限维左 kG -模的同构类生成、并对每个短正合列 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow$

²内斯比特 (Cecil James Nesbitt, 1912-2001), 美国数学家, 与布劳尔合作研究模表示论; 布劳尔已见本卷前注.

$N \rightarrow 0$ 加入 $[M] = [L] + [N]$ 的交换群。Jordan-Hölder 定理³使它是全部简单左 kG -模的不同构代表类 $[S_i]$ 为基的自由交换群。令 $R_K(G)$ 为有限维左 KG -模的表示群。对每个这样的模 V , 选择其中的满的 G -稳定格 L , 则对应

$$d : R_K(G) \longrightarrow G_0(kG), \quad [V] \mapsto [L/\pi L]$$

称为**分解映射** (decomposition map)。取全部简单左 KG -模的不同构代表 V_α , 以及其中的满的 G -稳定格 L_α , 定义

$$d_{\alpha i} = [L_\alpha/\pi L_\alpha : S_i].$$

这些非负整数称为**分解数** (decomposition numbers), 矩阵 $D = (d_{\alpha i})$ 称为分解矩阵, 行对应特征零简单模, 列对应特征 p 简单模。

前一定理保证它与格的选择无关。直和格给出加法性; 张量格给出乘法性, 所以若两群都配张量乘积, d 还是环同态。这里 G_0 使用的是短正合关系, 不是把非分裂扩张误认成实际直和。

命题 8.3.10. 设 G 为有限群, p 为素数, $(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p -模系统, (π) 为 $\mathcal{O}$ 的极大理想, K 含有全部 $|G|$ 次单位根, 并固定这些根到复数的对应。设 V 为有限维左 KG -模, L 为其中的满的 G -稳定格, χ_V 为按此对应得到的普通特征标, $G_{p'}$ 为 p -正则元素集合, φ_M 表示左 kG -模 M 的 Brauer 特征标。取简单左 KG -模代表 V_α 及其中的稳定满格 L_α , 记其普通特征标为 χ_α , 取简单左 kG -模代表 S_i , 记 $d_{\alpha i} = [L_\alpha/\pi L_\alpha : S_i]$ 。则

$$\chi_V|_{G_{p'}} = \varphi_{L/\pi L}, \quad \chi_\alpha|_{G_{p'}} = \sum_i d_{\alpha i} \varphi_{S_i}.$$

证明. 设 $g \in G_{p'}$ 的阶为 m 。它在 L 上有系数位于 $\mathcal{O}$ 的特征多项式, 约化后就是在 $L/\pi L$ 上的特征多项式。其根均为 m 次单位根, 且这些单位根的约化互异; 因而每个根及其重数在约化后对应到唯一的根及相同重数。把根再提升回来, 就恢复 $\chi_V(g)$ 。第二式由 Brauer 特征标对合成因子的加法性得到。□

定理 8.3.11. 设 G 为有限群, p 为素数, $(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p -模系统, K 含有全部 $|G|$ 次单位根, 并固定这些根到复数的对应, $G_{p'}$ 为 p -正则元素集合。不可约 Brauer 特征标构成 $G_{p'}$ 上复类函数空间的一组基。因此简单左 kG -模的同构类型数等于 p -正则共轭类数; 两个有限维左 kG -模有相同 Brauer 特征标, 当且仅当它们有相同的简单合成因子及重数。

证明. 先证线性无关。简单模 S_i 的 k 值迹作为 kG 上的线性函数两两独立: 在 $kG/J \cong \prod_i \text{End}_k(S_i)$ 中, 取第 i 块的一个对角矩阵单位, 其各个简单迹为 δ_{ij} , 再提升到群代数即可检验独立性。群元素是 kG 的基, 因此这些迹限制到 G 上仍独立。由引理 8.3.2, 所有值由 p -正则元素上的值确定, 故相应矩阵在 k 中有一个非零的满行秩子式。把这个子式中的各迹换成在 $\mathcal{O}$ 中取值的 Brauer 特征标, 约化后恢复原子式。因此提升后的

³若尔当 (Camille Jordan, 1838-1922), 法国数学家, 研究群论与代数方程; 赫尔德 (Otto Ludwig Hölder, 1859-1937), 德国数学家, 研究群论与分析。

行列式非零。在固定的分圆域嵌入下它仍非零，于是复值 Brauer 特征标线性无关。再证生成性。先在分裂的特征零群代数 KG 上对 $\text{Hom}_K(V_\alpha, V_\beta)$ 的共轭作用取平均。平均算子的像是交织空间，分裂假设与 Schur 引理使其维数为 $\delta_{\alpha\beta}$ ，故取迹得到

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\alpha(g^{-1}) \chi_\beta(g) = \delta_{\alpha\beta}.$$

这些等式在固定的分圆域嵌入下仍成立，所以复值普通特征标线性无关。另一方面， $Z(KG)$ 的共轭类和基说明其维数为共轭类数；半单分裂的矩阵块分解又说明该维数等于简单模数。因此这些特征标恰构成全部复类函数的一组基。任一 $G_{p'}$ 上的类函数可以在其余共轭类补零，故普通不可约特征标的限制生成所需空间。命题 8.3.10 又把每一个这样的限制写成不可约 Brauer 特征标的线性组合，得到生成性。最后用命题 8.3.6 和刚证的独立性比较系数，得到合成因子的判别。□

对于特征二的 S_3 ，例 8.2.6 已经给出两个简单模。两类 2-正则元素由 $1, r$ 代表，故

$$\begin{array}{c|cc} & 1 & r \\ \hline \varphi_{S_1} & 1 & 1 \\ \varphi_{S_2} & 2 & -1 \end{array} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

三行普通表示依次为平凡、符号和标准二维表示。前两者约化后相同；二维整系数标准表示约化后是前述简单模。由此直接计算 $D^T D = \text{diag}(2, 1) = C_{kS_3}$ 。这是本例的计算；一般的 Cartan-分解矩阵关系及投射模提升需要另作证明，可参阅 [16, Section 9.5, Corollary 9.5.6]。

8.4 模表示理论补充

本章的几个计算已经说明，特征零表示、模表示和投射模之间有联系，却不能彼此替换。本节用约化与诱导的相容性说明第一种联系，再用一个能够直接计算的截断映射说明块的缺陷群。更深的块分类还需要其他工具，这里先把问题和所需理论说明清楚。

8.4.1 模表示与 Brauer 诱导理论的区别

第五章的 Brauer 诱导定理在特征零表示环中，把普通特征标写成由某些子群的一维特征标诱导而来的整数线性组合。本章的 Brauer 特征标则在特征 p 中先取表示，再把 p -正则特征值提升到特征零；分解矩阵记录整格约化的合成因子。两种理论处理不同的构造，不能因为都冠以 Brauer 之名就将其结论互换。

命题 8.4.1. 设 G 为有限群， $H \leq G$ ， p 为素数，并给定对 G, H 都分裂的 p -模系统 $(K, \mathcal{O}, k)$ 。记 $d_G: R_K(G) \rightarrow G_0(kG)$ 、 $d_H: R_K(H) \rightarrow G_0(kH)$ 为分解映射，其中表示群及 Grothendieck 群⁴都取有限维左模。它们与限制、诱导相容：

$$d_G \text{Ind}_H^G = \text{Ind}_H^G d_H, \quad d_H \text{Res}_H^G = \text{Res}_H^G d_G.$$

⁴格罗滕迪克 (Alexandre Grothendieck, 1928-2014)，法籍数学家，重塑代数几何的概形与上同调方法。

右侧的诱导、限制作用于由短正合列定义的 G_0 群。

证明. 限制一个稳定满格仍是稳定满格, 其约化显然与限制交换. 若 L 是 KH 模 V 中的满格, 则 $\mathcal{O}G \otimes_{\mathcal{O}H} L$ 是 $\text{Ind}_H^G V$ 中的稳定满格: 按左陪集代表, $\mathcal{O}G$ 是有限自由右 $\mathcal{O}H$ 模, 这个张量是若干份 L 的直和, 且扩到 K 后得到所需诱导模. 模 π 后自然同构于 $kG \otimes_{kH} (L/\pi L)$. 诱导因右侧自由性保持正合列, 限制也保持正合列, 所以二者确实诱导 G_0 上的映射. 结合格选择无关性得到公式. $\square$

因此可以先诱导再约化, 也可以先约化再诱导, 得到相同的合成因子信息. 但这并不把任意模表示恢复为完全可约表示; G_0 本来就已经忘掉了非分裂扩张的区别。

8.4.2 缺陷群与块论简介

命题 8.4.2. 设 G 为有限群, p 为素数, k 为特征 p 的域, $P \leq G$ 为 p -子群, $C_G(P)$ 为其中心化子. 令 P 以共轭作用于 kG , 并记固定子代数 $(kG)^P$. 映射

$$\text{Br}_P^G : (kG)^P \longrightarrow kC_G(P), \quad \sum_{g \in G} a_g g \mapsto \sum_{g \in C_G(P)} a_g g$$

是保持单位的 k 代数同态, 称为此处的 **Brauer 映射** (Brauer map)。

证明. 加法、标量与单位的保持直接来自定义. 取两个 P 共轭不变的元素 $x = \sum a_g g$, $y = \sum b_h h$, 固定 $z \in C_G(P)$. 乘积中 z 的系数为

$$\sum_{gh=z} a_g b_h.$$

P 同时共轭二元组 (g, h) , 保持条件 $gh = z$, 且每个轨道内的系数乘积相同. 非平凡轨道的大小是正的 p 次幂, 在 k 中贡献为零. 剩余的固定二元组恰好满足 $g, h \in C_G(P)$, 其总贡献就是 $\text{Br}_P^G(x) \text{Br}_P^G(y)$ 的 z 系数. 逐个 z 比较即得乘法性. $\square$

定义 8.4.3. 设 G 为有限群, p 为素数, k 为特征 p 的域, b 为 kG 的块幂等元, 对 p -子群 $D \leq G$, 记 $\text{Br}_D^G : (kG)^D \rightarrow kC_G(D)$ 为保留中心化子上系数的 Brauer 映射. 若 D 满足 $\text{Br}_D^G(b) \neq 0$, 并且在满足这一条件的 p -子群中按包含关系极大, 就称 D 为块 kGb 的一个**缺陷群** (defect group)。

由于 $\text{Br}_1^G(b) = b \neq 0$, 且 G 有限, 这样的极大子群存在. 其进一步的共轭与结构性质属于块论; 这里采用支集截断的描述以便计算. 这个描述及其与一般定义的关系, 可参阅 [16, Corollaries 12.5.4–12.5.5]。

对例 8.2.6 中的 S_3 与特征二, 取 $P = \langle s \rangle$. 中心化子 $C_G(P) = P$, 故

$$\text{Br}_P^G(1 + r + r^2) = 1, \quad \text{Br}_P^G(r + r^2) = 0.$$

三个非平凡 2 子群均为这些共轭子群, 因此二维局部块的缺陷群为一个 Sylow 2 子群, 四维矩阵块的缺陷群为平凡群. 后者称为缺陷零块. 在任意有限 p 群上, 唯一块的幂等元为一, 而对整个群的截断仍为一, 所以其缺陷群就是整个群。

8.4.3 特征零与正特征下的表示分类

不可约 Brauer 特征标分类的是简单模，并由加法性确定任意模的合成因子。对于扩张信息，它有明确局限：循环 p 群上， M_d 与 $k^{\oplus d}$ 的 Brauer 特征标都只在单位元处取整数 d ，但前者不可分解，后者在 $d > 1$ 时可分解。分解矩阵同样保留约化后的合成因子，不指定某个整格约化的全部模结构。

有限群在正特征中甚至可以有无限多个不可分解表示。这里给一个不用分类定理的例子。设 k 是特征二的无限域， $G = C_2 \times C_2 = \langle x, y \rangle$ ，并在 k^2 上取

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho_\lambda(x) = I + N, \quad \rho_\lambda(y) = I + \lambda N \quad (\lambda \in k).$$

因为 $N^2 = 0$ ，两个矩阵交换且平方都为一，故给出表示。其自同态必须与 N 交换，恰为 $aI + bN$ ，组成局部环，所以每个表示不可分解。若两个参数的表示同构，同构矩阵 T 与 N 交换，再由 $T(\lambda N) = \mu NT$ 得到 $(\lambda - \mu)NT = 0$ 。 T 可逆且 $N \neq 0$ ，故 $\lambda = \mu$ 。于是得到一个参数化的无限族。

这个例子解释了为何后续会研究投射覆盖、块、相对投射性和稳定范畴，而不只寻找另一张有限的特征标表。一般缺陷群如何控制块、何时只有有限多种不可分解模，以及不同块之间的等价，都是进一步的问题。本编接下来改从箭图研究有限维代数；那里的表示可以在任意特征上定义，所用的无环性、关系和代数闭性条件仍须逐项写明。

本章小结

在模特征下，群代数的根和模的根层保留了非半单部分的信息。循环 p^r 群的群代数是 $k[t]/(t^{p^r})$ ，其不可分解模由幂零链的长度区分；它们虽然只有一种简单合成因子，直和结构仍不相同。投射覆盖按简单项排列，Cartan 矩阵记录投射模中的简单重数，块则把整个模范畴分成彼此没有同态和扩张的部分。

Brauer 特征标只在 p -正则元素上定义，并把剩余域中的单位根提升到特征零。这既保留了特征值及合成重数的整数信息，也说明它不能区分具有相同合成因子的不同扩张。分解数描述普通不可约表示约化后的简单成分；块的缺陷群则借助 Brauer 映射把块与 p 子群联系起来。

习题

习题 8.1* 设 $\text{char } k = 2$ ， $C_8 = \langle s \rangle$ 在十维空间 V 上作用。令 $T = s - 1$ ，已知

$$\dim \ker T^j = 3, 5, 7, 8, 9, 10 \quad (j = 1, \dots, 6).$$

求不可分解直和分解，以及顶、基座、不动空间和 T^5 的秩。

解. 相邻核维数之差为 3, 2, 2, 1, 1, 1，分别给出长度至少为 1, ..., 6 的幂零块数。故块长为 6, 3, 1， $V \cong M_6 \oplus M_3 \oplus M_1$ 。三个直和项各有一维顶和一维基座，故两者维数均为 3。不动空间为 $\ker(s - 1) = \ker T$ ，也为三维。最后 $\text{rank } T^5 = 10 - 9 = 1$ 。只有简单合成因子及其总数不能恢复这些块长，而各次核维数可以。□

习题 8.2*. 设 $G = C_m$, 其中 $m = p^r$, $\text{char } k = p$, $t = s - 1$. 对 $M_d = k[t]/(t^d)$, $1 \leq d \leq m$, 计算不动空间、余不动空间 M_d/tM_d 及两者之间的自然映射。再证明群的求和算子 $\sum_{j=0}^{m-1} s^j$ 等于乘 t^{m-1} , 并计算它在这些模上的像。

解. 不动空间是 kt^{d-1} , 余不动空间由 1 的类生成。自然映射由包含不动空间再取商给出: $d = 1$ 时为同构, $d > 1$ 时因 $t^{d-1} \in tM_d$ 而为零。在多项式环中,

$$\sum_{j=0}^{m-1} (1+t)^j = \frac{(1+t)^m - 1}{t} = t^{m-1},$$

其中商式是几何级数恒等式, 而特征 p 及 $m = p^r$ 给出 $(1+t)^m = 1 + t^m$. 故在 $d < m$ 时求和算子为零; 在 $d = m$ 时, 其像为 kt^{m-1} , 并诱导从一维余不动空间到一维不动空间的同构。□

习题 8.3*. 设 $P = C_p \times C_p = \langle s, u \rangle$, $\text{char } k = p$. 证明

$$kP \cong k[x, y]/(x^p, y^p), \quad x = s - 1, y = u - 1.$$

求根 J 、每层 J^i/J^{i+1} 的维数、最小的 N 使 $J^N = 0$, 以及正则模的基座。

解. 两生成元交换, 且 $x^p = y^p = 0$. 所给商以 $x^a y^b$, $0 \leq a, b < p$ 为基, 共 p^2 个; 到 kP 的映射满射且维数相等, 所以同构。根为 $J = (x, y)$, 第 i 层以全次数为 i 的上述单项式为基。因此层维数依次为

$$\dim J^i/J^{i+1} = \begin{cases} i+1, & 0 \leq i \leq p-1, \\ 2p-1-i, & p \leq i \leq 2p-2, \\ 0, & i \geq 2p-1. \end{cases}$$

最高非零单项式为 $x^{p-1}y^{p-1}$, 故 $J^{2p-2} \neq 0$, $J^{2p-1} = 0$. 一个元素同时被 x, y 零化, 当且仅当只含这个最高单项式; 因此基座为 $kx^{p-1}y^{p-1}$. □

习题 8.4*. 设 k 为特征 p 的无限域。记 V_λ 为 $C_p \times C_p$ 的二维表示, 两生成元分别作用为 $I + N$ 、 $I + \lambda N$, 其中 $N^2 = 0, N \neq 0$. 求任意参数 λ, μ 之间的同态空间及非零同态的秩。由此说明不同构的不可分解模之间也可以有非零同态。

解. 两生成元的矩阵交换且 p 次幂为恒等, 故确为表示。取基使 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 同态矩阵先须与 N 交换, 因而为 $f = aI + bN$; 第二生成元的条件为 $(\lambda - \mu)fN = 0$, 而 $fN = aN$. 所以当 $\lambda = \mu$ 时, 同态空间为 $kI + kN$, 其中 $a \neq 0$ 的映射可逆、 $a = 0, b \neq 0$ 的映射秩为一。当 $\lambda \neq \mu$ 时, 同态空间仅为 kN , 所有非零映射秩为一, 且两个这样的跨参数映射的复合为零。每个自同态环同构于局部环 $k[t]/(t^2)$, 所以模不可分解; 不同参数之间没有可逆同态, 却仍有一维同态空间。非半单情形下, 不能把简单模的 Schur 引理直接改成不可分解模的断言。□

习题 8.5*. 设 p 为素数, k 为特征 p 的域, $r \geq 1$ 为整数, $m = p^r$, $A = kC_{p^r} \cong k[t]/(t^m)$, $M_d = A/(t^d)$, 其中 $1 \leq d \leq m$. 给定 $1 \leq a, b \leq m$, 在 $\text{Hom}_A(M_a, M_b)$ 中, 求可经过有限维投射模分解的映射组成的子空间及其维数, 再求模掉该子空间后的维数。

解. 由定理 8.2.3 及唯一简单模的投射覆盖为 A , 每个有限维投射模都是有限个 A 的直和. 因此只须求经过 A 的映射之和. 映射 $M_a \rightarrow A$ 把 1 送到被 t^a 零化的元素, 即 $t^{m-a}A$ 中的元素; 随后映到 M_b , 所得 1 的像恰好遍历 $t^{m-a}M_b$. 这空间的维数为 $\max(0, a+b-m)$, 且已对加法封闭, 所以就是全部可经投射模分解的映射. 全部 Hom 的维数为 $\min(a, b)$, 故商空间维数为

$$\min(a, b) - \max(0, a+b-m) = \min(a, b, m-a, m-b).$$

这也直接显示, 当任一端为 $M_m = A$ 时, 商空间为零. $\square$

习题 8.6*. 设 p 为素数, k 为特征 p 的域, $r \geq 1$ 为整数, $m = p^r$, $A = k[t]/(t^m)$, 并对 $1 \leq d \leq m$ 令左模 $M_d = A/(t^d)$. 给定 $1 \leq a, b \leq m$, 按固定子模与商模的等价方式分类左 A -模的短正合列 $0 \rightarrow M_b \rightarrow E \rightarrow M_a \rightarrow 0$. 证明扩张类可由向量空间

$$\ker(t^{m-a} : M_b \rightarrow M_b)/t^a M_b$$

参数化, 并求这个空间的维数. 证明中直接使用生成元, 不要求先调用消解计算.

解. 把子模生成元记为 u , 取商模生成元 $1 \in M_a$ 的提升 $v \in E$. 因为 t^a 在商上为零, 有 $t^a v = w \in M_b$. 又因 $t^m E = 0$, 必有 $t^{m-a} w = 0$. 反过来, 给定满足此条件的 w , 在向量空间 $M_b \oplus \text{span}_k(v, tv, \dots, t^{a-1}v)$ 上定义 t 的作用: 在 M_b 上用原作用, 沿第二组基逐次后移, 并把最后一项送到 w . 条件保证 $t^m = 0$, 所以得到所需扩张, 且子模的嵌入不发生额外退化. 改变提升为 $v + z$, $z \in M_b$, 把 w 改为 $w + t^a z$. 固定两端的任何扩张同构都只能这样改变商生成元的提升, 因此等价类恰为所列商空间; 参数零恰好对应可以取 $t^a v = 0$ 的分裂扩张. 核的维数为 $\min(m-a, b)$, 而 $t^a M_b$ 的维数为 $\max(0, b-a)$. 相减得到

$$\min(m-a, b) - \max(0, b-a) = \min(a, b, m-a, m-b).$$

$\square$

习题 8.7*. 设 k 为特征 2 的域, $A = kC_4 \cong k[t]/(t^4)$, $M_d = A/(t^d)$, $1 \leq d \leq 4$. 对左 A -模短正合列 $0 \rightarrow M_2 \rightarrow E \rightarrow M_2 \rightarrow 0$, 记指定子模的生成元为 u , 商模生成元的提升为 v , 把扩张参数写成 $t^2 v = \alpha u + \beta tu$. 分别讨论 $\alpha \neq 0$, $\alpha = 0, \beta \neq 0$, $\alpha = \beta = 0$ 时中间项的不可分解直和类型.

解. 上一题中 $m = 4, a = b = 2$, 整个 M_2 都可作为参数, 且 $t^2 M_2 = 0$, 所以参数确为 $\alpha + \beta t$, 不同参数给出不同扩张类. 若 $\alpha \neq 0$, 有 $t^3 v = \alpha tu \neq 0$. 向量 $v, tv, t^2 v, t^3 v$ 线性无关, 故 $E \cong M_4$. 若 $\alpha = 0, \beta \neq 0$, 有 $t^2 v = \beta tu \neq 0, t^3 v = 0$, 故四维模含有一个长度三的幂零块, 剩余一维给出 $E \cong M_3 \oplus M_1$. 若参数为零, v 生成一个与指定子模互补的 M_2 , 故 $E \cong M_2 \oplus M_2$. 扩张类的两个标量参数与中间项的三种同构类型记录的是不同的分类要求. $\square$

习题 8.8*. 设 G 为有限群, k 的特征为 p , P 为一个 Sylow p 子群. 证明每个有限维投射 kG -模的维数都被 $|P|$ 整除, 并给出维数可被 $|P|$ 整除却不投射的模.

解. 将 G 分为互不相交的集合 Pg , 可知左 kP -模 kG 自由。因此投射 kG -模限制到 P 后, 是有限自由 kP -模的直和因子, 仍投射。 kP 是局部代数, 唯一简单模为 k , 其投射覆盖为 kP 。由定理 8.2.3, 有限维投射 kP -模都是有限自由模, 维数为 $|P|$ 的倍数。反例取 $G = C_p$ 及 p 维平凡模 $k^{\oplus p}$ 。如果它投射, 便应为秩一自由 kC_p -模; 但自由模的生成元 s 作用并非恒等, 而平凡模中作用恒等, 矛盾。 $\square$

习题 8.9*. 设 G 为有限群, k 为任意域, P 为有限维投射 kG -模, V 为任意有限维 kG -模。证明带对角群作用的 $P \otimes_k V$ 仍投射。

解. 先看 $kG \otimes_k V$ 。从对角作用的版本到只在第一因子作用的版本, 定义

$$g \otimes v \mapsto g \otimes g^{-1}v.$$

它的逆为 $g \otimes v \mapsto g \otimes gv$ 。对 $h \in G$, 对角作用后的像为 $hg \otimes (hg)^{-1}(hv) = hg \otimes g^{-1}v$, 恰为目标上的左作用, 故这是模同构。目标按 V 的一组基为 $\dim V$ 份正则模, 因而自由。取 P 在某个 $(kG)^r$ 中的直和补, 张量保持此直和分解, 所以 $P \otimes V$ 为自由模 $(kG \otimes V)^r$ 的直和因子, 因而投射。 $\square$

习题 8.10*. 设 $G = C_p$, $\text{char } k = p$, M_2 中生成元的矩阵为 $I + N$, 其中 $N^2 = 0, N \neq 0$ 。分别在 $p = 2$ 和 $p > 2$ 时求对角作用的 $M_2 \otimes_k M_2$ 的不可分解分解。

解. 取基 u, v 满足 $Nu = 0, Nv = u$ 。记张量基为 $a = u \otimes u, b = u \otimes v, c = v \otimes u, d = v \otimes v$ 。若 $D = s - 1$, 则

$$Da = 0, \quad Db = Dc = a, \quad Dd = b + c + a.$$

因此 $\text{rank } D = 2$, 且 $D^2d = 2a$, 其余基向量的二次像为零, $D^3 = 0$ 。若 $p = 2$, $D^2 = 0$, 四维空间上的秩二幂零算子由两个长度二块组成, 故张量积为 $M_2^{\oplus 2}$ 。若 $p > 2$, 二次幂秩为一, 块长为 3, 1, 故张量积为 $M_3 \oplus M_1$ 。 $p = 2$ 时 $M_2 = kC_2$ 投射, 其张量积的结果也符合上一题。 $\square$

习题 8.11*. 设 $A = T_2(k)$, 取顶点幂等元 $e_i = E_{ii}$ 和简单模 $S_i = Ae_i/J(A)e_i$ 。按本章“行是简单模、列是投射覆盖”的约定计算 Cartan 矩阵, 说明一般有限维代数的 Cartan 矩阵不必对称。

解. 根为 kE_{12} 。 Ae_1 只有基向量 E_{11} , 所以 $P_1 = S_1$ 。 Ae_2 的基为 E_{12}, E_{22} , 根子模 kE_{12} 同构于 S_1 , 商为 S_2 。因此

$$C_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它不对称。这个计算也提示 Cartan 矩阵的指标顺序必须固定, 不能根据名称把它当成根系中的对称化数据。 $\square$

习题 8.12*. 设 $\text{char } k = 3$, $G = C_3 \times C_2 = \langle r \rangle \times \langle s \rangle$ 。求 kG 的块、简单模、不可分解投射模及 Cartan 矩阵。再证明与 $s \mapsto -1, r \mapsto 1$ 的一维表示作张量会交换两个块中的模。

解. 因为 2 可逆, 中心幂等元 $e_+ = (1+s)/2$ 、 $e_- = (1-s)/2$ 正交且和为一。每个角理想 $kGe_{\pm}$ 都同构于局部代数 $kC_3 \cong k[t]/(t^3)$, 故它们恰为两个块。简单模 S_+, S_- 均为一维, r 平凡作用, s 分别按 1, -1 作用。投射覆盖为 $P_{\pm} = kGe_{\pm}$, 每个有三个相同的简单合成因子, 所以 $C = \text{diag}(3, 3)$ 。与指定一维表示作张量后, r 的矩阵不变而 s 的矩阵乘 -1, 因此 e_+, e_- 的作用互换。块分解使同态和扩张分开, 却不表示张量任意表示都保持原块。□

习题 8.13*. 设 $\text{char } k = 2$, 采用例 8.2.6 的 S_3 块幂等元 e, f 。令 $I = \ker(\varepsilon : kS_3 \rightarrow k)$ 。将 I 分解为不可分解模, 并求 I 的不动空间及它与 $J(kS_3)$ 的关系。

解. 局部块 kGe 以 e, se 为基, 二者的增广都为 $3 = 1$, 故其增广核是 $k(e + se) = k \sum_{g \in G} g$, 为平凡一维模。又因 $\varepsilon(f) = 1 - \varepsilon(e) = 0$, 矩阵块 kGf 整体包含在 I 中。该块同构于 $M_2(k)$, 作为左模是二维简单模 S_2 的两份直和, 因此

$$I \cong S_1 \oplus S_2^{\oplus 2}.$$

矩阵块没有根, 局部二维块的根就是 $k(e + se)$, 所以 $J(kS_3) = k \sum_g g \subsetneq I$ 。不动空间只来自 S_1 ; 非平凡简单模 S_2 不含平凡子模。因此 $I^G = J(kS_3)$ 为一维。增广理想与群代数的根在一般有限群中可以不同, 即使特征整除群阶。□

习题 8.14*. 证明 S_3 的 3-正则元素不构成子群。再设 g 的阶为 12, 按 $p = 2$ 写出其交换的 p 部分与 p' 部分, 并核验两部分的阶。

解. 恒等元及三个换位的阶与 3 互素, 但两个不同换位的乘积是三循环, 所以该集合不封闭。对阶为 12 的 g , 取

$$g_2 = g^9, \quad g_{2'} = g^4.$$

前者的阶为 $12/\gcd(12, 9) = 4$, 后者的阶为 3, 且二者都在 $\langle g \rangle$ 中, 所以交换; 乘积为 $g^{13} = g$ 。指数 9 在模 4 时为 1、模 3 时为 0, 指数 4 则相反, 这就是相应的中国剩余分解。□

习题 8.15*. 设 k 的特征为 p , $G = C_p$ 。比较正则模 $M_p = kG$ 、 p 份平凡模的直和和零模的 k 值迹函数、Brauer 特征标及不动空间。哪些资料能够区分这三个对象?

解. G 的唯一 p -正则元素是恒等元。前两个模的 Brauer 特征标在该元素上都取整数 p , 零模取 0, 所以 Brauer 特征标区分它们与零模, 却不能区分这两个非零模。三者的 k 值迹函数都为零: 在两个 p 维模上, 每个群元素都幂零, 迹为域中的 $p = 0$ 。不动空间则分别为一维、 p 维及零维, 因而能够区分三者。普通的模特征矩阵迹会进一步丢掉整数重数, Brauer 特征标保留重数, 但仍不记录扩张是否分裂。□

习题 8.16*. 设 $G = C_{p^r} \times C_{\ell} = \langle s \rangle \times \langle h \rangle$, 其中 $p \nmid \ell$, 并固定本章的分裂 p -模系统。令 $\alpha \in k$ 为本原 ℓ 次单位根, $\zeta = \hat{\alpha}$ 。求全部简单模、不可分解模及它们的 Brauer 特征标, 再求分解矩阵和 Cartan 矩阵。

解. 中心幂等元

$$e_j = \frac{1}{\ell} \sum_{v=0}^{\ell-1} \alpha^{-jv} h^v \quad (0 \leq j < \ell)$$

将群代数分成 ℓ 个块, 每个块同构于 kC_{p^r} . 第 j 块的唯一简单模 S_j 由 $s \mapsto 1, h \mapsto \alpha^j$ 给出, 全部不可分解模为 $M_d \otimes S_j$, 其中 $1 \leq d \leq p^r$. p -正则元素恰为 h^v , 故

$$\varphi_{M_d \otimes S_j}(h^v) = d\zeta^{jv}.$$

在特征零中, 所有简单表示均一维, 由 s 的一个 p^r 次单位根及 $h \mapsto \zeta^j$ 确定. 前者约化后必须为 1, 因为特征 p 中 $X^{p^r} - 1 = (X - 1)^{p^r}$. 所以每个这样的普通表示约化为 S_j , 分解矩阵的相应行就是第 j 个标准行向量, 且每一种行重复 p^r 次. 每个简单模的投射覆盖是该块的正则模, 具有 p^r 个相同简单因子. 因此 $C = p^r I_\ell$, 也在本例直接满足 $D^\top D = C$. $\square$

习题 8.17*. 设 k 为特征 3 的分裂域. 求 S_3 的全部不可约 Brauer 特征标及分解矩阵, 普通不可约表示依次按平凡、符号和标准二维表示排列. 判断二维增广子模

$$U = \{(x, y, z) \in k^3 : x + y + z = 0\}$$

是否半单, 并给出它的简单合成因子.

解. 记 $r = (123)$. 在任意非零模上, $(r - 1)^3 = 0$, 所以有非零的 C_3 -不动向量. 因 C_3 正规, 全部 C_3 -不动向量形成 S_3 -子模; 在简单模上便是全空间. 因此所有简单模都来自 $S_3/C_3 \cong C_2$, 恰为平凡模 S_+ 和符号模 S_- . 3-正则类由恒等元及换位 s 代表, 所以表及分解矩阵为

$$\begin{array}{c|cc} & 1 & s \\ \hline \varphi_+ & 1 & 1 \\ \varphi_- & 1 & -1 \end{array} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

最后一行来自标准普通特征标在两类上的值 $(2, 0) = \varphi_+ + \varphi_-$. 在 U 中, 向量 $(1, 1, 1)$ 非零且坐标和为 0, 给出平凡子模; 一维商为符号模, 例如一个换位在 U 上的迹为 0, 减去子模上的迹 1, 商的迹为 -1 . 三循环在 U 上并非恒等, 例如它把 $(1, -1, 0)$ 送到 $(0, 1, -1)$. 若 $U \cong S_+ \oplus S_-$, 三循环却应在两项上都平凡, 矛盾. 所以它不是半单模. $\square$

习题 8.18*. 沿用上一题, 令 $t = r - 1$, $e_\pm = (1 \pm s)/2$. 求 kS_3 的根以及投射模 $P_\pm = kS_3 e_\pm$ 的根层, 进而计算 Cartan 矩阵, 并证明此时群代数只有一个块.

解. 群关系给出 $t^3 = 0$ 及

$$sts = r^{-1} - 1 = (1 + t)^2 - 1 = -t + t^2.$$

因此由 t 生成的双边理想以 t, t^2, ts, t^2s 为基, 立方为零, 商为半单代数 kC_2 , 故它就是 $J(kS_3)$. $P_\pm$ 的基为 $e_\pm, te_\pm, t^2e_\pm$, 顶分别为 $S_\pm$. 在第 i 个根层上, r 平凡作用, 而

$$st^i e_\pm \equiv (\pm 1)(-1)^i t^i e_\pm \pmod{J^{i+1}P_\pm}.$$

所以 P_+ 从顶到底的因子为 S_+, S_-, S_+ , P_- 的因子为 S_-, S_+, S_- . 两模投射且顶简单, 故为相应不可分解覆盖, 得到

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = D^\top D.$$

一个不可分解模只属于一个块； P_+ 的合成因子同时包含两种简单模，所以它们必属于同一块。若有其他非零块，它必有简单模，与简单类型已经穷尽矛盾。因此群代数只有一个块。 $\square$

习题 8.19*. 对上一题的两个 Brauer 特征标，定义

$$(f, g)_0 = \frac{1}{|S_3|} \sum_{x \in (S_3)_{3'}} f(x) \overline{g(x)}.$$

计算两者的平方长度及内积，说明为何不能直接把普通不可约特征标的正交关系套到这里。

解. 3-正则元素包括恒等元及三个换位，因此

$$(\varphi_+, \varphi_+)_0 = (\varphi_-, \varphi_-)_0 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad (\varphi_+, \varphi_-)_0 = \frac{1-3}{6} = -\frac{1}{3}.$$

它们既未归一化，也不正交。不可约 Brauer 特征标形成类函数的一组基，并不表示在任意仿照普通公式定义的内积下都成为标准正交基；本章的基定理只给出线性独立与生成性。 $\square$

习题 8.20*. 在特征 2 的 S_3 模中，记 S_1 为平凡模， S_2 为二维简单投射模， P_1 为 S_1 的投射覆盖。先由 Brauer 特征标求 $S_2 \otimes S_2$ 的简单重数，再证明实际模同构

$$S_2 \otimes S_2 \cong P_1 \oplus S_2.$$

解. 两类 2-正则元素由 $1, r$ 代表， $\varphi_{S_1} = (1, 1)$ 、 $\varphi_{S_2} = (2, -1)$ 。张量特征标为 $(4, 1)$ ，解 $(4, 1) = a(1, 1) + b(2, -1)$ 得到 $a = 2, b = 1$ 。这一步只确定两个平凡因子与一个二维简单因子。由于 S_2 投射，**习题 8.9*** 保证张量积也投射。全部不可分解投射类型为 P_1, S_2 ，它们的简单重数分别是 $(2, 0)$ 、 $(0, 1)$ 。因此投射直和分解只能各取一份，得到所求同构。这里从合成重数走到实际直和，额外使用了投射性，不能仅凭特征标相同就作这一步推断。 $\square$

习题 8.21*. 设 $(K, \mathcal{O}, k)$ 为本章特征 3 的分裂模系统， π 为一致化元，并让 S_3 置换三个坐标。在 $V = K^3/K(1, 1, 1)$ 中取满格

$$\Lambda = \mathcal{O}^3/\mathcal{O}(1, 1, 1), \quad L = \{(x, y, z) \in \mathcal{O}^3 : x + y + z = 0\} \text{ 在 } V \text{ 中的像}.$$

证明 $\Lambda/L \cong \mathcal{O}/3\mathcal{O}$ ，并证明两个约化不同构，却有相同的简单合成因子及 Brauer 特征标。

解. 对角向量有一个单位坐标，故商 Λ 为秩二自由模；和为零的子模也自由秩二，在 V 中的映射单射，因为特征零中常向量的坐标和为 $3c$ ，只有 $c = 0$ 时为零。它们都是被群保持的满格。求和映射识别 $\mathcal{O}^3/\ker \Sigma \cong \mathcal{O}$ ，而对角子模在其下的像为 $3\mathcal{O}$ ，所以 $\Lambda/L \cong \mathcal{O}/3\mathcal{O}$ 。约化后， $L/\pi L$ 是 k^3 的二维增广子模，含一维平凡子模，商为符号模。另一方面， $\Lambda/\pi\Lambda \cong k^3/k(1, 1, 1)$ 。它的增广子模像是一维符号模，商为平凡模，因此简单重数相同。但第二个约化没有非零群不动元：若向量 $v \in k^3$ 的类不动，则每个换

位使 v 的变化都在对角直线上。这个变化有一个坐标为零，故只能是零；所有换位因此固定 v ，使 v 本身为常向量，其商类为零。第一个约化的不动空间却由 $(1, 1, 1)$ 生成，维数为一，故两个约化不同构。它们的 Brauer 特征标都为 $\varphi_+ + \varphi_-$ 。□

习题 8.22*. 设 G 为有限群， p 为素数， $(K, \mathcal{O}, k)$ 为 G 的分裂 p -模系统， K 含有全部 $|G|$ 次单位根，并固定这些根到复数的对应。记 $d: R_K(G) \rightarrow G_0(kG)$ 为分解映射， D 为分解矩阵。证明 D 的列在 $\mathbb{C}$ 上线性无关，并据此计算 $\mathbb{Q} \otimes \ker d$ 的维数：用普通共轭类数与 p -正则共轭类数表示。说明这一秩结论本身为何不能证明分解映射在整数上满射。

解. 普通不可约特征标限制到 $G_{p'}$ 后生成全部复类函数，而不可约 Brauer 特征标是一组基。恒等式 $\chi_\alpha|_{G_{p'}} = \sum_i d_{\alpha i} \varphi_i$ 因此说明 D 的行向量生成整个 $\mathbb{C}^s$ ，其中 s 为简单模数，即 p -正则类数。所以 D 的秩为 s ，各列线性无关。普通表示群的秩为全部共轭类数 c ，分解映射的矩阵是 D^T 。该整数矩阵在 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{C}$ 上秩相同，故有理化后的核维数为 $c - s$ 。但满秩的整数矩阵未必在整数格上满射，例如一阶矩阵 (2) 的有理秩为一，整数像却为 $2\mathbb{Z}$ 。因此若要证明整数上的更强结论，还需额外论证。□

习题 8.23*. 设 $\text{char } k = 2$ ， $G = S_3 = \langle r, s \rangle$ ， $P = \langle s \rangle$ 。把支集截断到 $C_G(P)$ 的线性映射暂时定义在整个 kG 上。证明它一般不保持乘法，并说明这与本章的 Brauer 映射命题不矛盾。

解. $C_G(P) = P$ ，两个三循环 r, r^{-1} 都不属于 P 。因此全空间上的截断分别把它们送到零，却把其乘积 $rr^{-1} = 1$ 送到 1，不保持乘法。命题 8.4.2 的定义域是 $(kG)^P$ ，其中元素须对 P 的共轭作用不变。这里 $srs = r^{-1} \neq r$ ，所以两个被选的元素都不在该定义域。轨道系数相同正是乘法性证明中消去非平凡 p 轨道的条件，不能删去。□

习题 8.24*. 在特征 3 中，求习题 8.12* 的 C_6 两个块的缺陷群，以及习题 8.18* 的 S_3 唯一块的缺陷群。将后者与正文中特征 2 的 S_3 比较。

解. C_6 交换，所以任一子群的中心化子都是全群，Brauer 截断在群代数上就是恒等。因此两个非零块幂等元对 Sylow 3 子群 C_3 的 Brauer 像都非零；没有更大的 3 子群，两个块的缺陷群都是 C_3 。特征 3 的 S_3 只有一个块，幂等元为 1。对 $P = \langle r \rangle$ 有 $\text{Br}_P^G(1) = 1 \neq 0$ ，且 P 是 Sylow 3 子群，所以它是缺陷群。特征 2 时， S_3 则有一个缺陷群为 C_2 的二维局部块和一个缺陷群平凡的四维矩阵块。改变模特征会同时改变块的数目、块的结构以及相应的缺陷群。□

习题 8.25*. 设 $\text{char } k = 3$ ， $G = S_3$ ， $H = \langle s \rangle \cong C_2$ 。分别诱导 H 的平凡与符号表示，确定所得模的不可分解类型及简单重数。再从特征零的诱导分解出发约化，核验与直接计算一致。

解. 令 $e_\pm = (1 \pm s)/2$ 。一维 kH -模 $k_\pm$ 同构于 $kHe_\pm$ ，乘法诱导

$$kG \otimes_{kH} k_\pm \cong kGe_\pm = P_\pm.$$

由习题 8.18*，两者都是不可分解投射模，简单重数分别为 $2S_+ + S_-$ 与 $S_+ + 2S_-$ 。特征零中，Frobenius 互反性给出

$$\text{Ind}_{C_2}^{S_3} \mathbf{1} = \mathbf{1} + \chi_{\text{std}}, \quad \text{Ind}_{C_2}^{S_3} \text{sgn} = \text{sgn} + \chi_{\text{std}}.$$

例如标准二维表示限制到一个换位时有特征值 $1, -1$ ，两个一维类型各出现一次，而群的平凡、符号表示各自只贡献对应的一个类型。按习题 8.17* 的分解矩阵约化，标准表示给出 $[S_+] + [S_-]$ ，所以两式分别变为 $2[S_+] + [S_-]$ 、 $[S_+] + 2[S_-]$ ，与直接计算相同。特征零的直和经约化后只保证合成类相同，此处所得的两个模本身都不可分解。 $\square$

第九章 箭图与有限维代数的表示

本章用箭图组织向量空间及线性映射，并把箭的复合写成路径代数的乘法。先建立箭图表示与左模的等价，再用选基和复合映射的秩分类线性定向的区间表示。无环箭图的短投射消解给出可直接计算的 Hom-Ext 正合列。最后从有限维代数的根商提取顶点、箭及关系，说明代数闭域上的有限维代数经过 Morita 约化后都可由容许关系箭图描述。

本章目标

- 能按既定路径乘法构造路径代数，判断有限维性及关系理想的容许性。
- 能在左路径代数模与箭图表示之间转换，并用逐顶点计算处理同态、核、商及正合列。
- 能分解线性定向的区间表示，从各段复合的秩恢复区间重数。
- 能写出顶点投射表示和短投射消解，计算态射及扩张，并核验扩张的方向。
- 能从分裂基本代数的 J/J^2 读出 Ext 箭图，区分箭图第一层资料与更高乘法关系。

前四节需要向量空间、线性映射、模、直和及投射模的基本知识，所用 Ext^1 将通过短正合扩张定义。第 9.5 节还会用到第二卷关于有限维代数根的幂零性、幂等元提升及满幂等元的 Morita 等价。

一个算子的标准形已经是表示分类的例子；若同时出现多个空间和映射，分别化简每个矩阵通常会破坏其他矩阵已经取得的形式。箭图把允许的换基精确地固定在各个顶点上，使“同时化简”成为一个统一问题。没有关系时，路径记录一切可作的复合；有关系时，路径之间的线性恒等式则记录额外限制。路径代数及最初的区间例子可对照 [4, Section 2.8, pp. 19–22, Section 6.2, pp. 150–153]。

9.1 箭图与路径代数

一个线性算子可以看成是一个向量空间上的一支箭；两个线性映射若首尾相接，还可以讨论它们的复合。箭图把这些信息分开记录：顶点说明有哪些空间，箭说明哪些空间之间给了映射。先只保留箭与路径，就能构造一个代数，随后再把线性映射赋给它。

9.1.1 顶点、箭和有向路径

定义 9.1.1. 设 Q_0, Q_1 为有限集合， $s, t: Q_1 \rightarrow Q_0$ 为两个映射。由这些数据组成的有向图 $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ 称为一个有限箭图 (quiver)； Q_0 的元素称为顶点， Q_1 的元素称为箭。箭 a 从 $s(a)$ 指向 $t(a)$ ，记为 $a: s(a) \rightarrow t(a)$ 。允许重箭以及起点等于终点的圈。

箭图不要求同一对顶点间至多一支箭。两支不同的箭以后可以表示两个完全无关的线性映射；把它们合并，会改变所研究的对象。这里允许圈，但“无环箭图”将专指没有正长度有向闭路径的箭图，并非仅仅没有一支箭构成的圈。

定义 9.1.2. 设 $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ 为有限箭图， s, t 分别给出箭的起点、终点， $r \geq 1$ 为整数。若箭 $a_1, \dots, a_r \in Q_1$ 满足 $t(a_\nu) = s(a_{\nu+1})$ 对 $1 \leq \nu < r$ 成立，则依次经过这些箭的序列称为长度 r 的**有向路径** (oriented path)，记作 $a_r \cdots a_1$ 。它从 $s(a_1)$ 指向 $t(a_r)$ 。每个顶点 $i \in Q_0$ 另有一条长度零的路径 e_i ，其起点与终点都是 i 。

例如在 $1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$ 中，长度二的路径记为 ba 。这个记法与线性映射的复合一致：先作 a ，再作 b 。相反， ab 在这个箭图中不能首尾相接。无向图是一条线并不规定唯一的箭图； $1 \rightarrow 2 \leftarrow 3$ 的两支箭就不能组成长度二的路径。

9.1.2 路径代数及幂等元

定义 9.1.3. 设 k 为域， Q 为非空有限箭图。以 Q 的全部有向路径为 k 基，取只有有限多个非零系数的线性组合。对基路径 $p: i \rightarrow j, q: \ell \rightarrow m$ ，规定 qp 在 $j = \ell$ 时为先走 p 再走 q 的拼接路径，在 $j \neq \ell$ 时为零；再按 k 双线性延拓乘法。所得代数记为 kQ ，称为 Q 的**路径代数** (path algebra)。

拼接满足结合律。对三条路径，如果相邻的两处都能接合，两种括号给出同一条箭序列；如果某处不能接合，两种乘法都为零。逐项展开便得到任意元素的结合律。长度零路径满足

$$1 = \sum_{i \in Q_0} e_i, \quad e_i e_j = \delta_{ij} e_i, \quad a = e_{t(a)} a e_{s(a)}.$$

尤其 $e_j(kQ)e_i$ 以全部从 i 到 j 的路径为基。任意正长度路径是箭的乘积，所以这些幂等元和箭生成 kQ 。给它们指定到另一个代数中的像，只要满足上式的顶点关系，就唯一决定一个代数同态：每条路径的像只能是各箭像的乘积，而上述关系保证不可拼接的乘积被送到零。

命题 9.1.4. 设 k 为域， Q 为非空有限箭图。代数 kQ 有限维，当且仅当 Q 没有正长度有向闭路径。

证明. 若有正长度闭路径 c ，则 $e_i, c, c^2, \dots$ 是长度不同的基路径，线性无关，所以代数无限维。反过来，若没有闭路径，任何路径都不能重复经过一个顶点，否则两次经过之间就是闭路径。因此路径长度至多为 $|Q_0| - 1$ 。每个长度的箭序列只有有限多个，所以全部路径有限。 $\square$

在 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 中，基为 e_1, e_2, e_3, a, b, ba ，维数六；在 $1 \rightarrow 2 \leftarrow 3$ 中，基只含三个顶点和两支箭，维数五。两个箭图的无向图相同，路径代数却不相同。若只有一个顶点和一个圈 a ，则 $kQ \cong k[t]$ ；有两个圈时，则得到两个不定元的自由结合代数，两个圈的乘法一般不交换。

9.1.3 有关系箭图与有限维性

定义 9.1.5. 设 k 为域, Q 为非空有限箭图. 由全部箭生成的双边理想记为 $\mathfrak{a}$, 称为**箭理想** (arrow ideal). 它以正长度路径为基, $\mathfrak{a}^r$ 以长度至少 r 的路径为基. 若双边理想 I 满足

$$\mathfrak{a}^N \subseteq I \subseteq \mathfrak{a}^2 \quad \text{对某个整数 } N \geq 2,$$

就称 I 为**容许关系理想** (admissible ideal), 称 (Q, I) 为有关系箭图, 并研究商代数 kQ/I .

一个关系可以是具有相同起点和终点的若干路径的线性组合. 一般元素也可按 $e_j I e_i$ 拆成这种形式. 商中要求每个关系为零; 例如在 $1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$ 中加入 $ba = 0$, 以后对应的两个线性映射就须满足复合为零.

命题 9.1.6. 设 k 为域, Q 为非空有限箭图, $\mathfrak{a} \subseteq kQ$ 为由全部箭生成的双边理想, $I \subseteq kQ$ 为双边理想, 且对某个整数 $N \geq 2$ 有 $\mathfrak{a}^N \subseteq I \subseteq \mathfrak{a}^2$. 令 $A = kQ/I$. 则 A 有限维, 其 Jacobson 根为

$$J(A) = \mathfrak{a}/I, \quad A/J(A) \cong \prod_{i \in Q_0} k.$$

证明. 所有长度至少 N 的路径在商中为零, 所以有限多个较短路径的像生成 A . 理想 $\mathfrak{a}/I$ 幂零; 幂零双边理想包含在 Jacobson 根中, 因为对其元素 x 和任意 $a \in A$, $1 - ax$ 有有限几何级数给出的逆. 模掉这个理想, 只剩互相正交的顶点幂等元, 商为 $\prod_i k$, 其根为零. 因此 $J(A)$ 也包含于 $\mathfrak{a}/I$, 得到等式. $\square$

容许条件既使长路径消失, 又不对顶点与箭的第一层施加线性关系. 有限维性本身不保证一个给定关系理想容许. 例如一个圈的关系 $a^2 - a = 0$ 给出二维商, 但关系含有一次项; 这个商同构于 $k \times k$, 它的根为零, 圈的像却不是零. 本章最后将从有限维代数的根重新选择箭图与容许关系, 而不是把任意展示都当成这种形式.

9.2 表示与模

路径代数把箭的复合变成乘法, 箭图表示则把它变成线性映射的复合. 本节不仅比较两者的对象, 还比较保持作用的映射; 这使直和、核、商和扩张都能在两种描述之间转换.

9.2.1 向量空间、线性箭及交换关系

定义 9.2.1. 设 k 为域, Q 为有限箭图. 给每个顶点 i 一个有限维 k 向量空间 V_i , 给每支箭 $a: i \rightarrow j$ 一个线性映射 $V_a: V_i \rightarrow V_j$, 所得数据 $V = (V_i, V_a)$ 称为 Q 的有限维 k **表示** (representation of a quiver). 对路径 $p = a_r \cdots a_1$, 记 $V_p = V_{a_r} \cdots V_{a_1}$, 并令 $V_{e_i} = 1_{V_i}$. 对两个表示 V, W , 一族线性映射 $f_i: V_i \rightarrow W_i$ 若满足

$$W_a f_i = f_j V_a \quad (a: i \rightarrow j),$$

就称为表示同态 $f: V \rightarrow W$. 若所有 f_i 都可逆, 则称 f 为表示同构.

对于有关系箭图 (Q, I) , 再要求每个关系 $\sum_p c_p p \in I$ 所给的映射 $\sum_p c_p V_p$ 为零。只需检查一组双边理想生成关系: 左右乘路径就是在两侧复合映射, 加法则是相加。记这些表示及其同态组成的范畴为 $\text{rep}_k(Q, I)$; $I = 0$ 时写为 $\text{rep}_k Q$ 。

定义 9.2.2. 设 k 为域, Q 为有限箭图, $V = (V_i, V_a)$ 、 $W = (W_i, W_a)$ 为 Q 的有限维 k 表示。若一族子空间 $U_i \subseteq V_i$ 、 $i \in Q_0$, 满足 $V_a(U_i) \subseteq U_j$ 对每支箭 $a: i \rightarrow j$ 成立, 则这些子空间及箭映射的限制组成 V 的子表示 U 。商表示在各顶点取 V_i/U_i , 箭映射由 V_a 诱导。直和 $V \oplus W$ 则在各顶点及各支箭分别取直和。向量 $\mathbf{d}(V) = (\dim_k V_i)_{i \in Q_0}$ 称为 V 的**维数向量** (dimension vector)。

表示同态的核与余核也逐顶点计算。例如 $W_a f_i = f_j V_a$ 使 V_a 将 $\ker f_i$ 映入 $\ker f_j$, 而同一个等式保证商上的箭映射良定义。因此一列表示正合, 当且仅当它在每个顶点的向量空间列都正合。这就给出一个交换范畴。

9.2.2 箭图表示与路径代数模的等价

定理 9.2.3. 设 k 为域, Q 为非空有限箭图, I 为 kQ 的双边理想, e_i 为顶点 i 的长度零路径。有限维左 kQ/I 模范畴与满足 I 中全部关系的有限维 k 箭图表示范畴 $\text{rep}_k(Q, I)$ 等价。对应对象上为

$$M \mapsto (e_i M, a|_{e_i M}), \quad (V_i, V_a) \mapsto \bigoplus_{i \in Q_0} V_i.$$

第二个对象上, 顶点幂等元作坐标投影, 路径按相应线性映射的复合作用; 两种对应保持直和与正合列。

证明. 若 M 是左模, 单位分解为 $\sum_i e_i$, 故 $M = \bigoplus_i e_i M$ 。由 $a = e_j a e_i$, 左乘 a 将 $e_i M$ 映入 $e_j M$, 而 I 在 M 上作用为零, 得到满足关系的表示。模同态保持每个 $e_i M$, 且与所有箭作用交换, 因而给出表示同态。反过来, 给定表示, 在直和上令一条从 i 到 j 的路径只作用于第 i 个坐标, 并用 V_p 将其送到第 j 个坐标。如果两条路径不接合, 两个坐标算子的复合为零; 如果接合, 复合正是拼接路径的算子。因此这些算子延拓为 kQ 的左作用。关系条件使作用通过 kQ/I 。一族表示同态的直和与全部顶点及箭交换, 所以也与生成代数的全部路径交换, 成为模同态。从模出发再取直和, 由 $(m_i)_i \mapsto \sum_i m_i$ 得到与作用相容的自然同构; 从表示出发则在各坐标恢复原空间和原箭映射。以上构造对同态也互逆, 故为范畴等价。直和逐坐标保持, 正合性由各顶点的核与余核计算保持。□

例如单圈表示就是一个向量空间及其一个线性算子, 因而等同于 $k[t]$ 模; 两个圈的表示是两个任意线性算子, 不要求它们交换。若另加关系 $ab - ba = 0$, 才变为两个可交换算子。箭图与关系分别记录“有哪些映射”和“映射应满足什么恒等式”。

9.2.3 左模约定与路径复合方向

本章始终用左模。若 $a: i \rightarrow j$, 左乘 $a = e_j a e_i$ 从 $e_i M$ 到 $e_j M$, 与箭向相同。若改用右模, 则右乘 a 从 $M e_j$ 到 $M e_i$, 箭向反转。因此把一个右模版本直接抄成左模, 往往会同时弄反路径乘积、投射模和扩张箭的方向。

一个能随时检查约定的例子是上三角矩阵代数 $T_2(k)$ 。令 $e_1 = E_{11}$ 、 $e_2 = E_{22}$ ，则 $E_{12} = e_1 E_{12} e_2$ ，对应的箭为 $2 \rightarrow 1$ 。把箭送到 E_{12} ，顶点送到两个对角矩阵，便给出此箭图的路径代数与 $T_2(k)$ 的同构：两侧均以这三个元素为基，全部乘法关系相同。

命题 9.2.4. 设 k 为域， Q 为有限箭图， $\mathbf{d} = (d_i)_{i \in Q_0}$ 为非负整数向量。固定每个顶点空间为 k^{d_i} ，则所有 k 表示由矩阵组

$$\text{Rep}_k(Q, \mathbf{d}) = \prod_{a:i \rightarrow j} \text{Mat}_{d_j \times d_i}(k)$$

给出。换基群 $\prod_i \text{GL}_{d_i}(k)$ 作用为

$$(g_i)_i \cdot (X_a)_a = (g_j X_a g_i^{-1})_{a:i \rightarrow j}.$$

两个矩阵组在同一轨道中，当且仅当相应表示同构。加关系时，取满足关系矩阵方程的稳定子集即可。

证明. 每支箭的线性映射由任意相应尺寸的矩阵给定，故得到所列直积。表示同构的方程为 $Y_a g_i = g_j X_a$ ，每个 g_i 可逆时恰好等价于 $Y_a = g_j X_a g_i^{-1}$ 。关系的矩阵值从起点到终点作同样的左右换基，因而其为零的条件在作用下保持。□

维数向量只规定矩阵的尺寸，并不确定表示。例如一个圈上的一维表示由标量 $\lambda \in k$ 给出，一维换基不改变这个标量，所以不同的 λ 已经给出不同构的表示。下一节先讨论没有圈、又只有少数箭的情形。

9.3 区间表示与线性定向箭图

一个箭头的分类只需矩阵的秩。沿一条有向直线增加箭头以后，需要同时记录每段复合的秩；这些数仍然足以恢复分解。本节给出实际选基的办法，为后面更一般的箭图分类提供可计算的比较。

9.3.1 A_2 、 A_3 与线性定向 A_n

定义 9.3.1. 设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， Q 为线性定向箭图 $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow n$ 。对满足 $1 \leq a \leq b \leq n$ 的整数 a, b ，在顶点 $a, a+1, \dots, b$ 放置 k ，在其余顶点放置零空间；区间内部的箭映射为恒等，其他箭映射为零。所得表示记为 $I[a, b]$ ，称为**区间表示** (interval representation)。

对 $A_2 = (1 \rightarrow 2)$ ，给定映射 $f: V_1 \rightarrow V_2$ ，令 $r = \text{rank } f$ 、 $d_i = \dim V_i$ 。在 V_1 中补全 $\ker f$ 的基，并用其余基向量的像作为 $\text{im } f$ 的基，再补全到 V_2 ，得到

$$V \cong I[1, 2]^{\oplus r} \oplus I[1, 1]^{\oplus (d_1 - r)} \oplus I[2, 2]^{\oplus (d_2 - r)}.$$

因此两端空间的维数与箭的秩共同决定同构类；只给维数则不够。

对于 $1 \xrightarrow{f} 2 \xrightarrow{g} 3$, 还须比较 $\operatorname{im} f$ 与 $\ker g$. 先在它们的交中选基, 分别补到两个子空间, 再补到 V_2 ; 把 $\operatorname{im} f$ 的这些基向量提升到 V_1 , 补上 $\ker f$ 的基, 并在 V_3 中补全相应的像。这就把表示分成六种区间。记 r_f, r_g, r_{gf} 为三个映射的秩, 则相应重数为

$$\begin{aligned} m_{13} &= r_{gf}, & m_{12} &= r_f - r_{gf}, & m_{23} &= r_g - r_{gf}, \\ m_{11} &= d_1 - r_f, & m_{22} &= d_2 - r_f - r_g + r_{gf}, & m_{33} &= d_3 - r_g. \end{aligned}$$

重数 $m_{22} \geq 0$ 来自

$$\dim(\operatorname{im} f \cap \ker g) = r_f - r_{gf} \leq \dim \ker g = d_2 - r_g.$$

这个不等式正好给出所需的非负性; 对应的向量是 $\ker g$ 中不来自前一顶点的部分。

另一种定向 $1 \rightarrow 2 \leftarrow 3$ 也可直接分解。对两支箭的像 $U, W \subseteq V_2$, 取适应 $U \cap W \subseteq U, W \subseteq U + W$ 的基, 再分别提升到两端。交中的每个基方向给一个在三个顶点都为 k 、两箭均为恒等的表示; U, W 各自的补给相邻两顶点的表示; 剩余基及两端的核给单点表示。因此仍有六种不可分解模型, 但区间中的箭须按此定向解释。

9.3.2 直和与不可分解表示

定义 9.3.2. 设 k 为域, Q 为有限箭图, V 为 Q 的非零有限维 k 表示。若 V 不能写成两个非零表示的直和, 就称其为**不可分解表示** (indecomposable representation)。若 V 没有非零真子表示, 就称其为简单表示。两者不同: 在箭图 $1 \rightarrow 2$ 中, 区间表示 $I[1, 2]$ 不可分解, 却有支集只在顶点 2 的子表示。

一个区间表示的自同态在每个非零顶点都是标量, 恒等箭迫使这些标量相同。因此

$$\operatorname{End}_Q(I[a, b]) \cong k.$$

若它有非平凡直和分解, 相应投影会给出不等于零、一的幂等自同态, 与域中无此幂等元矛盾。所以每个区间不可分解。不同区间的维数向量不同, 故不同构。下面使用 Krull–Schmidt 分解¹。

命题 9.3.3 (Krull–Schmidt). 设 k 为域, Q 为有限箭图, I 为 kQ 的双边理想。每个满足关系 I 的有限维 k 表示都能分解为有限个不可分解表示的直和; 各直和项的同构类型及重数唯一到重排。无关系情形取 $I = 0$ 。

证明. 若表示可分解, 便把它拆开; 每次非零直和项的总维数都变小, 因此有限步后得到存在性。为证唯一性, 先看不可分解表示 X 的自同态 u 。核与像的升降链在有限维下稳定, 取充分大的 N , 便有

$$X = \ker u^N \oplus \operatorname{im} u^N.$$

确实, 稳定性使 u 在稳定像上可逆, 而该像与稳定核相交为零, 维数相加为 $\dim X$; 二者都是子表示。于是 u 或可逆, 或幂零。其自同态环的非单位元构成理想: 左右乘任意自同

¹克鲁尔 (Wolfgang Krull, 1899-1971), 德国数学家, 研究可换代数与模的分解; 施密特 (Отто Юльевич Шмидт, 1891-1956), 苏联数学家, 也研究地球物理与天文学。

态不可能把不可逆线性算子变可逆；若两个非单位元 u, v 的和可逆，则 $a = (u+v)^{-1}u$ 、 $1-a = (u+v)^{-1}v$ 都非单位，但 a 幂零使 $1-a$ 可逆，矛盾。现在设 $V = \bigoplus_i X_i = \bigoplus_j Y_j$ 。把 X_1 包含到 V ，再分别投到各 Y_j 并投回 X_1 ，所得复合之和为 1_{X_1} 。非单位元构成理想，所以至少一个复合可逆。相应映射 $X_1 \rightarrow Y_j$ 为分裂单射； Y_j 不可分解，故它是同构。更具体地， $V \rightarrow X_1$ 在这个 Y_j 上为同构，所以 $V = Y_j \oplus \bigoplus_{i>1} X_i$ ：任意元可先减去唯一具有相同 X_1 投影的 Y_j 元。与原来的 Y_j 分解取商，得到 $\bigoplus_{i>1} X_i \cong \bigoplus_{\ell \neq j} Y_\ell$ 。按直和项数归纳即得唯一性。□

此论证只使用有限维性，没有使用路径代数本身有限维。因此带圈的有限箭图，只要所讨论的表示有限维，也满足这个分解唯一性结论。

9.3.3 区间表示的线性代数分解

定理 9.3.4. 设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， $Q = (1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow n)$ ， $V = (V_i, V_a)$ 为有限维 k 表示。则 V 是区间表示 $I[a, b]$ 的直和，其中 $1 \leq a \leq b \leq n$ 。记

$$r_{ij} = \text{rank}_k(V_i \rightarrow V_j) \quad (1 \leq i \leq j \leq n), \quad r_{ii} = \dim_k V_i,$$

其中 $V_i \rightarrow V_j$ 为沿唯一有向路径的箭映射复合，并约定 $r_{0j} = r_{i, n+1} = 0$ ，则 $I[a, b]$ 的重数为

$$m_{ab} = r_{ab} - r_{a-1, b} - r_{a, b+1} + r_{a-1, b+1}.$$

特别地，恰有 $n(n+1)/2$ 个不可分解同构类。

证明. 对 n 归纳。 $n=1$ 是选基。假定已把前 $n-1$ 个顶点分成区间。在顶点 $n-1$ 已为零的区间不参与最后一支箭，可直接保留。其余各区间都结束于 $n-1$ ，把其末端空间记为 $E = V_{n-1}$ 。按这些区间的起点定义旗

$$0 = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \cdots \subseteq F_{n-1} = E,$$

其中 F_i 由起点不超过 i 的末端基向量生成，亦即 $V_i \rightarrow E$ 的像。令 $f: E \rightarrow V_n$ 为最后的箭， $K = \ker f$ 。可以选一组同时适应旗 F_i 与子空间 K 的基：逐步补全 $K \cap F_i$ 的基，再补全商旗 $(F_i + K)/K$ 的基，并把后者的新增向量提升到 F_i 。任意保持这面旗的可逆换基都延伸为这些末端区间之和的自同构。为看清这一点，将起点为 a 的末端向量送到起点 $b \leq a$ 的末端向量，给出 $I[a, n-1] \rightarrow I[b, n-1]$ 的同态：在重合区间取同一个标量，在其余顶点取零。旗保持的矩阵恰由这些允许的项组成；其逆也保持旗，故同样延拓，且两复合在每个顶点都是恒等。因此可以用刚才选出的适应基代替原区间末端基。属于 K 的向量使相应区间仍结束于 $n-1$ ；其余向量的像线性无关，将它们作为 $\text{im } f$ 的基，相应区间便延长到 n 。最后补全到 V_n 的基，新增的向量各给一个 $I[n, n]$ 。这完成存在性的归纳。对任一区间和，复合 $V_i \rightarrow V_j$ 在一个直和项上秩为一，当且仅当该区间同时包含 i, j 。故

$$r_{ij} = \sum_{\substack{a \leq i \\ b \geq j}} m_{ab}.$$

先对起点作相邻差，再对终点作相邻差，就得到所列重数公式。每个区间不可分解且不同构已经证明；反过来，一个不可分解表示的区间分解只能有一项，因此类数为区间数。□

这个公式也给出判别同构的有限算法：计算各段复合的秩，再取四项差即可。仅计算相邻箭的秩仍不够。例如两个表示都可有维数向量 $(1, 2, 1)$ 及相邻秩 $1, 1$ ，但复合秩分别为一和零；它们的区间分解因而不同。

9.4 箭图表示的同调初步

区间分解说明线性定向箭图很容易分类，但一般箭图不能同时把所有箭化为这种形式。另一种有效做法是把一个表示写成若干简单的投射表示之间的商。无环箭图只需一层关系，因而可以用一条短消解同时计算同态与扩张。

9.4.1 无环箭图的投射表示

设 k 为域， Q 为有限箭图， P 为 Q 的有限维 k 表示。若对有限维 k 表示之间的每个满射同态 $E \rightarrow V$ ，任意表示同态 $P \rightarrow V$ 都能提升到 $P \rightarrow E$ ，则称 P 为投射表示。这里满射按顶点理解；这与对应左模的投射性一致。

命题 9.4.1. 设 k 为域， Q 为有限无环箭图， $A = kQ$ ， $i \in Q_0$ ， e_i 为顶点 i 的长度零路径。左 A -模 $P_i = Ae_i$ 在顶点 j 以全部路径 $i \rightarrow j$ 为基，箭通过在路径末端继续拼接而作用。对 Q 的任意有限维 k 表示 W ，在 e_i 处求值给出自然同构

$$\text{Hom}_Q(P_i, W) \cong W_i, \quad f \mapsto f(e_i).$$

因此 P_i 投射，且 $\text{End}_Q(P_i) \cong k$ ，所以不可分解。

证明. 模同态满足 $f(e_i) = e_i f(e_i) \in W_i$ ，又满足 $f(p) = W_p f(e_i)$ 。反过来，任给 $w \in W_i$ ，这个公式在路径基上线性延拓，便给出唯一模同态。该求值映射对 W 的同态相容，因而自然。顶点取值函子保持正合列，特别是满射，所以该 Hom 函子也保持满射，得到投射性。无环性使 $i \rightarrow i$ 只有长度零路径；取 $W = P_i$ ，自同态由 e_i 的标量倍决定。其自同态环是域，因而无非平凡直和投影。□

对 $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow n$ ，有 $P_i = I[i, n]$ 。箭向改变时投射表示也改变：在 $1 \rightarrow 2 \leftarrow 3$ 中， P_2 只支集在顶点 2， P_1, P_3 则各沿一支箭延伸。判断投射性应看“从这个顶点出发的路径”，不是只凭支集大小。

9.4.2 短投射消解与 Ext^1

定理 9.4.2. 设 k 为域， Q 为有限无环箭图， $A = kQ$ ， $V = (V_i, V_a)$ 为 Q 的有限维 k 表示。记 e_i 为顶点 i 的长度零路径， $P_i = Ae_i$ ， V_p 为沿路径 p 的箭映射复合。存在左 A -模的短正合列

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{a:i \rightarrow j} P_j \otimes_k V_i \xrightarrow{d} \bigoplus_{i \in Q_0} P_i \otimes_k V_i \xrightarrow{\epsilon} V \longrightarrow 0.$$

其中左 A 作用在每项的第一个因子上, $\epsilon(p \otimes v) = V_p v$ 。对于属于箭 $a: i \rightarrow j$ 的左端分量, 微分为

$$d(p \otimes v) = pa \otimes v - p \otimes V_a v,$$

第一项放在中项的 i 分量, 第二项放在 j 分量。两项直和都是有限维投射表示。

证明. ϵ 与 d 都为 A 线性, 且 $\epsilon d = 0$, 因为路径 pa 的作用是先 V_a 再 V_p 。每个顶点的向量由 $e_i \otimes v$ 提升, 所以 ϵ 满。证明 d 单射时, 对左端的一个非零元素按路径 p 收集其向量系数, 选出现的最大路径长度 L 。正项 $pa \otimes v$ 长度为 $L+1$, 负项长度至多 L 。一条正长度路径唯一决定其第一支箭 a 及剩余路径 p , 所以这些最高长度正项之间也不能相消。因此像非零。在中项模掉 $\text{im } d$ 后, 关系 $pa \otimes v = p \otimes V_a v$ 可逐次删去路径的第一支箭, 把 $p \otimes v$ 化为 $e_{t(p)} \otimes V_p v$ 。于是每个商类都是长度零项的和; 若其 ϵ 像为零, 各顶点的向量系数都为零, 商类也为零。故 $\ker \epsilon = \text{im } d$ 。最后由命题 9.4.1, 各项是有限个 P_i 的直和, 因而投射。□

为了说明这条消解怎样计算扩张, 先把本节所用的 Ext^1 定义清楚。对有限维 A 模 V, W , 考虑短正合列

$$0 \rightarrow W \rightarrow E \rightarrow V \rightarrow 0.$$

两列若有一个中项同构使两端恒等及相应图表交换, 就看成同一个扩张类, 记全体类为 $\text{Ext}_A^1(V, W)$ 。零类是分裂列。同样的定义也适用于一般左模; 本章的主要应用仍取有限维对象。两个扩张先沿 $V \rightarrow V \oplus V$ 拉回, 再沿 $W \oplus W \rightarrow W$ 的相加映射推出, 定义它们的和; 沿标量映射 $W \rightarrow W$ 推出定义标量乘法。下面的具体描述同时证明这些运算给出 k 向量空间。

命题 9.4.3. 设 k 为域, A 为含么 k 代数, V, W 为左 A -模, 并给定左 A -模的短正合列 $0 \rightarrow K \xrightarrow{\iota} P \rightarrow V \rightarrow 0$, 其中 P 投射。则有自然同构

$$\text{Ext}_A^1(V, W) \cong \text{coker} \left(\text{Hom}_A(P, W) \xrightarrow{\iota^*} \text{Hom}_A(K, W) \right).$$

这里 ι^* 把同态 $f: P \rightarrow W$ 送到 $f \circ \iota: K \rightarrow W$, $\text{Ext}_A^1(V, W)$ 取短正合扩张类及其 Baer 和。

证明. 给定 $f: K \rightarrow W$, 取

$$E_f = (W \oplus P) / \left\{ (f(x), -\iota(x)) : x \in K \right\}.$$

映射 $w \mapsto [(w, 0)]$ 单射, 商到 V 的映射为 $[(w, p)] \mapsto \bar{p}$, 其核正是这份 W , 所以得到扩张。反过来, 对任一扩张, 利用 P 的投射性将 $P \rightarrow V$ 提升为 $u: P \rightarrow E$ 。其在 K 上的限制落入 W , 给出 f ; 映射 $(w, p) \mapsto w + u(p)$ 诱导 $E_f \cong E$ 。两个提升的差是 $P \rightarrow W$, 故限制到 K 后只改变一个来自 $\text{Hom}_A(P, W)$ 的项。反过来, 若两个 f 的差可延伸到 P , 用这个延伸修正 $W \oplus P$ 的第一坐标, 便得到固定两端的扩张同构。因此商空间恰好记录扩张类。按定义作拉回和推出时, 两个限制映射相加, 标量推出则把限制映射乘相应标量; 所以对应保持上述运算, 自然性也由同样的构造得到。□

9.4.3 同调方法与箭图表示的分类

定理 9.4.4. 设 k 为域, Q 为有限无环箭图, $V = (V_i, V_a)$ 、 $W = (W_i, W_a)$ 为有限维 k 表示。记 $\text{Ext}_Q^1(V, W) = \text{Ext}_{kQ}^1(V, W)$, 其中两表示视作左 kQ -模。存在自然正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \text{Hom}_Q(V, W) &\longrightarrow \bigoplus_{i \in Q_0} \text{Hom}_k(V_i, W_i) \\ &\xrightarrow{\delta} \bigoplus_{a: i \rightarrow j} \text{Hom}_k(V_i, W_j) \longrightarrow \text{Ext}_Q^1(V, W) \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

其中 $\delta((f_i)_i) = (W_a f_i - f_j V_a)_{a: i \rightarrow j}$ 。若 $d_i = \dim_k V_i$ 、 $e_i = \dim_k W_i$, 则

$$\dim_k \text{Hom}_Q(V, W) - \dim_k \text{Ext}_Q^1(V, W) = \sum_i d_i e_i - \sum_{a: i \rightarrow j} d_i e_j.$$

证明. 将命题 9.4.3 用于定理 9.4.2。由命题 9.4.1 及张量的线性泛性质,

$$\text{Hom}_Q(P_i \otimes_k V_i, W) \cong \text{Hom}_k(V_i, W_i).$$

将同态应用于 $d(p \otimes v)$, 再令 $p = e_j$, 便得到 $W_a f_i - f_j V_a$ 。这个映射的核正是表示同态的交换条件, 而余核由前一命题计算扩张, 所以所列序列正合。所有空间有限维, 维数的交错和为零, 得到公式。□

若 S_i 表示只在顶点 i 放置 k 的表示, 则对于不同顶点 i, j , 有

$$\dim \text{Ext}_Q^1(S_i, S_j) = \#\{a : i \rightarrow j\}.$$

这里右侧的方向与左模约定一致: 在 $1 \rightarrow 2$ 中, 非分裂列是 $0 \rightarrow S_2 \rightarrow I[1, 2] \rightarrow S_1 \rightarrow 0$ 。

令 $V = W$, 公式左侧比较自同态与自扩张, 右侧只含维数向量。下一章将把这个整数二次式与反射联系起来。若采用第四卷的高次 Ext 定义, 上面的长度一投射消解还直接给出所有 $\text{Ext}_{kQ}^r(V, W) = 0$, $r \geq 2$ 。加上关系以后, 长度一消解一般不再成立。

9.4.4 短正合扩张与消解计算的一致性

上述余核还能从扩张中的箭矩阵直接读出。给定 $0 \rightarrow W \rightarrow E \rightarrow V \rightarrow 0$, 在每个顶点选择向量空间截面, 识别 $E_i = W_i \oplus V_i$ 。箭矩阵必为

$$E_a = \begin{pmatrix} W_a & \xi_a \\ 0 & V_a \end{pmatrix}, \quad \xi_a : V_i \rightarrow W_j \quad (a : i \rightarrow j).$$

没有关系时, 各个 ξ_a 可以任意选择。将截面 s_i 换成 $s_i + f_i$ 、 $f_i : V_i \rightarrow W_i$, 右上角变为

$$\xi'_a = \xi_a + W_a f_i - f_j V_a.$$

这是将 $E_a(s_i(v) + f_i(v))$ 减去 $s_j(V_a v) + f_j(V_a v)$ 的直接计算。因此两组矩阵表示相同的扩张类, 当且仅当相差 $\delta((f_i)_i)$; 中项同构固定两端时也恰有这种分块上三角形式。

这与消解所得的对应一致，而不只是维数相同。由各顶点的截面构造中项到 E 的提升

$$P_i \otimes V_i \longrightarrow E, \quad p \otimes v \longmapsto E_p s_i(v).$$

在箭 $a: i \rightarrow j$ 所对应的关系 $a \otimes v - e_j \otimes V_a v$ 上，它的值为 $E_a s_i(v) - s_j(V_a v) = \xi_a(v)$ ，正是前一命题取到的限制映射。

例 9.4.5. 设 k 为域， $Q = (1 \rightarrow 2)$ 。扩张 $0 \rightarrow S_2 \rightarrow E \rightarrow S_1 \rightarrow 0$ 由一个标量 c 给出，箭映射为 $k \xrightarrow{c} k$ 。此时两个顶点的 $\text{Hom}_k(V_i, W_i)$ 都为零，所以不同 c 给出不同扩张类， $\text{Ext}_Q^1(S_1, S_2) \cong k$ 。然而所有 $c \neq 0$ 的中项都同构于 $I[1, 2]$ 。扩张等价要求固定两端的指定映射，因此比只比较中项同构更严格。

对于有关系箭图，还须把分块矩阵代入关系。比如 $1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$ 加上 $ba = 0$ 时，右上角应满足 $W_b \xi_a + \xi_b V_a = 0$ ，并非每组 ξ_a, ξ_b 都可用。这里已经能看见关系怎样限制扩张；不能继续把无关系箭图的 Euler 公式²原样照搬。

9.5 基本代数、Ext 箭图与关系

前面从箭图造出代数。现在反过来：一个有限维代数的简单模之间有哪些最初的联系，能否由箭表示？答案要去掉半单商中重复的矩阵大小，以根的第一层作箭，以更高层的乘法作关系。代数闭基域在这一步有明确作用。本节把讨论扩大到带关系的有限维代数，需要第二卷的根、幂等元提升与 Morita 等价。

9.5.1 基本代数与分裂基域假设

设 A 为代数闭域 k 上的有限维含么代数，记 $J = J(A)$ 。第二卷定理 15.1.4 证明了 J 幂零；半单结构定理把商写为

$$A/J \cong \prod_{i=1}^r M_{n_i}(k).$$

每个简单模的自同态除环在代数闭域上为 k ，所以这里没有额外的除代数系数。第二卷定理 15.3.4 又允许将各矩阵块的对角矩阵单位提升为一组完整正交幂等元。

定义 9.5.1. 设 k 为域， B 为非零有限维含么 k 代数。若 $B/J(B) \cong k^r$ 对某个 $r \geq 1$ 成立，就称 B 为一个分裂基本代数 (basic algebra)。在代数闭域上，“分裂”自动满足；一般基本代数的半单商可以是若干不同除代数的直积，本节不把它们都换成 k 。

命题 9.5.2. 设 k 为代数闭域， A 为非零有限维含么 k 代数。可取一个幂等元 $e \in A$ ，使 $AeA = A$ ，且 $B = eAe$ 是分裂基本代数。将 Ae 按乘法看成 (A, B) -双模，则函子

$$M \longmapsto eM, \quad N \longmapsto Ae \otimes_B N$$

给出左 A 模与左 B 模的等价，并保持有限维性。

²欧拉 (Leonhard Euler, 1707-1783)，瑞士数学家，研究数论、分析与图论，奠定多项基础。

证明. 在每个 $M_{n_i}(k)$ 块中选一个秩一对角幂等元, 取相容提升 e_i , 并令 $e = \sum_i e_i$ 。第二卷命题 15.4.5 关于基本角代数的结论在这里给出

$$J(eAe) = eJe, \quad eAe/eJe \cong k^r.$$

这些条件也可直接检查: eJe 幂零, 商角环恰是在每个矩阵块保留一个对角位置, 因此半单且为 k^r 。商代数中每个所选秩一幂等元生成整个对应矩阵块, 故 $AeA + J = A$ 。令 $M = A/AeA$, 则 $JM = M$; 迭代得到 $M = J^N M = 0$, 所以 $AeA = A$ 。这验证了第二卷命题 16.3.4 的满幂等元条件, 该命题用乘法映射 $Ae \otimes_B eM \rightarrow M$ 、 $ae \otimes m \mapsto am$ 和 $eAe \otimes_B N \rightarrow N$ 证明所列函子互为拟逆。这里 Ae 有限维, 故两个函子也保持有限维对象。□

非代数闭域上的限制不能忽略。例如实代数 $\mathbb{C}$ 已是除代数, 只有一个简单模类型; 一个普通单顶点、无箭的实箭图只给出 $\mathbb{R}$, 不能用它记录 $\mathbb{C}$ 的除代数结构。本节的普通箭图结论以分裂条件为基础。

9.5.2 根商构造的箭图、箭向与扩张维数

以下设 $B/J \cong k^r$, 并选取提升标准坐标元的一组完整正交幂等元 $e_1, \dots, e_r$, 其中 $J = J(B)$ 。简单模为 $S_i = Be_i/Je_i$, 每个都一维。选取每个空间

$$e_j(J/J^2)e_i$$

的一组 k 基, 对每个基元画一支箭 $i \rightarrow j$ 。这里包括 $i = j$ 的圈。根只保留第一层, 是因为 J^2 中的元素已经可能由两支箭的复合产生, 不应当再次作为独立箭。

命题 9.5.3. 设 k 为域, B 为非零有限维含么分裂基本 k 代数, $J = J(B)$, $B/J \cong k^r$ 。取一组完整正交幂等元 $e_1, \dots, e_r \in B$, 其模 J 的像分别为 k^r 的标准坐标幂等元, 令简单左模 $S_i = Be_i/Je_i$ 。则对 $1 \leq i, j \leq r$ 有

$$\text{Ext}_B^1(S_i, S_j) \cong \text{Hom}_k(e_j(J/J^2)e_i, k).$$

以 $1, \dots, r$ 为顶点, 对每个 $e_j(J/J^2)e_i$ 的基元画一支箭 $i \rightarrow j$, 则所得箭图中从 i 到 j 的箭数为 $\dim_k \text{Ext}_B^1(S_i, S_j)$ 。

证明. Be_i 是正则模的直和因子, 因而投射。将命题 9.4.3 用于 $0 \rightarrow Je_i \rightarrow Be_i \rightarrow S_i \rightarrow 0$ 。从 Be_i 到 S_j 的任何模同态都把 Je_i 送到 $JS_j = 0$, 故该 Hom 映射的限制为零。于是

$$\text{Ext}_B^1(S_i, S_j) \cong \text{Hom}_B(Je_i, S_j).$$

右侧的同态又零化 J^2e_i , 所以可在 Je_i/J^2e_i 上计算。这个模被 J 零化, 是 k^r 模; 映到 S_j 的同态只保留第 j 个坐标, 并在该坐标上为任意 k 线性泛函。选 e_j 在 S_j 中的像为基, 便得到所列同构。□

这个箭图称为 B 的 **Ext 箭图** (Ext quiver)。箭的具体基依赖选择, 但每一对顶点间的箭数由扩张空间决定。注意顺序是 $\text{Ext}^1(S_i, S_j)$ 对应 $i \rightarrow j$: 其扩张以 S_j 为子模、 S_i 为商模。

9.5.3 容许关系、路径代数与有限维性

定理 9.5.4. 设 k 为域, B 为非零有限维含么分裂基本 k 代数, $J = J(B)$, $B/J \cong k^r$. 取一组完整正交幂等元 $e_1, \dots, e_r$, 其模 J 的像为各标准坐标幂等元. 以 $1, \dots, r$ 为顶点, 对每个 $e_j(J/J^2)e_i$ 的一组 k 基中的元素画一支箭 $i \rightarrow j$, 构成有限箭图 Q . 则存在 kQ 的容许关系理想 I , 使

$$B \cong kQ/I.$$

特别地, 每个代数闭域上的非零有限维代数都与某个这种商代数 Morita 等价.

证明. 记 $J = J(B)$. 将顶点送到选定的 e_i , 将每支箭 $i \rightarrow j$ 送到其基元的某个提升 $x_a \in e_j J e_i$. 顶点关系成立, 由路径代数的构造得到同态 $\phi: kQ \rightarrow B$. 令 C 为这些像生成的子代数, L 为箭像的线性生成空间. 基的选择给出 $J = L + J^2$, 而顶点像生成 B/J , 故 $B = C + J$. 将 $J = L + J^2$ 的乘积展开, 可得 $J^m \subseteq L^m + J^{m+1} \subseteq C + J^{m+1}$. 逐层代入 $B = C + J$, 最终用 $J^N = 0$ 得到 $B = C$. 所以 ϕ 满射. 令 $I = \ker \phi$, 并令 $\mathfrak{a}$ 为箭理想. 因每支箭映入 J , 有 $\mathfrak{a}^N \subseteq I$, 必要时增大 N 使 $N \geq 2$. 为证 $I \subseteq \mathfrak{a}^2$, 把核中一个元素拆成长度零项、长度一项及较长路径. 其像模 J 为零, 迫使全部顶点系数为零; 再模 J^2 , 箭像的基独立性迫使全部长度一系数为零. 故它只含长度至少二的路径. 所求理想容许, 第一同构定理给出商表示. 最后结合命题 9.5.2, 得到一般代数闭基域情形. $\square$

关系理想通常不唯一, 因为箭的提升与基可以改变. 定理给出的是一种适合模范畴的展示, 并不宣称所有代数都有唯一的一组路径关系. 这里的生成性也用到了根的幂零性; 若只知道根的第一层而没有这种有限性, 就不能用同样的有限步推导结束.

9.5.4 三角矩阵、双数与带关系代数

上三角矩阵代数 $T_3(k)$ 的根由 E_{12}, E_{23}, E_{13} 生成, 根平方由 $E_{13} = E_{12}E_{23}$ 生成. 因此箭图只有 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 的两支箭; 其六条路径对应六个上三角矩阵单位, 不必再加入关系. 这也复核了左模约定下的箭向.

双数代数 $k[t]/(t^2)$ 则只有一个顶点和一支圈, 关系为圈的平方为零. 它的简单模 $S = k$ 满足

$$\text{Ext}^1(S, S) \cong k,$$

因为 $J/J^2 = kt$. 同样的单圈若改加 $t^3 = 0$, Ext 箭图仍相同, 代数维数却从二变成三, 最长不可分解的幂零链也从二变成三. 箭图本身没有记录全部乘法, 关系不可省去.

例 9.5.5. 设 k 为域, $Q = (1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3)$, $B = kQ/(ba)$. 其基为 e_1, e_2, e_3, a, b , 根平方为零, Ext 箭图仍是原来的三顶点直线. 然而维数向量 $(1, 1, 1)$ 不再有不可分解表示: 两支箭由标量 α, β 给出, 关系要求 $\beta\alpha = 0$, 故至少一支箭为零, 表示沿该处拆成直和. 在无关系的 kQ 上, $I[1, 3]$ 则是这个维数向量的不可分解表示.

因此下一章关于无关系路径代数的根分类, 不能直接用于具有同一箭图的任意商代数.

9.5.5 ADE 二次型与反射简介

对有限无环箭图，定理 9.4.4 已经给出

$$q_Q(\mathbf{d}) = \sum_i d_i^2 - \sum_{a:i \rightarrow j} d_i d_j = \dim \operatorname{End}_Q(V) - \dim \operatorname{Ext}_Q^1(V, V), \quad \mathbf{d} = \mathbf{d}(V).$$

右边来自表示的线性方程，左边却只用图和整数向量。在线性定向 A_n 中，一个区间向量含有 $b - a + 1$ 个一，区间内有 $b - a$ 支箭，所以其值为一。我们已经用选基法证明了这些区间给出全部不可分解表示；这个数值因而有实际分类意义。

其他无向图是否也有类似现象，需要继续研究 q_Q 的正定性以及改变箭向的办法。第十章将定义整数格上的反射，证明所需的 ADE 图判别，再构造反射函子。对于带关系代数，例 9.5.5 已经说明，仅仅保留同一个图上的二次式还不足以恢复不可分解表示。

本章小结

路径乘法采用“先右后左”的复合次序，因此箭 $a : i \rightarrow j$ 满足 $a = e_j a e_i$ ，在左模上从 $e_i M$ 映到 $e_j M$ 。顶点分解把左模与箭图表示联系起来，箭上的交换条件则把模同态化为一组线性方程。这个对应同时保留直和、核、余核和扩张。

在线性定向的 A_n 上，区间表示给出全部不可分解对象，各段复合的秩决定区间重数。一般无环箭图虽然未必有这种简单分类，仍有长度一的投射消解。它把 Hom 与 Ext^1 分别表示为同一个线性映射的核与余核；扩张中的分块箭矩阵又解释了这一余核的含义。扩张以 S_j 为子模、 S_i 为商模时，对应的是从 i 指向 j 的箭。

反过来，有限维分裂基本代数的根第一层 J/J^2 决定箭，而根的更高乘法决定关系。代数闭域上的一般有限维代数先经满幂等元约化为基本代数，再得到路径代数模容许关系的展示。相同的 Ext 箭图可以承载不同的关系和不同的表示分类；下一章的 Gabriel 定理只处理没有附加关系的无环箭图。

习题

习题 9.1. 设箭图有四个顶点及四支箭 $a : 1 \rightarrow 2$ 、 $b : 1 \rightarrow 3$ 、 $c : 2 \rightarrow 4$ 、 $d : 3 \rightarrow 4$ 。列出路径代数的基与维数。再取 $B = kQ/(ca - db)$ ，证明关系理想容许，并求 B 、 $J(B)$ 、 $J(B)^2$ 的维数。

解. 全部路径为

$$e_1, e_2, e_3, e_4, a, b, c, d, ca, db,$$

所以 $\dim kQ = 10$ 。没有长度三路径，故箭理想 $\mathfrak{a}$ 满足 $\mathfrak{a}^3 = 0$ 。关系 $ca - db$ 位于 $\mathfrak{a}^2$ ，且不能再与正长度路径非零拼接，所以它生成的一维理想正是 $k(ca - db)$ ，容许条件 $\mathfrak{a}^3 \subseteq I \subseteq \mathfrak{a}^2$ 成立。商中两条长度二路径合为一个非零基向量，故 $\dim B = 9$ 。根由四支箭及这个长度二路径生成，维数为 5；根平方由后者生成，维数为 1，根立方为零。□

习题 9.2. 设 Q 是箭图 $n \rightarrow n-1 \rightarrow \cdots \rightarrow 1$ 。证明 $kQ \cong T_n(k)$ ，其中 $T_n(k)$ 为上三角矩阵代数，并说明为什么在本章左模约定下应取这个箭向。

解. 把 e_i 送到 E_{ii} , 把箭 $i \rightarrow i-1$ 送到 $E_{i-1,i}$. 从 i 到 $j \leq i$ 的唯一路径被送到 E_{ji} , 包括 $j = i$ 的长度零路径. 矩阵单位满足 $E_{\ell j} E_{ji} = E_{\ell i}$, 不可拼接时乘积为零, 故这定义代数同态. 全部路径与全部上三角矩阵单位一一对应, 所以同态为同构. 左乘 $E_{ji} = E_{jj} E_{ji} E_{ii}$ 将左模的第 i 个顶点空间送到第 j 个顶点空间; 因此矩阵下标与箭向正好相符. 若不同时改变顶点编号和约定, 不能把箭向直接反过来. $\square$

习题 9.3. 设 Q 有两顶点及箭 $a: 1 \rightarrow 2, b: 2 \rightarrow 1$, 令 $\mathfrak{a}$ 为箭理想, $B = kQ/\mathfrak{a}^3$. 求 B 的路径基、根的各次幂, 以及左投射模 Be_1, Be_2 的维数向量.

解. 商中保留长度零、一、二的路径, 基为 e_1, e_2, a, b, ba, ab , 所以维数为 6. $J(B)$ 由 a, b, ba, ab 张成, $J(B)^2$ 由 ba, ab 张成, $J(B)^3 = 0$. Be_1 以从顶点 1 出发的路径 e_1, a, ba 为基, 分别终止于 1, 2, 1, 故维数向量为 $(2, 1)$; 同理 Be_2 的基为 e_2, b, ab , 向量为 $(1, 2)$. 原箭图有有向圈, 路径代数无限维, 但容许关系使商代数有限维. $\square$

习题 9.4. 单圈箭图给出 $k[t]$. 讨论二维商 $A = k[t]/(t^2 - 1)$: 分别在 $\text{char } k \neq 2$ 与 $\text{char } k = 2$ 时求其根和一个具有容许关系的箭图展示, 并解释原关系为何不容许.

解. 原箭理想为 (t) , 而 $t^2 - 1 \notin (t^2)$, 所以原理想不容许. 特征不为 2 时, 互素因子 $t-1, t+1$ 给出 $A \cong k \times k$, 根为零, 改用两个孤立顶点、零关系理想即可. 特征为 2 时, 令 $u = t-1$, 有 $t^2 - 1 = u^2$, 所以 $A \cong k[u]/(u^2)$, 根为 ku , 根平方为零. 此时用一个顶点、一支新圈 u 及关系 $u^2 = 0$, 便得到容许展示. 代数的有限维性不保证任意一组给定生成元都适合作为根第一层的箭. $\square$

习题 9.5. 沿习题 9.1 的四支箭分别放置非零标量 a, b, c, d , 各顶点空间均为 k . 证明无关系时, 同构类由 $\lambda = ca/(db)$ 决定; 加入关系 $ca - db = 0$ 后, 这些表示只剩一个同构类.

解. 顶点换基为 $g_1, g_2, g_3, g_4 \in k^\times$. 两条复合分别变为 $g_4(ca)g_1^{-1}$ 和 $g_4(db)g_1^{-1}$, 所以其比值不变. 取 $g_1 = 1, g_2 = a^{-1}, g_3 = b^{-1}, g_4 = (ca)^{-1}$, 前三支箭 a, b, c 全变为 1, 第四支箭变为 $db/(ca) = \lambda^{-1}$. 因此相同比值足以保证同构, 不同比值不可能同构. 关系恰好要求 $\lambda = 1$, 所以有关系时得到唯一的全非零类型. $\square$

习题 9.6. 设 V 为有限箭图 Q 的有限维表示. 证明取各顶点对偶空间和各箭的转置映射给出反向箭图 Q^{op} 的表示, 并说明它与把有限维左 kQ -模取 k -对偶所得右模相符.

解. 箭 $a: i \rightarrow j$ 的对偶为 $V_a^*: V_j^* \rightarrow V_i^*$, 方向反转. 复合满足 $(V_b V_a)^* = V_a^* V_b^*$, 正好对应反向路径. 若 M 为左模, 在 $M^* = \text{Hom}_k(M, k)$ 上定义

$$(\ell \cdot x)(m) = \ell(xm) \quad (x \in kQ).$$

则 $(\ell \cdot x) \cdot y = \ell \cdot (xy)$, 所以得到右模. 其第 i 个顶点空间为 $M^* e_i \cong (e_i M)^*$, 右乘 $a = e_j a e_i$ 从第 j 个空间到第 i 个空间, 正是上述转置箭. 态射对偶反转方向; 有限维向量空间的对偶保持短正合列并反转箭头, 故两种描述也在态射及正合列上相符. $\square$

习题 9.7. 在 $Q: 1 \rightarrow 2$ 上, 取

$$V = \left(k^2 \xrightarrow{(x,y) \mapsto x} k \right), \quad W = \left(k \xrightarrow{z \mapsto (z,0)} k^2 \right).$$

令 $f_1(x, y) = x$, $f_2(z) = (z, 0)$ 。验证 $f = (f_1, f_2)$ 为表示同态, 求其核、像和余核, 并判断它是否为单射或满射。

解. 两条复合都把 (x, y) 送到 $(x, 0)$, 故交换条件成立。核在顶点 1 为 $k(0, 1)$ 、顶点 2 为零, 所以是 S_1 。像在两顶点分别为 k 和 $k(1, 0)$, 箭为同构, 所以同构于 $I[1, 2]$ 。余核只在顶点 2 有一维空间, 因而为 S_2 。核与余核都非零, 故 f 既不是单射也不是满射; 某一顶点上的满射或单射不足以替代所有顶点上的条件。□

习题 9.8. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $Q = (1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow n)$, $1 \leq a \leq b \leq n$, $1 \leq c \leq d \leq n$, $I[a, b], I[c, d]$ 为 k 上的区间表示。证明

$$\dim_k \operatorname{Hom}_Q(I[a, b], I[c, d]) = \begin{cases} 1, & c \leq a \leq d \leq b, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

在非零情形写出一个基态射。

解. 两区间不相交时, 逐顶点的映射全为零。若相交, 重合区间内部的恒等箭迫使全部分量为同一个标量 λ 。若 $a < c$, 在目标首次出现的箭 $c-1 \rightarrow c$ 上, 源端的映射为恒等而目标从零空间进入, 交换条件迫使 $\lambda = 0$ 。若 $b < d$, 在源最后出现后的箭 $b \rightarrow b+1$ 上, 同样迫使 $\lambda = 0$ 。非零态射因此要求 $c \leq a$ 、 $d \leq b$, 连同重合条件得到 $c \leq a \leq d \leq b$ 。这些条件成立时, 在重合顶点 $a, \dots, d$ 取恒等映射, 其余分量取零。内部箭交换; 两端边界处要么两边复合都为零, 要么仍是同一恒等复合, 故得到态射。任意态射都是它的标量倍, 所以空间恰为一维。□

习题 9.9. 对 $Q: 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$, 令 $U = I[1, 3]$ 、 $V = I[2, 3]$ 、 $W = I[2, 2]$ 。求 $\operatorname{End}_Q(U \oplus V \oplus W)$ 的矩阵形式、维数及 Jacobson 根。

解. 由上一题, 除了三个恒等类型的 Hom 外, 只有 $\operatorname{Hom}(V, U) \cong k$ 和 $\operatorname{Hom}(V, W) \cong k$ 非零。分别选择重合区间上的恒等映射为基, 以 U, V, W 排列直和项, 自同态代数可写为

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in k \right\}.$$

维数为 5。令三个对角元全为零所得二维理想的平方为零, 模掉它得到 k^3 。幂零理想包含在根中, 半单商又使根不可能更大, 所以该理想正是 Jacobson 根。这也说明各直和项的自同态虽只有标量, 整个直和的自同态代数仍含有非对角的态射信息。□

习题 9.10. 在 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 上取维数向量 $(3, 4, 2)$, 箭矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求区间分解, 并说明为何只知道两支箭各自的秩仍不够。

解. 有 $\text{rank } A = 2$ 、 $\text{rank } B = 2$ 、 $\text{rank}(BA) = 1$ 。代入区间重数公式, 得到

$$I[1, 3] \oplus I[1, 2] \oplus I[2, 3] \oplus I[1, 1] \oplus I[2, 2].$$

若保持 A 不变, 将 B 换成选取第三、第四坐标的映射, 则 B 的秩仍为 2, 但 $BA = 0$; 所得分解为 $I[1, 2]^{\oplus 2} \oplus I[2, 3]^{\oplus 2} \oplus I[1, 1]$ 。两个表示的维数向量及相邻箭秩完全相同, 区间分解却不同。□

习题 9.11. 对线性定向 A_4 , 设各段复合的秩为

$$(r_{ij})_{i \leq j} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ & 3 & 2 & 1 \\ & & 3 & 2 \\ & & & 2 \end{pmatrix}.$$

求全部非零区间重数, 并据此说明这些秩确实能够由一个表示实现。

解. 用定理 9.3.4 的四项差公式, 非零重数恰为

$$m_{12} = m_{13} = m_{24} = m_{34} = 1.$$

因此取 $I[1, 2] \oplus I[1, 3] \oplus I[2, 4] \oplus I[3, 4]$ 即可。其顶点维数为 $(2, 3, 3, 2)$; 每段复合的秩等于同时覆盖该段首尾顶点的区间数, 逐项计数恢复所列全部数值。这既给出分解, 也提供了可实现性的构造。□

习题 9.12. 有人给 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 提出维数向量 $(2, 2, 2)$, 两支箭的秩都为 2, 但复合秩为 1。说明这组资料为何不可能, 并从区间重数公式找到同一个矛盾。

解. 两个二维空间间的满秩映射都可逆, 故复合也可逆, 秩应为 2。从重数公式看, 单点区间 $I[2, 2]$ 的重数应为 $2 - 2 - 2 + 1 = -1$, 不可能为一个直和重数。分别检查每个秩不超过定义域和值域维数, 只给出了必要条件, 尚未保证不同复合之间相容。□

习题 9.13. 在 $1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow n$ 上求区间表示 $I[a, b]$ 的全部子表示。写出一个简单组列, 并求相应商表示。

解. 各个非零顶点空间为一维, 子空间只能为零或整个 k 。若某顶点上的子空间为 k , 其后区间内部的恒等箭迫使所有后续顶点也取 k 。因此除零子表示外, 子表示恰为 $I[c, b]$, 其中 $a \leq c \leq b$ 。相应商为 $I[a, c-1]$, 在 $c = a$ 时理解为零。逐步加入右端顶点, 得到

$$0 \subset I[b, b] \subset I[b-1, b] \subset \cdots \subset I[a, b].$$

各相邻商依次为 $S_b, S_{b-1}, \dots, S_a$, 所以组成长度为 $b - a + 1$ 。这些组成因子并不构成直和分解; 当 $a < b$ 时, 原区间仍不可分解。□

习题 9.14. 对习题 9.1 的箭图, 写出 $P_1 = kQe_1$ 的各顶点空间与箭映射。再对 $B = kQ/(ca - db)$ 求 Be_1 , 解释一个关系怎样改变这个投射表示。

解. P_1 在顶点 1, 2, 3, 4 的基分别为

$$(e_1), (a), (b), (ca, db).$$

前两支箭把 e_1 分别送到 a, b , 后两支箭把 a, b 分别送到 ca, db . 因此维数向量为 $(1, 1, 1, 2)$, 顶点 4 的两条到达路径彼此独立. 在 Be_1 中, $ca = db$; 它们的共同像仍非零, 所以顶点 4 变为一维, 其他顶点不变, 各箭在所选基下均为恒等. 维数向量变为 $(1, 1, 1, 1)$. Be_1 仍投射, 因为 $B = Be_1 \oplus B(1 - e_1)$ 是左模直和. 关系改变路径之间的线性独立性, 而不是取消顶点幂等元给出的投射直和项. $\square$

习题 9.15. 设 k 为域, Q 为有限无向环箭图, $i \in Q_0$, S_i 为只在顶点 i 取 k 的简单表示. 证明 S_i 投射, 当且仅当没有从 i 出发的箭.

解. 没有出箭时, 从 i 出发的路径只有 e_i , 所以 $P_i = kQe_i = S_i$, 投射性由命题 9.4.1 给出. 若有出箭, 则 P_i 的正长度路径张成非零真子表示, 商为 S_i . 若 S_i 投射, 满射 $P_i \rightarrow S_i$ 就会分裂, 使 P_i 成为两个非零子表示的直和. 可是同一命题已经证明 $\text{End}_Q(P_i) = k$, 所以 P_i 不可分解, 矛盾. 因此有出箭时 S_i 不投射. $\square$

习题 9.16. 设 Q 有箭 $a: 1 \rightarrow 2, b: 2 \rightarrow 3, c: 1 \rightarrow 3$. 求 $\text{Ext}_Q^1(S_1, S_3)$ 与 $\text{Ext}_Q^1(S_3, S_1)$ 的维数. 再写出 S_1 的短投射消解, 说明箭 c 与路径 ba 在其中的不同作用.

解. 两简单表示之间的 Hom 为零. 两种方向的 Euler 数分别为 -1 与 0 , 所以扩张维数分别为 1 与 0 . 扩张箭数只计直接箭 c , 不能把长度二的路径 ba 再数一次. 投射消解为

$$0 \rightarrow P_2 \oplus P_3 \xrightarrow{u} P_1 \rightarrow S_1 \rightarrow 0.$$

P_2 以 e_2, b 为基, u 把它们分别送到 a, ba ; P_3 只有基向量 e_3 , 它被送到 c . 这三条正长度路径线性无关, 恰好生成 $P_1 \rightarrow S_1$ 的核. 路径 ba 是箭 a 所生成的投射子表示内部继续沿 b 得到的向量; 箭 c 则需要另一个独立投射生成项. $\square$

习题 9.17. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $Q = (1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow n)$, $1 \leq a \leq b \leq n, 1 \leq c \leq d \leq n$, $I[a, b], I[c, d]$ 为 k 上的区间表示. 证明

$$\dim_k \text{Ext}_Q^1(I[a, b], I[c, d]) = \begin{cases} 1, & a < c \leq b+1 \leq d, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

提示: 先把 $I[a, b]$ 写成两个顶点投射表示之间的商.

解. 若 $b = n$, 则 $I[a, b] = P_a$ 投射, Ext 为零, 所列非零条件也因 $d \leq n$ 而不可能成立. 若 $b < n$, 有

$$0 \rightarrow P_{b+1} \rightarrow P_a \rightarrow I[a, b] \rightarrow 0,$$

左映射在两区间重合的顶点取恒等. 对任意表示 W , 由命题 9.4.3 及顶点取值同构, 得到

$$\text{Ext}_Q^1(I[a, b], W) \cong W_{b+1} / \text{im}(W_a \rightarrow W_{b+1}),$$

其中映射是沿唯一有向路径的复合. 取 $W = I[c, d]$. 分子非零恰好要求 $c \leq b+1 \leq d$, 此时它为 k . 在这一条件下, 从 W_a 到它的复合非零恰好当 $c \leq a$, 因为 $a \leq b < b+1 \leq d$. 故余核一维恰好要求再加 $a < c$; 其余情形余核为零. $\square$

习题 9.18. 在 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 上构造非分裂短正合列

$$0 \rightarrow I[2, 4] \rightarrow I[1, 4] \oplus I[2, 2] \rightarrow I[1, 2] \rightarrow 0.$$

写出全部非零顶点分量, 并核验它代表 $\text{Ext}_Q^1(I[1, 2], I[2, 4])$ 的非零类。

解. 左映射的第一分量为自然包含 $I[2, 4] \rightarrow I[1, 4]$, 第二分量为到顶点 2 的自然商映射。右映射的第一分量是截去顶点 3, 4 的商映射 $I[1, 4] \rightarrow I[1, 2]$, 第二分量取自然包含 $I[2, 2] \rightarrow I[1, 2]$ 的负号。顶点 2 上的两个映射因此是

$$k \xrightarrow{x \mapsto (x, x)} k^2 \xrightarrow{(u, v) \mapsto u - v} k,$$

它们正合; 在顶点 1 上右映射为恒等, 在顶点 3, 4 上左映射为恒等。各箭交换条件由上述区间包含及商映射满足, 所以全列正合。如果分裂, 中间项应同构于 $I[2, 4] \oplus I[1, 2]$, 但它的实际不可分解分解为 $I[1, 4] \oplus I[2, 2]$, 与命题 9.3.3 的唯一性矛盾。故扩张非零。上一题的条件为 $1 < 2 \leq 3 \leq 4$, 因此相应 Ext 空间恰为一维。□

习题 9.19. 设 k 为域, Q 为有限无有向环箭图, P 为有限维投射 k 表示, $U \subseteq P$ 为子表示。利用本章的长度一投射消解证明 U 也投射。

解. 令 $M = P/U$ 。由定理 9.4.2, 取 $0 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_0 \rightarrow M \rightarrow 0$, 其中 Q_0, Q_1 都投射。记两个满射为 $u: P \rightarrow M$ 、 $v: Q_0 \rightarrow M$, 构造拉回

$$E = \{ (p, q) \in P \oplus Q_0 \mid u(p) = v(q) \},$$

投影到 Q_0 给出 $0 \rightarrow U \rightarrow E \rightarrow Q_0 \rightarrow 0$, 因 Q_0 投射而分裂, 故 $E \cong U \oplus Q_0$ 。投影到 P 又给出 $0 \rightarrow Q_1 \rightarrow E \rightarrow P \rightarrow 0$, 因 P 投射而分裂, 故 $E \cong Q_1 \oplus P$ 投射。投射对象的直和因子仍投射: 把一个待提升映射先接直和投影, 再对整个投射对象提升, 最后限制到该因子即可。因此 U 投射。□

习题 9.20. 设 $Q: 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$, $B = kQ/(ba)$ 。令 $V = S_1$, $W = I[2, 3]$, 两者都满足关系。分别计算 $\text{Ext}_{kQ}^1(V, W)$ 与 $\text{Ext}_B^1(V, W)$, 并说明无关系的 Euler 公式为何不能直接用于后者。

解. 在无关系箭图上, 上一节的区间 Ext 公式给出一维扩张空间; 非零类的中间项为 $I[1, 3]$ 。也可直接看箭矩阵: 扩张只可能有一个参数 $\xi_a: V_1 \rightarrow W_2$, 而 $\xi_b = 0$, 且所有顶点上的 $V_i \rightarrow W_i$ 都为零, 所以无截面变化能消去该参数。在 B -模扩张中, 关系要求

$$W_b \xi_a + \xi_b V_a = 0.$$

这里 $W_b = 1$, 所以 $\xi_a = 0$, 每个扩张都分裂, Ext 为零。用维数向量计算的原 Euler 数仍为 $\langle (1, 0, 0), (0, 1, 1) \rangle_Q = -1$, 但在 B 上 Hom 与 Ext 都为零。关系排除了那个非分裂中间项, 因为 $I[1, 3]$ 的两箭复合为恒等, 不满足 $ba = 0$ 。□

习题 9.21. 设 $m = 2$ 或 3 , $A_m = k[t]/(t^m)$ 。分类全部有限维不可分解左 A_m -模, 求唯一简单模的自扩张维数, 并比较两个代数的 Ext 箭图。

解. 一个有限维左模等同于一个满足 $T^m = 0$ 的幂零算子。其最小多项式整除 t^m , 在 k 上分裂, 所以第二卷定理 4.5.3 的 Jordan 标准形适用; 各 Jordan 块大小至多为 m , 每块对应 $k[t]/(t^r)$, 其中 $1 \leq r \leq m$ 。其自同态环为 $k[t]/(t^r)$: 同态由 1 的像唯一决定。该环只有平凡幂等元, 因此每一块不可分解; 不同块的维数不同, 故不同构。这给出 m 个不可分解类型。两个代数都只有简单模 $S = k$, 根为 (t) , J/J^2 一维。由命题 9.5.3, $\dim \text{Ext}_{A_m}^1(S, S) = 1$, Ext 箭图都是单顶点单圈。关系分别为 $t^2 = 0$ 与 $t^3 = 0$, 所以相同的箭图并不能区分二者, 也不能决定不可分解类型数。□

习题 9.22. 令 $D = k[t]/(t^2)$ 、 $A = M_2(D)$ 、 $e = E_{11}$ 。求 $J(A)$ 、 $A/J(A)$ 、 eAe , 并说明 A 的基本代数与容许关系箭图。再求 A 的有限维不可分解左模的可能维数。

解. 理想 $M_2((t))$ 的平方为零, 商为 $M_2(k)$, 所以 $J(A) = M_2((t))$ 、 $A/J(A) \cong M_2(k)$ 。角代数 $eAe \cong D$, 且矩阵单位使 $AeA = A$, 故它给出本章的满幂等元 Morita 约化。基本代数是 D , 对应一个顶点、一支圈及圈平方为零的关系; A 自己的半单商是二阶矩阵代数, 因而不是分裂基本代数。上一题给出 D 的两个不可分解类型 k, D 。右 D -模 Ae 自由秩为 2, 所以拟逆 $Ae \otimes_D -$ 把它们分别送到维数为 2 与 4 的 A -模。范畴等价保持并反映直和分解, 故这就是全部不可分解类型及其维数。□

习题 9.23. 设 k 为无限域,

$$A = k\langle x, y \rangle / (x^2, xy, yx, y^2).$$

求其根与 Ext 箭图。再在 k^2 上令 x 作用为 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 令 y 作用为 λN , 证明 $\lambda \in k$ 给出无穷多个两两不同构的不可分解左 A -模。

解. A 的基为 $1, x, y$, 根为 $kx \oplus ky$, 根平方为零, 半单商为 k 。因此它分裂基本, Ext 箭图有一个顶点、两支圈, 关系使任意两圈的乘积为零。给定的两个算子满足全部关系, 因为 $N^2 = 0$ 。与 N 对易的矩阵恰为 $aI + bN$, 所以同时与 $N, \lambda N$ 对易的代数同构于 $k[t]/(t^2)$, 没有非平凡幂等元。每个模因而不可分解。若可逆矩阵 g 给出参数 λ, μ 两模的同构, 则 $gN = Ng$ 且 $\lambda gN = \mu Ng$ 。由 $gN \neq 0$, 得到 $\lambda = \mu$ 。无限域因此给出无穷多个同构类型。三维代数的有限维性并不保证有限表示型。□

习题 9.24. 把 $\mathbb{C}$ 看作实代数。证明它不可能与任何具有容许关系的普通实箭图代数 $\mathbb{R}Q/I$ Morita 等价。

解. $\mathbb{C}$ 作为除代数只有一个简单左模的同构类型, 其自同态实代数为 $\mathbb{C}^{\text{op}} = \mathbb{C}$ 。另一方面, 容许关系给出

$$(\mathbb{R}Q/I)/J(\mathbb{R}Q/I) \cong \mathbb{R}Q_0,$$

所以每个简单模都是某个顶点上的一维实空间, 自同态实代数为 $\mathbb{R}$ 。Morita 等价把简单对象送到简单对象, 并由全忠实性保持它们的自同态环; 这会要求 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}$, 不可能, 例如前者含有平方为 -1 的元素而后者没有。因此代数闭或分裂基域的假设不能从普通箭图展示定理中直接删掉。□

第十章* 箭图、反射函子与 Gabriel 定理

本章以 Euler 二次型、根与反射函子分类有限表示型的无环箭图，证明 Gabriel 定理，并用带参数的表示族及几乎分裂序列说明有限型之外的现象。

本章目标

- 能计算 Euler 型，利用 Hom-Ext 公式检验具体表示的自扩张。
- 能从图的分叉与三臂配方判断正定性，并在整数格上计算根和简单反射。
- 能实施汇点的核反射及源点的余核反射，说明函子的互逆范围。
- 分别论证 Gabriel 定理的必要性、存在性与唯一性，并由正根构造表示。
- 区分有限型、单参数分类与野型嵌入，检验几乎分裂序列所要求的因子分解性质。

预备知识为第 9.1 节至第 9.4 节的箭图表示、路径代数、不可分解对象及短投射消解，以及有限维线性代数。本章从这些对象出发建立 ADE 二次型和反射。

设 k 为代数闭域。两顶点之间只有一支箭时，给定两端向量空间，一张线性映射在换基后的类型由秩决定。若改成两支平行箭，即使两端都只取 k ，两箭分别取 1 与 λ 也会随 $\lambda \in k$ 给出两两不同构的表示：同时换基可以缩放两箭，却不能改变它们的比值。分类为什么会因一支箭的增减，从有限种类型跳到带参数的家族？Euler 二次型、根与反射函子将把这一差别同箭图的形状联系起来。

这里的分类以无关系的路径代数为对象。第 9.5 节还讨论带非零关系的代数；对这类代数，不能只凭相同的 Ext 箭图套用这里的正根参数。

10.1 Euler 型与维数向量

同一组顶点空间可以承载许多不同的箭映射。维数向量遗忘了这些映射，却仍能限制自同态和扩张的大小。本节从这个限制出发，把有限分类的问题化为一个实二次型的问题。这里的正定性始终指实数上的正定性，与表示的基域是否有序无关。

10.1.1 箭图的 Euler 双线性型

定义 10.1.1. 设 $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ 为有限无有向环箭图， $Q_0 = \{1, \dots, n\}$ ，其中 s, t 为箭的起点、终点映射。对 $\mathbf{x} = (x_i)$ 、 $\mathbf{y} = (y_i) \in \mathbb{Z}^{Q_0}$ ，定义

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_Q = \sum_{i \in Q_0} x_i y_i - \sum_{a: i \rightarrow j} x_i y_j.$$

这一双线性型称为 Q 的 **Euler 型** (Euler form)。它的二次型及对称化分别记为

$$\begin{aligned} q_Q(\mathbf{x}) &= \sum_i x_i^2 - \sum_{a:i \rightarrow j} x_i x_j, \\ B_Q(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_Q + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle_Q. \end{aligned} \quad (10.1)$$

二次型 q_Q 也称为 **Tits 型** (Tits form)，以蒂茨¹命名。上述公式同时把它们延拓到实向量空间 $\mathbb{R}^{Q_0}$ 。

箭的方向影响 Euler 型，但不影响 q_Q 或 B_Q 。把方向忘掉而保留每条边的重数，所得无向图记为 Γ 。若 m_{ij} 为顶点 i, j 间的边数，则 B_Q 的矩阵为 $C = (c_{ij})$ ，其中

$$c_{ii} = 2, \quad c_{ij} = -m_{ij} \quad (i \neq j), \quad B_Q(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 2q_Q(\mathbf{x}).$$

本章不允许环，但允许平行箭；无向圈与有向圈是两种不同条件。

10.1.2 Hom、Ext 与维数向量

命题 10.1.2. 设 k 为域， Q 为有限无有向环箭图， V, W 为 Q 的有限维 k -表示，维数向量分别为 $\mathbf{d}, \mathbf{e}$ 。记 $\langle, \rangle_Q$ 为箭图的 Euler 型， $q_Q(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_Q$ ，将两表示视作左 kQ -模，则

$$\langle \mathbf{d}, \mathbf{e} \rangle_Q = \dim_k \operatorname{Hom}_Q(V, W) - \dim_k \operatorname{Ext}_{kQ}^1(V, W). \quad (10.2)$$

特别地， $q_Q(\mathbf{d}) = \dim_k \operatorname{End}_Q(V) - \dim_k \operatorname{Ext}_{kQ}^1(V, V)$ 。

证明. 定理 9.4.4 给出的正合列是

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_Q(V, W) &\longrightarrow \bigoplus_i \operatorname{Hom}_k(V_i, W_i) \\ &\longrightarrow \bigoplus_{a:i \rightarrow j} \operatorname{Hom}_k(V_i, W_j) \longrightarrow \operatorname{Ext}_{kQ}^1(V, W) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

它适用于当前的有限无环箭图和有限维表示。对有限维正合列取维数交错和，两个中间项的维数分别为 $\sum_i d_i e_i$ 与 $\sum_{a:i \rightarrow j} d_i e_j$ ，即得公式。再令 $W = V$ 。□

例如，对 $1 \rightarrow 2$ ，令 V 为 $k \xrightarrow{1} k$ ，则自同态为两端相同的标量，故 $\dim \operatorname{End}_Q(V) = 1$ 。因为 $q_Q(1, 1) = 1$ ，公式给出 $\operatorname{Ext}_{kQ}^1(V, V) = 0$ 。若把箭映射换成零，同一维数向量上的表示成为 $S_1 \oplus S_2$ ，自同态空间维数增为 2，自扩张空间的维数也增为 1。因此 $q_Q(\mathbf{d}) = 1$ 并不表示维数为 $\mathbf{d}$ 的每个表示都不可分解。

10.1.3 二次型的正定性

定义 10.1.3. 设 Q 为有限无有向环箭图， $q_Q(\mathbf{x}) = \sum_{i \in Q_0} x_i^2 - \sum_{a:i \rightarrow j} x_i x_j$ 为其实二次型。若对每个非零 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{Q_0}$ 都有 $q_Q(\mathbf{x}) > 0$ ，则称 q_Q 为**正定二次型** (positive definite quadratic form)。

¹蒂茨 (Jacques Tits, 1930-2021)，比利时裔法国数学家，研究群论与几何，提出楼理论。

对一条有 n 个顶点的无向链，二次型为

$$q(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left(x_1^2 + x_n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (x_i - x_{i+1})^2 \right). \quad (10.3)$$

若右端为零，则首项和全部相邻差都为零，故 $\mathbf{x} = 0$ 。所以任何定向的链都给出正定型。这个配方也适用于 $n = 1$ ，此时首尾两项都是 x_1^2 。

相反，若无向图含有一个圈，在圈的顶点上赋值 1，其余顶点上赋值 0，便有 $q(\mathbf{x}) \leq 0$ ：圈上的顶点数和边数相等，可能存在的弦只会继续减小二次型。这个例子提示我们，有限分类所容许的图必须相当稀疏。

10.1.4 有限无环箭图的二次型与 ADE 图

本章用图形本身定义 ADE 名称。 A_n 是有 $n \geq 1$ 个顶点的链； D_n 是有一个三叉顶点、三个臂长分别为 $1, 1, n-3$ 的树，其中 $n \geq 4$ ； E_6, E_7, E_8 的三个臂长依次为 $(1, 2, 2)$ 、 $(1, 2, 3)$ 、 $(1, 2, 4)$ 。臂长计中心以外的顶点数。它们统称本章的 **Dynkin 图** (Dynkin diagram)，也称 ADE 图。

定理 10.1.4 (正定型的图判别). 设 Q 为有限无有向环箭图， Γ 为保留边重数的无向基础图， $q_Q(\mathbf{x}) = \sum_{i \in Q_0} x_i^2 - \sum_{a:i \rightarrow j} x_i x_j$ 。则实二次型 q_Q 正定，当且仅当 Γ 的每个连通分支都是 ADE 图。若这一条件不成立，则存在非零 $\mathbf{d} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{Q_0}$ ，使 $q_Q(\mathbf{d}) \leq 0$ 。

证明. 不同连通分支的变量不相交，二次型是各分支二次型之和，因而只需处理连通图。我们先排除四类子图。所取向量在子图之外均赋值零；子图顶点间若还有额外边，其贡献非正，不会破坏所得不等式。

若两顶点间有 $m \geq 2$ 条边，在这两点赋值 1，得到 $q = 2 - m \leq 0$ 。若有无向圈，取上一小节的全 1 向量。所以正定图必须是没有重边的树。若一顶点至少连接四个邻点，在该顶点赋值 2，在四个邻点赋值 1，则 $q = 4 + 4 - 8 = 0$ 。最后，若树有两个三叉顶点，取连接它们的简单路径；路径上各点赋值 2，再在两端各选两个不在路径上的邻点赋值 1。树的性质使这四个邻点互不相同，且没有额外相连的边。设路径上有 l 个顶点，则

$$q = 4l + 4 - 4(l-1) - 8 = 0.$$

因此尚可能正定的图只有链和恰有一个三叉点的树。

链的正定性由(10.3)成立。设三叉树三个臂长为 $p-1, q-1, r-1$ ，按 $2 \leq p \leq q \leq r$ 排列。中心值记为 t 。对长度为 $p-1$ 的臂，补记 $x_0 = t, x_p = 0$ ，并令

$$z_j = x_j - \left(1 - \frac{j}{p}\right)t \quad (0 \leq j \leq p).$$

两端有 $z_0 = z_p = 0$ 。对三条臂分别作此代换，展开相邻差的平方并用 $\sum_{j=0}^{p-1} (z_j - z_{j+1}) = 0$ ，得到

$$q_Q(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \sum_{\text{三个臂}} \sum_{j=0}^{p-1} (z_j - z_{j+1})^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} - 1 \right) t^2. \quad (10.4)$$

第一个和式中每条臂的上界采用该臂自己的参数。当 $1/p + 1/q + 1/r > 1$ 时, 等号为零强迫 $t = 0$, 继而每条臂的全部 $z_j = 0$, 所以二次型正定。当这个和不大于 1 时, 取 t 为 p, q, r 的正公倍数, 并令每条臂上 $x_j = (1 - j/p)t$, 便得到一个非负整数向量, 其二次型不大于零。

还须解出严格不等式。若 $p \geq 3$, 三个倒数之和至多为 1, 故 $p = 2$ 。若 $q = 2$, 所有 $r \geq 2$ 都可行, 给出 D_{r+2} 。若 $q \geq 4$, 则和至多为 $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$; 剩下 $q = 3$, 而 $1/r > 1/6$ 恰好给出 $r = 3, 4, 5$, 分别为 E_6, E_7, E_8 。这证明了正定判别, 也在所有被排除的情形构造了所需整数向量。□

10.1.5 整数格上的简单反射与正根

定义 10.1.5. 设 Γ 为有限 ADE 图的不交并, 顶点集为 Γ_0 , m_{ij} 为顶点 i, j 间的边数。在 $\mathbb{Z}^{\Gamma_0}$ 上令 $q(\mathbf{x}) = \sum_i x_i^2 - \sum_{\{i,j\} \text{ 为边}} x_i x_j$, $B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = q(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - q(\mathbf{x}) - q(\mathbf{y})$ 。整数向量 $\alpha \in \mathbb{Z}^{\Gamma_0}$ 满足 $q(\alpha) = 1$ 时, 称为一个根 (root); 所有坐标非负根称为正根 (positive root)。标准基向量 $\mathbf{e}_i$ 称为简单根 (simple root)。对顶点 $i \in \Gamma_0$, 定义

$$s_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - B(\mathbf{x}, \mathbf{e}_i)\mathbf{e}_i, \quad (s_i \mathbf{x})_i = -x_i + \sum_j m_{ij}x_j, \quad (10.5)$$

其余坐标保持不变; 线性变换 s_i 称为顶点 i 的简单反射 (simple reflection)。

引理 10.1.6. 设 Γ 为有限 ADE 图的不交并, 在顶点整数格上令 $q(\mathbf{x}) = \sum_i x_i^2 - \sum_{\{i,j\} \text{ 为边}} x_i x_j$, $B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = q(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - q(\mathbf{x}) - q(\mathbf{y})$, $\mathbf{e}_i$ 为标准基向量, $s_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - B(\mathbf{x}, \mathbf{e}_i)\mathbf{e}_i$ 。以 $q = 1$ 的整数向量为根、非负根为正根, 则有下列性质。

1. 根的集合有限; 每个根或者是正根, 或者是一个正根的负数。
2. $s_i^2 = 1$, 且 s_i 保持 q 及整数格。若 α 为正根且不等于 $\mathbf{e}_i$, 则 $s_i \alpha$ 仍为正根; $s_i \mathbf{e}_i = -\mathbf{e}_i$ 。
3. 每个非简单正根都可经某个简单反射变成坐标和较小的正根。因此每个根都可由简单根经有限次简单反射得到。

证明. 正定性给出常数 $c > 0$, 使 $q(\mathbf{x}) \geq c \sum_i x_i^2$: 可在欧氏单位球面上取 q 的正最小值。因此 $q = 1$ 的整数向量只有有限多个。将任意整数向量写为 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, 其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 非负且支集不交。由于 B 的非对角元非正, 有 $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq 0$ 。若两者都非零, 正定性和整数性给出

$$q(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = q(\mathbf{u}) + q(\mathbf{v}) - B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 2.$$

所以根不能同时有正、负坐标。

由 $B(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i) = 2$, 代入反射公式即得 $s_i^2 = 1$ 和 $q(s_i \mathbf{x}) = q(\mathbf{x})$; 系数均为整数。反射只改变第 i 个坐标。若一个正根反射后为负根, 它原先在其他坐标必全为零, 故由 $q = 1$ 得原根为 $\mathbf{e}_i$ 。这也证明了第二项中的正性断言。

最后, 对正根 α , 有

$$\sum_i \alpha_i \cdot B(\alpha, \mathbf{e}_i) = B(\alpha, \alpha) = 2.$$

故某个 $\alpha_i > 0$ 的位置满足 $B(\alpha, \mathbf{e}_i) > 0$ 。若根非简单，第二项保证 $s_i \alpha$ 为正根，而其坐标和减少这个正整数。反复进行，正整数的坐标和最终不能再减少，终点只能是简单根。反向使用同一组反射即得最后的断言；负根先由 $s_i \mathbf{e}_i = -\mathbf{e}_i$ 处理。□

这些根暂时只是整数格中的向量。它们与不可分解表示的对应将在第 10.3 节证明；以后 Lie 代数中也会出现相同的 ADE 图。根与反射的这套构造可对照 [4, Section 6.4, pp. 160–163]。

10.2 反射函子

简单反射只改动一个整数坐标。在表示中实现这一运算，需要构造新的顶点空间，并相应改变邻接的箭映射。汇点上的核、源点上的余核给出所需构造。反射可能把一个简单表示消去，因此它不会给出整个表示范畴之间的等价。

10.2.1 汇点反射与源点反射

定义 10.2.1. 设 k 为域， Q 为有限无有向环箭图， i 为没有出箭的汇点， Q' 由反转所有以 i 为终点的箭得到。对 Q 的有限维 k 表示 $V = (V_j, V_a)$ ，令

$$E_i(V) = \bigoplus_{a:j \rightarrow i} V_j, \quad \phi_V : E_i(V) \longrightarrow V_i, \quad (v_a)_a \mapsto \sum_{a:j \rightarrow i} V_a(v_a).$$

保留其他顶点空间，在 i 处取 $\ker \phi_V$ ；每条反转后的箭 $a^* : i \rightarrow j$ 取包含映射 $\ker \phi_V \hookrightarrow E_i(V)$ 与第 a 个投影的复合。所得 Q' -表示记为 $F_i^+ V$ ，构造 F_i^+ 称为**汇点反射函子** (sink reflection functor)。

若 i 是没有入箭的源点，另令 Q' 为反转所有以 i 为起点的箭所得箭图，并令

$$E_i(V) = \bigoplus_{a:i \rightarrow j} V_j, \quad \psi_V : V_i \longrightarrow E_i(V), \quad v \mapsto (V_a(v))_a.$$

在 i 处取 $\operatorname{coker} \psi_V$ ，其他顶点不变；每条反转后的箭取相应直和包含与商映射的复合。所得表示记为 $F_i^- V$ ，构造 F_i^- 称为**源点反射函子** (source reflection functor)。

这里的直和以箭为指标。两条平行箭即使出自同一顶点，也对应两个独立的直和分量；漏掉这个重数会使维数公式错误。

还须说明这两个构造怎样作用于态射。若 $f : V \rightarrow W$ 是表示态射，在汇点有

$$f_i \phi_V = \phi_W \left(\bigoplus_a f_{s(a)} \right).$$

因此右侧直和映射把 $\ker \phi_V$ 送入 $\ker \phi_W$ ，它的限制就是新顶点上的映射。各直和投影与此映射相容，保证反转后的箭图仍交换。在源点同样有

$$\left(\bigoplus_a f_{t(a)} \right) \psi_V = \psi_W f_i,$$

故直和映射诱导余核之间的映射；商映射与各直和包含相容。限制或取商都保持恒等态射、复合及态射的加法，所以确实得到两个加性 k -线性函子。汇点或源点反射不会制造有向圈，因为新箭图中的 i 分别成为源点或汇点，任何经过它的有向圈都不可能存在。

10.2.2 反射函子对不可分解表示的作用

记 S_i 为仅在顶点 i 处有一个 k 、其余空间全为零的简单表示。以下分裂现象说明，反射唯一需要排除的不可分解对象正是 S_i 。

引理 10.2.2. 设 k 为域， Q 为有限无有向环箭图， $V = (V_j, V_a)$ 为有限维 k 表示， $i \in Q_0$ 。记 S_i 为只在顶点 i 取 k 的简单表示， $\phi_V : \bigoplus_{a:j \rightarrow i} V_j \rightarrow V_i$ 为各入箭映射之和， $\psi_V : V_i \rightarrow \bigoplus_{a:i \rightarrow j} V_j$ 为各出箭映射组成的映射， F_i^+, F_i^- 分别为汇点、源点反射函子。

1. 若 i 是汇点，则 ϕ_V 满射当且仅当 V 没有非零的 S_i 直和项。

2. 若 i 是源点，则 ψ_V 单射当且仅当 V 没有非零的 S_i 直和项。

特别地，若 V 不可分解且 $V \cong S_i$ ，相应的满射或单射条件必成立；而 $F_i^+ S_i = 0$ 或 $F_i^- S_i = 0$ 。

证明. 汇点情形取向量空间补空间 $V_i = \text{im } \phi_V \oplus U$ 。所有进入 i 的箭都落在第一项，而 i 没有出箭。因此 V 分解为两个子表示：一个在 i 处取 $\text{im } \phi_V$ 、其余顶点取原空间，另一个只在 i 处取 U 。后一项同构于 $S_i^{\oplus \dim U}$ 。反过来，若存在这样的非零直和项，则入箭在该项上全为零， ϕ_V 不可能满射。

源点情形取 $V_i = \ker \psi_V \oplus U$ 。所有出箭在 i 处取 U ，且没有入箭，故只支撑于 $\ker \psi_V$ 的部分是直和项；剩下的表示在 i 处取 U 。存在非零 S_i 直和项也必使 ψ_V 有核。若 V 不可分解，分裂出的项只有在 $V \cong S_i$ 时才可能非零。最后直接代入核或余核定义， S_i 均被送到零。□

这与普通线性代数中“把映射的核与像分开”很接近，但源、汇条件不可删去。若一个顶点既有入箭又有出箭，任选的补空间通常不能同时保持两侧的映射。

10.2.3 反射函子与简单反射

命题 10.2.3. 设 k 为域， Q 为有限无有向环箭图， i 为汇点或源点， $V = (V_j, V_a)$ 为有限维 k 表示。记 m_{ij} 为顶点 i, j 间的箭数，定义整数格变换 $(s_i \mathbf{x})_i = -x_i + \sum_j m_{ij} x_j$ ，其余坐标不变，此处不要求二次型正定。记 $\phi_V : \bigoplus_{a:j \rightarrow i} V_j \rightarrow V_i$ 为各入箭映射之和， $\psi_V : V_i \rightarrow \bigoplus_{a:i \rightarrow j} V_j$ 为各出箭映射组成的映射， $\mathbf{d}$ 为维数向量。若 i 为汇点且 ϕ_V 满射，则对汇点反射函子有

$$\mathbf{d}(F_i^+ V) = s_i(\mathbf{d}(V)).$$

若 i 为源点且 ψ_V 单射，则对源点反射函子有

$$\mathbf{d}(F_i^- V) = s_i(\mathbf{d}(V)).$$

证明. 汇点的短正合列为

$$0 \longrightarrow \ker \phi_V \longrightarrow \bigoplus_{a:j \rightarrow i} V_j \longrightarrow V_i \longrightarrow 0.$$

故新顶点维数为 $\sum_{a:j \rightarrow i} \dim V_j - \dim V_i$, 其他维数不变。这正是简单反射的坐标公式。源点则对 $0 \rightarrow V_i \rightarrow \bigoplus_{a:i \rightarrow j} V_j \rightarrow \text{coker } \psi_V \rightarrow 0$ 取维数, 得到相同公式。□

满射或单射条件决定了公式能否适用。特别是 $s_i \mathbf{e}_i = -\mathbf{e}_i$, 但反射函子把 S_i 送到零; 负向量不是零表示的维数向量, 不能把这两种操作混同。

例 10.2.4. 对 $Q: 1 \rightarrow 2 \leftarrow 3$, 取三个顶点空间均为 k , 两条箭都为恒等映射。汇点 2 上的总映射是

$$k \oplus k \longrightarrow k, \quad (u, v) \mapsto u + v.$$

其核由 $(1, -1)$ 生成。反射后得到 $1 \leftarrow 2 \rightarrow 3$, 两条箭分别由 1 与 -1 给出。新维数仍为 $(1, 1, 1)$, 与 $s_2(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$ 相符。改变顶点 3 的基可把第二条箭也变成 1; 特征为 2 时它原先就等于 1。

10.2.4 核、余核与反射函子的互逆范围

定理 10.2.5 (反射等价). 设 k 为域, Q 为有限无有向环箭图, i 为汇点, Q' 为反转 i 处各箭所得箭图。对有限维 k 表示 V 属于 Q 、 W 属于 Q' , 分别记 $\phi_V: \bigoplus_{a:j \rightarrow i} V_j \rightarrow V_i$ 为入箭映射之和, $\psi_W: W_i \rightarrow \bigoplus_{a^*:i \rightarrow j} W_j$ 为出箭映射组成的映射。令 $\mathcal{C}$ 为 $\text{rep}_k Q$ 中 ϕ_V 满射的对象组成的全子范畴, $\mathcal{D}$ 为 $\text{rep}_k Q'$ 中 ψ_W 单射的对象组成的全子范畴。则汇点反射函子和源点反射函子

$$F_i^+: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}, \quad F_i^-: \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{C}$$

互为拟逆。两边的对象条件分别等价于不含只在顶点 i 取 k 的简单表示 S_i 的非零直和项。

证明. 对 $V \in \mathcal{C}$, 写 $E = E_i(V)$ 、 $K = \ker \phi_V$ 。在 $F_i^+ V$ 中, 源点总映射就是包含 $K \hookrightarrow E$, 故它属于 $\mathcal{D}$ 。再次反射后, 顶点 i 上的空间为 E/K 。映射

$$E/K \longrightarrow V_i, \quad [v] \mapsto \phi_V(v)$$

因满射条件而为同构。每条入箭由 $V_j \hookrightarrow E \rightarrow E/K$ 给出, 经过该同构正好恢复原来的 V_a 。其他顶点取恒等, 因而得到表示同构 $F_i^- F_i^+ V \cong V$ 。

对 $W \in \mathcal{D}$, 记 $L = W_i$ 、 $E = E_i(W)$, 则 L 通过 ψ_W 单射嵌入 E 。 $F_i^- W$ 的汇点总映射为商映射 $E \rightarrow E/\psi_W(L)$, 所以它属于 $\mathcal{C}$ 。再取核便得到 $\psi_W(L)$, 通过 ψ_W 与 L 同构。各投影限制到 $\psi_W(L)$ 后恢复原来的出箭, 故 $F_i^+ F_i^- W \cong W$ 。

对于态射, 上述两个同构分别由商空间的诱导映射和原单射 ψ_W 构成。态射与 ϕ, ψ 交换, 恰好说明它们与这两个同构交换, 因此所得同构是自然的。两种对象条件的直和解释由引理 10.2.2 给出。□

推论 10.2.6. 设 k 为域, Q 为有限无有向环箭图, i 为汇点或源点, Q' 为反转 i 处各箭所得箭图。以 S_i 分别表示两箭图中只在顶点 i 取 k 的简单表示, m_{ij} 为顶点 i, j 间的箭数, $(s_i \mathbf{x})_i = -x_i + \sum_j m_{ij} x_j$, 其余坐标不变。相应汇点或源点反射函子, 在 Q 与 Q' 中不同于 S_i 的不可分解有限维 k 表示的同构类之间给出双射, 并保持它们的自同态代数; 维数向量按 s_i 变化。

证明. 这些不可分解对象都在定理 10.2.5 的相应全子范畴中。子范畴对直和项封闭：一个分块直和映射满射或单射，恰好当每个分块都如此。等价保持非零对象与直和分解，所以既保持也反映不可分解性；全忠实性给出自同态代数同构。维数变化由命题 10.2.3 成立。□

反射等价不声称整个表示范畴等价，也不声称反射函子处处正合。例如对 $1 \rightarrow 2$ 的短正合列

$$0 \longrightarrow S_2 \longrightarrow (k \xrightarrow{1} k) \longrightarrow S_1 \longrightarrow 0,$$

取 F_2^+ 后，中间项成为反向箭图上的 S_1 ，最后一项成为 $k \xleftarrow{1} k$ ；两者之间的映射不是满射。后文只在上述明确的子范畴中使用拟逆。构造及其基本性质可参看 [4, Section 6.6, pp. 164–169]。

10.3 Gabriel 定理

反射函子把相邻定向的表示联系起来，但任意挑选反射并不能保证分类过程终止。我们固定一个不断重复的汇点次序，证明在正定情形下，每个不可分解表示终会变成顶点简单表示。反过来，从简单表示沿原次序倒行，就能由正根构造出表示。

10.3.1 有限表示型与 Dynkin 图

定义 10.3.1. 设 k 为域， Q 为有限箭图。若有限维不可分解 k -表示只有有限多个同构类，则称 Q 在 k 上具有有限表示型 (finite representation type)；否则称为无限表示型。

有限表示型不表示全部表示只有有限多个同构类。例如只有一个顶点且没有箭时，不可分解表示只有 k ，而全部表示有 k^m ($m \geq 0$) 这无穷多个类型。分类的对象是不能再作非平凡直和分解的部分。

接下来要证明两个不同方向的结论。正定型使反射过程终止，给出有限性及具体分类；非正定型则提供一个维数向量，使箭映射所含的自由参数多于换基能够消去的参数。后一论证不能由“二次型不是正定的”一句话代替。

10.3.2 不可分解表示与正根

对有限无有向环箭图，依次删去汇点，可以把顶点编号为 $1, \dots, n$ ，使每条箭都从较大编号指向较小编号。先反射顶点 1，随后 $2, \dots, n$ ：轮到 i 时，原先从 i 指向较小顶点的箭均已反转，而来自较大顶点的箭尚未反转，所以 i 确为当前箭图的汇点。一轮之后，每条箭的两端各反射一次，原方向恢复。

定义 10.3.2. 设 Q 为有限无有向环箭图，将顶点编号为 $1, \dots, n$ ，使每支箭都从较大编号指向较小编号。记 m_{ij} 为顶点 i, j 间的箭数， s_i 为整数格 $\mathbb{Z}^{Q_0}$ 上的反射，其第 i 坐标为 $(s_i \mathbf{x})_i = -x_i + \sum_j m_{ij} x_j$ ，其余坐标不变。复合

$$c = s_n s_{n-1} \cdots s_1$$

称为这一编号下的 **Coxeter 变换** (Coxeter transformation)。²复合按从右到左作用，因此先施行 s_1 。

引理 10.3.3. 设 Q 为有限无有向环箭图，将顶点编号为 $1, \dots, n$ ，使每支箭都从较大编号指向较小编号。令 $q_Q(\mathbf{x}) = \sum_i x_i^2 - \sum_{a:i \rightarrow j} x_i x_j$ 为正定实二次型， $B_Q(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = q_Q(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - q_Q(\mathbf{x}) - q_Q(\mathbf{y})$ ， $\mathbf{e}_i$ 为标准基向量， $s_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - B_Q(\mathbf{x}, \mathbf{e}_i)\mathbf{e}_i$ ， $c = s_n \cdots s_1$ 。则 c 有有限阶，1 不是其在 $\mathbb{R}^{Q_0}$ 上的特征值，并且对每个非零非负实向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{Q_0}$ ，存在整数 $r \geq 1$ ，使 $c^r \mathbf{x}$ 至少有一个负坐标。

证明. 各 s_i 保持有限的根集合，且标准基向量都是根。由这些反射生成的线性变换群在根集合上的作用是忠实的：固定全部根便固定一组基。因此它是有限置换群的子群， $c^h = 1$ 对某个正整数 h 成立。

若 $c\mathbf{x} = \mathbf{x}$ ，依次施行 $s_1, \dots, s_n$ 。只有 s_i 能改变第 i 个坐标，而且之后的反射不会再次改变它。最终向量等于原向量，所以第一步没有改变坐标 1，即 $s_1 \mathbf{x} = \mathbf{x}$ ；随后第二步也不改变坐标 2。逐步下去，所有 $s_i \mathbf{x} = \mathbf{x}$ 。由反射公式， $B_Q(\mathbf{x}, \mathbf{e}_i) = 0$ 对每个 i 成立，故正定性强迫 $\mathbf{x} = 0$ 。这排除了特征值 1。

令 $T = 1 + c + \cdots + c^{h-1}$ ，则 $(1 - c)T = 1 - c^h = 0$ 。因为 $1 - c$ 可逆，得到 $T = 0$ 。若 $\mathbf{x} \neq 0$ 非负且所有 $c^r \mathbf{x}$ 都非负，则

$$0 = T\mathbf{x} = \mathbf{x} + c\mathbf{x} + \cdots + c^{h-1}\mathbf{x}$$

是包含一个非零项的非负向量之和，矛盾。 □

这个引理控制的是完整一轮反射。若从正根出发，在某一步第一次出现负坐标，则引理 10.1.6 说明前一步恰为当前顶点的简单根。因此，同一个终止论证既适用于表示的维数向量，也适用于尚未实现为表示的正根。此处采用的反射证明方法可对照 [4, Sections 6.7–6.8, pp. 169–172]。

10.3.3 无环条件与基域假设

本章分类定理固定代数闭域、有限无有向环箭图以及有限维表示，不附加箭之间的关系。无有向环条件保证汇点排序存在，也保证第九章使用的路径代数有限维。若加入关系，允许的箭矩阵不再遍历全部矩阵空间，下面的参数计数便不能原封不动地使用。

基域的作用也可以准确区分：核、余核、反射等价以及 Dynkin 情形的构造都只需要域公理；非 Dynkin 情形的参数论证需要域无限，代数闭域满足这一条件。有限域上一个固定维数向量只有有限多个矩阵组，所以不能照搬这个证明来推断存在无穷多个同维数类型。我们不把当前证明未经核对地推广到更一般的基域情形。

10.3.4 有限型的必要性、存在性与唯一性

先把必要性所需的参数计数写成可独立调用的引理。

²考克斯特 (Harold Scott MacDonald Coxeter, 1907-2003)，英裔加拿大数学家，研究反射群和多面体几何。

引理 10.3.4. 设 k 为无限域, Q 为有限无有向环箭图, $\mathbf{d} = (d_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{Q_0}$ 非零, $q_Q(\mathbf{d}) = \sum_i d_i^2 - \sum_{a:i \rightarrow j} d_i d_j$. 若 $q_Q(\mathbf{d}) \leq 0$, 则维数向量为 $\mathbf{d}$ 的有限维 k -表示有无穷多个同构类。

证明. 在每个顶点固定空间 k^{d_i} , 所有箭映射组成仿射空间

$$\text{Rep}_k(Q, \mathbf{d}) = \prod_{a:i \rightarrow j} M_{d_j \times d_i}(k) \cong k^N, \quad N = \sum_{a:i \rightarrow j} d_i d_j.$$

换基群 $G = \prod_{d_i > 0} \text{GL}_{d_i}(k)$ 的轨道恰好是同构类。记 $m = \sum_i d_i^2$, 则假设给出 $N \geq m$ 。固定一个表示矩阵组 $A = (A_a)$ 。轨道中的元素为

$$(g_{t(a)} A_a g_{s(a)}^{-1})_a.$$

对所有 g_i 同时乘同一个非零标量不改变结果。选一个满足 $d_{i_0} > 0$ 的顶点; 矩阵 g_{i_0} 的某个条目非零, 可利用公共标量将它化为 1。非零条目的位置只有有限种选择。因此整个轨道是有限多个有理映射的像的并, 每个映射至多使用 $m - 1$ 个独立标量参数, 定义域只受相关行列式非零的限制。

说明为何这样的像包含在某个非零多项式的零点集中。若 N 个有理函数只依赖 $l < N$ 个变量, 取共同分母 D 。对它们的所有全次数不超过 s 的单项式乘以 D^s , 得到次数至多 Cs 的 l 元多项式, 其中 C 与 s 无关。前者有 $\binom{N+s}{N}$ 个, 后者所在向量空间的维数至多为 $\binom{l+Cs}{l}$ 。当 s 足够大时, 前一数量较大, 故有非平凡线性关系。这就给出一个非零 N 元多项式, 在有理映射的整个定义域上为零。当前 $l = m - 1 < N$, 所以每个参数片都具有这种关系; 将有限多个关系相乘, 得到在整个轨道上为零的非零多项式。

如果表示只有有限多个同构类, 再把各轨道所得的多项式相乘, 便得到在整个 k^N 上恒为零的非零多项式。这不可能: 对无限域, 非零一元多项式只有有限个根; 对变量数归纳, 把一个多元多项式视为最后一个变量的多项式, 先使某个非零系数不消失, 再选择最后一个变量, 即能找到非零值。因此轨道有无穷多个。□

定理 10.3.5 (Gabriel 定理). 设 k 为代数闭域, Q 为有限无有向环箭图, 允许平行箭, 表示均为没有额外关系的有限维 k -表示, $q_Q(\mathbf{x}) = \sum_{i \in Q_0} x_i^2 - \sum_{a:i \rightarrow j} x_i x_j$ 。则 Q 具有有限表示型, 当且仅当其无向基础图是 ADE 图的不交并。此时, 维数向量给出双射

$$\{\text{不可分解表示的同构类}\} \longleftrightarrow \{\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{Q_0} : q_Q(\alpha) = 1\}.$$

每个这样的不可分解表示 V 还满足 $\text{End}_Q(V) \cong k$ 及 $\text{Ext}_{kQ}^1(V, V) = 0$ 。

证明. 先证必要性。若基础图不是 ADE 图的不交并, 定理 10.1.4 给出非零非负整数向量 $\mathbf{d}$, 使 $q_Q(\mathbf{d}) \leq 0$ 。代数闭域无限, 故引理 10.3.4 给出这一维数向量上的无穷多个同构类。如果只有有限多个不可分解类型 $U_1, \dots, U_t$, 则任意有限维表示都可反复分裂非平凡直和, 直到写为这些对象的直和; 总维数每次严格下降, 过程终止。总维数固定为 $D = \sum_i d_i$ 时, 每个 U_j 的重数至多为 D , 所以这种直和只有有限多个可能的同构类型, 矛盾。

现在基础图为 ADE 图的不交并, 按汇点次序 $1, \dots, n$ 反复施行反射。从不可分解 $V \neq 0$ 出发, 只要当前对象不同于所反射顶点的简单表示, 推论 10.2.6 就保证下一对

象仍非零不可分解，维数向量按同一个简单反射变化。若过程永远不遇到该简单表示，每轮之后的维数向量便依次为 $\mathbf{d}, c\mathbf{d}, c^2\mathbf{d}, \dots$ ，全部非负，与引理 10.3.3 矛盾。因此某一步得到简单表示 S_i 。简单反射保持 q_Q ，故原维数向量满足 $q_Q(\mathbf{d}) = q_Q(\mathbf{e}_i) = 1$ ，即为正根。

下面证明同一正根至多对应一个不可分解表示。给定两个维数向量相同的不可分解表示，按相同的汇点次序反射。只要当前维数向量不是该顶点的 $\mathbf{e}_i$ ，两者都在相应反射等价的范围内。第一次达到 $\mathbf{e}_i$ 时，两者都只能是 S_i 。沿已经施行的等价逐步取拟逆，即得原来的两个表示同构。这个论证同时表明，停止时刻由维数向量确定，而不取决于箭映射的具体矩阵。

还需证明每个正根都能实现。给定正根 α ，按相同次序只在整数格中反射。由 Coxeter 引理，有限步后必首次出现负坐标。设这一负向量出现前的正根为 β ，下一步反射顶点为 i 。由引理 10.1.6，必有 $\beta = \mathbf{e}_i$ 。在当时的定向上取 S_i ，并按原次序的反序使用源点反射函子。

需要核实倒行过程不会把对象消去。若某一步要倒行经过顶点 j ，而当前维数向量是 $\mathbf{e}_j$ ，则原正向过程在这一步之前的向量应为 $s_j\mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j$ ，与首次出现负向量以前各项均为正根矛盾。因此每个倒行步骤都避开被消去的简单表示，推论 10.2.6 保证对象非零不可分解，并按原坐标序列恢复维数。最终得到维数向量为 α 的不可分解 Q -表示。

正根有限，所以双射也给出有限表示型。最后，每一步反射等价都保持自同态代数，而终点 S_i 的自同态代数为 k ，故 $\text{End}_Q(V) \cong k$ 。在 (10.2) 中令 $W = V$ ，代入 $q_Q(\mathbf{d}) = 1$ ，得到自扩张空间的维数为零。□

证明还给出了一个构造方法：输入 ADE 箭图的定向及一个正根，先记录汇点反射使它首次变负之前的全部步骤，再从末端的简单表示逐步取余核。每一步只需有限维线性代数。选择核、余核的不同基可能产生不同矩阵，但反射等价保证所得表示的同构类相同。

10.3.5 非连通箭图与 ADE 图的不交并

若 Q 的连通分支为 $Q^{(1)}, \dots, Q^{(r)}$ ，任何表示都按支集唯一分成各分支上的表示的直和。因而非零不可分解表示只支撑在一个分支上。二次型也按分支相加；在正定情形，整数向量的每个非零分支至少贡献 1，所以正根同样只支撑在一个分支上。Gabriel 对应在这里逐分支进行，不需要给非连通图强加一个连通的 Dynkin 名称。

例 10.3.6. 对 A_n ，设 $x_0 = x_{n+1} = 0$ ，则

$$2q(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^n (x_{i+1} - x_i)^2.$$

若 $\mathbf{x}$ 是整数正根，右侧等于 2。全部整数差中只能有两个非零项，各自为 1 或 -1；它们的和为零，所以必为一个 1 和一个 -1。非负性又要求先出现 1。因此正根恰为某段连续顶点上全为 1、其余为零的向量，共有 $n(n+1)/2$ 个。任意定向下，在这段顶点取 k ，内部各箭取恒等映射，外部空间取零，就得到相应的不可分解表示：所有非零顶点

上的自同态标量因箭交换条件而相等，所以自同态代数为 k ，不可能存在非平凡直和分解所产生的幂等元。

例如 A_2 与 A_1 的不交并有 $3 + 1 = 4$ 个不可分解类型，而不是 $3 \cdot 1$ 个。直和组合描述全部表示，分支的并则描述不可分解类型；两种计数的对象不同。

10.4 表示型与几乎分裂序列

ADE 图给出有限分类，图稍有扩大就可能出现带参数的不可分解表示。不过，“出现参数”并不等于“分类已无法描述”。本节用两条平行箭和三条平行箭比较两种不同的复杂程度，再用一个最小例子说明 Auslander–Reiten 理论³研究什么。

10.4.1 Kronecker 箭图

定义 10.4.1. 有两个顶点 1, 2，以及两条从 1 指向 2 的平行箭的箭图，称为 **Kronecker 箭图** (Kronecker quiver)。⁴给定域 k ，它的一个有限维 k -表示是一对有限维 k 向量空间之间具有相同定义域和值域的线性映射

$$A, B : V_1 \longrightarrow V_2.$$

同构是同时作用于两条映射的定义域换基和值域换基。

它的二次型为 $q(d_1, d_2) = (d_1 - d_2)^2$ ，所以并不正定。对每个 $\lambda \in k$ ，取两端空间为 k ，箭为 $1, \lambda$ ，记所得表示为 R_λ 。若两端换基标量为 a, b ，第一条箭的交换条件给出 $a = b$ ，第二条箭随即给出 $\lambda = \mu$ 。故 $R_\lambda \cong R_\mu$ 当且仅当 $\lambda = \mu$ 。每个 R_λ 的自同态代数为 k ，所以不可分解；另有两箭为 $0, 1$ 的 R_∞ ，它与前述各项不同构。

命题 10.4.2. 设 k 为代数闭域， Q 为两支箭均由顶点 1 指向顶点 2 的 Kronecker 箭图， $r \geq 1$ 为整数， $\lambda \in k$ ， $J_r(\lambda)$ 为大小 r 的 Jordan 块。两顶点空间均取 k^r ，则箭映射给出的表示

$$R_{\lambda,r} = (I_r, J_r(\lambda)), \quad R_{\infty,r} = (J_r(0), I_r)$$

均不可分解。对固定 r ，它们由 $\lambda \in k \cup \{\infty\}$ 给出两两不同的同构类，而且

$$\dim_k \operatorname{End}_Q(R_{\lambda,r}) = \dim_k \operatorname{Ext}_{kQ}^1(R_{\lambda,r}, R_{\lambda,r}) = r,$$

其中也允许 $\lambda = \infty$ 。

证明. 对有限 λ ，第一条箭为恒等，故自同态的两端矩阵相同，并与 $J_r(\lambda)$ 对易。令 $N = J_r(\lambda) - \lambda I_r$ 。Jordan 块有循环向量 v ，使 $v, Nv, \dots, N^{r-1}v$ 为一组基。与 N 对易的算子由 v 的像唯一决定；若其像为 $\sum_{j=0}^{r-1} a_j N^j v$ ，该算子便是 $\sum_j a_j N^j$ 。因此

$$\operatorname{End}_Q(R_{\lambda,r}) \cong k[t]/(t^r).$$

³ 奥斯兰德 (Maurice Auslander, 1926-1994)，美国数学家，研究同调代数与表示论；赖滕 (Idun Reiten, 1942-2025)，挪威数学家，研究有限维代数的表示与倾斜理论。

⁴ 克罗内克 (Leopold Kronecker, 1823-1891)，德国数学家，研究代数数论与代数方程。

这个环的每个元素若常数项非零就可逆，若常数项为零则幂零，所以幂等元只有 0, 1。非平凡直和分解会给出非平凡投影幂等元，故表示不可分解。无穷参数的情形只需用第二条恒等箭，计算相同。

两个有限参数表示的同构要求两个 Jordan 块相似，因而由唯一特征值分别为 λ, μ 得 $\lambda = \mu$ 。无穷参数中第一条箭不可逆，而有限参数中第一条箭可逆，所以它们不同构。最后，自同态维数为 r ，而 $q(r, r) = 0$ ，由 (10.2) 得到自扩张维数也为 r 。□

上式给出的族并未穷尽全部不可分解表示。例如维数向量 (1, 2)、两箭分别取 $1 \mapsto (1, 0)$ 与 $1 \mapsto (0, 1)$ 的表示，其自同态也只有标量，却不属于维数为 (r, r) 的那些族。完整分类还要处理维数不同的两端及一般矩阵铅笔；可把这一问题作为后续专题，参看 [4, Problem 6.9.1(d), p. 174]。

10.4.2 有限、驯和野表示型的区别

为了区分“由少量参数族描述”和“包含任意矩阵对的分类”，先给出常用的精确定义。以下只讨论代数闭域上的有限维代数；路径代数 kQ 在有限无有向环条件下属于这个范围。

定义 10.4.3. 设 k 为代数闭域， A 为有限维含么 k -代数。

1. 若 A 有无限多个有限维不可分解左模的同构类，且对每个整数 $d \geq 1$ ，存在有限多个 A - $k[t]$ 双模 $M_1, \dots, M_s$ ，每个作为右 $k[t]$ -模自由且秩为 d ，使除有限多个例外外，每个 d 维不可分解左 A -模都同构于某个

$$M_j \otimes_{k[t]} k[t]/(t - \lambda) \quad (\lambda \in k),$$

则称 A 具有**驯表示型** (tame representation type)。

2. 令 $R = k\langle x, y \rangle$ 为两个非交换变量上的自由结合代数。若存在 A - R 双模 M ，作为右 R -模自由且有限秩，使函子

$$M \otimes_R - : \{\text{有限维左 } R\text{-模}\} \longrightarrow \{\text{有限维左 } A\text{-模}\}$$

保持不可分解性，并且两个输入的像同构当且仅当输入本身同构，则称 A 具有**野表示型** (wild representation type)。

驯型定义要求在每个维数上穷尽几乎所有不可分解类型，而不是仅仅找到几个单参数族。上一小节的 Jordan 族本身还不足以证明 Kronecker 箭图为驯型。野型定义中的右自由条件保证张量函子正合；它所嵌入的 R -模分类恰好是任意两个方阵在同时相似下的分类，因为 x, y 可以独立作用为任意两个算子。

命题 10.4.4. 设 k 为代数闭域， Q 为具有两顶点及三条从 1 指向 2 的平行箭的箭图。则 kQ 为野表示型。

证明. 将一个有限维 $R = k\langle x, y \rangle$ -模写为 (V, X, Y) ，其中 X, Y 是 x, y 的作用。给它对应 Q -表示

$$F(V, X, Y) = (V, V; I_V, X, Y).$$

两端映射 (f_1, f_2) 与第一条箭交换, 强迫 $f_1 = f_2 = f$; 余下条件恰好为 $fX = X'f$, $fY = Y'f$. 所以 F 在态射上给出双射, 特别是保持自同态代数并反映同构。一个表示可分解当且仅当其自同态代数有非平凡幂等元: 投影给出一个方向, 另一个方向由幂等元的像与核给出。因此 F 保持不可分解性。

最后核实双模条件。取顶点 1, 2 上都为右 R -模 R , 三条箭分别为恒等映射、左乘 x 、左乘 y 。它们是右 R -线性映射, 故组成一个 kQ - R 双模 M 。其右 R -模为 $R \oplus R$, 自由秩为 2, 而 $M \otimes_R V$ 正好是上述 $F(V, X, Y)$ 。于是满足野型定义。 $\square$

上述例子给出三种情形: ADE 箭图只有有限多个不可分解类型, Kronecker 箭图出现显式单参数族, 三箭图包含任意矩阵对的同时相似问题。把一般有限维代数的无限型进一步分为驯型与野型, 还需要更深入的分类理论。

10.4.3 Auslander-Reiten 理论的基本问题

Gabriel 定理列出了对象, 却没有列出对象之间的全部态射。Auslander-Reiten 理论进一步研究: 哪些非分裂态射能够控制其他态射的分解, 哪些短正合列能够系统地组织不可分解对象之间的联系。

定义 10.4.5. 设 k 为域, A 为有限维含么 k -代数, X, E, Z 为有限维左 A -模, $p: E \rightarrow Z$ 为模同态。若 p 不是分裂满射, 且对每个有限维左 A -模 Y 及每个不是分裂满射的模同态 $f: Y \rightarrow Z$, 存在模同态 $h: Y \rightarrow E$ 使 $f = ph$, 则称 p 为右几乎分裂态射 (right almost split morphism)。对偶地, 给定模同态 $u: X \rightarrow E$, 若 u 不是分裂单射, 且每个不是分裂单射的模同态 $g: X \rightarrow Y$ 都经 u 分解, 则称 u 为左几乎分裂态射 (left almost split morphism)。一个非分裂短正合列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} E \xrightarrow{p} Z \longrightarrow 0$$

若两端 X, Z 非零不可分解, 且 u, p 分别具有上述左、右性质, 则称为几乎分裂序列 (almost split sequence), 也称 Auslander-Reiten 序列。

这些定义中的“分裂”是范畴中的分裂, 要求存在模态射的左逆或右逆; 向量空间上的任意补空间不够。

例 10.4.6. 对任意域 k 及箭图 $Q: 1 \rightarrow 2$, 有几乎分裂序列

$$0 \longrightarrow S_2 \longrightarrow P \longrightarrow S_1 \longrightarrow 0, \quad P = (k \xrightarrow{1} k).$$

其中左映射在顶点 2 为恒等, 右映射在顶点 1 为恒等。

证明. 序列逐顶点正合。若它分裂, 则 $P \cong S_1 \oplus S_2$, 而后者箭映射为零, 与 P 的箭映射秩为 1 矛盾。

设 $Y = (Y_1 \xrightarrow{T} Y_2)$ 。态射 $f: Y \rightarrow S_1$ 由任意线性泛函 $f_1: Y_1 \rightarrow k$ 给出。它是分裂满射, 当且仅当有 $v \in \ker T$ 使 $f_1(v) = 1$: 这样的 v 正好定义一个右逆 $S_1 \rightarrow Y$ 。因此若 f 不是分裂满射, f_1 必在 $\ker T$ 上为零。它于是经 T 的像分解为泛函, 并可延拓为 $h_2: Y_2 \rightarrow k$, 满足 $h_2 T = f_1$ 。两端取 $h_1 = f_1, h_2$, 得到态射 $h: Y \rightarrow P$, 并有 $f = ph$ 。这证明右几乎分裂性质。

态射 $g: S_2 \rightarrow Y$ 由一个向量 $w \in Y_2$ 给出。它有左逆, 当且仅当存在泛函 $\ell: Y_2 \rightarrow k$, 满足 $\ell T = 0$ 、 $\ell(w) = 1$, 也就是 $w \notin \text{im } T$ 。因此若 g 不是分裂单射, 必有 $w = T(v)$ 对某个 $v \in Y_1$ 成立。把 $1 \in P_1$ 送到 v 、把 $1 \in P_2$ 送到 w , 就得到态射 $P \rightarrow Y$, 使 g 经左映射分解。这证明左几乎分裂性质。两端简单表示当然不可分解。□

在一般理论中, 人们把几乎分裂序列左端的同构类记作 τZ , 并研究这些序列的存在、唯一性及中间项的不可分解成分; 本章只讨论了上面的例子。当前例子说明 $\tau S_1 \cong S_2$, 但 τ 并非所有模上的无条件自同构。特别是, 若终点 Z 为投射模, 任何以它为终点的短正合列都分裂, 因此不存在这种非分裂序列。对象分类与态射结构在这里成为两个互相补充的问题。

本章小结

Euler 型由顶点和箭的数值资料定义, 却等于 Hom 与 Ext 的维数差。正定判别不依赖表示的箭矩阵: 重边、圈、四叉及双三叉都会给出非正向量, 剩下的三臂树由倒数和不等式筛选出 ADE 图。正定整数格中的根与简单反射因而可以在学习 Lie 代数以前建立。

反射函子把整数格的运算实现为核或余核。在排除相应顶点简单直和项的全子范畴上, 它们互为拟逆; 对不可分解对象, 这正好排除唯一可能被消去的简单表示。Coxeter 变换控制重复反射的终止, 由此证明每个 Dynkin 不可分解表示都来自一个简单表示, 也证明每个正根能沿逆过程唯一实现。非正定情形的必要性则依赖另一个论证: 换基至多消去有限数量的参数, 无法把所构造的表示矩阵空间压缩为有限多个轨道。

Kronecker 箭图说明同一维数向量可以含有无穷多个不可分解类型, 自扩张也可能非零; 三箭图进一步包含任意矩阵对的同时相似问题。几乎分裂序列则把注意力转向对象之间的态射。有限分类、带参数分类和态射分解各自提出不同的问题, 不能用其中一个问题的答案代替其他问题。

习题

习题 10.1* 设 $Q: 1 \rightarrow 2 \leftarrow 3$ 。写出满足 $\langle x, y \rangle_Q = x^T E y$ 的矩阵 E , 并计算 $q_Q(2, 1, 1)$ 。反转箭 $1 \rightarrow 2$ 后, 指出 E 哪些条目改变, 并说明二次型为何不变。

解. 由两条箭的贡献,

$$E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad q_Q(2, 1, 1) = 4 + 1 + 1 - 2 - 1 = 3.$$

反转第一条箭使 E_{12} 由 -1 变成 0 , E_{21} 由 0 变成 -1 , 其余不变。二次型原来的项 $-x_1 x_2$ 变成 $-x_2 x_1$, 故数值完全相同; 非对称的 Euler 型则已经改变。□

习题 10.2* 对 $Q: 1 \rightarrow 2$, 记 $P = (k \xrightarrow{1} k)$ 。计算 $\text{Hom}_Q(S_1, P)$ 、 $\text{Hom}_Q(P, S_1)$ 及对应的两个 Ext^1 。将箭反转, 对相同维数向量的表示重复 Hom 计算。

解. 态射 $S_1 \rightarrow P$ 的顶点 1 映射被箭交换条件迫为零, 故 Hom 为零; 态射 $P \rightarrow S_1$ 的顶点 1 映射可以是任意标量, 故 Hom 同构于 k . Euler 数分别为 $\langle (1,0), (1,1) \rangle_Q = 0$ 、 $\langle (1,1), (1,0) \rangle_Q = 1$, 所以两个 Ext 都为零. 反向箭图的 $P' = (k \xleftarrow{1} k)$ 满足 $\text{Hom}(S_1, P') \cong k$ 、 $\text{Hom}(P', S_1) = 0$. 根集合不依赖定向, 但根所标记对象之间的态射空间会随定向改变. $\square$

习题 10.3*. 设树有一个三叉点, 三个臂长为 1, 2, 5. 构造一个所有坐标为正的整数向量, 使二次型为零; 再说明把最长臂末端删去后为什么变成正定型.

解. 三个参数为 $p=2, q=3, r=6$, 其倒数之和为 1. 中心取 6, 三个臂从中心向外分别取

$$(3), \quad (4, 2), \quad (5, 4, 3, 2, 1).$$

这些值沿每条臂作线性递减, 故(10.4)中的全部 z_j 为零, 最后的系数也为零, 所以 $q=0$. 删去最长臂末端后, 臂长成为 1, 2, 4, 参数为 2, 3, 5, 倒数之和大于 1, 这是正定的 E_8 图. $\square$

习题 10.4*. 对 D_4 , 用 t 表示中心坐标, x, y, z 表示三个叶端坐标. 求出全部正根, 并数出它们的个数.

解. 配方得到

$$q = t^2 + x^2 + y^2 + z^2 - t(x + y + z) = \left(x - \frac{t}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{t}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{t}{2}\right)^2 + \frac{t^2}{4}.$$

对正根 $q=1$, 故 $t=0, 1, 2$. 若 $t=0$, 恰有一个叶端坐标为 1, 其余为零, 共 3 个. 若 $t=1$, 条件为 $x(x-1)+y(y-1)+z(z-1)=0$; 每个非负整数乘积均非负, 故 x, y, z 各自为 0 或 1, 共 8 个. 若 $t=2$, 三个平方均须为零, 得 $(t; x, y, z) = (2; 1, 1, 1)$. 总计 12 个. $\square$

习题 10.5*. 令 D_4 的三个叶端都指向中心. 叶端空间取 k , 中心空间取 k^2 , 三条箭的像分别由 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(1,1)$ 生成. 证明这个表示不可分解, 并计算它的自扩张空间.

解. 中心自同态保持前两条坐标轴, 故为对角矩阵 $\text{diag}(a, b)$. 它还须保持第三条直线, 所以 $a=b$. 叶端的标量由对应箭交换条件确定, 均等于这个共同标量. 因此自同态代数为 k , 其幂等元只有 0, 1, 表示不可分解. 维数向量为上一题的 $(2; 1, 1, 1)$, 二次型为 1; Euler 公式给出 $\dim \text{Ext}^1 = 1 - 1 = 0$. $\square$

习题 10.6*. 对上一题的表示施行中心汇点反射, 写出新中心空间及三条出箭, 再施行反向的源点反射恢复原表示.

解. 总入箭为

$$k^3 \longrightarrow k^2, \quad (a, b, c) \longmapsto (a+c, b+c).$$

其核由 $(-1, -1, 1)$ 生成. 取该向量为新中心的基, 三条出箭的标量依次为 $-1, -1, 1$. 再次反射得到中心空间 $k^3/k(-1, -1, 1)$; 线性映射 $[(a, b, c)] \mapsto (a+c, b+c)$ 是到原 k^2 的同构. 三个标准基向量的类分别映到 $(1,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$, 因而三条入箭也被恢复. $\square$

习题 10.7*. 对 $Q: 1 \rightarrow 2$ 的表示 $V = (k^m \xrightarrow{A} k^n)$, 设 $\text{rank } A = r$. 求 F_2^+V 和 F_1^-V 的维数向量与唯一箭映射的秩, 并写出 V 的不可分解直和分解。

解. F_2^+V 在顶点 1, 2 的空间为 $k^m, \ker A$, 箭为核的包含, 故维数向量为 $(m, m-r)$ 、秩为 $m-r$. F_1^-V 的两端为 $\text{coker } A, k^n$, 箭从 2 指向 1, 为商映射, 故维数向量为 $(n-r, n)$ 、秩为 $n-r$. 选择定义域的核补空间及值域的像补空间, 把 A 化为一个 r 阶恒等块及零块, 得到

$$V \cong (k \xrightarrow{1} k)^{\oplus r} \oplus S_1^{\oplus(m-r)} \oplus S_2^{\oplus(n-r)}.$$

这也显示: 核反射消去 S_2 , 余核反射消去 S_1 . □

习题 10.8*. 设 i 为 Q 的汇点, Q' 为反射后的箭图。对任意有限维表示 W (属于 Q') 与 V (属于 Q), 证明存在自然同构

$$\text{Hom}_Q(F_i^-W, V) \cong \text{Hom}_{Q'}(W, F_i^+V).$$

这里不要求排除任何简单直和项。

解. 给定 i 以外各顶点的映射 $f_j: W_j \rightarrow V_j$, 先要求它们与不接触 i 的箭交换。记其直和为 $E(f): E_i(W) \rightarrow E_i(V)$ 。一个态射 $F_i^-W \rightarrow V$ 在 i 处所需的映射为 $E_i(W)/\text{im } \psi_W \rightarrow V_i$, 并且与各入箭交换; 它存在的必要充分条件为

$$\phi_V E(f) \psi_W = 0.$$

满足条件时, 该映射唯一由 $\phi_V E(f)$ 取商诱导。另一方面, 一个态射 $W \rightarrow F_i^+V$ 在 i 处必须由 $E(f)\psi_W$ 限制值域到 $\ker \phi_V$ 得到, 存在的条件也是上述等式, 且同样唯一。因此两边由相同的外部映射族描述。复合态射与直和、取商及限制均相容, 所以这一直对应自然。 □

习题 10.9*. 设 Γ 为 ADE 图。证明非相邻顶点的简单反射交换; 相邻顶点满足 $s_i s_j s_i = s_j s_i s_j$ 。

解. 若 i, j 不相邻, 则 $B(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = 0$, 两个反射分别只改变沿互相正交的两个向量的分量, 故交换。若相邻, 在 $\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j$ 张成的平面上, 有

$$s_i(\mathbf{e}_i) = -\mathbf{e}_i, \quad s_i(\mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_i, \quad s_j(\mathbf{e}_j) = -\mathbf{e}_j, \quad s_j(\mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j.$$

直接复合可得两个三项乘积都把 $\mathbf{e}_i$ 送到 $-\mathbf{e}_j$, 把 $\mathbf{e}_j$ 送到 $-\mathbf{e}_i$ 。正定性使这个平面与其 B -正交补直和为全空间, 而两个反射都逐点固定正交补。因此两个乘积在全空间相同。 □

习题 10.10*. 对 $Q: 2 \rightarrow 1$, 写出 $s_1, s_2, c = s_2 s_1$ 的矩阵, 验证 $c^3 = 1$ 与 $1 + c + c^2 = 0$ 。从简单表示 S_2 出发, 依次在 1, 2, 1, ... 处作汇点反射, 列出遇到当前顶点简单表示以前的全部维数向量。

解. 矩阵为

$$s_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad c^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

相乘及相加即得所求等式。维数序列为 $(0, 1) \mapsto (1, 1) \mapsto (1, 0)$ ；接下来要反射顶点 1，当前表示就是 S_1 ，于是停止。第一步的坐标和反而增大，说明按汇点次序进行的终止证明不能用“每一步高度都减小”代替 Coxeter 引理。□

习题 10.11*. 在等向链 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 上固定维数向量 $(1, 1, 1)$ 。分类这一维数向量上的全部表示，并指出哪个类型不可分解。

解. 两条箭由标量 a, b 给出。每个非零标量都可经相邻顶点的基变换化为 1，且是否为零在同构下不变。因此共有四个类型 $(a, b) = (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)$ 。它们依次分解为三个简单表示的直和、区间 $[1, 2]$ 与 S_3 的直和、 S_1 与区间 $[2, 3]$ 的直和，以及整个区间 $[1, 3]$ 。仅最后一个不可分解。虽然该维数向量为正根，仍有三个可分解类型具有同一向量。□

习题 10.12*. 设 Q 的无向基础图为 A_3, D_4 及两个孤立顶点的不交并，任取无环定向。求不可分解表示的同构类数，并解释为何横跨两个分支的非零表示必可分解。

解. A_3 有 $3 \cdot 4/2 = 6$ 个正根， D_4 由习题 10.4* 有 12 个，孤立顶点各有一个。因此共有 $6 + 12 + 1 + 1 = 20$ 个不可分解类型。若表示在两个分支上都非零，把所有顶点空间按分支分组；由于分支之间没有箭，这两组各自形成子表示，原表示就是它们的非平凡直和。□

习题 10.13*. 证明任意域上 A_2 的表示 $k \xrightarrow{1} k$ 自同态代数为 k ，却不是简单表示。结合 Kronecker 的 R_λ ，解释“自同态只有标量”“简单”“不可分解”和“没有自扩张”不能全部混同。

解. 箭交换条件迫使两个顶点自同态的标量相同，故代数为 k 。但仅在终点非零的 S_2 是其真非零子表示，所以它不简单。标量自同态代数没有非平凡幂等元，因而保证不可分解；它并不保证简单。Kronecker 的 R_λ 也具有标量自同态代数，但命题 10.4.2 在 $r = 1$ 时给出一维自扩张空间，说明这一条件也不保证没有自扩张。Dynkin 情形的自扩张消失还使用了 $q = 1$ 。□

习题 10.14*. 设 k 为有 q 个元素的有限域。计算 Kronecker 箭图维数向量 $(1, 1)$ 的全部同构类数及不可分解类型数。这为何不与二次型 $q_Q(1, 1) = 0$ 矛盾？

解. 两条箭是一对标量 (a, b) ，换基把它们同时乘一个非零标量。零对给出一个类型 $S_1 \oplus S_2$ ；非零对的轨道是 $\mathbb{P}^1(k)$ ，有 $(q^2 - 1)/(q - 1) = q + 1$ 个。每个非零对的自同态只有共同标量，所以不可分解。总类型数为 $q + 2$ ，不可分解类型数为 $q + 1$ 。参数计数引理要求无限域，而有限域上的非零多项式可以在全部点上消失，例如 $t^q - t$ ，故它的最后一步在这里不成立。□

习题 10.15*. 设 k 为代数闭域. 对有限参数 $\lambda, \mu \in k$ 与正整数 r, s , 计算下列空间的维数:

$$\mathrm{Hom}_Q(R_{\lambda,r}, R_{\mu,s}), \quad \mathrm{Ext}_Q^1(R_{\lambda,r}, R_{\mu,s}).$$

解. 恒等箭使态射由一个矩阵 $f: k^r \rightarrow k^s$ 给出, 并满足 $fJ_r(\lambda) = J_s(\mu)f$. 若 $\lambda \neq \mu$, 源空间被某次 $J_r(\lambda) - \lambda I$ 零化, 而目标上的 $J_s(\mu) - \lambda I$ 可逆; 交换等式因此迫使 $f = 0$. 若 $\lambda = \mu$, 态射等同于

$$\mathrm{Hom}_{k[t]}(k[t]/(t^r), k[t]/(t^s)).$$

它由 1 的像决定, 该像必须被 t^r 零化. 在目标中满足此条件的子空间维数为 $\min(r, s)$. 两种情形的 Euler 数均为 $rs + rs - 2rs = 0$, 所以 Ext 的维数等于 Hom 的维数: 参数不同为 0, 参数相同为 $\min(r, s)$. $\square$

习题 10.16*. 对 Kronecker 箭图, 取 $V_1 = k^2, V_2 = k^3$, 两箭为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明自同态代数为 k , 并计算自扩张维数.

解. 写源端自同态为 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 目标端为 Y . 由 $YA = AX$, Y 的前两列为 $(a, c, 0)^T$ 、 $(b, d, 0)^T$; 由 $YB = BX$, 后两列为 $(0, a, c)^T$ 、 $(0, b, d)^T$. 比较共同的第二列得 $b = c = 0, d = a$, 随后 $Y = aI_3$. 故自同态代数为 k , 表示不可分解. 二次型值为 $(2-3)^2 = 1$, Euler 公式给出自扩张维数为零. 无限型箭图仍可有这样的无自扩张不可分解表示. $\square$

习题 10.17*. 设 $r \geq 2$. 利用 $k[t]/(t^r)$ 的子模 $t k[t]/(t^r)$, 构造非分裂短正合列

$$0 \longrightarrow R_{\lambda,r-1} \longrightarrow R_{\lambda,r} \longrightarrow R_{\lambda,1} \longrightarrow 0.$$

解. 把两端空间都识别为 $k[t]/(t^r)$, 两箭取恒等与乘 $\lambda + t$. 子空间 $t k[t]/(t^r)$ 对这两个算子稳定, 并通过 $t^j \mapsto t^{j+1}$ 与 $k[t]/(t^{r-1})$ 同构; 商空间则为 $k[t]/(t)$. 这给出所需逐顶点正合列. 若它分裂, 则乘 t 的算子将相似于大小 $r-1$ 和大小 1 的两个幂零块, 其幂零指数至多为 $r-1$. 原模上乘 t 的幂零指数却为 r , 矛盾. $\square$

习题 10.18*. 在三箭图上取两端均为 k 、三箭为 $1, \lambda, \mu$ 的表示. 证明不同参数对给出不同的不可分解类型, 并计算它们的自扩张维数. 说明仅仅存在这个双参数族为什么仍不是野型定义的全部要求.

解. 第一条恒等箭迫使同构两端的标量相同, 另外两条箭遂迫使参数对相同. 自同态也只有共同标量, 故不可分解. 二次型值为 $1+1-3 = -1$, Euler 公式给出 $\dim \mathrm{Ext}^1 = 1 - (-1) = 2$. 野型定义要求通过一个固定双模, 把所有维数上的任意矩阵对分类一起嵌入, 并保持不可分解性、反映同构; 一个固定维数上的双参数族并未提供这样的构造. 命题 10.4.4 中的函子才满足全部要求. $\square$

习题 10.19*. 在 k^2 上取

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明由它们定义的 $k\langle x, y \rangle$ -模可约但不可分解。将它送入三箭图构造 $F(V, X, Y) = (V, V; I, X, Y)$, 指出一个真非零子表示, 并解释它为何没有表示补空间。

解. 直线 ke_1 被两个算子保持, 所以模可约。与 Y 对易的矩阵必为 $\text{diag}(a, b)$, 再与 X 对易便要求 $a = b$, 故共同对易代数只有标量, 没有非平凡幂等元, 所以模不可分解。三箭图表示在两个顶点都取 ke_1 , 三条箭分别为 $1, 0, 1$, 就给出一个真非零子表示。若它有表示补空间, 投影到该子表示的两端映射会由恒等箭而相等, 并同时与 X, Y 对易; 这将给出共同对易代数中的非平凡幂等元, 矛盾。共同不变旗与共同不变直和分解并不相同。□

习题 10.20*. 对 $Q: 1 \rightarrow 2$, 用标量 $\alpha \in k$ 参数化全部扩张 $0 \rightarrow S_2 \rightarrow E \rightarrow S_1 \rightarrow 0$ 的等价类。证明 $\text{Ext}_{kQ}^1(S_1, S_2) \cong k$, 并说明为何有无穷多个扩张类时仍只有两个可能的中间项同构类型。

解. 逐顶点正合使 E_1, E_2 都为 k , 且由两端固定的包含和商映射确定其基。唯一箭便是某个标量 $\alpha: k \rightarrow k$ 。扩张等价要求在子模和商模上都是恒等, 所以中间项两个顶点的映射都必须为恒等, 迫使参数相等。由 Euler 数 $\langle (1, 0), (0, 1) \rangle_Q = -1$ 及 $\text{Hom}_Q(S_1, S_2) = 0$, 扩张空间维数为 1; 也可以直接核验 Baer 和把两个箭参数相加。具体说, 先在商 $S_1 \oplus S_1$ 上取对角拉回, 箭变成 $v \mapsto (\alpha v, \beta v)$, 再在子模 $S_2 \oplus S_2$ 上沿加法推出, 箭即为 $\alpha + \beta$ 。标量作用同样对应参数乘标量, 因此得到所述线性同构。参数 0 的中间项是 $S_1 \oplus S_2$, 所有非零参数的中间项都通过改变一个顶点的基同构于 $k \xrightarrow{1} k$ 。中间项的同构允许改变两端的固定识别, 故比扩张等价粗。□

习题 10.21*. 令 $Y = (k^2 \xrightarrow{T} k^3)$, 其中 $T(a, b) = (a, 0, 0)$ 。分别判断由 $f_1(a, b) = a$ 给出的 $f: Y \rightarrow S_1$, 以及由 $1 \mapsto (1, 0, 0)$ 、 $1 \mapsto (0, 1, 0)$ 给出的两个 $S_2 \rightarrow Y$, 是否分裂。对不分裂的映射, 显式写出经 $P = (k \xrightarrow{1} k)$ 的分解。

解. $\ker T = k(0, 1)$, 而 f_1 在它上面为零, 所以 f 不分裂。取 $h_1(a, b) = a$ 、 $h_2(x, y, z) = x$, 有 $h_2 T = h_1$, 这给出 $Y \rightarrow P$, 再接 $P \rightarrow S_1$ 即为 f 。第一个 $S_2 \rightarrow Y$ 的像在 $\text{im } T$ 中, 所以不分裂; 取 $P_1 \rightarrow Y_1$ 将 1 送到 $(1, 0)$, $P_2 \rightarrow Y_2$ 将 1 送到 $(1, 0, 0)$, 就得到所需 $P \rightarrow Y$ 。第二个映射有左逆: 在顶点 2 取 $(x, y, z) \mapsto y$, 它在 $\text{im } T$ 上为零且把指定像送到 1。所以第二个映射是分裂单射, 不在左几乎分裂性质所要求的因子分解范围内。□

第三编

Lie 代数、根系与最高权

本编导读

有限群的元素通过可逆矩阵作用，Lie 代数则以线性算子之间的括号为出发点。本编主要讨论有限维复 Lie 代数，最高权分类也限于有限维表示；改变基域、特征或维数范围时，将另行说明条件。

第十一章建立括号、理想、表示及两种下降列。第十二章用 Engel 定理⁵与 Lie 定理解释幂零性、可解性及同时三角化，第十三章再以 Killing 型⁶判断半单性，并分解为单理想。一般完全可约性将在第十八章由 Casimir 方法⁷证明。Levi 分解⁸在第 12.4* 节给出陈述和交换核的计算，一般存在性与共轭性的证明见第 20.3 节。

第十四章单独研究 $\mathfrak{sl}_2$ 。升降算子确定不可约权链，Casimir 算子帮助证明有限维表示完全可约。第十五章随后用有序单项式和 Jacobi 恒等式证明 PBW，把诱导表示及最高权关系放进泛包络代数中。

第十六章先建立内在 Jordan 分解和 Cartan 子代数，再通过根空间中的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组证明根弦、整数性和反射。第十七章以这些数据研究 Weyl 群及全部有限约化结晶根系；第 17.4* 节再以 Serre 展示⁹证明相应复半单 Lie 代数的存在与唯一性。这一步完成的是 Lie 代数本身的分类。

第十八章先证明完全可约性，再构造 Verma 模¹⁰，并用支配整权分类给定复半单 Lie 代数的有限维简单模。简单模的存在性由简单根方向的幂关系及权集的有限性证明。第十九章随后把 Casimir 的权空间迹整理为 Freudenthal 递推¹¹，结合 Weyl 分母与反对称性，证明特征标公式及维数公式；第 7 章的 Schur 函数在最后给出 A 型的组合解释，BGG 消解¹²留待后文介绍。

第十章与本编都出现 Dynkin 图和正根，但参数的对象不同：在 Dynkin 箭图情形，正根给出不可分解表示的维数向量；在这里，支配整权给出固定复半单 Lie 代数的有限维简单模。前一对应由反射函子建立。

⁵恩格尔 (Friedrich Engel, 1861-1941)，德国数学家，与李合作奠定了 Lie 群理论的基础，并研究 Lie 代数的幂零性。

⁶基灵 (Wilhelm Killing, 1847-1923)，德国数学家，开创了复单 Lie 代数的分类研究。

⁷卡西米尔 (Hendrik Brugt Gerhard Casimir, 1909-2000)，荷兰物理学家，研究量子理论与凝聚态物理；以其名字命名的不变量也用于 Lie 代数表示论。

⁸列维 (Eugenio Elia Levi, 1883-1917)，意大利数学家，证明了有限维 Lie 代数关于可解根的分解定理。

⁹塞尔 (Jean-Pierre Serre, 1926-)，法国数学家，在代数几何、代数数论与同调方法方面作出重要贡献。

¹⁰维尔马 (Daya-Nand Verma, 1933-2012)，印度数学家，研究半单 Lie 代数的最高权表示，尤其是后来以他命名的诱导模。

¹¹弗罗伊登塔尔 (Hans Freudenthal, 1905-1990)，德裔荷兰数学家，研究 Lie 群与表示论，也对数学教育作出贡献。

¹²BGG 是伯恩斯坦 (Иосиф Наумович Бернштейн, 1945-)、伊斯拉埃尔·盖尔范德 (Израиль Моисеевич Гельфанд, 1913-2009) 与谢尔盖·盖尔范德 (Сергей Израилевич Гельфанд, 1944-) 三位数学家姓氏的首字母。伯恩斯坦是俄裔以色列数学家，两位盖尔范德是俄罗斯数学家；他们在 Lie 代数表示论中建立了相关消解。

计算中应始终看清归一化。本编的一般根内积由 Killing 型诱导，不统一把所有长根的平方长度改成二；分类所用的 Euclid 坐标¹³只作为整体相似的模型。第 14—15 章的 $\mathfrak{sl}_2$ 算子 $h^2 + 2h + 4fe$ 是其 Killing Casimir 的八倍，进入一般公式时会明确换算。主要参考 Humphreys 的《Introduction to Lie Algebras and Representation Theory》[8, Chapters II–VI]，所引页码采用 1980 年修订重印本；该版本的原版权年份为 1972 年。

¹³欧几里得 (Εὐκλείδης, 约公元前 325-约公元前 265)，古希腊数学家，著有《几何原本》，系统整理了古典几何。

第十一章 Lie 代数及其表示

本章从矩阵交换子建立 Lie 代数及其表示，研究子代数、理想、商、导子与伴随表示，并推导对偶、张量和 Hom 上的作用公式。

本章目标

- 能检验交替性和 Jacobi 恒等式，认识矩阵交换子和保持双线性型的经典例子。
- 区分子代数与理想，正确构造商并计算同态的核、像和交换化。
- 计算中心、导子和伴随表示，说明伴随作用的核怎样遗失中心信息。
- 推导对偶作用中的负号和张量作用的加法规则，并判断子空间是否不变。
- 会计算两种结构列，并用例子辨别可解性、幂零性和半单性。

预备知识为有限维线性代数、矩阵乘法、双线性型和张量积，以及前两编的表示、子模和商模观念。除明确说明的一般域计算外，本编后续核心结构定理将采用有限维复 Lie 代数。

取矩阵单位 E_{12}, E_{21} 。它们的乘积依次相减，得到 $[E_{12}, E_{21}] = E_{11} - E_{22}$ ；新的矩阵虽不在原来两者之中，却仍留在迹零矩阵空间内。若把交换子作为基本运算，闭合性和 Jacobi 恒等式便取代通常的乘法结合律；让这种结构作用于向量空间时，还要把括号对应到算子的交换子。我们将从矩阵计算抽出 Lie 代数与其表示的公理，再研究理想、商、导子及表示上的张量与对偶构造。基本定义及例子可参阅 [4, Section 2.9, pp. 22–25]；本章把交替条件单独写出，以兼顾特征二。

11.1 定义与例子

矩阵乘法一般不交换。若只取两种乘法次序的差，就得到一个双线性运算；它不再满足结合律，却满足另一条控制三重运算的恒等式。Lie 代数把这种括号运算本身作为研究对象。定义不需要 Lie 群或微分流形，本编的主要结构定理则固定在有限维复数情形。

11.1.1 反对称括号与 Jacobi 恒等式

定义 11.1.1. 设 k 为域， $\mathfrak{g}$ 为 k 向量空间。给定 k 双线性映射

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$$

使对任意 $x, y, z \in \mathfrak{g}$ 都有

$$[x, x] = 0, \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0,$$

就称 $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 **Lie 代数** (Lie algebra)，称第二个恒等式为 **Jacobi 恒等式** (Jacobi identity)。运算 $[x, y]$ 称为 Lie 括号。

第一条称为交替性。将 $x + y$ 代入它，得到 $[x, y] = -[y, x]$ ，即反对称性。特征不为二时，反对称性反过来推出交替性；特征二时却不能如此，所以一般域上的定义保留 $[x, x] = 0$ 。

给定一组基 $x_1, \dots, x_n$ ，括号由 $[x_i, x_j] = \sum_{\ell} c_{ij}^{\ell} x_{\ell}$ 决定。这些结构常数必须满足交替条件与 Jacobi 的二次关系。给定基向量之间的括号后，还须检查三重括号的 Jacobi 恒等式。

例 11.1.2. 在任意向量空间上令全部括号为零，就得到交换 Lie 代数。另取基 x, y, z ，规定 $[x, y] = z$ 、 $[x, z] = [y, z] = 0$ ，并按交替双线性延拓。每个括号都在 kz ，而 z 与全部元素括号为零，所以所有三重括号均为零，Jacobi 恒等式成立。这是三维 **Heisenberg Lie 代数** (Heisenberg Lie algebra)。¹

Jacobi 恒等式也可写成

$$[x, [y, z]] = [[x, y], z] + [y, [x, z]].$$

它说明固定 x 后，“与 x 取括号”像求导一样作用于另一个括号。这个形式将在理想、导子和表示中反复出现。

11.1.2 矩阵交换子及经典 Lie 代数

命题 11.1.3. 设 A 为域 k 上的结合代数，不要求交换。规定

$$[x, y] = xy - yx.$$

则 A 的底层向量空间成为 Lie 代数，记为 A^- 。

证明. 双线性和 $[x, x] = 0$ 直接成立。结合律使三项展开为

$$\begin{aligned} [x, [y, z]] &= xyz - xzy - yzx + zyx, \\ [y, [z, x]] &= yzx - yxz - zxy + xzy, \\ [z, [x, y]] &= zxy - zyx - xyz + yxz. \end{aligned}$$

相加后每个三重乘积出现两次，符号相反，所以和为零。这个证明不使用特征限制。□

特别地， $\text{End}_k(V)^-$ 记为 $\mathfrak{gl}(V)$ ；选基后写为 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 。满足 $\text{tr } X = 0$ 的矩阵组成子空间 $\mathfrak{sl}_n(k)$ ，它对括号封闭，因为 $\text{tr}(XY) = \sum_{i,j} x_{ij}y_{ji} = \text{tr}(YX)$ 。

对可逆对称矩阵 B 和标准交替矩阵 $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ ，还可定义

$$\begin{aligned} \mathfrak{so}(B) &= \{ X \mid X^T B + BX = 0 \}, \\ \mathfrak{sp}_{2n}(k) &= \{ X \mid X^T J + JX = 0 \}. \end{aligned}$$

¹海森堡 (Werner Karl Heisenberg, 1901-1976)，德国物理学家，建立矩阵力学，并提出量子力学的不确定性关系。

第一式讨论正交情形时, 本编假设 $\text{char } k \neq 2$ 。这些条件的含义是: 矩阵 X 满足 $b(Xu, v) + b(u, Xv) = 0$, 其中 b 为相应双线性型。若 X, Y 都满足这个条件, 两次使用它得到

$$b(XY u, v) = b(u, YX v), \quad b(YX u, v) = b(u, XY v),$$

相减便证明 $[X, Y]$ 仍满足条件。因此这两个子空间都是 Lie 代数。本编还会研究上三角矩阵 Lie 代数 $\mathfrak{b}_n$ 与严格上三角矩阵 Lie 代数 $\mathfrak{n}_n$ 。它们都是矩阵乘法下的子代数, 因而也对交换子封闭。矩阵群中要求可逆, 矩阵 Lie 代数中则没有这个要求; 零矩阵就在所有这些 Lie 代数中。

11.1.3 结合代数到 Lie 代数的构造

从 A 到 A^- 会忘掉部分结合乘法信息。例如一个交换代数的全部 Lie 括号都是零, 单靠这个零括号不能恢复原来的多项式乘法或幂零元。

命题 11.1.4. 设 k 为域, A, B 为 k 上的结合代数, $f: A \rightarrow B$ 为 k 代数同态。对任意 $x, y \in A$, 其底层线性映射保持交换子:

$$f([x, y]) = [f(x), f(y)].$$

如果 A 有单位, 给定一个么性左 A 模便得到交换子 Lie 代数 A^- 的线性作用; 但任意保持 Lie 括号的映射未必保持结合乘法或单位。

证明. 计算 $f(xy - yx) = f(x)f(y) - f(y)f(x)$ 。对模的作用同态 $A \rightarrow \text{End}_k(V)$ 应用此等式, 就得到括号相容性。反向断言的失败已经可在交换代数中看见: 例如 $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto 2z$, 保持两个零括号, 却不保持单位或乘法。□

因此“结合代数的表示”和“相应 Lie 代数的表示”不是同一类数据。第十五章将构造泛包络代数, 使一个给定 Lie 代数的全部表示恰好等同于某个结合代数的模; 那是对 Lie 括号另作构造, 不能简单使用本节原来的 A 。

11.2 子代数、理想与商

Lie 代数的子对象和商仍须与括号相容。理想条件保证一个括号在取商后不依赖代表; 伴随表示则把这种相容性写成线性算子的交换关系。这些构造是后面分解 Lie 代数的基础。

11.2.1 同态及同构定理

定义 11.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。子空间 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 若满足 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$, 就称为子代数; 子空间 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ 若满足 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{a}] \subseteq \mathfrak{a}$, 就称为理想。这里 $[U, W]$ 表示所有 $[u, w]$, $u \in U, w \in W$ 的线性生成空间。

定义 11.2.2. 设 $\mathfrak{g}, \mathfrak{l}$ 为同一域 k 上的 Lie 代数。一个 k 线性映射 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{l}$ 若满足 $f([x, y]) = [f(x), f(y)]$ 对所有 $x, y \in \mathfrak{g}$ 成立, 就称为 Lie 代数同态; 若它还是线性同构, 就称为 Lie 代数同构。

例如上三角矩阵在 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 中为子代数, 严格上三角矩阵在上三角代数中为理想。后一空间通常不是整个 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 的理想: 在二维中, $[E_{21}, E_{12}] = E_{22} - E_{11}$ 不再严格上三角。理想的环境不能从叙述中省去。

命题 11.2.3. 设 $\mathfrak{g}, \mathfrak{l}$ 为同一域 k 上的 Lie 代数, $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{l}$ 为 Lie 代数同态。则 $\ker f$ 为 $\mathfrak{g}$ 的理想, $\operatorname{im} f$ 为 $\mathfrak{l}$ 的子代数, 且

$$\mathfrak{g}/\ker f \cong \operatorname{im} f.$$

更一般地, 对 $\mathfrak{g}$ 的理想 $\mathfrak{a}$, 商空间上的括号 $[x + \mathfrak{a}, y + \mathfrak{a}] = [x, y] + \mathfrak{a}$ 良定义; 包含 $\mathfrak{a}$ 的理想与商 Lie 代数的理想一一对应。

证明. 若 $x \in \ker f$, 则 $f([y, x]) = [f(y), 0] = 0$, 证明核为理想; 像对括号封闭直接由同态等式得到。若更换两个商代表, 括号的差为 $[a, y] + [x, b] + [a, b]$, 其中 $a, b \in \mathfrak{a}$, 各项都在理想中, 故良定义。双线性、交替性与 Jacobi 从原代数下降。映射 $x + \ker f \mapsto f(x)$ 线性双射并保持括号, 得到同构。最后, 理想沿商映射取像或逆像时分别保持括号相容条件, 两种操作互逆。□

同样的计算还给出第二、第三同构定理。例如若 $\mathfrak{h}$ 为子代数、 $\mathfrak{a}$ 为理想, 则 $\mathfrak{h}/(\mathfrak{h} \cap \mathfrak{a}) \cong (\mathfrak{h} + \mathfrak{a})/\mathfrak{a}$; 若 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ 为理想, 则 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{a})/(\mathfrak{b}/\mathfrak{a}) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{b}$ 。这些映射分别由包含和复合商映射给出, 核与像已由前一命题确定。

11.2.2 中心与导子

定义 11.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。其中心为

$$Z(\mathfrak{g}) = \{z \in \mathfrak{g} \mid [z, x] = 0 \text{ 对所有 } x \in \mathfrak{g}\}.$$

k 线性映射 $D: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 若对所有 $x, y \in \mathfrak{g}$ 满足

$$D([x, y]) = [D(x), y] + [x, D(y)],$$

就称为 $\mathfrak{g}$ 的导子 (derivation of a Lie algebra)。全部导子的空间记为 $\operatorname{Der}(\mathfrak{g})$ 。

中心是一个交换理想。对一个子空间 $U \subseteq \mathfrak{g}$, 还分别定义

$$C_{\mathfrak{g}}(U) = \{x \mid [x, U] = 0\}, \quad N_{\mathfrak{g}}(U) = \{x \mid [x, U] \subseteq U\},$$

称为中心化子与正规化子。若 U 是子代数, Jacobi 恒等式说明这两者也是子代数。

命题 11.2.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。导子空间 $\operatorname{Der}(\mathfrak{g})$ 在算子交换子下组成 Lie 代数。对每个 $x \in \mathfrak{g}$, 映射

$$\operatorname{ad} x: \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}, \quad y \longmapsto [x, y]$$

为导子, 并对每个 $D \in \operatorname{Der}(\mathfrak{g})$ 满足

$$[D, \operatorname{ad} x] = \operatorname{ad}(Dx).$$

因此这些内导子的空间 $\operatorname{ad} \mathfrak{g}$ 为 $\operatorname{Der}(\mathfrak{g})$ 的理想。

证明. 对导子 D, E , 将 $DE([x, y]) - ED([x, y])$ 展开, 混合项 $[D(x), E(y)], [E(x), D(y)]$ 成对消去, 剩下 $[[D, E]x, y] + [x, [D, E]y]$, 所以交换子仍为导子。Jacobi 的导子形式直接说明 $\text{ad } x$ 为导子。再对 y 计算 $D([x, y]) - [x, D(y)] = [Dx, y]$, 得到最后的等式。□

导子未必都为内导子。例如一维交换 Lie 代数的全部内导子为零, 每个线性自同态却都是导子。半单复 Lie 代数中的情况将不同, 但不能把那个结论用于当前任意 Lie 代数。

11.2.3 伴随表示

命题 11.2.6. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。映射

$$\text{ad} : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}), \quad x \longmapsto \text{ad } x$$

是 Lie 代数同态, 其核为 $Z(\mathfrak{g})$ 。一个子空间 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ 在所有 $\text{ad } x$ 下不变, 当且仅当它是理想。

证明. 对 $z \in \mathfrak{g}$, Jacobi 恒等式给出

$$[\text{ad } x, \text{ad } y](z) = [x, [y, z]] - [y, [x, z]] = [[x, y], z].$$

故它保持括号。核与不变子空间两项结论分别就是中心和理想的定义。□

这称为**伴随表示** (adjoint representation)。它把 Lie 代数的内部括号转成一组线性算子, 因而可用特征值、迹与三角化研究结构。但它一般不忠实: 三维 Heisenberg 代数中的 z 就全部作用为零, 伴随表示看见的是模去中心后的代数。

例如二维代数取基 h, e , 规定 $[h, e] = e$ 。在这组基下,

$$\text{ad } h = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{ad } e = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

两矩阵的交换子等于第二个矩阵, 与原来的关系一致。这个小例子以后将区分可解性与幂零性。

11.3 表示与模

Lie 代数的表示仍然由线性算子组成, 但相容条件针对的是括号。一个元素无需作用为可逆算子, 也没有“先求群元素的逆”的步骤。对偶与张量作用中的符号应从这个条件重新推导, 不能照搬群表示的公式。

11.3.1 Lie 代数的线性作用

定义 11.3.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, V 为 k 向量空间。一个 k 线性映射 $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 若满足

$$\rho([x, y]) = \rho(x)\rho(y) - \rho(y)\rho(x) \quad (x, y \in \mathfrak{g}),$$

就称为 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示 (representation of a Lie algebra), 也称 V 为左 $\mathfrak{g}$ 模。简记 $xv = \rho(x)v$; 此时相容条件为

$$[x, y]v = x(yv) - y(xv).$$

表示同态是与全部 $\rho(x)$ 交换的线性映射; 两个表示同构要求这样的同态可逆。子表示是被全部作用算子保持的子空间, 商表示由商空间上的诱导算子给出。若 ρ 单射, 称表示忠实; 若全部作用为零, 称表示平凡。

命题 11.2.6 给出了伴随表示。矩阵 Lie 代数作为 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 的子代数时, 还在 k^n 上有自然表示。另一个简单例子是一维模: 它由线性泛函 $\lambda: \mathfrak{g} \rightarrow k$ 决定, 作用为 $xv = \lambda(x)v$ 。表示条件恰好要求 $\lambda([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$, 因为一维算子彼此交换。故一维模与交换化商 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 上的线性泛函对应。

命题 11.3.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, V, W 为左 $\mathfrak{g}$ 模, $f: V \rightarrow W$ 为表示同态。则核、像与余核均自然为左 $\mathfrak{g}$ 模; 一列左 $\mathfrak{g}$ 模正合, 当且仅当底层 k 向量空间列正合。

证明. 若 $f(v) = 0$, 则 $f(xv) = xf(v) = 0$, 故核不变。若 $w = f(v)$, 则 $xw = f(xv)$ 仍在像中。于是商上的作用不依赖代表, 且表示等式从原空间下降。核、像和商都没有改变相应的向量空间运算, 所以正合性也按底层空间检验。□

11.3.2 对偶表示与张量表示

命题 11.3.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, ρ_V, ρ_W 分别为它在 k 向量空间 V, W 上的表示。对 $x \in \mathfrak{g}$ 、 $v \in V$ 、 $w \in W$ 、 $\varphi \in V^* = \text{Hom}_k(V, k)$ 及 $T \in \text{Hom}_k(V, W)$, 下列公式分别给出 V^* 、 $V \otimes_k W$ 与 $\text{Hom}_k(V, W)$ 上的表示; 其中 $xv = \rho_V(x)v$ 、 $xw = \rho_W(x)w$:

$$\begin{aligned}(x\varphi)(v) &= -\varphi(xv), \\ x(v \otimes w) &= xv \otimes w + v \otimes xw, \\ xT &= \rho_W(x)T - T\rho_V(x).\end{aligned}$$

若 V 有限维, 则自然同构 $V^* \otimes W \cong \text{Hom}_k(V, W)$ 与这些作用相容。

证明. 在对偶上, 先后作用 x, y 给出 $(xy\varphi)(v) = \varphi(yxv)$, 故 $([x, y]\varphi)(v) = -\varphi([x, y]v)$, 正好是所需关系。在张量积上, 算子为 $\rho_V(x) \otimes I + I \otimes \rho_W(x)$; 两个不同因子上的算子交换, 计算交换子只留下两个因子的表示关系。对 Hom 展开两次作用, 混合项相消, 同样得到 $\rho_W([x, y])T - T\rho_V([x, y])$ 。最后把 $\varphi \otimes w$ 送到 $v \mapsto \varphi(v)w$, 代入公式得到

$$x(\varphi(v)w) - \varphi(xv)w = \varphi(v)xw - \varphi(xv)w,$$

这正是对偶与张量作用的像。有限维线性代数给出该映射为同构。□

尤其

$$\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, W) = \text{Hom}_k(V, W)^{\mathfrak{g}}, \quad U^{\mathfrak{g}} = \{u \in U \mid xu = 0 \text{ 对所有 } x \in \mathfrak{g}\}.$$

这里“不变”表示被所有 Lie 代数作用零化, 与群表示中被所有群元素固定的说法不同。

在 $V^{\otimes m}$ 上, x 的作用是分别在各因子作用后相加。它保持交换两个因子所得的关系子空间, 也保持外代数的交替关系: 对 $v \otimes v$ 的作用是 $xv \otimes v + v \otimes xv$, 而这个元素属于由平方张量生成的理想。因此对称幂、外幂及整个对称代数和外代数都得到诱导作用。在多项式代数上, 这个作用满足 Leibniz 规则², 是导子, 而不是代数自同构。

11.3.3 不变子空间与完全可约性

定义 11.3.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, V 为左 $\mathfrak{g}$ 模。若 $V \neq 0$ 且没有非零真子表示, 就称 V 为不可约表示; 若 V 是不可约子表示的直和, 就称为完全可约表示。若 $V \neq 0$ 且不能分成两个非零子表示的直和, 则称为不可分解表示。有限维不可约表示必不可分解, 逆命题一般不成立。

例如二维可解 Lie 代数 $[h, e] = e$ 可在 k^2 上作用为

$$\rho(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho(e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

两矩阵的交换子等于 $\rho(e)$, 所以确为表示。第一坐标轴不变, 但任何补直线均含第二坐标非零的向量, 而 $\rho(e)$ 将它送到非零第一坐标向量, 因而没有不变补。这个表示可约却不可分解。

Schur 引理对 Lie 代数表示仍成立: 同态的核与像是子表示, 所以不可约之间的非零同态可逆。若基域代数闭且表示有限维, 自同态取一个特征值后减去相应标量, 就由同一论证得到它原本就是标量。但要从自同态只有标量反推不可约, 仍须有额外条件; 上一例的两个作用矩阵的公共中心化子就只有标量, 却不完全可约。

Lie 代数表示的分解取决于 Lie 代数本身的结构。本编将证明: 半单复 Lie 代数的有限维表示完全可约, 可解复 Lie 代数的有限维不可约表示只能一维。前一结论需要 Killing 型与 Casimir 方法, 后一结论来自同时三角化; 两者的假设与证明均不同。

11.4 结构问题

最初的结构问题, 是反复取括号以后会发生什么。导出列让两边同时来自上一步, 下降中心列则始终允许一边来自整个代数。二者给出的有限终止条件不同; 弄清这种区别, 才能准确使用下一章的三角化定理。

11.4.1 可解、幂零与半单 Lie 代数

定义 11.4.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上 Lie 代数。定义导出列

$$\mathfrak{g}^{(0)} = \mathfrak{g}, \quad \mathfrak{g}^{(r+1)} = [\mathfrak{g}^{(r)}, \mathfrak{g}^{(r)}],$$

以及下降中心列

$$\gamma_1(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}, \quad \gamma_{r+1}(\mathfrak{g}) = [\mathfrak{g}, \gamma_r(\mathfrak{g})].$$

²莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716), 德国数学家、哲学家, 独立创立微积分, 并发展了微分记号和乘积求导法则。

若存在整数 $r \geq 0$ 使 $\mathfrak{g}^{(r)} = 0$, 称 $\mathfrak{g}$ 可解 (solvable); 若存在整数 $c \geq 0$ 使 $\gamma_{c+1}(\mathfrak{g}) = 0$, 称它幂零 (nilpotent). 对非零幂零代数, 最小的这种 c 称为幂零类。

定义 11.4.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上有限维 Lie 代数。若它没有非零可解理想, 就称为半单 Lie 代数 (semisimple Lie algebra)。若它非交换且只有零与自身两个理想, 就称为单 Lie 代数 (simple Lie algebra)。

这里把非交换性写入“单”的定义, 因而一维交换 Lie 代数不称为单 Lie 代数。半单代数最终能否分解为单理想之和, 还需要证明; 在定义中先使用理想条件, 避免把后面的分解定理预先假定下来。

三维 Heisenberg 代数满足 $\gamma_2 = kz, \gamma_3 = 0$, 所以幂零类为二。二维代数 $[h, e] = e$ 则满足

$$\mathfrak{g}^{(1)} = ke, \quad \mathfrak{g}^{(2)} = 0, \quad \gamma_r(\mathfrak{g}) = ke \quad (r \geq 2).$$

它可解但不幂零。这里两个一维的理想和商都是交换的, 已经说明幂零性不能像可解性一样在任意扩张下保持。

11.4.2 交换子代数与导出列

命题 11.4.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 是理想, 商 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 交换; 从 $\mathfrak{g}$ 到任意交换 Lie 代数的同态都唯一通过这个商分解。

证明. Jacobi 的导子形式说明 $[z, [x, y]] = [[z, x], y] + [x, [z, y]]$ 仍在括号的线性生成空间中, 所以它为理想。商中全部括号为零。到交换代数的同态把每个括号送到零, 核包含该理想, 商映射的泛性质即给出唯一分解。□

命题 11.4.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, 记 $\mathfrak{g}^{(r)}$ 为导出列的第 r 项, $\gamma_r(\mathfrak{g})$ 为下降中心列的第 r 项。两列的每一项都是理想; 对整数 $r, s \geq 1$, 有

$$[\gamma_r(\mathfrak{g}), \gamma_s(\mathfrak{g})] \subseteq \gamma_{r+s}(\mathfrak{g}), \quad \mathfrak{g}^{(r)} \subseteq \gamma_{2r}(\mathfrak{g}).$$

特别地, 幂零蕴涵可解。子代数与商分别继承可解性及幂零性。

证明. 若 I, J 为理想, Jacobi 恒等式使 $[I, J]$ 仍为理想; 若 I 只是导出列中的理想, 也有 $[\mathfrak{g}, [I, I]] \subseteq [I, I]$ 。逐步应用便得理想性。对第一个包含关系按 r 归纳, $r = 1$ 是定义; 由 Jacobi,

$$[[\mathfrak{g}, \gamma_r], \gamma_s] \subseteq [\mathfrak{g}, [\gamma_r, \gamma_s]] + [\gamma_r, [\mathfrak{g}, \gamma_s]] \subseteq \gamma_{r+s+1}.$$

第二项使用同一归纳假设对所有 s 成立。随后按导出次数归纳: 若 $\mathfrak{g}^{(r)} \subseteq \gamma_{2r}$, 两个这样的项取括号便落在 γ_{2r+1} 。若下降中心列终止, 导出列因此也终止。子代数的两种列逐项包含于原代数对应的列; 满同态则将两种列逐项映满商中的相应列。故终止性质在这两种操作下保持。□

命题 11.4.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, $\mathfrak{a}$ 为其理想。若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 都可解, 则 $\mathfrak{g}$ 可解。若 $\mathfrak{a} \subseteq Z(\mathfrak{g})$, 且 $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 幂零, 则 $\mathfrak{g}$ 幂零。

证明. 若商的第 r 个导出项为零, 则 $\mathfrak{g}^{(r)} \subseteq \mathfrak{a}$. 再取 s 次导出, 落入 $\mathfrak{a}^{(s)}$, 最终为零. 对第二个结论, 若商的第 $c+1$ 个下降中心项为零, 则 $\gamma_{c+1}(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{a} \subseteq Z(\mathfrak{g})$, 从而 $\gamma_{c+2}(\mathfrak{g}) = 0$. $\square$

命题 11.4.6. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的非交换有限维单 Lie 代数. 则 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$, $Z(\mathfrak{g}) = 0$, 且 $\mathfrak{g}$ 半单. 域 k 上任意有限维半单 Lie 代数的中心也为零.

证明. 导出代数为非零理想, 所以等于整个 $\mathfrak{g}$. 其导出列不终止, 故 $\mathfrak{g}$ 不可解; 唯一可能的非零理想因此不是可解理想. 中心为理想, 若等于整个代数便使代数交换, 所以只能为零. 一般半单代数的中心是交换理想, 同样必须为零. $\square$

11.4.3 复数域与正特征的区别

本编关于半单结构与有限维表示的核心定理以复数域为环境. 特征零使某些整数系数可以相消, 代数闭性使特征值存在; 两种条件有不同用途.

例如在特征 $p > 0$ 时, $\mathfrak{sl}_p(k)$ 包含非零标量矩阵 I_p , 因为 $\text{tr } I_p = p = 0$. 它张成一个中心交换理想, 所以这个 Lie 代数不满足本节的半单定义. 尤其在特征二的 $\mathfrak{sl}_2(k)$ 中, 取

$$e = E_{12}, \quad f = E_{21}, \quad h = I_2,$$

便有 $[e, f] = h$, $[h, e] = [h, f] = 0$. 它成为三维 Heisenberg 代数, 而不是后面要研究的复 $\mathfrak{sl}_2$.

还要区分“代数幂零”与“在某个表示中每个算子幂零”. 一个一维交换 Lie 代数本身幂零, 却可让它的基向量在一维表示上作用为一, 得到非幂零算子. Engel 定理将要求给定表示中的每个作用算子幂零; 应用于伴随表示以后, 才能得到 Lie 代数自身的幂零性判据. 下一章会把这个转换写清楚.

本章小结

Jacobi 恒等式使每个伴随算子都是导子, 并保证伴随映射保持 Lie 括号. 理想就是伴随表示的不变子空间, 而中心是这个表示的核. 同态保持 Lie 括号, 理想条件使商空间上的括号良定, 表示则把括号关系变为算子的交换关系.

对偶作用中的负号、张量作用中的两个加项以及 Hom 上的交换差, 都必须与 Lie 括号逐项核对. 一般 Lie 代数表示未必完全可约, 甚至自同态只有标量也不能反推不可约; 后面的结构定理会说明哪些附加条件能够改变这种情形.

导出列和下降中心列测量不同的性质. 幂零蕴含可解, 但两个交换代数的扩张未必幂零; 中央扩张则保留幂零性. 下一章将用同时三角化进一步研究这些条件, 而半单性与单理想分解要由 Killing 型建立. 正特征下的标量中心和特征二例子提醒我们, 不能忽略定理中写明的基域.

习题

习题 11.1. 设 k 的特征为 2。在基为 x, z 的空间上定义双线性括号 $[x, x] = z$, 其余基向量括号全为零。证明此括号反对称且满足 Jacobi 恒等式, 但不是 Lie 代数括号。

解. 括号是对称的, 而特征二时 $-1 = 1$, 所以对称性同时意味着 $[u, v] = -[v, u]$ 。每个括号都落在 kz , 且 z 与所有元素的括号为零, 因此所有三重括号均为零, Jacobi 成立。但 $[x, x] = z \neq 0$, 违反交替性。这表明在一般域的定义中不能只写反对称性。□

习题 11.2. 在域 k 上取基 x, y, z , 规定

$$[x, y] = az, \quad [y, z] = bx, \quad [z, x] = cy,$$

并交替双线性延拓, 其中 $a, b, c \in k$ 。证明任意参数都给出 Lie 代数; 若 $abc \neq 0$, 求其中心与导出代数。

解. Jacobi 表达式三线性, 所以只需查基向量三元组。出现重复向量时, 两项互为相反数而第三项为零; 三个不同向量时, $[x, [y, z]] = [x, bx] = 0$, 另两项也各自为零。因此 Jacobi 对全部参数成立。若 $abc \neq 0$, 三条括号直接给出全部基向量, 所以导出代数是整个代数。令 $u = \alpha x + \beta y + \gamma z$ 为中心元, 先由 $[u, x] = -\beta az + \gamma cy = 0$ 得 $\beta = \gamma = 0$, 再由 $[u, y] = \alpha az = 0$ 得 $\alpha = 0$ 。故中心为零。□

习题 11.3. 设 $n \geq 2$, k 为任意域。证明

$$[\mathfrak{gl}_n(k), \mathfrak{gl}_n(k)] = \mathfrak{sl}_n(k).$$

这里左端是全部交换子的线性生成空间, 不要求每个迹零矩阵单独就是一个交换子。

解. 交换子的迹为零, 所以左端包含于右端。反向, 非对角矩阵单位满足 $E_{ij} = [E_{ii}, E_{ij}]$, 对角差满足 $E_{ii} - E_{jj} = [E_{ij}, E_{ji}]$ 。这些矩阵张成所有迹零矩阵: 非对角部分已处理; 若对角元 $a_1 + \cdots + a_n = 0$, 其对角矩阵等于 $\sum_{i < n} a_i (E_{ii} - E_{nn})$ 。故右端也包含于左端, 任意特征均成立。□

习题 11.4. 证明复结合代数 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的底层 Lie 代数同构, 而它们作为结合代数不同构。

解. 两代数都交换且复维数为 2, 所以底层 Lie 括号恒零, 任意线性同构都是 Lie 同构。但第二个代数含非零幂零元 ε , 第一个代数中若 $(a, b)^m = (0, 0)$, 则 $a = b = 0$, 没有非零幂零元。结合代数同构保持幂零元, 故不存在结合代数同构。□

习题 11.5. 设 B 是域 k 上可逆矩阵, $P \in \mathrm{GL}_n(k)$, $B' = P^\top B P$ 。证明

$$X \mapsto P^{-1} X P$$

将满足 $X^\top B + B X = 0$ 的 Lie 代数同构到满足 $Y^\top B' + B' Y = 0$ 的 Lie 代数。

解. 置 $Y = P^{-1} X P$, 则

$$Y^\top B' + B' Y = P^\top (X^\top B + B X) P.$$

所以条件在两边等价。共轭是线性可逆映射, 并且 $[P^{-1} X P, P^{-1} Z P] = P^{-1} [X, Z] P$, 故为 Lie 代数同构。对称或交错性质也在这种换基下保持。□

习题 11.6. 在 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ 中求直线 $\mathbb{C}E_{12}$ 的中心化子与正规化子, 并计算二者的维数。

解. 令 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则

$$[X, E_{12}] = \begin{pmatrix} -c & a-d \\ 0 & c \end{pmatrix}.$$

要使它为零, 须 $c=0, a=d$, 中心化子为 $\{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}\}$, 维数 2。要使它属于 $\mathbb{C}E_{12}$, 只须 $c=0$, 正规化子为全部上三角矩阵, 维数 3。中心化要求逐元素括号为零, 正规化只要求保持整个子空间, 因此这里二者不同。□

习题 11.7. 设 $\mathfrak{h}$ 为域 k 上的三维 Heisenberg Lie 代数, $[x, y] = z$ 。列出其全部理想, 区分一维子代数与一维理想。

解. 零与整个代数是理想, 中心直线 kz 也是理想。若理想含有 $u = ax + by + cz$ 且 $(a, b) \neq (0, 0)$, 则 $[x, u] = bz, [y, u] = -az$, 至少一式非零, 所以它必须包含 z 。因此任何非零理想都包含 kz 。商 $\mathfrak{h}/kz$ 交换, 故其中每个子空间的逆像都是理想。全部理想便为零、 kz 、所有包含 kz 的二维平面以及 $\mathfrak{h}$ 。每条直线都是子代数, 因为交替性使同一直线上的括号为零, 但只有 kz 是非零一维理想。□

习题 11.8. 对三维 Heisenberg 代数及中心理想 kz , 比较 $Z(\mathfrak{h})/kz$ 与 $Z(\mathfrak{h}/kz)$ 。由此判断中心是否与取商交换。

解. 中心为 kz , 所以前一个空间为零。商由 $x + kz, y + kz$ 张成且括号全零, 因此后一个中心是整个二维商。两者不同。一般而言, 某些括号在取商后变成零, 可以产生新的中心元素; 中心的像只保证包含于商的中心。□

习题 11.9. 在复三维 Heisenberg 代数 $[x, y] = z$ 中, 求全部导子及内导子的维数。

解. 写

$$Dx = ax + by + cz, \quad Dy = dx + ey + fz.$$

导子条件强迫

$$Dz = D[x, y] = [Dx, y] + [x, Dy] = (a + e)z.$$

对 $[x, z] = [y, z] = 0$ 的条件随此式自动成立, 因为 Dz 仍在中心。反之任意 a, b, c, d, e, f 都给出导子, 所以导子空间六维。内导子 $\text{ad}(px + qy + rz)$ 满足 $x \mapsto -qz, y \mapsto pz, z \mapsto 0$, 形成二维子空间; 因此不是所有导子都为内导子。□

习题 11.10. 设 D 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的导子。证明 D 保持中心、每个导出项以及每个下降中心项。

解. 若 $z \in Z(\mathfrak{g})$, 则对任意 x , $[Dz, x] = D[z, x] - [z, Dx] = 0$, 故 Dz 仍在中心。如果 D 保持子空间 I, J , 则 $D[I, J] \subseteq [DI, J] + [I, DJ] \subseteq [I, J]$ 。从 $D\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{g}$ 出发, 对两种递归定义逐次应用, 便得到导出列和下降中心列每一项都被保持。□

习题 11.11. 将 Heisenberg 代数实现为 $\text{span}_k\{E_{12}, E_{23}, E_{13}\} \subseteq \mathfrak{gl}_3(k)$ 。比较自然表示与伴随表示的核, 并判断伴随像是否交换。

解. 自然表示是这个矩阵子代数的包含映射, 核为零。伴随表示的核为中心 kE_{13} , 所以伴随像同构于二维商 $\mathfrak{h}/kE_{13}$ 。商的括号为零, 故伴随像交换。一个非交换 Lie 代数的伴随像可以交换, 原因是原来全部非零括号都落在被核消去的中心中。□

习题 11.12. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的 Lie 代数, M 是其左模。在 $M \oplus \mathfrak{g}$ 上定义

$$[(m, x), (n, y)] = (xn - ym, [x, y]).$$

证明这是 Lie 代数, M 是交换理想, 商同构于 $\mathfrak{g}$ 。何时标准两个分量成为理想直和?

解. 双线性与交替性直接成立。Jacobi 和的第二分量为 $\mathfrak{g}$ 的 Jacobi 和, 故为零; 第一分量按 m, n, ℓ 分组, 分别包含

$$(xy - yx - [x, y])\ell, \quad (yz - zy - [y, z])m, \quad (zx - xz - [z, x])n,$$

各项由模的表示条件为零。 $M \oplus 0$ 自身括号为零, 与任意元素括号仍在其中, 所以是交换理想; 投影到第二分量是满同态且核为 M 。标准的 $0 \oplus \mathfrak{g}$ 总是子代数, 但若它还是理想, 则它与理想 M 的括号必须落在交集零中, 所以所有 $xm = 0$ 。反之作用平凡时两分量互相交换, 便为理想直和。□

习题 11.13. 在二维复代数 $[h, e] = e$ 的表示

$$\rho(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho(e) = E_{12}$$

中, 直接检验只取转置而不加负号不能给出对偶表示; 再检验正确的负转置公式。

解. 只取转置时, h, e 分别作用为 $H = \text{diag}(1, 0)$ 、 E_{21} , 而 $[H, E_{21}] = -E_{21} \neq E_{21}$, 不满足 $[h, e] = e$ 。取负转置后, 作用为 $-H, -E_{21}$, 其交换子 $[-H, -E_{21}] = [H, E_{21}] = -E_{21}$, 恰等于 e 的新作用矩阵, 满足表示条件。□

习题 11.14. 设 V 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模, v_i, v_i^* 为对偶基。证明 $\sum_i v_i^* \otimes v_i \in V^* \otimes V$ 不依赖基且被 $\mathfrak{g}$ 零化。另证明配对 $V^* \otimes V \rightarrow k, \varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$ 是到平凡模的同态。

解. 在自然同构 $V^* \otimes V \cong \text{End}_k(V)$ 下, 该张量对应恒等算子, 因而不依赖基。Hom 作用把恒等算子送到 $\rho(x)I - I\rho(x) = 0$, 故它不变。对配对则有

$$(x\varphi)(v) + \varphi(xv) = -\varphi(xv) + \varphi(xv) = 0,$$

正好等于平凡模上 x 对标量的作用, 所以配对是模同态。□

习题 11.15. 设 V 是 n 维 $\mathfrak{g}$ -模。证明在一维模 $\bigwedge^n V$ 上, 元素 x 作用为 $\text{tr } \rho(x)$ 。由此解释迹为什么零化所有 Lie 括号。

解. 选基 $v_1, \dots, v_n$, 写 $\rho(x)v_j = \sum_i a_{ij}v_i$ 。在 $v_1 \wedge \dots \wedge v_n$ 上逐个因子作用时, $i \neq j$ 的项含重复基向量, 均为零; 剩下的系数为 $\sum_j a_{jj} = \text{tr } \rho(x)$ 。因为一维表示的作用矩阵交换, 任何括号都作用为零, 所以 $\text{tr } \rho([x, y]) = 0$ 。这也与矩阵交换子的迹计算一致。□

习题 11.16. 设 V, W 是有限维 Lie 代数表示。证明张量表示满足

$$\mathrm{tr}_{V \otimes W} \rho_{V \otimes W}(x) = (\dim W) \mathrm{tr}_V \rho_V(x) + (\dim V) \mathrm{tr}_W \rho_W(x).$$

解. 张量作用是 $\rho_V(x) \otimes I_W + I_V \otimes \rho_W(x)$ 。在张量积基下, $A \otimes I_W$ 的对角元把 A 的每个对角元重复 $\dim W$ 次; 另一项同理把 W 的对角元重复 $\dim V$ 次。利用迹的线性性相加即得公式。这里是两个作用之和, 而非群表示中两个矩阵的张量积。□

习题 11.17. 令一维复交换 Lie 代数的基向量在 $\mathbb{C}^2$ 上作用为 $N = E_{12}$ 。计算模自同态环, 并证明这个表示可约而不可分解。

解. 解 $TN = NT$ 得

$$\mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(V) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{C}I + \mathbb{C}N.$$

第一坐标轴不变, 所以表示可约。若存在非平凡直和分解, 相应投影给出模自同态环中的非平凡幂等元。令 $(aI + bN)^2 = aI + bN$, 得到 $a^2 = a, 2ab = b$ 。在复数域上 $a = 0$ 或 1 , 两种情形均迫使 $b = 0$, 所以只有 $0, I$ 两个幂等元, 不能分解。□

习题 11.18. 设 U, V, W 是同一域上的 $\mathfrak{g}$ -模。验证自然对应

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, U) \cong \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, \mathrm{Hom}_k(W, U)),$$

其中 Hom 空间采用正文的 Lie 代数作用。

解. 底层线性对应把 f 送到 $F(v)(w) = f(v \otimes w)$ 。若 f 是模同态, 则

$$F(xv)(w) = xf(v \otimes w) - f(v \otimes xw) = (xF(v))(w),$$

所以 F 是模同态。反过来把这个等式移项, 便得 $xf(v \otimes w) = f(xv \otimes w + v \otimes xw)$, 所以 f 与张量作用相容。底层对应与逆对应互逆, 且两方向都保留模同态条件, 因而得到同构。□

习题 11.19. 设 $\lambda, \mu: \mathfrak{g} \rightarrow k$ 都零化 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, 对应一维模 k_λ, k_μ 。求其张量积、对偶及 Hom 表示, 并判断何时非零模同态。

解. 张量规则给出 $k_\lambda \otimes k_\mu \cong k_{\lambda+\mu}$; 对偶规则给出 $k_\lambda^* \cong k_{-\lambda}$; Hom 规则给出 $\mathrm{Hom}_k(k_\lambda, k_\mu) \cong k_{\mu-\lambda}$ 。模同态正是 Hom 中被全部作用零化的元素。因此当 $\lambda = \mu$ 时 Hom 为一维, 否则取使 $\mu(x) - \lambda(x) \neq 0$ 的 x , 迫使不变元素为零。于是非零模同态存在当且仅当两泛函相等。□

习题 11.20. 设 $n \geq 2$, k 是任意域。求 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 的全部一维表示; 说明结论在 $\mathrm{char} k \mid n$ 时仍成立。

解. 一维作用泛函 λ 必零化所有交换子。非对角矩阵单位 $E_{ij} = [E_{ii}, E_{ij}]$ 与对角差 $E_{ii} - E_{jj} = [E_{ij}, E_{ji}]$ 张成迹零空间, 所以 λ 零化 $\mathfrak{sl}_n(k)$ 。迹映射满射, 因为 $\mathrm{tr} E_{11} = 1$, 核为迹零空间, 因此 $\lambda = c \mathrm{tr}$, 其中 $c \in k$ 任意。反过来迹零化交换子, 所以每个这样的泛函都给出表示。证明没有除以 n , 故当特征整除 n 时仍成立。□

习题 11.21. 对复三阶上三角矩阵代数 $\mathfrak{b}_3$, 计算导出列和下降中心列。再对严格上三角子代数 $\mathfrak{n}_3$ 重复计算。

解. 对 $\mathfrak{b}_3$, 对角交换子为零, 而与对角矩阵取括号可产生每个 E_{12}, E_{23}, E_{13} , 所以

$$\mathfrak{b}_3^{(1)} = \mathfrak{n}_3, \quad \mathfrak{b}_3^{(2)} = \mathbb{C}E_{13}, \quad \mathfrak{b}_3^{(3)} = 0.$$

同时 $[\mathfrak{b}_3, \mathfrak{n}_3] = \mathfrak{n}_3$, 故 $\gamma_r(\mathfrak{b}_3) = \mathfrak{n}_3$ 对所有 $r \geq 2$ 成立, 它不幂零。严格上三角情形唯一基本非零括号为 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$, 所以

$$\mathfrak{n}_3^{(1)} = \mathbb{C}E_{13}, \quad \mathfrak{n}_3^{(2)} = 0, \quad \gamma_2(\mathfrak{n}_3) = \mathbb{C}E_{13}, \quad \gamma_3(\mathfrak{n}_3) = 0.$$

因此 $\mathfrak{n}_3$ 幂零类为二。 $\square$

习题 11.22. 在四维复空间上取基 x, y, z, w , 规定 $[x, y] = z, [x, z] = w$, 其余基向量括号为零并交替延拓。验证 Jacobi, 计算中心与幂零类, 并比较模去中心后的幂零类。

解. 重复基向量的 Jacobi 自动相消; 对互异三元组, 唯一需要注意 (x, y, z) , 其三项为 $0, [y, -w], [z, z]$, 均为零。含 w 的三元组也全部为零, 故确为 Lie 代数。若 $u = ax + by + cz + dw$ 在中心, 由 $[u, y] = az$ 得 $a = 0$, 再由 $[u, x] = -bz - cw$ 得 $b = c = 0$, 所以中心为 $\mathbb{C}w$ 。下降中心列为

$$\gamma_2 = \mathbb{C}z + \mathbb{C}w, \quad \gamma_3 = \mathbb{C}w, \quad \gamma_4 = 0.$$

故幂零类为三。模去中心后得到三维 Heisenberg 代数, 幂零类为二, 说明中央扩张可以使幂零类确实增加一。 $\square$

习题 11.23. 设 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 是有限维 Lie 代数。证明直和的导出列及下降中心列逐项为两个对应项的直和, 并求可解长度和幂零类的关系。

解. 直和括号逐分量计算, 因此

$$(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h})^{(r)} = \mathfrak{g}^{(r)} \oplus \mathfrak{h}^{(r)}, \quad \gamma_r(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}) = \gamma_r(\mathfrak{g}) \oplus \gamma_r(\mathfrak{h})$$

由归纳得到。若两者都可解, 直和导出列首次为零的次数就是两个次数的最大值; 若都幂零, 幂零类也是二者的最大值。反之, 只要一个分量相应列不终止, 直和也不终止。零代数可约定对应长度为零, 不影响这些公式。 $\square$

习题 11.24. 设 k 的特征为 $p > 0$ 。证明 $\mathfrak{gl}_p(k) = \mathfrak{sl}_p(k) \oplus kE_{11}$ 是向量空间直和, 且两个分量都是子代数; 但不存在由中心直线构成的 $\mathfrak{sl}_p(k)$ 的补。

解. 迹在 E_{11} 上为 1, 所以 $X = (X - \text{tr}(X)E_{11}) + \text{tr}(X)E_{11}$ 给出所述直和, 交集为零。迹零空间是理想, 一维直线是子代数, 因此这是子代数补; 但不一定是理想直和。与全部矩阵单位交换的矩阵只能为标量, 所以 $Z(\mathfrak{gl}_p) = kI_p$ 。因为 $\text{tr } I_p = p = 0$, 整个中心已经包含于 $\mathfrak{sl}_p$, 任何中心直线都不能作为补。特征零中常用的 $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{sl}_n \oplus kI$ 在这里失效。 $\square$

第十二章 幂零、可解与三角化

本章从一族算子的共同零向量出发证明 Engel 定理，再以理想特征空间的稳定性证明 Lie 三角化定理。由此构造可解根与幂零根，说明它们在自同构和导子下的不变性，并得到半单商。最后以交换核扩张的具体计算解释 Levi 分解的存在障碍与共轭问题。

本章目标

- 区分幂零 Lie 代数、幂零矩阵以及由幂零算子组成的表示。
- 用正规化子和维数归纳证明 Engel 定理，并构造严格下降的完全旗标。
- 证明 Lie 定理，指出代数闭性及特征零条件在证明中的具体位置。
- 计算可解根、幂零根及半单商，区分商对象与内部子代数补。
- 计算交换核扩张的余圈及截面修正，说明一般 Levi 分解还需哪些上同调消失结果。

预备知识为第十一章的 Lie 代数、理想、表示、导出列和下降中心列，以及有限维线性代数的特征空间、商空间与迹。Engel 定理适用于任意域；其后的结构结论以复数域为主要环境。

严格上三角矩阵都杀死第一基向量，因而有共同零向量；沿这个向量取商，便能逐维寻找一组使所有矩阵同时严格上三角的基。若最初没有给出这样的基，只知道一族算子中的每个元素都幂零，又该怎样找出共同零向量？Lie 括号把这些算子联系起来，Engel 定理正从这项联系给出答案。对可解 Lie 代数，结论改为共同特征向量与同时上三角化，特征值不必全为零。两种三角化的区别也将影响可解根和幂零根的结构。经典证明可参阅 [8, Sections 3.3 and 4.1, pp. 12–13, 15–16]。

12.1 Engel 定理

一个矩阵幂零，只约束它自身的幂；一族矩阵能够在同一组基下写成严格上三角形，则同时约束它们的所有混合乘积。Engel 定理说明：若这族矩阵是一个 Lie 子代数，并且其中每个元素都幂零，前一个条件便足以推出后一个条件。Lie 括号封闭性在这里不可省略。

12.1.1 幂零算子构成的 Lie 代数

引理 12.1.1. 设 V 是域 k 上的有限维向量空间， $r \geq 1$ 为整数， $x \in \text{End}_k(V)$ 且 $x^r = 0$ 。则算子 $\text{ad } x : T \mapsto xT - Tx$ 在 $\text{End}_k(V)$ 上幂零，并且对每个整数 $m \geq 0$ 及 $T \in \text{End}_k(V)$ ，有

$$(\text{ad } x)^m(T) = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} x^{m-j} T x^j, \quad (\text{ad } x)^{2r-1} = 0.$$

证明. 左乘 x 与右乘 x 交换, 二项式公式给出第一式. 当 $m = 2r - 1$ 时, 每一项的两个指数中至少一个不小于 r , 故每一项都为零. 证明适用于任意特征. $\square$

注意“每个元素幂零”要求全部线性组合都幂零. $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中的 E_{12} 和 E_{21} 分别幂零, 但它们的和平方为单位矩阵; 只检查一组生成元并不够.

12.1.2 公共零向量

下面是 **Engel 定理** (Engel's theorem) 的算子形式.

定理 12.1.2 (Engel 定理的算子形式). 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的 n 维向量空间, $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ 是 Lie 子代数. 若 L 的每个元素都是幂零算子, 则存在 $v \in V \setminus \{0\}$, 使 $xv = 0$ 对所有 $x \in L$ 成立. 进一步, 存在完全旗标

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = V, \quad \dim V_i = i, \quad LV_i \subseteq V_{i-1}.$$

因此 L 中全部算子可同时严格上三角化.

证明. 先对 $\dim L$ 归纳证明公共零向量的存在. 零代数没有限制; 以下设 $L \neq 0$, 并假定维数较小的算子 Lie 代数已经满足结论. 取 L 的极大真子代数 M . 对 $m \in M$, 引理 12.1.1 说明 $\text{ad } m$ 在 L , 从而在 L/M 上幂零. M 在 L/M 上作用的像维数至多为 $\dim M < \dim L$, 故归纳假设给出非零陪集 $x + M$, 满足 $[M, x] \subseteq M$. 于是正规化子

$$N_L(M) = \{x \in L \mid [x, M] \subseteq M\}$$

严格包含 M . Jacobi 恒等式保证这个正规化子是子代数; 由极大性它等于 L , 所以 M 是理想.

商 L/M 不含非零真子代数, 而任意一维子空间都是 Lie 子代数, 故 $\dim L/M = 1$. 取 $x \notin M$, 有 $L = M + kx$. 归纳假设又给出

$$W = \{v \in V \mid Mv = 0\} \neq 0.$$

若 $w \in W$ 、 $m \in M$, 则

$$m(xw) = x(mw) + [m, x]w = 0,$$

故 $xW \subseteq W$. 幂零算子 $x|_W$ 在非零空间 W 上必有非零核; 核中的任意非零向量都被 M 与 x 同时零化, 因而被 L 零化.

取这样的 v_1 , 令 $V_1 = kv_1$. L 在 V/V_1 上的每个诱导算子仍幂零. 重复已经证明的公共零向量结论, 逐次提升商空间中的一维子空间, 便得所需旗标. 选取与旗标相适应的基, 矩阵即为严格上三角形. $\square$

证明中的两个归纳作用不同: 对 $\dim L$ 的归纳解决“同时”的问题; 随后对商空间的重复使用把一条公共零直线扩充为完全旗标. 后一过程没有要求新的代数闭性条件.

12.1.3 Engel 定理及幂零性

Engel 定理的抽象形式把算子条件转回 Lie 代数自身。

定理 12.1.3 (Engel 定理). 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的有限维 Lie 代数。则 $\mathfrak{g}$ 幂零, 当且仅当对每个 $x \in \mathfrak{g}$, ad_x 都是幂零算子。

证明. 若下降中心列 $\gamma_1 \mathfrak{g} = \mathfrak{g}$, $\gamma_{i+1} \mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \gamma_i \mathfrak{g}]$ 在 $\gamma_{c+1} \mathfrak{g}$ 处为零, 则 $(\text{ad } x)^c(\mathfrak{g}) \subseteq \gamma_{c+1} \mathfrak{g} = 0$ 。

反之, 对伴随像 $L = \text{ad } \mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 应用定理 12.1.2。若 $n = \dim \mathfrak{g}$, 则任意 n 个伴随算子的乘积都沿该定理的旗标降到零。因此所有形如

$$[x_1, [x_2, \dots, [x_n, y] \dots]]$$

的括号都为零; 这些元素生成 $\gamma_{n+1} \mathfrak{g}$, 故 $\mathfrak{g}$ 幂零。零代数的结论直接成立。 $\square$

推论 12.1.4. 任意域上非零有限维幂零 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的中心非零。

证明. 在 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示中, 定理 12.1.2 给出的公共零向量正是一个非零中心元素。 $\square$

这里的幂零条件针对伴随表示。一个一维交换 Lie 代数可以在一维空间上作用为单位算子, 因而幂零 Lie 代数的任意表示并不必由幂零算子组成。这一点在下一节的三角化结论中会更加明显。

12.2 Lie 定理

严格上三角矩阵的对角线全为零, 而一般上三角矩阵允许非零特征值。相应地, 可解 Lie 代数的表示通常没有公共零向量, 却在复数域上总有公共特征向量。证明需要先说明一个理想的特征空间何时被整个 Lie 代数保持。

12.2.1 可解复 Lie 代数的共同特征向量

引理 12.2.1 (理想的特征空间). 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数, V 为有限维复向量空间, $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是表示, $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ 是理想, $\lambda: \mathfrak{a} \rightarrow \mathbb{C}$ 是线性泛函。若

$$V_\lambda = \{v \in V \mid \rho(a)v = \lambda(a)v \text{ 对所有 } a \in \mathfrak{a}\} \neq 0,$$

则 $\lambda([\mathfrak{g}, \mathfrak{a}]) = 0$, 且 V_λ 是 $\mathfrak{g}$ -子模。

证明. 省略作用符号 ρ 。固定 $x \in \mathfrak{g}$ 与非零 $v \in V_\lambda$, 设

$$W = \text{span}_{\mathbb{C}}\{v, xv, \dots, x^{m-1}v\},$$

其中 m 是首次出现线性相关时所取的维数, 所以 W 被 x 保持。对 j 归纳, 由

$$ax^jv = xax^{j-1}v + [a, x]x^{j-1}v, \quad [a, x] \in \mathfrak{a},$$

得到

$$ax^jv - \lambda(a)x^jv \in \text{span}_{\mathbb{C}}\{v, \dots, x^{j-1}v\}.$$

归纳时第二项对 $[a, x]$ 使用同一归纳断言, 恰落在上述低次空间。因此 $\mathfrak{a}$ 保持 W , 每个 $a \in \mathfrak{a}$ 在这组基下的对角元都是 $\lambda(a)$ 。特别地,

$$m \cdot \lambda([a, x]) = \operatorname{tr}_W[a, x] = 0.$$

复数域上 $m \neq 0$, 故 $\lambda([a, x]) = 0$ 。最后, 对任意 $w \in V_\lambda$ 有

$$a(xw) = x(aw) + [a, x]w = \lambda(a)xw,$$

所以 $xw \in V_\lambda$ 。 $\square$

定理 12.2.2 (Lie 定理的特征向量形式). 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维可解复 Lie 代数, $V \neq 0$ 是有限维复表示。则 V 含有一维 $\mathfrak{g}$ -子模, 即存在 $v \neq 0$ 和线性泛函 $\lambda: \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{C}$, 使 $xv = \lambda(x)v$ 对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 成立。

证明. 对 $\dim \mathfrak{g}$ 归纳。零代数时任取非零向量。非零可解代数满足 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \neq \mathfrak{g}$, 否则导出列不能终止。取交换商 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 中一个余维一子空间, 其逆像 $\mathfrak{a}$ 是余维一理想。它仍可解, 故归纳假设给出非零的 $\mathfrak{a}$ -公共特征空间 V_μ 。由引理 12.2.1, 这个空间被 $\mathfrak{g}$ 保持。

写 $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} + \mathbb{C}x$ 。由于复数域代数闭, $x|_{V_\mu}$ 有特征向量 $v \neq 0$ 。这个 v 已经是 $\mathfrak{a}$ 的公共特征向量, 因而也是 $\mathfrak{g}$ 的公共特征向量。其特征值对 x 线性, 便得到所述 λ 。 $\square$

12.2.2 表示的同时上三角化

Lie 定理 (Lie's theorem) 通常表述为下面的形式。

定理 12.2.3 (Lie 三角化定理). 有限维可解复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的任意有限维复表示 $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 都可同时上三角化。等价地, V 有一条每个相邻商都为一维的 $\mathfrak{g}$ -子模旗标。

证明. 定理 12.2.2 给出一维子模 V_1 。在 V/V_1 上再用同一定理, 并提升所得旗标。对 $\dim V$ 归纳即得完全旗标。选取与之适应的基后, 全部作用矩阵均上三角。 $\square$

命题 12.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维可解复 Lie 代数, V 为有限维复向量空间, $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是表示。则 $\rho([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}])$ 中的每个算子幂零, 而且

$$\operatorname{tr}(\rho(x)\rho(y)) = 0 \quad (x \in \mathfrak{g}, y \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]).$$

此外, $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 本身是幂零 Lie 代数, $\mathfrak{g}$ 的每个非零不可约有限维复表示都是一维的。

证明. 在定理 12.2.3 给出的基下, 上三角矩阵的交换子对角元全为零, 所以 $\rho(y)$ 严格上三角, $\rho(x)\rho(y)$ 也严格上三角。前两个结论随之成立。取 $\rho = \operatorname{ad}_{\mathfrak{g}}$, 再限制到不变子空间 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, 由定理 12.1.3 得到导出代数幂零。最后, 不可约表示中的一维不变子空间只能是整个空间。 $\square$

三角化不等于对角化。令一维交换 Lie 代数的生成元作用为非零 Jordan 幂零块, 就得到不可分解而非不可约的表示; 它的完全旗标存在, 但通常没有不变直和补。

12.2.3 特征零与代数闭假设的作用

例 12.2.5. 实一维交换 Lie 代数 $\mathbb{R}x$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上作用为

$$\rho(x) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

特征多项式 $T^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 中没有根, 因此不存在实不变直线。复化后则分成特征值 i 、 $-i$ 对应的两条直线。

例 12.2.6. 设 k 的特征为素数 p , $V = k[t]/(t^p)$ 。乘以 t 的算子记为 T , 形式求导记为 D ; 因 $D(t^p) = 0$, 求导在商空间上良定义, 且

$$[D, T] = I, \quad [D, I] = [T, I] = 0.$$

故 $L = \text{span}_k\{D, T, I\}$ 是可解 Lie 代数, 甚至其导出代数 kI 位于中心。然而 D, T 不可能有公共特征向量: 若 $Dv = av$ 、 $Tv = bv$, 则 $[D, T]v = (ab - ba)v = 0$, 与 $[D, T]v = v \neq 0$ 矛盾。

第二个例子还说明: 幂零 Lie 代数的表示在正特征下也未必可三角化。这里的 I 不是幂零算子, 因此不满足 Engel 定理的假设。Lie 定理的证明利用引理 12.2.1 中的 $m \cdot \lambda([a, x]) = 0 \Rightarrow \lambda([a, x]) = 0$ 排除这种现象, 而这一步需要特征零。

12.3 根与结构

可解性和幂零性也可以用来研究 Lie 代数的理想。我们将证明最大可解理想和最大幂零理想都存在, 并研究相应的商。本节的“根”指 radical, 与后面 Cartan 子代数上的根泛函不同。

12.3.1 可解根与幂零根

命题 12.3.1. 有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有唯一的最大可解理想 $\mathfrak{r}$, 也有唯一的最大幂零理想 $\mathfrak{n}$, 并且 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{r}$ 。

证明. 若 I, J 都是可解理想, 则 $(I+J)/I \cong J/(I \cap J)$ 可解。命题 11.4.5 因而说明 $I+J$ 可解。有限维性保证全部可解理想的和已经是其中有限多个的和, 故这个和就是最大可解理想。

若 I 是幂零理想, $x \in I$, 则 $\text{ad } x$ 首先把 $\mathfrak{g}$ 送入 I , 此后的迭代沿 I 的下降中心列继续下降。因此 $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 幂零。现在令 I, J 都幂零; 它们可解, 故 $I+J$ 可解。对 $I+J$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随表示应用定理 12.2.3。在同一组上三角基下, 来自 I 或 J 的矩阵由于幂零而对角元全为零, 它们的和也严格上三角。于是每个 $x \in I+J$ 的伴随算子幂零, 定理 12.1.3 说明 $I+J$ 幂零。再次利用有限维性取有限和, 便得到最大幂零理想。幂零蕴含可解, 所以它包含于 $\mathfrak{r}$ 。□

定义 12.3.2. 有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的最大可解理想称为它的**可解根** (solvable radical), 记作 $\text{rad } \mathfrak{g}$; 最大幂零理想称为它的**幂零根** (nilradical), 记作 $\text{nilrad } \mathfrak{g}$ 。

例 12.3.3. 设 $\mathfrak{b}_n$ 是复上三角矩阵 Lie 代数, $\mathfrak{n}_n$ 是严格上三角矩阵理想。则

$$\operatorname{rad} \mathfrak{b}_n = \mathfrak{b}_n, \quad \operatorname{nilrad} \mathfrak{b}_n = \mathbb{C}I + \mathfrak{n}_n.$$

第一个等式由 $[\mathfrak{b}_n, \mathfrak{b}_n] \subseteq \mathfrak{n}_n$ 和后者幂零得到。第二个等式右端确实幂零。若一个幂零理想含有对角元为 $a_1, \dots, a_n$ 的矩阵 x , 则 $\operatorname{ad}_{\mathfrak{b}_n} x$ 必幂零; 在按对角线上方距离排列的基下, 它在 E_{ij} 位置的对角元为 $a_i - a_j$ 。所以所有 a_i 相等, $x \in \mathbb{C}I + \mathfrak{n}_n$ 。

标量矩阵本身并不幂零, 却属于这里的幂零根。幂零理想指它作为 Lie 代数的下降中心列终止, 不能误解成它在某个给定矩阵实现中只含幂零矩阵。

12.3.2 根的特征性

命题 12.3.4. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数。其可解根与幂零根均被每个 Lie 代数自同构保持, 也被每个导子保持。

证明. 自同构把可解理想送到可解理想, 把幂零理想送到幂零理想。最大性给出包含关系, 对逆自同构再用一次便得相等。

对导子 D , 考虑有限维复空间上的矩阵指数 $e^{tD} = \sum_{m \geq 0} t^m D^m / m!$ 。矩阵级数绝对收敛; 反复使用导子公式得到

$$D^m[x, y] = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} [D^j x, D^{m-j} y],$$

从而 $e^{tD}[x, y] = [e^{tD}x, e^{tD}y]$, 其逆为 e^{-tD} 。因此 e^{tD} 保持这两个根。若 R 表示其中任意一个, 商映射 $q: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/R$ 对每个 $x \in R$ 满足 $q(e^{tD}x) = 0$ 。比较这个收敛幂级数的一次项, 得到 $q(Dx) = 0$, 即 $D(R) \subseteq R$ 。□

通常把被所有自同构保持的理想称为**特征理想** (characteristic ideal)。某些 Lie 代数文献直接用“被所有导子保持”作为该词的定义; 上面的结果同时满足这两种要求, 因此这里不会出现约定差异。

命题 12.3.5. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数, $\mathfrak{r} = \operatorname{rad} \mathfrak{g}$, $\mathfrak{n} = \operatorname{nilrad} \mathfrak{g}$ 。则

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}] \subseteq \mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{r}.$$

证明. 对 $\mathfrak{r}$ 在 $V = \mathfrak{g}$ 上的伴随表示使用定理 12.2.2, 得到非零公共特征空间 V_λ 。由于 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想, 引理 12.2.1 说明 V_λ 被 $\mathfrak{g}$ 保持, 且 $\lambda([\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]) = 0$ 。对商 V/V_λ 重复这个过程, 得到有限的 $\mathfrak{g}$ -子模滤过, 使 $\mathfrak{r}$ 在每个相邻商上按某个线性泛函作标量作用, 而 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 在每个相邻商上作用为零。

所以每个 $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 的伴随算子沿此滤过严格下降, 因而幂零。Jacobi 恒等式说明 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 是理想, 再用定理 12.1.3 及幂零根的最大性即可。□

12.3.3 可解根的商与半单性

命题 12.3.6. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数, $\mathfrak{r} = \operatorname{rad} \mathfrak{g}$ 。则 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 半单。更一般地, 对任意可解理想 I , 有

$$\operatorname{rad}(\mathfrak{g}/I) = \mathfrak{r}/I.$$

证明. 因 $I \subseteq \mathfrak{r}$, 右端是商中的可解理想. 商中的任意可解理想 J/I 的逆像 J 是 $\mathfrak{g}$ 的理想, 且它是可解 Lie 代数 J/I 对可解理想 I 的扩张. 由命题 11.4.5, J 可解, 所以 $J \subseteq \mathfrak{r}$. 这就证明等式. 取 $I = \mathfrak{r}$, 商中没有非零可解理想, 正是半单性的定义. $\square$

这条命题只构造了半单商, 并未在 $\mathfrak{g}$ 内构造同构于该商的子代数. 向量空间上的补总能选择, 但它未必对 Lie 括号封闭. 下一节讨论的 Levi 分解正是解决这个额外问题.

12.4* Levi 分解

本节说明一般有限维复 Lie 代数怎样由可解部分和半单部分组合而成. Levi 分解的一般存在性与共轭性的完整证明见第 20.3 节, 那里将用到半单表示论与 Lie 代数上同调中的消失定理.

12.4.1 半单子代数与可解根的半直积分解

定义 12.4.1. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数, $\mathfrak{r} = \text{rad } \mathfrak{g}$. 若子代数 $\mathfrak{s} \subseteq \mathfrak{g}$ 满足

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{r} \oplus \mathfrak{s} \quad \text{作为向量空间,}$$

则 $\mathfrak{s}$ 称为一个 **Levi 子代数** (Levi subalgebra). 此时商映射限制为 $\mathfrak{s} \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$, 所以 $\mathfrak{s}$ 自动半单.

写元素为 $(a, x) \in \mathfrak{r} \oplus \mathfrak{s}$, 括号为

$$[(a, x), (b, y)] = ([a, b] + [x, b] - [y, a], [x, y]).$$

这里 $\mathfrak{s}$ 通过导子作用于 $\mathfrak{r}$, 一般并不与它交换. 这样的分解写成 $\mathfrak{g} = \mathfrak{r} \rtimes \mathfrak{s}$, 称为 **Levi 分解** (Levi decomposition).

例 12.4.2. 设 $n \geq 2$. 仿射矩阵 Lie 代数

$$\mathfrak{a}_n = \left\{ \begin{pmatrix} A & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid A \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C}), v \in \mathbb{C}^n \right\}$$

有一个候选可解理想, 由 $A = tI$ 的矩阵组成; 它是 $\mathbb{C}^n \rtimes \mathbb{C}I$. 候选补为 $v = 0, \text{tr } A = 0$ 的子代数 $\mathfrak{sl}_n$. 在命题 13.4.3 证明 $\mathfrak{sl}_n$ 简单后, 商的半单性说明候选理想确为可解根, 从而这里确为 Levi 分解.

12.4.2 Levi 分解与共轭性范围

一般结论称为 **Levi-Malcev 定理** (Levi-Malcev theorem).¹

定理 12.4.3 (Levi-Malcev 定理). 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数, $\mathfrak{r} = \text{rad } \mathfrak{g}$. 则 $\mathfrak{g}$ 存在 Levi 子代数. 任意两个 Levi 子代数都可由形如 $\exp(\text{ad } z)$ 、 $z \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 的内自同构的有限乘积互相变换.

¹马尔采夫 (Анатолий Иванович Мальцев, 1909-1967), 苏联数学家, 研究 Lie 代数、群论及模型论; 他证明了此分解中半单补的共轭性.

这里准确限定了所用的共轭变换。命题 12.3.5 说明 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}] \subseteq \text{nilrad } \mathfrak{g}$, 所以每个这样的 $\text{ad } z$ 都幂零, 指数实际是有限多项式。有限乘积这一表述足以说明 Levi 子代数在内部变换下的唯一性; 它不是说两个补作为子空间必定相等, 也不是说任意向量空间补都能变成子代数。

下面计算交换核时的分裂障碍与共轭修正。一般可解核还需沿其中的交换理想逐层归纳。

12.4.3 Levi 分解的上同调证明

命题 12.4.4 (交换核扩张的障碍). 设

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \mathfrak{e} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{s} \longrightarrow 0$$

是有限维复 Lie 代数的正合列, 且 $[M, M] = 0$ 。取线性截面 $s: \mathfrak{s} \rightarrow \mathfrak{e}$, 定义

$$x \cdot m = [s(x), m], \quad c(x, y) = [s(x), s(y)] - s([x, y]).$$

则前式给出与截面无关的 $\mathfrak{s}$ -模结构, 后式取值于 M , 并满足

$$\begin{aligned} 0 &= x \cdot c(y, z) - y \cdot c(x, z) + z \cdot c(x, y) \\ &\quad - c([x, y], z) + c([x, z], y) - c([y, z], x). \end{aligned}$$

截面 s 是 Lie 同态当且仅当 $c = 0$ 。若改用 $s' = s + b$, 其中 $b: \mathfrak{s} \rightarrow M$ 线性, 则

$$c'(x, y) = c(x, y) + x \cdot b(y) - y \cdot b(x) - b([x, y]).$$

证明. 两截面的差取值于 M , 而 M 交换, 故作用不随截面改变。Jacobi 恒等式给出

$$x \cdot (y \cdot m) - y \cdot (x \cdot m) = [[s(x), s(y)], m] = [s([x, y]), m] = [x, y] \cdot m;$$

差项 $c(x, y) \in M$ 与 m 的括号为零。于是确有模结构。

把 $[s(x), s(y)] = s([x, y]) + c(x, y)$ 代入三个提升元素的 Jacobi 恒等式。取值在 $s(\mathfrak{s})$ 的三项由 $\mathfrak{s}$ 的 Jacobi 恒等式相消; 剩余六项按反对称性整理, 恰为陈述中的等式。最后直接展开 $[s(x) + b(x), s(y) + b(y)] - (s + b)([x, y])$, 并用 $[M, M] = 0$, 便得截面变换公式。□

这个三变量恒等式说 c 是 Lie 代数上同调的 2-余圈, 改换截面加上的是一个 2-余边。定理 20.3.6 将证明: 有限维复半单 $\mathfrak{s}$ 与有限维 $\mathfrak{s}$ -模 M 满足 $H^2(\mathfrak{s}, M) = 0$ 。取得这一消失结论后, 就能选 b 把 c 消去, 得到交换核扩张的分裂。一般存在性还需沿可解根中的交换理想逐步归纳, 完整论证见定理 20.3.7 的存在性证明; 当前的交换核计算只是其中一步。

共轭性对应另一个低阶问题。已分裂的交换核扩张中, 两个补可写成 $x \mapsto s(x)$ 与 $x \mapsto s(x) + b(x)$ 。后者封闭为子代数的条件是

$$b([x, y]) = x \cdot b(y) - y \cdot b(x).$$

定理 20.3.4 中的 $H^1(\mathfrak{s}, M) = 0$ 会给出 $b(x) = x \cdot m$ 。由于 $(\operatorname{ad} m)^2 = 0$, 有

$$\exp(-\operatorname{ad} m)s(x) = s(x) + x \cdot m.$$

因此这个特殊情形中的共轭变换可以直接看见。一般可解核的共轭性在定理 20.3.7 中沿同一个交换理想归纳证明; 那里还说明如何将共轭元选在 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{t}]$ 内, 不能只凭当前的一次修正推出一一般结论。

本章小结

Engel 定理把逐个算子的幂零性提升为共同的严格下降旗标。它的关键是: 真子代数的正规化子比自身大, 这使极大真子代数成为余维一理想。Lie 定理则利用特征空间上的迹, 证明理想的公共特征空间被整个 Lie 代数保持; 代数闭性保证能再选一个特征向量, 特征零保证迹计算中的维数可以约去。

可解根与幂零根是最大理想, 不能分别理解成所有可解子代数的并或所有幂零矩阵的集合。对有限维复 Lie 代数, 有 $[\mathfrak{g}, \operatorname{rad} \mathfrak{g}] \subseteq \operatorname{nilrad} \mathfrak{g}$ 。商去可解根得到半单 Lie 代数, 但寻找内部的半单补仍是另一个问题。

Levi 分解把这个问题写成扩张的分裂。对交换核, 截面的括号缺陷是一个 2-余圈, 换截面改变一个 2-余边; 补之间的差对应 1-余圈。一般存在性与共轭性的证明还需要半单表示论和上同调消失结论。

习题

习题 12.1. 在 $M_2(\mathbb{C})$ 中取 $A = E_{12}$ 、 $B = E_{21}$ 。计算 $A + B$ 及 $[A, B]$ 的平方, 并解释为什么“一组生成元都是幂零矩阵”不能替代 Engel 定理的假设。

解. 有 $(A + B)^2 = I$, 且 $[A, B] = \operatorname{diag}(1, -1)$, 故 $[A, B]^2 = I$ 。虽然 $A^2 = B^2 = 0$, 它们生成的 Lie 代数包含非幂零矩阵。Engel 定理要求 Lie 代数的每个元素都是幂零算子, 包括线性组合和括号产生的元素。□

习题 12.2. 设 $\mathfrak{n}_n$ 是域 k 上的严格上三角矩阵 Lie 代数, $n \geq 2$ 。证明其幂零类恰为 $n-1$ 。

解. 记 F^r 为只在 $j-i \geq r$ 处可能非零的矩阵空间。矩阵乘法给出 $[F^r, F^s] \subseteq F^{r+s}$, 所以 $\gamma_r \mathfrak{n}_n \subseteq F^r$, 特别 $\gamma_n \mathfrak{n}_n = 0$ 。另一方面,

$$\left[E_{12}, [E_{23}, \dots, [E_{n-2, n-1}, E_{n-1, n}] \dots] \right] = E_{1n} \neq 0.$$

当 $n = 2$ 时直接取 $E_{12} \neq 0$ 。因此 $\gamma_{n-1} \mathfrak{n}_n \neq 0$, 幂零类恰为 $n-1$ 。□

习题 12.3. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维幂零 Lie 代数, $\mathfrak{h} \subsetneq \mathfrak{g}$ 是子代数。证明 $N_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$ 严格包含 $\mathfrak{h}$, 并推出极大真子代数是余维一理想。

解. $\mathfrak{h}$ 通过伴随作用在非零空间 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上作用; 因 $\mathfrak{g}$ 幂零, 每个作用算子幂零。由定理 12.1.2 有非零陪集 $x + \mathfrak{h}$ 被 $\mathfrak{h}$ 零化, 故 $x \notin \mathfrak{h}$ 且 $[x, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$, 得到严格包含。若 $\mathfrak{h}$ 极大, 正规化子只能是 $\mathfrak{g}$, 故它为理想。商若维数大于一, 其中任意直线的逆像都是严格介于二者的子代数, 矛盾。□

习题 12.4. 设 $\mathfrak{g}$ 是任意域上的有限维幂零 Lie 代数, $I \neq 0$ 是理想. 证明 $I \cap Z(\mathfrak{g}) \neq 0$. 这个断言对任意非零子代数是否成立?

解. 伴随作用限制到 I 后仍逐元素幂零. 定理 12.1.2 给出非零 $v \in I$, 满足 $[\mathfrak{g}, v] = 0$, 故 $v \in I \cap Z(\mathfrak{g})$. 对子代数不成立: 三维 Heisenberg 代数 $[x, y] = z$ 中, $\mathbb{C}x$ 是非零子代数, 却与中心 $\mathbb{C}z$ 交为零. $\square$

习题 12.5. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维可解复 Lie 代数. 说明其不可约有限维表示由 $(\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}])^*$ 中的线性泛函参数化. 对 $[h, e] = e$ 的二维代数具体写出这些表示.

解. Lie 定理保证不可约表示只有一维. 一维作用 $x \mapsto \lambda(x)$ 是 Lie 表示, 当且仅当 $\lambda([x, y]) = 0$, 因为标量交换子为零; 这等价于 λ 经交换化商分解. 一维表示之间的非零同构不会改变标量, 故不同泛函给出不同类型. 二维例子的导出代数 $\mathbb{C}e$, 因此 h 可作用为任意 $a \in \mathbb{C}$, 而 e 必作用为零. $\square$

习题 12.6. 设复矩阵 $H, E \in M_2(\mathbb{C})$ 满足 $[H, E] = E$ 且 $E \neq 0$. 证明它们可同时换基为

$$H = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a-1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这个表示有不变直线的直和分解吗?

解. 它们构成二维可解代数的表示, 而 E 来自导出代数, 由命题 12.2.4 幂零. 非零二阶幂零矩阵可换基为 E_{12} . 写一般 H , 由 $[H, E_{12}] = E_{12}$ 比较四项, 得到 $H = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a-1 \end{pmatrix}$. 以 $I + tE_{12}$ 共轭保持 E_{12} , 并把 H 的右上角改为 $b-t$, 取 $t=b$ 即得所述形式. 唯一被 E 保持且作为其特征空间的直线是 $\mathbb{C}e_1$; 任何一维不变子模必须被幂零 E 零化, 因此也只能是这条直线. 所以不存在两个不变直线的直和分解. $\square$

习题 12.7. 令一维复交换 Lie 代数的生成元在 $\mathbb{C}^3$ 上作用为一个大小 3 的 Jordan 块 $J_3(a)$. 证明该表示不可分解, 并写出它的完全不变旗标.

解. 取标准上三角 Jordan 块, 旗标为 $0 \subset \mathbb{C}e_1 \subset \mathbb{C}e_1 + \mathbb{C}e_2 \subset \mathbb{C}^3$. 若表示分成两个非零不变直和项, 则 $J_3(a) - aI$ 在每个非零直和项上的限制都是幂零算子, 因而每个限制都至少有一维核. 全空间的核将至少二维, 但 $J_3(a) - aI$ 的核恰为 $\mathbb{C}e_1$, 矛盾. $\square$

习题 12.8. 设 k 代数闭, $\text{char } k = p > 0$, $\mathfrak{g}$ 是有限维可解 k -Lie 代数, $0 < \dim V < p$. 证明 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示仍可同时上三角化.

解. 重作引理 12.2.1 的证明, 其中出现的整数 m 满足 $1 \leq m \leq \dim V < p$, 所以在 k 中非零, 仍能由 $m \cdot \lambda([a, x]) = 0$ 推出 $\lambda([a, x]) = 0$. 其余步骤仅使用代数闭性、理想与维数归纳, 都对 k 有效. 对 $\mathfrak{g}$ 的维数归纳先得到共同特征向量, 再对表示空间的商归纳; 各商的维数仍小于 p , 故得到完整旗标. 此题是对经典小维数变式的展开, 参见 [8, Section 4, Exercise 2, p. 20]. $\square$

习题 12.9. 在例 12.2.6 的 $k[t]/(t^p)$ 上, 证明由 D, T 给出的表示不可约.

解. 设 $0 \neq W \subseteq V$ 同时被 D, T 保持, 取非零多项式 $f = a_r t^r + \cdots + a_0 \in W$, 其中 $r < p, a_r \neq 0$. 则 $D^r f = r! a_r \neq 0$, 故 $1 \in W$. 反复应用 T 得 $1, t, \dots, t^{p-1} \in W$, 所以 $W = V$. 这是可解 Lie 代数在正特征下出现高维不可约表示的具体例子. $\square$

习题 12.10. 实一维交换 Lie 代数在 $\mathbb{R}^2$ 上由旋转矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 作用。证明实表示不可约，而其复化可约；写出复化的两个特征向量。

解. 实二维空间若有非零真子模，只能是一条实不变直线，从而给出实特征值，但特征多项式为 $T^2 + 1$ ，不可能。复化后 $(1, -i)^T$ 与 $(1, i)^T$ 分别对应 i 、 $-i$ ，两条特征直线的直和为整个复化空间。□

习题 12.11. 令 $\mathfrak{b}_n^0$ 为复迹零上三角矩阵代数， $n \geq 2$ 。计算其可解根、幂零根和中心，并与 $\mathfrak{b}_n$ 比较。

解. $\mathfrak{b}_n^0$ 可解，所以可解根是自身。若 x 属于幂零理想，则 $\text{ad } x$ 幂零，沿与正文相同的矩阵单位滤过可得其对角元两两相等。迹零且特征零迫使这些对角元全为零。因此幂零根为 $\mathfrak{n}_n$ 。中心元先与全部迹零对角矩阵交换，迫使其为对角矩阵，再与所有 E_{ij} 交换，迫使其为标量；迹零使其为零。相比之下， $\mathfrak{b}_n$ 的中心为 $\mathbb{C}I$ ，幂零根为 $\mathbb{C}I + \mathfrak{n}_n$ 。□

习题 12.12. 设 V 是非零有限维复空间， $A \in \text{End}(V)$ ，在 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}h \oplus V$ 上规定 $[h, v] = Av$ ， $[V, V] = 0$ 。计算可解根与幂零根，区分 A 幂零和 A 非幂零两种情形。

解. 导出代数 $AV \subseteq V$ ，第二导出代数 $AV^2 \subseteq V^2$ ，故可解根总是整个 $\mathfrak{g}$ 。下降中心列从第二项起为 $\gamma_m \mathfrak{g} = A^{m-1}V$ ，故 A 幂零时 $\mathfrak{g}$ 幂零，幂零根也是自身。若 A 非幂零，则它在复数域上至少有一个非零特征值。对 $x = ah + v$ ， $\text{ad } x|_V = aA$ ；若 $a \neq 0$ ，这不是幂零算子，故 x 不能属于任何幂零理想。另一方面 V 是交换理想，所以幂零根恰为 V 。□

习题 12.13. 给出一个有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 及理想 I ，使

$$\text{nilrad } \mathfrak{g} \text{ 在 } \mathfrak{g}/I \text{ 中的像 } \neq \text{nilrad}(\mathfrak{g}/I).$$

解. 取 $[h, e] = e$ 的二维代数及 $I = \mathbb{C}e$ 。由伴随作用，幂零根恰为 $\mathbb{C}e$ ，在商中的像为零。但商是一维交换代数，幂零根是整个非零商。商去理想可以消去阻碍幂零性的作用，因此不能照搬可解理想商中的可解根公式。□

习题 12.14. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数，证明 $Z(\mathfrak{g}) \subseteq \text{nilrad } \mathfrak{g}$ 。再说明可解根为零与幂零根为零等价。

解. 中心是交换理想，所以包含于最大幂零理想。若可解根为零，幂零根当然为零。反之，若可解根 $R \neq 0$ ，它的导出列最后一个非零项是非零交换理想，因此包含于幂零根，矛盾。这里的最后一个导出项也是 $\mathfrak{g}$ 的理想，因为导子保持括号生成的每个导出项。□

习题 12.15. 对 $[h, e] = e$ 的二维复代数求出全部导子，直接检查它们保持幂零根，并判断是否全为内导子。

解. 写 $D(h) = ah + be$ 、 $D(e) = ch + de$ 。导子等式给出

$$ch + de = D([h, e]) = [D(h), e] + [h, D(e)] = (a + d)e.$$

因此 $c = a = 0$ ，而 b, d 任意。它们确实保持幂零根 $\mathbb{C}e$ 。又 $\text{ad}(dh - be)(h) = be$ 、 $\text{ad}(dh - be)(e) = de$ ，所以每个导子都为内导子。这个可解例子也提醒：内导子全体等于导子全体，并不单独推出半单性。□

习题 12.16. 设 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 是有限维复 Lie 代数同态。证明 $f(\text{rad } \mathfrak{g})$ 包含于 $\text{rad}(f(\mathfrak{g}))$ 。若 f 不满射，它一定包含于 $\text{rad } \mathfrak{h}$ 吗？

解. 像 $f(\text{rad } \mathfrak{g})$ 是 $f(\mathfrak{g})$ 的可解理想，所以包含于后者的可解根。非满射时不能把像代数换成整个余域：取迹零上三角代数嵌入 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 。前者可解且非零，而后者为单 Lie 代数，这可以在此直接检验。伴随算子 $\text{ad } h$ 在 e, h, f 上分别有特征值 $2, 0, -2$ ；对非零理想中的非零元素，用这三个特征值的插值多项式投影，即可得到其中至少一个基向量。再以 $[e, f] = h, [h, e] = 2e, [h, f] = -2f$ 取括号，便得到全部三个基向量。所以没有非零真理想；由命题 11.4.6，它半单，其可解根为零。□

习题 12.17*. 令 $\mathfrak{e}$ 为 $[x, y] = z$ 的三维复 Heisenberg 代数，核 $M = \mathbb{C}z$ ，商 $\mathfrak{s} = \mathfrak{e}/M$ 。对线性截面计算命题 12.4.4 中的 c ，证明这个扩张不分裂，并说明为什么不与 Levi 定理矛盾。

解. 取 $s(\bar{x}) = x, s(\bar{y}) = y$ ，则 $c(\bar{x}, \bar{y}) = z \neq 0$ 。核为中心，商交换，所以作用为零，而任意截面修正 b 的余边 $x \cdot b(y) - y \cdot b(x) - b([x, y])$ 都为零。因此没有截面能够消去 c ，扩张不分裂。商 $\mathfrak{s}$ 是非零交换代数，不是半单代数，故 Whitehead 消失及 Levi 分裂结论都不适用于这里。□

习题 12.18*. 设 $\mathfrak{s}$ 是复 Lie 代数， M 是其有限维模，令 $\mathfrak{e} = M \rtimes \mathfrak{s}$ ，其中 M 的括号为零。证明线性映射 $b: \mathfrak{s} \rightarrow M$ 的图是子代数，当且仅当 $b([x, y]) = x \cdot b(y) - y \cdot b(x)$ 。若 $b(x) = x \cdot m$ ，写出把标准补送到这个图的内自同构。

解. 图中两元素的括号为

$$[(b(x), x), (b(y), y)] = (x \cdot b(y) - y \cdot b(x), [x, y]).$$

它属于图，当且仅当前一分为 $b([x, y])$ 。若 $b(x) = x \cdot m$ ，则

$$\exp(-\text{ad}(m, 0))(0, x) = (0, x) - [(m, 0), (0, x)] = (x \cdot m, x).$$

因为 $\text{ad}(m, 0)$ 把全空间送入交换理想 M 并在 M 上为零，它的平方为零，指数没有更高项。□

习题 12.19*. 设 D 是有限维复 Lie 代数上的幂零导子。证明有限和 $\exp D$ 是 Lie 代数自同构，并说明这里并不需要 D 是内导子。

解. 设 $D^r = 0$ 。反复用导子等式得

$$D^m[x, y] = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} [D^j x, D^{m-j} y].$$

把等式乘以 $1/m!$ 并对全部 m 求和；两侧只有有限多个非零项，故可重新排列，得到

$$\exp D([x, y]) = [\exp D(x), \exp D(y)].$$

两个关于同一算子的有限指数满足 $\exp D \exp(-D) = I$ ，所以它是自同构。证明只使用导子恒等式和幂零性，没有使用 $D = \text{ad } z$ 。□

第十三章 Killing 型与半单 Lie 代数

本章证明 Cartan 的可解性与半单性判据，由 Killing 型的非退化性分解单理想，并在经典矩阵 Lie 代数中检验这些结构。

本章目标

- 能从迹的循环性证明不变性，区分 Killing 型与其他表示迹型。
- 用谱插值将 Cartan 判据中的迹条件变为幂零性。
- 能用正交补分解半单 Lie 代数的理想，并解释具体单理想的唯一性。
- 计算经典矩阵 Lie 代数的维数和中心，证明其单性范围并解释低维例外。
- 区分 Lie 代数同构与相应 Lie 群同构，不把有限中心或覆盖问题混入线性层面的结论。

预备知识是第十一章的伴随表示和理想、第十二章的 Engel 与 Lie 定理，以及线性代数的广义特征空间、双线性型和外幂。

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，取 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。伴随作用的迹配对 $\kappa(x, y) = \text{tr}(\text{ad } x \text{ ad } y)$ 给出 $\kappa(h, h) = 8$ 、 $\kappa(e, f) = 4$ ，所以 Killing 型非退化。若只取上三角子代数 $\langle h, e \rangle$ ，其 Killing 型却在 e 方向退化。迹型如何检出可解理想，非退化性又为什么足以迫使整个 Lie 代数半单？本章从这些矩阵计算进入 Cartan 判据，随后以正交补构造半单代数的单理想分解。有关经典证明可对照 [8, Sections 4.3, 5.1–5.2, pp. 19–23]。

13.1 不变双线性型

上一章用上三角矩阵识别可解性。本章通过伴随算子的乘积取迹，构造一个双线性型。Cartan 判据将证明，在有限维复 Lie 代数中，这个型非退化恰好等价于 Lie 代数半单。

13.1.1 Killing 型

定义 13.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的有限维 Lie 代数。映射

$$\kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = \text{tr}_{\mathfrak{g}}(\text{ad } x \circ \text{ad } y), \quad x, y \in \mathfrak{g},$$

称为 $\mathfrak{g}$ 的 **Killing 型** (Killing form)。更一般地，若 V 是有限维 k 向量空间，表示 $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 给出 **迹型** (trace form) $\beta_{\rho}(x, y) = \text{tr}_V(\rho(x)\rho(y))$ 。

例 13.1.2. 对 $X, Y \in \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$,

$$\kappa_{\mathfrak{sl}_n}(X, Y) = 2n \text{tr}(XY). \quad (13.1)$$

为核验系数, 在 $M_n(\mathbb{C})$ 上记 $L_X(T) = XT$ 、 $R_Y(T) = TY$ 。矩阵单位基给出

$$\mathrm{tr}(L_A) = \mathrm{tr}(R_A) = n \mathrm{tr} A, \quad \mathrm{tr}(L_X R_Y) = \mathrm{tr} X \mathrm{tr} Y.$$

最后一式中 E_{ij} 的自身系数为 $X_{ii}Y_{jj}$, 求和即可。展开 $(L_X - R_X)(L_Y - R_Y)$, 得

$$\kappa_{\mathfrak{gl}_n}(X, Y) = 2n \mathrm{tr}(XY) - 2 \mathrm{tr} X \mathrm{tr} Y.$$

又因 $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{sl}_n \oplus \mathbb{C}I$, 伴随作用在标量直线上为零, 便得到(13.1)。特别在 $n = 2$ 时, 对标准的 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$, 有

$$\kappa(h, h) = 8, \quad \kappa(e, f) = 4, \quad \kappa(e, e) = \kappa(f, f) = \kappa(h, e) = \kappa(h, f) = 0.$$

13.1.2 不变性与根空间正交

定义 13.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的 Lie 代数, $B: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow k$ 是双线性型。若

$$B([x, y], z) = B(x, [y, z]) \quad (x, y, z \in \mathfrak{g}),$$

则 B 称为一个**不变双线性型** (invariant bilinear form)。

命题 13.1.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的有限维 Lie 代数。它的每个有限维表示的迹型均为对称不变双线性型, 因此其 Killing 型对称且不变。对任意对称不变双线性型 $B: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow k$ 和理想 $I \subseteq \mathfrak{g}$, 正交补

$$I^\perp = \{x \in \mathfrak{g} \mid B(x, I) = 0\}$$

也是理想; 特别地, 型的根 $\mathfrak{g}^\perp$ 是理想。

证明. 矩阵迹满足 $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, 并且

$$\mathrm{tr}([A, B]C) = \mathrm{tr}(A[B, C]).$$

对表示矩阵代入即得对称性与不变性。若 $u \in I^\perp$ 、 $x \in \mathfrak{g}$ 、 $y \in I$, 则

$$B([x, u], y) = -B(u, [x, y]) = 0$$

因为 $[x, y] \in I$ 。于是 $[x, u] \in I^\perp$ 。 □

命题 13.1.5. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的 Lie 代数, $B: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow k$ 是对称不变双线性型, $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 是子代数, $\alpha, \beta \in \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{h}, k)$, $x, y \in \mathfrak{g}$ 。若

$$[h, x] = \alpha(h)x, \quad [h, y] = \beta(h)y \quad (h \in \mathfrak{h})$$

且 $\alpha + \beta \neq 0$, 则 $B(x, y) = 0$ 。

证明. 不变性给出

$$0 = B([h, x], y) + B(x, [h, y]) = (\alpha(h) + \beta(h))B(x, y).$$

取使 $\alpha(h) + \beta(h) \neq 0$ 的 h , 即可除去该非零标量。 □

后面的根空间正交关系将用到这条关于共同特征向量的命题。

引理 13.1.6. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的有限维 Lie 代数, I 是理想。对 $x, y \in I$, 有

$$\kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = \kappa_I(x, y).$$

证明. 伴随算子 $\text{ad } x$ 把 $\mathfrak{g}$ 送入 I , 在 $\mathfrak{g}/I$ 上诱导零作用。将 I 的基扩充为 $\mathfrak{g}$ 的基, 算子乘积的矩阵呈分块上三角形, 商块为零, 故其全空间迹等于限制到 I 的迹。□

13.1.3 单 Lie 代数上的形式

命题 13.1.7. 设 $\mathfrak{g}$ 是非零有限维复单 Lie 代数。则每个非零对称不变双线性型均非退化; 这种型所成空间的维数至多为一。

证明. 由命题 13.1.4, 一个不变型的根是理想。非零型的根不可能是整个 $\mathfrak{g}$, 单性便迫使其根为零。

固定一个非零型 B_0 。对另一个型 B , 非退化性唯一确定线性算子 T , 满足 $B(x, y) = B_0(Tx, y)$ 。两个型的不变性说明

$$B_0(T[a, x], y) = B_0([a, Tx], y)$$

对所有 y 成立, 因而 T 与全部 $\text{ad } a$ 交换。复数域上 T 有特征值 c , 非零空间 $\ker(T - cI)$ 是伴随子模, 即 $\mathfrak{g}$ 的理想。因此它等于 $\mathfrak{g}$, $T = cI$, 于是 $B = cB_0$ 。□

这时还不能仅凭此命题宣称 Killing 型非零: 它只说明“若已有一个非零不变型, 则唯一到标量”。下一节的判据将保证复单 Lie 代数确实具有非退化 Killing 型, 从而把“至多一维”加强为“恰好一维”。

13.2 Cartan 判据

迹型给出的二次条件足以判别可解性。不过, 复数特征值的平方可能相消, 不能从 $\text{tr}(x^2) = 0$ 直接推出 $x = 0$ 。证明中将另构造一个算子, 把所用的迹写成特征值绝对值平方之和。

13.2.1 可解性的迹判据

引理 13.2.1 (谱插值). 设 V 为有限维复向量空间, $x \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$, V_{λ} 表示 x 对应于特征值 λ 的广义特征空间。按这些空间写 $x = S + N$, 其中 S 在 V_{λ} 上为 λI , N 幂零。令 $S^{\#}$ 在 V_{λ} 上为 $\bar{\lambda}I$ 。则存在复多项式 p , 满足 $p(0) = 0$, 并且

$$\text{ad } S^{\#} = p(\text{ad } x) \quad \text{在 } \text{End}_{\mathbb{C}}(V) \text{ 上.}$$

证明. 在 $\text{Hom}(V_{\mu}, V_{\lambda})$ 上, $\text{ad } x = (\lambda - \mu)I + \text{ad } N$, 其中后项幂零; 而 $\text{ad } S^{\#}$ 是标量 $\overline{\lambda - \mu}$ 。取一个对所有这些子空间都足够大的整数 r 。对有限多个不同的差值 $\delta = \lambda - \mu$, 多项式中国剩余定理给出

$$p(t) \equiv \bar{\delta} \pmod{(t - \delta)^r}.$$

当 $\delta = 0$ 时, 这要求 $p(t) \equiv 0 \pmod{t^r}$, 特别有 $p(0) = 0$ 。代入每个子空间上的算子即可; 这些 Hom 空间的直和就是全部自同态空间。□

Cartan 可解性判据 (Cartan's solvability criterion) 如下。

定理 13.2.2 (Cartan 可解性判据). 设 $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ 是有限维复向量空间 V 上的 Lie 子代数。则 L 可解, 当且仅当

$$\mathrm{tr}(xy) = 0 \quad (x \in [L, L], y \in L).$$

因而有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 可解, 当且仅当 $\kappa_{\mathfrak{g}}([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], \mathfrak{g}) = 0$ 。

证明. 若 L 可解, 命题 12.2.4 已经证明迹条件。

反之, 固定 $x \in [L, L]$, 采用引理 13.2.1 的 $S^{\#}$ 。因为 $\mathrm{ad} x$ 把 L 送入理想 $[L, L]$, 而 p 没有常数项, 所以

$$[S^{\#}, L] = p(\mathrm{ad} x)(L) \subseteq [L, L].$$

把 x 写成有限和 $\sum_j [a_j, b_j]$, 其中 $a_j, b_j \in L$ 。迹的循环性和假设给出

$$\mathrm{tr}(S^{\#}x) = \sum_j \mathrm{tr}([S^{\#}, a_j]b_j) = 0.$$

另一方面, 在 x 的 Jordan 基下,

$$\mathrm{tr}(S^{\#}x) = \sum_{\lambda} (\dim V_{\lambda}) |\lambda|^2.$$

每一项均非负, 故每个特征值都为零, x 幂零。于是 $[L, L]$ 中的每个矩阵都是幂零算子。定理 12.1.2 使其同时严格上三角化, 故它是幂零 Lie 代数, 特别可解; 所以 L 可解。

最后, 对抽象 Lie 代数取 $L = \mathrm{ad} \mathfrak{g}$, 矩阵迹条件正好是陈述中的 Killing 型条件。若该条件成立, 已经证明 L 可解, 而 $\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g}) \cong L$ 。中心交换, 由命题 11.4.5, $\mathfrak{g}$ 可解。逆向对伴随表示使用已证的必要性。□

13.2.2 半单性的非退化判据

Cartan 半单性判据 (Cartan's semisimplicity criterion) 给出一个更简洁的检验。

定理 13.2.3 (Killing 型的非退化判据). 有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 半单, 当且仅当其 Killing 型非退化。

证明. 设 $\mathfrak{g}$ 半单, 令 $R = \mathfrak{g}^{\perp}$ 为 Killing 型的根。命题 13.1.4 说明 R 是理想。引理 13.1.6 给出 $\kappa_R = \kappa_{\mathfrak{g}}|_{R \times R} = 0$, 故定理 13.2.2 说明 R 可解。半单性迫使 $R = 0$ 。

反之, 设 Killing 型非退化。若有非零可解理想 I , 其导出列的最后一个非零项 A 是非零交换理想: 各导出项均为 $\mathfrak{g}$ 的理想, 且 $[A, A] = 0$ 。对 $a \in A, x \in \mathfrak{g}$, 算子 $T = \mathrm{ad} a \mathrm{ad} x$ 把 $\mathfrak{g}$ 送入 A , 又把 A 送到零, 所以 $T^2 = 0$ 。于是 $\kappa_{\mathfrak{g}}(a, x) = \mathrm{tr} T = 0$ 。这使 A 包含于型的根, 与非退化性矛盾。因此不存在非零可解理想。□

推论 13.2.4. 非零有限维复单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的对称不变双线性型均为 Killing 型的标量倍数, 且 Killing 型非退化。

证明. 单 Lie 代数半单, 所以定理 13.2.3 保证 Killing 型非退化; 再用命题 13.1.7。□

命题 13.2.5. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数, $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是忠实有限维表示。则 $\beta_\rho(x, y) = \text{tr}(\rho(x)\rho(y))$ 非退化。

证明. 型的根 R 是理想, 且 $\text{tr}(\rho(x)\rho(y)) = 0$ 对全部 $x, y \in R$ 成立。对矩阵代数 $\rho(R)$ 用定理 13.2.2, 得 $\rho(R)$ 可解。忠实性给出 $R \cong \rho(R)$, 故 R 是可解理想, 只能为零。□

13.2.3 与 Engel 定理的关系

证明的顺序值得区分。Engel 定理先由共同零向量识别幂零性; Lie 定理随后给出可解表示的上三角形; Cartan 判据再通过谱插值把迹条件还原为 Engel 定理的假设。半单性判据用的是这条已经建立的证明链, 并未调用半单 Lie 代数表示的完全可约性。

例 13.2.6. 设 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}h + \mathbb{C}e$, $[h, e] = e$ 。相对于 h, e ,

$$\text{ad } h = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{ad } e = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\kappa]_{h,e} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它可解而 Killing 型不恒为零; 正确条件是 $\kappa([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], \mathfrak{g}) = 0$, 这里 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathbb{C}e$ 恰好等于型的根。

特征零假设同样不可漏写。以特征 3 的域为例, $\mathfrak{sl}_2$ 仍简单: $\text{ad } h$ 在 e, h, f 上的三个特征值互不相同, 任意非零理想可投影出一个基向量, 再用三条标准括号得到全部基。但若特征为 2, 这些步骤与 Killing 型公式都会退化, $\mathfrak{sl}_2$ 不再半单。因此本章判据的适用范围始终是有限维复 Lie 代数, 不能只看相同的矩阵记号就推广。

13.3 半单分解

一般表示中的不变子空间未必有不变补。伴随表示在半单情形却有一个特别直接的补: 用 Killing 型取正交补。这是半单结构分解的来源, 而非任意表示完全可约性的预先使用。

13.3.1 半单 Lie 代数分解为单理想

定理 13.3.1 (半单 Lie 代数的理想分解). 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数。则存在单理想 $\mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_r$, 使

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_r, \quad [\mathfrak{g}_i, \mathfrak{g}_j] = 0 \quad (i \neq j).$$

此外, $\mathfrak{g}$ 的每个理想都是其中若干 $\mathfrak{g}_i$ 的直和。这些单理想作为 $\mathfrak{g}$ 的子空间由 $\mathfrak{g}$ 唯一确定, 只允许改变排列顺序。

证明. 先取任意理想 I 。由命题 13.1.4, $I^\perp$ 是理想, 所以 $J = I \cap I^\perp$ 也是理想。对 $x, y \in J$, 有 $\kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = 0$, 再由引理 13.1.6 得到 $\kappa_J = 0$ 。Cartan 可解性判据说明 J 可解, 半单性迫使 $J = 0$ 。由于整个 Killing 型非退化, $\dim I^\perp = \dim \mathfrak{g} - \dim I$, 故

$$\mathfrak{g} = I \oplus I^\perp.$$

两个理想的括号同时属于二者, 因而为零。

如果 $\mathfrak{g} \neq 0$, 选一个极小非零理想 I . 它的任意自身理想都被 I 保持, 又与 $I^\perp$ 交换, 所以也是 $\mathfrak{g}$ 的理想. 极小性说明 I 没有非零真理想; 它不能交换, 否则会是可解理想. 因此 I 为单 Lie 代数. 对补 $I^\perp$ 继续此过程, 维数严格减小, 有限步便得到所述分解.

设 J 是任意理想, $x = x_1 + \cdots + x_r \in J$. 若 $x_i \neq 0$, 单 Lie 代数 $\mathfrak{g}_i$ 的中心为零, 所以 $[\mathfrak{g}_i, x_i] \neq 0$. 又因为不同分量交换,

$$[\mathfrak{g}_i, x] = [\mathfrak{g}_i, x_i] \subseteq J \cap \mathfrak{g}_i.$$

交集是 $\mathfrak{g}_i$ 的理想, 故单性迫使 $\mathfrak{g}_i \subseteq J$. 于是 x 的每个非零分量都属于已包含于 J 的单理想, 从而 J 就是这些理想的直和. 特别地, 极小非零理想恰好是所列的 $\mathfrak{g}_i$, 唯一性也随之成立. $\square$

13.3.2 理想与正交补

推论 13.3.2. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数, I 是理想. 则

$$\mathfrak{g} = I \oplus I^\perp, \quad I^\perp = Z_{\mathfrak{g}}(I), \quad \mathfrak{g}/I \cong I^\perp.$$

这里正交补取自 Killing 型, 中心化子为 $Z_{\mathfrak{g}}(I) = \{x \mid [x, I] = 0\}$. 而且 I 与 $\mathfrak{g}/I$ 都半单.

证明. 由定理 13.3.1, I 是部分单理想的和, 其余分量组成 $I^\perp$. 后者显然中心化 I ; 若一个元素在 I 分量上的投影也中心化 I , 该投影属于 $Z(I) = 0$, 所以中心化子没有更多元素. 商映射在 $I^\perp$ 上单射且满射, 给出同构. 两者都由单理想直和组成, 故半单. $\square$

推论 13.3.3. 有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 满足

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}, \quad Z(\mathfrak{g}) = 0.$$

因此其一维表示全为平凡表示.

证明. 每个非交换单理想的导出代数是 nonzero 理想, 因而等于自身; 中心是可解理想, 因而为零. 对定理 13.3.1 中的直和逐项应用即可. 一维表示的像交换, 必零化导出代数, 故零化整个 $\mathfrak{g}$. $\square$

这个正交补只针对理想. 一般子代数 $\mathfrak{h}$ 的正交补不一定是理想, $\kappa|_{\mathfrak{h}}$ 也不一定非退化; 例如 $\mathfrak{sl}_2$ 中的一维子代数 $\mathbb{C}e$ 就是各向同性的.

13.3.3 分解的唯一性

例 13.3.4. 设 $\mathfrak{s}$ 是非零复单 Lie 代数. 对角子代数

$$\Delta\mathfrak{s} = \{(x, x) \mid x \in \mathfrak{s}\} \subseteq \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{s}$$

同构于 $\mathfrak{s}$, 但不是理想. 取 $[a, x] \neq 0$, 则

$$[(a, 0), (x, x)] = ([a, x], 0) \notin \Delta\mathfrak{s}.$$

所以单子代数可以很多, 而理想分解中的单理想仍只有两个.

分解唯一性说的是具体理想的集合唯一，比仅仅列出抽象同构类型更强。自同构可以置换同构的单理想，但不可能把一个单理想送到上述对角子代数，因为自同构保持理想性。这也说明分解中出现重数时仍没有连续选择补空间的自由。

13.4 经典例子

经典矩阵 Lie 代数把上述判据变成可以直接计算的例子。维数、中心和单性可以由矩阵单位、型及伴随作用直接证明。后面的根系将解释这些计算为什么分成四个系列。

13.4.1 $\mathfrak{sl}_n$ 、 $\mathfrak{so}_n$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}$

对复向量空间，非退化对称型可选基写成单位矩阵，非退化交错型可写成标准辛矩阵。因此采用下列矩阵实现：

$$\begin{aligned}\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}) &= \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid \operatorname{tr} X = 0\}, \\ \mathfrak{so}_n(\mathbb{C}) &= \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid X^\top + X = 0\}, \\ \mathfrak{sp}_{2n}(\mathbb{C}) &= \{X \in M_{2n}(\mathbb{C}) \mid X^\top J + JX = 0\}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

换用另一个非退化型，只会得到由换基共轭而同构的 Lie 代数。

命题 13.4.1. 对整数 $n \geq 1$ ，复经典 Lie 代数 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ 、 $\mathfrak{so}_n(\mathbb{C})$ 、 $\mathfrak{sp}_{2n}(\mathbb{C})$ 的维数为

$$\dim \mathfrak{sl}_n = n^2 - 1, \quad \dim \mathfrak{so}_n = \frac{n(n-1)}{2}, \quad \dim \mathfrak{sp}_{2n} = n(2n+1).$$

相对于标准辛型， $\mathfrak{sp}_{2n}(\mathbb{C})$ 恰好由如下分块矩阵构成，其中 $A, B, C \in M_n(\mathbb{C})$ ：

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^\top \end{pmatrix}, \quad B = B^\top, \quad C = C^\top.$$

证明. 迹零是 M_n 上一个非零线性条件，所以第一式成立。反对称矩阵的对角元为零，每对 $i < j$ 留一个自由参数，得到第二式。把四个矩阵块代入 $X^\top J + JX = 0$ ，便得陈述中的块条件；自由参数数目为 $n^2 + 2 \cdot n(n+1)/2 = n(2n+1)$ 。□

13.4.2 维数、中心与单性的范围

引理 13.4.2 (提取共同权分量). 设复向量空间 W 上的有限族算子 $H_1, \dots, H_r$ 交换且可同时对角化。若子空间 $U \subseteq W$ 被它们保持，则每个 $u \in U$ 的各个共同特征空间分量仍属于 U 。

证明. 共同特征值元组只有有限多个。可选系数 c_i ，使不同元组在 $H = \sum_i c_i H_i$ 下具有不同特征值：需要排除的只是有限多个真超平面。对每个特征值 λ ，Lagrange 插值多项式

$$P_\lambda(t) = \prod_{\mu \neq \lambda} \frac{t - \mu}{\lambda - \mu}$$

给出相应投影 $P_\lambda(H)$ 。子空间 U 被 H 及其多项式保持，故被这些投影保持。□

命题 13.4.3. 在复数域上, $\mathfrak{sl}_n$ 对 $n \geq 2$ 为单 Lie 代数, $\mathfrak{sp}_{2n}$ 对 $n \geq 1$ 为单 Lie 代数, $\mathfrak{so}_n$ 对 $n = 3$ 或 $n \geq 5$ 为单 Lie 代数。因此这些范围内的中心均为零。

证明. 先考虑特殊线性 Lie 代数。令 $\mathfrak{h}$ 为迹零对角矩阵空间。对 $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n)$, 有

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}.$$

这些非零权彼此不同, 零权空间为 $\mathfrak{h}$ 。给定非零理想 I , 引理 13.4.2 说明: 若 I 的元素有非零非对角分量, 则某个 $E_{ij} \in I$; 否则 I 含有非零迹零对角矩阵 H , 其对角元不能全相等, 故 $[H, E_{ij}] \neq 0$ 也使 $E_{ij} \in I$ 。

由 $[E_{ij}, E_{ji}] = E_{ii} - E_{jj}$ 得到 $H_{ij} \in I$ 。再与 E_{ji} 括号便得 $E_{ji} \in I$ 。对 $k \neq i, j$, 与 H_{ij} 括号先给出 $E_{ik}, E_{ki}, E_{jk}, E_{kj} \in I$; 随后 $[E_{ki}, E_{il}] = E_{kl}$ 给出其余非对角单位。全部迹零对角矩阵由 $[E_{ij}, E_{ji}]$ 生成, 所以 $I = \mathfrak{sl}_n$ 。当 $n = 2$ 时没有额外的 k , 前三个矩阵已经构成一组基。

再考虑辛 Lie 代数。用 $\bar{i} = n + i$ 表示后半部指标, 记

$$\begin{aligned} H_i &= E_{ii} - E_{\bar{i}\bar{i}}, & A_{ij} &= E_{ij} - E_{\bar{j}\bar{i}}, & (i \neq j), \\ B_{ii} &= E_{i\bar{i}}, & C_{ii} &= E_{\bar{i}\bar{i}}, \\ B_{ij} &= E_{i\bar{j}} + E_{j\bar{i}}, & C_{ij} &= E_{\bar{i}\bar{j}} + E_{\bar{j}\bar{i}} & (i < j). \end{aligned}$$

这些矩阵构成一组基。相对于 $H = \sum_i t_i H_i$ 的伴随作用, 它们的权分别是 $0, t_i - t_j, 2t_i, -2t_i, t_i + t_j, -t_i - t_j$, 所有非零权空间均为一维。若非零理想 I 没有对角分量, 投影引理先给出其中一个非零权向量。它与相反权向量的括号分别为

$$[A_{ij}, A_{ji}] = H_i - H_j, \quad [B_{ij}, C_{ij}] = H_i + H_j, \quad [B_{ii}, C_{ii}] = H_i,$$

所以无论如何, I 总含有一个非零对角元 $H = \sum_i t_i H_i$ 。

选择 $t_i \neq 0$, 由 $[H, B_{ii}] = 2t_i B_{ii}$ 、 $[H, C_{ii}] = -2t_i C_{ii}$ 得 $B_{ii}, C_{ii}, H_i \in I$ 。对 $j \neq i$, 与 H_i 括号得到 $A_{ij}, A_{ji} \in I$, 再得到 $H_i - H_j$, 故所有 H_j 均在 I 中。每个非零权至少在某个 H_j 上非零, 与这个 H_j 括号便把相应基向量收入 I 。所以 $I = \mathfrak{sp}_{2n}$ 。

最后考虑正交 Lie 代数。记 $F_{ij} = E_{ij} - E_{ji}$, 其中 $i < j$ 。考虑有限群

$$D = \left\{ \text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \mid \varepsilon_i = \pm 1, \prod_i \varepsilon_i = 1 \right\}.$$

共轭作用将 F_{ij} 乘以 $\varepsilon_i \varepsilon_j$ 。每个 D 的元素都是若干“同时翻转两个坐标符号”的矩阵之积, 后者等于 $\exp(\pi F_{ij})$ 。一个 Lie 理想被 $\text{ad } F_{ij}$ 保持, 因而被其指数保持; 恒等式

$$\exp(\text{ad } A)(X) = e^A X e^{-A}$$

可由左右乘算子的交换性及指数级数相乘得到。因此任何理想都被 D 共轭保持。

对 $n = 3$ 或 $n \geq 5$, 不同二元集合 $\{i, j\}$ 给出不同特征标 $\varepsilon_i \varepsilon_j$ 。事实上, 两个这样的特征标相同, 只可能是两集合相同, 或它们的对称差为全部指标; 后一个可能性恰好发生于 $n = 4$ 的互补二元集合。若 $X = \sum_{i < j} x_{ij} F_{ij}$, 则平均算子给出

$$\frac{1}{|D|} \sum_{d=\text{diag}(\varepsilon) \in D} \varepsilon_i \varepsilon_j dX d^{-1} = x_{ij} F_{ij}.$$

不相同的两个特征标相乘为非平凡特征标, 其和为零: 取它取值为 -1 的群元素平移求和即可。于是某个非零 x_{ij} 保证理想含有 F_{ij} 。再用

$$[F_{ij}, F_{jk}] = F_{ik} \quad (i, j, k \text{ 互异})$$

以及反对称记号 $F_{ji} = -F_{ij}$, 先得到涉及 i 或 j 的全部基向量, 再得到其余的 F_{kl} 。所以非零理想等于 $\mathfrak{so}_n$ 。三类代数均非交换; 其中心作为交换理想只能为零。□

上述正交 Lie 代数的证明在 $n = 4$ 时不能分离互补二元集合; 下面将看到, $\mathfrak{so}_4$ 恰好分解为两个单理想, 中心仍为零。 $\mathfrak{so}_2$ 是一维交换代数, 中心是自身; $\mathfrak{so}_1 = \mathfrak{sl}_1 = 0$ 。

13.4.3 小秩同构与例外情形

命题 13.4.4 (小维数同构). 复数域上有 Lie 代数同构

$$\mathfrak{sp}_2 \cong \mathfrak{sl}_2 \cong \mathfrak{so}_3, \quad \mathfrak{so}_4 \cong \mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2, \quad \mathfrak{sp}_4 \cong \mathfrak{so}_5, \quad \mathfrak{sl}_4 \cong \mathfrak{so}_6.$$

证明. 二维辛矩阵的块条件恰好是迹零, 故 $\mathfrak{sp}_2 = \mathfrak{sl}_2$ 在标准基下直接相等。 $\mathfrak{sl}_2$ 的伴随表示保持非退化对称 Killing 型; 其核是零中心。因此它给出单射 $\mathfrak{sl}_2 \rightarrow \mathfrak{so}(\mathfrak{sl}_2, \kappa)$, 两边维数均为 3, 便得到与 $\mathfrak{so}_3$ 的同构。

设 U, W 都是带非退化交错型的二维复空间。两个交错型的张量积是 $U \otimes W$ 上的非退化对称型, 且

$$(A, B) \mapsto A \otimes I + I \otimes B$$

把 $\mathfrak{sl}(U) \oplus \mathfrak{sl}(W)$ 映入相应的四维正交代数。若像为零, 对第二因子取部分迹得 $2A = 0$, 对第一因子取部分迹得 $2B = 0$, 所以映射单射。两边维数为 6, 故得到 $\mathfrak{so}_4$ 的分解。

在四维复空间 V 上选定非零体积元 $\text{vol} \in \bigwedge^4 V$, 以

$$B(u, v) \text{vol} = u \wedge v, \quad u, v \in \bigwedge^2 V$$

定义六维空间上的对称型。互补指标的楔积基两两配对, 说明它非退化。迹零算子在最高外幂上作用为零, 所以 $\mathfrak{sl}(V)$ 保持 B 。这个表示非零, 例如 $\text{diag}(1, 0, -1, 0)$ 在 $e_1 \wedge e_2$ 上非零。由命题 13.4.3, 单 Lie 代数 $\mathfrak{sl}_4$ 的非零表示核为零, 故得到单射 $\mathfrak{sl}_4 \rightarrow \mathfrak{so}_6$ 。两边均为 15 维, 因而同构。

最后令四维 V 带辛型, 并取辛基 e_1, e_2, f_1, f_2 。在上述六维空间中, 逆辛型对应的二向量 $\Omega = e_1 \wedge f_1 + e_2 \wedge f_2$ 被 $\mathfrak{sp}_4$ 零化。这个事实也可直接把辛矩阵块代入外幂作用检验。因 $\Omega \wedge \Omega \neq 0$, 直线 $\mathbb{C}\Omega$ 对 B 非退化, 其正交补 $W = \Omega^\perp$ 是五维非退化不变子空间。作用于 W 的表示非零: $e_1 \wedge e_2 \in W$, 而 H_1 在其上作用为 1。辛代数的单性使这表示单射; 源与 $\mathfrak{so}(W, B|_W)$ 均为 10 维, 所以得到最后一个同构。□

这些同构是 Lie 代数层面的同构。相应矩阵群还可能相差有限中心或覆盖, 不能把本命题直接改写成同名群的同构。后续讨论自旋群和代数群时, 会进一步区分这两种结论。

本章小结

迹型的不变性来自矩阵迹的循环性。Cartan 可解性判据进一步说明, 当导出代数与整个代数在迹型下正交时, 导出代数的每个算子都幂零。证明中引入共轭特征值构造, 排除了复数平方相消的可能, 再由 Engel 定理完成推导。

Killing 型非退化与半单性等价。理想的正交补因此成为可计算的理想直和补, 所有单分量以及所有理想都被确定。这个分解针对伴随表示, 不能在未证明 Weyl 定理之前推广成任意表示的完全可约性。

经典矩阵族的单性已由矩阵作用直接证明: 特殊线性与辛情形用对角伴随作用提取权分量, 正交情形用偶数次符号翻转提取反对称矩阵单位。 $\mathfrak{so}_4$ 的例外对应两个单理想, 其他小维数同构则由伴随表示、张量积和外幂构造实现。根系理论将把这些矩阵现象组织成统一的分类语言。

习题

习题 13.1. 在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中, 求 Killing 型相对于 $h, e+f, e-f$ 的矩阵。由此判断 $\mathbb{C}(e+f)$ 和 $\mathbb{C}e$ 上的限制是否退化。

解. 由 $\kappa(h, h) = 8, \kappa(e, f) = 4$, 新基下的矩阵为 $\text{diag}(8, 8, -8)$, 所有不同基向量的配对为零。因此 $\mathbb{C}(e+f)$ 上的限制非退化, 而 $\kappa(e, e) = 0$ 使 $\mathbb{C}e$ 上的限制恒零。这不与全空间非退化矛盾: 非退化双线性型可以含有各向同性向量。□

习题 13.2. 对 $n \geq 2$, 计算 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 的 Killing 型的根, 并将其与该代数的中心比较。

解. 正文给出 $\kappa(X, Y) = 2n \text{tr}(XY) - 2 \text{tr} X \text{tr} Y$ 。标量矩阵显然与全部矩阵正交。写 $X = X_0 + \text{tr}(X)I/n$, 其中 $\text{tr} X_0 = 0$ 。若 X 在型的根中, 则 $\text{tr}(X_0 Y) = 0$ 对所有迹零 Y 成立。依次取 $Y = E_{ji}$ 消去 X_0 的非对角元, 再取 $Y = E_{ii} - E_{jj}$ 说明对角元相等; 迹零使其全零。因此根恰为 $\mathbb{C}I$, 等于中心。□

习题 13.3. 计算三维复 Heisenberg Lie 代数 $[x, y] = z$ 的全部伴随矩阵及 Killing 型。再证明任意有限维幂零 Lie 代数的 Killing 型恒零。

解. 在基 x, y, z 下, $\text{ad } x = E_{32}, \text{ad } y = -E_{31}, \text{ad } z = 0$; 任意两个的乘积为零, 所以 Killing 型恒零。一般地, 伴随表示由幂零算子组成, Engel 定理给出共同的严格上三角基; 两个这种矩阵的乘积仍严格上三角, 迹为零。因此全部 Killing 配对都为零。□

习题 13.4. 设 ρ 是有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的有限维表示, $\rho^\vee$ 是对偶表示。证明两者给出的迹型相同。

解. 在对偶基下, $\rho^\vee(x) = -\rho(x)^\top$ 。因此

$$\text{tr}(\rho^\vee(x)\rho^\vee(y)) = \text{tr}(\rho(x)^\top \rho(y)^\top) = \text{tr}(\rho(y)\rho(x)) = \text{tr}(\rho(x)\rho(y)).$$

负号成对抵消, 而转置把乘法次序反转, 最后用迹的循环性。□

习题 13.5. 不使用不变型唯一性命题, 直接由标准括号计算 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 上全部对称不变双线性型。

解. 对 $[h, e] = 2e$ 、 $[h, f] = -2f$ 使用不变性, 得到 $B(e, e) = B(f, f) = B(h, e) = B(h, f) = 0$ 。例如 $B([h, e], e) = B(h, [e, e]) = 0$, 所以 $2B(e, e) = 0$; $B([h, h], e) = B(h, [h, e])$ 给出 $B(h, e) = 0$ 。再由

$$B(h, h) = B([e, f], h) = B(e, [f, h]) = 2B(e, f)$$

可知只剩一个自由参数 $c = B(e, f)$ 。矩阵为 $\begin{pmatrix} 2c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c \\ 0 & c & 0 \end{pmatrix}$, 这里基的次序为 h, e, f 。这些矩阵直接代入三条基括号均满足不变性, 故恰为全部解, 即 $(c/4)\kappa$ 。□

习题 13.6. 取 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h \subseteq \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 。比较 $\kappa_{\mathfrak{h}}$ 与 $\kappa_{\mathfrak{sl}_2}|_{\mathfrak{h}}$, 指出理想限制引理中哪个条件不能删去。

解. $\mathfrak{h}$ 交换, 所以自身伴随表示为零, $\kappa_{\mathfrak{h}} = 0$ 。但 $\kappa_{\mathfrak{sl}_2}(h, h) = 8$, 环境 Killing 型的限制非零。这里 $\mathfrak{h}$ 不是理想, 因为 $[e, h] = -2e \notin \mathfrak{h}$ 。因此引理 13.1.6 的“理想”不能换成“子代数”。□

习题 13.7. 设 $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ 是有限维复矩阵 Lie 代数, 并且 $\text{tr}(x^2) = 0$ 对全部 $x \in L$ 成立。证明 L 可解。另给出单个非幂零矩阵 x 满足 $\text{tr}(x^2) = 0$ 的例子。

解. 将 $x+y$ 代入并相减, 得 $0 = \text{tr}(xy+yx) = 2\text{tr}(xy)$ 。因此迹型在全部 $L \times L$ 上为零, 特别满足 Cartan 可解性判据, 故 L 可解。单个矩阵 $x = \text{diag}(1, i)$ 满足 $\text{tr}(x^2) = 1 + i^2 = 0$, 但并不幂零。后一事实说明证明必须利用整个 Lie 代数的迹条件, 不能对单个 x^2 的迹作错误推断。□

习题 13.8. 在复空间 $\mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y$ 上规定 $[h, x] = x$ 、 $[h, y] = iy$ 、 $[x, y] = 0$ 。证明 Killing 型恒零, 但代数不幂零。

解. 伴随矩阵为

$$\text{ad } h = \text{diag}(0, 1, i), \quad \text{ad } x = -E_{21}, \quad \text{ad } y = -iE_{31}.$$

后两矩阵与任一伴随矩阵相乘的迹为零, 而 $\text{tr}((\text{ad } h)^2) = 1 + i^2 = 0$, 故 Killing 型恒零。另一方面 $(\text{ad } h)^m x = x \neq 0$ 对所有 m 成立, 所以它不幂零。Cartan 判据只推出可解性; 本例导出代数为交换理想 $\mathbb{C}x + \mathbb{C}y$, 确实可解。□

习题 13.9. 证明每个二维复 Lie 代数的 Killing 型都退化。

解. 交换情形的 Killing 型为零。非交换时, 取基 u, v 并令 $e = [u, v] = au + bv \neq 0$ 。有 $[u, e] = be$ 、 $[v, e] = -ae$ 。可取 $h = \alpha u + \beta v$ 使 $\alpha b - \beta a = 1$, 于是 $[h, e] = e$, 且 h, e 线性无关。故代数同构于正文的二维仿射例子, Killing 矩阵为 $\text{diag}(1, 0)$, 仍退化。□

习题 13.10. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数, ρ 是任意有限维表示。证明其迹型的根恰为 $\ker \rho$ 。

解. 记 $K = \ker \rho$ 。商 $\mathfrak{g}/K$ 由推论 13.3.2 仍半单, 且 ρ 在商上诱导忠实表示。其迹型由命题 13.2.5 非退化。原迹型是此非退化型沿商映射的拉回, 故其根正好是 K 。特别地, 平凡表示的迹型恒零; 半单性本身不能代替忠实性。□

习题 13.11. 设 $\mathfrak{g} = \bigoplus_{i=1}^r \mathfrak{g}_i$ 是有限维复半单 Lie 代数的单理想分解。证明它恰有 2^r 个理想，并确定每个理想的单分量。

解. 定理 13.3.1 把每个理想唯一写成 $I_S = \bigoplus_{i \in S} \mathfrak{g}_i$, 其中 $S \subseteq \{1, \dots, r\}$ 。不同子集给出不同子空间, 故理想数为 2^r 。商映射在其余分量的直和上为同构, 所以 $\mathfrak{g}/I_S \cong \bigoplus_{i \notin S} \mathfrak{g}_i$ 。□

习题 13.12. 设 $\mathfrak{s}$ 是非零有限维复单 Lie 代数。证明

$$\text{Aut}(\mathfrak{s}^{\oplus r}) \cong \text{Aut}(\mathfrak{s})^r \rtimes S_r,$$

其中 S_r 置换各因子。

解. 自同构必置换极小非零理想, 而这些理想恰为 r 个坐标因子, 因此给出到 S_r 的同态。每个坐标置换确实是自同构, 提供该同态的分裂。核中的自同构逐个保持每个坐标理想, 其限制是 r 个独立的 $\mathfrak{s}$ 自同构; 反之这些自同构逐坐标作用便给出核的所有元素。共轭作用正是置换这 r 个自同构, 因此为所述半直积。□

习题 13.13. 设 $\mathfrak{g} = \bigoplus_i \mathfrak{g}_i$ 是有限维复半单 Lie 代数。求出所有对称不变双线性型, 并判断何时非退化。

解. 若 $i \neq j$, 每个 $x \in \mathfrak{g}_i$ 都是该理想中括号的和, 因为它完美。对 $x = [a, b]$, $y \in \mathfrak{g}_j$, 不变性给出 $B(x, y) = B(a, [b, y]) = 0$ 。所以不同单分量互相正交。每个分量上的限制由推论 13.2.4 为 $c_i \kappa_{\mathfrak{g}_i}$ 。故全部型恰为

$$B = \bigoplus_i c_i \kappa_{\mathfrak{g}_i}, \quad c_i \in \mathbb{C}.$$

各单因子的 Killing 型非退化, 因此 B 非退化当且仅当每个 $c_i \neq 0$; 若某些 $c_i = 0$, 其根就是对应单分量之和。□

习题 13.14. 在 $\mathfrak{s} \oplus \mathfrak{s}$ 中, $\mathfrak{s}$ 是非零复单 Lie 代数。计算对角子代数的中心化子与 Killing 正交补, 判断这个正交补是否为子代数。

解. 若 (a, b) 中心化全部 (x, x) , 则 $[a, x] = [b, x] = 0$ 对所有 x 成立, 故 $a = b = 0$ 。中心化子为零。另一方面, 直和 Killing 型给出

$$\kappa((a, b), (x, x)) = \kappa_{\mathfrak{s}}(a + b, x),$$

所以正交补为 $\{(a, -a) \mid a \in \mathfrak{s}\}$ 。取 $[a, b] \neq 0$, 则两反对角元素的括号为 $([a, b], [a, b])$, 不在反对角空间中。因此这个正交补不是子代数, 更不是理想。□

习题 13.15. 不使用单性, 直接证明 $n \geq 2$ 时 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ 的中心为零。指出在特征 $p \mid n$ 时哪一步会失效。

解. 若 X 与全部迹零对角矩阵交换, 则 X 的非对角元为零, 因为对每对 $i \neq j$ 可选一组迹零对角元使第 i, j 项不同。再与所有 E_{ij} 交换, 便迫使所有对角元相等, 即 $X = cI$ 。在复数域上 $\text{tr } X = nc = 0$ 给出 $c = 0$ 。若特征 $p \mid n$, 标量矩阵 I 已满足迹零, 故非零中心出现; 最后除以 n 的步骤失效。在小特征下前面的对角分离也可能需要调整, 但这个标量反例本身已经足够。□

习题 13.16. 求 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中 E_{12} 的中心化子及其维数, 并说明它为什么不是整个 Lie 代数的理想。

解. 令 $X = (x_{ij})$. 条件 $XE_{12} = E_{12}X$ 给出 $x_{21} = x_{23} = x_{31} = 0$, $x_{11} = x_{22}$, 结合迹零,

$$X = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & -2a \end{pmatrix}.$$

故中心化子四维。它含有 E_{12} , 但 $[E_{21}, E_{12}] = E_{22} - E_{11}$ 不中心化 E_{12} , 所以不是理想。这里的中心化子针对一个元素, 并不适用半单理想的正交补结论。□

习题 13.17. 对 $\mathfrak{sp}_4(\mathbb{C})$, 列出正文基 $H_i, A_{ij}, B_{ij}, C_{ij}$ 的全部十个元素及其对 $H = t_1 H_1 + t_2 H_2$ 的权。

解. 零权基为 H_1, H_2 . 其余为

向量	A_{12}	A_{21}	B_{11}	B_{22}	C_{11}	C_{22}	B_{12}	C_{12}
权	$t_1 - t_2$	$t_2 - t_1$	$2t_1$	$2t_2$	$-2t_1$	$-2t_2$	$t_1 + t_2$	$-t_1 - t_2$

其中 $\bar{1} = 3, \bar{2} = 4$, 例如 $A_{12} = E_{12} - E_{43}$, $B_{12} = E_{14} + E_{23}$, $C_{12} = E_{32} + E_{41}$. 其余单指标元素由正文公式直接写出。这十个元素分别占据 A 块的四个自由位置及两个对称块各三个自由位置, 因而线性无关且张成全部代数。□

习题 13.18. 在 $\mathfrak{so}_4(\mathbb{C})$ 中令

$$\begin{aligned} a_1 &= F_{12} + F_{34}, & a_2 &= F_{13} - F_{24}, & a_3 &= F_{14} + F_{23}, \\ b_1 &= F_{12} - F_{34}, & b_2 &= F_{13} + F_{24}, & b_3 &= F_{14} - F_{23}. \end{aligned}$$

验证它们分别生成两个三维理想, 并直接写出直和分解。

解. 由矩阵单位的乘法, 可得

$$[a_1, a_2] = -2a_3, \quad [a_2, a_3] = -2a_1, \quad [a_3, a_1] = -2a_2,$$

$$[b_1, b_2] = 2b_3, \quad [b_2, b_3] = 2b_1, \quad [b_3, b_1] = 2b_2, \quad [a_i, b_j] = 0 \quad (1 \leq i, j \leq 3).$$

例如第一式的四项分别为 $-F_{23}, -F_{14}, -F_{14}, -F_{23}$; 交叉括号中的矩阵单位系数则两两相消。这六个向量由三对可逆的和差变换从 F_{ij} 得到, 所以构成一组基。于是

$$\mathfrak{so}_4 = \text{span}\{a_1, a_2, a_3\} \oplus \text{span}\{b_1, b_2, b_3\}$$

是互相交换的理想直和; 各三维代数由缩放基与 $\mathfrak{so}_3$ 同构, 故为单 Lie 代数。□

习题 13.19. 解释正文正交单性证明中, D 在 F_{12} 与 F_{34} 上的特征标为何在四维时相同, 而在 $n \geq 5$ 时不同。

解. 四维时 $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 \varepsilon_4 = 1$, 所以 $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_3 \varepsilon_4$, 平均投影只能提取二者的二维共同特征空间, 不能单独分离两个基向量。若 $n \geq 5$, 取 $\varepsilon_1 = \varepsilon_5 = -1$, 其余为 1, 则行列式仍为 1, 而两特征标的值分别为 $-1, 1$, 故不同。这说明额外一个坐标怎样破坏四维中的成对重合。□

习题 13.20. 在证明 $\mathfrak{sp}_4 \cong \mathfrak{so}_5$ 的记号下, 写出五维空间 $W = \Omega^\perp$ 的一组基, 并求 $H = t_1 H_1 + t_2 H_2$ 在这组基上的特征值。

解. 可取

$$e_1 \wedge e_2, \quad e_1 \wedge f_2, \quad f_1 \wedge e_2, \quad f_1 \wedge f_2, \quad e_1 \wedge f_1 - e_2 \wedge f_2.$$

前四项与 Ω 楔积为零, 最后一项也因两个二向量彼此交换而与其楔积为零。五项线性无关, 且 $\dim W = 5$, 故为基。相应特征值为

$$t_1 + t_2, \quad t_1 - t_2, \quad -t_1 + t_2, \quad -t_1 - t_2, \quad 0.$$

这些值直接来自外幂作用 $H(u \wedge v) = Hu \wedge v + u \wedge Hv$ 。 $\square$

习题 13.21. 设 $V = \mathbb{C}^4$, ρ 是 $\mathfrak{sl}(V)$ 在 $\bigwedge^2 V$ 上的表示。证明

$$\mathrm{tr}_{\bigwedge^2 V}(\rho(X)\rho(Y)) = 2 \mathrm{tr}_V(XY) \quad (X, Y \in \mathfrak{sl}_4).$$

解. 两侧都是 $\mathfrak{sl}_4$ 上的对称不变型, 单性与推论 13.2.4 说明它们相差一个标量。因此只须用一对非零配对确定标量。取 $X = Y = \mathrm{diag}(1, -1, 0, 0)$ 。在六个楔积基上, $\rho(X)$ 的特征值为 $0, 1, 1, -1, -1, 0$, 平方和为 4, 而 $\mathrm{tr}_V(X^2) = 2$ 。比例为 2, 得到结论。这里比较的是自然表示和外幂表示的迹型, 不能省去这个比例而说两个迹型完全相同。 $\square$

第十四章 $\mathfrak{sl}_2$ 及其表示

本章从三个标准生成元的交换关系出发，建立 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的有限维表示理论。升降公式给出每个非负整数最高权对应的不可约模；一个显式 Casimir 算子再把不同类型分开，并帮助证明同一类型的扩张也分裂，由此独立得到完全可约性。随后用权重数计算 Clebsch–Gordan 分解，讨论不变双线性型、Casimir 投影及矩阵中的三元组构造，为根弦和一般最高权理论准备具体工具。

本章目标

- 从三个交换关系推导升降公式，并识别有限权链。
- 能在标准基及齐次多项式模型之间换算，确定最高权、维数和不变配对。
- 用 Casimir 算子和升降公式分裂扩张，再由完全可约性得到权算子的可对角化。
- 能由权重数或 Casimir 谱恢复不可约重数，计算张量积及其对称、交替部分。
- 能从幂零矩阵的 Jordan 链构造三元组，并说明该构造的适用范围。

预备知识为 Lie 代数表示、有限维线性代数、广义特征空间分解及张量积。

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，取 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ ，令 v 满足 $ev = 0$ 且 $hv = nv$ 。交换关系 $[e, f] = h$ 给出 $e(fv) = nv$ ，继续沿下降算子 f 作用，就得到一串权依次减少 2 的向量。若表示有限维，这串向量必须停下；停在何处，会限制 n 的取值，也决定整个不可约表示的维数。先在这个最小的半单 Lie 代数中把权链算清楚，才能在一般根方向重新使用相同的三元组计算。

14.1 $\mathfrak{sl}_2$ 的结构

在最小的非交换半单例子中，三个算子就能展示最高权、升降与完全可约的关系。本章固定复数域，直接从三个交换关系推导全部有限维表示；后面的根系理论正是反复把较大的代数限制到这样的三元组上。

14.1.1 标准基与交换关系

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中取

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

它们构成一组基，直接相乘得到

$$[h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f, \quad [e, f] = h.$$

因此在一个向量空间上给出 $\mathfrak{sl}_2$ 表示, 等价于给出满足这三条关系的算子 E, F, H 。为使公式容易阅读, 以下仍将作用算子写为 e, f, h ; 乘积 ef 指先作用 f 再作用 e , 括号仍为交换子。

命题 14.1.1. 复 Lie 代数 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 是单 Lie 代数。记矩阵单位为 E_{ij} , 取基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。其 Killing 型满足

$$\kappa(h, h) = 8, \quad \kappa(e, f) = \kappa(f, e) = 4,$$

其余基向量配对为零。

证明. 任一理想在 $\text{ad } h$ 下不变; 该算子的三个特征值为 $2, 0, -2$, 对应直线分别是 $\mathbb{C}e, \mathbb{C}h, \mathbb{C}f$ 。对一个非零理想中的元素, 用这三个特征值的插值多项式作投影, 可在理想中取得某个非零基向量。若取得 e 或 f , 与另一基向量括号就得到 h , 再得到全部三者; 若先取得 h , 则与 e, f 括号直接得到三者。因此理想只能为全部代数。计算 Killing 型时, $\text{ad } h$ 的平方迹为 $2^2 + (-2)^2 = 8$ 。算子 $(\text{ad } e)(\text{ad } f)$ 在 e, h, f 上的对角系数为 $2, 2, 0$, 迹为四; 反向积有同样的迹。两个同号根向量或 h 与 e, f 的乘积没有非零对角系数, 故其余配对为零。□

14.1.2 Cartan 子代数的例子

令 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h$ 。它是由对角矩阵组成的交换子代数, 并给出伴随作用下的分解

$$\mathfrak{sl}_2 = \mathbb{C}f \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathbb{C}e.$$

对线性泛函 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 、 $\alpha(h) = 2$, 三项分别具有特征值函数 $-\alpha, 0, \alpha$ 。第十六章将从这样的分解建立 Cartan 子代数与根的一般定义; 这个例子已显示其中的具体性质。

与 h 对易的矩阵在 $\mathfrak{sl}_2$ 中恰为 $\mathfrak{h}$ 。若 $x = ae + bf + ch$ 满足 $[x, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$, 则 $[x, h] = -2ae + 2bf$ 迫使 $a = b = 0$ 。所以 $\mathfrak{h}$ 的中心化子和正规化子都等于自身; 它的伴随算子又能同时对角化。这些性质是它作为 Cartan 子代数的具体表现, 而不只是矩阵恰好为对角形。

选基的可逆对角矩阵会缩放 e, f , 但不会改变关系的本质。例如取 $a \neq 0$, 令 $e' = ae$ 、 $f' = a^{-1}f$ 、 $h' = h$, 仍满足相同三式。根向量的归一化可以变动; 后面比较 Killing 对偶基和 Casimir 算子时, 会把相应常数写出。

14.1.3 升降算子

定义 14.1.2. 设 V 为复 Lie 代数 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的左模, 记 $h = \text{diag}(1, -1)$ 。对 $\lambda \in \mathbb{C}$, 子空间

$$V_\lambda = \{v \in V \mid hv = \lambda v\}$$

称为关于 h 的权空间; 若它非零, 称 λ 为一个权。有限维时, 再记 $V_{[\lambda]}$ 为 h 的广义特征空间。

由交换关系,

$$eV_\lambda \subseteq V_{\lambda+2}, \quad fV_\lambda \subseteq V_{\lambda-2}.$$

因此称 e, f 为升算子与降算子。同样的包含也对广义特征空间成立, 因为

$$(h - (\lambda + 2)I)^N e = e(h - \lambda I)^N, \quad (h - (\lambda - 2)I)^N f = f(h - \lambda I)^N.$$

此时尚不能假定 h 已经对角化, 但线性算子的广义特征空间分解总可以使用。

引理 14.1.3. 设 V 为非零有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij} , 取基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。则存在 $v \in V \setminus \{0\}$ 和 $\lambda \in \mathbb{C}$, 使

$$hv = \lambda v, \quad ev = 0.$$

而且在每个有限维模上, 算子 e, f 都幂零。

证明. 在 h 的有限个特征值中, 选实部最大的 λ 。此时 $\lambda + 2$ 不是特征值, 所以 $eV_{[\lambda]} = 0$ 。在这个非零广义特征空间中取一个非零特征向量, 即得所求 v 。对幂零性, e^N 将 $V_{[\mu]}$ 映入 $V_{[\mu+2N]}$ 。特征值集合有限, 取充分大的同一个 N , 所有这些目标都为零。因此 $e^N = 0$ 。对 f 用 $\mu - 2N$ 同理。□

这个论证同时解释了复数域与有限维性的作用: 需要存在特征值, 并需要权不能无限地向同一方向延伸。无限维最高权模中, 降算子通常就不幂零。

14.2 最高权模

从一个被升算子零化的向量开始, 反复作用降算子, 便得到一条权链。交换关系确定链上所有系数; 链必须终止这一有限维条件, 又迫使最高权成为非负整数。

14.2.1 最高权向量

定义 14.2.1. 设 V 为复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij} , 取基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。若 $v \in V \setminus \{0\}$ 、 $\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 $ev = 0$ 、 $hv = \lambda v$, 就称 v 为最高权为 λ 的**最高权向量** (highest weight vector)。由 $v, fv, f^2v, \dots$ 生成的子空间将在下面证明为子模, 称为它生成的最高权模。

引理 14.2.2. 设 V 为复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij} , 取基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。对整数 $j \geq 1$, 这些基元素在 V 上的作用算子满足

$$[e, f^j] = jf^{j-1}(h - j + 1).$$

因此若 $v \in V \setminus \{0\}$ 满足 $ev = 0$ 、 $hv = \lambda v$, 其中 $\lambda \in \mathbb{C}$, 则

$$hf^jv = (\lambda - 2j)f^jv, \quad ef^jv = j(\lambda - j + 1)f^{j-1}v.$$

证明. $j = 1$ 是 $[e, f] = h$ 。若公式对 j 成立, 则

$$[e, f^{j+1}] = [e, f^j]f + f^j[e, f] = jf^{j-1}(h - j + 1)f + f^jh.$$

利用 $hf = f(h - 2)$, 右边为 $(j + 1)f^j(h - j)$, 完成归纳。权公式由 $[h, f] = -2f$ 同样归纳得到; 将交换子公式用于 $ev = 0$ 即得升算子的作用。□

命题 14.2.3. 设 V 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij} , 取基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。设 $v \in V \setminus \{0\}$ 、 $\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 $ev = 0$ 、 $hv = \lambda v$ 。则 $\lambda = m$ 为非负整数, 且 $v, fv, \dots, f^m v$ 线性无关、 $f^{m+1}v = 0$ 。它们生成一个维数 $m+1$ 的子模。

证明. 由引理 14.1.3 中关于降算子的结论, 存在最大的 $m \geq 0$ 使 $f^m v \neq 0$ 。这些非零向量的权两两不同, 所以线性无关。把引理 14.2.2 用于 $j = m+1$, 得到 $0 = (m+1)(\lambda - m)f^m v$ 。特征零使 $m+1 \neq 0$, 所以 $\lambda = m$ 。升降公式说明该线性生成空间在 e, f, h 下均不变, 故为子模。□

14.2.2 有限维不可约模的构造

命题 14.2.4. 对每个整数 $m \geq 0$, 令 L_m 为具有基 $v_0, \dots, v_m$ 的复向量空间。记 E_{ij} 为矩阵单位, 取 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$, 规定

$$hv_i = (m - 2i)v_i, \quad fv_i = v_{i+1}, \quad ev_i = i(m - i + 1)v_{i-1},$$

其中 $v_{-1} = v_{m+1} = 0$ 。这些公式给出一个不可约 $\mathfrak{sl}_2$ 模。

证明. 代入可得 $[h, e]v_i = 2ev_i$ 、 $[h, f]v_i = -2fv_i$ 。又

$$(ef - fe)v_i = ((i+1)(m-i) - i(m-i+1))v_i = (m-2i)v_i,$$

端点处也同样成立, 故三条交换关系全部满足。若非零子模包含某个非零向量, 利用 h 的互异特征值作多项式投影, 便包含某个 v_i 。系数 $j(m-j+1)$ 对 $1 \leq j \leq m$ 都非零, 所以反复作用 e 得到 v_0 , 再作用 f 得到全部基向量。子模因此是整个 L_m 。□

这个模型也可以写成二元齐次多项式。令

$$e = x \frac{\partial}{\partial y}, \quad f = y \frac{\partial}{\partial x}, \quad h = x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y}.$$

它们保持全次数为 m 的空间; 在基

$$v_i = \frac{m!}{(m-i)!} x^{m-i} y^i, \quad 0 \leq i \leq m,$$

上正好给出上述公式。这一归一化使降算子的系数为一。若直接使用单项式基, 则升降系数分别是 i 与 $m-i$, 描述的表示相同。

14.2.3 维数与权链

L_m 的权为

$$m, m-2, \dots, -m,$$

每个权空间一维。因此 L_0 是平凡模, L_1 是自然二维模, L_2 同构于伴随模: 取最高向量 e , 沿 $\text{ad } f$ 下降得到 $e, -h, -2f$, 其作用与模型一致。

每个 L_m 有最高权和最低权, 且两端互为相反数。维数不是最高权本身, 而是最高权加一。两个不同的非负整数给出不同构表示, 既可由维数看出, 也可由最高权看出。

命题 14.2.5. 设 $m \geq 0$ 为整数, L_m 为命题 14.2.4 给出的 $(m+1)$ 维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模, $v_0, \dots, v_m$ 为该模型的基。则 $L_m^* \cong L_m$ 。记矩阵单位为 E_{ij} , 取标准基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。若在 L_m 上定义双线性型

$$B(v_i, v_j) = 0 \quad (i + j \neq m), \quad B(v_i, v_{m-i}) = (-1)^i,$$

则 B 非退化并对 h 和 f 的作用不变; 它对 e 也不变。其对称性为 $B(w, v) = (-1)^m \cdot B(v, w)$ 。

证明. 矩阵只有反对角线上的非零元, 所以非退化。 h 不变性由两项权之和为零得到。对 f , 可能非零的等式 $B(fv_i, v_j) + B(v_i, fv_j) = 0$ 只在 $i + j = m - 1$ 时出现, 两系数为 $(-1)^{i+1}$ 与 $(-1)^i$, 和为零。对 e , 只需检查 $i + j = m + 1$; 此时两个作用系数 $i(m - i + 1)$ 与 $j(m - j + 1)$ 相等, 相应符号相反, 所以和仍为零。交换反对角线的两个位置使符号乘 $(-1)^m$, 得到最后结论。不变性使 $v \mapsto B(v, -)$ 是到对偶表示的同态, 非退化性使它为同构。 $\square$

所以奇数 m 的模型带有非退化交替型, 偶数 m 的模型带有非退化对称型。这个性质将把低维 $\mathfrak{sl}_2$ 表示与辛、正交 Lie 代数联系起来; 此处的判断来自显式配对, 而非仅凭维数猜测。

14.3 有限维表示

最高权链已经给出了候选的不可约表示, 但一般有限维模中还可能不存在不分裂的扩张。本节先完成不可约分类, 再用三个作用矩阵构造 Casimir 算子, 排除这些扩张。

14.3.1 不可约分类

定理 14.3.1. 对每个整数 $m \geq 0$, 记 L_m 为命题 14.2.4 给出的 $(m+1)$ 维标准最高权模型。每个有限维不可约复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模都恰好同构于一个 L_m 。其最高权为 m , 维数为 $m+1$ 。

证明. 由引理 14.1.3 选最高权向量。由命题 14.2.3, 它生成一个与某个 L_m 同构的非零子模; 不可约性使这个子模为整个表示。命题 14.2.4 已经逐个构造并证明 L_m 不可约, 而不同的 m 给出不同维数, 所以类型唯一。 $\square$

这个结论也确定了任何有限维表示的简单合成因子。仅凭合成因子, 还不能断言原模是它们的直和; 上一编的模特征例子已经说明这种推断可能失败。下面用 $\mathfrak{sl}_2$ 的额外关系证明, 在当前复数情形它确实成立。

14.3.2 完全可约性

引理 14.3.2. 设 V 为复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij} , 取基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。则 V 上的算子

$$C = h^2 + 2h + 4fe$$

与 e, f, h 都交换。对整数 $m \geq 0$, 在最高权为 m 的标准模型 L_m 上, 它为标量 $m(m+2)$ 。

证明. 由 $[h, fe] = 0$, 得 $[h, C] = 0$. 其余两式直接计算为

$$[e, C] = -2(eh + he) - 4e + 4he = 2[h, e] - 4e = 0,$$

$$[f, C] = 2(fh + hf) + 4f - 4fh = 2[h, f] + 4f = 0.$$

在最高向量上, $fev_0 = 0$, $hv_0 = mv_0$, 故 $Cv_0 = m(m+2)v_0$. C 与 f 交换, 而所有 $v_i = f^i v_0$, 所以这个标量作用遍及整个 L_m . $\square$

定理 14.3.3. 每个有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模完全可约. 特别地, 标准 Cartan 元 $h = \text{diag}(1, -1)$ 在任意这种表示上可对角化, 关于 h 的全部权为整数.

证明. 按 $\dim V$ 归纳. 若 V 简单, 已由定理 14.3.1 分类. 否则取极大真子模 U , 使 $V/U \cong L_m$; 归纳假设使 U 为若干 L_n 的直和. 因为 C 与作用交换, 它的广义特征空间都是子模. 除特征值 $c = m(m+2)$ 对应的一项外, 其余各项映到 V/U 都为零, 故已经包含在半单模 U 中. 只需考虑广义 c 空间; 它仍映满 L_m . 非负整数中, 等式 $n(n+2) = m(m+2)$ 只在 $n = m$ 时成立, 所以该项的核为 L_m 的若干份直和. 以下把此项仍记为 V , 把其核仍记为 U . 现在 h 在 U 与 V/U 上的特征值都属于 $m, m-2, \dots, -m$, 故在 V 上也只有这些特征值, 但暂不假定它可对角化. 将商的最高向量提升到 V 的广义 m 特征空间, 记为 v . 升降关系给出 $ev = 0$, $f^{m+1}v = 0$, 因为相应目标广义特征空间不存在. 又令 $a = (h - m)v$, 则 $a \in U$; U 上的 h 已可对角化, 所以事实上 $a \in U_m$. 由引理 14.2.2 的算子等式,

$$0 = ef^{m+1}v = (m+1)f^m(h-m)v = (m+1)f^ma.$$

在 $U \cong L_m^{\oplus r}$ 中, $f^m : U_m \rightarrow U_{-m}$ 是同构, 包括 $m = 0$ 的情形. 因此 $a = 0$, 即 v 是最高权向量. 它生成一个 L_m 子模, 且到 V/U 的映射在最高向量上非零, 因而为同构. 这个子模与 U 交为零并映满商, 得到 $V = U \oplus L_m$. 加回其他 C 广义特征空间即完成归纳. 最后, 所有 L_m 上的 h 都在所给基上对角化且权为整数, 直和也有这些性质. $\square$

这一证明分别使用了最高权链、Casimir 的不同标量以及同一最高权的扩张计算. 它没有先假定一般 Weyl 定理, 也没有把 h 的可对角化放进表示的定义.

14.3.3 张量积的 Clebsch–Gordan 分解

这里的分解以克莱布施和戈尔丹命名.¹ 对有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模 V , 定义有限 Laurent 多项式²

$$\chi_V(z) = \sum_{r \in \mathbb{Z}} (\dim V_r) z^r.$$

由张量作用 $h(v \otimes w) = hv \otimes w + v \otimes hw$, 有 $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W$, 直和则对应相加.

¹ 克莱布施 (Rudolf Friedrich Alfred Clebsch, 1833-1872) 与戈尔丹 (Paul Gordan, 1837-1912) 都是德国数学家, 研究不变量理论及代数形式; 克莱布施还研究几何与数学物理.

² 洛朗 (Pierre Alphonse Laurent, 1813-1854), 法国数学家、工程师, 提出复函数的 Laurent 级数展开.

定理 14.3.4 (Clebsch–Gordan). 对每个非负整数 r , 记 L_r 为最高权 r 、维数 $r+1$ 的标准复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。则对非负整数 m, n , 有模分解

$$L_m \otimes L_n \cong \bigoplus_{j=0}^{\min(m,n)} L_{m+n-2j}.$$

证明. 由完全可约性, 只须确定不可约直和项的重数。已知 $\chi_{L_m} = z^m + z^{m-2} + \cdots + z^{-m}$ 。可交换 m, n , 故假设 $m \geq n$ 。乘积中 z^{m+n-2r} 的系数为满足 $a+b=r$ 、 $0 \leq a \leq m$ 、 $0 \leq b \leq n$ 的整数对数, 即

$$\min(n, r) - \max(0, r-m) + 1 \quad (0 \leq r \leq m+n).$$

候选和 $\sum_{j=0}^n \chi_{L_{m+n-2j}}$ 的同次系数为满足 $0 \leq j \leq n$ 、 $j \leq r \leq m+n-j$ 的整数 j 数, 即 $\min(n, r, m+n-r) + 1$ 。若 $r \leq m$, 两式都为 $\min(n, r) + 1$; 若 $r > m$, 两式都为 $m+n-r+1$ 。所以这两个 Laurent 多项式相同。上述 Laurent 多项式 χ_{L_a} 线性无关: 在任何非零有限线性组合中, 最大的 a 所给最高项 z^a 无法抵消。因此所列重数就是完全可约分解的重数。□

例如 $L_1 \otimes L_1 = L_2 \oplus L_0$, 分别对应自然二维模的对称平方与外平方; 又有 $L_2 \otimes L_2 = L_4 \oplus L_2 \oplus L_0$ 。后一式的维数为 $9 = 5 + 3 + 1$ 。这些等式先由权重数证明, 再作维数核, 不能把维数和正确当作分解的唯一理由。

14.3.4 Casimir 算子的谱与分解

完全可约之后, Casimir 算子还给出一种内在的分块方式。设 V 中出现的不可约类型的最高权组成有限集合 S 。对 $m \in S$, 定义

$$P_m = \prod_{\substack{n \in S \\ n \neq m}} \frac{C - n(n+2)I}{m(m+2) - n(n+2)}.$$

每个分母非零, 且空乘积取恒等。该多项式在 C 的特征值 $m(m+2)$ 处为一, 在其余特征值处为零, 所以 P_m 恰好投到所有 L_m 直和项组成的等型分量。它与群作用无关, 只使用 Lie 代数的三个算子和多项式插值。

重数还可直接从权空间维数读出:

$$[V : L_m] = \dim V_m - \dim V_{m+2} \quad (m \geq 0).$$

因为 L_n 含有权 m , 当且仅当 $n \geq m$ 且二者同奇偶; 两项相减只留下 $n = m$ 。在有限维空间中, 这给出一个从算子 h 的谱到不可约重数的计算步骤。

本章的 $C = h^2 + 2h + 4fe$ 与 Killing 对偶基所给的 Casimir 相差常数。由命题 14.1.1, 对偶基为 $h/8, f/4, e/4$, 所以 Killing 归一化的元素作用为

$$\frac{h^2}{8} + \frac{ef + fe}{4} = \frac{h^2 + 2h + 4fe}{8}.$$

其标量因此是 $m(m+2)/8$ 。后面使用 Killing 型构造 Casimir 时保留这一常数; 本章为了使升降公式清楚, 使用的是分母已清掉的算子 C 。

14.4 结构应用

三元组关系使 $\mathfrak{sl}_2$ 可以嵌入较大的 Lie 代数, 也使较大的表示在限制以后分成已经熟悉的权链。本节据此证明权链的整数性与反射对称性, 为后面的根弦论证作准备。

14.4.1 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组

定义 14.4.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为复 Lie 代数, $x, y, h_0 \in \mathfrak{g}$ 。若它们满足

$$[h_0, x] = 2x, \quad [h_0, y] = -2y, \quad [x, y] = h_0$$

则称它们为一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。记矩阵单位为 E_{ij} , 取 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的标准基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$ 。若三者不全为零, 则由 $e \mapsto x, f \mapsto y, h \mapsto h_0$ 给出的同态是单射, 其像同构于 $\mathfrak{sl}_2$ 。

最后一句来自命题 14.1.1: 同态的核为理想, 而非零同态的核不能是整个单 Lie 代数。若 $h_0 = 0$, 前两条关系又迫使 $x = y = 0$, 所以非零三元组的各个标准方向确实都存在。

命题 14.4.2. 设 V 为有限维复向量空间, $E \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 为幂零算子。则存在 $F, H \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$, 使 $[H, E] = 2E$ 、 $[H, F] = -2F$ 、 $[E, F] = H$ 。

证明. 对 E 取 Jordan 链, 先处理长度 $m+1$ 的一条, 写成基 $v_0, \dots, v_m$, 使 $Ev_i = v_{i-1}$, 其中 $v_{-1} = 0$ 。定义

$$Hv_i = (m - 2i)v_i, \quad Fv_i = (i + 1)(m - i)v_{i+1},$$

并令 $v_{m+1} = 0$ 。代入可得 $[H, E] = 2E$ 、 $[H, F] = -2F$, 以及

$$[E, F]v_i = ((i + 1)(m - i) - i(m - i + 1))v_i = Hv_i.$$

在全部 Jordan 链上取这些算子的直和, 便得到所求 F, H 。 $\square$

这里构造的是 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的三元组。如果 E 原本属于一个指定的真子代数, 还须另外证明能否把 F, H 也选在该子代数中; 本命题没有自动给出这个更强结论。

14.4.2 根弦的原型

命题 14.4.3. 设 $W \neq 0$ 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模, $d \in \mathbb{C}$ 为标准 Cartan 元 $h = \text{diag}(1, -1)$ 在 W 上的一个权。若全部权都在 $d + 2\mathbb{Z}$ 中, 且每个权空间至多一维, 则 W 不可约。存在非负整数 p, q , 使权恰为

$$d - 2p, d - 2p + 2, \dots, d + 2q, \quad d = p - q.$$

对每个权 r , 相反的权 $-r$ 以相同重数出现。

证明. 按定理 14.3.3 分成 L_m 。所有出现的 m 都与整数权 d 同奇偶。如果有两个直和项, 那么偶数情形它们都含权零, 奇数情形它们都含权一, 均与权空间至多一维矛盾。因此只出现一个 L_m 。其权无间断地从 m 降到 $-m$; 以其中的 d 为原点记录两端, 得到 $d + 2q = m$ 、 $d - 2p = -m$, 相加便是 $d = p - q$ 。对称性也由同一权链得到。 $\square$

如果每个权空间可以有更高维数,单一奇偶性就不再保证不可约,例如 $L_2 \oplus L_0$ 在权零处有二维空间。后面由根空间证明根弦是一条连续链时,必须先证明根空间一维,再应用这里的论证。

14.4.3 根系与最高权理论的模型

设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复 Lie 代数,并在其中给定一个非零 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。通过伴随作用,把整个 $\mathfrak{g}$ 看成该 $\mathfrak{sl}_2$ 的有限维模。于是 $\text{ad } h_0$ 可对角化,全部特征值为整数, $\text{ad } x$ 、 $\text{ad } y$ 则幂零。这里不要求整个 $\mathfrak{g}$ 已经半单;使用的是限制到三元组后的表示定理。

这个结论为一般结构论提供了三件可用的事实:升降只把权移动固定的步长,有限链的端点受整数控制,而且链在反射 $r \mapsto -r$ 下对称。在更大的半单 Lie 代数中,每一对相反根将产生一个这样的三元组;多个三元组的相容关系才进一步形成根系。至于不可约表示怎样由一组最高权整数共同决定,则需要后面的泛包络代数与三角分解。

本章小结

$\mathfrak{sl}_2$ 的每个有限维不可约复表示由一个非负整数 m 决定,其权为 $m, m-2, \dots, -m$, 维数为 $m+1$ 。同一个模既可用升降链描述,也可实现为二元齐次多项式。显式不变型说明每个不可约模自对偶,并区分了对称型与交替型。

不可约表示的分类之后,还须证明完全可约性。Casimir 算子先把不同最高权的广义特征分量分开;在相同最高权的扩张中,升降公式使最高向量的提升仍是普通特征向量,从而构造补模。由此才得到权算子的可对角化及权的整数性。

完全可约性使权重数成为有效的计算资料, Clebsch–Gordan 分解及 Casimir 多项式投影都是它的应用。限制到三元组以后,任何有限维表示都分成这些权链;这将解释一般根系中的整数、连续根弦和反射。矩阵三元组的构造则提醒我们,存在于全矩阵代数中的补充算子未必自动属于事先指定的真子代数。

习题

习题 14.1. 在 $\mathbb{C}^3$ 的基 v_0, v_1, v_2 下, 取

$$H = \text{diag}(2, 0, -2), \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

验证三条交换关系,并给出到二次齐次多项式模型的显式同构。

解. 由矩阵作用, $Hv_i = (2-2i)v_i$ 、 $Fv_i = v_{i+1}$ 、 $Ev_i = i(3-i)v_{i-1}$, 逐基代入得 $[H, E] = 2E$, $[H, F] = -2F$, $[E, F] = H$ 。取 $v_0 \mapsto x^2$, $v_1 \mapsto 2xy$, $v_2 \mapsto 2y^2$, 则 $y\partial_x$ 顺次送前一基向量到后一基向量, $x\partial_y$ 的两项系数均为 2, 故与全部三个算子交织。□

习题 14.2. 一个有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模的非零权空间只有

$$\dim V_{\pm 4} = 1, \quad \dim V_{\pm 2} = 3, \quad \dim V_0 = 4.$$

求它的不可约分解、维数及 $\ker e$ 的维数。

解. 用 $[V : L_m] = \dim V_m - \dim V_{m+2}$, 得到

$$V \cong L_4 \oplus L_2^{\oplus 2} \oplus L_0.$$

维数为 $5 + 2 \cdot 3 + 1 = 12$, 也等于全部权重数之和。每个不可约直和项中 $\ker e$ 由一个最高向量张成, 所以 $\dim \ker e = 1 + 2 + 1 = 4$. $\square$

习题 14.3. 判断是否存在有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模, 其 h 特征值仅为 $2, -2$, 各重数为 1。再给出一个全部权重数关于零对称、但仍不可能出现的四维候选谱。

解. 第一种谱若存在, 最高权 2 迫使出现一个 L_2 , 而 L_2 含有零权, 矛盾。四维例子可取 $4, 1, -1, -4$, 各重数为 1。最高权 4 迫使出现五维模 L_4 , 已超过总维数; 同时还缺少权 $2, 0, -2$ 。因此对称性只是必要条件, 不能代替连续权链及非负重数条件。 $\square$

习题 14.4. 在模型基下, 显式找出 $L_2 \otimes L_1$ 中最高权为 3 和 1 的向量, 并写出最高权 1 子模的两项权链。

解. 记两因子的基为 v_0, v_1, v_2 及 w_0, w_1 。 $v_0 \otimes w_0$ 被 e 零化, 权为 3。在权 1 空间中,

$$u = v_1 \otimes w_0 - 2v_0 \otimes w_1$$

满足 $eu = 2v_0 \otimes w_0 - 2v_0 \otimes w_0 = 0$ 。再有

$$fu = v_2 \otimes w_0 - v_1 \otimes w_1, \quad f^2u = 0.$$

所以这两项生成 L_1 , 其余由最高权 3 向量生成 L_3 ; 两者最高权不同, 且维数和为 $4+2=6$, 故得到整个张量积。 $\square$

习题 14.5. 在 $L_2 \otimes L_2$ 中构造非零不变向量, 并找出最高权 2 的向量。判断它们在交换两因子的映射下分别具有何种符号。

解. 不变向量可取

$$u = v_0 \otimes v_2 - v_1 \otimes v_1 + v_2 \otimes v_0.$$

其权为零; e 作用后两种权 2 张量的系数分别为 $2 - 2 = 0$, f 作用后的两种系数也互相抵消, 所以 u 不变。最高权 2 向量可取 $w = v_1 \otimes v_0 - v_0 \otimes v_1$, 其 e 像为零。交换两因子固定 u , 把 w 送到 $-w$ 。因此 L_0 在对称部分, L_2 在交替部分。 $\square$

习题 14.6. 对 $m \geq 0$, 证明

$$\mathrm{Sym}^2 L_m \cong \bigoplus_{0 \leq j \leq \lfloor m/2 \rfloor} L_{2m-4j}, \quad \bigwedge^2 L_m \cong \bigoplus_{0 \leq j \leq \lfloor (m-1)/2 \rfloor} L_{2m-2-4j},$$

其中空和为零。

解. Clebsch–Gordan 分解给出各出现一次的 L_{2m-2a} , $0 \leq a \leq m$. 交换因子的映射 τ 与作用交换, 所以在每个不可约直和项上为标量 ± 1 . 其最高向量形如 $u_a = \sum_{i=0}^a c_i v_i \otimes v_{a-i}$. 条件 $eu_a = 0$ 给出

$$c_{i+1}(i+1)(m-i) + c_i(a-i)(m-a+i+1) = 0.$$

取 $c_0 \neq 0$, 所有系数由递推确定且非零; 把比值相乘, 分子与分母的连续乘积相消, 得 $c_a = (-1)^a c_0$. τu_a 的首项系数为 c_a , 故 τ 在该项上的标量为 $(-1)^a$. 偶数 a 留在对称平方, 奇数 a 留在外平方, 重写指标即得两式. $\square$

习题 14.7. 求 $\text{Sym}^2 L_3$ 、 $\wedge^2 L_3$ 及 $\wedge^3 L_3$ 的不可约分解。

解. 前两项由上一题得到 $L_6 \oplus L_2$ 和 $L_4 \oplus L_0$. L_3 的权为 $3, 1, -1, -3$, 三重外积的四个权分别为 $3, 1, -1, -3$, 各一次. 由完全可约性及最高权逐项相减, $\wedge^3 L_3 \cong L_3$. 维数分别为 $10, 6, 4$, 与对称、外幂的线性代数维数相符. $\square$

习题 14.8. 对自然共轭作用 $(x \cdot T)(v) = xT(v) - T(xv)$, 求 $\text{End}(L_m)$ 的不可约分解, 并指出其迹零子模。

解. 有 $\text{End}(L_m) \cong L_m \otimes L_m^* \cong L_m \otimes L_m$, 故

$$\text{End}(L_m) \cong L_{2m} \oplus L_{2m-2} \oplus \cdots \oplus L_0.$$

唯一的平凡直和项由恒等算子张成. 迹是到平凡模的同态, 在所有非平凡简单模上为零, 而恒等算子的迹为 $m+1 \neq 0$. 所以迹零子模恰为除 L_0 外的全部项; $m=0$ 时它为零. $\square$

习题 14.9. 求 $\text{Hom}(L_m, L_n)$ 在上述 Hom 作用下的不变子空间, 并说明 $L_m \otimes L_n$ 中平凡模出现的条件与重数。

解. 不变条件为 $xT = Tx$ 对全部 x 成立, 即 T 为模同态. 不同最高权的不可约模之间同态为零, 同一不可约模的自同态为标量, 所以维数为 δ_{mn} . 再用 $L_m^* \cong L_m$, 这也等于张量积中平凡模的重数. 因此恰在 $m=n$ 时出现一次. $\square$

习题 14.10. 设 V 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模. 证明其表示忠实, 当且仅当它含有至少一个非平凡不可约直和项。

解. 若全部直和项都是 L_0 , 作用为零, 不忠实. 若某个 L_m 满足 $m > 0$, 则 h 在其最高向量上按非零标量 m 作用, 所以表示非零. 其核为 $\mathfrak{sl}_2$ 的理想, 而这个 Lie 代数是单的, 非零表示的核只能为零. 这里的忠实性是 Lie 代数表示的性质, 不直接回答某个 Lie 群表示的核. $\square$

习题 14.11. 设幂零算子 E 的 Jordan 块大小为 $4, 2, 1$. 依正文方法构造三元组后, 列出 H 的全部特征值, 求 $\text{rank } E$ 及 $\text{rank } E^2$.

解. 三条 Jordan 链分别成为 L_3, L_1, L_0 , 故 H 的权为 $3, 1, -1, -3; 1, -1; 0$. 大小为 a 的幂零块的 k 次幂秩为 $\max(a-k, 0)$, 因此 $\text{rank } E = 3 + 1 = 4$, $\text{rank } E^2 = 2$. 总维数为 7 , 每条权链的权和为零. $\square$

习题 14.12. 设 J_a, J_b 为大小分别为 $a, b \geq 1$ 的幂零单 Jordan 块。证明 $J_a \otimes I_b + I_a \otimes J_b$ 的 Jordan 块大小依次为

$$a+b-1, a+b-3, \dots, |a-b|+1.$$

解. 把两个 Jordan 块分别补成 L_{a-1}, L_{b-1} 上的上升算子。张量积中的上升算子正是题中的矩阵和。Clebsch-Gordan 分解给出

$$L_{a-1} \otimes L_{b-1} = \bigoplus_{j=0}^{\min(a,b)-1} L_{a+b-2-2j}.$$

每个 L_s 上的上升算子只有一个大小为 $s+1$ 的 Jordan 块, 因为沿整条权链的非端点系数均非零。于是得到所列块大小。□

习题 14.13. 对上一题的 $a=3, b=4$, 求矩阵和的核维数、秩以及平方的秩。若把第一个加数乘以任意非零复数 c , 答案是否改变?

解. Jordan 块大小为 6, 4, 2, 故核维数为 3, 秩为 $5+3+1=9$, 平方的秩为 $4+2+0=6$ 。 cJ_3 与 J_3 通过对 Jordan 链逐级缩放同构, 因此 $cJ_3 \otimes I + I \otimes J_4$ 与原矩阵和共轭, 答案不变。□

习题 14.14. 设 V 的不可约类型只有 L_0, L_2, L_3 , 每类均出现。用 $C = h^2 + 2h + 4fe$ 显式写出三个等型投影, 并说明投影的迹给出什么。

解. 三个特征值为 0, 8, 15, 所以

$$P_0 = \frac{(C-8I)(C-15I)}{120}, \quad P_2 = -\frac{C(C-15I)}{56}, \quad P_3 = \frac{C(C-8I)}{105}.$$

它们在各个特征值上的取值为相应的零或一, 故互相正交、和为恒等。投影的迹等于像的维数; 把三个投影的迹分别除以 1, 3, 4, 便得到三个类型的重数。□

习题 14.15. 证明张量积上的 Casimir 算子为

$$C_{V \otimes W} = C_V \otimes I + I \otimes C_W + 2h \otimes h + 4(f \otimes e + e \otimes f).$$

对 $L_1 \otimes L_1$, 证明它等于 $4(I + \tau)$, 其中 τ 交换两因子。

解. 将 h 换成 $h \otimes I + I \otimes h$, e, f 作同样替换, 展开 $h^2 + 2h + 4fe$ 即得公式。在 $L_1 \otimes L_1 = L_2 \oplus L_0$ 上, Casimir 分别为 8, 0, 而 τ 在对称部分 L_2 为 1, 在交替部分 L_0 为 -1。两算子在整个直和分解上作用一致, 所以相等。□

习题 14.16. 在全次数为 m 的二元齐次多项式模型中, 把不变双线性型归一为 $B(x^m, y^m) = 1$ 。求 $B(x^{m-i}y^i, x^iy^{m-i})$, 并说明其他单项式何时可有非零配对。

解. h 不变性迫使两个权之和为零, 所以只有指数 i, j 满足 $i+j=m$ 时可能非零。由 $v_i = m!x^{m-i}y^i/(m-i)!$ 及正文的 $B(v_i, v_{m-i}) = (-1)^i$, 转换到单项式后再按首末配对归一, 得到

$$B(x^{m-i}y^i, x^iy^{m-i}) = \frac{(-1)^i}{\binom{m}{i}}.$$

直接代入 $f = y\partial_x$ 也得到相邻系数递推 $(m-i)B_{i+1} + (i+1)B_i = 0$, 与这个答案相同。□

习题 14.17. 利用 L_2, L_3 上的不变型, 分别构造 $\mathfrak{sl}_2 \rightarrow \mathfrak{so}_3$ 和 $\mathfrak{sl}_2 \rightarrow \mathfrak{sp}_4$ 的单射, 并判断其中哪个是同构。

解. L_2 上的非退化型对称, L_3 上的非退化型交替。不变性 $B(xv, w) + B(v, xw) = 0$ 说明作用矩阵分别落在保持该型的正交、辛 Lie 代数中。两个表示均非平凡, 由单性可知同态都单射。 $\dim \mathfrak{so}_3 = 3 = \dim \mathfrak{sl}_2$, 故第一个为同构; $\dim \mathfrak{sp}_4 = 10$, 故第二个是严格包含。□

习题 14.18. 设 $m, n \geq 1$ 。对次数为 m, n 的齐次多项式 P, Q , 定义

$$\Omega(P, Q) = \frac{\partial P}{\partial x} \frac{\partial Q}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial y} \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

证明它诱导满的 $\mathfrak{sl}_2$ 同态 $L_m \otimes L_n \rightarrow L_{m+n-2}$, 并描述其核的不可约类型。

解. 输出的全次数为 $m+n-2$ 。对 $h = x\partial_x - y\partial_y$, 两项都各有一个降低权的偏导数和一个升高权的偏导数, 所以 $h\Omega(P, Q) = \Omega(hP, Q) + \Omega(P, hQ)$ 。对 $e = x\partial_y$, 利用 $[e, \partial_x] = -\partial_y, [e, \partial_y] = 0$, 额外的两个 $\partial_y P \partial_y Q$ 项符号相反而抵消, 得到同样的导子相容式。对 $f = y\partial_x$, 交换 x, y 后同理成立。又 $\Omega(x^m, y^n) = mn x^{m-1} y^{n-1} \neq 0$, 所以像是目标不可约模中的非零子模, 即为整个目标。Clebsch-Gordan 分解中目标类型只出现一次, 因此核为除 L_{m+n-2} 以外的全部直和项。□

习题 14.19. 在 L_m 中计算 $\text{tr}(h^2)$ 和 $\text{tr}(ef)$, 并求迹型 $B_m(x, y) = \text{tr}_{L_m}(xy)$ 与 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Killing 型之间的比例。

解. 权求和给出

$$\text{tr}(h^2) = \sum_{i=0}^m (m-2i)^2 = \frac{m(m+1)(m+2)}{3}.$$

而 $efv_i = (i+1)(m-i)v_i$, 故 $\text{tr}(ef) = m(m+1)(m+2)/6$ 。其余基本配对除 fe 外均为零; 与 $\kappa(h, h) = 8, \kappa(e, f) = 4$ 比较, 得到

$$B_m = \frac{m(m+1)(m+2)}{24} \kappa.$$

$m=0$ 时两项计算都为零, 符合平凡表示。□

习题 14.20. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 中取

$$E = E_{12} + E_{23}, \quad F = 2E_{21} + 2E_{32}, \quad H = \text{diag}(2, 0, -2).$$

验证它们构成三元组; 把 $\mathfrak{sl}_3$ 限制为这个三元组的伴随模, 求不可约分解和 E 在 $\mathfrak{sl}_3$ 中的中心化子。

解. 基本矩阵括号给出三条标准关系。自然三维模为 L_2 , 故 $\text{End}(\mathbb{C}^3) = L_4 \oplus L_2 \oplus L_0$; 去掉标量矩阵, 得到 $\mathfrak{sl}_3 = L_4 \oplus L_2$ 。也可直接看见两个最高向量: E_{13} 权为 4, 而 E 权为 2, 它们都与 E 交换。每个不可约直和项的上升算子核一维, 所以中心化子为 $\mathbb{C}E + \mathbb{C}E_{13}$, 维数为 2。□

习题 14.21. 求自然二维模 L_1 的 n 次张量幂中平凡模的重数。

解. 若 n 为奇数, 全部权都是奇数, 没有零权, 所以平凡模重数为零。若 $n = 2r$, 权 0 的重数为 $\binom{2r}{r}$, 权 2 的重数为 $\binom{2r}{r-1}$ 。两者相减便得到

$$[L_1^{\otimes 2r} : L_0] = \binom{2r}{r} - \binom{2r}{r-1} = \frac{1}{r+1} \binom{2r}{r}.$$

公式也涵盖 $r = 0$, 零次张量幂为一维平凡模。 $\square$

习题 14.22. 构造一个可约的有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模, 使每个权空间都一维。再构造一个全部权同奇偶、但仍可约的例子。说明单链判据中两个假设各有什么作用。

解. $L_2 \oplus L_1$ 的权为 $2, 1, 0, -1, -2$, 各重数为 1, 但它分成两个非零子模; 其权不在同一集合 $d + 2\mathbb{Z}$ 中。 $L_2 \oplus L_0$ 的权全为偶数, 但零权空间二维, 也可约。同奇偶使两个不可约直和项必在权 0 或权 1 相遇; 一维性再排除这种相遇, 两者须共同使用。 $\square$

习题 14.23. 设 V, W 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模, 且对所有整数 $j \geq 0$ 有 $\text{rank}(e^j|_V) = \text{rank}(e^j|_W)$ 。证明 $V \cong W$, 并给出从这些秩恢复各不可约重数的公式。

解. 在 L_m 上, e 为大小 $m+1$ 的单 Jordan 块。令 $r_j = \text{rank } e^j$, 则 $r_{j-1} - r_j$ 等于大小至少为 j 的 Jordan 块数。所以大小恰为 $m+1$ 的块数, 即 L_m 的重数, 为

$$r_m - 2r_{m+1} + r_{m+2}.$$

所有这些二阶差分由题设相同, 故两个模的不可约重数逐一相同。 $\square$

第十五章 泛包络代数与 PBW 定理

本章构造 Lie 代数的泛包络代数，证明 PBW 定理及有序单项式基，随后研究伴随分次和 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Verma 模。

本章目标

- 用泛性质构造包络代数同态，区分商代数、商模与左理想关系。
- 分别证明 PBW 重排的终止性、重叠相容性与有序单项式的线性无关性。
- 运用滤过和主符号计算维数、判断零因子，并进行具体有序单项式计算。
- 用右自由性证明诱导的正合性，理解 Verma 模为何非零且通常无限维。

在 $\mathfrak{sl}_2$ 中，生成元 e, f, h 满足 $ef - fe = h$ 。因此一个含 ef 的乘积可改写成含 fe 的乘积，却会多出一项次数更低的 h 。若继续重排更长的字，可能有几条不同的重排次序；它们必须给出相同结果，才谈得上由有序单项式构成基。把 Lie 括号译成结合代数中的交换关系后，这个问题便成为泛包络代数的核心。PBW 定理不仅说每个元素能重排，还要证明重排后的表达不会暗含新的线性关系。

本章需要张量代数、滤过与伴随分次的基本定义，以及已经介绍的 Lie 代数表示和 $\mathfrak{sl}_2$ 算子关系。PBW 主定理允许任意底域；只有对称化公式以及后面的复最高权例子另有特征零条件。

有序基与包络代数的经典证明可参阅 Humphreys[8, Sections 17.3–17.4, pp. 91–94]。本章通过相邻重排及 Jacobi 恒等式处理重叠，直接证明 PBW 定理，再在所得基上计算 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Verma 模。这些构造也将用于后面的最高权分类。

15.1 泛包络代数

一个 Lie 代数表示只要求括号相容，而作用算子及其乘积属于自同态结合代数。泛包络代数以 Lie 代数为生成元，以 Lie 括号为乘法关系，使这些乘积可以在同一个代数中计算。取商构造之后，还须证明原 Lie 代数到泛包络代数的自然映射是单射；这将由 PBW 定理得到。

15.1.1 张量代数按 Lie 括号关系取商

设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上 Lie 代数。张量代数

$$T(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{r \geq 0} \mathfrak{g}^{\otimes r}, \quad \mathfrak{g}^{\otimes 0} = k,$$

以张量拼接为乘法，是由向量空间 $\mathfrak{g}$ 自由生成的含么结合代数。给定线性映射 $\mathfrak{g} \rightarrow A$ ，把纯张量送到各因子像的乘积，就唯一得到一个含么代数同态 $T(\mathfrak{g}) \rightarrow A$ 。

定义 15.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, 记 $T(\mathfrak{g})$ 为其底层 k 向量空间的张量代数。令 I 为 $T(\mathfrak{g})$ 中由

$$x \otimes y - y \otimes x - [x, y] \quad (x, y \in \mathfrak{g})$$

生成的双边理想, 其中 $[x, y]$ 看作次数一的张量。代数

$$U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I$$

称为 $\mathfrak{g}$ 的**泛包络代数** (universal enveloping algebra)。次数一部分的自然映射记为 $\iota: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 。

由关系立即得到 $\iota([x, y]) = \iota(x)\iota(y) - \iota(y)\iota(x)$, 所以 ι 是到 $U(\mathfrak{g})$ 的 Lie 代数同态, 其单射性将在 PBW 定理中证明。将全部正次数张量送到零的增广映射零化 I , 故 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow k$ 保持单位, 特别地, $U(\mathfrak{g})$ 的单位非零。

关系含有次数二与次数一的两部分, 所以商一般不是由张量次数直接得到的分次代数。不过, “次数不超过 r ” 的子空间仍能传到商中, 下一节将用这个滤过研究它。

15.1.2 泛包络代数的泛性质

定理 15.1.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, A 为含么结合 k 代数, A^- 为其交换子 Lie 代数, $\iota: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数的自然映射。对每个 Lie 代数同态 $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow A^-$, 存在唯一含么 k 代数同态 $\tilde{\phi}: U(\mathfrak{g}) \rightarrow A$, 使 $\tilde{\phi}\iota = \phi$ 。也就是说, 下图在底层 k 向量空间上交换, 虚线额外要求为含么代数同态, 并在这一要求下唯一:

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{\iota} & U(\mathfrak{g}) \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & A \end{array}$$

证明. 先由张量代数的自由性延拓 ϕ 。因为 ϕ 保持括号, 每个关系元的像为 $\phi(x)\phi(y) - \phi(y)\phi(x) - \phi([x, y]) = 0$ 。所以延拓零化双边理想 I , 下降到商。 $U(\mathfrak{g})$ 由单位和 $\iota(\mathfrak{g})$ 生成, 因此这些生成元上的值唯一决定代数同态。 $\square$

这就是泛包络代数的泛性质。它也使构造对同态自然: Lie 代数同态 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{l}$ 唯一诱导 $U(f): U(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{l})$, 复合与恒等都因唯一性而保持。是否把单射映成单射, 不能仅从泛性质推出; PBW 将另外给出这一结论。

命题 15.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ 为理想, $\iota: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数的自然映射。令 J 为 $U(\mathfrak{g})$ 中由 $\iota(\mathfrak{a})$ 生成的双边理想, 则

$$U(\mathfrak{g}/\mathfrak{a}) \cong U(\mathfrak{g})/J.$$

证明. 映射 $\mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})/J$ 零化 $\mathfrak{a}$, 故通过商 Lie 代数分解, 再由泛性质延拓为左边到右边的同态。反过来, 商映射 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 诱导的包络代数同态零化 J , 得到右边到左边的同态。两复合都在单位及来自 $\mathfrak{g}$ 的生成元上为恒等, 所以互逆。 $\square$

若 $\mathfrak{g}$ 交换, 定义中的关系只是让两个生成元交换, 因而 $U(\mathfrak{g}) = \text{Sym}(\mathfrak{g})$ 。特别地, 一维交换 Lie 代数的包络代数是 $k[t]$, 其表示可以由任意线性算子给出, 不存在类似有限循环群关系 $T^n = I$ 的限制。

15.1.3 Lie 代数模与包络代数模

定理 15.1.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数, $\iota: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数的自然映射。左 $\mathfrak{g}$ 模与么性左 $U(\mathfrak{g})$ 模给出同一个范畴: 在相同 k 向量空间上, 作用通过 ι 限制或按泛性质唯一延拓; 同态、子模、商模与正合列均保持。

证明. 一个 Lie 代数表示 $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是到结合代数 $\text{End}_k(V)$ 的交换子 Lie 代数的同态, 故由定理 15.1.2 唯一延拓为 $U(\mathfrak{g})$ 的么作用。反向限制显然恢复表示条件, 唯一性使两种过程互逆。一个线性映射若与全部 $\rho(x)$ 交换, 就与它们的有限乘积及线性组合交换, 即与整个包络代数作用交换。所以两种同态相同, 子空间的不变性也相同, 核、商及正合性因而不改变。□

这并不把 Lie 代数中的单个元素与包络代数中的任意元素混为一谈。例如在 $\mathfrak{sl}_2$ 模上, ef 、 h^2 或它们的和都是自然的算子, 但一般不是某个 Lie 代数元素的作用。上一章的 Casimir 算子正需要这种乘积; 现在可以把它看成一个与具体表示无关的代数元素。

15.2 滤过与 PBW

张量次数在关系中可以下降, 却不会上升。把这种现象写成滤过后, 原来的非交换乘法在最高次上变成交换乘法。PBW 定理进一步断言: 在最高次上, 除了交换关系以外没有新的关系。

15.2.1 标准滤过

令 $F_d U(\mathfrak{g})$ 为长度不超过 d 的张量在商中的像, $d \geq 0$, 并令 $F_{-1} = 0$ 。则

$$F_0 = k, \quad F_d F_e \subseteq F_{d+e}, \quad U(\mathfrak{g}) = \bigcup_{d \geq 0} F_d.$$

这称为标准滤过。伴随分次代数为

$$\text{gr } U(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{d \geq 0} F_d / F_{d-1}.$$

由基本关系 $\iota(x)\iota(y) - \iota(y)\iota(x) = \iota([x, y]) \in F_1$, 两个次数一的主符号交换。更一般地, 利用 $[ab, c] = a[b, c] + [a, c]b$ 逐次展开, 可得

$$[F_d, F_e] \subseteq F_{d+e-1}.$$

因此伴随分次代数交换, 次数一的符号给出满同态

$$\text{Sym}(\mathfrak{g}) \longrightarrow \text{gr } U(\mathfrak{g}).$$

满射只说明最高次的生成性; 它是否单射, 正是下面要证明的内容。

15.2.2 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理

这个定理以庞加莱、伯克霍夫与维特命名。¹

定理 15.2.1 (Poincaré–Birkhoff–Witt). 设 $\mathfrak{g}$ 为任意域 k 上的 Lie 代数, 并选定一组带全序的基 $(x_i)_{i \in I}$, 其中 I 为全序指标集. 记 $\iota: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 为自然映射, 并按乘积长度给 $U(\mathfrak{g})$ 取张量次数滤过. 在 $U(\mathfrak{g})$ 中, 单位与全部有序单项式

$$\iota(x_{i_1}) \cdots \iota(x_{i_r}), \quad r \geq 1, \quad i_1 \leq \cdots \leq i_r,$$

构成一组 k 基. 因此自然映射 $\text{Sym}(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{gr } U(\mathfrak{g})$ 是分次代数同构, $\iota: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 单射. 证明. 在张量代数的字上, 遇到逆序的相邻因子 $x_j x_i$ 、 $j > i$, 便使用重排

$$x_j x_i \mapsto x_i x_j + [x_j, x_i],$$

把右端括号按所选基展开. 对一个字, 先比较长度, 再比较逆序对数. 交换项保持长度而减少一个逆序对, 括号项长度减少一; 因此每条重写分支都终止. 原字长度固定, 较短字的逆序数也有统一上界, 每次括号又只有有限个基系数, 所以整个重写只有有限项. 下面证明结果与选择哪一对先重排无关. 对长度及逆序数作归纳. 两次重排若发生在不相交的位置, 分别展开两处会给出相同的四组项; 归纳假设保证其余较小项继续重排的结果相同. 唯一的重叠情形是三个相邻基元 $x_k x_j x_i$ 、 $k > j > i$. 先处理左边再继续交换, 得到

$$x_i x_j x_k + [x_j, x_i] x_k + x_j [x_k, x_i] + [x_k, x_j] x_i;$$

先处理右边, 则得到

$$x_i x_j x_k + x_i [x_k, x_j] + [x_k, x_i] x_j + x_k [x_j, x_i].$$

两式之差都是长度二的项. 在归纳中, 任意两个线性生成元 u, v 已满足 $\text{NF}(uv - vu) = \text{NF}([u, v])$: 先对基元检查所选次序, 再双线性延拓即可. 因此这个差的正规式等于

$$\text{NF}\left([x_j, x_i], x_k + [x_j, [x_k, x_i]] + [[x_k, x_j], x_i]\right) = 0$$

其中括号内的和由 Jacobi 恒等式为零. 若前后还有其他因子, 同样的差只含比原字短一的项, 故在相同归纳范围内. 这证明所有重写选择相容, 给出到有序字空间的线性正规式映射 NF . 每次重排之差都属于定义理想 I , 所以任意字与其正规式模 I 相同. 反过来, 对于任意字 u, v 及基元 x_i, x_j ,

$$\text{NF}\left(u(x_j x_i - x_i x_j - [x_j, x_i])v\right) = 0,$$

因为中间的一次重排与随后正规化相容. 由双线性及理想生成性, $I \subseteq \ker \text{NF}$. 有序字被 NF 原样保留, 所以任何属于 I 的有序字线性组合都只能是零. 这同时证明它们在商中生成并线性无关. 按长度分组, 长度恰为 d 的这些基元给出 F_d/F_{d-1} 的基, 与对称代数的单项式基对应, 故自然满射为同构. 长度一的基元因此仍线性无关, 得到 ι 单射. $\square$

¹ 庞加莱 (Henri Poincaré, 1854-1912) 是法国数学家, 研究拓扑、动力系统及数学物理; 加勒特·伯克霍夫 (Garrett Birkhoff, 1911-1996) 与维特 (Ernst Witt, 1911-1991) 分别是美国和德国数学家, 研究代数结构.

这称为 PBW 定理。证明只使用交替性、Jacobi 及重排，没有除以整数，所以不需要特征零。以下在不会混淆时省去 ι ，把 $\mathfrak{g}$ 作为 $U(\mathfrak{g})$ 的线性子空间。

15.2.3 伴随分次与对称代数

推论 15.2.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 n 维 Lie 代数， $F_d U(\mathfrak{g})$ 为其泛包络代数中由长度不超过整数 $d \geq 0$ 的乘积生成的 k 子空间，其中长度零的乘积是单位。则

$$\dim F_d U(\mathfrak{g}) = \binom{n+d}{n} \quad (d \geq 0),$$

且 $U(\mathfrak{g})$ 没有零因子。若 $\mathfrak{g} \neq 0$ ，则 $U(\mathfrak{g})$ 无限维。

证明. PBW 基把问题化为计算 n 个变量中全次数不超过 d 的单项式数；加一个记录剩余次数的变量后，用非负整数解计数得到 $\binom{n+d}{n}$ 。 $n=0$ 时两侧均为一。若 $u, v \neq 0$ ，取它们在标准滤过中的最高次主符号。由 PBW，伴随分次是多项式整环，两个非零主符号的乘积不为零，所以 $uv \neq 0$ 。若 $n \geq 1$ ，某个基元的任意不同次幂都是 PBW 基元，故代数无限维。□

命题 15.2.3. 设 k 为特征零域， $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数， $\text{Sym}(\mathfrak{g})$ 为其对称代数。对整数 $r \geq 0$ 及 $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{g}$ ，在右端通过自然映射把各 x_i 看作 $U(\mathfrak{g})$ 中的元素，则对称化公式

$$\text{sym}(x_1 \cdots x_r) = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} x_{\sigma(1)} \cdots x_{\sigma(r)}$$

给出 $\text{Sym}(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 的滤过向量空间同构。它与伴随作用相容，但一般不是代数同构。

证明. 右端对 $x_1, \dots, x_r$ 对称且多线性，故由对称幂的泛性质良定义。其最高次符号等于 $x_1 \cdots x_r$ ，所以诱导的分次映射为恒等。对每个有限次数按滤过归纳，先匹配最高次，再处理较低次，即得满射；非零核元的最高次不可能映为零，故单射。伴随作用在张量乘积上按导子规则逐项作用，并与排列因子交换，所以对称化保持作用。若它是代数同态，则应将 $xy = yx$ 送成 $xy = yx$ 于 $U(\mathfrak{g})$ ；PBW 的单射性会迫使原括号全部为零。因此在非交换 Lie 代数上它不是代数同态。□

15.2.4 有序单项式与重排引理

PBW 的重排证明分为三步：每次操作降低复杂度，故过程终止；Jacobi 恒等式使三重重叠相容，故正规式不依赖重排次序；正规式原样保留有序字，从而得到线性无关性。单凭重排能写出有序字的线性组合，还只能证明生成性。

例如对三个逆序元 x_k, x_j, x_i ，两种重排留下的二次差分别包含 $[x_j, x_i]x_k - x_k[x_j, x_i]$ 等项。这里必须把这些差继续化为括号，才能使用 Jacobi。若把原关系改为任意二次与一次项的组合而不检查这一步，可能会产生额外低次关系，使原来的生成元也线性相关。

第二卷的非交换重写与 Diamond 引理提供了另一种组织重叠检查的方法。对于以有序生成元表示的具体元素，依次重排即可得到 PBW 系数。

15.3 具体计算

有序单项式基使元素的坐标和乘积都可以直接计算。先固定次序，再按交换关系重排，并保留每次交换产生的低次项；漏掉括号项会改变元素。伴随导子也与这种重排相容，后面将用这一性质证明最高权商模上的局部幂零性。

15.3.1 有序单项式

设 $\mathfrak{g}$ 有有序基 $x_1 < \cdots < x_n$ 。PBW 使每个元素唯一写成有限和

$$u = \sum_{a_1, \dots, a_n \geq 0} c_{a_1, \dots, a_n} x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}.$$

相邻逆序替换是求这些系数的算法；最高次数的部分按交换多项式相乘，而低次数由 Lie 括号补正。特别地，PBW 是向量空间基定理，不表示这些 x_i 在 $U(\mathfrak{g})$ 中已经交换。

命题 15.3.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数， $x \in \mathfrak{g}$ ，并假设 $\text{ad } x$ 在 $\mathfrak{g}$ 上局部幂零，即对每个 $y \in \mathfrak{g}$ ，都存在整数 $a \geq 1$ 使 $(\text{ad } x)^a y = 0$ 。则 $\text{ad } x$ 在泛包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 上的导子延拓也局部幂零。在此假设下，若左 $\mathfrak{g}$ 模 V 由向量 $v \in V$ 生成，且 $x^b v = 0$ 对某个整数 $b \geq 1$ 成立，则 x 在整个 V 上局部幂零。

证明. 记 $D(u) = xu - ux$ 。它是结合代数的导子，且在 $\mathfrak{g}$ 上就是给定的伴随作用。对一个乘积 $y_1 \cdots y_r$ ，选 $a_i \geq 1$ 使 $D^{a_i} y_i = 0$ 。反复使用 Leibniz 规则， D^N 的每项是在各因子上分别作用 j_i 次、且 $\sum_i j_i = N$ 的乘积。若 $N > \sum_i (a_i - 1)$ ，至少一个 $j_i \geq a_i$ ，该项为零。线性组合只有有限项，故 D 在每个包络代数元素上局部幂零。再由 $xu = D(u) + ux$ ，对 N 归纳得到

$$x^N u = \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} D^j(u) x^{N-j}.$$

若 $D^a(u) = 0$ 、 $x^b v = 0$ ，取 $N \geq a + b - 1$ ，每项或有 $j \geq a$ ，或有 $N - j \geq b$ ，于是 $x^N uv = 0$ 。 V 中元素为有限个 uv 的线性组合，取各个界的最大值即可。□

这个证明不要求一个统一的幂同时零化整个包络代数；指数可以依赖具体元素。后面构造有限维最高权模时，先在最高向量上加幂关系，再借本命题将局部幂零性传到它生成的整个模。

15.3.2 $\mathfrak{sl}_2$ 的包络代数

对 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ ，选择次序 $f < h < e$ 。则

$$\{f^a h^b e^c \mid a, b, c \geq 0\}$$

为 $U(\mathfrak{sl}_2)$ 的基。三个基本重排为

$$ef = fe + h, \quad eh = (h - 2)e, \quad hf = f(h - 2).$$

例如

$$efh = f(h - 2)e + h^2, \quad e^2 f = fe^2 + 2(h - 1)e.$$

第二式由 $e(e f) = e(f e + h)$ 展开, 再把 eh 按规则重排得到。

引理 14.2.2 的算子恒等式同样是包络代数中的恒等式:

$$e f^r = f^r e + r f^{r-1}(h - r + 1) \quad (r \geq 1).$$

它的原证明只用了三个交换关系, 故可以在当前结合代数里原样进行。以 $r = 2$ 继续计算, 可得

$$\begin{aligned} e^2 f^2 &= e(f^2 e + 2f(h - 1)) \\ &= f^2 e^2 + 2f(h - 1)e + 2(fe + h)(h - 1) \\ &= f^2 e^2 + 4f(h - 2)e + 2h(h - 1). \end{aligned}$$

末式已是所选次序下的表达。这里的低次项在具体表示上可能与高次项相消, 但在包络代数本身并没有消失。

15.3.3 Casimir 元的例子

命题 15.3.2. 记 $\mathfrak{sl}_2 = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, E_{ij} 为矩阵单位, 取标准基 $e = E_{12}$ 、 $f = E_{21}$ 、 $h = E_{11} - E_{22}$, 并通过自然映射把它们看作泛包络代数的元素。在 $U(\mathfrak{sl}_2)$ 中, 元素

$$C = h^2 + 2h + 4fe = h^2 - 2h + 4ef$$

属于中心。对任意复 $\mathfrak{sl}_2$ 模 V , 若 $v \in V \setminus \{0\}$ 、 $\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 $ev = 0$ 、 $hv = \lambda v$, 则 C 在 v 上作用为 $\lambda(\lambda + 2)$; 如果整个模由 v 生成, 同一个标量作用遍及整个模。

证明. 两个表达式由 $ef - fe = h$ 相等。引理 14.3.2 中的交换子计算只用这三条关系, 因此在包络代数中仍给出 $[e, C] = [f, C] = [h, C] = 0$ 。这三个元素生成整个结合代数, 所以 C 中央。最高向量 v 满足 $ev = 0$ 、 $hv = \lambda v$, 代入第一式即得标量; 对任意 u , 中央性使 $C(uv) = uCv = \lambda(\lambda + 2)uv$ 。□

PBW 还说明 C 不是一个标量元素: 它的最高次主符号为 $h^2 + 4fe$, 在交换多项式环中非零。一个中央元素在每个特定不可约模上可以成为标量, 不等于它在代数里本来就是标量。

若按 Killing 型取对偶基, 则对应的 Casimir 元是 $C/8$, 见上一章末的归一化计算。选择哪一种写法并不改变中央性, 但会改变其特征值常数。本编一般半单代数的公式将采用 Killing 归一化。

15.4 诱导模初步

子代数的表示可以借扩张标量诱导为较大 Lie 代数的表示。与有限群的诱导不同, 这样构造出的模通常无限维。PBW 给出所需的自由右模基, 由此可构造最高权模, 并证明其最高权向量非零。

15.4.1 子代数上的扩张标量

定理 15.4.1. 设 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为域 k 上 Lie 代数的子代数。自然映射 $U(\mathfrak{h}) \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 单射, 且 $U(\mathfrak{g})$ 是自由右 $U(\mathfrak{h})$ 模。对左 $\mathfrak{h}$ 模 M , 定义

$$\mathrm{Ind}_{\mathfrak{h}}^{\mathfrak{g}} M = U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{h})} M,$$

其中 $\mathfrak{g}$ 通过第一因子左乘作用。对任意左 $\mathfrak{g}$ 模 V , 记 $V|_{\mathfrak{h}}$ 为限制到 $\mathfrak{h}$ 的模, 则有自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(\mathrm{Ind}_{\mathfrak{h}}^{\mathfrak{g}} M, V) \cong \mathrm{Hom}_{\mathfrak{h}}(M, V|_{\mathfrak{h}}).$$

诱导函子保持正合列, 且 $M \rightarrow \mathrm{Ind}_{\mathfrak{h}}^{\mathfrak{g}} M$ 、 $m \mapsto 1 \otimes m$ 单射。

证明. 把 $\mathfrak{h}$ 的基扩为 $\mathfrak{g}$ 的基, 排序时令补充基元在前, 子代数的基元在后。PBW 先说明子代数的有序单项式在大代数中仍独立, 所以自然映射单射; 又说明每个大代数基元唯一写成一个补充基元有序单项式乘以一个 $U(\mathfrak{h})$ 基元。这正给出自由右模基, 其中包括空单项式一。伴随同构把 F 送到 $m \mapsto F(1 \otimes m)$ 。反向把 $\mathfrak{h}$ 同态 T 送到 $u \otimes m \mapsto u \cdot T(m)$; T 与 $U(\mathfrak{h})$ 作用相容, 保证公式对张量关系良定义。两者直接互逆并自然。右自由性使诱导的底层向量空间为若干份 M 的直和, 故保持正合性; 空单项式对应的直和分量正好给出所列单射。□

例如从零子代数的平凡一维模诱导得到 $U(\mathfrak{g})$ 本身。只要 $\mathfrak{g} \neq 0$, 它就无限维。诱导的泛性质先构造所有可能的作用, 有限维性往往要靠随后取商和加入额外关系获得。

15.4.2 三角分解的动机

命题 15.4.2. 设域 k 上的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 作为向量空间分解为

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{n}^- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+,$$

其中三项都是子代数。则乘法给出向量空间同构

$$U(\mathfrak{n}^-) \otimes_k U(\mathfrak{h}) \otimes_k U(\mathfrak{n}^+) \longrightarrow U(\mathfrak{g}).$$

若另有 $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+$ 为子代数, 则 $U(\mathfrak{g}) \cong U(\mathfrak{n}^-) \otimes_k U(\mathfrak{b})$ 作为右 $U(\mathfrak{b})$ 模相容。

证明. 分别取三项的有序基, 并按负、零、正的次序合并。PBW 给出的有序字恰好是三段有序字的乘积, 因此乘法把左边的张量积基双射到右边的基。若后两项合成子代数, 按同一分组即可得到右模陈述。□

这个同构一般不是结合代数同构, 因为三段之间的元素未必交换。它的作用是把自由方向和将要规定作用的方向分开。若 $\mathfrak{h}$ 交换、 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{n}^+] \subseteq \mathfrak{n}^+$, 任意线性泛函 $\lambda: \mathfrak{h} \rightarrow k$ 都给出 $\mathfrak{b}$ 的一维模: $\mathfrak{h}$ 按 λ 作用, $\mathfrak{n}^+$ 按零作用。诱导以后, 底层向量空间便是 $U(\mathfrak{n}^-)$ 。

在 $\mathfrak{sl}_2$ 中可取 $\mathfrak{n}^- = \mathbb{C}f$ 、 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h$ 、 $\mathfrak{n}^+ = \mathbb{C}e$ 。这正是次序 $f < h < e$ 的来源。一般半单 Lie 代数中的三项, 将在根分解中由负根、Cartan 子代数和正根构成; 本命题只用给定的子空间分解, 没有预先假定那套结构存在。

15.4.3 诱导模与 Verma 模

定义 15.4.3. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$, 记 $\mathfrak{sl}_2 = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, E_{ij} 为矩阵单位, $e = E_{12}$, $h = E_{11} - E_{22}$, 令 $\mathfrak{b} = \mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}e$. 在一维复空间 $\mathbb{C}_\lambda$ 上规定 h 作用为 λ , e 作用为零, 得到一个左 $\mathfrak{b}$ 模。诱导模

$$M(\lambda) = U(\mathfrak{sl}_2) \otimes_{U(\mathfrak{b})} \mathbb{C}_\lambda$$

称为 $\mathfrak{sl}_2$ 的最高权为 λ 的 **Verma 模** (Verma module)。

由 PBW 三角分解, $M(\lambda)$ 有基 $v_j = f^j \otimes 1$, $j \geq 0$, 并满足

$$hv_j = (\lambda - 2j)v_j, \quad fv_j = v_{j+1}, \quad ev_j = j(\lambda - j + 1)v_{j-1}.$$

这些式子与有限模型相同, 但这里没有预先规定 $v_{m+1} = 0$ 。特别地, 最高向量 v_0 非零; 这由 PBW 证明, 而不是诱导记号本身的形式性质。

定理 15.4.4. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$, $M(\lambda)$ 为复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的最高权为 λ 的 Verma 模, v_λ 为其标准最高权生成元, 记 $v_j = f^j v_\lambda$, 其中 $f = E_{21}$, E_{21} 为矩阵单位。若 $\lambda \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 则 $M(\lambda)$ 简单。若 $\lambda = m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 则它唯一的非零真子模为

$$N_m = \text{span}_{\mathbb{C}}\{v_{m+1}, v_{m+2}, \dots\} \cong M(-m-2),$$

且 $M(m)/N_m \cong L_m$, 其中 L_m 为最高权 m 、维数 $m+1$ 的不可约复 $\mathfrak{sl}_2$ 模。列 $0 \rightarrow N_m \rightarrow M(m) \rightarrow L_m \rightarrow 0$ 不分裂。

证明. 任一非零子模中的非零向量只有有限多个权分量, 而 h 的权两两不同。对这一有限集合使用插值多项式, 便使子模包含某个 v_j 。如果 λ 不是非负整数, 所有升算子系数 $r(\lambda - r + 1)$, $r \geq 1$ 都非零, 所以能升到 v_0 , 再用 f 生成全部模, 证明简单。若 $\lambda = m$, 则 $ev_{m+1} = 0$, 所列尾部空间稳定; 在其中把 v_{m+1} 作为最高向量, 作用公式恰是最高权 $-m-2$ 的同一模型, 因此与 $M(-m-2)$ 同构且简单。任何真子模不能包含 v_j , $j \leq m$, 否则可升到 v_0 ; 若它非零, 就包含某个 $j \geq m+1$ 的 v_j , 再升到 v_{m+1} , 因而包含整个 N_m 。而商的前 $m+1$ 个基向量给出 L_m , 故没有其他非零真子模。最后, f 在 $M(m)$ 上单射, 在非零有限维模 L_m 上却幂零。若存在同态截面, 它的像会给出一个非零有限维子模, 与 f 单射而幂零的矛盾相冲突。因此列不分裂。□

这个例子也说明有限维条件的重要性: 有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模完全可约, 并不意味着所有包络代数模都完全可约。后面的一般最高权构造会采用相同方法, 先建立非零的诱导模, 再证明何时其简单商有限维。

本章小结

包络代数的定义只加入 $xy - yx = [x, y]$ 所要求的关系。泛性质把 Lie 代数作用唯一延拓为结合代数作用, 但不能单独保证原生成元仍然独立。PBW 定理通过重排的终止性、Jacobi 控制的相容性及正规式的独立性, 才完成这一点。

标准滤过使包络代数的最高次乘法成为交换乘法; 伴随分次与对称代数同构, 而包络代数本身一般仍不交换。主符号可用于增长与零因子判断, 对称化则在特征零时给出一个与伴随作用相容的向量空间同构。

子代数的包络代数嵌入较大的包络代数, PBW 进一步给出自由右模基, 所以扩张标量是正合的。诱导模通常无限维, $\mathfrak{sl}_2$ 的 Verma 模就是由一条无限下降链构成的。加入额外幂关系后可得到有限维简单商; 第十八章将把这种构造推广到一般复半单 Lie 代数。

群代数 kG 中的群元素 g 在张量积两因子上同时作用, 包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 中的 $x \in \mathfrak{g}$ 则按 $x(v \otimes w) = xv \otimes w + v \otimes xw$ 作用。第二十一章将用余乘法 $\Delta(g) = g \otimes g$ 和 $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$ 同时描述这两条规则。

习题

习题 15.1. 设 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有基 e, h , 满足 $[h, e] = e$, 底域任意。写出 $U(\mathfrak{g})$ 的生成关系与 PBW 基, 并证明 $he^m = e^m(h + m)$ 。

解. 生成关系为 $he - eh = e$ 。取 $e < h$, PBW 基为 $e^a h^b$, $a, b \geq 0$ 。由 $he = e(h + 1)$, 对 m 归纳: $he^{m+1} = e^m(h + m)e = e^{m+1}(h + m + 1)$ 。整数 m 在底域中取其像, 所以公式也适用于正特征。□

习题 15.2. 设 $[x, y] = z$, $[x, z] = [y, z] = 0$ 。在 $x < y < z$ 的 PBW 次序中求 $y^2 x^2$ 。

解. 先由 $yx = xy - z$ 得 $yx^2 = x^2 y - 2xz$ 。再左乘 y , 利用 z 中央:

$$y^2 x^2 = (x^2 y - 2xz)y - 2(xy - z)z = x^2 y^2 - 4xyz + 2z^2.$$

该式保留了重排产生的一次、二次括号贡献。□

习题 15.3. 证明 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow k$ 的含么代数同态, 与零化 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 的线性泛函 $\mathfrak{g} \rightarrow k$ 一一对应。对 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 写出全部这样的同态。

解. 目标结合代数交换, 所以限制到 $\mathfrak{g}$ 后必须将括号送到零; 反过来, 这样的泛函是到交换 Lie 代数 k 的 Lie 代数同态, 由泛性质唯一延拓。 $\mathfrak{sl}_2 = [\mathfrak{sl}_2, \mathfrak{sl}_2]$, 所以泛函只能为零, 包络代数同态只有增广映射。□

习题 15.4. 令 J 为 $U(\mathfrak{g})$ 中由全部交换子 $uv - vu$ 生成的双边理想。证明

$$U(\mathfrak{g})/J \cong \text{Sym}(\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]).$$

解. 商代数交换, 其中 $[x, y] = xy - yx = 0$, 故来自 $\mathfrak{g}$ 的映射通过其交换化。对称代数的泛性质给出右侧到左侧的同态。反过来, $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 再到其对称代数的映射保持 Lie 括号, 延拓到 $U(\mathfrak{g})$ 后零化所有结合交换子。两复合在生成元及单位上为恒等, 所以互逆。□

习题 15.5. 证明 $U(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{l}) \cong U(\mathfrak{g}) \otimes_k U(\mathfrak{l})$ 。说明为什么直和中两因子的括号为零恰是所需条件。

解. 把 $x \in \mathfrak{g}$ 送到 $x \otimes 1$, 把 $y \in \mathfrak{l}$ 送到 $1 \otimes y$, 两类像交换, 故定义 Lie 代数同态并延拓为包络代数同态。反向, 两份包络代数在 $U(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{l})$ 中的像互相交换, 所以乘法给出张量积到它的同态。两复合在两份生成元及单位上为恒等。若两因子的括号不为零, 张量积中的像却总交换, 就会丢掉该括号信息。□

习题 15.6. 设非零有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有一个非零有限维表示 V 。证明延拓 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}_k(V)$ 不可能单射。用 $\mathfrak{sl}_2$ 自然模说明这不妨碍 Lie 代数作用忠实。

解. PBW 使 $U(\mathfrak{g})$ 无限维, 而目标有限维, 所以线性映射有非零核。自然模中的 $\mathfrak{sl}_2$ 矩阵表示显然忠实, 但 e^2 在该模上作用为零; PBW 又说明 $e^2 \neq 0$ 于包络代数。因此两个忠实性问题不同。□

习题 15.7. 令 $\epsilon: U(\mathfrak{g}) \rightarrow k$ 为增广, $I = \ker \epsilon$ 。证明 $I/I^2 \cong \mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 。

解. I 由正长度单项式生成, 模 I^2 后只有长度一的生成元可能留下。因 $[x, y] = xy - yx \in I^2$, 得到满射 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \rightarrow I/I^2$ 。反向考虑平方零代数 $k \oplus \mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, 第二项的任意两个元素乘积为零。映射 $x \mapsto (0, \bar{x})$ 保持 Lie 括号, 延拓到包络代数后将 I^2 送到零, 从而给出所需逆映射。两边都由来自 x 的类生成, 所以确实互逆。□

习题 15.8. 若 $\mathfrak{g} \neq 0$ 且 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$, 证明增广理想 I 满足 $I = I^2 \neq 0$, 并说明 I -进滤过不分离。这是否与 PBW 矛盾?

解. 每个生成元 x 是括号的线性组合, 而每个括号在 $U(\mathfrak{g})$ 中属于 I^2 , 所以 $I \subseteq I^2$, 反向包含显然。PBW 保证某个非零 x 在 I 中仍非零。因此 $I^n = I$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 交集为 $I \neq 0$, 不分离。PBW 使用的是按单项式长度的递增标准滤过, 不是这个递减的增广理想滤过, 所以没有矛盾。□

习题 15.9. 设 $\mathfrak{g}$ 有限维。对主符号定义

$$\{\sigma_r(u), \sigma_s(v)\} = \sigma_{r+s-1}([u, v]).$$

证明它在 $\text{gr } U(\mathfrak{g})$ 上良定, 满足反对称性、Jacobi 和两变量的 Leibniz 法则, 并求它在次数一上的取值。

解. 若改变 u 的代表元, 差在 F_{r-1} , 与 v 的交换子就在 F_{r+s-2} , 故目标主符号不变; 另一变量同理。结合交换子满足反对称、Jacobi 及 $[u, vw] = [u, v]w + v[u, w]$, 逐式取所需最高次数符号便得到对应恒等式。次数一的 x, y 给出 $\{x, y\} = [x, y]_{\mathfrak{g}}$, 并按导子规则延拓到对称代数。这定义了次数降低一的 Poisson 括号², 虽伴随分次乘法交换, 原 Lie 括号的信息仍保留在此运算中。□

习题 15.10. 求 $\dim F_d U(\mathfrak{sl}_2)$ 及 $\dim F_d / F_{d-1}$, 并写出伴随分次的 Hilbert 级数。

解. 有序单项式为 $f^a h^b e^c$, 所以

$$\dim F_d = \binom{d+3}{3}, \quad \dim F_d / F_{d-1} = \binom{d+2}{2}.$$

三个指数独立给出生成函数 $\sum_{d \geq 0} \binom{d+2}{2} t^d = (1-t)^{-3}$ 。□

习题 15.11. 设底域特征零。将 $\text{sym}(x^2 y)$ 写成 $x^2 y$ 与含 Lie 括号的较低次项之和。

²泊松 (Siméon-Denis Poisson, 1781-1840), 法国数学家、物理学家, 研究分析、概率及力学; 力学中的泊松括号以他命名。

解. 六次排列中每个不同词出现两次, 所以 $\text{sym}(x^2y) = (x^2y + xyx + yx^2)/3$. 令 $z = [x, y]$, 则 $xyx = x^2y - xz$, $yx^2 = x^2y - xz - zx$. 因此

$$\text{sym}(x^2y) = x^2y - x[x, y] + \frac{1}{3}[x, [x, y]].$$

最高次仍是交换单项式 x^2y , 其余项分别降低到次数二和次数一. $\square$

习题 15.12. 在特征二的一维交换 Lie 代数中, 说明未除以阶乘的二次“对称化和” $x^2 \mapsto xx + xx$ 为什么不能代替正文的对称化同构。

解. 该和等于 $2x^2 = 0$, 而 x^2 在对称代数与包络代数中都非零. 所以未归一化的平均在次数二已经不是单射. 这里 PBW 仍成立, 失败的是依赖除以 $2!$ 的特定对称化公式. $\square$

习题 15.13. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 的 PBW 次序 $f < h < e$ 中求 e^2f^3 .

解. 先用 $ef^3 = f^3e + 3f^2(h-2)$, 再用 $ef^2 = f^2e + 2f(h-1)$:

$$\begin{aligned} e^2f^3 &= f^3e^2 + 3f^2(h-2)e + 3(f^2e + 2f(h-1))(h-2) \\ &= f^3e^2 + 6f^2(h-3)e + 6f(h-1)(h-2). \end{aligned}$$

其中 $e(h-2) = (h-4)e$, 不能在这一步把 e 与 h 当作交换. $\square$

习题 15.14. 在 $U(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 中令 $C = h^2 + 2h + 4fe$. 证明任意非零多项式 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 都满足 $p(C) \neq 0$.

解. 若 p 的次数为 r 、首项系数为 $a \neq 0$, 则 $p(C)$ 的最高次主符号为 $a(h^2 + 4fe)^r$, 次数 $2r$. PBW 将它置于多项式整环 $\mathbb{C}[f, h, e]$, 该元素非零. 因此 $p(C)$ 不可能为零, 得到一个多项式代数 $\mathbb{C}[C]$ 嵌入中心. $\square$

习题 15.15. 证明存在唯一反自同构 $S: U(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g})$, 满足 $S(x) = -x$ 对 $x \in \mathfrak{g}$ 成立, 且 $S^2 = 1$.

解. 将目标看成反代数. 在反代数中, $[-x, -y]_{\text{op}} = yx - xy = -[x, y]$, 所以 $x \mapsto -x$ 是 Lie 代数同态, 由泛性质延拓为到反代数的代数同态, 也就是反同态 S . 它满足 $S(x_1 \cdots x_r) = (-1)^r x_r \cdots x_1$. 两次作用在生成元及单位上为恒等, 故 $S^2 = 1$, 因此可逆. $\square$

习题 15.16. 证明赋值 $x \mapsto x \otimes 1 + 1 \otimes x$ 唯一延拓为代数同态 $\Delta: U(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g}) \otimes U(\mathfrak{g})$, 并证明 $(\Delta \otimes 1)\Delta = (1 \otimes \Delta)\Delta$. 说明它怎样产生张量模作用。

解. 不同张量因子的元素交换, 所以两像的括号为 $[x, y] \otimes 1 + 1 \otimes [x, y]$, 与指定赋值相容. 泛性质给出唯一延拓. 两个到三重张量积的同态都将 x 送到 $x \otimes 1 \otimes 1 + 1 \otimes x \otimes 1 + 1 \otimes 1 \otimes x$, 因而在全部生成元上相等, 也就在整个代数上相等. 把两个模的作用张量后与 Δ 复合, 便得到 $x(v \otimes w) = xv \otimes w + v \otimes xw$. $\square$

习题 15.17. 设 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为域上 Lie 代数, $M \neq 0$ 为 $\mathfrak{h}$ 模. 证明 $\text{Ind}_{\mathfrak{h}}^{\mathfrak{g}} M$ 必无限维, 即使 M 一维也如此。

解. 把子代数基扩成大代数基, 补充基元至少有一个 x . PBW 右自由模基包含互不相同的 $1, x, x^2, \dots$. 张量 M 后, 它们给出无穷多份非零的 M 直和, 所以诱导模无限维. 这个结论与底域特征无关. $\square$

习题 15.18. 设 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为子代数, M 为 $\mathfrak{a}$ 模. 构造并验证诱导的传递同构.

解. 同构为

$$U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{h})} (U(\mathfrak{h}) \otimes_{U(\mathfrak{a})} M) \longrightarrow U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{a})} M, \quad u \otimes (v \otimes m) \mapsto uv \otimes m.$$

两层平衡关系均由结合律保持, 所以良定. 逆为 $u \otimes m \mapsto u \otimes (1 \otimes m)$, 其平衡性来自 $a \otimes m = 1 \otimes am$ 于内层张量积. 两个复合利用外层平衡关系化为恒等, 且都保持左 $\mathfrak{g}$ 作用. $\square$

习题 15.19. 设 $\chi: \mathfrak{h} \rightarrow k$ 零化 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}]$, ∇_χ 为相应一维模. 证明诱导模同构于 $U(\mathfrak{g})$ 模掉由 $x - \chi(x)$, $x \in \mathfrak{h}$, 生成的左理想.

解. 映射 $u \mapsto u \otimes 1$ 满射到诱导模, 且 $u(x - \chi(x))$ 被送到零, 故通过所述左理想商. 反过来, 把 $u \otimes a$ 送到 $a[u]$; 因为商中 $[ux] = \chi(x)[u]$, 所以此式满足张量平衡关系. 两方向互逆. 关系只须允许左乘任意包络代数元素, 不是要求它们生成双边理想. $\square$

习题 15.20. 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 证明 $\mathfrak{sl}_2$ 在 $M(\lambda)$ 上的作用忠实, 但其包络代数作用不忠实.

解. Lie 代数作用的核为 $\mathfrak{sl}_2$ 的理想. f 在 PBW 基上向后移动, 作用非零, 所以核不是整个 Lie 代数; 单性迫使核为零. 但中央元素 $C - \lambda(\lambda + 2)$ 作用为零, 它在包络代数中非零, 因为主符号仍为 $h^2 + 4fe$. 因此包络代数作用不忠实. $\square$

习题 15.21. 在 $M(1)$ 中取最高向量 v , 令 $I = \{u \in U(\mathfrak{sl}_2) \mid uv = 0\}$. 证明 I 是左理想但不是右理想.

解. 若 $uv = 0$, 则 $(au)v = a(uv) = 0$, 故它是左理想. $e \in I$, 但 $efv = hv = v \neq 0$, 所以 $ef \notin I$. 因此 I 不封闭于右乘 f , 不是右理想, 更不是双边理想. $\square$

习题 15.22. 给出一个正合诱导函子把简单模送到非简单模的例子, 说明“保持正合”与“保持简单”不同.

解. 取 $\mathfrak{b} = \mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}e \subseteq \mathfrak{sl}_2$, 并取一维平凡 $\mathfrak{b}$ 模. 诱导得到 $M(0)$, 它包含非零真子模 $M(-2)$, 故不简单. 诱导的正合性由 PBW 右自由性保证, 与其是否产生新的子模没有矛盾. $\square$

习题 15.23. 在一个结合代数展示中取生成元 x, y, z , 加关系 $xy - yx = x$, $yz - zy = y$, $zx - xz = z$. 证明所得含么代数只有 k , 并说明为什么不能对这个关系表引用 PBW.

解. 结合交换子恒满足 Jacobi. 代入所给三式, 得到 $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = x + y + z = 0$. 所以 $z = -x - y$, 再代入 $yz - zy = y$ 得 $x = y$. 第一式于是给出 $0 = x$, 继而 $y = z = 0$, 所以商代数为 k . 原来的三维反对称括号表不满足 Jacobi, 根本不是 Lie 代数. 这个例子展示了三重重叠未经检查时怎样产生额外一次关系. $\square$

习题 15.24. 设 $x \in \mathfrak{g}$, 并假定 $(\operatorname{ad} x)^a = 0$ 在整个 $\mathfrak{g}$ 上成立。证明对每个 $r \geq 1$, $(\operatorname{ad} x)^{r(a-1)+1}$ 零化 $F_r U(\mathfrak{g})$ 。若 $x^b v = 0$, 给出零化 $F_r U(\mathfrak{g})v$ 的一个统一幂。

解. 对长度至多 r 的单项式反复用导子法则。若总作用次数为 $r(a-1)+1$, 至少有一个因子被作用 a 次, 故每项为零; 常数项也被导子零化。再用 $x^N u = \sum_j \binom{N}{j} (\operatorname{ad} x)^j(u) x^{N-j}$ 。取 $N = r(a-1) + b$, 则每项或者 $j \geq r(a-1) + 1$, 或者 $N - j \geq b$, 作用于 v 都为零。这个界对整个有界滤过部分统一, 但一般不能与 r 无关。 $\square$

第十六章 Cartan 子代数与根分解

本章把复半单 Lie 代数的伴随表示分解为同时特征空间。先用 Killing 型证明导子的内性及内在 Jordan 分解，再建立 Cartan 子代数的存在、自中心化与共轭。相反根空间的配对产生根 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数，由此证明根空间一维、根弦连续以及反射的整数性。最后从 Killing 型得到实正定内积，抽出根系公理、简单根基和三角分解。

本章目标

- 区分元素在伴随表示中的半单性、幂零性及一般矩阵表示中的外观。
- 用 Cartan 子代数的同时权分解，在矩阵 Lie 代数中计算根与根空间。
- 用根 $\mathfrak{sl}_2$ 的升降作用证明根弦性质，并计算具体根弦。
- 证明 Killing 对偶型在根的实线性生成空间上正定。
- 能选取简单根，写出正负根及三角分解，并由简单根向量生成其余根空间。

预备知识为 Engel 定理、Lie 定理、Killing 型的半单判别，以及有限维 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模的分类与完全可约性。Cartan 共轭证明所需的多项式开像引理在本章用有限代数和行列式论证建立。

在 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中，取迹零对角矩阵 $h = \text{diag}(t_1, t_2, t_3)$ ，其中 $t_1 + t_2 + t_3 = 0$ 。矩阵单位满足 $[h, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$ ，所以每个非对角位置都对这族对角矩阵给出一个线性权。哪些共同特征空间应当被看作根空间，为什么它们在括号运算下仍有严格限制？从这个显式分解出发，本章将寻找一般复半单 Lie 代数中的 Cartan 子代数，并借 Killing 型和根 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组建立有限根系。

16.1 Cartan 子代数

本节先把同时对角化所需的子代数建立起来。全节的基域为复数，Killing 型记为 $B = \kappa_{\mathfrak{g}}$ ；“半单元素”指伴随算子可对角化，不是把元素本身当作一个已经选定的矩阵。

16.1.1 半单 Lie 代数中的 Cartan 子代数

定义 16.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数。若 $x \in \mathfrak{g}$ 的伴随算子 $\text{ad } x$ 可对角化，则称 x 为半单元素；若该算子幂零，则称 x 为幂零元素。若交换子代数 $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{g}$ 的每个元素都半单，称 $\mathfrak{t}$ 为环面子代数 (toral subalgebra)。若环面子代数 $\mathfrak{h}$ 按包含关系极大，就称它为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数 (Cartan subalgebra)。

这里的“极大”按包含关系理解，不预先指定维数。例如 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ 中迹零对角矩阵构成环面子代数。要证明它极大，只须注意：与全部迹零对角矩阵交换的矩阵仍为对

角矩阵。一般情形不能凭借矩阵的外观作判断,须先把线性代数中的 Jordan 分解移到 $\mathfrak{g}$ 内部。

引理 16.1.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, Killing 型为 B 。每个导子 D 都唯一写成 $\text{ad } x$ 。每个 $x \in \mathfrak{g}$ 都唯一分解为

$$x = x_s + x_n, \quad [x_s, x_n] = 0,$$

其中 x_s 半单, x_n 幂零; 对应的伴随算子正是 $\text{ad } x$ 的半单部分和幂零部分。

证明. 由定理 13.2.3, B 非退化。给定导子 D , 取唯一的 x 满足 $B(x, y) = \text{tr}(D \text{ad } y)$ 对所有 y 成立。令 $D_0 = D - \text{ad } x$, 则 $\text{tr}(D_0 \text{ad } y) = 0$ 。导子恒等式给出

$$\begin{aligned} B(D_0 u, v) &= \text{tr}([D_0, \text{ad } u] \text{ad } v) \\ &= \text{tr}(D_0 [\text{ad } u, \text{ad } v]) = 0. \end{aligned}$$

所以 $D_0 u = 0$ 。中心为零保证 ad 单射, 从而内导子的表示唯一。

再对任意导子 D 作广义特征空间分解 $\mathfrak{g} = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}$ 。导子法则的二项式展开表明 $[V_{\lambda}, V_{\mu}] \subseteq V_{\lambda+\mu}$: 若 $(D-\lambda)^a u = 0$ 、 $(D-\mu)^b v = 0$, 则在 $(D-\lambda-\mu)^{a+b-1}[u, v]$ 的展开中, 每项至少有一个因子为零。令 D_s 在 V_{λ} 上为 λ 倍恒等, 则 $D_s[u, v] = [D_s u, v] + [u, D_s v]$; 所以 D_s 及 $D_n = D - D_s$ 都是导子。应用前一段, 写成 $\text{ad } x_s$ 、 $\text{ad } x_n$ 。取 $D = \text{ad } x$, 算子的 Jordan 分解及 ad 的单射性给出全部断言。□

下面的中心化子结论把极大性与零权空间联系起来。

引理 16.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, B 为其 Killing 型, $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{g}$ 为环面子代数, $\mathfrak{c} = Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{t})$ 为其中心化子。则 $B|_{\mathfrak{c}}$ 非退化, 且 $\mathfrak{c}$ 对内在 Jordan 分解封闭。若 $\mathfrak{t}$ 是极大环面子代数, 则 $\mathfrak{c} = \mathfrak{t}$ 。

证明. 交换的可对角化算子可同时对角化, 故 $\mathfrak{g} = \mathfrak{c} \oplus \bigoplus_{\lambda \neq 0} V_{\lambda}$, 其中 $[h, v] = \lambda(h)v$ 。 B 的不变性给出 $(\lambda(h) + \mu(h))B(u, v) = 0$ 。于是 $\mathfrak{c}$ 与全部非零权空间正交; B 在整个 $\mathfrak{g}$ 上非退化, 故其在 $\mathfrak{c}$ 上也非退化。

若 $x \in \mathfrak{c}$, 则 $\text{ad } x$ 与各 $\text{ad } h$ 交换; 其 Jordan 两部分是该算子的多项式, 因而同样交换。由 ad 单射, $x_s, x_n \in \mathfrak{c}$ 。极大性说明 $x_s \in \mathfrak{t}$: 否则可把交换的半单元素 x_s 加入 $\mathfrak{t}$, 得到更大的环面子代数。因此在 $\mathfrak{c}$ 上, $\text{ad } x = \text{ad } x_n$ 幂零。定理 12.1.3 遂说明 $\mathfrak{c}$ 幂零, 特别是可解。

将定理 12.2.3 用于 $\mathfrak{c}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随表示。所有伴随矩阵同时上三角, 交换子矩阵严格上三角, 所以 $B([\mathfrak{c}, \mathfrak{c}], \mathfrak{c}) = 0$ 。限制型非退化给出 $[\mathfrak{c}, \mathfrak{c}] = 0$ 。此时 $\text{ad } x_n$ 与全部 $\text{ad } y$ ($y \in \mathfrak{c}$) 交换, 其乘积幂零, 因而 $B(x_n, y) = 0$ 。再次使用非退化性, 得到 $x_n = 0$; 于是 $\mathfrak{c}$ 的全部元素都在 $\mathfrak{t}$ 中。□

16.1.2 同时对角化与正则元素

固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 。上一引理给出同时特征空间分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\lambda \in \Omega} V_{\lambda}, \quad V_{\lambda} = \{x \mid [h, x] = \lambda(h)x \text{ 对所有 } h \in \mathfrak{h}\},$$

其中 Ω 为有限个非零线性泛函。下一节将把这些泛函称为根。选取 $h \in \mathfrak{h}$, 使每个 $\lambda(h) \neq 0$, 则 $Z_{\mathfrak{g}}(h) = \mathfrak{h}$ 。这样的元素存在: 复向量空间不可能是有限个真超平面的并。这些元素称为相对于 $\mathfrak{h}$ 的**正则元素** (regular element)。此处只讨论 Cartan 子代数内的半单元素; 任意 Lie 代数中用最小中心化子维数定义的正则性将在需要时另作说明。

若 $x \in V_{\lambda}$, 则 $\text{ad } x$ 幂零。事实上, $[V_{\lambda}, V_{\mu}] \subseteq V_{\lambda+\mu}$, 而有限的权集合中不可能含有 $\mu, \mu + \lambda, \mu + 2\lambda, \dots$ 的无限序列。相应的指数

$$\exp(t \text{ad } x) = \sum_{j \geq 0} \frac{t^j (\text{ad } x)^j}{j!}$$

只是有限和, 是 $\mathfrak{g}$ 的多项式自同构。它保持括号, 因为导子法则给出指数的乘法相容性, 其逆为把 t 改成 $-t$ 的同一表达式。本章所说的**内自同构** (inner automorphism), 包括这些指数及其有限乘积。

16.1.3 Cartan 子代数的存在性与共轭性

这里把仿射空间中多项式零点集的补集及其任意并称为 Zariski 开集, 记 $D(q) = \{x \mid q(x) \neq 0\}$ 。所需的开像事实可以用有限代数直接证明。

已有的内在 Jordan 分解和自中心化结论保证 Cartan 子代数存在, 却还不能说明任意两个 Cartan 子代数共轭。为证明定理 16.1.5, 下文把幂零伴随指数的乘积写成多项式映射, 并在正则元素处验证其 Jacobian 非零。此处调用引理 16.1.4 的结论: 该映射将非空 Zariski 开集的像覆盖一个非空开集。这样, 两份 Cartan 子代数得到的开集相交, 再由正则元素的中心化子恢复共轭; 该引理的有限整扩张证明在主证明之后给出。

引理 16.1.4. 设 $F: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 为多项式映射, 其 Jacobian 行列式不是零多项式。若 $U \subseteq \mathbb{C}^n$ 是非空 Zariski 开集, 则 $F(U)$ 含有非空 Zariski 开集。

证明. 记坐标多项式为 $f_1, \dots, f_n$ 。它们代数独立: 否则取最低次数的非零关系

$$P(f_1, \dots, f_n) = 0.$$

求偏导并在有理函数域中乘 Jacobian 的逆, 得到

$$\frac{\partial P}{\partial T_i}(f_1, \dots, f_n) = 0 \quad (1 \leq i \leq n).$$

特征零保证非恒定 P 至少有一个非零偏导, 这与所选关系的最低次数矛盾。因而 $\mathbb{C}(f_1, \dots, f_n) \subseteq \mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)$ 是有限代数扩张。将各 x_i 的首一代数方程清除系数的分母, 可取非零 $d \in A = \mathbb{C}[f_1, \dots, f_n]$, 使 $A_d \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]_d$ 为有限整扩张。

取非零多项式 q , 使 $D(q) \subseteq U$ 。把 q^{-1} 也看成有限函数域扩张中的代数元素, 再增大 d , 便能使 q^{-1} 整于 A_d 。于是 $A_d \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n, 1/d, 1/q]$ 仍为有限整扩张, 记右端为 R 。对 $D(q)$ 的一点, 其在 A_d 中的极大理想记为 $\mathfrak{m}$ 。必有 $\mathfrak{m}R \neq R$: 否则取有限个 A_d -模生成元 u_i , 可写 $u_i = \sum_j a_{ij} u_j$, 其中 $a_{ij} \in \mathfrak{m}$; 乘伴随矩阵说明 $\det(I - (a_{ij})) \in 1 + \mathfrak{m}$ 零化 R 。但 A_d 嵌入 R 且 $1 \in R$, 这会迫使该行列式等于零, 矛盾。所以 $R/\mathfrak{m}R$ 为非

零有限维复代数。取其一个极大理想，商是 $\mathbb{C}$ 的有限域扩张，只能为 $\mathbb{C}$ ，因而给出所求原像。因 q 在 R 中可逆，所有这些原像都在 $D(q) \subseteq U$ ，故 $D(d) \subseteq F(U)$ 。 $\square$

定理 16.1.5 (Cartan 子代数的存在与共轭). 每个有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 都有 Cartan 子代数。任意两个 Cartan 子代数都由有限个幂零伴随指数的乘积互相变换，因而维数相同。

证明. 零代数取零子代数即可。若 $\mathfrak{g} \neq 0$ 的所有元素都幂零，Engel 定理会使 $\mathfrak{g}$ 幂零，与半单性矛盾。因此存在 x 使 $(\text{ad } x)_s \neq 0$ ；由引理 16.1.2， $\mathbb{C}x_s$ 是非零环面子代数。在有限维空间中不断扩张，便得到极大者。

固定一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ ，在全部非零权空间中取基 $x_1, \dots, x_m$ ，其权为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 。考虑

$$F_{\mathfrak{h}} : \mathbb{C}^m \times \mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{g}, \quad (t_1, \dots, t_m, h) \longmapsto \exp(t_1 \text{ad } x_1) \cdots \exp(t_m \text{ad } x_m)h.$$

源、靶维数相等。在 $t_1 = \cdots = t_m = 0$ 且 h 正则处，微分在 $\mathfrak{h}$ 方向为恒等，在第 i 个参数方向为 $[x_i, h] = -\lambda_i(h)x_i$ ，故可逆。引理 16.1.4 说明：正则元素的这些内自同构像含有 $\mathfrak{g}$ 中的非空 Zariski 开集 $O_{\mathfrak{h}}$ 。

若 $\mathfrak{h}'$ 是另一个 Cartan 子代数，相应开集与 $O_{\mathfrak{h}}$ 相交；因为仿射空间的坐标环是整环，两个非空开集必相交。取 $z = a(h) = b(h')$ ，其中 h, h' 正则， a, b 均为上述指数的乘积。对中心化子取像，得到

$$a(\mathfrak{h}) = Z_{\mathfrak{g}}(z) = b(\mathfrak{h}').$$

因此 $b^{-1}a$ 给出所需共轭。 $\square$

这份证明只用有限和的指数及多项式映射，没有假定已经建立复 Lie 群。开像引理中的行列式论证也解释了有限整扩张如何保证闭点有原像。

16.1.4 Jordan 分解与中心化子

命题 16.1.6. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数， $x = x_s + x_n$ 为其内在 Jordan 分解。则

$$Z_{\mathfrak{g}}(x) = Z_{\mathfrak{g}}(x_s) \cap Z_{\mathfrak{g}}(x_n).$$

此外，每个自同构保持此分解；在任意半单元素 s 的中心化子中，Killing 型的限制非退化。

证明. 若 $[y, x] = 0$ ，则 $\text{ad } y$ 与 $\text{ad } x$ 交换，也与其两个多项式 Jordan 部分交换；伴随表示单射给出 $[y, x_s] = [y, x_n] = 0$ 。反向包含显然成立。自同构把交换的半单、幂零两部分送到同样性质的两部分，故由唯一性保持分解。最后应用引理 16.1.3 于 $\mathbb{C}s$ 。 $\square$

在一般有限维 Lie 代数中，Cartan 子代数通常定义为幂零且等于自身正规化子的子代数。本章的 $\mathfrak{h}$ 满足这个条件：它交换；若 $[x, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$ ，把 x 按同时权空间分解，所有非零权分量都被这个包含关系迫为零，所以 $x \in \mathfrak{h}$ 。本章只在复半单情形使用已经证明的极大环面刻画，不把“Cartan 子代数交换”推广到任意 Lie 代数。

16.2 根空间分解

同时特征值记录 Cartan 子代数怎样作用于整个 Lie 代数。本节固定一份 Cartan 子代数，先确定括号可能落入的权空间，再利用 Killing 型把相反的权空间配对。

16.2.1 根、根空间与秩

定义 16.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数， $\mathfrak{h}$ 为 Cartan 子代数。对 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ ，令

$$\mathfrak{g}_\alpha = \{x \in \mathfrak{g} \mid [h, x] = \alpha(h)x \text{ 对所有 } h \in \mathfrak{h}\}.$$

若 $\alpha \neq 0$ 且 $\mathfrak{g}_\alpha \neq 0$ ，则称 α 为一个根， $\mathfrak{g}_\alpha$ 为根空间 (root space)。全部根组成的集合记为 Φ 。Cartan 子代数的共同维数称为 $\mathfrak{g}$ 的秩 (rank)。

定理 16.2.2 (根空间分解). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数， $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数， $\Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为相应根集合， $\mathfrak{g}_\alpha$ 为根 α 对应的根空间。则

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha. \quad (16.1)$$

根的集合有限，且在复数上生成 $\mathfrak{h}^*$ 。

证明。同时对角化给出全部权空间的直和，零权空间由引理 16.1.3 恰为 $\mathfrak{h}$ 。若 $h \in \mathfrak{h}$ 被所有根零化，则它与各根空间以及 $\mathfrak{h}$ 都交换，因而在 $\mathfrak{g}$ 的中心中。中心为零，所以根的公共零空间为零，即根生成对偶空间。□

例如，对 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ ，取迹零对角子代数，令 $\varepsilon_i(\text{diag}(h_1, \dots, h_n)) = h_i$ 。由 $[h, E_{ij}] = (h_i - h_j)E_{ij}$ ，得到

$$\Phi = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j \mid i \neq j\}, \quad \mathfrak{g}_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = \mathbb{C}E_{ij}.$$

这里 $\sum_i \varepsilon_i = 0$ ，秩为 $n - 1$ ，而不是矩阵的阶数 n 。

16.2.2 根空间括号关系

命题 16.2.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数， $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数。对 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ ，记 $\mathfrak{g}_\alpha$ 为伴随作用的权空间；其中 $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$ ，不存在的权空间为零。则对任意 $\alpha, \beta \in \mathfrak{h}^*$ ，有

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

特别地，每个根向量 $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ 的 $\text{ad } x$ 幂零。

证明。对 $h \in \mathfrak{h}$ 及相应根向量，Jacobi 恒等式给出

$$[h, [x, y]] = [[h, x], y] + [x, [h, y]] = (\alpha(h) + \beta(h))[x, y].$$

这证明包含关系。重复与 x 作括号，会把权 β 逐次移到 $\beta + k\alpha$ 。权集合有限且 $\alpha \neq 0$ ，所以充分多次后必为零。□

这个包含关系尚未断言：当 $\alpha + \beta$ 为根时括号一定非零。后一断言要用下一节的 $\mathfrak{sl}_2$ 表示理论。先分清“由权决定可能的值域”和“实际达到该值域”，可以避免在构造简单根向量时循环论证。

16.2.3 Killing 型诱导的配对

命题 16.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数, B 为其 Killing 型, $\mathfrak{g}_\alpha$ 为根 α 的根空间。则 $B|_{\mathfrak{h}}$ 非退化, 且对任意两个根 α, β , 有

$$B(\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta) = 0 \quad \text{若 } \alpha + \beta \neq 0.$$

每个根 α 的负数也是根, 且 $B: \mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha} \rightarrow \mathbb{C}$ 为非退化配对。定义唯一的 $t_\alpha \in \mathfrak{h}$, 使 $B(t_\alpha, h) = \alpha(h)$, 则

$$[x, y] = B(x, y)t_\alpha \quad (x \in \mathfrak{g}_\alpha, y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}). \quad (16.2)$$

证明. 限制型的非退化性已经由引理 16.1.3 给出。不变性说明

$$B([h, x], y) = -B(x, [h, y]),$$

故 $(\alpha(h) + \beta(h))B(x, y) = 0$ 。只要 $\alpha + \beta \neq 0$, 可选 h 使该系数非零。若某个非零 $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ 与 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 全部正交, 它也与其余根空间正交, 违反 B 非退化; 这同时证明负根存在及配对非退化。最后, 括号属于 $\mathfrak{h}$, 并且

$$B([x, y], h) = B(x, [y, h]) = \alpha(h)B(x, y).$$

在 $\mathfrak{h}$ 上用非退化性比较, 即得所列公式。□

我们把 $B|_{\mathfrak{h}}$ 的对偶型记为 $(\alpha, \beta) = B(t_\alpha, t_\beta)$ 。此时它首先是复双线性型, 尚不能称作正定内积。下一节先证明根的平方非零, 再在根的实线性生成空间上证明正定性; 不能把复数上的非退化性误当成正定性。

16.3 根弦与反射

相反根向量的括号产生一个 Cartan 方向。把它适当归一化, 就会出现已经熟悉的三维 Lie 代数; 根弦的长度和反射系数将由它的有限维表示决定。

16.3.1 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数

定理 16.3.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数, B 为其 Killing 型, $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 为根, $\mathfrak{g}_{\pm\alpha}$ 为相应根空间。令 $t_\alpha \in \mathfrak{h}$ 满足 $B(t_\alpha, h) = \alpha(h)$ 对所有 $h \in \mathfrak{h}$ 成立, 并记 $(\alpha, \alpha) = B(t_\alpha, t_\alpha)$ 。则 $(\alpha, \alpha) \neq 0$ 。取 $e_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ 、 $f_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 满足 $B(e_\alpha, f_\alpha) = 1$, 并令

$$h_\alpha = \frac{2t_\alpha}{(\alpha, \alpha)}, \quad E_\alpha = e_\alpha, \quad F_\alpha = \frac{2f_\alpha}{(\alpha, \alpha)}.$$

则 $[h_\alpha, E_\alpha] = 2E_\alpha$ 、 $[h_\alpha, F_\alpha] = -2F_\alpha$ 、 $[E_\alpha, F_\alpha] = h_\alpha$, 三者构成一个 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 子代数。每个根空间均为一维, 且与 α 成比例的根只有 $\alpha, -\alpha$ 。

证明. 由前一节非退化配对可选到 $e = e_\alpha, f = f_\alpha$, 满足 $[e, f] = t_\alpha$ 。若 $\alpha(t_\alpha) = 0$, 则 $\text{ad } e, \text{ad } f$ 都与半单算子 $\text{ad } t_\alpha$ 交换。在后者的特征值为 c 的特征空间上,

$$[\text{ad } e, \text{ad } f] = \text{ad } t_\alpha = cI.$$

取迹得到 $c \dim V_c = 0$, 所以所有特征值为零。半单性给出 $\text{ad } t_\alpha = 0$, 继而 $t_\alpha = 0$, 与 $\alpha \neq 0$ 矛盾。因此 $\alpha(t_\alpha) = (\alpha, \alpha) \neq 0$, 所列括号关系随即成立。

将这份 $\mathfrak{sl}_2$ 作用限制到

$$M_\alpha = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\beta \in \Phi \cap \mathbb{C}\alpha} \mathfrak{g}_\beta.$$

由定理 14.3.3, 它是有限维不可约 $\mathfrak{sl}_2$ 模的直和; 其中 h_α 在 $\mathfrak{g}_{c\alpha}$ 上的特征值为 $2c$, 所以 $2c$ 为整数。沿这条直线选根 α , 使 $\alpha/2$ 不再为根; 若原根不满足, 连续减半, 有限性保证过程终止。

此时 M_α 不含奇最高权的不可约直和项, 因为每个这种直和项都有权 1, 会产生根 $\alpha/2$ 。每个非平凡偶最高权直和项都含权 0, 2, 且 E_α 从其零权空间到权 2 空间的秩为 1。但整个零权空间是 $\mathfrak{h}$, 而 $[E_\alpha, h] = -\alpha(h)E_\alpha$, 这个映射的秩恰为 1。因此只有一个非平凡偶直和项。已经存在的三维伴随子模 $\mathbb{C}E_\alpha \oplus \mathbb{C}h_\alpha \oplus \mathbb{C}F_\alpha$ 就是该直和项。其余全为平凡模, 故该直线上的根只有 $\pm\alpha$, 两根空间都一维。每条含根的直线均可如此处理, 于是结论对所有根成立。 $\square$

两套根向量的归一化各有用途。Killing 配对为 1 的 e_α, f_α 适合 Casimir 计算; 满足标准 $\mathfrak{sl}_2$ 关系的则是 $E_\alpha, F_\alpha, h_\alpha$ 。除非恰有 $(\alpha, \alpha) = 2$, 不得把两套记号不加说明地混用。

16.3.2 根弦性质

定理 16.3.2 (根弦). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数, Φ 为相应根集合, $\mathfrak{g}_\gamma$ 为根 γ 的根空间。取 $\alpha, \beta \in \Phi$ 且 $\beta \neq \pm\alpha$, 记 $h_\alpha \in \mathfrak{h}$ 为根 α 的余根。则存在非负整数 p, q , 使

$$\Phi \cap (\beta + \mathbb{Z}\alpha) = \{\beta - p\alpha, \dots, \beta + q\alpha\}, \quad \beta(h_\alpha) = p - q.$$

这列根对应的根空间之和是根 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数的不可约模; 相邻根空间之间的升降括号非零。特别地, 若 $\alpha + \beta \in \Phi$, 则 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ 。

证明. 令 $M = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathfrak{g}_{\beta+k\alpha}$ 。它是有限维根 $\mathfrak{sl}_2$ 模。其 h_α 特征值均为 $\beta(h_\alpha) + 2k$, 每个存在的特征空间都一维。完全可约性将 M 分解为不可约模; 所有直和项的权具有同一奇偶性。而两个偶最高权模都含权 0, 两个奇最高权模都含权 1, 故 M 不可能有两个非零直和项。因此 M 不可约, 其权按步长 2 连续排列, 且关于零对称。首、尾权的和为零, 给出

$$\beta(h_\alpha) - 2p + \beta(h_\alpha) + 2q = 0.$$

这就是 $p - q = \beta(h_\alpha)$ 。不可约 $\mathfrak{sl}_2$ 模的升降公式还说明, 除两端以外, 相邻权空间之间的映射均非零。 $\square$

例如在 $\mathfrak{sl}_3$ 中, 取 $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, $\beta = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$ 。根弦为 $\beta, \beta + \alpha$, 故 $p = 0, q = 1$, $\beta(h_\alpha) = -1$ 。矩阵等式 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$ 正好实现这一步升根。

16.3.3 根反射与整数性

命题 16.3.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, $\Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为根集合, $(\cdot, \cdot)$ 为 Killing 型诱导的对偶型. 对根 $\alpha \in \Phi$, 取相应的标准 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 $(E_\alpha, F_\alpha, h_\alpha)$, 其中 $h_\alpha \in \mathfrak{h}$ 为余根. 则在 $\mathfrak{h}^*$ 上的变换

$$s_\alpha(\lambda) = \lambda - \lambda(h_\alpha)\alpha = \lambda - \frac{2(\lambda, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha$$

保持根集合, 且 $\beta(h_\alpha) \in \mathbb{Z}$ 对所有根 β 成立. 内自同构

$$n_\alpha = \exp(\text{ad } E_\alpha) \exp(-\text{ad } F_\alpha) \exp(\text{ad } E_\alpha)$$

保持 $\mathfrak{h}$, 在其上作用为 $h \mapsto h - \alpha(h)h_\alpha$, 在根上实现 s_α .

证明. 对非比例根, 根弦两端的关系说明 $\beta - (p - q)\alpha$ 仍在同一根弦中, 即 $s_\alpha\beta$ 仍为根. 比例根只有 $\pm\alpha$, 其整数值为 ± 2 , 反射互换二者.

在三维子代数中代入标准括号, 有限指数的直接计算给出 $n_\alpha(h_\alpha) = -h_\alpha$. 而 $\ker \alpha \subseteq \mathfrak{h}$ 与 E_α, F_α 都交换, 所以被固定. 把 h 写成 $h - \alpha(h)h_\alpha/2 + \alpha(h)h_\alpha/2$, 便得到所列公式. 若 $x \in \mathfrak{g}_\beta$, 自同构保持括号, 因而

$$[h, n_\alpha x] = n_\alpha[n_\alpha^{-1}h, x] = (s_\alpha\beta)(h)n_\alpha x.$$

所以它把相应根空间同构地送到反射后的根空间. □

16.4 根系公理

根空间计算已经给出有限性、反射与整数系数. 还需把这些复线性资料放进一个实正定空间, 才能把根系作为独立的几何对象研究.

16.4.1 有限约化结晶根系

定义 16.4.1. 设 E 为有限维实内积空间, 内积记为 $(\cdot, \cdot)$, $\Phi \subseteq E \setminus \{0\}$ 为有限子集. 若 Φ 满足下列条件:

1. Φ 生成 E ;
2. 对每个 $\alpha \in \Phi$, 有 $\Phi \cap \mathbb{R}\alpha = \{\alpha, -\alpha\}$;
3. 正交反射 $s_\alpha(v) = v - 2(v, \alpha)\alpha/(\alpha, \alpha)$ 保持 Φ ;
4. 对所有 $\alpha, \beta \in \Phi$, 数 $2(\beta, \alpha)/(\alpha, \alpha)$ 为整数.

则称 Φ 为一个有限约化结晶根系 (finite reduced crystallographic root system). 最后两项分别是反射条件和结晶条件. 本书未另加限时, “根系”采用这个版本.

定理 16.4.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数, $\Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为相应根集合. Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的对偶型在 $E = \text{span}_{\mathbb{R}} \Phi$ 上为正定实内积, 且 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系. 实维数 $\dim_{\mathbb{R}} E$ 等于 $\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{h}$.

证明. 令 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{h_{\alpha} \mid \alpha \in \Phi\}$. 根反射的整数性说明, 每个根在这个实空间上的值都是实数. 根分解及一维性给出

$$B(h, k) = \sum_{\alpha \in \Phi} \alpha(h)\alpha(k) \quad (h, k \in \mathfrak{h}). \quad (16.3)$$

因此对非零 $h \in \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$, 有 $B(h, h) = \sum_{\alpha} \alpha(h)^2 > 0$; 严格不等式使用了根分离 $\mathfrak{h}$ 中的点. 由于 t_{α} 在复数上生成 $\mathfrak{h}$, 同样的事实也适用于 h_{α} . 而实正定性排除 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}} \cap i\mathfrak{h}_{\mathbb{R}} \neq 0$, 所以 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}_{\mathbb{R}} \oplus i\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$. 在这个实形式上对偶化正定型, 即得 E 的实正定型及维数结论.

有限性和生成性来自定理 16.2.2, 约化性来自定理 16.3.1, 反射条件及结晶条件来自命题 16.3.3. 因而四条公理均成立. $\square$

后文画根图时常把一个不可约分支整体缩放, 使图上的短根或长根具有方便的长度. 这只是同一根系的相似图形. 本卷表示论中的 (λ, μ) 始终采用上述 Killing 对偶型, 不因坐标图的缩放而改变 Casimir 算子的常数.

16.4.2 正根与简单根

设 $\Phi \subseteq E$ 为根系. 选取 $v \in E$, 使 $(v, \alpha) \neq 0$ 对所有根成立, 定义 $\Phi^+ = \{\alpha \in \Phi \mid (v, \alpha) > 0\}$. 其中不能写成两个正根之和的根称为简单根, 全部简单根组成 Δ . 这些用语与第 10.1 节中 ADE 整数格的定义相容.

定理 16.4.3 (简单根基). 设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系, E 为实内积空间. 选取 $v \in E$, 使 $(v, \alpha) \neq 0$ 对所有 $\alpha \in \Phi$ 成立, 令 $\Phi^+ = \{\alpha \in \Phi \mid (v, \alpha) > 0\}$. 把不能写成两个正根之和的正根组成的集合记为 Δ . 则简单根集合 $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是 E 的一组基. 每个根在这组基下的系数都是整数, 并且或者全非负, 或者全非正. 不同简单根的内积非正. 若 $\beta \in \Phi^+ \setminus \Delta$, 则存在简单根 α_i , 使 $\beta - \alpha_i$ 为正根.

证明. 先证一个小事实: 若不成比例的根 α, β 满足 $(\alpha, \beta) > 0$, 则 $\alpha - \beta$ 为根. 两个正整数

$$m = \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}, \quad n = \frac{2(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)}$$

的乘积为 $4 \cos^2 \theta < 4$, 所以至少有一个等于 1. 相应反射把一个根送到两根之差, 必要时取负号即可. 若两个不同简单根内积为正, 它们之差为根; 按此差的正负, 其中一个简单根便是两个正根之和, 矛盾.

任意非简单正根可以分解为两个正根. 反复分解必终止, 因为每次子项的 $(v, \cdot)$ 值严格减小, 而正根集合有限. 因此每个正根都是简单根的非负整数和. 为证线性无关, 将一个实线性关系的正、负系数分到两边, 得到 $u = \sum_{i \in I} a_i \alpha_i = \sum_{j \in J} b_j \alpha_j$, 其中 I, J 不交, 系数均正. 于是 $(u, u) = \sum_{i, j} a_i b_j (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$, 迫使 $u = 0$; 但与 v 配对又说明任一非空正组合都不为零. 故关系只能平凡. 生成性及负根取负号给出基和符号结论.

最后写 $\beta = \sum n_i \alpha_i$. 因为 $(\beta, \beta) = \sum n_i (\beta, \alpha_i) > 0$, 某个 $n_i > 0$ 满足 $(\beta, \alpha_i) > 0$. 若 β 非简单, 它不与 α_i 成比例; 前述小事实给出 $\beta - \alpha_i \in \Phi$, 其系数非负, 故为正根. $\square$

命题 16.4.4. 设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系, Φ^+ 为所选正根集合, $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为相应简单根基。记 $s_i = s_{\alpha_i}$ 为根 α_i 对应的正交反射。则每个 s_i 置换 $\Phi^+ \setminus \{\alpha_i\}$, 并把 α_i 送到 $-\alpha_i$ 。每个正根都可用简单反射依次降低高度, 最终变成简单根。

证明. 反射 s_i 只改变简单根展开中的第 i 个数。若正根不同于 α_i , 约化性使它至少有一个其他正系数, 反射后不可能全部系数非正, 故仍为正根。对非简单正根 $\beta = \sum n_j \alpha_j$, 上一定理的证明给出 $(\beta, \alpha_i) > 0$ 。此时 $s_i \beta = \beta - \beta(h_{\alpha_i})\alpha_i$ 仍正, 且高度 $\sum n_j$ 减去一个正整数。反复进行必停在简单根。□

16.4.3 由 Lie 代数结构得到根系数据

现在回到有限维复半单 Lie 代数。固定简单根后, 令

$$\mathfrak{n}^+ = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_\alpha, \quad \mathfrak{n}^- = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_{-\alpha}.$$

二者对括号封闭, 并因高度逐次增加而幂零。于是根分解成为

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{n}^- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+. \quad (16.4)$$

这称为三角分解 (triangular decomposition)。它是向量空间直和; 其中各项不是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

命题 16.4.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数, Φ^+ 为所选正根集合, 记 $\mathfrak{n}^\pm$ 为正、负根空间之和。固定相应简单根 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 。在各简单根的标准三元组中记 $e_i = E_{\alpha_i}$ 、 $f_i = F_{\alpha_i}$ 、 $h_i = h_{\alpha_i}$ 。则 $h_1, \dots, h_r$ 是 $\mathfrak{h}$ 的基; $\mathfrak{n}^+$ 由 $e_1, \dots, e_r$ 生成, $\mathfrak{n}^-$ 由 $f_1, \dots, f_r$ 生成。

证明. 简单根为对偶空间的基, 故其 Killing 对偶向量 t_{α_i} 为 $\mathfrak{h}$ 的基; 逐个乘非零常数得到 h_i 。对非简单正根 β , 定理 16.4.3 给出 $\beta - \alpha_i \in \Phi^+$; 由定理 16.3.2,

$$[\mathfrak{g}_{\alpha_i}, \mathfrak{g}_{\beta - \alpha_i}] = \mathfrak{g}_\beta.$$

按高度归纳, 全部正根空间都由简单根向量的迭代括号生成。负根同样处理。□

在 $\mathfrak{sl}_n$ 中可取 $\alpha_i = \varepsilon_i - \varepsilon_{i+1}$, 正根为 $\alpha_i + \dots + \alpha_{j-1}$ ($i < j$)。此时 $\mathfrak{n}^+$ 、 $\mathfrak{n}^-$ 分别是严格上三角、严格下三角矩阵; 等式 $[E_{ij}, E_{jk}] = E_{ik}$ 具体表现了上面的高度归纳。根系记录权、相邻根空间的关系和简单生成元, 但还没有自动给出整个 Lie 代数的展示。后者将在第 17.4* 节证明。

本章小结

Cartan 子代数的存在首先依赖内在 Jordan 分解; 它的自中心化性质使零权空间恰好等于 Cartan 子代数。共轭性则通过正则元素及幂零伴随指数的开像证明, 保证秩和根系不依赖最初的选择。

根空间的关键性质来自相反根之间的 Killing 配对。非零根长产生标准 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组；有限维 $\mathfrak{sl}_2$ 模的结构随后同时给出一维性、约化性、根弦和结晶整数。根反射也可由 Lie 代数的内自同构实现。

在根的实线性生成空间上，Killing 对偶型成为正定内积。正根的不可分解元形成简单根基，正负根空间分别由简单根向量生成。这些事实既为下一章的分类提供有限数据，也为后续表示论提供升降算子和三角分解。

习题

习题 16.1. 在 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中取对角 Cartan 子代数。分别求 $h = \text{diag}(1, 0, -1)$ 和 $h' = \text{diag}(1, 1, -2)$ 的中心化子，判断二者是否正则。

解. 矩阵方程 $[h, X]_{ij} = (h_i - h_j)X_{ij} = 0$ 说明，第一种情形只能保留对角元，中心化子为二维 Cartan 子代数，故正则。第二种情形可以保留左上 2×2 块和右下单元，整体迹为零，中心化子维数为 4，所以不正则。根 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ 在 h' 上恰好为零。□

习题 16.2. 对 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中的 $x = \text{diag}(2, 2, -4) + E_{12}$ ，求内在 Jordan 分解，并求其中心化子的维数。

解. 对角部分 s 与 $n = E_{12}$ 交换； $\text{ad } s$ 可对角化， $\text{ad } n$ 幂零，故由唯一性它们就是内在两部分。与 s 交换的矩阵为一个 2×2 块及一个单元；其中与 E_{12} 交换的 2×2 块为 $aI_2 + bE_{12}$ 。迹零使第三个单元等于 $-2a$ ，故中心化子由 $\text{diag}(1, 1, -2), E_{12}$ 张成，维数为 2。这个元素的中心化子与 Cartan 子代数同维，但该元素不是半单元素。□

习题 16.3. 令 $\mathfrak{a}$ 有基 x, y, z ，唯一非零基本括号为 $[x, y] = z$ 。按“幂零且自正规化”定义，证明 $\mathfrak{a}$ 自身为 Cartan 子代数，但不是交换代数。说明这不违反本章结论。

解. $[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}] = \mathbb{C}z$ ，下一步下中心列为零，故幂零；它在自身中的正规化子当然是自身，但 $[x, y] \neq 0$ ，不交换。本章的极大环面刻画只用于复半单 Lie 代数，此处 $\mathfrak{a}$ 可解且非半单。□

习题 16.4. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 的标准基 e, f, h 下，分别求 $\mathbb{C}h$ 与 $\mathbb{C}e$ 的 Lie 代数正规化子。为什么第二条直线不是 Cartan 子代数？

解. 若 $u = ae + bf + ch$ ，则 $[u, h] = -2ae + 2bf$ ；落在 $\mathbb{C}h$ 中迫使 $a = b = 0$ ，故正规化子为 $\mathbb{C}h$ 。又 $[u, e] = -bh + 2ce$ ，落在 $\mathbb{C}e$ 中当且仅当 $b = 0$ ，故正规化子为 $\mathbb{C}e + \mathbb{C}h$ 。第二条直线虽然交换，却不是自正规化的；其非零元素也不是半单元素。□

习题 16.5. 利用 $\mathfrak{sl}_n$ 的根，在迹零对角矩阵上证明 $B(h, k) = 2n \text{tr}(hk)$ 。继而求 $t_{\varepsilon_i - \varepsilon_j}$ 和 $h_{\varepsilon_i - \varepsilon_j}$ 。

解. 根求和给出

$$\sum_{i \neq j} (h_i - h_j)(k_i - k_j) = 2n \sum_i h_i k_i - 2 \left(\sum_i h_i \right) \left(\sum_j k_j \right) = 2n \text{tr}(hk).$$

因此 $t_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = (E_{ii} - E_{jj})/(2n)$ 。其根值为 $1/n$ ，即该根在 Killing 对偶型下的平方长度为 $1/n$ ；余根为 $E_{ii} - E_{jj}$ 。标准欧氏根图中长度平方为 2，与这里的数值相差整体比例。□

习题 16.6. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 中，令 $e_\alpha = E_{13}$ ， $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_3$ 。求满足 Killing 配对为 1 的 f_α ，以及标准三元组中的 F_α 。

解. $\mathfrak{sl}_3$ 的 Killing 型为 $6\operatorname{tr}(XY)$ ，故 $f_\alpha = E_{31}/6$ ， $[e_\alpha, f_\alpha] = (E_{11} - E_{33})/6 = t_\alpha$ 。由于 $(\alpha, \alpha) = 1/3$ ，有 $F_\alpha = 2f_\alpha/(1/3) = E_{31}$ 。所以 Killing 对偶的反根向量并不是标准三元组中的下降生成元。□

习题 16.7. 在 $\mathfrak{sl}_4$ 中计算 $[E_{12}, E_{23}]$ 、 $[E_{12}, E_{34}]$ 、 $[E_{13}, E_{32}]$ 。把每个结果与相应根之和对照。

解. 用 $[E_{ij}, E_{kl}] = \delta_{jk}E_{il} - \delta_{li}E_{kj}$ ，三个结果依次为 $E_{13}, 0, E_{12}$ 。根之和依次为 $\varepsilon_1 - \varepsilon_3$ 、 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4$ 、 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ 。中间的泛函不是根也不是零，故括号只能为零；其余两项确实达到一维的相应根空间。□

习题 16.8. 在 $B_2 = \{\pm e_1, \pm e_2, \pm e_1 \pm e_2\}$ 中，取 $\alpha = e_2, \beta = e_1 - e_2$ 。列出 α -根弦并计算 $\beta(h_\alpha)$ ；交换两根后重复计算。

解. 第一条弦为 $e_1 - e_2, e_1, e_1 + e_2$ ，故 $p = 0, q = 2$ ，配对为 -2 ，也等于 $2(\beta, \alpha)/(\alpha, \alpha)$ 。以 β 为方向、经过 α 的弦为 e_2, e_1 ，故 $p = 0, q = 1$ ，配对为 -1 。两个整数不同，正好反映方向根的长度不同。□

习题 16.9. 令 $e = E_{12}, f = E_{21} \in \mathfrak{sl}_2$ 。计算矩阵 $N = (I + e)(I - f)(I + e)$ ，并验证其共轭作用把 $h = \operatorname{diag}(1, -1)$ 送到 $-h$ 。

解. 直接相乘得 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $N^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，故 $NhN^{-1} = -h$ 。因为矩阵共轭的指数满足 $\operatorname{Ad}(\exp e) = \exp(\operatorname{ad} e)$ ，这个计算就是根反射的内自同构实现。注意 $N^2 = -I$ ，而其伴随作用的平方为恒等。□

习题 16.10. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 中， e 与 f 都是幂零元素。判断 $e + f$ 是否幂零，并证明任意 $x \in \mathfrak{n}^+$ 在伴随表示中都幂零。

解. $e + f$ 的两个特征值为 $1, -1$ ，故它半单且非零，其伴随算子也有非零特征值，不幂零。对 $x \in \mathfrak{n}^+$ ，每次 $\operatorname{ad} x$ 都把简单根总高度至少增加 1； $\mathfrak{h}$ 视为高度 0，根分解中的高度范围有限，所以充分多次作用必为零。同一正根方向范围内的和保持幂零，任意根向量的和则未必如此。□

习题 16.11. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 的 A_2 根系中，分别以 $v = (2, 0, -2)$ 、 $v' = (0, 2, -2)$ 选正根，写出两组简单根及对应的严格三角子代数。

解. 第一组简单根为 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2, \varepsilon_2 - \varepsilon_3$ ，正根空间由 E_{12}, E_{23}, E_{13} 张成。第二组的坐标次序为 $2 > 1 > 3$ ，故简单根为 $\varepsilon_2 - \varepsilon_1, \varepsilon_1 - \varepsilon_3$ ，正根空间由 E_{21}, E_{13}, E_{23} 张成。交换第 1, 2 个基向量把两组子代数互相变换。□

习题 16.12. 在 $\mathfrak{sl}_4$ 中，用简单正根向量 $e_1 = E_{12}, e_2 = E_{23}, e_3 = E_{34}$ 写出最高正根向量 E_{14} 的两种迭代括号表达，并用 Jacobi 恒等式比较。

解. $[[e_1, e_2], e_3] = [E_{13}, E_{34}] = E_{14}$, $[e_1, [e_2, e_3]] = [E_{12}, E_{24}] = E_{14}$. Jacobi 恒等式给出二者之差为 $[e_2, [e_1, e_3]]$, 而 $[E_{12}, E_{34}] = 0$, 故两种表达相同. $\square$

习题 16.13. 在 $\mathbb{R}^r$ 中取 $\Psi = \{\pm e_i, \pm 2e_i, \pm e_i \pm e_j \mid i < j\}$. 说明它满足有限性、生成性、反射及结晶条件, 却不是本章的根系.

解. 各反射为坐标变号或带符号的坐标互换, 保持 Ψ . 方向分别为 $e_i, 2e_i, e_i \pm e_j$ 时, 配对为 $2\beta_i, \beta_i, \beta_i \pm \beta_j$, 对所有所列根均为整数. 但是同一直线上同时有 $e_i, 2e_i$, 违反约化条件. 所以它不能是复半单 Lie 代数的根集合. $\square$

习题 16.14. 在平面上取正十边形的十个单位顶点. 说明其关于顶点方向的反射保持该集合, 但不满足结晶条件.

解. 关于一条顶点方向的垂线反射, 把极角 θ 变为 $2\phi + \pi - \theta$; 若 θ, ϕ 都是 $\pi/5$ 的整数倍, 结果仍如此, 故保持十个顶点. 相邻顶点的配对为 $2\cos(\pi/5) = (1 + \sqrt{5})/2$, 不是整数. 因此有限反射对称性本身不足以产生半单 Lie 代数的根系. $\square$

习题 16.15. 对 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 的全部对角矩阵子代数, 求非零伴随权及其公共零空间. 与半单情形比较, 哪一步失效?

解. 非零权仍为 $\varepsilon_i - \varepsilon_j$, 公共零空间为标量矩阵 $\mathbb{C}I_n$. 这些元素位于中心, 所以所有伴随权都看不到它们. $\mathfrak{gl}_n$ 不是半单 Lie 代数, 其 Killing 型在中心上为零; 根不能生成整个对角子代数的对偶空间. $\square$

习题 16.16. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 秩为 r , $h \in \mathfrak{h}$. 证明 $\dim Z_{\mathfrak{g}}(h) = r + \#\{\alpha \in \Phi \mid \alpha(h) = 0\}$, 并推出这个维数与 r 同奇偶.

解. 根分解中的 $\mathfrak{h}$ 全部中心化 h , 而一维根空间 $\mathfrak{g}_{\alpha}$ 被 $\text{ad } h$ 按标量 $\alpha(h)$ 作用. 因此恰好保留零值根空间, 得到维数公式. 零值根成对出现为 $\alpha, -\alpha$, 所以附加项是偶数. $\square$

习题 16.17. 在 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2$ 中取两条对角直线之和. 写出根系、根空间和秩, 并判断根系是否不可约.

解. 设两坐标余根为 h_1, h_2 . 两根 α, β 分别满足 $\alpha(h_1) = 2, \alpha(h_2) = 0$ 和 $\beta(h_1) = 0, \beta(h_2) = 2$. 根系为 $\{\pm\alpha, \pm\beta\}$, 根空间分别由两因子的 e, f 张成, 秩为 2. 两个因子在 Killing 型下正交, 故根系为 $A_1 \oplus A_1$, 可约. $\square$

习题 16.18. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 中判断下列空间是否为子代数:

$$\mathfrak{a} = \mathbb{C}E_{12} + \mathbb{C}E_{23}, \quad \mathfrak{b} = \mathbb{C}E_{12} + \mathbb{C}E_{13}, \quad \mathfrak{c} = \mathbb{C}E_{12} + \mathbb{C}E_{21} + \mathbb{C}(E_{11} - E_{22}).$$

对成立者说明其结构.

解. $[E_{12}, E_{23}] = E_{13} \notin \mathfrak{a}$, 所以第一空间不封闭. $[E_{12}, E_{13}] = 0$, 故 $\mathfrak{b}$ 是二维交换子代数. 第三空间的括号正是标准 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组关系, 所以 $\mathfrak{c} \cong \mathfrak{sl}_2$. 选择若干根空间时, 必须检查根和以及相反根括号产生的 Cartan 方向. $\square$

第十七章 Weyl 群、Dynkin 图与分类

本章研究 Weyl 群的长度与 Weyl 室、支配权和 Dynkin 图，分类有限约化结晶根系，并以 Serre 展示建立相应复半单 Lie 代数的存在与唯一性。

本章目标

- 能计算简单反射、Weyl 群长度及根格和权格，识别支配权。
- 能在带箭头的 Dynkin 图与 Cartan 矩阵之间转换，并保持行列约定。
- 用正定性排除圈、过多分叉与重边，说明根系分类为何穷尽。
- 能在经典坐标模型及 E_8 格模型中直接检查根的性质。
- 在 Serre 构造中，分别检验三角分解的线性生成关系、生成元的非零性、有限维性及半单性。

预备知识为第十六章的根系公理、简单根及根弦，以及实正定二次型与整数格。第 17.4 节还用自由代数和生成关系的商；其构造在该节回顾。

在 A_2 根系中，除两个简单根 α_1, α_2 外，正根还有 $\alpha_1 + \alpha_2$ 。关于 α_1 的反射把它自身送到负根，却把 α_2 送到 $\alpha_1 + \alpha_2$ 。一次反射既改变了某个根的符号，又在其余正根之间作置换。若反复反射，怎样判断一个表达式已是最短的，怎样从许多 Weyl 室中挑出标准代表？简单根间允许的角度还会限制可出现的图形。本章从这项几何计算进入长度、权室与 Dynkin 图的分类。

17.1 Weyl 群

从单个根反射走向它们生成的群，需要同时研究反射乘积和正根符号。交换引理将把最短表达、Weyl 室及支配代表联系起来。

17.1.1 简单反射

定义 17.1.1. 设 E 为有限维实内积空间， $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系， s_α 为根 α 对应的正交反射。由这些反射生成的正交变换群称为 Φ 的 **Weyl 群** (Weyl group)，记为 W 。固定简单根基 $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 后，记 $s_i = s_{\alpha_i}$ 。

因为 W 置换有限集合 Φ ，而 Φ 生成 E ，故这个置换作用忠实， W 是有限群。命题 16.4.4 还说明它由简单反射生成：每个根写成 $w\alpha_i$ ，其中 w 是简单反射的乘积，则 $s_{w\alpha_i} = ws_iw^{-1}$ 。这里得到的是生成元；反射之间的完整关系尚未作出断言。

引理 17.1.2 (删去一个反射)。设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系，选定正根集合及其简单根基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ ，记 $s_i = s_{\alpha_i}$ 为相应简单反射。设 $w = s_{i_1} \cdots s_{i_m}$ 。若 $w\alpha_j$ 为负根，则 ws_j 可由所列乘积删去某一个因子得到。

证明. 从右向左依次把各反射作用于 α_j . 它起初为正, 最终为负, 故某一步首次把正根变成负根. 简单反射只把自己的简单根变为负根, 因此存在 k , 使

$$v\alpha_j = \alpha_{i_k}, \quad v = s_{i_{k+1}} \cdots s_{i_m}.$$

反射的共轭公式给出 $vs_jv^{-1} = s_{i_k}$, 故

$$ws_j = s_{i_1} \cdots s_{i_{k-1}} s_{i_k} vs_j = s_{i_1} \cdots s_{i_{k-1}} v.$$

这正是删去第 k 个因子的乘积。 □

17.1.2 Weyl 室与长度

全部根超平面 $H_\alpha = \{x \in E \mid (x, \alpha) = 0\}$ 把其补集分成若干连通分支, 称为 **Weyl 室** (Weyl chamber). 选定简单根所对应的基本室为

$$C = \{x \in E \mid (x, \alpha_i) > 0 \text{ 对所有 } i\}.$$

它确是一个连通分支: 正根为简单根的非负整数和, 所以 C 中所有正根的值都为正; 它又是若干开半空间的交, 因而凸且连通. 任何不穿过根超平面的连续路径都不能改变这些符号。

定理 17.1.3. 设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系, E 为实内积空间, W 为其 Weyl 群. 选定正根集合 Φ^+ 及简单根基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$, 令 $C = \{v \in E \mid (v, \alpha_i) > 0 \text{ 对所有 } i\}$ 为基本 Weyl 室, $\overline{C}$ 为其闭包. 对 $w \in W$, 令 $\ell(w)$ 为其最短简单反射乘积的因子数. 则

$$\ell(w) = \#\{\alpha \in \Phi^+ \mid w\alpha \in -\Phi^+\}. \quad (17.1)$$

此外, W 在 Weyl 室上单纯传递, 每个 W -轨道与闭基本室 $\overline{C}$ 相交于唯一一点。

证明. 将右边记为 $N(w)$. 因 s_i 置换除 α_i 外的正根, 有

$$N(ws_i) = \begin{cases} N(w) + 1, & w\alpha_i > 0, \\ N(w) - 1, & w\alpha_i < 0. \end{cases}$$

对一个最短表达 $w = us_i$, 其前缀也是最短表达. 若 $u\alpha_i < 0$, 引理 17.1.2 会把 us_i 写成比当前表达少两个因子的乘积, 矛盾. 因此 $u\alpha_i > 0$, 按长度归纳得到 $N(w) = \ell(w)$.

取 $c \in C$. 对任意 $x \in E$, 在有限轨道 Wx 中选取与 c 内积最大的 y . 若 $(y, \alpha_i) < 0$, 则

$$(s_i y, c) - (y, c) = -\frac{2(y, \alpha_i)(\alpha_i, c)}{(\alpha_i, \alpha_i)} > 0,$$

矛盾. 所以 $y \in \overline{C}$; 若 x 不在任何根超平面上, 则 $y \in C$. 这说明各室均为某个 wC . 若 $wC = C$, 则 w 保持正根, 故 $N(w) = 0$, 从而 $w = 1$.

还要处理闭室的边界. 若 $w = s_{i_1} \cdots s_{i_m}$ 最短, 则每个 $\beta_k = s_{i_1} \cdots s_{i_{k-1}} \alpha_{i_k}$ 为正根; 否则交换引理使相应前缀变短. 对任意支配向量 $\mu \in \overline{C}$, 望远镜求和给出

$$\mu - w\mu = \sum_{k=1}^m \frac{2(\mu, \alpha_{i_k})}{(\alpha_{i_k}, \alpha_{i_k})} \beta_k. \quad (17.2)$$

所以 $\mu - w\mu$ 是简单根的非负实线性组合。若 $w\mu$ 也支配，反过来用 w^{-1} ，则 $w\mu - \mu$ 也是这样的组合。简单根线性无关，迫使二者都为零。因此闭室中的代表唯一。 $\square$

在 A_{n-1} 的标准坐标中， $W = S_n$ 置换坐标；一个基本室由 $x_1 > x_2 > \cdots > x_n$ 、 $\sum x_i = 0$ 给出。长度公式便成为排列的逆序数公式。坐标相等时，向量落在室的边界上，其稳定子群可以非平凡，这与室内部的单纯传递性并不冲突。

17.1.3 权格和根格

定义 17.1.4. 设 E 为有限维实内积空间， $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系，固定简单根基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ ，记 $\bar{C} = \{v \in E \mid (v, \alpha_i) \geq 0 \text{ 对所有 } i\}$ 为闭基本室。令 $\alpha^\vee = 2\alpha/(\alpha, \alpha)$ ，并记 $\langle \lambda, \alpha^\vee \rangle = 2(\lambda, \alpha)/(\alpha, \alpha)$ 。两个格

$$Q = \sum_i \mathbb{Z}\alpha_i, \quad P = \{\lambda \in E \mid \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \in \mathbb{Z} \text{ 对所有 } \alpha \in \Phi\}$$

分别称为**根格** (root lattice) 和**权格** (weight lattice)。满足 $\langle \omega_i, \alpha_j^\vee \rangle = \delta_{ij}$ 的向量 ω_i 称为**基本权** (fundamental weight)。属于 $P \cap \bar{C}$ 的向量称为**支配整权** (dominant integral weight)，其集合记为 P^+ 。

命题 17.1.5. 设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系， $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为简单根基， ω_i 为相应基本权，即 $\langle \omega_i, \alpha_j^\vee \rangle = \delta_{ij}$ 。记 P 为权格， Q 为根格， P^+ 为支配整权集合。则

$$P = \bigoplus_i \mathbb{Z}\omega_i, \quad P^+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0}\omega_i, \quad Q \subseteq P,$$

且 P/Q 有限。检验一个向量是否属于 P ，只须检验它与简单余根的配对是否全为整数。证明。余根集合本身也是根系：反射与原根系相同，结晶整数交换了原来的两个根参数。每个正根的余根都是简单余根的非负实组合。若一个简单余根是两个正余根之和，比较在简单余根基下的非负实系数，两个加数都只能在该简单余根的射线上；约化性使它们都等于该简单余根，矛盾。因此全部简单余根都是余根系的简单根；它们已有 r 个，由定理 16.4.3，正好组成余根系的简单根基。故每个余根都是简单余根的整数和，检验简化随之成立。基本权是简单余根的对偶基，所以所列两种展开立即成立。结晶条件给出 $Q \subseteq P$ 。把简单根写成基本权的整数线性组合，所得矩阵可逆，故其像在 $\mathbb{Z}^r$ 中具有有限指数；例如伴随矩阵恒等式说明行列式的绝对值乘每个基本权都落在 Q 中。 $\square$

命题 17.1.6. 设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系， $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为所选简单根基， W 为 Weyl 群， P 为权格， P^+ 为支配整权集合。每个 $\mu \in P$ 的 W 轨道都有唯一支配整权。若 $\mu \in P^+$ 、 $w \in W$ ，则 $\mu - w\mu \in \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i$ 。

证明。反射公式说明 W 保持 P ，故闭室代表仍为整权。存在唯一性已经由定理 17.1.3 证明。公式(17.2)中的系数此时都是非负整数，而 β_k 为正根，故给出后一结论。 $\square$

命题 17.1.7. 设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系， Φ^+ 为所选正根集合， $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为相应简单根基， ω_i 为基本权， $\alpha_i^\vee$ 为简单余根。令 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$ 。则 $\rho = \sum_i \omega_i$ ，特别地 $\langle \rho, \alpha_i^\vee \rangle = 1$ 。

证明. s_i 置换除 α_i 外的正根, 故 $s_i\rho = \rho - \alpha_i$. 与反射公式比较便得每个配对等于 1, 再用基本权基展开. $\square$

17.2 Cartan 矩阵与 Dynkin 图

简单根数目有限, 但其内积最初看似仍有连续参数. 结晶整数把角度和长度比限制为少数可能, Cartan 矩阵由此成为一份离散的记录.

17.2.1 简单根夹角和长度

两个不成比例的根 α, β 给出的整数

$$a = \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}, \quad b = \frac{2(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)}$$

满足 $ab = 4\cos^2\theta < 4$. 对不同简单根, $a, b \leq 0$, 所以可能的有序数对只有

$$(0, 0), \quad (-1, -1), \quad (-1, -2), \quad (-2, -1), \quad (-1, -3), \quad (-3, -1).$$

它们对应夹角 $90^\circ, 120^\circ, 135^\circ, 150^\circ$; 非等长时, 平方长度之比为 2 或 3. 这说明结晶条件不仅限制角度, 也限制不同长度的相对比例.

17.2.2 Cartan 矩阵

定义 17.2.1. 设 $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为有限约化结晶根系的简单根基. 矩阵

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} = \langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle = \frac{2(\alpha_i, \alpha_j)}{(\alpha_i, \alpha_i)}$$

称为根系的 **Cartan 矩阵** (Cartan matrix). 本书的行对应余根, 列对应根.

这个矩阵与模表示论中由投射覆盖重数定义的 Cartan 矩阵是不同对象. 这里 $a_{ii} = 2$, 非对角元为非正整数, 且 $a_{ij} = 0$ 当且仅当 $a_{ji} = 0$. 令 $d_i = (\alpha_i, \alpha_i)/2$, 则 $\text{diag}(d_i)A$ 是简单根的 Gram 矩阵, 故对称正定. 特别地 A 可逆.

命题 17.2.2. 设两个有限约化结晶根系具有相同的带编号 Cartan 矩阵. 把一组简单根送到另一组简单根的线性同构, 将全部根双射到全部根; 在每个不可约分支上, 它将内积乘以一个正数.

证明. 在简单根基下, $s_i(\alpha_j) = \alpha_j - a_{ij}\alpha_i$, 所以这个线性同构交织全部简单反射. 每个根都是某个简单根经这些反射所得, 故它将根集合双射到根集合. 在相邻顶点处, a_{ij}/a_{ji} 决定平方长度之比; 沿连通图传播, 所有长度只差一个共同正比例. 再由 Cartan 系数恢复全部内积, 便得到最后的断言. $\square$

17.2.3 Dynkin 图的构造

为每个简单根画一个顶点；顶点 i, j 之间画 $a_{ij}a_{ji}$ 条边，若是双边或三边，则箭头指向较短的根。所得有向重图称为 Dynkin 图。它同时记录角度及长短，因而恢复 Cartan 矩阵。例如

$$A_2: \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_2: \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad G_2: \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

在这里的 B_2 编号中第一根长、第二根短； G_2 的第一根短。若只保留边数而忘掉箭头，就不能区分一般秩的 B_r 与 C_r 。

分类时方便把每根归一到长度 $\sqrt{2}$ 。其 Gram 矩阵 G 满足

$$G_{ii} = 2, \quad G_{ij} = -\sqrt{a_{ij}a_{ji}} \quad (i \neq j).$$

这只是对 Gram 矩阵作正对角合同变换，仍然正定；它不把原来的长短根真的改成同一个根系。下一节通过这个正定矩阵限制图的形状，再用具体坐标验证所有剩下的图确实出现。

17.3 根系分类

本节先证明候选图形的穷尽性，再用坐标构造证明每种候选确实出现。两个步骤缺一不可：只画出经典图形不能排除其他图，只列出正定矩阵也没有自动给出根集合。

17.3.1 不可约有限根系

定义 17.3.1. 设 $\Phi \subseteq E$ 为非空有限约化结晶根系。若不能把它写成两个非空子集 Φ_1, Φ_2 的不交并，使两子集中的根两两正交，则称 Φ 为**不可约根系** (irreducible root system)。

Dynkin 图的连通分支与根系的正交不可约分支相对应。事实上，简单反射只在自己的图分支中改变坐标，每个根又都是简单根的反射像，故没有根跨越两个分支。于是分类只须处理连通图。

引理 17.3.2. 每个不可约有限约化结晶根系的 Dynkin 图，必为下列图形之一：

$$A_r \ (r \geq 1), \quad B_r \ (r \geq 2), \quad C_r \ (r \geq 3), \quad D_r \ (r \geq 4), \quad E_6, E_7, E_8, F_4, G_2.$$

证明. 先证明图的穷尽性。使用上一节的正定矩阵 G ，其对角元为 2，边上的负非对角元为 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 。在非负向量上增大边权只会减小二次型，所以以下排除也适用于重边。

图不能有圈：在一个最短圈上赋值 1，其余为零，得到 $x^T G x \leq 0$ 。一顶点不能有四个邻点：中心取 2，四邻点取 1，同样得到非正值。不能有两个三叉点：连接两点的途径全部取 2，两端各取两个外邻点赋值 1，其余为零；途径若有 l 个顶点，则在单边情形

$$\frac{1}{2} x^T G x = 4l + 4 - 4(l-1) - 8 = 0.$$

因此图为链，或只有一个三叉点的树。

若有三叉点, 图不能有重边。取从三叉点到最近重边的路径, 再保留三叉点另外两个方向各一个叶点, 以及重边的另一端。对这个主子矩阵逐次消去叶点: 两个单叶点使中心的有效对角元从 2 降为 1; 沿路径的单边消元反复给出 $2 - 1/1 = 1$; 最后重数 $m \geq 2$ 的边使终点对角元成为 $2 - m \leq 0$ 。这与正定矩阵的 Schur 补仍正定矛盾。

所以分叉情形全部为单边。设三个臂长为 $p-1, q-1, r-1$, 其中 $2 \leq p \leq q \leq r$ 。中心坐标为 t , 一条臂的坐标为 $x_1, \dots, x_{p-1}$, 补记 $x_0 = t, x_p = 0$, 再令 $z_j = x_j - (1-j/p)t$ 。逐臂配方得到

$$\frac{1}{2}x^\top Gx = \frac{1}{2} \sum_{\text{三个臂}} \sum_{j=0}^{p-1} (z_j - z_{j+1})^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} - 1 \right) t^2.$$

正定性等价于三个倒数之和大于 1。若 $p \geq 3$, 和至多为 1, 故 $p = 2$; 若 $q = 2$, 所有 $r \geq 2$ 可行, 得到 D_{r+2} ; 若 $q \geq 4$, 仍不可能严格大于 1; 剩下 $q = 3$, 只能 $r = 3, 4, 5$, 分别得到 E_6, E_7, E_8 。

再处理链。链上至多有一条重边。否则取从第一条到下一条重边的最短子链; 从首端消元后, 有效对角元为 $2 - m/2 \leq 1$, 沿中间单边保持至多为 1, 至末端便得到 $2 - m'/d \leq 0$, 违反正定性。三重边若还有一个相邻顶点, 三阶主子式至多为 $8 - 2 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 0$, 所以三重边只能单独构成 G_2 。

若唯一重边为双边, 设其两侧的单链分别有 p, q 个顶点, 包含重边端点。单链矩阵的行列式为 $p+1$, 末端逆矩阵条目为 $p/(p+1)$, 二者都由三对角行列式递推得到。对双边作 Schur 补, 正定条件为

$$1 - \frac{2pq}{(p+1)(q+1)} > 0, \quad \text{即} \quad (p-1)(q-1) < 2.$$

交换两侧后设 $p \leq q$ 。于是或者 $p = 1$, 双边位于端部, 按箭头方向得到 B_r, C_r ; 或者 $p = q = 2$, 得到 F_4 。没有重边的链为 A_r 。这已经排除了所有其他形状; 箭头方向由长度比决定, 树上没有额外的相容性障碍。

这已经证明所列图形的穷尽性。 $\square$

上述证明与箭图中 ADE 正定型的分类有共同部分, 但这里还处理了不等长根及重边。简单根 Gram 矩阵的正定性限制了 Dynkin 图可能的形状。

17.3.2 经典型与例外型

以下坐标均使用普通欧氏内积, 只用于展示根系的形状。记 e_i 为标准正交基。四个经典族为

$$\begin{aligned} A_r &: \{e_i - e_j \mid i \neq j, 1 \leq i, j \leq r+1\} \subseteq \{\sum x_i = 0\}, \\ B_r &: \{\pm e_i, \pm e_i \pm e_j \mid i < j\}, \\ C_r &: \{\pm 2e_i, \pm e_i \pm e_j \mid i < j\}, \\ D_r &: \{\pm e_i \pm e_j \mid i < j\}. \end{aligned} \tag{17.3}$$

两处正负号独立选取。 A_r 取简单根 $e_i - e_{i+1}$; B_r, C_r 前 $r-1$ 个也如此, 末根分别取 $e_r, 2e_r$; D_r 取 $e_1 - e_2, \dots, e_{r-1} - e_r, e_{r-1} + e_r$ 。反射分别是坐标互换、改变一个坐标的

符号, 或互换两坐标并同时变号; 这些操作保持所列集合, 结晶整数也由坐标立即读出。每个正根都能沿相邻差逐次展开, 例如 $e_i - e_j = \alpha_i + \cdots + \alpha_{j-1}$; 对和根先沿两条相邻差移到末端, 再用末端简单根表达, 系数全非负。因此所列根确为简单根, 图分别是相应的链或分叉树。

例外型同样可以从有限坐标集合得到, 毋须先构造例外 Lie 代数。先取八维格

$$L = \{z \in \mathbb{Z}^8 \mid \sum z_i \in 2\mathbb{Z}\} \cup \left(\frac{1}{2}(1, \dots, 1) + \{z \in \mathbb{Z}^8 \mid \sum z_i \in 2\mathbb{Z}\}\right).$$

它对加法封闭, 所有向量的平方长度为偶整数, 任意两个向量的内积为整数。其中平方长度为 2 的向量恰为

$$\Phi_{E_8} = \{\pm e_i \pm e_j \mid i < j\} \cup \left\{ \frac{1}{2}(\pm e_1 \pm \cdots \pm e_8) \mid \text{负号个数为偶数} \right\}. \quad (17.4)$$

前一类有 112 个, 后一类有 128 个。对任意这样的 α , $s_\alpha(x) = x - (x, \alpha)\alpha$ 保持格 L 及长度, 故保持这 240 个向量; 这也同时验证了反射与结晶公理。

取下列八个根:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{2}(e_1 + e_8 - e_2 - e_3 - e_4 - e_5 - e_6 - e_7), & \alpha_2 &= e_1 + e_2, \\ \alpha_3 &= e_2 - e_1, & \alpha_4 &= e_3 - e_2, \\ \alpha_5 &= e_4 - e_3, & \alpha_6 &= e_5 - e_4, \\ \alpha_7 &= e_6 - e_5, & \alpha_8 &= e_7 - e_6. \end{aligned} \quad (17.5)$$

它们的图有中心 α_4 , 三个臂长为 1, 2, 4。还须验证它们确为简单根, 不能只看图形。对 $x = \sum c_i \alpha_i \in L$, 直接解坐标方程得到

$$\begin{aligned} c_1 &= 2x_8, & c_2 &= \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + \cdots + x_7 + 5x_8), \\ c_3 &= \frac{1}{2}(-x_1 + x_2 + \cdots + x_7 + 7x_8), & c_4 &= x_3 + \cdots + x_7 + 5x_8, \\ c_5 &= x_4 + \cdots + x_7 + 4x_8, & c_6 &= x_5 + x_6 + x_7 + 3x_8, \\ c_7 &= x_6 + x_7 + 2x_8, & c_8 &= x_7 + x_8. \end{aligned}$$

在 L 的两种陪集中, 这些数都是整数。若一个平方长度为 2 的格向量同时有正、负系数, 把它分成支集不交的非负组合 $u - v$ 。不同简单根的内积非正, 故 $(u, v) \leq 0$; 两个非零格向量的平方长度至少为 2, 遂有 $(u - v, u - v) \geq 4$, 矛盾。所以所有根的系数同号; 每个 α_i 因此不可分解, 确为简单根。

在 Φ_{E_8} 中分别取与 $e_7 + e_8$ 正交的根, 以及同时与 $e_7 + e_8, e_6 - e_7$ 正交的根, 便得到 E_7, E_6 。与一个子空间相交所得的根集合对其中各根的反射封闭; 上述坐标公式说明它们的简单根分别为前七个和前六个 α_i , 因而张成所需子空间。 E_7 有 62 个整数根与 64 个半整数根, 总计 126 个; E_6 有 40 个整数根与 32 个半整数根, 总计 72 个。这样也核验了三个例外图的存在, 而非仅仅列出符号。

F_4 的根集合为

$$\{\pm e_i, \pm e_i \pm e_j \mid i < j\} \cup \left\{ \frac{1}{2}(\pm e_1 \pm e_2 \pm e_3 \pm e_4) \right\},$$

共有 48 个根, 取简单根

$$e_2 - e_3, \quad e_3 - e_4, \quad e_4, \quad \frac{1}{2}(e_1 - e_2 - e_3 - e_4).$$

符号改变与坐标置换显然保持根集合; 剩下只须检验关于 $\frac{1}{2}(e_1 + e_2 + e_3 + e_4)$ 的反射。它把坐标短根变成半整数短根, 把两坐标同号的长根变成另外两坐标的长根, 保持两坐标异号的长根; 对半整数短根, 按负号数 0, 1, 2, 3, 4 逐项代入, 分别得到半整数根、坐标根、原根、坐标根、半整数根。因此反射公理成立, 配对的整数性也由这些同类计算给出。若 $x = \sum c_i \alpha_i$, 则

$$c_4 = 2x_1, \quad c_1 = x_1 + x_2, \quad c_2 = 2x_1 + x_2 + x_3, \quad c_3 = 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4.$$

对所列三类根, 按第一个非零坐标的符号检查, 系数全为同号整数; 这证明四根构成简单根基, 图中间为双边。

G_2 在 $\sum x_i = 0$ 的三维坐标平面中取

$$\{\pm(e_i - e_j) \mid i < j\} \cup \{\pm(2e_i - e_j - e_k) \mid \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}\}.$$

简单根可取 $\alpha_1 = e_1 - e_2$ 、 $\alpha_2 = -2e_1 + e_2 + e_3$, 正根为

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_1 + 2\alpha_2.$$

两简单反射在坐标 (a, b) 上分别作用为 $(a, b) \mapsto (-a + 3b, b)$ 、 $(a, b) \mapsto (a, a - b)$ 。它们置换上述六个根及其负根, 并把每个根变到一个简单根; 故关于任意根的反射也是这两个反射的共轭, 四条根系公理随之成立。

定理 17.3.3 (根系分类). 不可约有限约化结晶根系的同构类型恰为 A_r ($r \geq 1$)、 B_r ($r \geq 2$)、 C_r ($r \geq 3$)、 D_r ($r \geq 4$)、 E_6, E_7, E_8, F_4, G_2 , 其中允许在一个不可约根系上同时缩放全部长度。任意有限约化结晶根系唯一分成这些类型的正交直和, 忽略分支的排列次序。

证明. 引理 17.3.2 排除了全部其他图。本小节逐一给出的坐标集合满足根系公理, 并已检查简单根及 Dynkin 图, 所以每种图均存在。命题 17.2.2 说明相同的带箭头图确定根集合, 长度只差整体正比例。最后, 图的连通分支恰好给出根系的正交不可约分支, 且图的连通分解唯一。□

17.3.3 低秩例子和同构

上述参数范围去掉了低秩重复。 B_1, C_1 都给出 A_1 ; B_2 与 C_2 通过平面旋转及整体缩放同构; D_3 的分叉退化为 A_3 , 而 $D_2 = A_1 \oplus A_1$ 可约。秩至少为 3 时, B_r 与 C_r 的长短根数量相反, 不能再通过整体相似互换。它们的 Weyl 群却相同, 都是全部带符号的坐标置换群。这说明 Weyl 群本身并不确定根系。

命题 17.3.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数, Φ 为相应根系。记 $\mathfrak{g}_\alpha$ 为根空间, $t_\alpha \in \mathfrak{h}$ 为满足 $\kappa_{\mathfrak{g}}(t_\alpha, h) = \alpha(h)$ 对所有 $h \in \mathfrak{h}$ 成立的元素。 Φ 的不可约分支与 $\mathfrak{g}$ 的单理想一一对应; 对应于分支 $\Psi \subseteq \Phi$ 的理想为

$$\mathfrak{g}(\Psi) = \text{span}_{\mathbb{C}}\{t_\alpha \mid \alpha \in \Psi\} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Psi} \mathfrak{g}_\alpha.$$

证明. 不同根系分支正交, 且不存在跨分支的根和. 根空间括号公式及 $[t_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \beta(t_\alpha)\mathfrak{g}_\beta$ 说明不同的 $\mathfrak{g}(\Psi)$ 互相交换, 且各自为理想, 其直和为 $\mathfrak{g}$. 另一方面, 定理 13.3.1 将 $\mathfrak{g}$ 分成单理想. 先在各单理想中取 Cartan 子代数; 它们之和自中心化且为环面, 故是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 不同单理想的根互相正交; 一个单理想的根系若可分解, 前一段的构造又会把该理想分成两个非零理想, 矛盾. 最后用定理 16.1.5 把这份 Cartan 子代数搬到当前 $\mathfrak{h}$, 所以每个不可约分支恰对应一个单理想. $\square$

经典根系由 $\mathfrak{sl}_{r+1}$ 、 $\mathfrak{so}_{2r+1}$ 、 $\mathfrak{sp}_{2r}$ 、 $\mathfrak{so}_{2r}$ 实现. 例外型也将由下一节的统一展示构造得到. 例如 G_2, F_4 另有与八元数代数、Albert 代数¹的导子有关的具体模型. 这些模型的构造涉及额外的非结合代数理论.

17.4* 从根系到 Lie 代数

有限根系的分类已经完成, 本节补足由根系恢复复半单 Lie 代数的构造. 后文研究给定半单 Lie 代数的表示时, 将直接使用它的根数据.

17.4.1 Serre 关系与展示

根系分类给出有限的图表, 却还留下两个代数问题: 每个图是否来自一个 Lie 代数; 同一个图是否只能来自一个同构类型. 本节从根系、自由代数及根 $\mathfrak{sl}_2$ 的计算出发解决二者. 生成关系、自由字模型及局部幂零反射的证明方法可对照 [8, Sections 18.1–18.4, pp. 96–101].

定义 17.4.1. 设 $A = (a_{ij}) \in M_r(\mathbb{Z})$ 是有限约化结晶根系的 Cartan 矩阵, 行对应余根. 取复自由 Lie 代数的生成元 e_i, f_i, h_i ($1 \leq i \leq r$), 并加上下列关系:

$$\begin{aligned} [h_i, h_j] &= 0, & [h_i, e_j] &= a_{ij}e_j, & [h_i, f_j] &= -a_{ij}f_j, \\ [e_i, f_j] &= \delta_{ij}h_i, & (\text{ad } e_i)^{1-a_{ij}}e_j &= 0, & (\text{ad } f_i)^{1-a_{ij}}f_j &= 0 \quad (i \neq j). \end{aligned} \quad (17.6)$$

由自由 Lie 代数模去这些关系生成的理想所得的 Lie 代数记为 $\mathfrak{g}(A)$. 这组关系称为 **Serre 关系** (Serre relations), 给出 $\mathfrak{g}(A)$ 的生成元与关系展示 (也称呈示).

自由 Lie 代数可以不借助存在性定理而直接构造: 对生成元的所有有限带括号字取自由向量空间, 把反对称性和 Jacobi 恒等式生成的理想模掉; 每个到某个 Lie 代数的生成元映射唯一延拓为同态. 这一泛性质保证上述商的含义明确.

给出生成元和关系之后, 还须证明所得代数非零, 并证明 h_i 线性无关. 下面构造一个允许任意复参数的具体作用来证明这两点.

引理 17.4.2. 设 Φ 为有限约化结晶根系, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为简单根基, $A \in M_r(\mathbb{Z})$ 为相应有限型 Cartan 矩阵. 记 $\mathfrak{g}(A)$ 为由复生成元 e_i, f_i, h_i 及 Serre 关系 (17.6) 定义的 Lie 代数. 令 $\mathfrak{n}^\pm$ 为 $\mathfrak{g}(A)$ 中由 e_i, f_i 分别生成的子代数, 令 $\mathfrak{h} = \sum_i \mathbb{C}h_i$. 则

$$\mathfrak{g}(A) = \mathfrak{n}^- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+,$$

¹艾伯特 (Abraham Adrian Albert, 1905–1972), 美国数学家, 研究非结合代数与中心单代数; 例外型 Jordan 代数以他命名.

且 $h_1, \dots, h_r$ 线性无关。按照 $\deg e_i = \alpha_i, \deg f_i = -\alpha_i, \deg h_i = 0$, 这个代数有根格分次; 非零次数只能是简单根的全非负组合或全非正组合。

证明. 先在自由结合代数 $T = \mathbb{C}\langle f_1, \dots, f_r \rangle$ 上构造算子。给定任意参数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 令 F_i 为左乘 f_i ; 对次数为 $-\beta = -\sum_j n_j \alpha_j$ 的字 u , 令

$$H_i u = \left(\lambda_i - \sum_j n_j a_{ij} \right) u.$$

再按字长递归规定

$$E_i 1 = 0, \quad E_i(f_j u) = f_j E_i u + \delta_{ij} H_i u.$$

由此直接得到 $[H_i, H_j] = 0, [H_i, F_j] = -a_{ij} F_j, [H_i, E_j] = a_{ij} E_j, [E_i, F_j] = \delta_{ij} H_i$ 。例如第三式可在 1 上验证后, 把两边作用于 $f_k u$, 利用递归式把差化为相同关系在较短字 u 上的差。

令 J 为由 $S_{ij} = (\text{ad } f_i)^{1-a_{ij}} f_j$ ($i \neq j$) 生成的双边理想。它是齐次的, 故被各 H_k 保持, 也被左乘保持。还须验证各 E_k 保持它。对 $m = 1 - a_{ij}$, 交换子法则及上面的四组关系给出

$$[E_i, (\text{ad } F_i)^m F_j] = m(-a_{ij} - m + 1)(\text{ad } F_i)^{m-1} F_j = 0.$$

当 $k \neq i, j$ 时交换子为零; 当 $k = j$ 时, 结果为 $(\text{ad } F_i)^m H_j$, 也为零: 若 $m \geq 2$, 第二次括号已经消失; 若 $m = 1$, 则 $a_{ij} = a_{ji} = 0$ 。因此 $E_k(S_{ij}u) = S_{ij}E_k u$ 。在左侧再逐个添 f_l , 递归式说明新产生的 H_k 项仍在齐次理想 J 中。故 $E_k J \subseteq J$ 。

这些算子于是降到非零空间 T/J 上; 它非零是因为 J 由正次数齐次元生成, 不含 1。负 Serre 关系按构造成立。正 Serre 算子 $R_{ij} = (\text{ad } E_i)^{1-a_{ij}} E_j$ 与每个 F_k 交换: 交换前一段的 E, F 并把 H 改成 $-H$, 所得同一个系数恰为零。又因 $E_i 1 = 0$, 有 $R_{ij} 1 = 0$, 故与全部左乘交换后, R_{ij} 在每个字上都为零。所以这确实是 $\mathfrak{g}(A)$ 的作用。若 $\sum c_i h_i = 0$, 作用在 1 上得到 $\sum c_i \lambda_i = 0$ 对所有复参数成立, 故每个 $c_i = 0$ 。

最后证明三角跨度。由 Jacobi 恒等式及 $[e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i$, 有 $[e_i, \mathfrak{n}^-] \subseteq \mathfrak{n}^- + \mathfrak{h}$: 对负字长度归纳, 括号经过一个 f_j 后或者留下较短负字, 或者成为 h_i , 后者再与其余负字作括号仍回到 $\mathfrak{n}^-$ 。同理 $[f_i, \mathfrak{n}^+] \subseteq \mathfrak{n}^+ + \mathfrak{h}$ 。继续对正字长度归纳, 得到 $[\mathfrak{n}^+, \mathfrak{n}^-] \subseteq \mathfrak{n}^- + \mathfrak{h} + \mathfrak{n}^+$ 。故该和是含全部生成元的子代数, 等于 $\mathfrak{g}(A)$ 。所有关系齐次, 所以根格分次下降到商; 正次数、零次数、负次数互不相交, 和因此为直和。次数为 α_i 的空间至多一维, 由 e_i 张成; 负简单次数同理。□

17.4.2 复半单 Lie 代数的存在性与唯一性

定理 17.4.3 (Serre 展示). 设 Φ 为秩 r 的有限约化结晶根系, $A \in M_r(\mathbb{Z})$ 为相应简单根基下的 Cartan 矩阵。记 $\mathfrak{g}(A)$ 为复生成元 e_i, f_i, h_i ($1 \leq i \leq r$) 及 Serre 关系 (17.6) 定义的 Lie 代数。则 $\mathfrak{g}(A)$ 是有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h} = \bigoplus_i \mathbb{C} h_i$ 是其 Cartan 子代数, 其根系与 Φ 同构, 并且

$$\dim \mathfrak{g}(A) = r + |\Phi|.$$

任意具有根系 Φ 的有限维复半单 Lie 代数, 都同构于 $\mathfrak{g}(A)$ 。

证明. 先证有限维, 不能把它当作展示的当然结果. 导子 $\text{ad } e_i, \text{ad } f_i$ 在每个生成元上局部幂零: 对同号生成元是 Serre 关系, 对异号生成元和 h_j 则由前三组关系直接算出. 若导子在两个元素上分别由某次幂零化, 二项式法则说明它也在二者的括号上由某次幂零化; 因此它们在整个 $\mathfrak{g}(A)$ 上局部幂零. 于是

$$T_i = \exp(\text{ad } e_i) \exp(-\text{ad } f_i) \exp(\text{ad } e_i)$$

逐元素由有限和定义, 是自同构. 标准三元组计算给出 $T_i(h_j) = h_j - a_{ji}h_i$; 所以 T_i 把次数为 β 的空间同构地送到次数为 $s_i\beta$ 的空间. 这里 A 可逆, 根格的次数由全部 h_j 特征值唯一确定.

若正次数 $\beta = \sum n_i \alpha_i \neq 0$ 的空间非零, 则 $(\beta, \beta) = \sum n_i (\beta, \alpha_i) > 0$, 可选 i 使 $\beta(h_i) = 2(\beta, \alpha_i)/(\alpha_i, \alpha_i) > 0$. 若 β 有其他非零系数, $s_i\beta$ 仍有这些正系数; 三角分次排除了混合正负系数, 故 $s_i\beta$ 全非负, 而高度严格减少. 若 β 只支持在 i , 则对应正字只能由 e_i 自己组成; 一个元素与自己作括号为零, 所以只能有 $\beta = \alpha_i$. 迭代降高度, 得每个非零次数都可由简单反射变成简单根或其负根. 因此所有次数都属于有限集合 $W\Delta = \Phi$, 每个次数空间至多一维. 这已经证明 $\dim \mathfrak{g}(A) \leq r + |\Phi|$.

由上一引理 $h_i \neq 0$, 而 $[e_i, f_i] = h_i$, 所以 $e_i, f_i \neq 0$. 再用 T_i , 全部 Φ 次数空间都非零, 维数恰为一; 于是维数等式成立. 各 $\text{ad } h_i$ 在这个有限分次上同时对角化, 零权空间恰为 $\mathfrak{h}$, 故 $\mathfrak{h}$ 自中心化.

接着证明半单性. 在 $\mathfrak{h}$ 上, Killing 型为

$$B_A(h, k) = \sum_{\alpha \in \Phi} \alpha(h)\alpha(k).$$

对实线性生成空间 $\sum_i \mathbb{R}h_i$, 它正定, 因为 Cartan 矩阵可逆、根分离点. 因此 $B_A|_{\mathfrak{h}}$ 非退化. 每个根次数经某个 T_i 乘积移到简单根次数, 相应三元组也由自同构搬过去. 对简单三元组, 不变性给出

$$2B_A(e_i, f_i) = B_A(h_i, h_i) \neq 0.$$

所以每对相反根空间的配对都非退化. 不同且不相反的权空间互相正交, 故整个 B_A 非退化. 定理 13.2.3 遂给出半单性; 自中心化的环面 $\mathfrak{h}$ 极大, 正是 Cartan 子代数.

最后设 $\mathfrak{g}$ 为具有根系 Φ 的复半单 Lie 代数. 在简单根空间中选择标准三元组 e_i, f_i, h_i . 不同简单根之差不是根, 给出 $[e_i, f_j] = 0$ ($i \neq j$); 根弦定理说明 $(\text{ad } e_i)^{1-a_{ij}}e_j = 0$, 负根同理. 其余关系由三元组和权直接成立. 因此得到 $\mathfrak{g}(A) \rightarrow \mathfrak{g}$ 的同态. 命题 16.4.5 说明像含有 $\mathfrak{h}$ 及全部根空间, 所以满射. 两边均有维数 $r + |\Phi|$, 故核为零, 这便证明唯一性. $\square$

17.4.3 根系分类与 Lie 代数展示

第 17.3 节以正定性确定可能的 Dynkin 图, 并逐一构造相应根系. 本节的 Serre 展示进一步构造 Lie 括号, 证明每个有限型 Cartan 矩阵都对应一个半单 Lie 代数, 其维数为秩与根数之和, 而且同图的复半单 Lie 代数彼此同构.

由命题 17.3.4, 连通图对应单 Lie 代数。因此复单 Lie 代数分成四个经典族和五个例外型。例外型的维数由根数加秩得到:

$$\begin{aligned}\dim E_6 &= 78, & \dim E_7 &= 133, & \dim E_8 &= 248, \\ \dim F_4 &= 52, & \dim G_2 &= 14.\end{aligned}$$

这里的 E_6 等符号在语境明确时兼指根系型或相应单 Lie 代数; 写维数时指后者。分类按复 Lie 代数同构进行, 不能据此把不同的实形式、不同中心的 Lie 群或正特征 Lie 代数也视为同一个分类问题。

本章小结

Weyl 群由简单反射生成, 最短表达的长度等于它改变符号的正根数。室的内部具有单纯传递作用, 闭室则给每个轨道唯一代表; 位于边界上的向量仍可有非平凡稳定子群。权格采用简单余根的对偶基, 支配整权因而对应基本权的非负整数系数。

Dynkin 图保存 Cartan 矩阵, Cartan 矩阵再通过简单反射恢复全部根。分类的穷尽性来自正定 Gram 矩阵: 先排除圈和复杂分叉, 再对三臂树与含重边的链逐一计算。坐标模型保证留下的每一种形状都确实存在。

Serre 构造从 Dynkin 图得到 Lie 代数。允许任意参数的自由字作用证明 Cartan 生成元线性无关; 局部幂零的伴随指数把可能的非零次数降到简单根; 有限根集合随后给出整个代数的维数。存在性与唯一性的证明只使用此前建立的结果, 无须最高权表示分类。

习题

习题 17.1. 在 A_3 中取标准正根 $e_i - e_j$ ($i < j$)。对排列 $w = [3, 1, 4, 2]$, 求 $\ell(w)$, 并给出最短相邻交换表达。

解. 逆序对为 $(1, 2), (1, 4), (3, 4)$, 故长度为 3。采用右侧先作用的约定, $w = s_2 s_1 s_3$: 它依次把 1, 2, 3, 4 送到 3, 1, 4, 2。这个三因子表达达到逆序数下界, 所以最短。□

习题 17.2. 在 B_2 中取 $\alpha_1 = e_1 - e_2, \alpha_2 = e_2$ 。写出简单反射矩阵, 求 $s_1 s_2$ 的阶和 W 的阶。

解.

$$s_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad s_1 s_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

乘积是直角旋转, 阶为 4。坐标互换及一个坐标变号生成全部带符号置换, 共有 $2^2 \cdot 2! = 8$ 个, 故 W 为八阶二面体群。□

习题 17.3. 由根反射的坐标公式证明: $W(B_r) = W(C_r)$ 是全部带符号置换群, $W(D_r)$ 是变号次数为偶数的带符号置换群。求它们的阶。

解. $e_i - e_j$ 的反射交换两个坐标; e_i 或 $2e_i$ 的反射改变一个坐标的符号, 故前两类生成全部带符号置换, 阶为 $2^r r!$ 。 D_r 只有和根、差根; 和根的反射在互换坐标的同时改变

这两个符号, 故总变号数为偶数。结合普通坐标互换, 可以实现任意两坐标同时变号, 因此得到全部偶变号置换, 阶为 $2^{r-1}r!$ 。□

习题 17.4. 对 A_2 的 $\alpha_1 = e_1 - e_2, \alpha_2 = e_2 - e_3$, 求基本权, 并证明 $P/Q \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

解. 解与两简单余根的配对方程及坐标和为零的条件, 得

$$\omega_1 = \frac{1}{3}(2, -1, -1), \quad \omega_2 = \frac{1}{3}(1, 1, -2).$$

根为 $\alpha_1 = 2\omega_1 - \omega_2, \alpha_2 = -\omega_1 + 2\omega_2$ 。模根格后有 $\omega_2 = 2\omega_1, 3\omega_1 = 0$; 而 ω_1 的坐标不是整数, 所以不在 Q 中。故商恰为三阶循环群。□

习题 17.5. 对 B_2 的上述简单根, 求 Q, P 和基本权, 判断 $e_1/2$ 是否为整权。

解. 简单余根为 $e_1 - e_2, 2e_2$, 故 $\omega_1 = e_1, \omega_2 = (e_1 + e_2)/2$ 。有 $Q = \mathbb{Z}^2$, 而

$$P = \mathbb{Z}^2 \cup \left(\frac{1}{2}(e_1 + e_2) + \mathbb{Z}^2\right).$$

$e_1/2$ 与第一简单余根的配对为 $1/2$, 所以不是整权。只有同时出现的两个半整数坐标才属于另一陪集。□

习题 17.6. 在 A_2 中求权 $\lambda = -\omega_1 + 2\omega_2$ 的支配代表, 并列它与此代表之差。

解. $\lambda = (0, 1, -1)$ 。按坐标递减排列, 支配代表为 $(1, 0, -1) = \omega_1 + \omega_2$, 由交换前两坐标得到。代表减原权为 $(1, -1, 0) = \alpha_1$ 。所以原权虽是一个正根, 却不是支配权; “正根”与“支配”采用不同判断条件。□

习题 17.7. 在 A_3 的闭基本室中, 取 $\mu = (2, 2, -1, -3)$ 。求它的 Weyl 稳定子群及轨道大小, 并解释与 Weyl 室上单纯传递作用的区别。

解. 只有前两个坐标相等, 所以稳定子群由交换它们的 s_1 生成, 阶为 2; 轨道大小为 $4!/2 = 12$ 。 μ 在墙 $(\mu, \alpha_1) = 0$ 上, 不属于任何开室。群在室的集合上单纯传递, 并不要求每个边界向量的稳定子群都平凡。□

习题 17.8. 在 A_r 中求 ρ 的标准坐标, 并验证每两个相邻坐标之差为 1。

解. 坐标 e_i 在正根和中正出现 $r+1-i$ 次, 负出现 $i-1$ 次, 所以

$$\rho = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{r+1} (r+2-2i)e_i.$$

第 i 与第 $i+1$ 个坐标之差为 1, 故与每个简单余根的配对为 1。坐标和为零, 确实属于根空间。□

习题 17.9. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 采用本书的行余根约定。判断根的长短、长度平方之比和 Dynkin 箭头方向。

解. 由对称性 $(\alpha_1, \alpha_1)a_{12} = (\alpha_2, \alpha_2)a_{21}$, 得 $(\alpha_1, \alpha_1) = 3(\alpha_2, \alpha_2)$ 。因此第一根长、第二根短, 画三重边并将箭头指向第二根。这是 G_2 的另一编号次序。□

习题 17.10. 设 A 为秩 r 根系的 Cartan 矩阵。证明 $[P:Q] = |\det A|$ ，并算出 A_r 的这个指数。

解. 由 $\alpha_j = \sum_i a_{ij}\omega_i$ ，根格在基本权坐标中就是 $A\mathbb{Z}^r$ 。整数矩阵的 Smith 标准形说明其指数等于非零不变因子的乘积，即 $|\det A|$ 。 A_r 的三对角行列式 d_r 满足 $d_r = 2d_{r-1} - d_{r-2}$ 、 $d_0 = 1, d_1 = 2$ ，故 $d_r = r + 1$ 。□

习题 17.11. 构造三臂长为 2, 2, 2 的单边树的一个正整数零向量，即使其 Gram 二次型为零的非零向量。若在任一臂上再加一个顶点，为什么仍不可能正定？

解. 中心赋值 3，每条臂从中心向外赋值 2, 1。半个 Gram 二次型等于 $9 + 3(4 + 1) - 3(6 + 2) = 0$ 。加顶点后让新坐标为零，原向量的二次型仍为零，因此扩大的矩阵仍非正定。这也说明分类中三臂倒数和必须严格大于 1。□

习题 17.12. 对三个顶点、两条边都为双边的链，写出归一 Gram 矩阵并找出非零零向量。

解.

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{2} & 0 \\ -\sqrt{2} & 2 & -\sqrt{2} \\ 0 & -\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}, \quad G(1, \sqrt{2}, 1)^T = 0.$$

因此这种链不能是有限根系的 Dynkin 图。仅有每条边的重数不超过三，并不足以保证正定性。□

习题 17.13. 数出 A_r, B_r, C_r, D_r 的根数，利用根空间一维性求相应半单 Lie 代数的维数，并与经典矩阵维数比较。

解. 根数分别为 $r(r+1), 2r^2, 2r^2, 2r(r-1)$ 。加上秩后，维数为

$$r(r+2), \quad r(2r+1), \quad r(2r+1), \quad r(2r-1).$$

它们依次等于 $(r+1)^2 - 1, (2r+1)2r/2, r(2r+1), 2r(2r-1)/2$ ，与迹零、奇正交、辛和偶正交矩阵模型一致。□

习题 17.14. 在 E_8 坐标模型中，令 $\alpha = \frac{1}{2}(e_1 + \cdots + e_8)$ 、 $\beta = e_1 + e_2$ 。计算 $s_\alpha\beta$ ，并指出它属于哪一类根。

解. $(\alpha, \alpha) = 2$ 、 $(\beta, \alpha) = 1$ ，故

$$s_\alpha\beta = \frac{1}{2}(e_1 + e_2 - e_3 - e_4 - e_5 - e_6 - e_7 - e_8).$$

它有六个负号，属于半整数根。反射会互换坐标模型中的两类根，不能把两类分别当作互不相交的根系分支。□

习题 17.15. 证明 E_8 根格等于正文中的格 L ，并据此证明 $P = Q$ 。

解. 正文给出的八个简单根属于 L ，而坐标求解公式证明 L 中每个向量都是它们的整数和，所以 $Q = L$ 。整数偶和格 D_8 在 $\mathbb{Z}^8$ 中指数为 2，基本体积为 2； L 是它的指数为 2 的扩格，故体积为 1。格 L 整，所以 $L \subseteq L^*$ ，两者体积互为倒数而都为 1，故 $L = L^*$ 。所有根长平方为 2，余根等于根，因此 $P = L^* = L = Q$ 。□

习题 17.16. 对 $r \geq 3$, 解释为什么相同的带符号置换 Weyl 群不能给出 $B_r \cong C_r$, 并具体计算 $r = 3$ 时两种长度的根数。

解. B_r 的短根为 $\pm e_i$, 共 $2r$ 个, 长根共 $2r(r-1)$ 个; C_r 刚好相反。整体相似必须保持长短次序, 而 $r \geq 3$ 时这两个数不同。当 $r = 3$, B_3 有 6 个短根、12 个长根; C_3 有 12 个短根、6 个长根, 所以二者不同构。□

习题 17.17*. 在 A_2 的 Serre 展示中, 令 $z = [e_1, e_2]$ 。证明正部由 e_1, e_2, z 张成, 并计算 $[f_1, z]$ 、 $[f_2, z]$, 由此验证 $z \neq 0$ 。

解. Serre 关系给出 $[e_1, z] = [e_2, z] = 0$, 所以三维跨度对括号封闭且含正部的两个生成元, 因而就是正部。由 Jacobi 恒等式,

$$[f_1, z] = [-h_1, e_2] = e_2, \quad [f_2, z] = [e_1, -h_2] = -e_1.$$

e_1, e_2 非零, 故 $z \neq 0$ 。三个元素又有不同的根次数, 线性无关。□

习题 17.18*. 在 Serre 构造的任意参数自由字模型中, 固定 i , 计算 $E_i f_i^m$, 其中 f_i^m 表示作用于 1 的字。何时 f_i^{m+1} 被 E_i 零化?

解. 递归式给出

$$E_i f_i^m = m(\lambda_i - m + 1) f_i^{m-1}.$$

归纳时增加一位, 系数相加为 $(m-1)(\lambda_i - m + 2) + \lambda_i - 2(m-1) = m(\lambda_i - m + 1)$ 。因此对整数 $m \geq 0$, 若 $\lambda_i = m$, 则 $E_i f_i^{m+1} = 0$ 。这里尚未把该向量生成的子模模掉; 它揭示了后续有限维最高权构造中关系的来源。□

习题 17.19*. 若 Cartan 矩阵是两个块的直和, 利用 Serre 关系直接证明 $\mathfrak{g}(A)$ 是两个对应 Lie 代数的直和。

解. 跨块有 $a_{ij} = a_{ji} = 0$, 故 Serre 关系成为 $[e_i, e_j] = [f_i, f_j] = 0$; 另外已有 $[e_i, f_j] = 0$ 、 $[h_i, e_j] = [h_i, f_j] = 0$ 。所以两个块生成的子代数互相交换, 并共同生成整个代数。各块的展示给出到整体的同态, 也有把另一块全部送到零的反向投影。包含与投影的复合在生成元上为恒等, 证明每个块都嵌入且交为零, 遂为直和。□

习题 17.20*. 设 σ 为保持 Cartan 矩阵的顶点置换。证明 $e_i \mapsto e_{\sigma(i)}, f_i \mapsto f_{\sigma(i)}, h_i \mapsto h_{\sigma(i)}$ 延拓为 $\mathfrak{g}(A)$ 的自同构。对 D_4 指出由图得到的这类自同构群。

解. 每一条定义关系在置换后仍是同一矩阵的一条关系, 所以由展示泛性质得到同态; 使用 σ^{-1} 得到其逆, 故为自同构。 D_4 图有一个中心及三个等长的单顶点臂, 三个叶点可任意置换, 故得到一个 S_3 自同构群。这里构造了图自同构在 Lie 代数上的作用; 它不等于证明全部形式的三重性分类。□

第十八章 最高权与有限维不可约表示

本章先证明复半单 Lie 代数的有限维表示完全可约，再构造 Verma 模及其简单商，并证明有限维简单模恰由支配整最高权参数化。

本章目标

- 区分中心算子的构造、非零标量性质及完全可约性证明中各自的作用。
- 从三角分解和 PBW 解释最高权空间一维、权偏序与有限维权空间。
- 构造 Verma 模的唯一简单商，并明确支配整性是有限维性的充要条件。
- 用简单根幂关系构造有限维简单模，识别自然模、外幂与对称幂的最高权。

在 $\mathfrak{sl}_2$ 的最高权向量 v 上，若 $hv = nv$ 且 $ev = 0$ ，交换关系给出 $e(f^j v) = j(n - j + 1)f^{j-1}v$ 。有限维不可约表示的权链因而会在某一步终止，并迫使 n 是非负整数。对一般半单 Lie 代数，每个简单根都带来一条这样的链；难点是这些链怎样同时相容。我们将先借 Casimir 元控制有限维表示的分解，再由三角分解构造最高权模，最后检验哪些最高权真能给出有限维简单模。

本章使用此前证明的 $\mathfrak{sl}_2$ 分类与完全可约性、PBW 定理、根系及 Weyl 室结构。底域为复数，各项结果的有限维性和半单性条件随陈述给出。根内积采用 Killing 型诱导的归一化，尤其 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Killing Casimir 是 $h^2 + 2h + 4fe$ 的八分之一。

先证明 Verma 商非零且有限维，才能在下一章计算其维数与权重数。关于简单根幂关系与局部幂零性的论述，可参阅 Humphreys[8, Section 21.4, pp. 115–116]；本章将展开权集有限性与商模非零性的证明。

18.1 完全可约性

有限群表示的平均投影依赖有限求和。Lie 代数没有可以直接照搬的群元素平均式，但半单性提供了另一种工具：一个由不变双线性型构造的中心算子。它能消去截面不保持作用所产生的误差，从而证明任意子模都有不变补。本节始终讨论有限维复半单 Lie 代数及其有限维复表示。

18.1.1 Weyl 完全可约性定理

若一个模是简单模的直和，就称它完全可约。对于有限维模，这等价于每个子模都有子模补空间：后一条件允许逐次取一个简单子模并分裂；前一条件则可按有限直和归纳证明任意子模都可分裂。下面证明所有短正合列分裂。

先固定需要保持一致的双线性型。设 $\mathfrak{g}$ 为复半单 Lie 代数, $B(x, y) = \operatorname{tr}_{\mathfrak{g}}(\operatorname{ad} x \operatorname{ad} y)$ 为其 Killing 型。对一组基 $x_1, \dots, x_N$, 用 $x^1, \dots, x^N$ 表示满足 $B(x_i, x^j) = \delta_i^j$ 的对偶基。在包络代数中定义

$$C = \sum_{i=1}^N x_i x^i \in U(\mathfrak{g}). \quad (18.1)$$

它称为 Killing 型对应的 **Casimir 元** (Casimir element)。不同不变型给出的 Casimir 元可能相差因子; 本书以后未另加说明时都使用(18.1)。

命题 18.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, B 为其 Killing 型。取 $\mathfrak{g}$ 的一组基 $x_1, \dots, x_N$ 及满足 $B(x_i, x^j) = \delta_i^j$ 的对偶基 $x^1, \dots, x^N$, 令 $C = \sum_{i=1}^N x_i x^i \in U(\mathfrak{g})$ 。则 C 不依赖对偶基的选择, 并属于 $U(\mathfrak{g})$ 的中心。因此在任意复 $\mathfrak{g}$ 模上, C 的作用与全部 $\mathfrak{g}$ 作用交换。
证明. 在 B 给出的 $\mathfrak{g}^* \simeq \mathfrak{g}$ 识别下, 张量 $\sum_i x_i \otimes x^i$ 对应 $\operatorname{End}(\mathfrak{g})$ 的恒等算子, 故不依赖基。Killing 型的不变性使此识别与伴随作用相容; 恒等算子在共轭作用下不变, 所以

$$\sum_i [x, x_i] \otimes x^i + \sum_i x_i \otimes [x, x^i] = 0 \quad (x \in \mathfrak{g}). \quad (18.2)$$

对这个等式应用乘法 $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$, 得到 $[x, C] = 0$ 。由于 $\mathfrak{g}$ 生成包络代数, C 与整个 $U(\mathfrak{g})$ 交换。□

中心性本身还不够: 一个中心算子可能为零。下一步要证明, C 在每个非平凡的有限维简单模上作用为非零标量。所用正性只在根的实空间与整数权上出现, 并非给整个复 Lie 代数选择正定 Killing 型。

18.1.2 Casimir 方法的证明

引理 18.1.2. 设 $\mathfrak{g} \neq 0$ 为有限维复半单 Lie 代数, M 为非零有限维简单 $\mathfrak{g}$ 模。其 Killing Casimir 元作用为标量 c_M 。若 M 非平凡, 则 c_M 是正实数; 若 M 平凡, 则 $c_M = 0$ 。
证明. 中心性和 Schur 引理给出标量作用。由定理 13.3.1, 将 $\mathfrak{g}$ 写成单理想的直和 $\bigoplus_j \mathfrak{g}_j$, 并令

$$B_M(x, y) = \operatorname{tr}_M(\rho(x)\rho(y)).$$

这是不变对称双线性型。不同单理想之间的配对为零: 若 $x = [u, v] \in \mathfrak{g}_j$, $y \in \mathfrak{g}_\ell$, $j \neq \ell$, 则不变性给出 $B_M(x, y) = B_M(u, [v, y]) = 0$; 每个单理想由其括号生成。

在 $\mathfrak{g}_j$ 上, 用非退化的 Killing 型将 B_M 写成 $B(Tx, y)$ 。不变性说明 T 与伴随作用交换。单理想的伴随模不可约, 因此 $T = b_j I$, 即 $B_M|_{\mathfrak{g}_j} = b_j B|_{\mathfrak{g}_j}$ 。

若 $\mathfrak{g}_j$ 在 M 上作用为零, 则 $b_j = 0$ 。否则其表示核为单理想的真理想, 只能为零。取该因子的一个根余根 h_α 。由定理 16.3.1, 它属于一个标准 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组; 由定理 14.3.3 及定理 14.3.1, $\rho(h_\alpha)$ 可对角化且特征值为整数。忠实性使此算子非零, 所以

$$B_M(h_\alpha, h_\alpha) = \sum_{\text{特征值 } m} m^2 > 0.$$

Killing 诱导型在根实空间正定, 因而 $B(h_\alpha, h_\alpha) > 0$ 。所以 $b_j > 0$ 。这里把 M 限制到已经解决的三维子代数。

分别选择各单理想的 Killing 对偶基, 得到

$$c_M \dim M = \operatorname{tr}_M C = \sum_j b_j \dim \mathfrak{g}_j.$$

非平凡表示至少在一个单因子上非零, 所以右侧严格为正。平凡模上所有基元素都作用为零, 结论也成立。□

引理 18.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, M 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模, $C \in U(\mathfrak{g})$ 为 Killing 型对应的 Casimir 元。则 M 有 $\mathfrak{g}$ 子模直和分解

$$M = M_0 \oplus M_\times,$$

其中 M_0 是 C 的广义零特征空间, $\mathfrak{g}$ 在 M_0 上作用为零, 而 C 在 $M_\times$ 上可逆。

证明. 对与 $\mathfrak{g}$ 交换的线性算子 C 作广义特征空间分解, 取零特征空间为 M_0 , 其余广义特征空间之和为 $M_\times$ 。两者都是子模, 且 C 在后者上可逆。

M_0 的每个简单合成因子上, C 同时为幂零算子和标量, 所以标量为零。引理 18.1.2 说明这些因子都是平凡的一维模。取适应合成列的基, 则所有 $\rho(x)|_{M_0}$ 都为严格上三角矩阵, 故像 Lie 代数可解。另一方面, 推论 13.3.3 给出 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$, 所以其像也等于自身的导出代数。一个既可解又等于自身导出代数的 Lie 代数只能为零。于是 $\mathfrak{g}$ 在 M_0 上平凡作用。□

引理 18.1.4 (交叉映射的消去). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, M 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。若复线性映射 $d: \mathfrak{g} \rightarrow M$ 对所有 $x, y \in \mathfrak{g}$ 满足

$$d([x, y]) = x \cdot d(y) - y \cdot d(x),$$

则存在 $m \in M$, 使 $d(x) = x \cdot m$ 对全部 $x \in \mathfrak{g}$ 成立。

证明. 用引理 18.1.3 分解 M 。投到平凡分量后, 上式变成 $d_0([x, y]) = 0$, 而 $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, 所以 $d_0 = 0$ 。因而只须处理 C 可逆的分量。

在该分量中令

$$a = \sum_i x_i \cdot d(x^i).$$

对任意 x , 使用交叉映射恒等式, 得到

$$\begin{aligned} x \cdot a &= \sum_i [x, x_i] \cdot d(x^i) + \sum_i x_i \cdot (x \cdot d(x^i)) \\ &= \sum_i [x, x_i] \cdot d(x^i) + \sum_i x_i \cdot d([x, x^i]) + \sum_i x_i x^i \cdot d(x). \end{aligned}$$

前两和由(18.2)相消, 所以 $x \cdot a = C d(x)$ 。令 $m = C^{-1}a$, 由于 C^{-1} 仍与作用交换, 便有 $x \cdot m = d(x)$ 。□

这个引理也可用一阶 Lie 代数上同调的语言表达; 下面直接求解所需的线性恒等式。

定理 18.1.5 (Weyl 完全可约性). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。每个子模 $U \subseteq V$ 都有一个子模 U' , 使 $V = U \oplus U'$ 。因此每个这样的 V 都是有限个简单模的直和。

证明. 令 $W = V/U$, 选一个复线性截面 $s: W \rightarrow V$, 暂不要求它保持 Lie 代数作用。对 $x \in \mathfrak{g}$ 定义

$$d(x) = \rho_V(x)s - s\rho_W(x): W \rightarrow U.$$

商映射作用于该差为零, 故其像确实在 U 。在 $M = \text{Hom}_{\mathbb{C}}(W, U)$ 上取作用

$$x \cdot T = \rho_U(x)T - T\rho_W(x).$$

展开两边, 并使用三个表示都保持括号, 可得 $d([x, y]) = x \cdot d(y) - y \cdot d(x)$; 其中含 $s\rho_W(x)\rho_W(y)$ 的项组成 $-s\rho_W([x, y])$, 含 $\rho_V(x)\rho_V(y)s$ 的项组成 $\rho_V([x, y])s$, 交叉项抵消。

由引理 18.1.4, 存在 $T: W \rightarrow U$ 使 $d(x) = x \cdot T$ 。所以 $s' = s - T$ 保持 $\mathfrak{g}$ 作用, 且仍是商映射的截面。取 $U' = s'(W)$, 则 U' 是子模, 并且 $V = U \oplus U'$ 。最后对维数归纳, 先取非零最小子模, 再分裂补空间, 得到简单模直和分解。□

18.1.3 与有限群平均投影的比较

有限群情形从任意线性投影出发, 平均后得到保持作用的投影; 这里从任意线性截面出发, 用 Casimir 算出修正项 T , 再减去误差。两者都把“有一个线性分裂”改造成“有一个表示分裂”, 但所依据的条件不同。当前证明用到了特征零、有限维性、Killing 型非退化以及半单 Lie 代数的完美性。

条件不能随意删除。一维交换 Lie 代数 $\mathbb{C}x$ 在 $\mathbb{C}^2$ 上令 x 作用为一个非零平方零 Jordan 块, 就有一维子模而没有不变补。即使 Lie 代数半单, 无限维模也不一定完全可约; 下一节之后的 Verma 模会给出实例。因此本定理没有声称包络代数本身是半单环, 也没有声称其任意模都完全可约。

在标准 $\mathfrak{sl}_2$ 基 e, f, h 中, $[h, e] = 2e$ 、 $[h, f] = -2f$ 、 $[e, f] = h$, Killing 型满足 $B(h, h) = 8$ 、 $B(e, f) = 4$ 。所以本节的 Casimir 元为

$$C = \frac{h^2}{8} + \frac{ef + fe}{4} = \frac{h^2 + 2h + 4fe}{8}. \quad (18.3)$$

若前面的 $\mathfrak{sl}_2$ 计算使用 $h^2 + 2h + 4fe$, 其特征值应在这里除以八。这个常数将在下一章的根长与递推中继续保持。

18.2 权与最高权

完全可约性把有限维表示的研究归结为简单模。要给简单模编号, 需要选定 Cartan 子代数及正根; 对这一选择而言, 一个简单模会有唯一的最高权。改变正根系会改变这个标签的表达, 但不会改变原来的表示。

18.2.1 Borel 子代数及三角分解

固定有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 、Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 、根系 Φ 、正根集 Φ^+ 及简单根 $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ 。由定理 16.2.2, 记

$$\mathfrak{n}^+ = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_\alpha, \quad \mathfrak{n}^- = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_{-\alpha}, \quad \mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+.$$

于是有向量空间的三角分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{n}^- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+.$$

这里“向量空间”不可省略：三个直和项并不是三个彼此交换的理想。

定义 18.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复 Lie 代数。它的一个可解子代数若不真包含在另一个可解子代数中, 就称为 **Borel 子代数** (Borel subalgebra)。¹

命题 18.2.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根。令 $\mathfrak{n}^+ = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_\alpha$ 、 $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+$, 其中 $\mathfrak{g}_\alpha$ 为根空间。则 $\mathfrak{n}^+$ 幂零, $\mathfrak{b}$ 是 Borel 子代数, 且

$$[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] = \mathfrak{n}^+.$$

证明. 根空间括号满足 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ 。连续对正根向量取括号会使简单根高度相加, 而正根高度有有限上界, 所以 $\mathfrak{n}^+$ 幂零。 $\mathfrak{h}$ 交换, 故 $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] \subseteq \mathfrak{n}^+$ 。每个根 $\alpha \neq 0$, 可取 $h \in \mathfrak{h}$ 使 $\alpha(h) \neq 0$, 于是 $x_\alpha = \alpha(h)^{-1}[h, x_\alpha]$, 得到反向包含。由此 $\mathfrak{b}$ 可解。

若子代数 $\mathfrak{c}$ 真包含 $\mathfrak{b}$, 则因 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{c}$, 它在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定。根分解的投影可由若干 $\text{ad } h$ 的多项式给出, 所以 $\mathfrak{c}$ 也按根空间分解。它已含 $\mathfrak{h}$ 和所有正根空间, 严格增加只能使它含有某个 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 、 $\alpha > 0$ 。连同已在其中的 $\mathfrak{g}_\alpha$, 根 $\mathfrak{sl}_2$ 定理使它包含一个 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数。可解代数的子代数仍可解, 而 $\mathfrak{sl}_2 = [\mathfrak{sl}_2, \mathfrak{sl}_2] \neq 0$, 矛盾。因此 $\mathfrak{b}$ 极大可解。 $\square$

定义 18.2.3. 设 V 为复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的模, $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为交换子代数。对 $\mu \in \mathfrak{h}^*$, 令

$$V_\mu = \{v \in V \mid h \cdot v = \mu(h)v \text{ 对所有 } h \in \mathfrak{h}\}.$$

它称为相应的**权空间** (weight space)。若 $V_\mu \neq 0$, 称 μ 为 V 的**权** (weight)。若 $V = \bigoplus_\mu V_\mu$, 就说 V 具有**权分解**。

命题 18.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数。选择简单根 $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$, 记其对应余根为 $h_1, \dots, h_\ell$ 。每个有限维复 $\mathfrak{g}$ 模 V 都有相对于 $\mathfrak{h}$ 的权分解, 且全部权属于权格 $P = \{\mu \in \mathfrak{h}^* \mid \mu(h_i) \in \mathbb{Z} \text{ 对所有 } i\}$ 。对相应根系中的每个根 α 、根向量 $x_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ 及 $\mu \in \mathfrak{h}^*$, 有 $x_\alpha V_\mu \subseteq V_{\mu+\alpha}$ 。

证明. 将 V 限制到每个简单根的 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数。由定理 14.3.3 和定理 14.3.1, h_i 的作用可对角化, 且特征值为整数。这些算子彼此交换, 并生成 $\mathfrak{h}$ 的作用, 因此可同时对角化, 得到权分解和整性。

若 $v \in V_\mu$, 则

$$h(x_\alpha v) = [h, x_\alpha]v + x_\alpha h v = (\alpha(h) + \mu(h))x_\alpha v.$$

所以 $x_\alpha v$ 要么为零, 要么处于 $\mu + \alpha$ 权空间。 $\square$

¹博雷尔 (Armand Borel, 1923-2003), 瑞士数学家, 在代数群、拓扑及自守形式方面作出重要贡献。

18.2.2 最高权向量和最高权模

在 $\mathfrak{sl}_2$ 的权链中, 升算子到达链的上端便为零。一般根向量同样把 μ 权空间送入 $\mu + \alpha$ 权空间; 选定正根以后, 就可以把被所有上升方向零化的向量作为起点, 再用负根方向生成表示。最高权向量与最高权模的定义分别记录这两个要求。

定义 18.2.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根, $\mathfrak{n}^+ = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_\alpha$ 。给定复 $\mathfrak{g}$ 模 V 、非零向量 $v \in V$ 及 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。若满足

$$hv = \lambda(h)v \quad (h \in \mathfrak{h}), \quad \mathfrak{n}^+v = 0,$$

就称为权 λ 的最高权向量。若还满足 $V = U(\mathfrak{g})v$, 则称 V 为最高权模 (highest weight module), 称 λ 为其最高权。此定义允许 V 无限维。

由命题 16.4.5, $\mathfrak{n}^+$ 由简单根向量 e_i 生成。因此 $\mathfrak{n}^+v = 0$ 等价于 $e_i v = 0$ 对每个 i 成立; 任意反复括号作用在 v 上也为零。

命题 18.2.6. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及相应根系的一组正根。相对于这份选择, 每个非零有限维复 $\mathfrak{g}$ 模都有最高权向量; 每个有限维简单模都是最高权模。

证明. 由命题 18.2.4, 权集有限。取根实空间上对全部简单根为正的线性泛函, 选它在权集上达到最大值的权 λ , 并取 $0 \neq v \in V_\lambda$ 。对每个简单根, $\lambda + \alpha_i$ 不在权集中, 所以 $e_i v = 0$ 。简单根向量生成 $\mathfrak{n}^+$, 故 v 为最高权向量。若 V 简单, 非零子模 $U(\mathfrak{g})v$ 必为整个 V 。□

对 $\mathfrak{sl}_r$, 取对角 Cartan 子代数和上三角正根向量。自然模 $\mathbb{C}^r$ 中 e_1 被全部严格上三角矩阵零化, 故为最高权向量; 其他标准基向量通常不是。这里最高权取决于已经选定的正根。

18.2.3 权偏序

记

$$Q_+ = \sum_{i=1}^{\ell} \mathbb{Z}_{\geq 0} \alpha_i.$$

对 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$, 若 $\lambda - \mu \in Q_+$, 记 $\mu \leq \lambda$ 。这是权偏序 (weight order); 简单根线性无关使 $Q_+ \cap (-Q_+) = \{0\}$, 因此反对称性成立。两个权可能不可比较。

命题 18.2.7. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根, $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ 为简单根。令 $\mathfrak{n}^- = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_{-\alpha}$, $Q_+ = \sum_{i=1}^{\ell} \mathbb{Z}_{\geq 0} \alpha_i$ 。设 $V = U(\mathfrak{g})v \neq 0$ 为相对于此选择的最高权模, v 的权为 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 以 $\text{wt}(V)$ 表示其权集。则

$$V = U(\mathfrak{n}^-)v, \quad \text{wt}(V) \subseteq \lambda - Q_+, \quad V_\lambda = \mathbb{C}v.$$

V 有权分解, 每个权空间有限维; 其子模与商模也有相应的权分解。

证明. 对先负根、再 Cartan、再正根的有序基应用定理 15.2.1. 正根部分零化 v , Cartan 部分在 v 上按标量作用, 所以 V 由负根单项式作用于 v 生成. 每个单项式

$$f_{\beta_1}^{a_1} \cdots f_{\beta_N}^{a_N} v, \quad \beta_j \in \Phi^+,$$

若非零, 其权为 $\lambda - \sum_j a_j \beta_j$. 只有全部 $a_j = 0$ 才可能保持最高权, 因为每个正根都有正高度. 故 $V_\lambda = \mathbb{C}v$.

不同权的共同特征空间线性无关, 因而上述生成给出直和分解. 对固定差 $\lambda - \mu$, 各 a_j 的和至多为该差的高度, 故只有有限多个单项式, 证明权空间有限维.

若子模 U 含有 $u = u_{\mu_1} + \cdots + u_{\mu_s}$, 取 $h \in \mathfrak{h}$ 使有限多个 $\mu_j(h)$ 两两不同. 对 h 使用 Lagrange 插值多项式, 可从 u 提取每个 u_{μ_j} , 仍在 U 中. 所以 $U = \bigoplus_\mu (U \cap V_\mu)$, 商模随即按 $V_\mu / (U \cap V_\mu)$ 分解. $\square$

这个结论还说明, 一个最高权模的最高权生成元只差非零标量. 若另一个最高权生成元的权为 μ , 两个生成结论分别给出 $\mu \leq \lambda$ 和 $\lambda \leq \mu$, 故 $\lambda = \mu$; 最高权空间一维. 模中可能另有较低权的最高权向量, 但它们不能生成整个模, 这正是研究子模时要区分的两件事.

18.3 Verma 模

指定最高权以后, 可以只加入最高权向量必须满足的关系, 暂不要求表示有限维. 由一个同权最高权向量生成的表示都是所得模的商. 这样便可先构造最高权模及其简单商, 再研究哪些附加关系使商有限维.

18.3.1 诱导构造

定义 18.3.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根. 令 $\mathfrak{n}^+ = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_\alpha$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+$, 给定 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$. 令 $\mathbb{C}_\lambda$ 为一维 $\mathfrak{b}$ 模, 其中每个 $h \in \mathfrak{h}$ 按 $\lambda(h)$ 作用, $\mathfrak{n}^+$ 作用为零. 诱导模

$$M(\lambda) = U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{b})} \mathbb{C}_\lambda$$

称为最高权 λ 的 Verma 模, 记 $v_\lambda = 1 \otimes 1$.

这个一维作用保持括号, 因为 $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] = \mathfrak{n}^+$ 被送到零. 等价地, $M(\lambda)$ 是 $U(\mathfrak{g})$ 模掉由全部 $x \in \mathfrak{n}^+$ 及 $h - \lambda(h)$, $h \in \mathfrak{h}$ 生成的左理想. 不能把它说成双边理想商代数: 这里构造的是一个左模.

命题 18.3.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根, $\lambda \in \mathfrak{h}^*$. 令 $\mathfrak{n}^\pm = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^\pm} \mathfrak{g}_{\pm\alpha}$, 记相应 Verma 模为 $M(\lambda)$, 其标准最高权生成元为 $v_\lambda = 1 \otimes 1$. 映射

$$U(\mathfrak{n}^-) \longrightarrow M(\lambda), \quad u \longmapsto uv_\lambda$$

是向量空间同构. 特别地 $v_\lambda \neq 0$, $M(\lambda)_\lambda = \mathbb{C}v_\lambda$, 且其权空间有限维. 对任意 $\mathfrak{g}$ 模 V , 若 $v \in V$ 满足 $hv = \lambda(h)v$, $\mathfrak{n}^+v = 0$, 则存在唯一模同态 $M(\lambda) \rightarrow V$ 将 v_λ 送到 v .

证明. PBW 给出乘法同构

$$U(\mathfrak{n}^-) \otimes_{\mathbb{C}} U(\mathfrak{b}) \longrightarrow U(\mathfrak{g})$$

作为向量空间以及右 $U(\mathfrak{b})$ 模的同构。再在右边张量 $\mathbb{C}_\lambda$, 得到所需同构; 常数单项式对应 v_λ , 所以它非零。各 PBW 单项式的权按命题 18.2.7 的计算给出, 得到其余权空间结论。

映射 $u \otimes 1 \mapsto uv$ 良定, 因为 v 满足 $\mathbb{C}_\lambda$ 的全部 $U(\mathfrak{b})$ 关系; 它显然保持左作用。反之, v_λ 生成 $M(\lambda)$, 所以它的像决定整个同态。若 v 生成 V , 这个同态满射。□

例如对 $\mathfrak{sl}_2$, 写 $\lambda(h) = z \in \mathbb{C}$ 。则 $M(z)$ 的基为 $v, fv, f^2v, \dots$, 作用为

$$hf^jv = (z - 2j)f^jv, \quad ef^jv = j(z - j + 1)f^{j-1}v. \quad (18.4)$$

每个权空间一维, 但模本身无限维; “每个权空间有限维” 与 “只有有限多个权” 是不同的条件。

18.3.2 唯一简单商

定理 18.3.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, 固定相应根系的一组正根, $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。相对于这份选择的 Verma 模 $M(\lambda)$ 有唯一极大真子模 $N(\lambda)$, 因此有唯一简单商

$$L(\lambda) = M(\lambda)/N(\lambda).$$

每个非零最高权为 λ 的模都有一个满射到 $L(\lambda)$ 。所有简单最高权模由 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 唯一参数化。

证明. 由命题 18.2.7, 任意子模都按权分解。一个真子模不可能含有 v_λ , 所以它的 λ 权空间为零。令 $N(\lambda)$ 为所有真子模之和; 这个和在每个向量上只有有限个求和项, 仍不含 λ 权分量。因此 $N(\lambda) \neq M(\lambda)$, 却包含每个真子模, 它就是唯一极大真子模。商模非零且没有非零真子模, 所以简单。

若 $V \neq 0$ 为最高权 λ 的模, 由泛性质有满射 $M(\lambda) \rightarrow V$ 。其核为真子模, 故包含于 $N(\lambda)$, 因此满射 $M(\lambda) \rightarrow L(\lambda)$ 经 V 分解。若 V 简单, 这个非零满射就是同构。不同最高权的简单模不能同构, 因为一个最高权模的最高权生成元只有一个权, 已在上一节证明。□

作为一个已经算过的例子, 定理 15.4.4 给出

$$0 \longrightarrow M(-m-2) \longrightarrow M(m) \longrightarrow L_m \longrightarrow 0 \quad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}),$$

且此列不分裂。左端最高向量映到 $f^{m+1}v$, 它是一个较低权的最高权向量; 右端则是唯一有限维简单商。这个例子把 “模中有另一个最高权向量” 与 “另有一个最高权生成元” 的差别具体表现出来。

18.3.3 有限维性的支配整性条件

定义 18.3.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ 为相应根系中选定的简单根, $h_1, \dots, h_\ell \in \mathfrak{h}$ 为对应余根. 给定 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$. 若满足

$$\lambda(h_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad (1 \leq i \leq \ell),$$

就称 λ 为支配整权. 它们的集合记为 P^+ .

命题 18.3.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 、正根及标准简单根三元组 e_i, f_i, h_i ($1 \leq i \leq \ell$). 令 P^+ 为相对于此选择的支配整权集. 若 $V \neq 0$ 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 最高权模, v 为最高权 λ 的生成元, 则 $\lambda \in P^+$. 令 $m_i = \lambda(h_i)$, 则对每个 $1 \leq i \leq \ell$, 有

$$f_i^{m_i+1}v = 0.$$

证明. 限制到第 i 个 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数. 有限维完全可约性把 V 分成 $L(r)$ 的直和. v 被 e_i 零化且为 h_i 的特征向量, 所以它在各直和项中的非零投影都是最高权为 $\lambda(h_i)$ 的向量. 由 $\mathfrak{sl}_2$ 分类, 这个数必须是非负整数 m_i , 且这些投影都被 $f_i^{m_i+1}$ 零化. 把投影相加即得结论. $\square$

到这里只证明了必要性. 给定支配整权, 是否存在有限维表示, 不能从“这些关系看起来有限”直接推出: 不同负根方向可以产生任意长的 PBW 单项式. 下一节将先把简单根方向的幂关系加入 Verma 模, 再证明这些关系控制了整个权集.

18.4 最高权分类

最高权必须支配且为整权, 已由每个简单根方向的三维子代数看出. 充分性需要把这些方向同时拼合起来. 本节先构造一个非零商模, 再用局部幂零性和 Weyl 群对称性限制其权集.

18.4.1 支配整权与有限维简单模

设 $\lambda \in P^+$, 记 $m_i = \lambda(h_i)$. 在 $M(\lambda)$ 中取向量

$$u_i = f_i^{m_i+1}v_\lambda, \quad V(\lambda) = M(\lambda) / \sum_{i=1}^{\ell} U(\mathfrak{g})u_i.$$

这一构造只规定简单负根方向的幂关系. 虽然只有有限个关系, 仍须证明所得商模非零且有限维.

引理 18.4.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 、正根及标准简单根三元组 e_i, f_i, h_i ($1 \leq i \leq \ell$). 设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 为支配整权, 记 $m_i = \lambda(h_i)$, $M(\lambda)$ 为相应 Verma 模, v_λ 为其标准最高权生成元. 则商模

$$V(\lambda) = M(\lambda) / \sum_{i=1}^{\ell} U(\mathfrak{g})f_i^{m_i+1}v_\lambda$$

非零, 且为最高权 λ 的模。其中每个 e_i, f_i 都局部幂零, 即对每个向量都存在一个充分高的幂将它零化。

证明. 首先, 每个 u_i 都被全部 e_j 零化。对 $j = i$, $\mathfrak{sl}_2$ 公式给出

$$e_i f_i^{m_i+1} v_\lambda = (m_i + 1)(m_i - (m_i + 1) + 1) f_i^{m_i} v_\lambda = 0.$$

对 $j \neq i$, 简单根之差不是根, 所以 $[e_j, f_i] = 0$, 从而 $e_j u_i = 0$ 。因此 u_i 是权 $\lambda - (m_i + 1)\alpha_i$ 的最高权向量。由 PBW, 它生成的子模只有低于或等于该权的权, 不含 λ 。这些子模之和仍不含最高权线, 所以 $V(\lambda) \neq 0$ 。

在商模的生成元 $\bar{v}_\lambda$ 上, 已有 $e_i \bar{v}_\lambda = 0$ 和 $f_i^{m_i+1} \bar{v}_\lambda = 0$ 。根弦定理说明 $\text{ad } e_i, \text{ad } f_i$ 在 $\mathfrak{g}$ 上幂零。因此命题 15.3.1 的两个假设都满足: 伴随作用在 Lie 代数上局部幂零, 而且算子的一次或适当次幂零化循环生成元。该命题于是给出整个 $V(\lambda)$ 上的局部幂零性。

具体地, 对 $x = e_i$ 或 f_i 及固定 $u \in U(\mathfrak{g})$, 若 $(\text{ad } x)^a(u) = 0$, $x^b \bar{v}_\lambda = 0$, 所引命题给出的界 $N \geq a + b - 1$ 保证 $x^N u \bar{v}_\lambda = 0$ 。因此这里并未假设一个统一的幂零指数零化整个无限维候选模。□

引理 18.4.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 、正根及标准简单根三元组 e_i, f_i, h_i ($1 \leq i \leq \ell$), 以 W 表示相应的 Weyl 群。设复 $\mathfrak{g}$ 模 V 具有相对于 $\mathfrak{h}$ 的权分解和有限维权空间, 且每个 e_i, f_i 都局部幂零。则对每个 i , 每个向量都包含在一个有限维的根子代数 $\text{span}_{\mathbb{C}}\{e_i, f_i, h_i\} \cong \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的子模中; 对每个 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 与 $w \in W$, 有

$$\dim V_\mu = \dim V_{w\mu}.$$

证明. 先取权向量 v 。第 i 个 $\mathfrak{sl}_2$ 的 PBW 单项式可按 $f_i^a h_i^b e_i^c$ 排序。只有有限多个 $e_i^c v$ 非零; 每个仍是权向量, 所以 h_i^b 只给标量。再对每个这样的向量使用 f_i 的局部幂零性, 便知 $U(\mathfrak{sl}_2^{(i)})v$ 有限维。任意向量是有限个权向量之和, 所以结论对它们也成立。

设 $r = \mu(h_i) \geq 0$ 。在有限维 $\mathfrak{sl}_2$ 模中, 分类说明 f_i^r 在 h_i 权为 r 的空间上单射。对 $0 \neq v \in V_\mu$, 取刚构造的有限维子模应用此结论, 得 $f_i^r v \neq 0$; 其完整 $\mathfrak{h}$ 权为 $\mu - r\alpha_i = s_i \mu$ 。故 $f_i^r : V_\mu \rightarrow V_{s_i \mu}$ 单射。若 $r \leq 0$, 同理用 e_i^{-r} 。再从 $s_i \mu$ 出发得到反向维数不等式, 所以两者维数相等。这里 r 的整性也来自包含 v 的有限维 $\mathfrak{sl}_2$ 模。简单反射生成 W , 所以结论对所有 w 成立。□

引理 18.4.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及正根, 记简单根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ 、对应余根为 h_i , Weyl 群为 W , 令 $Q_+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0} \alpha_i$ 。设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 为支配整权。若复 $\mathfrak{g}$ 权模 V 具有有限维权空间, 权集包含于 $\lambda - Q_+$, 且其权集在 W 下稳定, 则 V 有限维。特别地, 相应 Verma 模 $M(\lambda)$ 的商 $V(\lambda) = M(\lambda) / \sum_i U(\mathfrak{g}) f_i^{\lambda(h_i)+1} v_\lambda$ 有限维; 这里 f_i 为标准简单负根向量, v_λ 为标准最高权生成元。

证明. 令 $\rho^\vee = \frac{1}{2} \sum_{\alpha > 0} h_\alpha$ 。正余根在简单余根下具有非负系数, 且每个简单余根都出现, 所以

$$\rho^\vee = \sum_i c_i h_i, \quad c_i > 0.$$

此外, 简单反射置换除对应简单余根外的正余根, 故 $s_i \rho^\vee = \rho^\vee - h_i$ 。与反射公式 $s_i h = h - \alpha_i(h)h_i$ 比较, 得到 $\alpha_i(\rho^\vee) = 1$ 。

由命题 17.1.6, 每个整权的 Weyl 群轨道有唯一支配代表。因为权集包含于 $\lambda - Q_+ \subseteq P$, 全部权均为整权。设 μ 是 V 的一个支配权。写 $\mu = \sum_i a_i \omega_i$, 其中在当前格中 $a_i = \mu(h_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。因为 $\lambda - \mu \in Q_+$, 有

$$0 \leq \mu(\rho^\vee) = \sum_i c_i a_i \leq \lambda(\rho^\vee).$$

每个 $c_i > 0$, 所以每个非负整数 a_i 都有上界, 可能的支配权只有有限多个。每个权与其中一个支配权位于同一轨道, 而 W 有限, 故整个权集有限。再用每个权空间有限维, 得到 V 有限维。

对 $V(\lambda)$, PBW 给出权集包含关系及有限维权空间, 引理 18.4.1 和引理 18.4.2 给出 Weyl 稳定性。因此所有假设均满足。□

18.4.2 存在性、唯一性与完备性

定理 18.4.4 (最高权分类). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及相应根系的一组正根。令 $P^+ \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为相对于此选择的支配整权集, $L(\lambda)$ 为相应 Verma 模 $M(\lambda)$ 的唯一简单商。映射

$$\lambda \mapsto L(\lambda), \quad \lambda \in P^+,$$

给出支配整权与有限维简单 $\mathfrak{g}$ 模同构类之间的双射。等价地, Verma 模的唯一简单商 $L(\lambda)$ 有限维, 当且仅当 λ 支配且为整权。

证明. 若 $\lambda \in P^+$, 前一小节构造了非零有限维最高权模 $V(\lambda)$ 。由定理 18.3.3, 它满射到 $L(\lambda)$, 所以后者非零、有限维且简单, 证明存在性。

反过来, 每个有限维简单模都由命题 18.2.6 成为最高权模, 其最高权由命题 18.3.5 属于 P^+ ; Verma 泛性质及唯一简单商定理又说明它同构于该 $L(\lambda)$, 证明完备性。不同 λ 对应的简单最高权模不同构, 已在唯一简单商定理中证明, 故得到单射。三步分别解决存在、穷尽和唯一的问题。□

结合定理 18.1.5, 任意有限维模都可写为 $\bigoplus_{\lambda \in P^+} L(\lambda)^{\oplus n_\lambda}$, 其中只有有限多个 $n_\lambda \neq 0$ 。这些重数由 Hom 空间决定, 分解中的具体子空间则通常依赖选择。

18.4.3 经典表示与基本权

对 $\mathfrak{sl}_r$, 取 $h_i = E_{ii} - E_{i+1, i+1}$ 和正根向量 E_{ij} , $i < j$ 。基本权由 $\omega_i(h_j) = \delta_{ij}$ 确定。自然模 $V = \mathbb{C}^r$ 的最高权为 ω_1 , 其对偶最高权为 ω_{r-1} 。

命题 18.4.5. 设 $r \geq 2$ 为整数, $V = \mathbb{C}^r$ 为 $\mathfrak{sl}_r(\mathbb{C})$ 的自然模。取对角 Cartan 子代数及上三角正根, 令 $h_i = E_{ii} - E_{i+1, i+1}$, 基本权 ω_i 由 $\omega_i(h_j) = \delta_{ij}$ ($1 \leq i, j < r$) 确定。对整数 $1 \leq j < r$, 外幂 $\bigwedge^j V$ 简单, 最高权为 ω_j 。对整数 $m \geq 0$, $\text{Sym}^m V$ 简单, 最高权为 $m\omega_1$ 。

证明. 外幕的标准楔积 $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_j}$, $i_1 < \cdots < i_j$, 有互不相同的 $\mathfrak{h}$ 权, 每个权空间一维. 向量 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_j$ 被所有正根向量零化; 对 h_i 的取值为 δ_{ij} , 所以权为 ω_j .

若一个非零子模存在, 它按权分解, 故含某个标准楔积. 若其指标集合不是 $\{1, \dots, j\}$, 选一个有空缺的较小指标和集合中较大的指标, 用相应 E_{ab} , $a < b$ 将较大指标换成空缺, 得到非零楔积. 反复操作使指标和下降, 最终得到 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_j$. 反向使用负根矩阵单位能从该向量产生全部标准楔积. 因此任何非零子模都是整个外幕.

对称幂可用次数 m 的单项式 $e_1^{a_1} \cdots e_r^{a_r}$ 为基; 固定总次数后, 它们的 $\mathfrak{sl}_r$ 权仍互不相同. $E_{i, i+1}$ 把一个 e_{i+1} 换成 e_i , 系数为非零整数 a_{i+1} . 从任一单项式反复提升可得到 e_1^m , 反向下降又生成全部单项式. 因此同样的权空间论证证明简单性. e_1^m 的最高权为 $m\omega_1$. $\square$

对单 Lie 代数, 伴随模简单. 取高度最大的正根及其非零根向量, 正根升算子都将它零化; 这个向量因简单性而生成整个伴随模. 命题 18.2.7 于是说明全部根都不高于该根, 而最高权生成元的权唯一, 所以得到唯一的最高根. 这里使用的是伴随模的简单性, 不能仅凭每个 Weyl 轨道有唯一支配代表来排除不同轨道. 对 $\mathfrak{sl}_3$, 最高根为 $\alpha_1 + \alpha_2 = \omega_1 + \omega_2$, 故伴随模为 $L(\omega_1 + \omega_2)$, 维数八. 其非零权为六个根, 零权空间为二维 Cartan 子代数. 这给出一个权重数大于一的例子.

18.4.4 Verma 模商、局部幂零性与有限维性

命题 18.4.6. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 、正根及标准简单根三元组 e_i, f_i, h_i ($1 \leq i \leq \ell$). 设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 为支配整权, 令 $m_i = \lambda(h_i)$. 记相应 Verma 模为 $M(\lambda)$, 标准最高权生成元为 v_λ , 唯一简单商为 $L(\lambda)$. 则

$$L(\lambda) \cong M(\lambda) / \sum_i U(\mathfrak{g}) f_i^{m_i+1} v_\lambda.$$

因此有限维简单最高权模由一个向量 v 及关系

$$hv = \lambda(h)v, \quad e_i v = 0, \quad f_i^{m_i+1} v = 0$$

给出; 这里 h 遍历 $\mathfrak{h}$, i 遍历简单根.

证明. 已经证明 $V(\lambda)$ 非零且有限维, 故由 Weyl 完全可约性分解为简单模的直和. 将最高权生成元 $\bar{v}_\lambda$ 投到每个简单直和项; 每个非零投影仍是权 λ 的最高权向量, 所以相应简单项均为 $L(\lambda)$. 若某项投影为零, 则整个生成子模在该项的投影为零, 与 $\bar{v}_\lambda$ 生成全模矛盾. 因此所有直和项均为 $L(\lambda)$. 但 $V(\lambda)_\lambda$ 一维, 而每份 $L(\lambda)$ 的最高权空间也一维, 所以只能有一份, 得到同构. $\square$

寻找这个模的一组基时, 可以先用 $\mu(\rho^\vee) \leq \lambda(\rho^\vee)$ 枚举可能的支配整权, 再取它们的有限 Weyl 轨道, 并保留落在 $\lambda - Q_+$ 中的权; 对每个这样的权, PBW 只留下有限多个候选单项式. 它们之间仍可能有线性关系, 下一章的权重数公式将计算最终维数.

生成元上的局部幂零性要推广到 $u\bar{v}_\lambda$, 还须利用 $\text{ad } e_i, \text{ad } f_i$ 在包络代数中的局部幂零性, 以及所引命题的二项式恒等式. 有限维性的证明进一步利用整个 Weyl 群的对称性; 单个简单根方向的有限权链还不足以限制所有方向的组合.

本章小结

Casimir 元的中心性来自 Killing 对偶张量的不变性。非平凡有限维简单模上，它的标量非零；广义零空间则是平凡模。这个区分给出了消去交叉映射的显式公式，进而把任意线性截面修正为模截面，证明 Weyl 完全可约性。

最高权向量与 PBW 把模的权压在 $\lambda - Q_+$ 中。Verma 模保留满足这些基本关系的全部自由度，它的最高权线不可能属于真子模，因而真子模之和仍为真子模，得到唯一简单商。有限维性额外要求每个简单余根取非负整数值。

对支配整权，加入 $f_i^{\lambda(h_i)+1}v = 0$ 后，简单根算子在全模上局部幂零。有限维 $\mathfrak{sl}_2$ 子模给出 Weyl 对称性，最高权界限制可能的支配权，最终使全部权及总维数有限。因此，每个支配整权对应唯一的有限维简单模，且所有有限维简单模都由此得到。下一章将在这个分类的基础上计算特征标。

习题

习题 18.1. 设 B 为复半单 Lie 代数上的非退化不变型， $c \in \mathbb{C}^\times$ 。比较 B 与 cB 给出的 Casimir 元，并解释为何只改根长而不改 Casimir 标量会破坏后面的递推。

解. 若 x^i 为 x_i 关于 B 的对偶基，则关于 cB 的对偶基为 $c^{-1}x^i$ 。所以新 Casimir 为 $c^{-1}C$ 。对偶权空间的内积也整体乘以 c^{-1} ，故 Casimir 标量与递推中的所有内积项都同倍变化。只改变一边会使同一算子的两种迹计算不相等。□

习题 18.2. 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ ，两因子为复半单 Lie 代数。证明 Killing Casimir 为 $C_1 + C_2$ ，并求它在外张量模 $V_1 \boxtimes V_2$ 上的作用，其中 C_i 在 V_i 上按 c_i 作用。

解. 不同理想的伴随算子互相零乘，所以 Killing 型是两因子 Killing 型的正交直和。分别取对偶基，即得 $C = C_1 + C_2$ 。在外张量上第一项作用为 $c_1 I \otimes I$ ，第二项为 $I \otimes c_2 I$ ，故总标量为 $c_1 + c_2$ 。其中一个因子平凡时，其贡献为零。□

习题 18.3. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 自然模 $V = \mathbb{C}u \oplus \mathbb{C}v$ 中， $hu = u, hv = -v, ev = u, fu = v$ 。设交叉映射 d 满足 $d(h) = au + bv$ 。求 $d(e), d(f)$ 及使 $d(x) = xm$ 的 m 。

解. 由 $[h, e] = 2e$ ，有 $2d(e) = h d(e) - e d(h)$ ，比较两个基系数得 $d(e) = -bu$ 。由 $[h, f] = -2f$ 同样得 $d(f) = av$ 。再检查 $[e, f] = h$ ，右边为 $e(av) - f(-bu) = au + bv$ ，没有额外约束。取 $m = au - bv$ ，则 $hm = d(h), em = d(e), fm = d(f)$ ，故这是所求向量。自然模无不变向量，因而 m 唯一。□

习题 18.4. 继续上一题，使用 Killing 对偶基直接计算 $\sum_i x_i d(x^i)$ ，核对交叉映射消去公式中的逆 Casimir。

解. 对基 e, f, h ，对偶基为 $f/4, e/4, h/8$ 。于是

$$e d(f)/4 + f d(e)/4 + h d(h)/8 = \frac{3}{8}(au - bv).$$

自然模最高权为一，Killing Casimir 标量为 $1(1+2)/8 = 3/8$ 。乘以其逆 $8/3$ ，恰得 $m = au - bv$ 。□

习题 18.5. 设有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 满足 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$, 但不假定它半单. 若有限维模 V 的全部简单合成因子都是一维的, 证明整个作用平凡.

解. 任何一维表示都零化括号, 而 $\mathfrak{g}$ 完美, 所以各合成因子均平凡. 取适应合成列的基, 所有作用矩阵都是严格上三角, 因而像 Lie 代数可解. 又 $\rho(\mathfrak{g}) = [\rho(\mathfrak{g}), \rho(\mathfrak{g})]$, 因为 $\mathfrak{g}$ 完美. 可解 Lie 代数的导出列最终为零, 而这里每一项都等于整个像, 所以像为零. 这里未假定半单性, 所用的是完美性和合成因子的一维性. $\square$

习题 18.6. 在 $\mathfrak{sl}_2 \oplus \mathbb{C}z$ 上构造一个二维表示, 它限制到 $\mathfrak{sl}_2$ 时完全可约, 却作为整个 Lie 代数的表示不完全可约.

解. 让 $\mathfrak{sl}_2$ 平凡作用, 让中心元 z 作用为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 所有括号关系都成立. 限制到 $\mathfrak{sl}_2$ 是两个平凡模之和; 对整个代数, 不变直线只有该幂零算子的核, 没有不变补. 可见允许非零中心以后, 还须控制中心作用的半单性. $\square$

习题 18.7. 设 $\mathfrak{g}$ 为复半单 Lie 代数. 证明在有限维模范畴中, 不变向量函子 $V \mapsto V^{\mathfrak{g}}$ 保持短正合列; 并说明这并未证明包络代数的所有模都半单.

解. 短正合列由 Weyl 定理分裂为模直和, 取不变向量后仍为直和, 所以得到短正合列. 这里仅讨论有限维模; Verma 模通常无限维, 例如正文的 $M(m)$ 包含 $M(-m-2)$ 且相应短正合列不分裂. 因此有限维范畴中的正合性不能扩大为所有 $U(\mathfrak{g})$ 模上的半单性. $\square$

习题 18.8. 对 $\mathfrak{sl}_3$ 的上三角 Borel 子代数 $\mathfrak{b}$, 计算 $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}]$, $[\mathfrak{n}^+, \mathfrak{n}^+]$ 及 $\mathfrak{n}^+$ 的中心.

解. $\mathfrak{n}^+$ 以 E_{12}, E_{23}, E_{13} 为基, $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$, 其余两个基括号为零. Cartan 对每个根向量按非零根作用, 所以 $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] = \mathfrak{n}^+$. 随后 $[\mathfrak{n}^+, \mathfrak{n}^+] = \mathbb{C}E_{13}$. 若 $aE_{12} + bE_{23} + cE_{13}$ 与前两个基向量都交换, 则 $a = b = 0$, 故中心也为 $\mathbb{C}E_{13}$. $\square$

习题 18.9. 设 V 为 $\mathfrak{sl}_2$ 的自然模. 在 $V \oplus V$ 中求被 e 零化的空间, 说明“最高权向量只差标量”为什么不能用于这个模.

解. 每份自然模中 $\ker e = \mathbb{C}u$, 所以直和中的核为 $\mathbb{C}(u, 0) \oplus \mathbb{C}(0, u)$, 二维且全部为权一. 任何非零向量 (au, bu) 生成一份对角嵌入的自然模, 维数二, 不能生成四维直和. 因此该直和不是由一个最高权向量生成的最高权模, 正文唯一性结论的生成假设不满足. $\square$

习题 18.10. 设 $V = \mathbb{C}^3$ 为 $\mathfrak{sl}_3$ 自然模. 证明 $V \oplus V^*$ 有两个不可比较的极大权 ω_1, ω_2 , 因而有限维模的权集不一定只有一个极大元.

解. 两个简单直和项的最高权分别为 ω_1, ω_2 . 在简单根坐标中, $\omega_1 - \omega_2 = (\alpha_1 - \alpha_2)/3$, 既不在 Q_+ 也不在 $-Q_+$, 所以不可比较. 每一份中的其余权都小于相应最高权, 故这两个都是直和权集的极大元. $\square$

习题 18.11. 列出 $\text{Sym}^2 \mathbb{C}^3$ 的全部 $\mathfrak{sl}_3$ 权, 以它们在 (h_1, h_2) 上的取值表示, 并求各重数.

解. 自然基向量的权分别为 $(1, 0), (-1, 1), (0, -1)$ 。六个二次单项式给出

$$(2, 0), (0, 1), (1, -1), (-2, 2), (-1, 0), (0, -2).$$

它们互不相同, 所以重数全部为一, 最高权为 $(2, 0) = 2\omega_1$. $\square$

习题 18.12. 在 $(\mathbb{C}^r)^*$ 中直接找出最高权向量, 并计算其最高权, 不借用下一章特征标。

解. 设 $e_1^*, \dots, e_r^*$ 为对偶基. 对 $i < j$, $E_{ij}e_a^* = -\delta_{ia}e_j^*$, 故 e_r^* 被全部正根向量零化. 其对角权为 $-\varepsilon_r$, 在 h_i 上取值为 $\delta_{i,r-1}$, 所以最高权为 ω_{r-1} . $\square$

习题 18.13. 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$. 在 Verma 模 $M(\lambda)$ 中求权 $\lambda - a\alpha_1 - b\alpha_2$ 的维数, 其中 $a, b \geq 0$.

解. 取负根基 f_1, f_{12}, f_2 , 对应 $-\alpha_1, -(\alpha_1 + \alpha_2), -\alpha_2$. PBW 基向量 $f_1^u f_{12}^v f_2^w v_\lambda$ 有所需权, 当且仅当 $u + v = a$, $v + w = b$. 因此 v 可从零取到 $\min(a, b)$, 每个值唯一确定 u, w , 维数为 $\min(a, b) + 1$. 这项维数属于 Verma 模, 简单商中的重数还可能降低. $\square$

习题 18.14. 对 $\mathfrak{sl}_2$, 判断 $M(-1), M(-2)$ 是否简单, 并计算各自的 Killing Casimir 标量. 说明有限维非平凡简单模上 Casimir 为正的结论为何不能用于它们。

解. 由定理 15.4.4, 两个参数都不在 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, 故这两个 Verma 模都简单; PBW 基表明它们无限维. 标量分别为 $(-1)(-1+2)/8 = -1/8$ 与 $(-2)(-2+2)/8 = 0$. 因此无限维非平凡简单模上既可能出现负标量, 也可能出现零标量; 引理 18.1.2 的有限维条件不可删除. $\square$

习题 18.15. 对 $z, w \in \mathbb{C}$, 求 $\text{Hom}_{\mathfrak{sl}_2}(M(z), M(w))$ 何时非零, 并求其维数。

解. 同态由最高权生成元的像决定; 它须为 $M(w)$ 中权 z 、被 e 零化的向量. 权空间一维, 候选为 $f^j v_w$, 其中 $j \geq 0$ 且 $z = w - 2j$. 当 $j = 0$ 时得到 $z = w$ 的恒等同态倍数; 当 $j > 0$ 时, 条件 $j(w - j + 1) = 0$ 强迫 $w = j - 1 = m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 此时 $z = -m - 2$. 这两类互不重合, Hom 空间均一维, 其余情形为零. 非零映射在 PBW 基上只把 $f^a v_z$ 送到 $f^{a+j} v_w$, 所以都是单射. $\square$

习题 18.16. 设 $\lambda, \mu \in P^+$. 证明 $L(\lambda) \otimes L(\mu)$ 中 $L(\lambda + \mu)$ 恰出现一次。

解. 最高权向量的张量 $v_\lambda \otimes v_\mu$ 被全部正根向量零化, 权为 $\lambda + \mu$. 若两个权 $\lambda - \beta, \mu - \gamma$ 的和为 $\lambda + \mu$, 则 $\beta + \gamma = 0$, $\beta, \gamma \in Q_+$, 只能都为零. 故该权空间一维. 完全可约分解中, 这个向量必须处在最高权为 $\lambda + \mu$ 的简单项中, 而这样的每份简单项贡献一维最高权空间, 所以重数为一. $\square$

习题 18.17. 对 $r \geq 3$, 计算 $\mathfrak{sl}_r$ 伴随模的最高权、零权重数与 Killing Casimir 标量。

解. 最高根为 $\varepsilon_1 - \varepsilon_r = \omega_1 + \omega_{r-1}$, 最高权向量可取 E_{1r} . 零权空间是对角迹零 Cartan 子代数, 维数 $r-1$. 伴随模简单, 故 Casimir 为标量; 在伴随模中迹型就是 Killing 型, 所以 $\text{tr}_{\mathfrak{g}} C = \dim \mathfrak{g}$. 因此标量为一. $\square$

习题 18.18. 设 $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2$ 为有限维复半单 Lie 代数. 证明 $L_{\mathfrak{g}_1}(\lambda) \boxtimes L_{\mathfrak{g}_2}(\mu)$ 是 $\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ 的简单模, 并说明全部有限维简单模都这样得到。

解. 最高权向量的张量具有最高权 (λ, μ) , 而两因子分别由其包络代数生成, 所以这个张量生成整个外张量模。它有限维且完全可约, 最高权空间一维; 任何简单直和项上的生成元投影若非零, 都有最高权 (λ, μ) , 若为零则该项不能被生成。故只能有一份简单项。反过来, 直和根系的支配整权恰为支配整权对, 最高权分类说明全部简单模都在上述列表中。□

习题 18.19. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 模 $\text{Sym}^2 \mathbb{C}^3 = L(2\omega_1)$ 中, 取 $v = e_1^2$, $f_1 = E_{21}$, $f_2 = E_{32}$ 。证明 $f_2 v = 0$ 却有 $f_2 f_1 v \neq 0$, 并解释这与最高权展示的关系。

解. f_2 只把 e_2 换成 e_3 , 所以 $f_2 e_1^2 = 0$ 。但 $f_1 e_1^2 = 2e_1 e_2$, 再施 f_2 得 $2e_1 e_3 \neq 0$ 。最高权展示中的关系 $f_2 v = 0$ 只规定生成元上的作用, 不表示 f_2 零化整个模, 也不允许在左理想关系中任意向右乘其他算子。□

习题 18.20. 令二维 Lie 代数有基 h, e , 满足 $[h, e] = e$ 。在 $\mathbb{C}[t]$ 上令 e 为乘 t , $h = t \, d/dt$ 。证明 1 是循环生成元, $h1 = 0$, 但 h 不局部幂零; 指出正文的推广引理缺少哪项假设。

解. 两个算子的交换子是乘 t , 所以给出表示。各 $t^n = e^n 1$, 故 1 生成整个模。虽然 $h1 = 0$, 但对 $n \geq 1$, $h^N t^n = n^N t^n \neq 0$ 。这里 $(\text{ad } h)^N(e) = e$ 对所有 N 成立, 所以 $\text{ad } h$ 在 Lie 代数上不局部幂零。仅知道生成元被某次幂零化, 不足以推出全模局部幂零。□

习题 18.21. 对 $\mathfrak{sl}_3$ 及 $\lambda = 2\omega_1 + \omega_2$, 计算 $\lambda(\rho^\vee)$ 。列出满足 $a, b \geq 0$ 及 $(a\omega_1 + b\omega_2)(\rho^\vee) \leq \lambda(\rho^\vee)$ 的所有整数对, 并说明为什么还不能把它们全部宣布为实际权。

解. 在 A_2 中 $\rho^\vee = h_1 + h_2$, 故 $\lambda(\rho^\vee) = 3$ 。候选为 $a + b \leq 3$ 的十个非负整数对:

$$(0, 0), (1, 0), (0, 1), (2, 0), (1, 1), (0, 2), (3, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 3).$$

这个界只用于证明有限性。还须满足 $\lambda - \mu \in Q_+$, 并最终检查权空间不为零。例如 $\mu = 0$ 与 λ 不在同一个根格陪集中, 因为 $2\omega_1 + \omega_2 = (5\alpha_1 + 4\alpha_2)/3$ 不在根格, 所以零不是这个模的权。□

习题 18.22. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 自然模上计算 $s = \exp(e) \exp(-f) \exp(e)$ 及 s^2 。说明权的反射作用不必由一个平方为恒等的向量空间算子实现。

解. 自然模中 $e^2 = f^2 = 0$, 所以指数为 $I + e, I - f, I + e$ 。矩阵相乘得到

$$s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad s^2 = -I.$$

它将 h 的两个权空间互换, 因而在权上实现唯一非平凡反射, 但自身阶为四。Weyl 群作用于权格的关系, 不能不加核的说明便当作这些提升算子的全部关系。□

习题 18.23. 设 $\mathfrak{g}$ 为复单 Lie 代数, B' 为任意不变复双线性型, 不预先假定对称。证明 B' 是 Killing 型的标量倍数。

解. 用 Killing 非退化性定义唯一线性算子 T , 使 $B'(x, y) = B(Tx, y)$ 。两个型的不变性给出 $T[z, x] = [z, Tx]$, 即 T 为伴随模自同态。伴随模简单, 故 Schur 引理使 $T = cI$ 。因此 $B' = cB$, 并且它自动对称。这个论证解释了完全可约性证明中迹型为何在每个单因子上只差一个常数。 $\square$

习题 18.24. 设 $V \neq 0$ 为有限维复半单 Lie 代数的最高权模。证明 V 已经简单, 并说明无限维时结论如何失败。

解. 由完全可约性分解 V 。最高权生成元在每个非零简单项的投影仍是同一最高权的最高权向量; 为生成全模, 各项投影都不能为零。因此全部简单项同构, 但最高权空间一维, 迫使只有一项。无限维时, $M(m)$ 、 $m \geq 0$, 是由一个最高权向量生成的非简单模, 含非零真子模 $M(-m-2)$ 。 $\square$

第十九章 Weyl 特征标公式与张量问题

本章从最高权分类继续求权重数与维数：建立 Freudenthal 递推、Weyl 分母与特征标公式，推出维数和 Kostant 重数公式，并与 A 型 Schur 函子比较。

本章目标

- 使用权格群环记录形式特征标，并区分权重数、总维数与简单模重数。
- 保持 Killing 型的归一化，用根方向的迹计算证明和运用 Freudenthal 递推。
- 说明负锥形式级数乘法为何良定，逐项验证分母与微分算子恒等式。
- 完整证明 Weyl 特征标公式，再以维数、Kostant 公式与低秩张量计算检验结果。

对 $\mathfrak{sl}_2$ ，最高权 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 的简单模有 $n+1$ 个权，每个权重数都是一；它的形式特征标就是 $e^n + e^{n-2} + \cdots + e^{-n}$ 。根系有多个方向时，仅凭最高权仍无法逐个写出重数。我们可以先用 Casimir 元比较相邻权的贡献，得到重数递推；若能把递推合成一个对 Weyl 群反对称的等式，就可能一次求出全部权的重数。维数和张量分解的计算也要从这个特征标公式继续取得，而不能仅靠简单模的分类。

本章还将由分母公式求出 Kostant 重数公式。¹

本章使用第十八章的完全可约性与最高权分类，以及根系和 Weyl 群的基本性质。所讨论的 Lie 代数均为有限维复半单 Lie 代数，根内积仍取 Killing 型诱导的内积。形式指数只表示权格加法。

Humphreys 在 [8, Section 22.3, pp. 121–122, Section 24.3, pp. 138–139] 中陈述了 Freudenthal 递推及 Weyl 特征标、维数公式。本章将递推整理为形式算子等式，再用它排除额外反对称项；证明中同时说明所用的求和范围、正定性与最高权条件。

19.1 形式特征标

最高权已经给出了有限维简单模的完整编号，但尚未告诉我们一个模有多大，某个较低权出现多少次，两个简单模的张量积又怎样分解。这些问题可以统一写成权的生成函数。这里的指数符号只记权的加法，不先引入 Lie 群或指数函数。

¹科斯坦特 (Bertram Kostant, 1928–2017)，美国数学家，研究 Lie 代数表示论与几何，其权重数公式以他命名。

19.1.1 权空间维数

本章固定有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 、Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 、正根集 Φ^+ 、权格 P 和 Weyl 群 W 。内积 $(\cdot, \cdot)$ 始终是 Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的型，并限制到根的实空间上使用其正定性。记

$$\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha.$$

由命题 17.1.7, $\rho(h_i) = 1$, 所以 $\rho \in P$, 并处于支配室的内部。我们不另外把长根统一缩放到长度平方二; 若读者使用这种归一化, Casimir 特征值和递推两边必须同时作相同缩放。

定义 19.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, $P \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为相应权格。设 V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。对 $\mu \in P$, 以 V_μ 表示相对于 $\mathfrak{h}$ 的权空间, 记

$$m_V(\mu) = \dim_{\mathbb{C}} V_\mu,$$

称为权 μ 的**权重数** (weight multiplicity); 不是权时规定其为零。另选正根, 对相应最高权 λ 的有限维简单模 $L(\lambda)$, 将其权重数简记为 $m_\lambda(\mu)$ 。

最高权分类给出 $m_\lambda(\lambda) = 1$, 而权支集包含于 $\lambda - Q_+$ 。这只是初值与位置限制, 不能据此断言其余重数也为一。例如单 Lie 代数的伴随模在零权处的重数是秩; $\mathfrak{sl}_3$ 的伴随模就有一个二维零权空间。

19.1.2 群环中的形式特征标

定义 19.1.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, $P \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为相应权格, V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。权格群环 $\mathbb{Z}[P]$ 以 e^μ 、 $\mu \in P$ 为自由交换群基, 乘法由 $e^\mu e^\nu = e^{\mu+\nu}$ 给出, 其元素只有有限多个非零系数。以 $m_V(\mu) = \dim_{\mathbb{C}} V_\mu$ 表示权重数, 令

$$\text{ch } V = \sum_{\mu \in P} m_V(\mu) e^\mu \in \mathbb{Z}[P].$$

所得群环元素称为 V 的**形式特征标** (formal character)。此处的 ch 记录 Cartan 权; 它与第七章的 Frobenius 特征映射作用于不同的对象, 不能把两种映射直接等同。

命题 19.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, P 为相应权格, V, U 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。以 $m_V(\mu) = \dim_{\mathbb{C}} V_\mu$ 表示权重数, 所有形式特征标均相对于 $\mathfrak{h}$ 取值于 $\mathbb{Z}[P]$ 。则

$$\text{ch}(V \oplus U) = \text{ch } V + \text{ch } U, \quad \text{ch}(V \otimes U) = \text{ch } V \text{ ch } U, \quad \text{ch}(V^*) = \sum_{\mu} m_V(\mu) e^{-\mu}.$$

短正合列的中项特征标为两端特征标之和。两个有限维模同构, 当且仅当形式特征标相同。

证明. 直和按权空间相加。张量作用满足 $h(v \otimes u) = hv \otimes u + v \otimes hu$, 所以 $(V \otimes U)_\gamma = \bigoplus_{\mu+\nu=\gamma} V_\mu \otimes U_\nu$, 得到乘法。对偶作用为 $(hf)(v) = -f(hv)$, 所以权变号。权空间取值在短正合列上正合: 可以使用同时对角化, 或用在有限权集上的插值投影逐项取权。

最后, 由 Weyl 完全可约性, 只须说明简单模的形式特征标线性无关。若有限整数线性组合 $\sum_{\lambda} a_{\lambda} \operatorname{ch} L(\lambda) = 0$, 在 $a_{\lambda} \neq 0$ 的有限集合中选一个对权偏序极大的 λ 。其他最高权的特征标不含 e^{λ} , 否则 $\lambda \leq \nu$ 与极大性矛盾。该项系数就是 $a_{\lambda} m_{\lambda}(\lambda) = a_{\lambda}$, 不可能为零。故简单特征标独立, 分解重数由特征标唯一确定。 $\square$

19.1.3 Weyl 群对称性

令 W 作用于群环, 规定 $w(e^{\mu}) = e^{w\mu}$ 。反射权空间的维数对称性由简单根方向的 $\mathfrak{sl}_2$ 理论给出。

命题 19.1.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, P 为相应权格, W 为相应 Weyl 群。设 V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模, 以 $m_V(\mu) = \dim_{\mathbb{C}} V_{\mu}$ 表示相对于 $\mathfrak{h}$ 的权重数, 令 W 在 $\mathbb{Z}[P]$ 上按 $w(e^{\mu}) = e^{w\mu}$ 作用。则

$$m_V(w\mu) = m_V(\mu) \quad (\mu \in P, w \in W), \quad \operatorname{ch} V \in \mathbb{Z}[P]^W.$$

证明. 有限权集与根向量移权公式使每个 e_i, f_i 幂零: 反复加上或减去同一个非零根不能永远留在有限集内。于是引理 18.4.2 适用, 给出每个简单反射保持权重数; 它们生成 W , 故结论成立。 $\square$

对 $\mathfrak{sl}_2$, 令 $\omega(h) = 1$, 则根为 2ω 。最高权 $m\omega$ 的特征标为

$$e^{m\omega} + e^{(m-2)\omega} + \cdots + e^{-m\omega},$$

在唯一的非平凡反射 $\omega \mapsto -\omega$ 下不变。高秩时, 单个简单反射仍从相应的 $\mathfrak{sl}_2$ 链得到对称性; 需要多个反射一起作用, 才控制全部权。

19.2 Casimir 作用与 Freudenthal 递推

Casimir 元的中心性已经用来分裂表示。本节进一步计算它在每个权空间上的迹。最高权给出一个全模通用的标量, 而各权空间又把同一个算子拆成根方向的升降作用; 比较两种计算, 就得到权重数的递推关系。

19.2.1 Casimir 元与最高权模上的标量作用

对 $\alpha \in \Phi$, 令 $t_{\alpha} \in \mathfrak{h}$ 由 $B(t_{\alpha}, h) = \alpha(h)$ 决定。于是

$$\alpha(t_{\beta}) = (\alpha, \beta), \quad h_{\alpha} = \frac{2t_{\alpha}}{(\alpha, \alpha)}.$$

对每个正根选取 $e_{\alpha} \in \mathfrak{g}_{\alpha}$, $f_{\alpha} \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, 使 $B(e_{\alpha}, f_{\alpha}) = 1$ 。Killing 不变性给出

$$[e_{\alpha}, f_{\alpha}] = t_{\alpha}.$$

注意这一对 e_{α}, f_{α} 尚不是标准 $\mathfrak{sl}_2$ 的升降算子; 标准三元组为

$$E_{\alpha} = e_{\alpha}, \quad F_{\alpha} = \frac{2f_{\alpha}}{(\alpha, \alpha)}, \quad h_{\alpha}.$$

这个缩放将在迹计算中保留。

命题 19.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根, $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$. 以 $(,)$ 表示 Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的双线性型, 记 $\|\nu\|^2 = (\nu, \nu)$. 设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, $V \neq 0$ 为相对于这份选择的复最高权 $\mathfrak{g}$ 模, 最高权为 λ , 允许无限维。其 Killing Casimir 元在 V 上作用为标量

$$c_\lambda = (\lambda, \lambda + 2\rho) = \|\lambda + \rho\|^2 - \|\rho\|^2. \quad (19.1)$$

这里范数平方表示由 Killing 诱导型给出的二次式; 仅在根实空间上把它解释为正定范数。

证明. 取 $\mathfrak{h}$ 的 Killing 对偶基 h_a, h^a , 连同正、负根对偶向量, 得到

$$\begin{aligned} C &= \sum_a h_a h^a + \sum_{\alpha > 0} (e_\alpha f_\alpha + f_\alpha e_\alpha) \\ &= \sum_a h_a h^a + 2 \sum_{\alpha > 0} f_\alpha e_\alpha + 2t_\rho. \end{aligned} \quad (19.2)$$

对最高权向量 v , 全部 $e_\alpha v = 0$, Cartan 部分作用为 $\sum_a \lambda(h_a) \lambda(h^a) = (\lambda, \lambda)$, 而 $2t_\rho$ 作用为 $2(\lambda, \rho)$. 所以 $Cv = c_\lambda v$. 由命题 18.1.1, C 与 $U(\mathfrak{g})$ 交换, 而 v 生成 V , 故该标量作用在整个模上成立。□

19.2.2 根方向分解与 Freudenthal 递推

引理 19.2.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, 选择相应根系的一组正根 Φ^+ , 以 P 表示权格。设 V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模, $\alpha \in \Phi^+$, B 为 Killing 型, $(,)$ 为其在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的型。选根向量 $e_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$, $f_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, 使 $B(e_\alpha, f_\alpha) = 1$, 令 $m_V(\nu) = \dim_{\mathbb{C}} V_\nu$. 则对任意 $\mu \in P$, 有

$$\mathrm{tr}(f_\alpha e_\alpha | V_\mu) = \sum_{j \geq 1} (\mu + j\alpha, \alpha) m_V(\mu + j\alpha).$$

右侧只有有限个非零项。

证明. 令左侧为 $T(\mu)$. 映射 $e_\alpha : V_\mu \rightarrow V_{\mu+\alpha}$ 与 $f_\alpha : V_{\mu+\alpha} \rightarrow V_\mu$ 是有限维空间间的线性映射, 故两种复合的迹相等。使用 $e_\alpha f_\alpha = f_\alpha e_\alpha + t_\alpha$, 得到

$$T(\mu) = T(\mu + \alpha) + (\mu + \alpha, \alpha) m_V(\mu + \alpha).$$

权集有限, 所以沿 $+\alpha$ 迭代到权空间为零时停止, 得到所需和式。

这也可从根方向的 $\mathfrak{sl}_2$ 分解理解。将 V 限制到 $E_\alpha, F_\alpha, h_\alpha$ 张成的三维代数, 并同时按与它交换的 $\ker \alpha \subseteq \mathfrak{h}$ 分解。每条最高 h_α 权为 r 的链中,

$$F_\alpha E_\alpha(F_\alpha^q v) = q(r - q + 1) F_\alpha^q v.$$

所以本节的 $f_\alpha e_\alpha$ 在该位置的特征值是 $(\alpha, \alpha)q(r - q + 1)/2$. 相邻位置相减, 正好得到上式中的 $(\mu + \alpha, \alpha)$. 这说明递推系数来自升降算子的归一化, 而不是把每条根都当成同样长度。□

定理 19.2.3 (Freudenthal 递推). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根。令 P 为权格、 P^+ 为支配整权集, $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$, $(,)$ 为 Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的型, 记 $\|\nu\|^2 = (\nu, \nu)$ 。设 $\lambda \in P^+$, $L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模, $m_\lambda(\mu) = \dim_{\mathbb{C}} L(\lambda)_\mu$ 。对任意 $\mu \in P$, 有

$$(\|\lambda + \rho\|^2 - \|\mu + \rho\|^2)m_\lambda(\mu) = 2 \sum_{\alpha > 0} \sum_{j \geq 1} (\mu + j\alpha, \alpha)m_\lambda(\mu + j\alpha). \quad (19.3)$$

初值为 $m_\lambda(\lambda) = 1$, 权集外的重数为零。

证明. 在(19.2)的 μ 权空间上取迹。左端为 $c_\lambda m_\lambda(\mu)$, Cartan 与 $2t_\rho$ 两项贡献 $(\mu, \mu + 2\rho)m_\lambda(\mu)$ 。其余根方向的迹由引理 19.2.2 给出。移项后, 标量差等于

$$c_\lambda - (\mu, \mu + 2\rho) = \|\lambda + \rho\|^2 - \|\mu + \rho\|^2,$$

得到公式。即使 $V_\mu = 0$, 迹计算仍成立, 所以该恒等式对所有 $\mu \in P$ 有效。 $\square$

19.2.3 递推初值、支配序与归一化

在最高权处, (19.3)两边都为零, 故它自身不能确定初值; 必须另用最高权线一维。计算较低权时, 也不能不检查分母便直接相除。

命题 19.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根, P^+ 为相应支配整权集, $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$ 。以内积 $(,)$ 表示 Killing 型诱导的根实空间上的正定型, 记 $\|\nu\|^2 = (\nu, \nu)$, 按相应简单根使用权偏序。设 $\lambda \in P^+$, $L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模, $\mu \neq \lambda$ 为其实际权。则

$$\|\lambda + \rho\|^2 - \|\mu + \rho\|^2 > 0.$$

若只枚举支配整权, 则对每个 $\mu \in P^+$ 、 $\mu < \lambda$, 同样有此严格不等式, 无论 μ 是否实际出现。

证明. 先令 ν 为 μ 的支配轨道代表。Weyl 对称性使 ν 仍为权, 所以 $\nu \leq \lambda$ 。两者都支配, 因而

$$\|\lambda\|^2 - \|\mu\|^2 = \|\lambda\|^2 - \|\nu\|^2 = (\lambda - \nu, \lambda + \nu) \geq 0.$$

最后一个不等式来自 $\lambda - \nu \in Q_+$ 与 $(\alpha_i, \lambda + \nu) \geq 0$ 。而 $\lambda - \mu \in Q_+ \setminus \{0\}$, $(\rho, \alpha_i) > 0$, 故

$$\|\lambda + \rho\|^2 - \|\mu + \rho\|^2 = \|\lambda\|^2 - \|\mu\|^2 + 2(\rho, \lambda - \mu) > 0.$$

若 μ 本来就是支配整权且 $\mu < \lambda$, 上述证明取 $\nu = \mu$ 即可, 不需要实际权假设。 $\square$

算法 19-1 把递推写成有限的权重数计算。它只使用根数据和精确的有理数运算, 不要求先构造 $L(\lambda)$ 的矩阵表示。

引理 18.4.3 的 $\rho^\vee$ 界使 C 可由非负基本权坐标的有限范围枚举, 故 D 也有限。对正根 α , $\mu + j\alpha$ 的支配代表若在 C 中, 就比 μ 更接近最高权, 所需重数已经算出; 不在 D 中的项为零。分母由命题 19.2.4 保证为正, 正确性由(19.3)和 Weyl 对称性归纳得到。

算法 19-1 Freudenthal 权重数计算

输入： 有限型根数据的简单根 α_i 、简单余根 h_i 、正根集 Φ^+ 、基本权 ω_i 、Weyl 群 W 及由 Killing 型诱导的精确内积，和支配整权 λ 。

输出： 最高权为 λ 的有限维简单模 $L(\lambda)$ 的全部非零权及其重数。

- 1: 记 $P^+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0} \omega_i$ 、 $Q_+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0} \alpha_i$ ，计算 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$ 、 $\rho^\vee = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha^\vee = \sum_i c_i h_i$ 。
- 2: 枚举 $C = P^+ \cap (\lambda - Q_+) \cap \{\mu \mid \mu(\rho^\vee) \leq \lambda(\rho^\vee)\}$ ，再令 $D = \bigcup_{\nu \in C} W\nu$ 。
- 3: 置 $m(\lambda) = 1$ ，将 $C \setminus \{\lambda\}$ 按 $\lambda - \mu$ 的简单根高度递增排列。
- 4: **for** 依次处理每个 $\mu \in C \setminus \{\lambda\}$ **do**
- 5: 置 $s = 0$ 。
- 6: **for** 每个 $\alpha \in \Phi^+$ ，以及有限集 D 中形如 $\beta = \mu + j\alpha$ ($j \geq 1$) 的 β **do**
- 7: 求 β 的支配代表 ν ，令 $s \leftarrow s + (\beta, \alpha)m(\nu)$ 。
- 8: **end for**
- 9: 令 $m(\mu) = 2s/(\|\lambda + \rho\|^2 - \|\mu + \rho\|^2)$ 。
- 10: **end for**
- 11: 对每个 $\mu \in C$ 与 $w \in W$ ，置 $m(w\mu) = m(\mu)$ ；删去重数为零的项，返回所得表。

例如 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Killing 归一化给出 $(\omega, \omega) = 1/8$ ， $\lambda = m\omega$ 、 $\rho = \omega$ 。最高权 Casimir 标量为 $m(m+2)/8$ ，与(18.3)一致。若把标准 $\mathfrak{sl}_2$ 算子 $h^2 + 2h + 4fe$ 的标量直接代入本节，就会差一个八倍因子。

19.2.4 特征标的代数恒等式与权重数计算

取 $\mathfrak{sl}_3$ 的伴随模，最高权为 $\theta = \alpha_1 + \alpha_2 = \rho$ 。六个非零根权的重数为一。设共同根长平方为 a ，则 $c_\theta = (\theta, 3\theta) = 3a$ 。在 $\mu = 0$ 处，Freudenthal 递推右侧只有三条正根的 $j = 1$ 项，故

$$3a m_\theta(0) = 2(3a), \quad m_\theta(0) = 2.$$

在本书 Killing 归一化中 $a = 1/3$ ，因而伴随 Casimir 标量为一。计算同时验证了根长、Casimir 和零权重数三个量之间的相容性。

下一节将把(19.3)的所有权空间等式合并成一个形式微分算子等式。这个等式既保留了可逐权计算的内容，也能与 Weyl 分母相乘后化为简单的二阶特征方程。它是排除特征标公式中额外项所需的代数依据。

19.3 Weyl 分母、反对称性与形式算子

特征标在 Weyl 群下不变；乘上一个适当的反对称元素后，它会变成若干轨道交错和的线性组合。本节建立这个反对称元素的乘积与求和表达，再把 Freudenthal 递推整理成算子等式。

19.3.1 反对称展开与 Weyl 分母恒等式

记 $\varepsilon(w) = \det(w|_E) \in \{\pm 1\}$, 其中 E 是根实空间。对 $\nu \in P$, 定义有限和

$$A_\nu = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\nu}.$$

若 $f \in \mathbb{Z}[P]$ 满足 $w(f) = \varepsilon(w)f$, 称它为 **Weyl 反对称元素** (Weyl anti-invariant element)。

引理 19.3.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ 为相应根系, P 为权格, W 为 Weyl 群, $E = \text{span}_{\mathbb{R}} \Phi$. 选择正根及对应简单余根 $h_1, \dots, h_\ell$, 令 $\varepsilon(w) = \det(w|_E)$, $A_\nu = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\nu}$ ($\nu \in P$). 每个满足 $w(f) = \varepsilon(w)f$ 对所有 $w \in W$ 成立的反对称元素 $f \in \mathbb{Z}[P]$ 都可唯一写为

$$f = \sum_{\nu \in P, \nu(h_i) > 0 \ \forall i} a_\nu A_\nu,$$

其中 $a_\nu \in \mathbb{Z}$, 只有有限多个 $a_\nu \neq 0$, 且 a_ν 等于 f 中 e^ν 的系数。

证明. 将 f 的有限支集按 Weyl 轨道分组。每个轨道有唯一支配代表。若这个代表位于某个墙上, 就被一个简单反射固定; 反对称性使该处系数等于自己的负数, 故为零, 整条轨道的系数都为零。

其余轨道的支配代表 ν 位于室内部, 其稳定子群平凡。因此轨道上 $e^{w\nu}$ 的系数由反对称性唯一确定为 $\varepsilon(w)a_\nu$, 恰为 $a_\nu A_\nu$ 。不同轨道互不相交, 得到存在与唯一性。□

定理 19.3.2 (Weyl 分母恒等式). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ 为相应根系, Φ^+ 为一组正根, P 为权格, W 为 Weyl 群。令 $E = \text{span}_{\mathbb{R}} \Phi$, $\varepsilon(w) = \det(w|_E)$, $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$ 。则在 $\mathbb{Z}[P]$ 中有

$$D := e^\rho \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha}) = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\rho} = A_\rho. \quad (19.4)$$

特别地, D 反对称, 最高项为 e^ρ , 其系数为一。

证明. 简单反射 s_i 将 α_i 变为 $-\alpha_i$, 并置换其他正根; 同时 $s_i \rho = \rho - \alpha_i$ 。所以

$$s_i D = e^{\rho - \alpha_i} (1 - e^{\alpha_i}) \prod_{\substack{\alpha > 0 \\ \alpha \neq \alpha_i}} (1 - e^{-\alpha}) = -D.$$

简单反射生成 W , 故 D 反对称。乘积展开中全部权都在 $\rho - Q_+$, 并且只有全部选择常数项才能得到 e^ρ , 所以最高项系数为一。

用引理 19.3.1 展开 D 。一个可能出现的严格支配整权 ν 必满足 $\nu \leq \rho$ 。因为 $\nu(h_i)$ 是正整数, 而 $\rho(h_i) = 1$, 所以 $\gamma = \nu - \rho$ 是支配整权; 另一方面 $\gamma \in -Q_+$ 。写 $-\gamma = \sum_i c_i \alpha_i$, $c_i \geq 0$, 则

$$\|\gamma\|^2 = - \sum_i c_i (\gamma, \alpha_i) \leq 0.$$

正定性迫使 $\gamma = 0$, 故唯一可能的轨道代表为 ρ 。最高项系数一又给出 $D = A_\rho$ 。□

19.3.2 Freudenthal 递推的形式算子恒等式

本段要约束 $D \operatorname{ch} L(\lambda)$ 中能够出现的指数，而不另求一套权重数公式。定理 19.2.3 给出逐权递推，定理 19.3.2 给出有限群环中的分母；为了把二者合成二阶算子等式，需要先在负根锥方向展开分母的倒数。下文用形式级数环证明这些乘法逐系数有意义，命题 19.3.4 最后得到的 $\Delta(Df) = \|\lambda + \rho\|^2 Df$ 则是有限群环中的等式。下一节再用范数限制排除多余指数。

乘积 D 在有限群环中不是单位。为展开其倒数，使用一个明确的形式级数环：

$$\widehat{\mathbb{C}[P]}_- = \left\{ \sum_{\mu \in P} a_\mu e^\mu \mid \begin{array}{l} \operatorname{supp}(a) \subseteq \bigcup_{i=1}^s (\lambda_i - Q_+) \\ \text{对某个有限集合 } \{\lambda_i\} \end{array} \right\}.$$

加法逐系数进行，乘法按 $e^\mu e^\nu = e^{\mu+\nu}$ 进行。它们都良定：固定乘积中某个指数 γ 后，来自两锥的指标满足 $\beta + \delta = \lambda_i + \kappa_j - \gamma$ 、 $\beta, \delta \in Q_+$ ；简单根坐标给出每个坐标的有限选择，因此每个系数只有有限项贡献。

在这个环中

$$(1 - e^{-\alpha})^{-1} = \sum_{j \geq 0} e^{-j\alpha}, \quad q_\alpha := \frac{e^{-\alpha}}{1 - e^{-\alpha}} = \sum_{j \geq 1} e^{-j\alpha} \quad (\alpha > 0).$$

这是形式恒等式，不需要给 e^α 赋数值或比较其绝对值。Weyl 群的作用只用于有限群环中的元素；它一般不会保持这里选定的负锥级数环，不能不加说明地对任意无穷展开施反射。

定义 19.3.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数， $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数， Φ 为相应根系， P 为权格， $E = \operatorname{span}_{\mathbb{R}} \Phi$ 。选择正根及简单根 $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ ，令 $Q_+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0} \alpha_i$ 。以 $\widehat{\mathbb{C}[P]}_-$ 表示支集包含在有限个 $\lambda_i - Q_+$ ($\lambda_i \in P$) 的并中的形式级数环，内积取 Killing 型在 E 上诱导的正定型。对 $\eta \in E$ 及 $\mu \in P$ ，定义

$$\partial_\eta(e^\mu) = (\eta, \mu) e^\mu.$$

若 $u_1, \dots, u_\ell$ 为 E 的一组正交单位基，令

$$\Delta = \sum_{a=1}^{\ell} \partial_{u_a}^2, \quad \Delta(e^\mu) = \|\mu\|^2 e^\mu.$$

这些算子逐系数延拓；后一个表达式说明 Δ 不依赖正交基的选择。

∂_η 满足 Leibniz 法则，因为 $(\eta, \mu + \nu) = (\eta, \mu) + (\eta, \nu)$ 。每个系数只有有限项参与乘法，也保证这些法则适用于所选形式环中的无穷和。

命题 19.3.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数， $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数， Φ^+ 为相应根系的一组正根， P 为权格， P^+ 为支配整权集， Q_+ 为简单根的非负整数组合所成的锥。令 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$ ，内积 $(,)$ 取 Killing 型诱导的型， $\|\nu\|^2 = (\nu, \nu)$ 。设 $\lambda \in P^+$ ， $f = \operatorname{ch} L(\lambda)$ ，其中 $L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模，令

$$D = e^\rho \prod_{\alpha \in \Phi^+} (1 - e^{-\alpha}), \quad q_\alpha = \sum_{j \geq 1} e^{-j\alpha}, \quad c_\lambda = (\lambda, \lambda + 2\rho).$$

采用逐系数算子 $\partial_\eta(e^\mu) = (\eta, \mu)e^\mu$ 、 $\Delta(e^\mu) = \|\mu\|^2 e^\mu$ 。以 $\widehat{\mathbb{C}[P]}_-$ 表示支集包含在有限个 $\nu_i - Q_+$ ($\nu_i \in P$) 的并中的形式级数环。在 $\widehat{\mathbb{C}[P]}_-$ 中有

$$\left(\Delta + 2\partial_\rho + 2 \sum_{\alpha > 0} q_\alpha \partial_\alpha \right) f = c_\lambda f. \quad (19.5)$$

并且在有限群环中有

$$\Delta(Df) = \|\lambda + \rho\|^2 \cdot Df. \quad (19.6)$$

证明. 算子 $q_\alpha \partial_\alpha$ 作用于 f 后, e^μ 的系数为

$$\sum_{j \geq 1} (\mu + j\alpha, \alpha) m_\lambda(\mu + j\alpha).$$

因此(19.5)的每个系数正是 (19.3), 证明第一式。

对 $D = e^\rho \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})$ 求形式导数, 可得

$$D^{-1} \partial_\eta D = (\eta, \rho) + \sum_{\alpha > 0} (\eta, \alpha) q_\alpha.$$

由 Leibniz 法则,

$$\begin{aligned} \Delta(Df) &= D\Delta f + 2 \sum_a (\partial_{u_a} D)(\partial_{u_a} f) + f\Delta D \\ &= D \left(\Delta f + 2\partial_\rho f + 2 \sum_{\alpha > 0} q_\alpha \partial_\alpha f \right) + f\Delta D. \end{aligned}$$

而定理 19.3.2 把 D 写成 A_ρ 。Weyl 群保持范数, 故 $\Delta D = \|\rho\|^2 \cdot D$ 。代入第一式, 得到

$$\Delta(Df) = (c_\lambda + \|\rho\|^2) Df = \|\lambda + \rho\|^2 \cdot Df.$$

虽然中间借用了形式倒数, 最后两边都是有限群环元素; 其等式因有限群环嵌入形式环而成立。□

这个二阶等式的用途十分具体: Df 中每个非零指数都必须与 $\lambda + \rho$ 有相同范数。反对称性将允许我们只看严格支配的指数, 最高权限制再排除其他可能。

19.4 Weyl 特征标公式

证明 Weyl 特征标公式将用到有限维特征标的 Weyl 不变性、分母的反对称性, 以及 Casimir 给出的二阶算子等式。反对称性确定可能出现的轨道和, 二阶等式与最高权条件则排除较低项。

19.4.1 Weyl 分母

由(19.4), $D = A_\rho$ 。乘积形式便于在负根锥中求逆, 交错和形式便于利用 Weyl 群对称性。若把 e^μ 最终代成函数 $\exp(\mu(h))$, 某些 h 会让分母为零; 本节先在群环中证明乘法恒等式, 以区别形式商和可能未定义数值商。

例如在 A_1 中, 根为 2ω , 故 $D = e^\omega - e^{-\omega}$. 在 A_2 中, $\rho = \alpha_1 + \alpha_2$, 故

$$D = e^{\alpha_1 + \alpha_2}(1 - e^{-\alpha_1})(1 - e^{-\alpha_2})(1 - e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)}).$$

后一式展开后只有六项, 因为抵消后它正是 A_ρ , 而 $W \cong S_3$ 有六个元素。

19.4.2 Weyl 特征标公式的陈述与证明

定理 19.4.1 (Weyl 特征标公式). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ 为相应根系, Φ^+ 为一组正根, P 为权格, P^+ 为支配整权集, W 为 Weyl 群. 令 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$, $\varepsilon(w) = \det(w|_{\text{span}_{\mathbb{R}} \Phi})$, 并在 $\mathbb{Z}[P]$ 中定义

$$D = e^\rho \prod_{\alpha \in \Phi^+} (1 - e^{-\alpha}), \quad A_\nu = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\nu} \quad (\nu \in P).$$

设 $\lambda \in P^+$, $L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模. 则在权格群环中有

$$D \text{ ch } L(\lambda) = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w(\lambda + \rho)} = A_{\lambda + \rho}. \quad (19.7)$$

因此在群环的分式域中可写为

$$\text{ch } L(\lambda) = \frac{A_{\lambda + \rho}}{A_\rho} = \frac{\sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w(\lambda + \rho)}}{e^\rho \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})}.$$

右端实际属于 $\mathbb{Z}[P]$, 其系数就是权重数。

证明. 令 $f = \text{ch } L(\lambda)$. 由命题 19.1.4, f 在 W 下不变, 而 D 反对称, 所以 Df 反对称. 由引理 19.3.1, 可唯一写成

$$Df = \sum_{\nu \text{ 严格支配整权}} a_\nu A_\nu.$$

它的支集包含于 $\lambda + \rho - Q_+$, 故每个出现的 ν 都满足 $\nu \leq \lambda + \rho$. 最高项 $e^{\lambda + \rho}$ 的系数为一: f 的最高项是 e^λ , D 的最高项是 e^ρ , 其余项都严格向下. 因此 $a_{\lambda + \rho} = 1$.

另一方面, 命题 19.3.4 给出 $\Delta(Df) = \|\lambda + \rho\|^2 Df$. 对每个交错和, $\Delta A_\nu = \|\nu\|^2 A_\nu$. 它们线性无关, 故 $a_\nu \neq 0$ 时必须有 $\|\nu\|^2 = \|\lambda + \rho\|^2$.

若 $\nu < \lambda + \rho$, 令 $\beta = \lambda + \rho - \nu \in Q_+ \setminus \{0\}$. $\lambda + \rho$ 和 ν 都严格支配, 所以

$$\|\lambda + \rho\|^2 - \|\nu\|^2 = (\beta, \lambda + \rho + \nu) > 0.$$

严格性来自 β 为简单根的非零非负组合, 而 $(\alpha_i, \lambda + \rho + \nu) > 0$ 对每个 i 成立. 这与范数相等矛盾. 因此只剩 $\nu = \lambda + \rho$ 一项, 且系数为一, 得到主等式。

权格群环同构于有限个 Laurent 变量的整系数多项式环, 故为整环, 而 $D \neq 0$. 因此可在其分式域中除以 D . 所得商等于已经存在的有限维模特征标, 故确为有限整数和. $\square$

Humphreys 在 [8, Section 24.3, pp. 138–139] 中给出同一特征标公式和维数公式. 本节从 Freudenthal 递推、形式算子和反对称展开出发证明这些公式。

19.4.3 反对称性、最高项与范数限制

若只知道 Df 反对称且最高项为 $e^{\lambda+\rho}$, 仍可添加较低的反称轨道和。(19.6)再给出范数限制, 结合最高权支集与严格支配代表上的范数比较, 才排除这些项。单凭范数相等还不够, 因为一个球面可以与许多 Weyl 轨道相交。

上一章已构造有限维 $L(\lambda)$, 本章据此计算其特征标。公式中的商等于这个表示的特征标, 因此只有有限项, 且系数均为非负整数。

19.4.4 $\mathfrak{sl}_2$ 与 $\mathfrak{sl}_3$ 的特征标计算

对 $\mathfrak{sl}_2$, 令 $z = e^\omega$, $\lambda = m\omega$ 。公式变为

$$\text{ch } L(m\omega) = \frac{z^{m+1} - z^{-(m+1)}}{z - z^{-1}} = z^m + z^{m-2} + \cdots + z^{-m}.$$

最后一步是有限等比恒等式, 可直接乘回 $z - z^{-1}$ 验证。它恢复了独立建立的 $\mathfrak{sl}_2$ 分类中的全部权和重数。

对 $\mathfrak{sl}_3$, 用 $x_1 x_2 x_3 = 1$ 的形式变量记录对角权, 正根为 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2, \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \varepsilon_1 - \varepsilon_3$ 。令 $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$, $a, b \geq 0$ 。在该权格中可以用指数列 $(a+b, b, 0)$ 表示 λ , 用 $(2, 1, 0)$ 表示 ρ , 所以

$$\text{ch } L(a\omega_1 + b\omega_2) = \frac{\det \begin{pmatrix} x_1^{a+b+2} & x_1^{b+1} & 1 \\ x_2^{a+b+2} & x_2^{b+1} & 1 \\ x_3^{a+b+2} & x_3^{b+1} & 1 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{pmatrix}}. \quad (19.8)$$

分子、分母都是对变量置换的交错和, 因而确实是 Weyl 公式的直接改写。

取 $(a, b) = (1, 0), (0, 1), (2, 0)$, 分别得到

$$x_1 + x_2 + x_3, \quad x_1^{-1} + x_2^{-1} + x_3^{-1}, \quad \sum_{i \leq j} x_i x_j.$$

例如第一式乘以分母时, 只留下指数列 $(3, 1, 0)$ 的交错式: 乘积中的重复指数行列式为零; 第三式同样由完全对称二次式的行列式恒等式验证。

取 $(a, b) = (1, 1)$, 商为

$$2 + \sum_{i \neq j} \frac{x_i}{x_j}.$$

可将它乘回 Vandermonde 分母, 逐项交错化得到指数列 $(4, 2, 0)$ 的分子; 也可用 $(x_1 + x_2 + x_3)(x_1^{-1} + x_2^{-1} + x_3^{-1}) - 1$ 展开为同一式。这六个非零权正是六个根, 常数项二对应二维 Cartan 空间, 与前面的伴随模计算一致。

19.5 维数与重数

Weyl 特征标公式已经同时包含维数和全部权重数, 但取出这两类信息的方法不同. 求维数要处理分子分母的共同消失; 求单个权重数则可在负根锥中展开倒数. 张量分解最后归结为乘法和最高项的逐次消去.

19.5.1 Weyl 维数公式

定理 19.5.1 (Weyl 维数公式). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ^+ 为相应根系的一组正根, P^+ 为支配整权集. 令 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$, 以 h_α 表示根 α 的余根, $(\cdot, \cdot)$ 表示 Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的型. 对 $\lambda \in P^+$, 相应有限维简单最高权模 $L(\lambda)$ 满足

$$\dim L(\lambda) = \prod_{\alpha > 0} \frac{(\lambda + \rho, \alpha)}{(\rho, \alpha)} = \prod_{\alpha > 0} \frac{(\lambda + \rho)(h_\alpha)}{\rho(h_\alpha)}. \quad (19.9)$$

证明. 记 $N = |\Phi^+|$. 取 $H \in \mathfrak{h}$ 使所有 $\alpha(H) \neq 0$, 作形式代换 $e^\mu \mapsto \exp(t \cdot \mu(H)) \in \mathbb{C}[[t]]$. 这在有限群环上是环同态. 对 $A_\nu(tH) = \sum_w \varepsilon(w) \exp(t(w\nu)(H))$, 其 t^j 系数分别是关于 H 和 ν 的 j 次齐次多项式, 并且在两个变量中各自反对称.

任意关于 H 的反对称多项式在每个根反射的固定超平面 $\alpha(H) = 0$ 上为零, 故被所有正根线性因子的乘积整除. 不同正根的线性因子不相伴, 因而 $j < N$ 时该系数为零. 对 $j = N$, 该系数关于 H 必为 $\prod_{\alpha > 0} \alpha(H)$ 的倍数; 再对 ν 用同样论证, 得

$$[t^N] A_\nu(tH) = c \prod_{\alpha > 0} \alpha(H) \prod_{\alpha > 0} (\nu, \alpha),$$

其中 c 与 H, ν 都无关.

令 $\nu = \rho$. 分母恒等式给出

$$A_\rho(tH) = e^{t \cdot \rho(H)} \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-t \cdot \alpha(H)}) = t^N \prod_{\alpha > 0} \alpha(H) + O(t^{N+1}).$$

因此 $c = \prod_{\alpha > 0} (\rho, \alpha)^{-1}$. 将 Weyl 特征标公式的乘法形式 $A_{\lambda+\rho} = A_\rho \operatorname{ch} L(\lambda)$ 作同一代换并比较 t^N 系数, 右端的特征标只贡献常数项 $\sum_\mu m_\lambda(\mu) = \dim L(\lambda)$. 约去非零的 $\prod_{\alpha > 0} \alpha(H)$, 得到第一式. 每一项分子分母同时乘 $2/(\alpha, \alpha)$, 得到余根形式. $\square$

例如对 $\mathfrak{sl}_3$, 正余根为 $h_1, h_2, h_1 + h_2$. $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$ 时,

$$\dim L(a\omega_1 + b\omega_2) = \frac{(a+1)(b+1)(a+b+2)}{2}.$$

所以自然模、对偶自然模、对称平方和伴随模的维数依次为三、三、六、八. 取 $a = b = m$ 时, 维数为 $(m+1)^3$.

19.5.2 权重数的计算

定义 19.5.2. 设 Φ 为有限维复半单 Lie 代数的根系, Φ^+ 为一组正根, $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ 为简单根. 令 $E = \operatorname{span}_{\mathbb{R}} \Phi$, $Q = \sum_i \mathbb{Z} \alpha_i$, $Q_+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0} \alpha_i$. 对根格 Q 中的 β , 令

$$\mathcal{P}(\beta) = \# \left\{ (n_\alpha)_{\alpha > 0} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{|\Phi^+|} \left| \sum_{\alpha > 0} n_\alpha \alpha = \beta \right. \right\}.$$

若 $\beta \notin Q_+$, 规定为零; 特别地 $\mathcal{P}(0) = 1$. 它称为 **Kostant 分拆函数** (Kostant partition function). 对不在根格中的向量也规定其值为零。

由于正根高度为正, 固定 β 时所有 n_α 都有界, 故这个数有限。其形式生成函数为

$$\prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})^{-1} = \sum_{\beta \in Q_+} \mathcal{P}(\beta) e^{-\beta}.$$

定理 19.5.3 (Kostant 重数公式). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, $\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数, Φ 为相应根系, Φ^+ 为一组正根, P 为权格, P^+ 为支配整权集, W 为 Weyl 群。令 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$, $\varepsilon(w) = \det(w|_{\text{span}_{\mathbb{R}} \Phi})$, 以 $\mathcal{P}$ 表示 Φ^+ 的 Kostant 分拆函数。设 $\lambda \in P^+$, $L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模, $\mu \in P$, $m_\lambda(\mu) = \dim_{\mathbb{C}} L(\lambda)_\mu$ 。则

$$m_\lambda(\mu) = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) \mathcal{P}(w(\lambda + \rho) - (\mu + \rho)). \quad (19.10)$$

证明. 在负锥形式环中, 将 Weyl 特征标公式的分母倒数展开:

$$\text{ch } L(\lambda) = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w(\lambda + \rho) - \rho} \sum_{\beta \in Q_+} \mathcal{P}(\beta) e^{-\beta}.$$

固定 e^μ 的系数, 所需 β 恰为 $w(\lambda + \rho) - (\mu + \rho)$, 于是得到公式。Weyl 群有限, 且每个系数的形式乘法有限, 因而没有交换发散级数的问题。□

在 A_2 中, 正根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$ 。所以

$$\mathcal{P}(a\alpha_1 + b\alpha_2) = \begin{cases} \min(a, b) + 1, & a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

因为组合中第三条根可选 $0, \dots, \min(a, b)$ 次, 选定后前两条根的次即确定。对 $\lambda = m(\alpha_1 + \alpha_2) = m\rho$, $\mu = 0$, Kostant 和中只有单位元项非零: 其他轨道权 $w((m+1)\rho) - \rho$ 至少有一个简单根系数为负。因此

$$m_{m\rho}(0) = \mathcal{P}(m\alpha_1 + m\alpha_2) = m + 1.$$

当 $m = 2$ 时, 二十七维简单模有三维零权空间。

Freudenthal 递推适合按较高权逐层计算, Kostant 公式则直接把一个重数写成有限个分拆数的交错和。后者的中间项可能很大, 并且发生抵消, 不意味着它在所有秩中都更省计算。两者均由本章已经证明的等式得到, 可用来互相核验。

19.5.3 特征标乘法与张量分解

设 $\lambda, \mu \in P^+$ 。先把

$$F = \text{ch } L(\lambda) \text{ch } L(\mu)$$

展开为有限权和。由完全可约性, 它是若干简单特征标的非负整数和。选其支集中对权偏序极大的权 ν , 该权必为某个简单直和项的最高权, 因而支配。令 a 为 e^ν 的系数; 减去 $a \text{ch } L(\nu)$, 就删掉相应的全部简单直和项。继续这个过程, 每次都使表示的总维数下降, 有限步后停止。若同时有多个不可比较的极大权, 可按任意次序处理。

例 19.5.4. 设 $V = \mathbb{C}^3$ 为 $\mathfrak{sl}_3$ 自然模。由已算出的特征标,

$$\text{ch}(V \otimes V^*) = (x_1 + x_2 + x_3)(x_1^{-1} + x_2^{-1} + x_3^{-1}) = 3 + \sum_{i \neq j} \frac{x_i}{x_j}.$$

减去最高权 $\omega_1 + \omega_2$ 的伴随特征标 $2 + \sum_{i \neq j} x_i/x_j$, 剩下一个常数一。因此

$$V \otimes V^* \cong L(\omega_1 + \omega_2) \oplus L(0).$$

这与 $\text{End}(V) = \mathfrak{sl}_3 \oplus \mathbb{C}I$ 一致。类似地,

$$V \otimes V \cong L(2\omega_1) \oplus L(\omega_2),$$

因为 $(x_1 + x_2 + x_3)^2$ 分成 $\sum_{i \leq j} x_i x_j$ 与 $\sum_{i < j} x_i x_j$, 它们分别是对称平方和外平方的特征标。

19.5.4 形式代换与最低次项比较

维数公式中, 不能直接令所有 $e^\mu = 1$ 后把 Weyl 商的分子与分母相除: 两者都会变为零。正确做法是保留一个形式参数 t , 找到共同的首个非零次数, 再比较系数。这个次数是正根数 N , 原因是反对称多项式必须含有每一条反射超平面的线性因子。

在 A_1 中, 这个过程只有一次消失。取 $\omega(H) = 1$, 则

$$A_{(m+1)\omega}(tH) = 2(m+1)t + O(t^3), \quad A_\omega(tH) = 2t + O(t^3),$$

比值的常数项为 $m+1$ 。在 A_2 中, 三条正根使分子分母都从 t^3 开始, 最高次首项的比值就是 $(a+1)(b+1)(a+b+2)/2$ 。这里的 $O(t^r)$ 只表示形式幂级数中次数至少为 r 的项, 不调用解析极限。

维数、权重数和张量重数分别回答“总共有多少个向量方向”“某个 Cartan 权出现几次”“某个简单模出现几份”。三个数应分开记录; 本章通过特征标把它们联系起来, 却没有把它们混作一种重数。

19.6 与组合表示论的联系

第七章已经从对称群与张量幂构造 Schur 函子; 本章则从 Cartan 子代数和根构造最高权表示。到 A 型, 两种构造给出同一批表示。本节在一般 Weyl 公式已经证明之后建立这个识别, 用来解释分拆和最高权之间的关系。

19.6.1 A 型与 Schur 函数

设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_r$, 取自然模 $V = \mathbb{C}^r$ 。在对角 Cartan 子代数上, 记 ε_i 为第 i 个对角坐标, 并有 $\sum_i \varepsilon_i = 0$ 。正根为 $\varepsilon_i - \varepsilon_j$, $i < j$, Weyl 群为 S_r , 通过置换坐标作用。

命题 19.6.1. 设 $r \geq 2$ 为整数, $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_r(\mathbb{C})$, 取对角 Cartan 子代数及上三角正根, 相应基本权记为 $\omega_1, \dots, \omega_{r-1}$ 。设 $\nu = (\nu_1 \geq \dots \geq \nu_r \geq 0)$ 为分拆, 令

$$\lambda_\nu = \sum_{i=1}^{r-1} (\nu_i - \nu_{i+1}) \omega_i.$$

记 $L(\lambda_\nu)$ 为相应有限维简单最高权模, s_ν 为 Schur 多项式. 用形式变量 $x_1, \dots, x_r$ 记录对角权, 并规定 $x_1 \cdots x_r = 1$, 则

$$\text{ch } L(\lambda_\nu) = \frac{\det(x_i^{\nu_j+r-j})_{i,j=1}^r}{\det(x_i^{r-j})_{i,j=1}^r} = s_\nu(x_1, \dots, x_r).$$

证明. 指数列 ν 在 $\mathfrak{sl}_r$ 权格中的简单余根取值为 $\nu_i - \nu_{i+1}$, 所以代表 λ_ν . 列 $(r-1, r-2, \dots, 0)$ 的相邻差都是一, 故代表 ρ ; 其与通常和为零的 ρ 坐标只差共同常数, 在 $\sum_i \varepsilon_i = 0$ 后为同一权. Weyl 群交错求和正是变量置换的行列式, 所以 Weyl 特征标公式给出前一个商. 后一个等号就是定义 7.1.4 的交错式定义. $\square$

每个支配整权 $\sum_i a_i \omega_i$ 都可由唯一一个满足 $\nu_r = 0$ 的分拆表示:

$$\nu_i = a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{r-1}, \quad \nu_r = 0.$$

若允许末行非零, 则对所有行同时加一个非负整数不会改变 λ_ν . 这正对应一般线性群表示中的行列式扭曲, 在 $\mathfrak{sl}_r$ 上则变成平凡扭曲.

19.6.2 对称幂、外幂与 Schur 函子

定理 19.6.2. 设 $r \geq 2$ 为整数, $V = \mathbb{C}^r$ 为 $\mathfrak{sl}_r(\mathbb{C})$ 的自然模, 取对角 Cartan 子代数及上三角正根, 相应基本权记为 $\omega_1, \dots, \omega_{r-1}$. 设 $\nu = (\nu_1 \geq \cdots \geq \nu_r \geq 0)$ 为至多 r 行的分拆, 不足 r 行时补零, 令 $\lambda_\nu = \sum_{i=1}^{r-1} (\nu_i - \nu_{i+1}) \omega_i$. Schur 函子值 $\mathbb{S}_\nu(V)$ 按张量作用成为复 $\mathfrak{sl}_r$ 模时, 与相应有限维简单最高权模 $L(\lambda_\nu)$ 满足

$$\mathbb{S}_\nu(V) \cong L(\lambda_\nu).$$

特别地, 对整数 $m \geq 0$ 及 $1 \leq j < r$, 有

$$\text{Sym}^m V \cong L(m\omega_1), \quad \bigwedge^j V \cong L(\omega_j) \quad (1 \leq j < r), \quad \bigwedge^r V \cong L(0).$$

证明. 在 $V^{\otimes n}$ 上, $x \in \mathfrak{sl}_r$ 按

$$x(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = \sum_{a=1}^n v_1 \otimes \cdots \otimes x v_a \otimes \cdots \otimes v_n$$

作用; 它与因子置换交换, 所以在 $\mathbb{S}_\nu(V) = \text{Hom}_{S_n}(S^\nu, V^{\otimes n})$ 上也有自然作用. 对角 Cartan 权由各张量指标的出现次数记录; 第七章的命题 7.3.4 因此给出其形式特征标 $s_\nu(x)$, 再加上 $x_1 \cdots x_r = 1$ 的关系.

由命题 19.6.1, 这个特征标等于 $\text{ch } L(\lambda_\nu)$. 两个模有限维, 故 Weyl 完全可约性和命题 19.1.3 说明它们同构. 单行与单列 Schur 函子分别为对称幂与外幂, 代入相邻行长差得到后面的具体识别. $\square$

19.6.3 对称函数与最高权理论

对 $\mathfrak{sl}_r$ 的两个 Schur 模, 先在对称函数环中求乘积

$$s_\lambda s_\mu = \sum_{\nu} c_{\lambda\mu}^{\nu} s_{\nu}.$$

删去超过 r 行的分拆, 再按相邻行长差将每个剩余 ν 换成最高权, 就得到对应 Lie 代数模的张量分解。若不同分拆给出同一最高权, 须合并重数; 在同一总次数中, 它们若只差共同整数平移, 实际上平移量只能为零。对称幂与外幂的乘法则分别由已经证明的横条、竖条 Pieri 规则直接计算。

例 19.6.3. 对 $r = 3$, 分拆 $(2, 1, 0)$ 对应 $\omega_1 + \omega_2$, 即八维伴随模。由 (7.13), 保留至多三行的项并换成最高权, 得到

$$\begin{aligned} L(\omega_1 + \omega_2)^{\otimes 2} &\cong L(2\omega_1 + 2\omega_2) \oplus L(3\omega_1) \oplus L(3\omega_2) \\ &\quad \oplus L(\omega_1 + \omega_2)^{\oplus 2} \oplus L(0). \end{aligned}$$

具体对应的分拆依次为 $(4, 2, 0)$ 、 $(4, 1, 1)$ 、 $(3, 3, 0)$ 、 $(3, 2, 1)$ 、 $(2, 2, 2)$ 。维数公式给出 $27 + 10 + 10 + 2 \cdot 8 + 1 = 64$, 与 8^2 一致。这里重数二来自 Littlewood–Richardson 系数; 零权重数则属于每个简单模内部, 是另一项数据。

19.6.4 低秩计算与 BGG 方法简介

对 $\mathfrak{sl}_2$, 分拆 $(m, 0)$ 的 Schur 多项式在 $x_1 = z, x_2 = z^{-1}$ 时为 $z^m + z^{m-2} + \cdots + z^{-m}$, 与本章秩一情形的 Weyl 计算一致。对 $\mathfrak{sl}_3$, 分拆 $(a+b, b, 0)$ 正给出 (19.8); 三个变量的 Schur 维数乘积化简为 $(a+1)(b+1)(a+b+2)/2$ 。这些等式说明分拆、最高权和张量构造是同一对象的不同描述。

后面的 BGG 方法研究 Verma 模之间的映射和消解, 能够把特征标中的交错和解释为某些正合复形的 Euler 和。这里的交错符号来自 Weyl 反对称性, 额外项的消失来自 Casimir 的范数限制。

本章小结

形式特征标把有限维模分解变成权格群环中的加法与乘法。Weyl 对称性来自根方向的 $\mathfrak{sl}_2$ 模; Casimir 标量与同一算子的权空间迹比较, 给出 Freudenthal 递推及最高权初值以外的重数计算。

Weyl 分母先由简单反射与最高项独立确定。乘上分母以后, Freudenthal 恒等式成为一个二阶特征方程, 限制每个指数的范数。反对称展开把问题归到严格支配的代表, 最高权偏序随即排除全部较低项, 得到 Weyl 特征标公式。三个条件共同起作用, 任何一个单独都不足以完成证明。

维数公式比较形式代换后的首个非零次数; Kostant 公式则展开分母倒数并读出系数。计算张量积时, 先相乘, 再按极大权逐次减去简单特征标。在 A 型, 交错和化成行列式, 恢复 Schur 函数; 这解释了第七章的分拆参数与本章最高权参数之间的对应。

习题

习题 19.1. 设 $\mathfrak{b}$ 有基 h, e , 满足 $[h, e] = 2e$. 构造两个二维 $\mathfrak{b}$ 模, 它们的 h 权均为 $1, -1$, 却不同构. 说明形式特征标判断同构时为什么用到了半单 Lie 代数条件.

解. 在两者上都令 $h = \text{diag}(1, -1)$. 第一个令 $e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 第二个令 $e = 0$. 两者都满足括号关系且权相同, 但 e 的秩分别为一与零, 所以不同构. 第一模还有不分裂的子模列, 第二模为两个一维模之和. 形式特征标只记录 Cartan 权, 不记录这种扩张; 正文借完全可约性才能用它恢复同构类. $\square$

习题 19.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为复半单 Lie 代数, w_0 为把正根变成负根的最长元. 证明 $L(\lambda)^* \cong L(-w_0\lambda)$.

解. 对偶模简单: 其真子模的零化子会在原模中给出真子模. 原模权在 $\lambda - Q_+$ 中, 且在 W 下稳定. 对任意权 μ , 由 $w_0\mu \leq \lambda$ 得 $\mu \geq w_0\lambda$, 因为 $w_0Q_+ = -Q_+$ 且 $w_0^2 = 1$. 权 $w_0\lambda$ 确实出现且重数一, 所以对偶模的最高权为 $-w_0\lambda$. 最高权分类给出同构. $\square$

习题 19.3. 证明 $L(\lambda)$ 中每个 $w\lambda$, $w \in W$, 的重数均为一. 并说明 Weyl 对称性不能因此推出所有权重数都为一.

解. 最高权重数为一, Weyl 不变性使同一轨道上的重数均为一. 但其他权可能不在最高权轨道中. 例如 $\mathfrak{sl}_3$ 伴随模的最高权轨道为六个根, 零权不在该轨道中, 且零权重数为二. $\square$

习题 19.4. 设 $C = \sum_i x_i x^i$ 为 Killing Casimir. 求其在 $V \otimes W$ 上的算子, 并用 $\mathfrak{sl}_2$ 两个自然模的张量积说明它不等于 $C_V \otimes I + I \otimes C_W$.

解. 张量作用中 x 为 $\rho_V(x) \otimes I + I \otimes \rho_W(x)$. 展开二次式, 得

$$C_{V \otimes W} = C_V \otimes I + I \otimes C_W + 2 \sum_i \rho_V(x_i) \otimes \rho_W(x^i),$$

两个交叉和相同, 因为 Killing 对偶张量对称. 对两个自然模, 前两项总和为 $3I/4$. 但张量积为 $L(2) \oplus L(0)$, 实际 Casimir 标量分别为一与零. 因此交叉项不可删除; 它在两个分量上的标量分别为 $1/4$ 与 $-3/4$. $\square$

习题 19.5. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 的 $L(4)$ 中, 求零权空间上 $f_\alpha e_\alpha$ 的迹, 其中 $e_\alpha = e$, $B(e_\alpha, f_\alpha) = 1$. 再由 Casimir 核对结果.

解. 标准基满足 $B(e, f) = 4$, 故 $f_\alpha = f/4$. 零权向量为 f^2v , 而 $fef^2v = 2(4-2+1)f^2v = 6f^2v$, 所以所求迹为 $6/4 = 3/2$. Killing Casimir 标量为 $4(4+2)/8 = 3$; 零权时 Cartan 与 $2t_\rho$ 都作用为零, 故 $C = 2f_\alpha e_\alpha$ 在该空间上给出 $2 \cdot 3/2 = 3$, 相符. $\square$

习题 19.6. 对 $\mathfrak{sl}_2$, 令 $\lambda = m\omega$, $\alpha = 2\omega$. 假定高于 $\mu = (m-2q)\omega$ 的链上重数都为一, 直接代入 Freudenthal 递推证明该权重数也为一, 其中 $1 \leq q \leq m$.

解. Killing 型给出 $(\omega, \omega) = 1/8$. 递推左端的系数为

$$\frac{(m+1)^2 - (m-2q+1)^2}{8} = \frac{q(m-q+1)}{2}.$$

右端只有 $j = 1, \dots, q$ 的项, 且

$$2 \sum_{j=1}^q (\mu + j\alpha, \alpha) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^q (m - 2q + 2j) = \frac{q(m - q + 1)}{2}.$$

该数在所给范围内非零, 故重数为一。 $\square$

习题 19.7. 对 $\mathfrak{sl}_2$ 平凡模 $\lambda = 0$, 取 $\mu = -2\omega$ 。说明 Freudenthal 分母为零, 却不产生任何未确定的实际权重数。

解. 此时 $\rho = \omega$, $\mu + \rho = -\omega$, 所以两个范数相等。然而平凡模只含零权, μ 根本不是实际权。递推右侧可能遇到 $\mu + \alpha = 0$, 但其内积系数 $(0, \alpha) = 0$, 其余项也为零, 所以式子只是 $0 = 0$ 。这说明不能对任意格点一律除以分母; 正文的正性结论附有实际权或支配候选权条件。 $\square$

习题 19.8. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 的 Killing 归一化下, 求自然模及其对称平方的 Casimir 标量。可用 $B(X, Y) = 6 \operatorname{tr}(XY)$ 。

解. 根长平方为 $1/3$, 故 $(\omega_1, \omega_1) = 1/9$ 、 $(\omega_1, \omega_2) = 1/18$, 从而 $(\omega_1, \rho) = 1/6$ 。所以

$$c_{\omega_1} = \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{4}{9}, \quad c_{2\omega_1} = \frac{4}{9} + \frac{2}{3} = \frac{10}{9}.$$

自然模还可使用迹核对: 其迹型是 Killing 型的 $1/6$, 故 $\operatorname{tr}_V C = 8/6$, 除以维数三仍为 $4/9$ 。 $\square$

习题 19.9. 把 A_2 的 Weyl 分母乘积展开成六项, 并检验 s_1 使它变号。

解. 直接展开并抵消得

$$D = e^{\alpha_1 + \alpha_2} - e^{\alpha_1} - e^{\alpha_2} + e^{-\alpha_1} + e^{-\alpha_2} - e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)}.$$

反射满足 $s_1 \alpha_1 = -\alpha_1$ 、 $s_1 \alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2$ 。逐项代入, 六项被配成符号相反的三对, 所以 $s_1 D = -D$ 。 $\square$

习题 19.10. 设整权 ν 满足 $\nu(h_i) = 0$ 。证明 $A_\nu = 0$ 。对 A_2 的 $\nu = \omega_1$ 举例说明。

解. $s_i \nu = \nu$ 。将求和中的 w 与 ws_i 配对, 两者指数相同而符号相反, 故相消。在 A_2 中 $\omega_1(h_2) = 0$, 所以 $A_{\omega_1} = 0$, 尽管 ω_1 本身是非零支配权。交错和需要严格支配的轨道代表。 $\square$

习题 19.11. 用已经证明的 Weyl 公式证明: 权格群环中的全部反对称元素, 恰为 $D\mathbb{Z}[P]^W$ 。

解. D 反对称, 故右侧都反对称。反过来, 反对称元素唯一展开成有限和 $\sum_\nu a_\nu A_\nu$, 其中 ν 严格支配整。每个 $\nu = \lambda + \rho$, $\lambda \in P^+$, 所以 $A_\nu = D \operatorname{ch} L(\lambda)$ 。于是该元素等于 D 乘一个有限整数线性组合的 Weyl 不变特征标。 $\square$

习题 19.12. 在 A_1 的负锥形式环中计算 $(1 - e^{-\alpha})^{-2}$, 并解释每个系数为何有限。

解. 把两个几何级数相乘, $e^{-n\alpha}$ 的系数等于 $a+b=n$, $a, b \geq 0$ 的解数, 即 $n+1$. 所以

$$(1 - e^{-\alpha})^{-2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)e^{-n\alpha}.$$

固定 n 后只有 $n+1$ 项参与, 没有解析求和问题. $\square$

习题 19.13. 说明简单反射不能逐项把 $\sum_{j \geq 0} e^{-j\alpha}$ 变成同一个负锥形式环中的级数. 再求有理式 $(1 - e^\alpha)^{-1}$ 在这个负锥环中的合法展开.

解. 反射后得到 $\sum_{j \geq 0} e^{j\alpha}$, 其支集向正方向无界, 不能包含在有限多个负锥平移中. 但代数恒等式

$$(1 - e^\alpha)^{-1} = -\frac{e^{-\alpha}}{1 - e^{-\alpha}} = -\sum_{j \geq 1} e^{-j\alpha}$$

给出负锥中的合法展开. 它与前一个正向展开对应不同的形式展开方向, 不能在同一个形式环中直接比较系数. $\square$

习题 19.14. 对 $\nu \in P$ 及负锥形式级数 f , 证明

$$\Delta(e^\nu f) = e^\nu(\Delta f + 2\partial_\nu f + \|\nu\|^2 f).$$

解. 对单项式 $f = e^\mu$, 左边为 $\|\mu + \nu\|^2 e^{\mu+\nu}$, 右边为 $(\|\mu\|^2 + 2(\nu, \mu) + \|\nu\|^2) e^{\mu+\nu}$, 相等. 逐系数延拓便得一般情况; 乘一个固定单项式只平移支集, 所以仍在同一形式环中. $\square$

习题 19.15. 在 A_1 中取 $m \geq 1$. 构造一个最高项为 $e^{(m+1)\omega}$ 的反对称元素, 它不等于 $A_{(m+1)\omega}$, 并用 Laplace 等式²检测多余项.

解. 取 $F = A_{(m+1)\omega} + A_\omega$. 两个加数都反对称, 且第二项严格较低, 所以最高项不变. 但它们分别是 Δ 的特征向量, 特征值为 $(m+1)^2/8$ 与 $1/8$, 二者不同. 所以 F 不满足 $\Delta F = ((m+1)^2/8)F$, 多余项被 Casimir 对应的方程排除. $\square$

习题 19.16. 在 A_1 中计算 $\lambda = -2\omega$ 的形式商 $A_{\lambda+\rho}/A_\rho$. 说明为什么 Weyl 公式必须附有支配整权条件.

解. $\lambda + \rho = -\omega$, 而 $A_{-\omega} = -A_\omega$, 故商为 -1 . 它不是实际有限维表示的特征标, 因为零权系数为负. 最高权 -2ω 的简单模是无限维的; 不能把为有限维支配最高权证明的公式用于它. $\square$

习题 19.17. 对 C_2 , 取正根 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, 2\varepsilon_1, 2\varepsilon_2$, 基本权 $\omega_1 = \varepsilon_1, \omega_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. 求 $L(a\omega_1 + b\omega_2)$ 的维数, 并算出两个基本模的维数.

解. $\rho = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2$, $\lambda + \rho = (a+b+2)\varepsilon_1 + (b+1)\varepsilon_2$. 四条正根给出的比值依次为 $a+1, (a+2b+3)/3, (a+b+2)/2, b+1$. 因此

$$\dim L(a\omega_1 + b\omega_2) = \frac{(a+1)(b+1)(a+b+2)(a+2b+3)}{6}.$$

²拉普拉斯 (Pierre-Simon Laplace, 1749-1827), 法国数学家、天文学家, 在概率论、天体力学与势函数理论方面作出重要贡献.

基本权 ω_1, ω_2 的维数分别为四与五。式中使用了两种根长，但每个分子分母同根的比值使整体归一化相消。 $\square$

习题 19.18. 用 Weyl 维数公式计算 $\mathfrak{sl}_4$ 的 $L(2\omega_2)$ 的维数，再与分拆 $(2, 2)$ 的 Schur 模比较。

解. 分拆取 $(2, 2, 0, 0)$ 。六条正根的维数因子 $(\nu_i - \nu_j + j - i)/(j - i)$ 、 $i < j$ ，依次为 $1, 2, 5/3, 3, 2, 1$ ，乘积为二十。第七章的 $S_{(2,2)}(\mathbb{C}^d)$ 维数 $d^2(d^2 - 1)/12$ 在 $d = 4$ 时也为二十；这里的比较是两种已证公式的核验。 $\square$

习题 19.19. 用 Kostant 重数公式计算 $\mathfrak{sl}_3$ 的 $L(3\omega_1)$ 中零权的重数，明确列出发生抵消的非零项。

解. $\lambda = 3\omega_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ ， $\lambda + \rho = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$ 。单位元给出的差为 $2\alpha_1 + \alpha_2$ ，分拆数二。反射 s_2 把 $(3, 2)$ 的简单根坐标变为 $(3, 1)$ ，减去 $\rho = (1, 1)$ 后为 $(2, 0)$ ，分拆数一，符号为负。其余四个 Weyl 元给出的差至少有一个负坐标，所以贡献为零。因此零权重数为 $2 - 1 = 1$ ，对应对称立方中的单项式 $e_1 e_2 e_3$ 。 $\square$

习题 19.20. 在 A_2 中，设 $\lambda = m\rho$ 、 $m \geq 1$ 。用 Kostant 公式求正根方向上 $j\alpha$ 的重数，再用 Freudenthal 在零权处核验 $m_\lambda(0)$ 。

解. Weyl 群对根传递，所以可取 $\alpha = \rho = \alpha_1 + \alpha_2$ 。当 $1 \leq j \leq m$ 时，Kostant 和只有单位元项，其差为 $(m - j)\rho$ ，所以 $m_\lambda(j\alpha) = m - j + 1$ ； $j > m$ 时为零。其他 Weyl 元把 $(m + 1)\rho$ 送到另一个同长度根的倍数，减去 $(j + 1)\rho$ 后都有负简单根坐标，故没有贡献。

设共同根长平方为 a 。零权处 Casimir 系数为 $m(m + 2)a$ ，而递推右端为

$$2 \cdot 3a \sum_{j=1}^m j(m - j + 1) = a m(m + 1)(m + 2).$$

所以 $m_\lambda(0) = m + 1$ ，与直接分拆数计算一致。 $\square$

习题 19.21. 用形式特征标分解 $\mathfrak{sl}_2$ 的 $L(2\omega) \otimes L(3\omega)$ ，并核对维数。

解. 两个特征标分别为 $z^2 + 1 + z^{-2}$ 与 $z^3 + z + z^{-1} + z^{-3}$ 。乘积最高权为五，减去 $L(5\omega)$ 的六项特征标；剩余最高权为三，再减去 $L(3\omega)$ ；最后剩 $z + z^{-1}$ 。因此分解为

$$L(5\omega) \oplus L(3\omega) \oplus L(\omega).$$

维数 $6 + 4 + 2 = 12 = 3 \cdot 4$ 。 $\square$

习题 19.22. 设 $V = \mathbb{C}^3$ 为 $\mathfrak{sl}_3$ 自然模。分解 $\text{Sym}^2 V \otimes V^*$ 。

解. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 上 $V^* \cong \bigwedge^2 V$ ，所以使用对称函数乘积 $s_{(2)}e_2 = s_{(3,1)} + s_{(2,1,1)}$ 。两分拆的相邻行长差分别为 $(2, 1)$ 、 $(1, 0)$ ，故

$$\text{Sym}^2 V \otimes V^* \cong L(2\omega_1 + \omega_2) \oplus L(\omega_1).$$

维数公式给出 $15 + 3 = 18$ ，与 $6 \cdot 3$ 一致。 $\square$

习题 19.23. 比较 $S_{(5,3,1)}(\mathbb{C}^3)$ 与 $S_{(4,2,0)}(\mathbb{C}^3)$ 。它们作为 $\mathfrak{sl}_3$ 模是否同构？作为 GL_3 表示呢？

解. 两分拆各行同时相差一，所以相邻差都是 $(2, 2)$ ；限制到 $\mathfrak{sl}_3$ 后均为 $L(2\omega_1 + 2\omega_2)$ ，维数二十七。一般线性群一侧，两者相差一个行列式扭曲；标量 cI 分别作用为 c^9 与 c^6 ，所以它们不同构。□

习题 19.24. 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$ 。证明

$$\bigwedge^2 \mathfrak{g} \cong L(3\omega_1) \oplus L(3\omega_2) \oplus L(\omega_1 + \omega_2).$$

提示：检查 $E_{13} \wedge E_{12}$ 、 $E_{13} \wedge E_{23}$ ，并使用 Lie 括号映射。

解. 两个楔积分别有权 $2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 = 3\omega_1$ 和 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3 = 3\omega_2$ 。对简单正根向量取括号，第一项的可能非零像只能产生 $E_{13} \wedge E_{13} = 0$ ，第二项同理，所以它们都是最高权向量。有限维完全可约性及最高权线的生成论证，使其各生成对应的简单模。

Lie 括号 $\bigwedge^2 \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 为模满射，因为 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$ ；因此还有一份伴随模作为直和项。上述三个互不同构简单项维数为十、十、八，和为 $28 = \binom{8}{2}$ ，已穷尽整个外平方。□

习题 19.25. 由本章伴随模张量平方及上一题的外平方分解，求 $\text{Sym}^2 \mathfrak{sl}_3$ 的分解，并指出平凡分量的意义。

解. 特征零下张量平方分成对称平方与外平方。从伴随张量平方中减去外平方的 $L(3\omega_1), L(3\omega_2)$ 及一份伴随模，剩

$$\text{Sym}^2 \mathfrak{sl}_3 \cong L(2\omega_1 + 2\omega_2) \oplus L(\omega_1 + \omega_2) \oplus L(0).$$

维数为 $27 + 8 + 1 = 36 = \binom{9}{2}$ 。平凡分量对应 Killing 型的对偶不变对称张量；它只有一份，与单 Lie 代数上不变双线性型只有一个标量自由度一致。□

第四编

高级表示论与代数对称

本编导读

前面建立了有限群表示的分解方法、ADE 箭图的不可分解分类与复半单 Lie 代数的有限维最高权分类。本编进一步讨论无限维最高权模组成的范畴、群的坐标环上的张量结构，以及不变多项式与商的构造。范畴 $\mathcal{O}$ 中的中心特征标与 BGG 消解用来研究最高权模；坐标环的余乘法记录群的乘法，表示对应的余模则说明群作用怎样在张量积上组合；不变环的生成元与关系具体描述多项式函数怎样形成商。

第二十章有两组问题。研究无限维最高权模时，可读第 20.1、20.2 及 20.4 节：范畴 $\mathcal{O}$ 的有限性条件、中心作用和 BGG 方法依次服务于这一问题。为完成第 12.4* 节留下的 Levi 分解与共轭问题，可以直接读第 20.3 节所证明的 Whitehead 引理³及可解根归纳，不必先学范畴 $\mathcal{O}$ 和 Harish–Chandra 同构⁴。第 20.4 节的一般 BGG 证明概要使用相对 Chevalley–Eilenberg 复形⁵，追踪该概要时仍需补读第 20.3 节。第三编的根系及特征标公式只用此前已证的结构与表示论结果，可以独立阅读。

第二十一章从余乘法、对极和张量表示开始，再把代数群写成坐标环。前半只需张量积与代数同态，后半使用仿射几何的基本语言。群代数与函数代数、模与余模、群点与群概形分别比较；古典群的型与对合例子最后说明，基域和中心商仍会影响表示及点群。

第二十二章的前四节可以在学完第一编并具备多项式基础后阅读。先证明不变环有限生成，再用次数界和 Molien 公式⁶寻找生成元，最后求出生成元之间的全部关系。经典群不变量与仿射商随后解释这些计算的几何意义。几何不变量理论部分证明线性约化群的有限生成、幂提升与射影商的仿射图构造，并给出 Haboush 定理⁷与 Nagata 定理⁸的具体概要及低维算例。

附录 A 的组合与反射群工具承接第 6、7 章；附录 B 的量子群、簇变异和范畴化主要通过小模型说明方法。附录 C 的 Lie 群、算术与几何表示论另需相应的拓扑、分析

³亨利·怀特海德 (John Henry Constantine Whitehead, 1904-1960)，英国数学家，是同伦论的奠基者之一；此处的怀特海德不是其叔父、数学家兼哲学家阿尔弗雷德·诺思·怀特海德。

⁴哈里什-钱德拉 (Harish-Chandra, 1923-1983)，印度裔美国数学家，在半单 Lie 群的表示论与调和分析方面作出重要贡献。

⁵舍瓦莱 (Claude Chevalley, 1909-1984) 是法国数学家，研究类域论和代数群；艾伦伯格 (Samuel Eilenberg, 1913-1998) 是波兰裔美国数学家，创立范畴论并研究代数拓扑。二人共同建立了 Lie 代数上同调的复形。

⁶莫利恩 (Theodor Georg Andreas Molien, 1861-1941)，波罗的海德裔俄国数学家，研究结合代数及有限群多项式不变量。

⁷哈布什 (William Joseph Haboush, 1942-)，美国数学家，证明约化代数群的几何约化性。

⁸永田雅宜 (假名：ながたまさよし，罗马音：Masayoshi Nagata, 1927-2008)，日本数学家，研究可换代数和代数几何，给出 Hilbert 第十四问题的反例。

或几何知识。附录 D.2.1 节使用附录 E 的 Picard–Vessiot 术语⁹与例子；附录 D.1 节的微分算子模计算则可独立于附录 E 进行。这些专题仍须逐项核对其底域和适用条件。

⁹皮卡 (Charles Émile Picard, 1856-1941) 与维西奥 (Ernest Vessiot, 1865-1952) 都是法国数学家, 发展了线性微分方程的 Galois 理论; 皮卡还研究复分析, 维西奥还研究微分方程对称性。

第二十章* 范畴 $\mathcal{O}$ 与 Lie 代数上同调

本章研究范畴 $\mathcal{O}$ 、中心特征标与 BGG 消解，并以 Lie 代数上同调证明 Whitehead 引理和 Levi 分解。一般中心同构与 BGG 消解给出证明概要，秩一情形作完整计算。

本章目标

- 检查范畴 $\mathcal{O}$ 的三个定义条件，证明权空间有限性及核、余核的封闭性。
- 从 PBW 投影计算中心作用，完整求出 $\mathfrak{sl}_2$ 包络代数的中心。
- 使用 Chevalley–Eilenberg 微分，解释一、二阶上同调并证明 Whitehead 引理与一般 Levi–Malcev 定理。
- 核验秩一 BGG 正合列，区分中心特征标、简单模参数以及不同范畴中的扩张。

取 $\mathfrak{sl}_2$ 的最高权为零的 Verma 模，令 v 为最高权向量。向下降方向走一步得到 fv ，而 $e(fv) = [e, f]v + f(ev) = hv = 0$ ，所以 fv 又是一个最高权向量。它生成真子模，说明有限维简单模的分类没有穷尽自然出现的最高权模。怎样把这些无限维对象及其同态、扩张放进一个可控的范畴？范畴 $\mathcal{O}$ 从权分解与有限生成条件作答；中心特征标和消解进一步揭示其中的结构。本章还从 Lie 代数上同调回到可解根与 Levi 分解的问题。

第 20.1、20.2 及 20.4 节研究无限维最高权模：先确定范畴 $\mathcal{O}$ 中的对象，再研究中心特征标和 BGG 消解。这部分需要 PBW、Verma 模与最高权分类；一般 Harish–Chandra 同构和一般 BGG 消解给出证明概要，秩一中心与秩一消解则作完整计算。有限长度、投射覆盖及标准滤过属于更深入的最高权范畴理论。

第 20.3 节以 Lie 代数上同调处理第 12.4* 节的 Levi 分解问题，使用有限维 Lie 代数、模、短正合列以及第三编的完全可约性与 Casimir 结果。交换范畴与上同调长正合列的基础见第四卷，本节也写出所用复形及低阶公式。第 20.4 节的一般 BGG 证明概要还要在第 20.3 节的 Chevalley–Eilenberg 复形基础上使用相对版本，故两组问题在这里有一处实际联系。

参考 [12, Sections 8.4 and 8.8] 可对照 BGG 消解与中心的两种描述。Lie 代数积分和旗簇微分算子的进一步例子放在附录 C。

20.1 范畴 $\mathcal{O}$

复半单 Lie 代数的有限维表示完全可约，研究 Verma 模中的非分裂扩张却必须允许无限维对象。全部包络代数模过于宽泛：Cartan 作用可能没有权分解，权空间也可能无限维。范畴 $\mathcal{O}$ 选取有限生成的权模，并限制正根方向的作用，使最高权方法仍能控制权集和各权空间。

20.1.1 有限生成性、权分解与局部有限性

定义 20.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定三角分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}^- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+$, 其中 $\mathfrak{h}$ 为 Cartan 子代数, $\mathfrak{n}^\pm$ 分别为所选正、负根空间之和。在么性左 $U(\mathfrak{g})$ 模范畴中, 选取满足下列条件的模 M :

1. 模 M 作为 $U(\mathfrak{g})$ 模有限生成;
2. $M = \bigoplus_{\mu \in \mathfrak{h}^*} M_\mu$, 其中 M_μ 是共同特征值为 μ 的 Cartan 权空间;
3. 对每个 $v \in M$, 向量空间 $U(\mathfrak{n}^+)v$ 有限维。

这些模及它们之间的全部模同态组成的全子范畴, 称为**范畴 $\mathcal{O}$** (category $\mathcal{O}$)。第三条称 $\mathfrak{n}^+$ 的作用**局部有限** (locally finite)。

正根方向的局部有限性有独立的作用。例如取 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, 标准基为 e, f, h , 并固定 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ 。在 $W = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}v_j$ 上规定

$$hv_j = (z - 2j)v_j, \quad fv_j = v_{j+1}, \quad ev_j = j(z - j + 1)v_{j-1}.$$

前两条括号关系由权的升降直接得到, 而

$$(ef - fe)v_j = ((j+1)(z-j) - j(z-j+1))v_j = (z-2j)v_j = hv_j,$$

所以这确为一个模。它由 v_{-1} 生成, 每个权空间一维, 却有

$$e^r v_{-1} = (-1)^r r! \prod_{s=1}^r (z+s+1) v_{-r-1} \neq 0 \quad (r \geq 1).$$

这些向量的权互不相同, 故 $U(\mathfrak{n}^+)v_{-1}$ 无限维。这个模满足前两条定义条件, 但不属于 $\mathcal{O}$; 其权向上没有界。

命题 20.1.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及简单根 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 令 $\mathcal{O}$ 为相应的范畴 $\mathcal{O}$, $Q_+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0} \alpha_i$ 。设 $M \in \mathcal{O}$, 记 M_μ 为权 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 的空间, $\text{wt } M$ 为全部非零权空间的权集合。则每个 M_μ 有限维, 且存在有限集 $F \subset \mathfrak{h}^*$, 使

$$\text{wt } M \subseteq \bigcup_{\nu \in F} (\nu - Q_+).$$

若 $M \neq 0$, 它含有一个非零最高权向量。

证明. 把一组有限生成元分别拆成有限个权分量, 得到有限个权生成元 v_j 。每个 $U(\mathfrak{n}^+)v_j$ 有限维, 而且由权向量生成, 故被 $\mathfrak{h}$ 保持。因此 $E = \sum_j U(\mathfrak{b})v_j = \sum_j U(\mathfrak{n}^+)v_j$ 是有限维 $\mathfrak{b}$ 子模。PBW 给出 $M = U(\mathfrak{n}^-)E$ 。取 E 的权集为 F , 即得权集包含式。

对固定 μ , 每个 $\nu \in F$ 所贡献的负根单项式满足 $\sum_{\alpha > 0} a_\alpha \alpha = \nu - \mu$ 。右端若不在 Q_+ , 没有贡献; 若在 Q_+ , 所有 a_α 之和至多为其高度, 故只有有限种可能。 E_ν 也有限维, 所以 M_μ 有限维。

任取实际出现的权 μ 。处在 $\mu + Q_+$ 中的权只有有限多个: 对每个 $\nu \in F$, 若 $\mu + \beta = \nu - \gamma$, 则 $\beta, \gamma \in Q_+$ 且 $\beta + \gamma = \nu - \mu$, 高度受到固定上界约束。取这些权中的极大者 η , 则全部正根向量都零化 M_η 。任意非零 $v \in M_\eta$ 就是所需向量。□

局部有限不表示整个模有限维。对 $\mathfrak{sl}_2$, Verma 模的 f 方向无限延伸, 而 e 反复作用于任一向量最终为零。另一方面, 去掉有限生成条件后, $\bigoplus_{j \geq 0} \mathbb{C}$ 虽有权分解且正根作用为零, 零权空间却无限维。

20.1.2 Verma 模与简单模

命题 20.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 和正根集合, 令 $\mathcal{O}$ 为相应的范畴 $\mathcal{O}$ 。对 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 记 $M(\lambda)$ 为最高权 λ 的 Verma 模, $L(\lambda)$ 为其唯一简单商。则这两个模都属于 $\mathcal{O}$, 而 $\mathcal{O}$ 的所有简单对象恰为这些 $L(\lambda)$, 参数 λ 不重复。

证明. 由命题 18.3.2, $M(\lambda)$ 是循环权模, 权在 $\lambda - Q_+$ 中且权空间有限维。对权为 $\lambda - \beta$ 的向量, 正根方向只能升到 $\lambda - \beta + \gamma \leq \lambda$, 其中 $\gamma \in Q_+$ 的高度至多为 β 的高度; 只有有限个这样的权。因此其 $U(\mathfrak{n}^+)$ 轨道有限维。一般向量只有有限个权分量, 结论仍成立。商模 $L(\lambda)$ 继承三个条件。

若 S 是 $\mathcal{O}$ 中的简单对象, 命题 20.1.2 给出最高权向量 v 。子模 $U(\mathfrak{g})v$ 本身是最高权模, 满足 $\mathcal{O}$ 的条件, 所以简单性使它等于 S 。于是 Verma 泛性质和定理 18.3.3 给出 $S \cong L(\lambda)$, 并保证参数唯一。 $\square$

这里的分类允许任意复最高权。有限维简单模只占其中的支配整权部分。对于 $\mathfrak{sl}_2$, (18.4)说明: 当 $z \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 时, $M(z)$ 已经简单; 当 $z = m \geq 0$ 为整数时, $f^{m+1}v$ 生成它的唯一非零真子模。这一变化不能由有限维完全可约性解释, 因为 Verma 模从来不是有限维模。

20.1.3 交换范畴基本概念回顾

一个范畴中的核与余核必须仍处在该范畴内, 才可以在其中讨论正合列。包络代数的 Noether 性¹保证有限生成模的子模仍有限生成; 下面先证明这一点, 再与 $\mathcal{O}$ 的情形比较。

引理 20.1.4. 若 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数, 则 $U(\mathfrak{g})$ 左、右 Noether。因此有限生成 $U(\mathfrak{g})$ 模的每个子模仍有限生成。

证明. PBW 给出 $\text{gr } U(\mathfrak{g}) \cong \text{Sym}(\mathfrak{g})$, 后者为有限个变量的多项式环, 由 Hilbert 基定理 Noether。对左理想 I 取诱导滤过, 其主符号构成分次理想 $\text{gr } I$ 。选择有限个齐次生成元, 并在 I 中提升为 $u_1, \dots, u_s$ 。任取 $u \in I$, 先用 u_i 的左倍数消去最高次主符号, 所得差次数严格下降; 按次数归纳可把 u 写成这些 u_i 的左线性组合。因此左理想有限生成。右侧同理。最后对有限秩自由模的秩归纳, 再把一般有限生成模表示为自由模的商, 即得子模结论。 $\square$

命题 20.1.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数及正根集合, 令 $\mathcal{O}$ 为相应的范畴 $\mathcal{O}$ 。则 $\mathcal{O}$ 是交换范畴, 核、余核、有限直和以及像均按通常的 $U(\mathfrak{g})$ 模构造。

证明. 若 $f: M \rightarrow N$ 是模同态, 核与商继承权分解: 对一个向量的有限个权分量, 选 $h \in \mathfrak{h}$ 区分这些权, 再用 h 的插值多项式提取各分量, 故子模也按权分解。局部 $\mathfrak{n}^+$ 有

¹诺特 (Amalie Emmy Noether, 1882-1935), 德国数学家, 发展抽象代数中的理想理论, 并证明对称性与守恒律的联系。

限性对子模和商显然保持；有限生成性对商保持，对核由引理 20.1.4 保持。有限直和也满足三个条件。于是模范畴中的核、余核都在 $\mathcal{O}$ 内，且余像到像的自然映射仍为同构，这正是交换范畴的判据。□

不能据此断言它在全部 $U(\mathfrak{g})$ 模中对任意扩张封闭。例如令 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$ ，在二维 $\mathfrak{b}$ 模 E 上令 $e = 0, h = \lambda I + N$ ，其中 $N \neq 0, N^2 = 0$ 。诱导模 $U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{b})} E$ 是两个 $M(\lambda)$ 的扩张；诱导正合性来自 PBW 的右自由性。但其中 h 不是半单算子，所以中间项不在 $\mathcal{O}$ 。讨论 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}$ 时，允许的中间对象也必须属于 $\mathcal{O}$ 。

20.2 中心作用

Casimir 元在最高权模上给出一个标量，但不同最高权可能给出同一标量。中心的全部元素可以同时测量一个模，不过仍不能区分所有简单最高权模。本节将这种限制具体算出。

20.2.1 无穷小特征标

定义 20.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 是复 Lie 代数， $Z = Z(U(\mathfrak{g}))$ ， $M \neq 0$ 是左 $U(\mathfrak{g})$ 模。若存在含么代数同态 $\chi : Z \rightarrow \mathbb{C}$ ，使 $zm = \chi(z)m$ 对所有 $z \in Z, m \in M$ 成立，则称 M 具有**无穷小特征标** (infinitesimal character) χ 。这里所说的是包络代数中心的特征标，与群上取矩阵迹的特征标不同。

命题 20.2.2. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 和正根集合， $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。每个最高权为 λ 的非零左 $\mathfrak{g}$ 模 M 都有无穷小特征标，即包络代数中心 $Z(U(\mathfrak{g}))$ 在 M 上按一个含么代数同态 $\chi_\lambda : Z(U(\mathfrak{g})) \rightarrow \mathbb{C}$ 作用。这个同态只依赖 λ ，所有同一最高权的非零商模具有同一个 χ_λ 。

证明. 设 v 为最高权生成元。中心元 z 与 Cartan 子代数交换，所以保持一维空间 $M_\lambda = \mathbb{C}v$ ，从而 $zv = \chi_\lambda(z)v$ 。对 $u \in U(\mathfrak{g})$ ，有 $zuv = uzv = \chi_\lambda(z)uv$ ，故这个标量作用于全模。和、积及单位元在 v 上的作用说明 χ_λ 是含么代数同态。最后每个最高权模都是 $M(\lambda)$ 的商，故标量与所选商无关。□

这个论证利用最高权空间的一维性及其生成全模的性质，无须将有限维 Schur 引理推广到无限维模。

20.2.2 包络代数的中心

固定三角分解。PBW 将包络代数写成有序负根、Cartan、正根单项式的线性组合。保留没有正负根因子的单项式，得到线性投影

$$\text{pr} : U(\mathfrak{g}) \longrightarrow U(\mathfrak{h}) = \text{Sym}(\mathfrak{h}).$$

对中心元 z ，它的伴随 Cartan 权为零。含正根因子的项零化最高权向量；只含非零负根因子的项不可能有权零。因此

$$\chi_\lambda(z) = \text{pr}(z)(\lambda). \quad (20.1)$$

投影 pr 在整个 $U(\mathfrak{g})$ 上不是代数同态,但在中心上的乘法性由这个标量公式推出:两个多项式在全部 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 上相同,就确实相等。

定理 20.2.3. 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, 取基 e, f, h , 满足 $[h, e] = 2e$, $[h, f] = -2f$, $[e, f] = h$, 并记 C 为 Killing 型对应的 Casimir 元。令

$$\Omega = h^2 + 2h + 4fe = 8C.$$

则 $Z(U(\mathfrak{g})) = \mathbb{C}[\Omega]$ 。在最高权为 $z \in \mathbb{C}$ 的模上, Ω 作用为 $z(z+2)$ 。

证明. $\Omega = 8C$ 的中心性来自命题 18.1.1 和 (18.3), 作用标量由最高向量直接算得。现在证明没有遗漏其他中心元。

若 u 是非零中心元, 取 PBW 滤过中的最高次主符号 $p \in \mathbb{C}[e, f, h]$ 。对每个 $x \in \mathfrak{g}$, $[x, u] = 0$ 使 $\text{ad } x$ 零化 p 。由 h 的权, p 中 e, f 次数相等, 所以 $p = F(t, h)$, $t = ef$ 。再用 $\text{ad } e$, 得到

$$0 = e \left(h \frac{\partial F}{\partial t} - 2 \frac{\partial F}{\partial h} \right).$$

多项式环无零因子, 故括号为零。换元 $q = h^2 + 4t$, 则 $\mathbb{C}[t, h] = \mathbb{C}[q, h]$, 上述导子在新坐标中就是 $-2\partial/\partial h$ 。因此 $p \in \mathbb{C}[q]$ 。由于 p 齐次且 q 次数为二, 必有 $p = aq^r$ 。 Ω 的主符号正是 q , 于是 $u - a\Omega^r$ 仍中心, 且滤过次数严格下降。归纳至常数, 得到 $u \in \mathbb{C}[\Omega]$ 。不同幂的主符号次数不同, 也说明 Ω 没有多项式关系。 $\square$

因此 $\mathfrak{sl}_2$ 的两个最高权给出相同无穷小特征标, 当且仅当

$$z(z+2) = w(w+2), \quad w = z \text{ 或 } w = -z-2.$$

例如 $L(0)$ 与无限维简单模 $L(-2) = M(-2)$ 有同一中心特征标, 却不同构。中心参数识别的是一个有限反射群轨道, 而不是单个最高权。

20.2.3 Harish–Chandra 同构的标准形式

令 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha > 0} \alpha$, 在 $\mathfrak{h}^*$ 上定义移位作用

$$w \cdot \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho.$$

这确为群作用, 因为先平移 ρ 、作通常 Weyl 作用、再平移回来。引入 ρ 是为了把刚才的 $z \mapsto -z-2$ 化成关于原点的反射: $z+1 \mapsto -(z+1)$ 。

定理 20.2.4 (Harish–Chandra 同构). 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 和正根集合 Φ^+ , W 为相应 Weyl 群, $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$ 。记 $\text{pr} : U(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{h}) = \text{Sym}(\mathfrak{h})$ 为 PBW 三角分解中保留纯 Cartan 项的线性投影, 把 $\text{Sym}(\mathfrak{h})$ 识别为 $\mathfrak{h}^*$ 上的多项式函数, W 按其自作用作用于这些函数。则映射

$$\gamma : Z(U(\mathfrak{g})) \longrightarrow \text{Sym}(\mathfrak{h})^W, \quad \gamma(z)(\mu) = \text{pr}(z)(\mu - \rho)$$

是代数同构。对 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 记 χ_λ 为最高权 λ 的 Verma 模的无穷小特征标。则对任意中心元 z , 有 $\chi_\lambda(z) = \gamma(z)(\lambda + \rho)$ 。对 $\lambda, \nu \in \mathfrak{h}^*$, $\chi_\lambda = \chi_\nu$ 当且仅当 $\nu = w \cdot \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho$ 对某个 $w \in W$ 成立。

证明概要. 前面已经由最高权向量的作用证明 pr 在中心上是代数同态, 且 $\chi_\lambda(z) = \text{pr}(z)(\lambda)$. 先核对平移后的 W 不变性. 对支配整权 λ 及简单反射 s_α , Verma 模 $M(\lambda)$ 含有最高权为 $s_\alpha \cdot \lambda$ 的子模; 同一个中心元在母模和子模上作用的标量相同, 故

$$\text{pr}(z)(\lambda) = \text{pr}(z)(s_\alpha \cdot \lambda).$$

支配整权在 $\mathfrak{h}^*$ 中 Zariski 稠密, 而两端都是关于 λ 的多项式, 所以等式对全部权成立. 每个简单反射都满足这一式, 故 $\gamma(z)$ 属于 $\text{Sym}(\mathfrak{h})^W$.

再给包络代数和对称代数取次数滤过. PBW 对称化在每一层的主符号上是恒等, 且与伴随 $\mathfrak{g}$ 作用相容, 因此中心的分次向量空间与 $\text{Sym}(\mathfrak{g})^{\mathfrak{g}}$ 相应. 若 z 的最高次符号是 p , 投影到 Cartan 部分后, $\gamma(z)$ 的最高次项正是 p 在 $\mathfrak{h}^*$ 上的限制: PBW 重排产生的交换子以及平移 ρ 都只改变较低次数项. Chevalley 限制定理给出

$$\text{Sym}(\mathfrak{g})^{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\sim} \text{Sym}(\mathfrak{h})^W.$$

这里可以用已经建立的有限维最高权表示说明限制同构. 用 Killing 型识别 Lie 代数及其对偶. 若一个伴随不变多项式在 $\mathfrak{h}$ 上为零, 它在 $\mathfrak{h}$ 的全部幂零伴随指数像上也为零; 定理 16.1.5 证明中的开像计算说明这些像含有非空 Zariski 开集, 因此原多项式为零, 得到单射.

为证满射, 记 $P \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为整权格. 对每个次数 m , $\text{Sym}^m(\mathfrak{h}^*)$ 由 ν^m , $\nu \in P$, 线性生成: 若一个线性泛函在这些幂上全为零, 它在权坐标中的相应多项式就在整数格上恒为零, 逐变量使用无限多个整数根便知该多项式为零. 再对 W 平均, 便知不变部分由轨道和 $\sum_{\nu \in W\lambda} \nu^m$ 生成.

支配整权 λ 的简单模特征标具有三角展开

$$\text{ch } L(\lambda) = \sum_{\nu \in W\lambda} e^\nu + \sum_{\mu < \lambda} a_{\lambda\mu} \sum_{\nu \in W\mu} e^\nu,$$

其中 μ 支配且 $\lambda - \mu$ 是简单根的非负整数组组合. 低于固定 λ 的支配权有限: 正定根内积给出 $\|\mu\| \leq \|\lambda\|$, 而权格离散. 按这个有限偏序归纳, 每个形式轨道和都是有限维模特征标的线性组合. 在线性映射 $e^\nu \mapsto \nu^m$ 下, 特征标的像恰是 $h \mapsto \text{tr}(\rho(h)^m)$. 它延拓为 $x \mapsto \text{tr}(\rho(x)^m)$, 这是 $\mathfrak{g}$ 上的伴随不变多项式, 因为其沿 $[y, x]$ 的导数是交换子的迹, 等于零. 于是所有所需轨道和均能延拓, 限制映射满射.

故 γ 的伴随分次映射是同构. 对次数归纳, 依次提升最高次不变多项式并减去已提升项, 得到 γ 满射; 若 $\gamma(z) = 0$, 其最高次符号为零, 按次数下降得到 $z = 0$, 故它也单射.

最后, 有限群的两个不同轨道可由不变多项式区分: 先在两条有限轨道上作多项式插值, 使取值分别为零和一, 再对 W 平均. 于是全部中心元在两个最高权模上取相同标量, 恰当 $\lambda + \rho$ 与 $\nu + \rho$ 属于同一 W 轨道. 这里省略了简单反射对应的 Verma 子模构造, 以及 PBW 对称化与伴随作用相容的逐项展开; 限制同构则由上面的稠密性、特征标三角性和迹多项式论证得到. 限制论证可对照 [8, Section 23.1], 滤过比较和移位不变性见 [12, Section 8.8, Theorems 8.50, 8.52 and 8.54]. $\square$

例 20.2.5. 对 $\mathfrak{sl}_3$, 把 $\mathfrak{h}^*$ 写成 $a + b + c = 0$ 的三元组, $W = S_3$ 排列三个坐标。其不变多项式由 $a^2 + b^2 + c^2$ 与 $a^3 + b^3 + c^3$ 生成: 对称多项式基本定理把任一不变式写为初等对称式的多项式, 而第一初等对称式为零, 另外两个分别为

$$-\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2), \quad \frac{1}{3}(a^3 + b^3 + c^3).$$

二次 Casimir 只看到第一个参数, 完整中心还需要三次参数。这里的取值点是 $\lambda + \rho$, 不能漏掉平移。

无穷小特征标也提示了如何分组研究 $\mathcal{O}$ 中的扩张。若中心并非按纯标量作用, 可以要求每个 $z - \chi(z)$ 在每个向量上局部幂零; 这称为广义中心特征标条件。扩张可能保留广义特征标而失去纯标量作用, 因此两个条件不能混写。

20.3 Lie 代数上同调

本节回到第 12.4* 节留下的两个问题: 线性截面怎样修正成 Lie 代数同态, 不同的半单补怎样互相共轭。误差分别满足二阶和一阶余圈恒等式。先建立这些恒等式所属的复形, 再证明消失结果, 最后处理一般可解根中的逐层修正。

20.3.1 Chevalley–Eilenberg 复形

定义 20.3.1. 设 $\mathfrak{a}$ 为复 Lie 代数, M 为左 $\mathfrak{a}$ 模, $q \geq 0$ 为整数。令 $C^q(\mathfrak{a}, M) = \text{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda^q \mathfrak{a}, M)$, 并置 $C^0 = M$ 。定义升次映射

$$\begin{aligned} (d\varphi)(x_0, \dots, x_q) &= \sum_{i=0}^q (-1)^i x_i \cdot \varphi(x_0, \dots, \widehat{x_i}, \dots, x_q) \\ &\quad + \sum_{0 \leq i < j \leq q} (-1)^{i+j} \varphi([x_i, x_j], x_0, \dots, \widehat{x_i}, \dots, \widehat{x_j}, \dots, x_q). \end{aligned}$$

帽号表示删去对应变数。此上链复形称为 **Chevalley–Eilenberg 复形** (Chevalley–Eilenberg complex); 其上同调 $H^q(\mathfrak{a}, M) = \ker d^q / \text{im } d^{q-1}$ 称为 **Lie 代数上同调** (Lie algebra cohomology), 其中约定 $d^{-1} = 0$ 。

命题 20.3.2. 设 $\mathfrak{a}$ 为复 Lie 代数, M 为左 $\mathfrak{a}$ 模, $C^q(\mathfrak{a}, M) = \text{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda^q \mathfrak{a}, M)$, d 为 Chevalley–Eilenberg 微分。则 $d^2 = 0$ 。若 $\mathfrak{a}$ 有限维, 则对每个整数 $q \geq 0$, $C^q(\mathfrak{a}, -)$ 是正合函子; 短正合系数列由此诱导上同调长正合列。

证明. 展开 $d(d\varphi)$ 。两次各取一个作用项时, 每对 $i < j$ 合并为带符号的 $x_i \cdot (x_j \cdot v) - x_j \cdot (x_i \cdot v)$; 先取括号再让该括号作用的项给出相反符号的 $[x_i, x_j] \cdot v$ 。它们由模公理抵消。一次作用与一个不含该变量的括号对应两种先后次序; 删除变量的次序相差一次换位, 符号相反, 故两两抵消。两对互不相交的括号也按交换先后次序两两抵消。剩余项只涉及三个变量, 其内部组合为

$$[[x_i, x_j], x_k] + [[x_j, x_k], x_i] + [[x_k, x_i], x_j],$$

在 φ 的同一位置出现, 外部排列符号相同; Jacobi 恒等式使之为零。这覆盖了展开中的全部项, 故 $d^2 = 0$ 。

域上的线性映射总能沿满射提升, 所以 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(\Lambda^q \mathfrak{a}, -)$ 正合。逐次提升一个余圈、对提升取微分, 再在核中读取结果, 就得到连接同态; 不同提升相差余边, 证明其良定义。核与像的追逐与一般复形的长正合列构造相同。 $\square$

低次数公式值得单独写出:

$$\begin{aligned} (dm)(x) &= x \cdot m, \\ (db)(x, y) &= x \cdot b(y) - y \cdot b(x) - b([x, y]), \\ (dc)(x, y, z) &= x \cdot c(y, z) - y \cdot c(x, z) + z \cdot c(x, y) \\ &\quad - c([x, y], z) + c([x, z], y) - c([y, z], x). \end{aligned}$$

它们与命题 12.4.4 中的截面误差完全一致。

20.3.2 低阶上同调、导子及扩张

由定义, $H^0(\mathfrak{a}, M) = M^{\mathfrak{a}}$, 而 H^1 是满足 $b([x, y]) = x \cdot b(y) - y \cdot b(x)$ 的线性映射模掉 $b(x) = x \cdot m$ 的映射。系数为伴随模 $\mathfrak{a}$ 时, 前者正是导子; 后者等于 $x \mapsto [x, m] = -\mathrm{ad}(m)x$, 所以

$$H^1(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}) \cong \mathrm{Der}(\mathfrak{a}) / \mathrm{ad}(\mathfrak{a}).$$

命题 20.3.3. 设 $\mathfrak{a}$ 为复 Lie 代数, M 为其左模。交换核扩张

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \mathfrak{e} \longrightarrow \mathfrak{a} \longrightarrow 0$$

中诱导的 $\mathfrak{a}$ 作用固定为所给作用, 并且扩张同构要求在 M 和 $\mathfrak{a}$ 上均为恒等。则其同构类与 $H^2(\mathfrak{a}, M)$ 一一对应, 零类对应半直积扩张。

证明. 选商映射 $\pi: \mathfrak{e} \rightarrow \mathfrak{a}$ 的线性截面 s , 令

$$x \cdot m = [s(x), m], \quad c(x, y) = [s(x), s(y)] - s([x, y]).$$

因为核 M 交换, 前式不依赖提升的选择, 且 Jacobi 恒等式使之满足模公理; 这里正取命题要求固定的作用。第二式的像落在 $\ker \pi = M$ 。将它代入 $\mathfrak{e}$ 的 Jacobi 恒等式, 得到

$$\begin{aligned} 0 &= x \cdot c(y, z) - y \cdot c(x, z) + z \cdot c(x, y) \\ &\quad - c([x, y], z) + c([x, z], y) - c([y, z], x) = (dc)(x, y, z). \end{aligned}$$

若 $s' = s + b$, $b: \mathfrak{a} \rightarrow M$ 线性, 则展开括号并用 $[M, M] = 0$, 有

$$c'(x, y) - c(x, y) = x \cdot b(y) - y \cdot b(x) - b([x, y]) = (db)(x, y).$$

这些正是命题 12.4.4 中的截面障碍计算; 该处虽在有限维条件下陈述, 逐项计算并未使用维数限制, 因此同样适用于当前的一般扩张。反过来, 对余圈 c 在 $M \oplus \mathfrak{a}$ 上定义

$$[(m, x), (n, y)] = (x \cdot n - y \cdot m + c(x, y), [x, y]).$$

反对称性成立。涉及两个 M 变量的 Jacobi 式为零; 一个 M 变量的情形正是模公理; 三个 $\mathfrak{a}$ 变量的 M 分量为 dc , 另一个分量为 $\mathfrak{a}$ 的 Jacobi 式。因此这是 Lie 代数。

改变截面等价于改变坐标 $(m, x) \mapsto (m + b(x), x)$, 相应余圈相差 db 。任何在两端为恒等的扩张同构都具有这种坐标形式, 故余圈类相等恰好等价于扩张同构。最后 $c = 0$ 时上述括号是半直积; 一个类为零的扩张可通过改换截面使 $c = 0$ 。□

例如 $\mathfrak{a} = \mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y$ 交换、 $M = \mathbb{C}z$ 平凡时, 所有微分为零, 故 $H^2(\mathfrak{a}, M)$ 一维。取 $c(x, y) = z$, 得到 $[x, y] = z$ 、 z 中心的三维 Heisenberg Lie 代数。这一扩张不分裂, 因为若有交换补, 提升 x, y 后无论加上多少中心分量, 括号仍是 z 。

20.3.3 Whitehead 引理与 Levi 分解

定理 20.3.4 (Whitehead 第一引理). 设 $\mathfrak{s}$ 为有限维复半单 Lie 代数, M 为有限维复 $\mathfrak{s}$ 模。则 $H^1(\mathfrak{s}, M) = 0$ 。

证明. 一阶余圈条件正是引理 18.1.4 中的交叉映射条件。该引理已经用 Killing Casimir 证明存在 $m \in M$ 使 $b(x) = x \cdot m$, 而这里的右端就是 $(dm)(x)$ 。故所有一阶余圈都是余边。引理要求的半单性与有限维性恰为当前假设。□

第二引理还需要把 Casimir 修正推广到更高阶。下面给出可直接检验的链同伦公式; 它同时说明非平凡简单系数与平凡系数为什么应分别处理。

引理 20.3.5. 设 $\mathfrak{s}$ 为有限维复半单 Lie 代数, M 为左 $\mathfrak{s}$ 模, (x_i) 和 (x^i) 为 $\mathfrak{s}$ 的两组 Killing 对偶基。记 $C^q(\mathfrak{s}, M) = \text{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda^q \mathfrak{s}, M)$, d 为 Chevalley–Eilenberg 微分, $C_M : m \mapsto \sum_i x_i \cdot (x^i \cdot m)$ 为 Killing Casimir 在 M 上的作用。对整数 $q \geq 1$, 在 $C^q(\mathfrak{s}, M)$ 上定义

$$(H\varphi)(y_1, \dots, y_{q-1}) = \sum_i x_i \cdot \varphi(x^i, y_1, \dots, y_{q-1}),$$

且 $H = 0$ 于次数零。则 $dH + Hd = C_M$, 其中右边只让 Killing Casimir 作用于 φ 的取值。若 C_M 可逆, 则所有 $H^q(\mathfrak{s}, M)$ 均为零。

证明. 用 R_x 表示只对取值施加 x 作用, 用 i_x 表示在交错形式第一个变量插入 x 。若 a_j 是任意基, ϵ^j 表示与其对偶线性形式作外乘, 则直接把微分的作用项和括号项分开, 得到

$$\begin{aligned} dR_x - R_x d &= \sum_j \epsilon^j R_{[a_j, x]}, \\ di_x + i_x d &= L_x = R_x - \sum_j \epsilon^j i_{[x, a_j]}. \end{aligned}$$

第二式的右边在 q 个变量上就是 $x \cdot \varphi(y_1, \dots, y_q) - \sum_r \varphi(y_1, \dots, [x, y_r], \dots, y_q)$: 微分中未涉及插入变量的项因插入位置移动而抵消, 留下这一式。

因为 $H = \sum_i R_{x_i} i_{x^i}$, 代入上面两式得到

$$\begin{aligned} dH + Hd &= \sum_i R_{x_i} R_{x^i} \\ &\quad + \sum_{i,j} \epsilon^j (R_{[a_j, x_i]} i_{x^i} + R_{x_i} i_{[a_j, x^i]}). \end{aligned}$$

第二行由(18.2)为零, 第一行就是 C_M 。 C_M 为模自同态, 因而与 d 交换。若 $d\varphi = 0$ 且 C_M 可逆, 则 $\varphi = d(C_M^{-1}H\varphi)$, 即每个余圈都是余边。□

定理 20.3.6 (Whitehead 第二引理). 设 $\mathfrak{s}$ 为有限维复半单 Lie 代数, M 为有限维复 $\mathfrak{s}$ 模。则 $H^2(\mathfrak{s}, M) = 0$ 。

证明. 由定理 18.1.5, M 是有限个简单模的直和; 上同调与这一有限直和相容。非平凡简单分量上的 Killing Casimir 是非零标量, 由引理 18.1.2 和引理 20.3.5, 这些分量的二阶上同调为零。因此只需处理平凡系数 $\mathbb{C}$ 。 $\mathfrak{s} = 0$ 时结论直接成立, 以下允许用非退化 Killing 型 B 。

取交错 2-余圈 $\omega: \Lambda^2 \mathfrak{s} \rightarrow \mathbb{C}$ 。由 B 非退化, 存在唯一线性算子 D 满足 $B(Dx, y) = \omega(x, y)$ 。交错性说明 D 关于 B 斜对称。平凡系数的余圈式给出

$$\omega([x, y], z) = \omega(x, [y, z]) + \omega(y, [z, x]).$$

结合 Killing 型的不变性, 右边等于 $B([Dx, y], z) + B([x, Dy], z)$ 。非退化性因此给出 $D[x, y] = [Dx, y] + [x, Dy]$, 即 D 是导子。

将定理 20.3.4 用于有限维伴随模 $\mathfrak{s}$, 得所有导子都是内导子。于是 $D = \text{ad } a$ 对某个 $a \in \mathfrak{s}$ 成立。令线性形式 $b(x) = -B(a, x)$, 则平凡系数时

$$(db)(x, y) = -b([x, y]) = B(a, [x, y]) = B([a, x], y) = \omega(x, y).$$

故平凡系数的每个 2-余圈也是余边, 完成证明。 $\square$

这两个结果合称 **Whitehead 引理 (Whitehead lemmas)**。它们不声称半单 Lie 代数在任意次数、任意系数下的上同调都消失; 例如平凡系数的三阶上同调可以非零。有限维假设也不能从上述 Casimir 分解中删除。

定理 20.3.7 (Levi-Malcev 定理). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复 Lie 代数, $\mathfrak{r} = \text{rad } \mathfrak{g}$ 。则存在半单子代数 $\mathfrak{s}$, 使 $\mathfrak{g} = \mathfrak{r} \rtimes \mathfrak{s}$ 。任意两个这样的子代数可由若干 $\exp(\text{ad } z)$ 、 $z \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 的有限乘积互相变换; 这些指数均为有限多项式。

证明. 先证存在性, 对 $\dim \mathfrak{r}$ 归纳。若 $\mathfrak{r} = 0$, 取 $\mathfrak{s} = \mathfrak{g}$ 。否则取 $\mathfrak{r}$ 导出列的最后一个非零项 A 。它是非零交换理想; 导出列各项被保持 $\mathfrak{r}$ 的导子保持, 故 A 也是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

由命题 12.3.6, $\mathfrak{g}/A$ 的可解根为 $\mathfrak{r}/A$ 。归纳假设给出该商中的 Levi 子代数 $\bar{\mathfrak{s}}$ 。设 $\mathfrak{e}$ 是其在 $\mathfrak{g}$ 中的逆像, 则

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \mathfrak{e} \longrightarrow \bar{\mathfrak{s}} \longrightarrow 0$$

有交换核。商通过括号在 A 上作用, 与提升选择无关。由定理 20.3.6, 这个扩张的二阶类为零; 命题 20.3.3 便给出 Lie 代数截面。其像 $\mathfrak{s}$ 同构于 $\bar{\mathfrak{s}}$, 所以半单。商中 $\bar{\mathfrak{s}}$ 与 $\mathfrak{r}/A$ 相交为零, 且截面像与 A 相交为零, 故 $\mathfrak{s} \cap \mathfrak{r} = 0$ 。维数或满射到 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 又给出 $\mathfrak{g} = \mathfrak{r} + \mathfrak{s}$ 。

再证共轭性, 同样对 $\dim \mathfrak{r}$ 归纳。取两个 Levi 子代数 $\mathfrak{s}_1, \mathfrak{s}_2$; 在上述商 $\mathfrak{g}/A$ 中, 它们的像都是 Levi 子代数。归纳假设把两个像用若干指数共轭起来。商中的每个共轭元属于 $[\mathfrak{g}/A, \mathfrak{r}/A]$, 可提升为 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 中的元素。由命题 12.3.5 的证明, 这些元素在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随算子都幂零, 所以提升后的指数是良定义的同构, 并诱导原商中的指数。对 $\mathfrak{s}_1$ 先施加这些自同构后, 可以假定二者在商中有相同的像。

于是它们都位于同一个子代数 $\mathfrak{e} = \mathfrak{s}_1 + A$ 中, 并且都与 A 互补。以 $\mathfrak{s}_1$ 为基准, $\mathfrak{s}_2$ 写成图

$$\{x + b(x) \mid x \in \mathfrak{s}_1\}, \quad b: \mathfrak{s}_1 \longrightarrow A.$$

A 交换使子代数条件化为 $b([x, y]) = x \cdot b(y) - y \cdot b(x)$ 。由第一引理, $b(x) = x \cdot m$ 对某个 $m \in A$ 成立。

还须保证共轭元处在定理要求的 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 中。由 Weyl 完全可约性, 有限维 $\mathfrak{s}_1$ 模 A 分解为平凡部分与非平凡简单部分之和, 后者恰为 $[\mathfrak{s}_1, A]$ 。把 m 的平凡分量删去不改变 b , 故可取 $m \in [\mathfrak{s}_1, A] \subseteq [\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 。由于 $[m, \mathfrak{g}] \subseteq A$ 且 $[m, A] = 0$, 有 $(\text{ad } m)^2 = 0$ 。因而

$$\exp(-\text{ad } m)x = x - [m, x] = x + x \cdot m = x + b(x),$$

这个最后的指数把 $\mathfrak{s}_1$ 送到 $\mathfrak{s}_2$ 。连同已经提升的有限个指数, 得到一般共轭性。存在性和共轭性的每次归纳都严格降低可解根维数, 故过程终止。□

这就证明了定理 12.4.3。二阶上同调消失使每一层交换核的扩张分裂, 一阶上同调消失给出同一层中两个补的共轭; 沿可解根归纳, 便得到任意有限维复 Lie 代数的 Levi 分解与共轭性。

20.4 BGG 方法

取最高权模的简单商时, 要商去较低最高权生成的子模。若出现多个这样的子模, 还须考虑它们的交及相互关系。BGG 消解通过一个正合复形逐次描述这些关系。

20.4.1 BGG 消解的典型版本

定理 20.4.1 (BGG 消解). 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及正根集合 Φ^+ , $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 为相应的支配整权, W 为 Weyl 群, $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$ 。记 $M(\mu)$ 为最高权 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 的 Verma 模, $L(\mu)$ 为其唯一简单商, $\ell(w)$ 为 $w \in W$ 的简单反射长度, w_0 为最长元, $N = \ell(w_0)$ 。对 $0 \leq j \leq N$, 记

$$D_j = \bigoplus_{\ell(w)=j} M(w \cdot \lambda), \quad w \cdot \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho.$$

可以选择模同态 $D_j \rightarrow D_{j-1}$, 使

$$0 \rightarrow D_N \rightarrow \cdots \rightarrow D_1 \rightarrow D_0 \rightarrow L(\lambda) \rightarrow 0$$

正合。它称为 **BGG 消解** (Bernstein–Gelfand–Gelfand resolution)。

证明概要. 先取 $\lambda = 0$ 。令 $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$, 以 $\mathfrak{b}$ 的伴随作用把 $\mathfrak{g}/\mathfrak{b}$ 看成 $\mathfrak{b}$ 模。考虑相对 Chevalley–Eilenberg 复形的各项

$$E_j = U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{b})} \bigwedge^j (\mathfrak{g}/\mathfrak{b}), \quad 0 \leq j \leq N.$$

删去一个外幂因子的作用项与两两括号项组成微分, Jacobi 恒等式使相邻微分复合为零。PBW 分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{b}$ 将此复形作为向量空间识别为 $\mathfrak{n}_-$ 的标准消解; 给 $U(\mathfrak{n}_-)$ 取 PBW 滤过后, 其分次复形是对称代数的 Koszul 消解, 所以除了末端的平凡模外没有同调。

这些 E_j 暂时只是具有 Verma 滤过的模。将复形投影到含平凡模的中心特征标分块, 仍保持正合。 $\bigwedge^j(\mathfrak{g}/\mathfrak{b})$ 的权是 j 个不同负根的和; 其中与零权处于同一移位 W 轨道的, 恰为 $w \cdot 0 = w\rho - \rho$, $\ell(w) = j$, 各出现一次。故分块后的第 j 项具有每个 $M(w \cdot 0)$ 恰一次的 Verma 滤过。同一长度的不同 w 互不处于严格 Bruhat 比较关系, Verma 模间相应的 Ext^1 消失, 于是这个滤过分裂, 得到定理所要求的直和项。

一般支配整权 λ 可从这一复形出发, 先逐项张量有限维模 $L(\lambda)$, 再投影到 λ 的中心特征标分块。这两步均正合, 末端变为 $L(\lambda)$ 。逐项的 Verma 滤过中, 每个 $w \cdot \lambda$ 恰出现一次, 其他权落在别的分块; 同样的 Ext^1 消失给出 D_j 的直和形式。所得微分由相对复形的微分诱导, 因而满足 $d_{j-1}d_j = 0$, 并保持正合。

这里省略了相对微分的良定义及滤过消解核验、外幂权的唯一性引理、Verma 扩张消失, 以及张量后分块中没有额外因子的权计算; 这些步骤分别保证复形存在、正合与每项恰为所写直和。关于 Verma 模的扩张与消解方法, 可进一步参阅 [10, Chapter 6]。[12, Section 8.4, Theorem 8.30] 给出了同一定理的陈述, 但未展开证明。□

下面在秩一情形给出具体映射, 并直接证明正合性。

命题 20.4.2. 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 记 $M(\mu)$ 为 $\mathfrak{g}$ 的最高权 μ 的 Verma 模, L_m 为最高权 m 、维数 $m+1$ 的不可约 $\mathfrak{g}$ 模。令 v, u 分别为 $M(m), M(-m-2)$ 的非零最高权生成元, $f = E_{21}$, 其中 E_{21} 为矩阵单位。则下式给出一个不分裂的短正合列, ι 按所有整数 $j \geq 0$ 时的公式定义:

$$0 \longrightarrow M(-m-2) \xrightarrow{\iota} M(m) \longrightarrow L_m \longrightarrow 0, \quad \iota(f^j u) = f^{j+m+1} v,$$

证明. 向量 $f^{m+1}v$ 的权为 $-m-2$, 且 $ef^{m+1}v = (m+1)(m-m)f^m v = 0$ 。Verma 泛性质给出 ι ; PBW 基表明所有 $f^{j+m+1}v$ 线性无关, 所以 ι 单射。商模以 $v, fv, \dots, f^m v$ 为基, e, f, h 的作用正是有限维简单模 L_m 的标准公式, 故商为 L_m 。

若正合列分裂, 商中最高向量的像必须是 $M(m)$ 中权 m 的向量, 因此是 v 的非零倍数。这个向量生成整个 $M(m)$, 却在 L_m 中应被 f^{m+1} 零化, 矛盾。因此它不分裂。□

在一般消解中, 逐权取维数仍合法, 因为每个权空间有限维。欧拉交错和给出

$$\text{ch } L(\lambda) = \sum_{w \in W} (-1)^{\ell(w)} \text{ch } M(w \cdot \lambda).$$

再用 PBW 的 $\text{ch } M(\mu) = e^\mu \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})^{-1}$, 即可恢复 Weyl 公式。这个推导从 BGG 消解解释前章的公式。

20.4.2 Ext 与最高权范畴

定义 20.4.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数, 固定 Cartan 子代数及正根集合, 令 $\mathcal{O}$ 为相应的范畴 $\mathcal{O}$, $M, N \in \mathcal{O}$ 。中间项 E 也在 $\mathcal{O}$ 内的短正合列 $0 \rightarrow N \rightarrow E \rightarrow M \rightarrow 0$, 按在两端为恒等的交换图取等价类, 并用拉回、推出定义 Baer 加法, 所得群记作 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(M, N)$ 。零类恰为分裂列。

命题 20.4.2 因此给出 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(L_m, M(-m-2)) \neq 0$ 。这里不能把 BGG 消解误称为投射消解：它的各项是 Verma 模，而 Verma 模并非都投射。

例 20.4.4. 在 $M(m)$ 的每个一维权空间上取对偶，令 φ_j 与 $f^j v$ 对偶，取其代数直和 $DM(m) = \bigoplus_{j \geq 0} \mathbb{C}\varphi_j$ 。以交换 e, f 、固定 h 的反自同构定义对偶作用，便有

$$h\varphi_j = (m-2j)\varphi_j, \quad e\varphi_j = \varphi_{j-1}, \quad f\varphi_j = (j+1)(m-j)\varphi_{j+1},$$

其中 $\varphi_{-1} = 0$ 。这些公式也可以直接验证三个 $\mathfrak{sl}_2$ 括号。若 $m \geq 0$ ，前 $m+1$ 个向量生成子模 L_m ；商的最高权为 $-m-2$ ，后续 f 作用均非零，故经逐项缩放基后商同构于 $M(-m-2)$ 。中间模由 φ_{m+1} 生成，具有有限维权空间且 e 局部幂零，所以属于 $\mathcal{O}$ 。得到

$$0 \rightarrow L_m \rightarrow DM(m) \rightarrow M(-m-2) \rightarrow 0.$$

该列不分裂：商的最高向量只有 φ_{m+1} 的标量倍提升能保持权，而 $e\varphi_{m+1} = \varphi_m \neq 0$ 。于是 $M(-m-2)$ 不是 $\mathcal{O}$ 中的投射对象。

最高权范畴把简单模、标准模和投射模放在同一个偏序下。一个常用的有限版本如下：设有限长度的 $\mathbb{C}$ 线性交换范畴具有有限维同态空间，有有限多个简单对象 $L(\lambda)$ ，由有限偏序集标记，并有投射覆盖 $P(\lambda)$ 。若可选择标准对象 $\Delta(\lambda)$ ，使其顶为 $L(\lambda)$ 、其余合成因子参数严格小于 λ ，且 $\text{End } \Delta(\lambda) = \mathbb{C}$ ，同时 $P(\lambda) \twoheadrightarrow \Delta(\lambda)$ 的核有参数严格大于 λ 的标准对象滤过，就得到一种**最高权范畴** (highest weight category) 结构。这个定义还要求投射覆盖与上述滤过确实存在；简单模有最高权本身并不足以推出这些条件。

可以直接看见投射性如何依赖范畴范围。对 $\mathfrak{sl}_2$ ，在权只允许为 $m, m-2, m-4, \dots$ 的 $\mathcal{O}$ 全子范畴中，

$$\text{Hom}(M(m), N) \cong N_m.$$

因为 N 中没有权 $m+2$ ，任何权 m 的向量都被 e 零化，Verma 泛性质便给出这个同构。取一个固定权空间是正合函子，故 $M(m)$ 在这个受限范畴中投射。这个计算与上面的非投射例并不矛盾：投射性的判断始终包含允许哪些对象这一条件。

一般 $\mathcal{O}$ 的分块与最高权结构还需要有限长度、投射覆盖和标准滤过理论，本节暂不展开。计算高阶 Ext 时，应使用相应范畴中的投射或内射消解，或先证明替代消解的各项相对于目标函子为零调对象。BGG 消解的正合性本身尚不足以说明对它施加 Hom 就能计算 Ext。

20.4.3 几何表示论所需的进一步工具

几何方法从旗簇上的局部对象构造表示。在 $\mathfrak{sl}_2$ 情形，旗簇就是 $\mathbb{P}^1$ 。次数为 $m \geq 0$ 的齐次多项式是线丛 $\mathcal{O}(m)$ 的整体截面，而算子

$$e = X \frac{\partial}{\partial Y}, \quad f = Y \frac{\partial}{\partial X}, \quad h = X \frac{\partial}{\partial X} - Y \frac{\partial}{\partial Y}$$

使它成为 L_m 。在坐标 $z = Y/X$ 下，这些算子变成 $e = \partial_z, h = m - 2z\partial_z, f = mz - z^2\partial_z$ 。附录 C 将从坐标变换核验这些局部微分算子以及相应中心关系。

高维旗簇的 Schubert 分解²按 Weyl 群编号, 但胞腔闭包可能奇异。一般简单模的重数问题因而需要层的导出函子、交叉上同调和微分算子模等工具; 光滑胞腔与其可能奇异的闭包也须区分。关于 BGG 与旗簇、几何表示的关系, 可参见 [12, Section 8.4 and Further reading, Geometric representation theory]。这些几何方法进一步研究表示的构造与重数。

本章小结

范畴 $\mathcal{O}$ 的有限生成性和正根局部有限性, 结合 PBW, 控制了权集的上界及各权空间维数。最高权简单模仍由所有复最高权参数化, 但中心特征标只能记录移位 Weyl 轨道; $\mathfrak{sl}_2$ 中这一差别由 $z(z+2)$ 的二次对称性直接表现。

一阶上同调衡量交叉映射是否可消去, 二阶上同调衡量交换核扩张是否分裂。Casimir 链同伦与 Killing 型给出 Whitehead 消失; 再沿可解根的交换理想归纳, 得到一般 Levi 分解及规定范围内的共轭性。交换核的单步计算是归纳的一层, 并不能单独代替一般定理。

BGG 消解以 Verma 模记录简单模的关系, 它给出形式特征标的交错和, 但不会自动计算任意 Ext。秩一的正向、对偶两个不分裂扩张说明, 无限维最高权模未必完全可约, 有限维半单理论的结论不能直接推广到这里。

习题

习题 20.1*. 在复半单 Lie 代数上令 $M = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbb{C}$ 为平凡模。判断范畴 $\mathcal{O}$ 的各项条件, 并说明哪个有限性结论失败。

解. 它只有权零, 正根在每个向量上作用为零, 故满足权分解和局部有限性。但包络代数对任何向量只产生其一维张成空间, 有限多个生成元只能生成有限维子空间, 所以 M 不有限生成。其零权空间就是整个无限维 M , 说明权空间有限性不能只从后两个条件推出。□

习题 20.2*. 设 $M \in \mathcal{O}$, V 是有限维复半单 Lie 代数模。证明带对角作用的 $M \otimes V$ 仍属于 $\mathcal{O}$ 。

解. 由有限维模的权分解, 张量积按权和分解。对 $m \otimes v$, 其正根轨道包含在 $U(\mathfrak{n}^+)m \otimes V$ 中, 后者有限维; 有限和仍如此。若 $m_1, \dots, m_s$ 生成 M , 取 V 的基 v_j 。这些 $m_i \otimes v_j$ 生成张量积: 按 $u \in U(\mathfrak{g})$ 的次数归纳, 恒等式 $xm \otimes v = x(m \otimes v) - m \otimes xv$ 把第一因子上较长的单项式写成对角作用及较短单项式。因此三个条件均成立。□

习题 20.3*. 证明 $\mathfrak{sl}_2$ 的 $M(1/2)$ 与 $M(-5/2)$ 是不同构的简单模, 但具有相同无穷小特征标。

解. 两个参数都不是非负整数, 因而由 $ef^jv = j(z-j+1)f^{j-1}v$ 可见没有正次数的最高向量; 任一非零子模取极大权就产生最高向量, 所以两模简单。它们最高权不同, 故不同构。两参数的 $z(z+2)$ 同为 $5/4$, 而中心由 Ω 生成, 所以完整中心特征标相同。□

²舒伯特 (Hermann Cäsar Hannibal Schubert, 1848-1911), 德国数学家, 开创了代数几何中的枚举几何研究。

习题 20.4*. 在 $L_1 \otimes L_1$ 上利用 Ω 写出投到对称平方与外平方的投影。

解. 对称平方是 L_2 , 外平方是一维平凡模 L_0 . Ω 在两者上分别作用为 $2(2+2) = 8$ 和零. 因此投影为 $P_{\text{sym}} = \Omega/8$, $P_{\text{alt}} = I - \Omega/8$. 这里 Ω 取张量积对角 Lie 代数作用, 不能把它误写为两个因子上 Ω 的简单和; 其交叉项正是区分两种分量所必需的. $\square$

习题 20.5*. 在 $a+b+c=0$ 中找两点, 其平方和相同, 但立方和不同, 并解释为什么只用二次 Casimir 不足以区分一般中心特征标。

解. 取 $(1, -1, 0)$ 与 $(t, t, -2t)$, $t = 1/\sqrt{3}$. 平方和都是二, 立方和分别为零与 $-6t^3 = -2/\sqrt{3}$. 令两点分别为 $\lambda + \rho$, $\mu + \rho$. Harish-Chandra 同构给出与三次不变多项式对应的中心元, 能够区分它们; 二次 Casimir 对应平方和减去同一常数, 不能区分. $\square$

习题 20.6*. 对 $\mathfrak{sl}_3$ 取 $\rho = (1, 0, -1)$. 列出零权的移位 Weyl 轨道, 并指出其中哪个权支配。

解. 排列 ρ 再减去 ρ , 得到

$$(0, 0, 0), (0, -1, 1), (-1, 1, 0), (-1, -1, 2), (-2, 1, 1), (-2, 0, 2).$$

支配条件是第一坐标不小于第二、第二不小于第三, 故只有零权支配. 六个最高权具有同一中心特征标, 但只有零权对应有限维简单模. $\square$

习题 20.7*. 设 $\mathfrak{a} = \mathbb{C}x$, x 在模 M 上按算子 T 作用. 计算所有 $H^q(\mathfrak{a}, M)$.

解. 外幂在次数二起为零. 复形是 $0 \rightarrow M \xrightarrow{T} M \rightarrow 0$, 所以 $H^0 = \ker T$, $H^1 = M/TM$, $H^q = 0$ 对 $q \geq 2$. 即使 M 有限维, 非半单的一维交换 Lie 代数也可能有非零一阶上同调, 例如 $T = 0$. $\square$

习题 20.8*. 设二维 Lie 代数有基 x, y , $[x, y] = y$. 计算平凡系数上同调。

解. 令 α, β 是对偶基. $d\alpha = 0$, $d\beta = -\alpha \wedge \beta$, 且 $d: C^0 \rightarrow C^1$ 为零. 因此 $H^0 = \mathbb{C}$, $H^1 = \mathbb{C}[\alpha]$, $H^2 = 0$, 更高次数为零. 一阶非零检测到交换化 $\mathfrak{a}/[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}]$ 的一维性. $\square$

习题 20.9*. 对 $[x, y] = z$ 、其余基括号为零的三维 Heisenberg Lie 代数, 求平凡系数上同调的维数与代表元。

解. 对偶基记作 α, β, γ . 有 $d\alpha = d\beta = 0$, $d\gamma = -\alpha \wedge \beta$. 微分为外代数导子, 所以全部二形式的微分为零. 于是四个次数的维数依次为 1, 2, 2, 1, 可分别取代表 1; α, β ; $\alpha \wedge \gamma, \beta \wedge \gamma$; $\alpha \wedge \beta \wedge \gamma$. $\square$

习题 20.10*. 设 $A = \mathbb{C}^n$ 是交换 Lie 代数, $M = \mathbb{C}$ 为平凡模. 说明中心扩张在固定两端的意义下由交错型参数化, 并解释为何允许任意基变换时参数空间会改变。

解. 全部微分为零, 所以 $H^2(A, \mathbb{C}) = \Lambda^2 A^*$. 扩张括号由 $[(a, s), (b, t)] = (0, \omega(a, b))$ 给出. 固定两端的等价不能改变 ω . 若允许在 A 上作 $g \in \text{GL}(A)$ 并在中心上缩放 $c \neq 0$, 则型可变为 $c\omega(g^{-1}a, g^{-1}b)$. 因此那时分类的是这种作用的轨道, 而不是 H^2 中逐个向量. $\square$

习题 20.11*. 设 c 是 $\mathfrak{sl}_2$ 上的平凡系数 2-余圈。直接以 $c(e, f), c(h, e), c(h, f)$ 写出 b , 使 $db = c$ 。

解. 令 $b(h) = -c(e, f)$ 、 $b(e) = -c(h, e)/2$ 、 $b(f) = c(h, f)/2$ 。平凡系数满足 $db(x, y) = -b([x, y])$, 在三对基向量上分别给出指定的三个值, 所以 $db = c$ 。实际上任意交错二形式都满足余圈条件, 因为在 (h, e, f) 上有 $-c(2e, f) + c(-2f, e) - c(h, h) = 0$ 。□

习题 20.12*. 计算 $H^3(\mathfrak{sl}_2, \mathbb{C})$, 并说明它与 Whitehead 引理不矛盾。

解. C^3 一维且 $C^4 = 0$ 。上一题的直接计算表明 $d: C^2 \rightarrow C^3$ 为零, 故 $H^3 \cong \mathbb{C}$ 。可取在 (h, e, f) 上为一的体积形式。Whitehead 两引理只断言一、二阶消失; Casimir 链同伦也不能在平凡系数上求逆, 因为其 Casimir 为零。□

习题 20.13*. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 模 $M(-2)$ 中令 u 为最高向量。证明 $b(e) = b(h) = 0$ 、 $b(f) = u$ 给出非零的一阶上同调类。

解. 对 $[h, e] = 2e$ 余圈式两边均为零; 对 $[h, f] = -2f$, 两边均为 $-2u$; 对 $[e, f] = h$, 右边为 $eu = 0$ 。故 b 是余圈。若 $b(x) = xv$, 则 $hv = 0$ 。但 $M(-2)$ 的权为 $-2, -4, \dots$, 所以 $v = 0$, 与 $b(f) = u \neq 0$ 矛盾。这说明有限维系数假设不能删去。□

习题 20.14*. 在 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}^2 \rtimes \mathfrak{sl}_2$ 中, $\mathbb{C}^2$ 是自然模且交换。描述所有 Levi 子代数, 并给出将标准补送到每一个补的指数。

解. 商为 $\mathfrak{sl}_2$, 每个补是 $x \mapsto x + b(x)$ 的图。图是子代数恰当 b 为一余圈, 所以 $b(x) = xv$ 。自然模没有不变向量, 故 v 唯一。所求补为 $\{x + xv\}$, 且 $\exp(-\text{ad } v)x = x + xv$, 因为交换根使 $(\text{ad } v)^2 = 0$ 。□

习题 20.15*. 令 $\mathfrak{r} = \langle x, y, z \rangle$ 满足 $[x, y] = z$, z 中心。令 $\mathfrak{sl}_2$ 在 x, y 上按自然模作用, 在 z 上平凡作用。对 $a, b \in \mathbb{C}$, 求 $\exp(\text{ad}(ax + by))$ 作用于标准 Levi 基 e, f, h 的结果。

解. 先核验该作用保持 $[x, y] = z$: 自然模矩阵迹为零, 所以在 $\Lambda^2 \langle x, y \rangle$ 上作用为零。令 $v = ax + by$, 则

$$e \mapsto e - bx + \frac{1}{2}b^2z, \quad f \mapsto f - ay - \frac{1}{2}a^2z, \quad h \mapsto h - ax + by + abz.$$

例如 $[v, e] = -bx$ 、 $[v, [v, e]] = b^2z$, 更高括号为零; 其他两式同样由前两次括号得到。二次中心修正说明非交换可解根中的共轭通常不能只写成一次线性修正。□

习题 20.16*. 从秩一 BGG 列计算 L_m 的形式特征标, 不直接列举其基。

解. $M(z)$ 的特征标为 $e^z/(1 - e^{-2})$ 。正合性逐权给出

$$\text{ch } L_m = \frac{e^m - e^{-m-2}}{1 - e^{-2}} = e^m + e^{m-2} + \dots + e^{-m}.$$

最后一步是有限几何级数; 这同时给出维数 $m+1$ 及所有权重数为一。□

习题 20.17*. 对 $M(0)$ 的受限对偶写出前四个基向量上的 e, f, h 作用, 并指出它与 $M(0)$ 不同构的一个结构理由。

解. 有 $h\varphi_j = -2j\varphi_j$, $e\varphi_j = \varphi_{j-1}$, $f\varphi_j = -j(j+1)\varphi_{j+1}$. 因此 φ_0 张成平凡子模, φ_1 生成全模, 且 $e\varphi_1 = \varphi_0$. $M(0)$ 没有平凡子模: 其权零空间由最高生成元 v 张成, 但 $fv \neq 0$. 故两模不同构. $\square$

习题 20.18*. 设 $z \in \mathbb{C}$. 在权集包含于 $z - 2\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 的 $\mathfrak{sl}_2$ 范畴 $\mathcal{O}$ 子范畴中, 证明任一满射 $E \rightarrow N$ 都使 $\text{Hom}(M(z), E) \rightarrow \text{Hom}(M(z), N)$ 满射.

解. 同态由权 z 的最高向量决定. 在 N_z 中给定这样的向量, 可以沿满射在 E_z 中提升, 因为模同态保持权且每个向量只有有限个权分量. E 没有权 $z+2$, 所以提升自动被 e 零化. 由 Verma 泛性质得到所需提升同态. 这直接验证了相对于该子范畴的投射性. $\square$

习题 20.19*. 在二维交换 Lie 代数 $\mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y$ 上, 若企图用不交换的算子 A, B 分别表示 x, y , 计算形式上的 d^2m , 说明复形为何失败.

解. 形式上 $(dm)(x) = Am$, $(dm)(y) = Bm$. 因括号为零, $(d^2m)(x, y) = ABm - BAm$. 若 $[A, B] \neq 0$, 就存在 m 使此式非零. 所以 $d^2 = 0$ 的验证实质用到了表示保持 Lie 括号, 不能对任意一组线性算子写下公式就称上调. $\square$

习题 20.20*. 解释为何秩一 BGG 消解不能仅凭形式直接用于计算任意 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(L_m, N)$. 给出其中一项不投射的明确证据.

解. 通常的 Hom 复形计算导出函子, 需要消解项投射, 或先证明消解的各项相对于所用 Hom 函子为零调对象. BGG 的左项是 $M(-m-2)$, 而正文构造的不分裂列 $0 \rightarrow L_m \rightarrow DM(m) \rightarrow M(-m-2) \rightarrow 0$ 说明它不投射: 否则恒等映射能沿右端满射提升, 短正合列就会分裂. 因此缺少必要条件, 不能作所述直接推断. $\square$

习题 20.21*. 设 $\mathfrak{s}$ 半单, M 为有限维复模且 $M^{\mathfrak{s}} = 0$. 证明 $H^q(\mathfrak{s}, M) = 0$ 对所有 $q \geq 0$ 成立.

解. 完全可约性把 M 分解为非平凡简单模之和; 无不变向量排除了平凡分量. 每个分量上的 Killing Casimir 标量非零, 所以它在整个 M 上可逆. 对任意余圈 φ , 链同伦公式给出 $\varphi = d(C_M^{-1}H\varphi)$. 次数零的同一公式给出不变量为零. 注意本题加强了系数假设, 因此不与平凡系数三阶非零的例子冲突. $\square$

习题 20.22*. 在 $\mathbb{C}[z]$ 上令 $e = \partial_z$, $h = m - 2z\partial_z$, $f = mz - z^2\partial_z$, 其中 $m \in \mathbb{C}$. 计算 $\Omega = h^2 + 2h + 4fe$ 的作用.

解. 令 $D = z\partial_z$. 则 $D^2 = z^2\partial_z^2 + D$, 所以 $h^2 + 2h = m(m+2) - 4mD + 4z^2\partial_z^2$, 而 $4fe = 4mD - 4z^2\partial_z^2$. 相加得到 $m(m+2)I$. 对于整数 $m \geq 0$, 次数不超过 m 的子空间被 f 保持, 正是有限维最高权模; 但算子恒等式本身对任意复 m 都成立. $\square$

第二十一章* Hopf 代数与仿射代数群

本章建立 Hopf 代数的乘法、余乘法、余单位和对极，比较群代数、包络代数与坐标环，并用余模和矩阵系数研究有理表示与群概形例子。

本章目标

- 在具体生成元上核验余乘法、余单位和对极，并构造张量与对偶作用。
- 区分群代数和坐标代数、模与余模、基域点与所有交换代数上的点。
- 从余模证明有理表示的局部有限性、环面权分解及仿射群的线性实现。
- 说明仅由微分表示无法恢复哪些整数与正特征信息，比较等距、相似和对合自同构群。

乘法群的元素可以相乘，也可以取逆。若把它看成由坐标函数 t 与 t^{-1} 描述的对象，两个群元素相乘时， t 的取值随之相乘；在坐标环中，这表现为 $\Delta(t) = t \otimes t$ 。单位元给出 $\varepsilon(t) = 1$ ，取逆则给出 $S(t) = t^{-1}$ 。原来作用在点上的三种运算，如今变成作用在函数上的代数映射，并满足相应的恒等式。沿着这个具体例子，Hopf 代数的公理和表示张量积所需的余乘法就有了可核对的来源。

本章使用张量积、代数同态和第三卷的仿射坐标环语言；群概形从可表示函子及坐标方程出发介绍。包络代数例子调用第 15 章，四元数例子则把所需乘法与范数公式重新列出。

Hopf 代数的结构及对偶可参阅 [3, Sections 5.2–5.3]。该书的 Hopf 定义要求对极可逆，本章采用更一般的定义并在使用对偶时说明实际所需条件；所讨论的群代数、包络代数和交换坐标代数不受这一区别影响。

21.1 余代数与 Hopf 代数

群表示与 Lie 代数表示都能作张量积，但作用公式不同：群元素同时作用于两个因子，Lie 代数元素则分别作用后相加。余乘法把这两种规则统一写成代数中的映射；再把单位表示和对偶表示所需的规则一并加入，就得到 Hopf 代数。

21.1.1 余乘法、余单位与对极

定义 21.1.1. 设 k 为域， H 为 k 向量空间。线性映射 $\Delta: H \rightarrow H \otimes_k H$ 、 $\varepsilon: H \rightarrow k$ 满足

$$(\Delta \otimes 1)\Delta = (1 \otimes \Delta)\Delta, \quad (\varepsilon \otimes 1)\Delta = 1_H = (1 \otimes \varepsilon)\Delta$$

时, 称 (H, Δ, ε) 为**余代数** (coalgebra), 称两映射为余乘法与余单位; 后两式用 $k \otimes H = H = H \otimes k$ 识别。若 H 还为含么结合 k 代数, 且 Δ, ε 是含么代数同态, 就称为**双代数** (bialgebra)。若另有线性映射 $S: H \rightarrow H$ 满足

$$m(S \otimes 1)\Delta = \eta\varepsilon = m(1 \otimes S)\Delta,$$

其中 m 是乘法、 $\eta: k \rightarrow H$ 是单位映射, 就称为**Hopf 代数** (Hopf algebra), 称 S 为**对极** (antipode)。

本书不把对极的可逆性额外放进定义; 它在本章的群代数、包络代数及交换坐标代数例子中成立。Etingof 等的《Tensor Categories》在定义 Hopf 代数时要求对极可逆, 因此引用其张量范畴结论时须保留这一差别。

常把 $\Delta(h)$ 写为 $\sum h_{(1)} \otimes h_{(2)}$, 称为 Sweedler 记号。它表示一个有限和, 不表示每个 h 都只有一个纯张量分解。余结合律允许把三重余乘法统一写为 $\sum h_{(1)} \otimes h_{(2)} \otimes h_{(3)}$ 。

命题 21.1.2. 设 k 为域, H 为 k 双代数。其对极 $S: H \rightarrow H$ 若存在, 则唯一, 并满足 $S(1) = 1$ 、 $S(ab) = S(b)S(a)$ 对全部 $a, b \in H$ 成立。

证明. 在 $\text{Hom}_k(H, H)$ 上定义卷积 $(f * g)(h) = \sum f(h_{(1)})g(h_{(2)})$ 。结合律来自 m 的结合与 Δ 的余结合, 单位为 $\eta\varepsilon$ 。对极就是恒等映射的双边卷积逆, 故唯一; 代入单位即得 $S(1) = 1$ 。对反乘法性质, 改在 $\text{Hom}_k(H \otimes H, H)$ 中卷积, 张量积余乘法把 $a \otimes b$ 送到 $\sum (a_{(1)} \otimes b_{(1)}) \otimes (a_{(2)} \otimes b_{(2)})$ 。映射 $S \circ m$ 是乘法映射 m 的卷积逆, 因 Δ 保持乘法。另一个映射 $F(a, b) = S(b)S(a)$ 也给出逆: 两侧复合分别为

$$\sum S(b_{(1)})S(a_{(1)})a_{(2)}b_{(2)} = \varepsilon(a)\varepsilon(b)1$$

和 $\sum a_{(1)}b_{(1)}S(b_{(2)})S(a_{(2)}) = \varepsilon(a)\varepsilon(b)1$ 。逆的唯一性使两映射相同。□

若再有交换 Δ 两因子不改变它, 则称余交换。乘法交换与余乘法余交换是两项不同条件, 以下两种来自同一个群的代数将说明这种区别。

21.1.2 群代数及坐标环的对偶方向

命题 21.1.3. 设 k 为域, G 为群, $\mathfrak{g}$ 为 k 上 Lie 代数。下列公式分别给出 kG 与 $U(\mathfrak{g})$ 上的 Hopf 代数结构:

	$H: \Delta$	ε	S
kG	$g \mapsto g \otimes g$	$g \mapsto 1$	$g \mapsto g^{-1}$
$U(\mathfrak{g})$	$x \mapsto x \otimes 1 + 1 \otimes x$	$x \mapsto 0$	$x \mapsto -x$

第二行的公式在 $x \in \mathfrak{g}$ 上规定, 再按相应代数或反代数映射延拓。两者都余交换。

证明. 群代数的各式在群基元上核验公理即可, 例如 $m(S \otimes 1)\Delta(g) = g^{-1}g = 1 = \varepsilon(g)1$ 。包络代数中, 映射 $x \mapsto x \otimes 1 + 1 \otimes x$ 保持 Lie 括号, 因为交叉的两个因子交换, 故由泛性质延拓为代数同态。增广零化全部 Lie 括号; 映射 $x \mapsto -x$ 到反代数保持 Lie 括

号, 因而给出反同态 S 。余结合及余单位等式在生成元上成立, 所以在全部代数上成立。对极等式可对字长归纳: 若两较短字 u, v 满足左式, 则

$$\sum S((uv)_{(1)})(uv)_{(2)} = \sum S(v_{(1)})S(u_{(1)})u_{(2)}v_{(2)} = \varepsilon(u)\varepsilon(v)1.$$

右式同理; 线性性完成证明。 $\square$

若 G 有限, 函数空间 k^G 则按逐点乘法成为交换 Hopf 代数:

$$\Delta f(g, h) = f(gh), \quad \varepsilon(f) = f(1), \quad Sf(g) = f(g^{-1}).$$

在点函数基 δ_x 中, $\Delta\delta_x = \sum_{ab=x} \delta_a \otimes \delta_b$ 。这是 k^G 的线性对偶 Hopf 代数; 函数代数通常不余交换, 恰在 G 交换时余交换。群无限时, 任意函数的两变量拉回未必在代数张量积 $k^G \otimes k^G$ 中, 因此不能不加限制照搬有限对偶。

21.1.3 模与余模的区别

有限群表示在基下写成 $gv_j = \sum_i a_{ij}(g)v_i$ 。与其对每个 g 分别保存这个矩阵, 也可以把系数看成函数 $a_{ij} \in k^G$, 一次写成 $v_j \mapsto \sum_i v_i \otimes a_{ij}$ 。群乘法在系数函数上的拉回, 正好给出这种展开应满足的相容条件。这便是余模的来源。

定义 21.1.4. 设 k 为域, (C, Δ, ε) 为 k 余代数。 k 向量空间 V 配 k 线性映射 $\delta: V \rightarrow V \otimes_k C$, 使

$$(\delta \otimes 1)\delta = (1 \otimes \Delta)\delta, \quad (1 \otimes \varepsilon)\delta = 1_V,$$

时, 称为右 C 余模 (comodule)。第一式将两种继续展开余作用的次序联系起来, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\delta} & V \otimes_k C \\ \delta \downarrow & & \downarrow 1_V \otimes \Delta \\ V \otimes_k C & \xrightarrow{\delta \otimes 1_C} & V \otimes_k C \otimes_k C \end{array}$$

给定两个右 C 余模 (V, δ_V) 、 (W, δ_W) , 若 k 线性映射 $f: V \rightarrow W$ 使下图交换, 就称它为余模同态:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\delta_V} & V \otimes_k C \\ f \downarrow & & \downarrow f \otimes 1_C \\ W & \xrightarrow{\delta_W} & W \otimes_k C \end{array}$$

模是代数元素作用于向量的规则; 余模是把一个向量展开成向量与系数函数的规则。只有适当的对偶条件成立时, 两种语言才可直接转换。例如有限维代数 A 的左模等同于右 A^* 余模; 取对偶基 a_i, a^i , 余作用为 $v \mapsto \sum_i a_i v \otimes a^i$ 。代数乘法公理与单位公理分别对应余结合与余单位。

一个二维例子已能看清余作用的含义。设 k 为域, $C = k[t]$ 的余乘法为 $\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t$, 余单位为 $\varepsilon(t) = 0$ 。在 $V = kv_1 \oplus kv_2$ 上令

$$\delta(v_1) = v_1 \otimes 1, \quad \delta(v_2) = v_2 \otimes 1 + v_1 \otimes t.$$

在 v_2 上, 余结合律两边都等于 $v_2 \otimes 1 \otimes 1 + v_1 \otimes t \otimes 1 + v_1 \otimes 1 \otimes t$, 余单位律也直接成立。把 t 代成 $c \in k$, 便得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; 余乘法中的两个加项对应参数相加。直线 kv_1 是子余模, 商余模平凡, 但将 v_2 换成 $v_2 + av_1$ 仍留下 $v_1 \otimes t$ 项, 故这条子余模没有补。

命题 21.1.5. 设 k 为域, $(H, \Delta, \varepsilon, S)$ 为 k Hopf 代数, V, W 为么性左 H 模。对 $h \in H$, 用 Sweedler 记号写 $\Delta(h) = \sum h_{(1)} \otimes h_{(2)}$ 。则张量积 $V \otimes_k W$ 通过

$$h(v \otimes w) = \sum h_{(1)}v \otimes h_{(2)}w$$

成为左模, k 通过 ε 成为单位模。若 V 有限维, 则

$$(h\varphi)(v) = \varphi(S(h)v)$$

给出 V^* 的左模结构, 求值映射 $V^* \otimes V \rightarrow k$ 是模同态。

证明. Δ 保持乘法使两次作用等于乘积作用, 余结合使三重张量的两种括号相容, 余单位使 $k \otimes V \rightarrow V$ 相容。对偶上依次作用 a, b 得到 $\varphi(S(b)S(a)v) = \varphi(S(ab)v)$, 所以是左作用。求值映射的等变性为

$$\sum (h_{(1)}\varphi)(h_{(2)}v) = \varphi\left(\sum S(h_{(1)})h_{(2)}v\right) = \varepsilon(h)\varphi(v).$$

□

在群代数上, 张量公式就是对角群作用; 在包络代数上, 它是 Lie 代数的 Leibniz 型作用。普通交换 $v \otimes w \mapsto w \otimes v$ 是否等变, 要看余乘法是否余交换; 第 B.1.3 小节给出一个非余交换的例子。上述基础可对照 [3, Definitions 5.2.2, 5.3.2, Propositions 5.3.5–5.3.6, Corollary 5.3.7]。

21.2 代数群的坐标环

代数群的乘法也可由函数上的拉回来描述。采用坐标环而非只看一个基域上的点, 有两个好处: 公式可以同时在不同交换代数上取值, 正特征中的幂零信息也不会因为点集太小而消失。

21.2.1 仿射代数群

定义 21.2.1. 设 k 为域, A 为有限生成的交换 k Hopf 代数, 结构映射记为 Δ, ε, S 。对每个交换含么 k 代数 R , 记 $\eta_R: k \rightarrow R$ 为单位映射, 并令

$$G(R) = \text{Hom}_{k\text{-alg}}(A, R),$$

对 $a \in A$, 用 Sweedler 记号写 $\Delta(a) = \sum a_{(1)} \otimes a_{(2)}$ 。对 $g, h \in G(R)$, 用余乘法、余单位及对极分别定义

$$(gh)(a) = \sum g(a_{(1)})h(a_{(2)}), \quad 1_G = \eta_R \varepsilon, \quad g^{-1} = g \circ S.$$

这个群值函子称为一个有限型仿射群概形, 记为 $G = \operatorname{Spec} A$, 其坐标环记为 $k[G] = A$ 。在代数闭域上, 若坐标环约化, 也把相应的仿射簇及其群运算称为**仿射代数群** (affine algebraic group)。

因为 A, R 都交换, 两个代数同态的卷积仍为代数同态; Hopf 公理正好使以上运算结合、有单位与逆。一个 k 代数同态 $R \rightarrow R'$ 与这些公式交换, 所以这是对 R 自然的群, 而非彼此不相干的一组点集。

两个这类群之间的态射, 定义为反向的 Hopf 代数同态。特别地, 点上的映射必须在所有 R 上由同一坐标公式给出; 只给 $G(k) \rightarrow H(k)$ 的一个抽象群同态, 并不足以定义代数群态射。

21.2.2 群乘法与 Hopf 结构

坐标环方法与通常的正则映射方法相符。设 k 代数闭, G 为仿射簇, 乘法、单位及求逆都是正则映射。则乘法拉回给出

$$\Delta : k[G] \rightarrow k[G \times G] = k[G] \otimes k[G],$$

单位与求逆分别给出 ε, S 。正则函数在三元组 (g, h, ℓ) 上比较时, 群乘法结合律就是余结合律, 其他公理同理。反向从约化的有限型交换 Hopf 代数出发, 正则函数关系恢复同样的运算。

命题 21.2.2. 设 k 为域, $A = k[G]$ 为有限生成的交换 k Hopf 代数, 其结构映射为 Δ, ε, S 。若理想 $I \subseteq A$ 满足

$$\Delta(I) \subseteq I \otimes A + A \otimes I, \quad \varepsilon(I) = 0, \quad S(I) \subseteq I,$$

则 A/I 自然成为交换 Hopf 代数, 且 $\operatorname{Spec}(A/I)$ 是 G 的闭子群概形。反过来, 使商上的三种映射良定义所需的条件正是以上三式。

证明. 张量商映射 $A \otimes A \rightarrow (A/I) \otimes (A/I)$ 的核为 $I \otimes A + A \otimes I$, 故第一条条件使余乘法下降; 其余两条条件分别使余单位与对极下降。所有公理在商中继承。对每个 R , 商到 R 的代数同态就是那些零化 I 的 $G(R)$ 元素, 以上三式保证它们对乘法、单位和逆封闭。□

例如 $k[t]$ 上的 $\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t$ 描述加法群 $\mathbb{G}_a$ 。特征 p 中 $I = (t^p)$ 满足上述条件, 因为二项式中间系数为零; 所得闭子群概形有非零幂零坐标, 不能仅由其 k 点辨认。

21.2.3 一般线性群及可对角化群

一般线性群的坐标代数为

$$k[\mathrm{GL}_n] = k[x_{ij}, d]/(d \det(x_{ij}) - 1).$$

对任意 R , 它的 R 点就是可逆矩阵。矩阵乘法给出

$$\Delta(x_{ij}) = \sum_{\ell} x_{i\ell} \otimes x_{\ell j}, \quad \varepsilon(x_{ij}) = \delta_{ij},$$

对极则是逆矩阵的条目, 由伴随矩阵与行列式逆表示。公式 $\det(AB) = \det A \det B$ 保证 d 的余乘法为 $d \otimes d$ 。关系 $\det X = 1$ 又给闭子群 SL_n 。

定义 21.2.3. 设 k 为域, M 为有限生成交换群。群代数 $k[M]$ 以符号 e^m 为基, 乘法为 $e^m e^n = e^{m+n}$, 余乘法为 $\Delta(e^m) = e^m \otimes e^m$ 。相应的交换仿射群概形记为 $D(M)$, 称为分裂可对角化群 (diagonalizable group)。当 $M = \mathbb{Z}^r$ 时, 它是分裂代数环面 (algebraic torus) $\mathbb{G}_m^r$ 。

事实上 $D(M)(R) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{grp}}(M, R^\times)$, 因为代数同态必须把 e^m 送到相容的单位。特别地,

$$k[\mathbb{G}_m] = k[t, t^{-1}], \quad D(\mathbb{Z}/n) = \mu_n, \quad k[\mu_n] = k[t]/(t^n - 1).$$

若 k 特征为 p , 则 $t^p - 1 = (t - 1)^p$, μ_p 的坐标环不约化; 即使 k 代数闭, 它的 k 点也只有单位。与此相对, 常数群 C_p 的坐标环为 k^{C_p} , 约化且有 p 个 k 点。这是两个不同群概形, 不能只因为都带下标 p 就认同。

21.3 有理表示

代数群表示不能只要求每个群元素给出一个矩阵, 还要让矩阵条目随群元素正则地变化。余模的系数恰好记录这些函数, 因此能把“有理表示”的条件写成有限个代数等式。这里的有理表示是正则群态射, 不是允许任意带极点的有理映射。

21.3.1 余模与有理表示

定义 21.3.1. 设 $G = \mathrm{Spec} A$ 为域 k 上的有限型仿射群概形, V 为有限维 k 空间。群概形态射 $G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 称为一个有限维有理表示 (rational representation)。

定理 21.3.2. 设 k 为域, $(A, \Delta, \varepsilon, S)$ 为有限生成的交换 k Hopf 代数, $G = \mathrm{Spec} A$ 。有限维有理 G 表示与有限维右 A 余模等价。具体地, 给定有限维右余模 (V, δ) 及交换含么 k 代数 R , 若在 V 的一组 k 基 $v_1, \dots, v_n$ 下有

$$\delta(v_j) = \sum_i v_i \otimes a_{ij},$$

则对应的 R 点 $g: A \rightarrow R$ 在 $V \otimes_k R$ 上的作用矩阵为 $(g(a_{ij}))$, 且

$$\Delta(a_{ij}) = \sum_{\ell} a_{i\ell} \otimes a_{\ell j}, \quad \varepsilon(a_{ij}) = \delta_{ij}.$$

证明. 余模的两条公理分别给出所列矩阵系数等式。对 R 点求值, 前式表示乘法相容, 后式表示单位作用为恒等。对极给出逆矩阵 $(S(a_{ij}))$, 因此这些矩阵在每个 R 上都可逆, 定义到 GL_n 的态射。反过来, 群态射的矩阵系数必满足同样等式, 定义余作用。换基只是同时改变这组系数的表达, 同态相容条件也相同, 所以得到基无关的范畴等价。□

引理 21.3.3. 设 k 为域, C 为 k 余代数, V 为右 C 余模, 不要求有限维。每个 $v \in V$ 都属于一个有限维 k 子余模。

证明. 写 $\delta(v) = \sum_{i=1}^r v_i \otimes c_i$, 令 c_i 线性无关。选线性泛函 ϕ_i 满足 $\phi_i(c_j) = \delta_{ij}$ 。令 $W = \mathrm{span}\{v_i\}$, 亦即所有 $(1 \otimes \phi)\delta(v)$ 的线性生成空间。余结合律在最后一个因子上应用任意 ϕ , 给出

$$\delta((1 \otimes \phi)\delta(v)) = \sum_i v_i \otimes (1 \otimes \phi)\Delta(c_i) \in W \otimes C.$$

故 W 稳定; 余单位公式使 $v = \sum_i \varepsilon(c_i)v_i \in W$ 。□

推论 21.3.4. 域 k 上每个有限型仿射群概形都可以闭嵌入某个 GL_n 。

证明. 将 $A = k[G]$ 本身看作余作用为 Δ 的右余模。取 A 的有限个代数生成元, 利用前一引理, 选包含这些元及一的有限维子余模 W 。在 W 的基 w_j 上写系数为 a_{ij} 。由 $w_j = (\varepsilon \otimes 1)\Delta(w_j) = \sum_i \varepsilon(w_i)a_{ij}$, 所有 w_j 都在这些矩阵系数的线性生成空间中。因此表示给出的 $k[\mathrm{GL}(W)] \rightarrow A$ 的像包含全部代数生成元, 是满射; 这就是闭嵌入。□

这项证明同时说明有限生成坐标环的用途。余模局部有限性保证任何一个函数都受有限维矩阵系数控制, 而有限生成性保证一次选择便能控制整个坐标环。

21.3.2 权和代数环面

定理 21.3.5. 设 k 为任意特征的域, M 为有限生成交换群, $G = D(M) = \mathrm{Spec} k[M]$, e^m 为群代数 $k[M]$ 中元素 $m \in M$ 对应的基元。对有限维有理 G 表示, 以及更一般的任意右 $k[M]$ 余模 (V, δ) , 令 $V_m = \{v \in V \mid \delta(v) = v \otimes e^m\}$ 。则有唯一的分解

$$V = \bigoplus_{m \in M} V_m, \quad \delta(v) = v \otimes e^m \quad (v \in V_m).$$

有限维时只有有限多个非零项。因此每个有理表示完全可约, 简单表示是一维权; 结论在任意特征下成立。

证明. 群代数的 e^m 是一组基, 对每个 v 唯一写 $\delta(v) = \sum_m v_m \otimes e^m$, 有限多个系数非零。余结合比较第三因子的 e^m 系数, 得到 $\delta(v_m) = v_m \otimes e^m$; 余单位使 $v = \sum_m v_m$ 。若一组不同权向量的和为零, 对其余作用比较不同 e^m 系数便知每项为零, 所以是直和。表示同态保各权空间, 一维子空间在同一权空间内都稳定, 故分解为一维表示。唯一性也来自系数唯一性。□

对 $\mathbb{G}_m^r$, 权是整数元组 $(m_1, \dots, m_r)$, 作用字符为 $t_1^{m_1} \cdots t_r^{m_r}$ 。这不是任意复指数。比如一维交换 Lie 代数的任意复标量作用都给出 Lie 代数表示, 却只有整数标量才能从 $\mathbb{G}_m$ 的有理表示微分得到。

即使 $G = \mu_p$ 在特征 p 中不约化, 上述按 $\mathbb{Z}/p$ 分次的结论仍成立。它与常数群 C_p 的模特征表示完全不同: 后者的群代数是局部非半单代数, 而这里讨论的是不同的群概形及其坐标余模。

21.3.3 与 Lie 代数表示的关系及积分问题

把一个 R 点在单位附近代入双数环 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$, 便得到无穷小作用。具体地, 对 $\varepsilon: A \rightarrow k$, 线性映射 $d: A \rightarrow k$ 满足

$$d(ab) = \varepsilon(a)d(b) + d(a)\varepsilon(b)$$

时, $\varepsilon + \epsilon d$ 为双数值代数同态。这些 d 构成 $\text{Lie}(G)$; 括号由卷积交换子给出。有理表示的余作用因此诱导 $\rho_*(d) = (1 \otimes d)\delta$ 。群交换子的二次项, 或直接用余结合展开, 说明这是一项 Lie 代数表示。坐标方程在 $I + \epsilon X$ 处线性化便恢复熟悉的矩阵条件, 例如 $\text{Lie}(\text{SL}_n) = \mathfrak{sl}_n$ 。

命题 21.3.6. 设 k 为特征零域, V 为 n 维 k 向量空间。加法群 $\mathbb{G}_a$ 在 V 上的每个有理表示, 在选定 k 基后唯一形如

$$\rho(t) = \exp(tN) = \sum_{j \geq 0} \frac{t^j N^j}{j!},$$

其中 N 为幂零矩阵, 故该和有限。每个有限维有理 $\mathbb{G}_m$ 表示的微分则可对角化, 特征值为整数。

证明. 加法群的矩阵条目为 t 的多项式, 满足 $\rho(t+u) = \rho(t)\rho(u)$ 、 $\rho(0) = I$ 。对 u 求导并令 $u = 0$, 得到 $\rho'(t) = \rho(t)N$, 其中 $N = \rho'(0)$ 。逐次比较多项式系数得到 $A_j = N^j/j!$ 。多项式次数有限, 所以充分大的 $N^j = 0$ 。反过来, 幂零 N 的有限指数满足加法公式, 给出有理表示。乘法群的结论由定理 21.3.5 中 t^m 的导数得到。□

因此从 Lie 代数表示到代数群有理表示会多出条件; 即使两群的 Lie 代数都一维交换, $\mathbb{G}_a$ 要求幂零作用, $\mathbb{G}_m$ 要求整数半单作用。复 Lie 群的积分问题还涉及拓扑覆盖, 留在附录 C 说明。在特征 p 中, 群态射 $t \mapsto t^p$ 的微分为零却不是零态射, 微分还会进一步丢掉信息。

21.4 代数群结构初步

从矩阵例子进入一般代数群时, 需要区分几个不同的结构条件。么幂性控制元素的 Jordan 形, 约化性排除连通正规么幂部分; 根数据又在根系以外保留了整数格。正特征时, 坐标环的幂零信息和无穷小子群还会使点集直觉失效。

21.4.1 么幂群和约化群

在代数闭域 k 上, 矩阵 u 若满足 $u - I$ 幂零, 就称为么幂矩阵。一个线性代数群在一个忠实表示中全部元素都么幂时, 称为么幂群; 这个概念的表示无关性是一般线性代数群理论的一项结构结论。本节的实例均在明确的矩阵模型中使用它。

上三角对角线全为一的群 U_n 是基本例子。令 $U_n^{(r)}$ 为仅在距对角线至少 r 条的上三角线上允许非零条目的子群。若记相应严格上三角矩阵空间为 J^r , 则

$$(1+X)(1+Y) \equiv 1+X+Y \pmod{J^{r+s}} \quad (X \in J^r, Y \in J^s),$$

从而 $[U_n^{(r)}, U_n^{(s)}] \subseteq U_n^{(r+s)}$ 。因为 $J^n = 0$, 这个群幂零, 特别可解。对 U_3 , 三个参数的乘法为

$$(a, b, c)(a', b', c') = (a+a', b+b', c+c'+ab'),$$

可见中心方向记录了非交换性, 不能把全部上三角参数都简单看成独立加法。

定义 21.4.1. 设 G 为代数闭域上的光滑连通仿射代数群。若 G 没有非平凡的连通正规幺幂闭子群, 就称为**约化群** (reductive group)。若此外没有正维数的连通正规可解闭子群, 就称为半单代数群。这里的“约化群”不同于“坐标环约化”: 后者只要求没有非零幂零元。

例如环面没有非平凡幺幂元素, 所以约化; 它自身交换且有正维数时不半单。 U_n 在 $n \geq 2$ 时光滑连通且非平凡, 却是幺幂的, 因而不约化。一般约化群的结构还涉及环面、根子群和正规子群; 下一小节从整数格资料观察其中一部分。

21.4.2 根数据的意义

定义 21.4.2. 设 X, Y 为两个有限秩自由交换群, 给定完美整数配对 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times Y \rightarrow \mathbb{Z}$, 以及有限子集 $\Phi \subseteq X, \Phi^\vee \subseteq Y$ 及双射 $\alpha \mapsto \alpha^\vee$ 。要求对所有 $\alpha \in \Phi$, 都有 $\langle \alpha, \alpha^\vee \rangle = 2$, 且反射

$$s_\alpha(x) = x - \langle x, \alpha^\vee \rangle \alpha, \quad s_\alpha^\vee(y) = y - \langle \alpha, y \rangle \alpha^\vee$$

分别保持 Φ 和 $\Phi^\vee$, 并对所有 $\alpha, \beta \in \Phi$ 满足 $(s_\alpha \beta)^\vee = s_\alpha^\vee(\beta^\vee)$ 。还要求约化条件 $\Phi \cap \mathbb{Q}\alpha = \{\alpha, -\alpha\}$ 对每个 $\alpha \in \Phi$ 成立, 其中把 X 嵌入 $X \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 。满足这些条件的资料称为**根数据** (root datum); 允许 Φ 为空, 也不要求它生成整个 $X \otimes \mathbb{Q}$, 以便包含环面的中心方向。

在连通约化群的结构理论中, X 是极大环面的字符格, Y 是一参数子群格。根系给出实向量空间里的角度与相对长度, 根数据还记录哪些整数权给出群上的字符。因此同一个复半单 Lie 代数可以对应不同的代数群。

对 SL_2 , 取 $T = \{\text{diag}(t, t^{-1})\}$ 。若 $\lambda(t) = t$, 则 $X = \mathbb{Z}\lambda$, 根为 $\pm 2\lambda$; 一参数子群 $\nu(t) = \text{diag}(t, t^{-1})$ 满足 $\langle \lambda, \nu \rangle = 1$, 正余根就是 ν 。对 PGL_2 的对角环面, 用对角条目比值 r 作坐标, 字符格由 $\alpha(r) = r$ 生成, 根为 $\pm \alpha$, 余根是相应余字符生成元的二倍。两者的抽象根系都为 A_1 , 但整数格中的嵌入不同。

这也解释了表示下降的一个必要条件。中心元 $-I \in SL_2(\mathbb{C})$ 在 $L_m = \text{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$ 上作用为 $(-1)^m$, 所以这个具体代数群表示能通过商 $PSL_2(\mathbb{C})$ 当且仅当 m 为偶数。Lie 代数的最高权分类列出所有 $m \geq 0$, 却不会自动替每个中心商筛去不能下降的表示。

21.4.3 正特征下的代数群与群概形

在特征 p 中, 对加法群的 Frobenius 态射

$$F : \mathbb{G}_a \longrightarrow \mathbb{G}_a, \quad t \longmapsto t^p$$

对应坐标同态 $k[t] \rightarrow k[t]$, $t \mapsto t^p$ 。它的核为 $\alpha_p = \text{Spec } k[t]/(t^p)$ 。若 k 代数闭, 点集上 F 为双射, 但坐标同态不满, 所以它不是代数群同构。其微分为零; 核概形的切空间却一维, 尽管它的 k 点只有一个。

同样, $\mu_p = \text{Spec } k[t, t^{-1}]/(t^p - 1)$ 的切空间一维; 在 $t = 1 + \epsilon a$ 代入关系时, $(1 + \epsilon a)^p = 1$, 对任意 a 都成立。于是 α_p, μ_p 与平凡点集之间的区别, 必须由坐标环或所有代数上的点保留。

Frobenius 态射与非约化核说明, 光滑性、约化性、可分性以及表示是否能由微分恢复, 分别控制不同信息。后续的不变量理论将区分特征零的线性约化性与正特征下更弱的几何约化性; 有限群的平均公式只在群阶可逆时适用, 一般群概形需要相应的表示论方法。

21.5 型、对合与古典群

正交群、辛群和酉群最初由保持型的矩阵定义。把型换成自同态代数上的伴随对合以后, 同一批方程也能在非分裂代数中使用。本节先固定具体模型, 再比较等距、相似变换和代数自同构; 它们之间有联系, 却不是同一个群。

21.5.1 等距群、相似变换群与乘子

设 F 为特征不为二的域, 取 $K = F$ 或一个可分二次扩张 K/F , 并以 $a \mapsto \bar{a}$ 分别表示恒等或非平凡共轭。给定 $H \in \text{GL}_n(K)$, $n \geq 1$, 假设 $H^* = \epsilon H$, $\epsilon \in \{1, -1\}$, 其中 $X^* = \bar{X}^T$ 。型为 $b(u, v) = \bar{u}^T H v$, 伴随对合为 $\sigma_H(X) = H^{-1} X^* H$ 。

定义 21.5.1. 设 F 为特征不为二的域, $K = F$ 或 K/F 为可分二次扩张, 共轭分别为恒等或非平凡域自同构。取 $H \in \text{GL}_n(K)$, $n \geq 1$, 满足 $H^* = \epsilon H$, $\epsilon \in \{1, -1\}$, 其中 $X^* = \bar{X}^T$ 。对非退化型 $b(u, v) = \bar{u}^T H v$, 定义等距群与相似变换群

$$\begin{aligned}\text{Isom}(b) &= \{g \in \text{GL}_n(K) \mid g^* H g = H\}, \\ \text{Sim}(b) &= \{g \in \text{GL}_n(K) \mid g^* H g = cH \text{ 对某个 } c \in F^\times\}.\end{aligned}$$

相似变换的这个唯一标量 c 称为乘子, 记为 $\mu(g)$ 。当 $K = F$, H 对称时, 两群分别记为 $\text{O}(b)$, $\text{GO}(b)$; 当 H 交替时, 记为 $\text{Sp}(b)$, $\text{GSp}(b)$; 二次扩张上的 Hermitian 情形记为 $\text{U}(b)$, $\text{GU}(b)$ 。

这些式子不仅定义 F 上的抽象群。对任意交换 F 代数 R , 把系数扩大到 $K \otimes_F R$, 令共轭固定 R , 便得到相同的矩阵方程; 将非零乘子换为 $R^\times$ 中的元, 就定义相应仿射群概形。等距群是一般线性群的闭子群, 相似群可在 $\text{GL}_n(K) \times \mathbb{G}_m$ 中用方程实现; K/F 有限维使这些都是有限个 F 坐标方程。

命题 21.5.2. 设 F 为特征不为二的域, $K = F$ 或 K/F 为可分二次扩张, 共轭分别为恒等或非平凡域自同构, $X^* = \bar{X}^T$ 。取 $n \geq 1$, $H \in \text{GL}_n(K)$, 满足 $H^* = \epsilon H$, $\epsilon = \pm 1$ 。令 b 为 K^n 上的非退化型 $b(u, v) = \bar{u}^T H v$, $\sigma_H(X) = H^{-1} X^* H$, 记 $\text{Sim}(b)$, $\text{Isom}(b)$ 分

别为相似变换群和等距群。则乘子给出群同态 $\mu: \text{Sim}(b) \rightarrow F^\times$, 其核为 $\text{Isom}(b)$ 。并且

$$g \in \text{Sim}(b), \mu(g) = c \iff \sigma_H(g)g = cI.$$

证明. 非退化型至少有一个非零配对值, 故乘子唯一。两个相似变换连续作用使配对值乘两个标量的积, 逆变换乘以逆标量, 所以是同态, 乘子一恰是等距条件。最后左乘 H^{-1} 即将矩阵方程改写为所示对合方程。 $\square$

乘子的实际像须另外判断。在正定实型上它只能为正数, 且 $\sqrt{c}I$ 实现每个正数; 在分裂辛型 $J = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}$ 上, $\text{diag}(cI_m, I_m)$ 实现每个 $c \in F^\times$ 。所以写核与像时不能一概补上“到 $F^\times$ 满射”。

21.5.2 带对合代数的自同构群

命题 21.5.3. 设 F 为特征不为二的域, $K = F$ 或 K/F 为可分二次扩张, 共轭分别为恒等或非平凡域自同构, $X^* = \bar{X}^\top$ 。取 $H \in \text{GL}_n(K)$ 、 $n \geq 1$, 满足 $H^* = \epsilon H$ 、 $\epsilon = \pm 1$ 。令 $A = M_n(K)$ 、 $b(u, v) = \bar{u}^\top H v$ 为 K^n 上的非退化型、 $\sigma(X) = H^{-1} X^* H$, $\text{Sim}(b)$ 为型 b 的相似变换群。保持 σ 的 K 代数自同构组成的群记为 $\text{Aut}_K(A, \sigma)$ 。内自同构 $\text{Int}(g)(X) = gXg^{-1}$ 给出群同构

$$\text{Sim}(b)/K^\times \cong \text{Aut}_K(A, \sigma),$$

其中 $K^\times$ 作为非零标量矩阵嵌入相似群, 其乘子为 $\bar{a}a$ 。

证明. 矩阵代数的每个 K 代数自同构都是内自同构, 这是第二卷定理 17.3.1 的 Skolem-Noether 结论¹在中心单代数 $M_n(K)$ 上的应用。直接计算

$$\sigma(gXg^{-1}) = \sigma(g)^{-1}\sigma(X)\sigma(g).$$

它等于 $g\sigma(X)g^{-1}$ 对所有 X 成立, 当且仅当 $\sigma(g)g$ 与所有矩阵交换, 即为某个 cI 、 $c \in K^\times$ 。对该等式再用 σ , 得到 $\bar{c} = c$, 故 $c \in F^\times$ 。由前一命题, 这正是相似条件。内自同构的核是矩阵代数的中心单位 $K^\times$, 而这些标量全属于相似群, 遂得所示同构。 $\square$

这里比较的是指定域上的点群, 并且自同构要求逐点固定 K 。二次扩张上若允许自同构在中心上也作共轭, 会得到另一个群。对一般带对合中心单代数, 相同的计算仍把内自同构与条件 $\sigma(g)g \in F^\times$ 联系起来; 非分裂情形中的型及对合细节见第二卷附录 B。

还须区分代数群满态射与域上点的满射。复数上, 标量平方根能把任意可逆二阶矩阵缩放为行列式一矩阵, 所以 $\text{SL}_2(\mathbb{C}) \rightarrow \text{PGL}_2(\mathbb{C})$ 满射。相应代数群态射在实数上也定义良好, 但实点的像只含行列式为正的射影矩阵类: 缩放把行列式乘一个正平方, 不可能把负行列式改成一。 $\text{diag}(-1, 1)$ 的射影类便没有实的 SL_2 原像。

¹斯科伦 (Thoralf Albert Skolem, 1887-1963), 挪威数学家, 研究数理逻辑与集合论; 他关于一阶逻辑和可数模型的工作是其代表成果。

21.5.3 分裂模型与四元数例子

在 $F = \mathbb{R}$ 上, Hamilton 四元数代数

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k, \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k = -ji$$

带有共轭 $\bar{q}$ 和范数 $N(q) = q\bar{q} = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$ 。共轭反转乘法, 故 $N(uv) = N(u)N(v)$ 。于是

$$\mathrm{SL}_1(\mathbb{H})(\mathbb{R}) = \{q \in \mathbb{H} \mid N(q) = 1\}$$

由一个四元二次方程定义为实代数群; 逆由共轭给出, 不需要除以变量。

复化后它变成分裂模型。把 i, j 分别送到

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

两矩阵平方为 $-I$ 、反交换, 并且它们连同单位及乘积线性无关, 所以给出 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong M_2(\mathbb{C})$ 。计算一般元素的行列式恰为 $N(q)$, 因此复化后的群为 SL_2 。在实点上, 四元数单位球面是有界闭集, 而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 含任意大的 $\mathrm{diag}(t, t^{-1})$; 这两个实模型的差异不由其共同的复化消除。

例 21.5.4. 单位四元数通过 $x \mapsto qxq^{-1}$ 作用于纯虚三维空间 $\mathrm{Im} \mathbb{H}$ 。它保持该空间, 因为实部是 $(x + \bar{x})/2$, 且共轭作用保持实部; 它也保持正定范数。作用的核是 $\{\pm 1\}$: 若与 i, j, k 都交换, 便在 $\mathbb{H}$ 的中心 $\mathbb{R}$ 中, 再加范数一就只剩两个元。例如 $q = i$ 固定 i 并把 j, k 变号; 而 $q = (1 + i)/\sqrt{2}$ 固定 i , 将 j 送到 k 、 k 送到 $-j$ 。这是由非交换代数乘法产生的具体正交作用。

分裂矩阵型、非分裂四元数、等距群与代数自同构因而可以互相解释。它们也提醒我们: 复数域上的根系或 Lie 代数类型只记录部分结构; 改换基域、对合或中心商以后, 点群与表示下降问题还需要重新核对。

本章小结

余乘法规定张量积的作用, 余单位规定平凡对象, 对极使对偶和求逆成为可能。群代数中的元素按对角方式作用, 包络代数中的 Lie 代数生成元按 Leibniz 方式作用; 坐标代数则以反向的函数拉回描述群乘法。

有理表示等同于坐标余模, 有限生成坐标环可由有限维矩阵系数恢复。环面表示按整数权分解, 而微分只记录这些字符在单位处的一阶变化; 正特征的 Frobenius 和非约化核说明一阶变化可能遗漏更多信息。

型的等距群是相似群的乘子核, 保持伴随对合的内自同构则还要模去中心标量。四元数群在复化后成为熟悉的矩阵群, 但其实际底域上的点仍可大不相同。这些区别是下一章讨论不变量与商时需要保留的对象条件。

习题

习题 21.1*. 设 $(H, \Delta, \varepsilon, S)$ 为域 k 上的 Hopf 代数, 证明 $\varepsilon(S(h)) = \varepsilon(h)$. 提示: 在 $\text{Hom}_k(H, k)$ 的卷积中比较余单位及其逆。

解. 对极等式应用 ε , 得到 $(\varepsilon S) * \varepsilon = \varepsilon = \varepsilon * (\varepsilon S)$, 而余单位公理说明 ε 本来就是在这个卷积代数的单位. 单位的逆仍为单位, 故 $\varepsilon S = \varepsilon$. $\square$

习题 21.2*. 在 $k[t]$ 上取 $\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t$. 计算 $\Delta(t^n)$, 并说明特征 p 时 t^p 仍为本原元. 特征零时全部本原多项式有哪些?

解. 余乘法是代数同态, 故 $\Delta(t^n) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} t^j \otimes t^{n-j}$. 特征 p 下中间二项式系数为零, 得到本原性. 特征零时若非零本原多项式最高次为 $d > 1$, 其余乘法中 $t^{d-1} \otimes t$ 系数为首项系数乘 d , 非零, 矛盾; 常数本原要求 $c = 2c$, 所以为零. 全部本原元恰为 kt . $\square$

习题 21.3*. 设 G 为群. 在 kG 中求满足 $\Delta(u) = u \otimes u$, $\varepsilon(u) = 1$ 的全部元素, 称这类元素为类群元.

解. 写 $u = \sum a_g g$. 左侧仅有 $g \otimes g$, 而右侧不同 g, h 的系数为 $a_g a_h$. 域中不能有两个非零系数, 因此只有一个 $a_g \neq 0$. 比较对角系数得 $a_g = a_g^2$, 余单位又要求它为一. 故类群元恰好是群基 G . $\square$

习题 21.4*. 设 $G = C_2$, 在特征二中比较 kG 与 k^G 的底层代数、类群元及幂零性.

解. 前者同构于 $k[u]/(u^2)$, 其中 $u = s - 1$, 有非零幂零元; 后者为 $k \times k$, 约化. 前者类群元为 $1, s$. 后者的类群元是函数 $f(gh) = f(g)f(h)$, $f(1) = 1$, 即字符 $G \rightarrow k^\times$; 其 $f(s)^2 = 1$ 在特征二只有 $f(s) = 1$, 所以只有常数一. 两者不能因向量空间维数相同而认同. $\square$

习题 21.5*. 在 $U(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 的 Hopf 结构下, 求 $\Omega = h^2 + 2h + 4fe = 8C$ 的余乘法, 其中 C 为本书按 Killing 型归一化的 Casimir 元.

解. 用生成元本原性展开得

$$\Delta(\Omega) = \Omega \otimes 1 + 1 \otimes \Omega + 2h \otimes h + 4f \otimes e + 4e \otimes f.$$

交叉项来自平方 h^2 与乘积 fe . 因此 Casimir 中央并不意味着它是本原元; 它在张量积上的特征值不能只把两因子特征值直接相加. $\square$

习题 21.6*. 设 G 有限, 给出 k^G 上左模与 G -分次空间的对应, 并解释其张量乘法.

解. 点函数 δ_g 是完整正交幂等元, 因此 $V = \bigoplus_g V_g$, $V_g = \delta_g V$. 反过来按各分次片投影定义作用. 由 $\Delta \delta_g = \sum_{ab=g} \delta_a \otimes \delta_b$, 张量积的 g 片是 $\bigoplus_{ab=g} V_a \otimes W_b$. 若群非交换, 交换张量因子一般不保持这个分次. $\square$

习题 21.7*. 验证矩阵余代数的公式 $\Delta(c_{ij}) = \sum_\ell c_{i\ell} \otimes c_{\ell j}$, $\varepsilon(c_{ij}) = \delta_{ij}$. 求其线性对偶代数.

解. 两次余乘法均为 $\sum_{\ell, r} c_{ir} \otimes c_{r\ell} \otimes c_{\ell j}$, 重命名指标即一致; 余单位直接只留下一个求和项. 若对偶基为 e^{ij} , 卷积满足 $e^{ij} e^{rs} = \delta_{jr} e^{is}$, 所以对偶代数为矩阵代数. $\square$

习题 21.8*. 在 $\mathbb{G}_a$ 的正则余模 $k[t]$ 中, 求包含 t^d 的一个有限维子余模. 特征零时证明最小这样的子余模为次数不超过 d 的多项式空间.

解. 二项式公式说明 $W_d = \text{span}\{1, t, \dots, t^d\}$ 稳定. 特征零时 $\Delta(t^d)$ 的第二因子各次系数非零且独立, 用相应系数泛函作用便得到每个 t^j , 故任一含 t^d 的子余模都含 W_d . 正特征下有些系数会消失, 最小性可能改变. $\square$

习题 21.9*. 给出 $\mathbb{G}_m^2$ 在二维空间上的权 $(1, 0), (0, 1)$ 作用, 计算对偶、二次对称幂和外平方的权.

解. 对偶的两个权为 $(-1, 0), (0, -1)$, 因为字符取逆. 对称平方中, 基与权的对应为

$$v_1^2 : (2, 0), \quad v_1 v_2 : (1, 1), \quad v_2^2 : (0, 2).$$

外平方 $v_1 \wedge v_2$ 的权为 $(1, 1)$. 这些结论直接由字符乘法得到, 在任意特征均成立. $\square$

习题 21.10*. 证明 $\mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m$ 的群概形态射恰为 $t \mapsto t^n, n \in \mathbb{Z}$.

解. 坐标同态由可逆 Laurent 多项式的像 u 决定, Hopf 条件要求其类群元. 写有限 Laurent 和, 比较 $\Delta(u)$ 与 $u \otimes u$, 如群代数的系数论证可知 $u = t^n$. 反向每个这样的公式显然满足全部结构等式. $\square$

习题 21.11*. 在特征零域上, 证明代数群同态 $\mathbb{G}_a \rightarrow \mathbb{G}_m$ 必为平凡, 而 $\mathbb{G}_a \rightarrow \mathbb{G}_a$ 恰为 $t \mapsto ct$.

解. 前者对应把 $k[u, u^{-1}]$ 映到 $k[t]$, 但 $k[t]$ 的单位只有非零常数, 单位点条件使该常数为 1. 后者的坐标像必须本原, 前题已证全部本原多项式为 ct , 反向加法性显然. $\square$

习题 21.12*. 设 k 特征为零, 给 $\mathbb{G}_a$ 一个三维有理表示, 微分为单个三阶幂零 Jordan 块 N . 写出表示矩阵并求不动空间.

解. 以 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 有

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

一个向量被所有参数固定, 当且仅当各个 t 次系数作用为零, 等价于 $Nv = 0$. 因此不动空间是第一坐标轴, 维数一. $\square$

习题 21.13*. 在特征 p 中, 比较平凡的一维 $\mathbb{G}_m$ 表示与字符 t^p 的表示: 其微分与有理群表示是否相同?

解. 平凡字符的微分为零, t^p 的导数也为零, 所以两个 Lie 代数表示相同. 但坐标 Laurent 多项式 1 与 t^p 不同, 故群概形表示不同; 在代数闭域的点上也可选 $t^p \neq 1$. 微分在这里不忠实. $\square$

习题 21.14*. 设 k 代数闭且特征为 p . 计算 $\alpha_p(k), \alpha_p(k[\epsilon]/(\epsilon^2))$, 并与平凡群概形比较.

解. 域中 $a^p = 0$ 只可能 $a = 0$, 所以第一点群平凡. 双数环中 $a + b\epsilon$ 的 p 次幂为 a^p , 故全部 $b\epsilon$ 都给点, 组成与 $(k, +)$ 同构的群. 平凡群概形在任何代数上只有一个点, 所以两者不同. $\square$

习题 21.15*. 设 $A = k[\mathrm{GL}_n]$. 证明约束 $\det X = 1$ 生成 Hopf 理想, 并求其单位处线性化.

解. $\Delta(\det X - 1) = (\det X - 1) \otimes \det X + 1 \otimes (\det X - 1)$, 余单位为零, 对极将它送为 $-(\det X)^{-1}(\det X - 1)$. 故为 Hopf 理想. 模 ϵ^2 有 $\det(I + \epsilon Y) = 1 + \epsilon \operatorname{tr} Y$, 线性化条件为迹零, 在任意特征成立. $\square$

习题 21.16*. 求 U_3 的中心和交换子子群, 并说明它与加法群三重直积不同.

解. 按正文坐标, 交换子为 $(0, 0, ab' - a'b)$. 若与全部 (a', b', c') 交换, 必须 $a = b = 0$, 故中心是全部 $(0, 0, c)$. 取 $a = 1, b' = c, a' = b = 0$ 可实现每个中心元, 所以交换子子群等于中心. 该群非交换, 而三个加法群直积交换. $\square$

习题 21.17*. 对实型 b 的矩阵 $H = \operatorname{diag}(1, -1)$, 求相似乘子的像, 并给出乘子为 -1 的矩阵.

解. 交换坐标的 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 满足 $P^T H P = -H$. 正乘子由实标量 $\sqrt{c}I$ 实现, 负乘子由 $\sqrt{-c}P$ 实现, 故像为全部 $\mathbb{R}^\times$. 正定型只能有正乘子, 所以型的选择影响实际像. $\square$

习题 21.18*. 设 b 为非退化型, $a \in K^\times$. 证明标量矩阵 aI 总给相似变换, 但其在自同态代数上的内自同构恒等. 由此区分三个群.

解. 有 $(aI)^* H (aI) = \bar{a}aH$, 所以乘子为 $\bar{a}a$. 标量与每个矩阵交换, 故内自同构恒等. 只有 $\bar{a}a = 1$ 时它等距; 相似群包含更多标量, 而对合代数自同构群已经把这些标量全都商掉. $\square$

习题 21.19*. 证明实点映射 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的像恰为正行列式射影类, 核为 $\{\pm I\}$.

解. 标量缩放把行列式乘实平方, 所以像必有正号. 若 $\det A > 0$, 则 $(\det A)^{-1/2}A$ 行列式一, 给原射影类的原像. 核是标量 aI 且 $a^2 = 1$, 正为两个元. 负行列式类没有原像. $\square$

习题 21.20*. 在 $\mathbb{H}$ 中令 $q = (1 + i + j + k)/2$. 计算共轭在基 i, j, k 上的矩阵, 以及该矩阵的行列式.

解. 四元数范数为一, 所以 $q^{-1} = (1 - i - j - k)/2$. 使用 $ij = k, jk = i, ki = j$ 及反向乘积变号, 逐项相乘得到 $qiq^{-1} = j, qjq^{-1} = k, qkq^{-1} = i$. 矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 是三轮换矩阵, 行列式一. 它固定 $i + j + k$, 在其正交平面上是三分之一整周的旋转; q 与 $-q$ 仍给相同作用. $\square$

习题 21.21*. 对 $n \geq 2, m \geq 0$, 证明自然 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ 表示 $\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^n)$ 能通过中心商 $\mathrm{PGL}_n(\mathbb{C})$, 当且仅当 $n \mid m$; 并在 $n = 2$ 时把条件写成字符格条件.

解. SL_n 的中心由 ζI 、 $\zeta^n = 1$ 组成, 在每个纯 m 次张量及其对称商上按 ζ^m 作用。由于复数域有本原 n 次单位根, 中心作用平凡恰当 $n \mid m$ 。任意复可逆矩阵都可乘以标量使行列式为一, 故这个中心商正是 $PGL_n(\mathbb{C})$, 核平凡作用便允许下降。对 $n = 2$, 环面最高权为 $m\lambda$, 下降要求它属于根格 $2\mathbb{Z}\lambda$, 即 m 偶数。 $\square$

习题 21.22*. 取一个交换 Hopf 代数 A 。证明每个 R 点的逆由 gS 给出时, 还满足 $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$, 并解释为何不能据此认为 $G(R)$ 交换。

解. Hopf 对极给卷积逆, 任意结合群中双边逆唯一, 故 $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$ 。 A 交换保证卷积结果仍是代数同态, 却不保证其余乘法余交换。以 $A = k[GL_2]$ 为例, 点群仍为通常的非交换矩阵群。 $\square$

第二十二章* 不变量理论与商

本章研究群作用下的不变环：证明有限群情形的有限生成与次数界，计算生成元和关系，再以矩阵配对及商的几何意义讨论连续群作用。

本章目标

- 区分形式多项式、点集函数、轨道分离及轨道闭包。
- 证明有限群不变环有限生成，利用次数界找到生成集，并用 Molien 公式计算各次维数。
- 为具体不变环求出生成元和全部关系，保持正确的分次。
- 把 Schur–Weyl 对偶转化为配对不变量定理，理解协变式与相对不变量。
- 解释仿射商合并非闭轨道的方式，并辨认线性约化与几何约化的不同作用。

交换两个变量 x, y 不改变 $s = x + y$ 与 $p = xy$ 。例如 $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$ ，更高次数的对称多项式也可以逐次消去最高项，改写成 s, p 的多项式。这里有两件不同的事：找到显然不变的候选元，以及证明它们已经生成全部不变量。对一般群作用还要再问，候选元之间是否存在关系，关系是否已经找全。本章从有限群的轨道多项式和平均算子入手，再用消去与 Hilbert 级数处理关系，最后研究连续群作用下商的几何意义。

第 22.1—22.4 节从有限群作用出发，利用第 1、2 章及多项式环、有限生成模的基本性质，求不变环的候选生成元并核对其全部关系。第 22.5 节的配对定理使用定理 7.3.3。第 22.6、22.7 节则使用第 21 章的坐标环与有理余模；其中有限群商、矩阵闭轨道和线性约化有限生成在此证明，一般正特征约化群的有关结论引用文献中的结果。

不变环的计算涉及三个不同的问题：确定作用与底域，证明候选元生成整个不变环，以及求出它们之间的全部关系。本章在这些计算的基础上讨论商的几何意义。关于极化、几何约化以及商的进一步背景，可参阅 [2, Sections 1.2, 3.4 and 6.1, Chapters 7–9]。

22.1 群作用与不变多项式

矩阵的元素会随基改变，特征多项式却保持不变。一个多项式的根可以重新编号，根的初等对称式却仍是原来的系数。不变量理论研究哪些多项式在给定作用下保持不变，以及这些多项式能辨认多少对象。

22.1.1 线性作用、函数上的作用与不变子环

定义 22.1.1. 设 k 为域， V 为有限维 k 向量空间，群 G 通过线性自同构作用在 V 上。在 $k[V] = \text{Sym}(V^*)$ 上定义

$$(g \cdot f)(v) = f(g^{-1}v).$$

此处等式由线性代入解释为形式多项式恒等式。满足 $g \cdot f = f$ 对所有 $g \in G$ 成立的多项式组成子代数

$$k[V]^G = \{ f \in k[V] \mid g \cdot f = f \text{ 对所有 } g \in G \},$$

称为作用的**不变环** (invariant ring), 其中的元素称为多项式不变量。

逆元保证 $g \cdot (h \cdot f) = (gh) \cdot f$ 。先在 V^* 上取对偶作用, 再乘法延拓, 就得到同一定义。它保持全次数; 若 $S_d = \text{Sym}^d(V^*)$, 则 $k[V]^G = \bigoplus_{d \geq 0} S_d^G$ 。有限域上的形式多项式不能等同于点集函数, 例如非零多项式 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_q$ 每一点取零。因此本章的不变性始终指代数中的等式。

例 22.1.2. 设 $\text{char } k \neq 2$, 阶二群由 s 生成, 在 k^2 上同时变号。则 $s \cdot x = -x, s \cdot y = -y$, 单项式 $x^a y^b$ 不变当且仅当 $a + b$ 为偶数。若两指数均偶, 它是 x^2, y^2 的乘积; 若均奇, 先提出 xy 。故

$$k[x, y]^{(s)} = k[x^2, xy, y^2].$$

生成元满足 $(xy)^2 = x^2 y^2$ 。找到生成元之后, 还须求出它们之间的全部关系。

22.1.2 有限群的轨道与不变量分离

同一轨道上的不变量值必然相同。有限群情形的逆命题不需要除以群阶, 但要在几何点上陈述。

命题 22.1.3. 设 k 为代数闭域, 有限群 G 通过代数自同构作用在仿射代数集 X 上。若 $x, y \in X(k)$ 不在同一轨道, 则存在 $F \in k[X]^G$ 满足 $F(x) = 0, F(y) = 1$ 。

证明. 两个轨道是互不相交的有限点集。不同点的极大理想两两互素, 中国剩余定理给出 $f \in k[X]$, 使它在 Gx 上取零, 在 Gy 上取一。令 $F = \prod_{g \in G} g \cdot f$ 。群作用只置换乘积因子, 所以 F 不变; 在 x 处每个因子为零, 在 y 处每个因子为一。□

一般域上的几何轨道要扩到代数闭包后考察。一般无限群也没有上述结论: $k^\times$ 在直线上按数乘作用时, 零点与非零点属于不同轨道, 却只有常数不变量。

22.1.3 平均法与 Reynolds 算子

命题 22.1.4. 设 k 为域, 有限群 G 通过 k 代数自同构作用在交换含幺 k 代数 A 上, A^G 为其不变子代数, 且 $|G|$ 在 k 中可逆。则

$$\mathcal{R}: A \longrightarrow A^G, \quad \mathcal{R}(f) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot f$$

是 A^G 线性投影, 即 $\mathcal{R}|_{A^G} = 1$, 且 $\mathcal{R}(af) = a\mathcal{R}(f)$ 对 $a \in A^G$ 成立。若作用保持分次, 则 $\mathcal{R}$ 保持次数。此映射称为 **Reynolds 算子** (Reynolds operator)。

证明. 作用于求和式的群元素只重排指标, 所以像落在 A^G 。不变元的各求和项相同, 平均后仍为原元。对不变的 a , 每项 $g \cdot (af) = a(g \cdot f)$, 提出 a 即得线性性。保次数则由各求和项直接得到。□

这个投影通常不保持乘法。变号作用下 $\mathcal{R}(x) = 0$ ，但 $\mathcal{R}(x^2) = x^2$ 。其主要用处是处理系数：若 $f = \sum_i a_i f_i$ ，而 f, f_i 都不变，则

$$f = \sum_i \mathcal{R}(a_i) f_i.$$

这使一个带任意系数的等式转化为带不变系数的等式。

22.2 有限生成与次数界

有限生成代数的子环未必有限生成。有限群作用提供了额外的整性条件；特征零时，平均法与极化还给出可以停止计算的明确次数。

22.2.1 轨道多项式与整性

命题 22.2.1. 设 k 为域，有限群 G 通过 k 代数自同构作用在交换含么 k 代数 A 上， A^G 为其不变子代数。则每个 $a \in A$ 都在 A^G 上整。若 A 是有限生成 k 代数，则 A 是有限生成 A^G 模。

证明. 多项式

$$P_a(T) = \prod_{g \in G} (T - g \cdot a)$$

首一，其系数因群作用只置换因子而不变，且 $P_a(a) = 0$ 。若 $A = k[a_1, \dots, a_n]$ ，则也有 $A = A^G[a_1, \dots, a_n]$ 。设 a_i 满足次数 d_i 的首一整性方程。反复用它降低指数，得到以下有限个 A^G 模生成元：

$$\{a_1^{e_1} \cdots a_n^{e_n} \mid 0 \leq e_i < d_i\}.$$

□

轨道多项式允许重复因子，特征也可以整除群阶。下一步用 Artin–Tate 引理¹，由模的有限生成性推得不变环的有限生成。

22.2.2 模的有限生成性及 Artin–Tate 引理

引理 22.2.2 (Artin–Tate). 设 k 为域， $k \subseteq B \subseteq A$ 为交换含单位代数。若 A 是有限生成 k 代数，又是有限生成 B 模，则 B 是有限生成 k 代数。

证明. 取 $A = k[a_1, \dots, a_n]$ ，并取 B 模生成元 $e_1, \dots, e_r$ ，增补后可设 $e_1 = 1$ 。将各 a_i 与各 $e_j e_\ell$ 写成 e_j 的 B 线性组合，由这些有限多个系数生成的 k 子代数记为 B_0 。模 $M = \sum_j B_0 e_j$ 包含一和全部 a_i ，又因已收齐乘法结构系数而对乘法封闭。因此 $A \subseteq M \subseteq A$ ，即 A 是有限生成的 B_0 模。

B_0 为有限生成 k 代数，由 Hilbert 基定理为 Noether 环。因此 A 作为 B_0 模有限生成，其子模 B 也有有限生成元 $b_1, \dots, b_s$ ，从而 $B = B_0[b_1, \dots, b_s]$ ，这是有限生成 k 代数。 □

¹泰特 (John Torrence Tate, 1925-2019)，美国数学家，在代数数论、椭圆曲线和代数几何方面作出重要贡献；阿廷已在本卷前文介绍。

不能直接对尚不知为 Noether 环的 B 使用子模有限生成；引入 B_0 正是为了避免循环。

22.2.3 有限群不变量的有限生成

定理 22.2.3. 设 k 为任意域，有限群 G 通过 k 代数自同构作用在有限生成交换含么 k 代数 A 上， A^G 为其不变子代数。则 A^G 是有限生成 k 代数，且 A 是有限生成 A^G 模。若 $A = k[V] = \text{Sym}_k(V^*)$ 来自有限维 k 线性表示 V ，可以取齐次不变量作为代数生成元。

证明. 由命题 22.2.1, A 作为 $B = A^G$ 模有限生成，再使用引理 22.2.2。在线性作用下，各齐次分量分别不变，将已有有限生成元全部拆成齐次分量，所得有限集仍生成整个不变环。□

模特征中失效的是平均法，而非此定理。例如在特征 $p > 0$ 中，令阶 p 群在 $k[x, y]$ 上由 $\sigma(x) = x + y$, $\sigma(y) = y$ 生成。元素 $z = x^p - xy^{p-1}$ 不变，而且

$$k[x, y]^{\langle \sigma \rangle} = k[y, z]. \quad (22.1)$$

事实上，首一关系 $x^p = z + xy^{p-1}$ 使每个多项式唯一写为 $\sum_{i=0}^{p-1} a_i(y, z)x^i$ 。唯一性来自各项最高 x 次数模 p 不同。若某个正指标的 $a_i \neq 0$ ，取最大的 i ；在 $\sigma(f) - f$ 中，基向量 x^{i-1} 的系数是 $iy a_i \neq 0$ ，矛盾。于是只剩 a_0 。

22.2.4 Noether 次数界与有效计算

定理 22.2.4 (特征零下的 Noether 次数界). 设 k 为特征零域，有限群 G 线性作用在有限维 k 向量空间 V 上， $m = |G|$, $k[V] = \text{Sym}_k(V^*)$ 为多项式函数代数，各线性函数的次数为一。则不变环 $k[V]^G$ 由全次数不超过 m 的齐次不变量生成。

证明. 令 $S = k[V]$ ，并令 $J \subseteq S$ 为次数在 $1, \dots, m$ 内的全部齐次不变量生成的理想。对任意线性形式 $\ell \in V^*$ ，有

$$\prod_{g \in G} (T - g \cdot \ell) = T^m + c_1 T^{m-1} + \dots + c_m, \quad c_i \in S_i^G.$$

代入 $T = \ell$ ，得到 $\ell^m \in J$ 。

对任意 $\ell_1, \dots, \ell_m \in V^*$ ，容斥展开给出极化等式

$$m! \ell_1 \cdots \ell_m = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, m\}} (-1)^{m-|I|} \left(\sum_{i \in I} \ell_i \right)^m.$$

遗漏某个指标的项相消，所有指标各出现一次的项共有 $m!$ 个。特征零使 $m!$ 可逆，因此 $S_m \subseteq J$ ，进而 $S_d \subseteq J$ 对 $d \geq m$ 成立。

在每个 S_i^G ($1 \leq i \leq m$) 取基，合并记为 $f_1, \dots, f_r$ ，其生成的代数记为 B 。对次数归纳。次数不超过 m 的不变量已在 B 中。若 $f \in S_d^G$, $d > m$ ，可写

$$f = \sum_j a_j f_j, \quad \deg a_j = d - \deg f_j < d,$$

其中取齐次系数即可。应用命题 22.1.4 得 $f = \sum_j \mathcal{R}(a_j)f_j$ 。各系数是不变元且次数下降，由归纳假设属于 B ，故 $f \in B$ 。最后拆分齐次分量便得到全部结论。□

因而只需在次数 $1, \dots, |G|$ 中列出单项式，计算其平均，并用线性代数选基，就能找到有限生成集。它通常冗余，且单项式数目可能很大；次数界保证终止，不保证快速。

上述证明也适用于特征大于 $|G|$ 的域。群阶可逆而特征不大于群阶时，极化所需的阶乘仍可能为零，因而仅由本证明不能得到同一次数界。模特征则应另用具体构造，例如(22.1)。

22.3 Hilbert 级数与 Molien 公式

有限生成告诉我们最终可以找到一张有限的生成元表，但没有立即给出每个次数有多少独立不变量。把这个维数问题转成迹的计算，就能直接使用有限群特征标。本节在复数域上讨论，以便将迹与整数维数明确对应。

22.3.1 齐次不变量的维数与特征标

定义 22.3.1. 设 k 为域， $A = \bigoplus_{d \geq 0} A_d$ 为非负分次 k 代数，每个 A_d 都是有限维 k 向量空间。形式幂级数

$$H_A(t) = \sum_{d \geq 0} (\dim_k A_d) t^d \in \mathbb{Z}[[t]]$$

称为 A 的 **Hilbert 级数** (Hilbert series)。其分次属于数据的一部分；生成元的次数不是一时，不能擅自按次数一计算。

例如次数为 $a_1, \dots, a_r > 0$ 的多项式环有级数

$$\prod_{i=1}^r (1 - t^{a_i})^{-1},$$

因为展开各几何级数就是按单项式的次数计数。这里不要求 t 是复数，也没有收敛问题。

引理 22.3.2. 设有限群 G 作用在有限维复空间 W 上。则

$$\dim W^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{tr}(g | W).$$

证明. 平均算子是像为 W^G 的幂等算子。按像与核分解 W ，其矩阵为 $\text{diag}(I, 0)$ ，故迹等于像的维数；迹的线性性给出右端。□

应用于 $W = \text{Sym}^d(V^*)$ ，便把第 d 次不变量的数目写成对称幂特征标的平均。模特征中，即使偶然可以构造别的投影，域内的迹也至多记录维数在该域中的像，不能直接恢复整数维数。

22.3.2 Molien 公式

定理 22.3.3 (Molien 公式). 设有限群 G 线性作用在有限维复向量空间 V 上, g_V, g_{V^*} 分别表示 $g \in G$ 在 V 及对偶空间上的算子, I 为相应恒等算子. 记 $H_{\mathbb{C}[V]^G}(t)$ 为不变环按多项式总次数分次的 Hilbert 级数, 则

$$H_{\mathbb{C}[V]^G}(t) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \frac{1}{\det(I - tg_{V^*})} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \frac{1}{\det(I - tg_V)}.$$

两端均按 $t = 0$ 展开为形式幂级数。

证明. 每个 g 有有限阶, 在复数域上可对角化. 设其在 V^* 上的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 在特征向量的单项式基下,

$$\sum_{d \geq 0} \operatorname{tr}(g | \operatorname{Sym}^d(V^*)) t^d = \sum_{a_1, \dots, a_n \geq 0} \lambda_1^{a_1} \dots \lambda_n^{a_n} t^{a_1 + \dots + a_n} = \prod_i (1 - \lambda_i t)^{-1}.$$

现在逐次使用引理 22.3.2, 有限求和可以与形式级数相交换, 得到第一式. 对偶作用的矩阵为 g_V^{-T} , 而 $g \mapsto g^{-1}$ 置换群元素, 所以求和后可把它换成 g_V , 得到第二式. 两式相等不表示两个对应单项对每个 g 都相等. $\square$

计算时可按共轭类求和, 因为同一共轭类的特征多项式相同. 级数的系数虽写成单位根表达式的平均, 最终必为非负整数, 正是各次不变子空间的维数。

22.3.3 循环群与小型反射群的计算

令 C_m 在一维复空间上由本原 m 次单位根 ζ 数乘. 只有 x^{jm} 不变, 故

$$\frac{1}{m} \sum_{r=0}^{m-1} \frac{1}{1 - \zeta^r t} = \frac{1}{1 - t^m}.$$

直接展开左端也能看到这一点: t^d 的系数是 $\frac{1}{m} \sum_r \zeta^{rd}$, 它在 $m \mid d$ 时为一, 其余为零。

例 22.3.4. 对同时变号的二维作用, 单位元与非平凡元分别贡献 $(1-t)^{-2}$ 、 $(1+t)^{-2}$, 所以

$$H(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(1-t)^2} + \frac{1}{(1+t)^2} \right) = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2} = \frac{1-t^4}{(1-t^2)^3}.$$

因此次数 $2r$ 的维数为 $2r+1$, 奇数次维数为零. 最后一个表达式与三个二次生成元、一个四次关系相容; 仅由级数本身, 还不能断定存在这样的展示。

再让 S_3 置换 $\mathbb{C}^3$ 的坐标. 单位元、三个换位、两个三轮换分别给出

$$H(t) = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{(1-t)^3} + \frac{3}{(1-t)^2(1+t)} + \frac{2}{1-t^3} \right) = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)(1-t^3)}.$$

这与初等对称多项式的次数 1, 2, 3 一致. 在反射表示 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 上, 平凡的一维方向被去掉; 由于特征为零, 分解为该平面与平凡直线是直和, 故其级数为

$$\frac{1}{(1-t^2)(1-t^3)}.$$

例如二次与三次不变量空间各一维, 六次则有两个独立候选 e_2^3, e_3^2 . 下一节说明如何把这种计数用于检验生成元及其关系。

22.4 生成元、关系与 Gröbner 计算

一个候选不变量很容易检验；困难在于证明没有遗漏其他生成元，以及没有遗漏生成元之间的关系。这两种完备性需要不同的理由。次数界解决第一项，消去和分次维数可以解决第二项。

22.4.1 齐次生成元的搜索与完备性

设 G 已由有限个矩阵给出，并已列出其全部元素，在可有效进行四则运算的特征零域 k 上作用于 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 。以下是一种有限的计算方法。步骤一、二求得整个

算法 22-1 Reynolds 平均生成元搜索

输入： 特征零的精确可计算域 k 、有限群 G 的全部作用矩阵，以及 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 。

输出： S^G 的有限齐次代数生成集。

- 1: 对每个 $1 \leq d \leq |G|$ ，列出全部次数为 d 的单项式，计算其 Reynolds 平均。
 - 2: 把所得多项式按单项式坐标写成列向量，经消元取出 S_d^G 的一组基。
 - 3: 逐次处理各 d 。把先前保留的生成元的所有次数为 d 的乘积展开，取其线性生成空间；从所取的基中保留补足该空间所需的元素。
-

S_d^G ，因为投影把一个生成集送到像的生成集。步骤三仅删除已经属于先前生成子代数的元，不改变最终生成的代数。定理 22.2.4 保证在次数 $|G|$ 后停止时已经生成 S^G 。零平均必须删去，但不能只因两个候选次数相同就认为它们冗余。

此法以已知的有限群及精确系数运算为输入，输出一个有限齐次生成集；它不是关于任意给定矩阵群是否有限的判定算法。即使群很小，单项式空间也可能很大，故这里的终止性不应读成复杂度保证。

22.4.2 用消去求生成元之间的关系

命题 22.4.1. 设 k 为域， $f_1, \dots, f_r \in k[x_1, \dots, x_n]$ ，定义

$$\phi : k[u_1, \dots, u_r] \longrightarrow k[x_1, \dots, x_n], \quad u_i \mapsto f_i.$$

在大多项式环 $k[x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_r]$ 中令

$$J = (u_1 - f_1, \dots, u_r - f_r).$$

则 $\ker \phi = J \cap k[u_1, \dots, u_r]$ 。若 $\mathcal{G}$ 是 J 在消去 x 变量的单项式序下的 Gröbner 基²，则 $\mathcal{G} \cap k[u_1, \dots, u_r]$ 是这个核的 Gröbner 基。

证明. 代入 $u_i = f_i(x)$ 定义从大环到 $k[x]$ 的满射，其核为 J ：按各 $u_i - f_i$ 逐次除法，任意多项式模 J 化为其代入所得的多项式。把这张映射限制在 $k[u]$ 就是 ϕ ，所以核为所述交。

²格罗布纳 (Wolfgang Gröbner, 1899-1980)，奥地利数学家，研究代数几何与消去理论；Gröbner 基由其学生布赫贝格尔命名以纪念他。

消去序的条件是每个含 x 的单项式都大于所有只含 u 的单项式。若 $h \in J \cap k[u]$ 非零, 其首项被某个 $g \in \mathcal{G}$ 的首项整除。于是 g 的首项只含 u , 消去序又迫使 g 的所有项只含 u 。故交集集中的基元已经控制核的全部首项, 这正是 Gröbner 基的定义。□

因而求关系的步骤是: 引入独立变量 u_i , 生成 J , 在消去序下计算 Gröbner 基, 然后保留不含 x 的基元。若 f_i 已证明生成 $k[V]^G$, 得到的商环才是不变环; 否则它只展示子代数 $k[f_1, \dots, f_r]$ 。构造 J 本身不会证明候选生成元充分。

22.4.3 用 Hilbert 级数核验展示

引理 22.4.2. 设 k 为域, A, B 为每个齐次分量都有限维的非负分次 k 代数, $\psi: A \rightarrow B$ 为保持次数的满射, H_A, H_B 为相应 Hilbert 级数。若 $H_A(t) = H_B(t)$, 则 ψ 是同构。

证明. 逐次取核得到

$$0 \longrightarrow (\ker \psi)_d \longrightarrow A_d \longrightarrow B_d \longrightarrow 0.$$

维数相等使每个核分量为零, 而分次核是这些分量的直和, 故整个核为零。□

例如 u_i 的次数为 $a_i > 0$, 齐次非零多项式 $F \in k[u_1, \dots, u_r]$ 的次数为 b 。多项式环为整环, 乘 F 的映射单射, 所以

$$H_{k[u]/(F)}(t) = \frac{1 - t^b}{\prod_i (1 - t^{a_i})}.$$

这来自次数平移的短正合列, 而不是从“一个关系”凭直觉减去一项。多个关系只有在另行建立正则序列等条件后, 才可逐项作同样的乘法。

22.4.4 循环作用的完整算例

命题 22.4.3. 设 k 为特征不为二的域, 二阶循环群 C_2 的非单位元在 $k[x, y]$ 上把 x, y 分别变为 $-x, -y$ 。则存在分次同构

$$k[u, v, w]/(uw - v^2) \simeq k[x, y]^{C_2}, \quad (u, v, w) \mapsto (x^2, xy, y^2),$$

其中 x, y 的次数为一, u, v, w 的次数均为二。

证明. 例 22.1.2 已按单项式的指数奇偶证明满射。关系 $uw - v^2$ 显然落入核。模此关系, 每个多项式都可化为

$$A(u, w) + v \cdot B(u, w).$$

其像的第一部分只含 x, y 指数均偶的单项式, 第二部分只含指数均奇的单项式。这两组互不相交, 各组内不同 $u^a w^b$ 也给出不同单项式, 故若像为零, 所有系数为零。于是没有其他关系。□

在消去计算中, 同一个核由首项为 v^2 的单元素 Gröbner 基 $\{v^2 - uw\}$ 控制, 标准单项式正是上述两组。它们给出

$$H(t) = \frac{1 + t^2}{(1 - t^2)^2}.$$

在复数域上,这也与例 22.3.4 相符。两种核验使用的资料不同:单项式法直接证明线性无关, Molien 法则在已有满射后比较维数。

这个例子还能推广。设 k 含本原 m 次单位根,且特征不整除 m , 令生成元在坐标环上作用为

$$x \mapsto \zeta x, \quad y \mapsto \zeta^{-1}y.$$

不变条件是 $m \mid (a-b)$ 。从 $x^a y^b$ 先提出 $(xy)^{\min(a,b)}$, 余下是 x^m 或 y^m 的幂, 因而

$$k[x, y]^{C_m} \simeq k[u, v, w]/(uv - w^m), \quad (u, v, w) = (x^m, y^m, xy). \quad (22.2)$$

为验证全部关系, 将含 uv 的项用 w^m 消去, 留下

$$w^c, \quad u^a w^c \ (a \geq 1), \quad v^b w^c \ (b \geq 1).$$

代入后的指数差分别为零、正的 m 倍、负的 m 倍, 且每类内指数唯一决定原单项式, 所以这些像线性无关。分次为 $\deg u = \deg v = m, \deg w = 2$, 于是级数为

$$\frac{1 - t^{2m}}{(1 - t^m)^2(1 - t^2)}.$$

当 $m = 2$ 时, 只是前三个生成元的名称与上例有所调换。

22.5 经典不变量与协变式

不同的群产生不同的不变量问题。置换坐标保留对称多项式, 改变矩阵的基保留特征多项式, 同时改变向量与对偶向量则保留配对。本节从这些具体作用中证明几类基本结果, 并说明不变量之外还有相对不变量和协变式。

22.5.1 对称多项式与反射群的例子

这一基本定理的主要证明已在第一卷定理 12.4.4 给出。为使本节的对称群与矩阵例子能够独立阅读, 下面回顾陈述及首项消去证明, 并保留它在正特征中的适用范围。

定理 22.5.1 (对称多项式基本定理). 设 k 为域, S_n 置换 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的变量。令 e_i 为 i 次初等对称多项式, 则

$$k[x_1, \dots, x_n]^{S_n} = k[e_1, \dots, e_n],$$

且 $e_1, \dots, e_n$ 代数独立。此结论不要求特征零。

证明. 固定字典序 $x_1 > \dots > x_n$, 先处理齐次对称多项式 f 。其首单项式为 $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$, 必有 $a_1 \geq \dots \geq a_n$: 若 $a_i < a_j$ 且 $i < j$, 互换这两个变量便出现更大的同系数单项式, 矛盾。多项式

$$e_1^{a_1 - a_2} e_2^{a_2 - a_3} \dots e_{n-1}^{a_{n-1} - a_n} e_n^{a_n}$$

恰有该首单项式, 首系数为一。乘以 f 的首系数后相减, 首项严格下降。全次数不变, 而同次数只有有限多个单项式, 所以有限步后余式为零。拆分齐次分量就证明生成性。

另一方面, 不同的 $e_1^{b_1} \cdots e_n^{b_n}$ 的首指数是

$$(b_1 + \cdots + b_n, b_2 + \cdots + b_n, \dots, b_n),$$

它唯一确定 $(b_1, \dots, b_n)$ 。非零多项式关系中的最大首项因而不可能相消, 所以不存在这样的关系。□

还可令符号置换群 $(C_2)^n \rtimes S_n$ 作用在特征不为二的 k^n 上。先对各坐标独立变号取不变量, 得到 $k[x_1^2, \dots, x_n^2]$; 再对置换取不变量, 得到

$$k[e_1(x_1^2, \dots, x_n^2), \dots, e_n(x_1^2, \dots, x_n^2)].$$

其基本次数为 $2, 4, \dots, 2n$ 。这里两步都给出了生成性的证明。这是反射群具有多项式不变环的典型例子; 一般复有限反射群的多项式性及其逆命题属于 Chevalley–Shephard–Todd 定理³, 不能仅由这两个例子推广得出。

22.5.2 矩阵共轭下的特征多项式与迹

定理 22.5.2. 设 k 为代数闭域, $n \geq 1$ 为整数, $\mathrm{GL}_n(k)$ 在 $M_n(k)$ 上按共轭作用, $k[M_n]$ 表示矩阵空间的多项式函数代数。对 $A \in M_n(k)$, 定义特征多项式的系数函数 c_i 为

$$\det(TI - A) = T^n - c_1(A)T^{n-1} + \cdots + (-1)^n \cdot c_n(A).$$

则 $k[M_n]^{\mathrm{GL}_n} = k[c_1, \dots, c_n]$, 且这些生成元代数独立。若 $\mathrm{char} k = 0$, 也可用 $\mathrm{tr}(A), \dots, \mathrm{tr}(A^n)$ 生成。

证明. 把不变量 f 限制到对角矩阵。置换矩阵共轭说明这个限制是对称多项式, 故由定理 22.5.1 等于某个 $P(e_1, \dots, e_n)$ 。于是 $f - P(c_1, \dots, c_n)$ 在对角矩阵及其全部共轭矩阵上为零。

特征多项式有互异根的矩阵构成非空 Zariski 开集: 其补集是判别式多项式的零集, 而取互异对角元证明该多项式非零。仿射空间的非空开集稠密, 这个开集中的矩阵都可对角化。因此差多项式在稠密集上为零, 只能恒为零, 得到生成性。任何 c_i 的关系限制到对角矩阵就是 e_i 的关系, 故代数独立。

令 $p_j(A) = \mathrm{tr}(A^j)$, 并置 $c_0 = 1$ 。在对角矩阵上使用 Newton 恒等式⁴, 再由稠密性延拓, 得到

$$rc_r = \sum_{j=1}^r (-1)^{j-1} c_{r-j} p_j \quad (1 \leq r \leq n).$$

特征零允许逐次除以 r , 故每个 c_r 都在前 r 个迹生成的代数中。反向也由这些恒等式递推得到。□

特征多项式相同并不意味着共轭。例如零矩阵与非零的二阶幂零 Jordan 块有相同特征多项式, 因而所有多项式不变量都相同, 却有不同的秩。多个矩阵的同时共轭涉及 $\mathrm{tr}(A_{i_1} \cdots A_{i_r})$ 等迹字; 上面的对角化证明不能用于一组未必交换的矩阵, 本节只处理单矩阵。

³谢泼德 (Geoffrey Colin Shephard, 1927-2016) 和托德 (John Arthur Todd, 1908-1994) 都是英国数学家, 研究几何及有限复反射群; 舍瓦莱已在本卷前文介绍。

⁴牛顿 (Isaac Newton, 1642/1643-1727), 英国数学家、物理学家, 奠定经典力学并独立发展微积分。

22.5.3 向量与对偶向量的配对不变量

定理 22.5.3 (一般线性群的配对不变量). 设 k 为特征零域, V 为有限维非零 k 向量空间, $r, s \geq 0$ 为整数. 群 $\mathrm{GL}(V)$ 在

$$W = V^{\oplus r} \oplus (V^*)^{\oplus s}$$

上同时按原作用与对偶作用. 则 $k[W]^{\mathrm{GL}(V)}$ 由配对

$$p_{ji}(v_1, \dots, v_r, \phi_1, \dots, \phi_s) = \phi_j(v_i)$$

生成。

证明. 先处理对每个向量、对偶向量变量都一次齐次的多线性不变量, 共有 a 个向量变量和 b 个对偶向量变量. 标量矩阵 tI 使函数值乘以 t^{a-b} . 域 k 无限, 若 $a \neq b$, 选 t 使此因子不等于一, 就知道该函数为零. 因此只需 $a = b = d$.

这时一个多线性函数 F 唯一对应算子 $A \in \mathrm{End}_k(V^{\otimes d})$, 使

$$F(v_1, \dots, v_d, \phi_1, \dots, \phi_d) = (\phi_1 \otimes \dots \otimes \phi_d)(A(v_1 \otimes \dots \otimes v_d)).$$

有限维张量配对的非退化性给出存在性与唯一性. F 不变当且仅当 A 与每个 $g^{\otimes d}$ 交换.

定理 7.3.3 的第二个中心化子等式说明, A 是因子置换算子 P_σ 的线性组合. 其对应函数为

$$\prod_{j=1}^d \phi_j(v_{\sigma^{-1}(j)}),$$

故每个多线性不变量都是配对乘积的线性组合. 次数零的情形只给常数。

最后对一般不变量 f 取多重齐次分量; 作用不混合各变量组, 所以每个分量仍不变. 设它在 v_i 上的次数为 a_i , 在 ϕ_j 上的次数为 b_j . 将

$$v_i = \sum_{\nu=1}^{a_i} t_{i\nu} v_{i\nu}, \quad \phi_j = \sum_{\mu=1}^{b_j} u_{j\mu} \phi_{j\mu}$$

代入, 并取所有参数各一次的系数. 所得函数 $\tilde{f}$ 对新增变量多线性, 且不变, 因为代入和取系数均与群作用交换. 让同一组副本相等, 得到

$$\tilde{f} = \left(\prod_i a_i! \right) \left(\prod_j b_j! \right) f.$$

这由齐次性及多项展开的多项式系数给出. 特征零允许除以这些阶乘; 先把 $\tilde{f}$ 写成配对乘积, 再合并副本, 便把 f 写成原配对的多项式. $\square$

这个结论只断言生成性. 若 $\dim V = n$, 配对矩阵 (p_{ji}) 的秩至多 n , 故其 $(n+1)$ 阶子式都是关系; 证明这些子式生成全部关系, 是另外的关系定理, 不能由生成性直接得到。

在二维交错空间 $V = k^2$ 中, 标准交错型为 $\omega(v, w) = \det(v, w)$, 保持它的群是 SL_2 。对两个向量组成的矩阵 $X = (v, w)$, 有

$$k[V \oplus V]^{\mathrm{SL}_2} = k[\omega(v, w)]$$

(这里仍设特征零)。证明也很具体: 若 $\det X = t \neq 0$, 矩阵 $\mathrm{diag}(1, t)X^{-1}$ 的行列式为一, 把 X 送到 $\mathrm{diag}(1, t)$ 。所以不变量 f 在可逆矩阵上等于多项式 $F(\det X)$, 其中 $F(t) = f(\mathrm{diag}(1, t))$; 由稠密性, 这个等式在全部矩阵上成立。这里的交错 Gram 矩阵只有一个独立条目, 其余是零及其负值。

22.5.4 二元型的判别式与协变式

定义 22.5.4. 设 k 为域, G 为 k 上的仿射代数群, 有理作用在有限维 k 空间 U, W 上。多项式函数 $f: U \rightarrow k$ 若作为代数态射满足 $f(gu) = \chi(g)f(u)$, 其中 $\chi: G \rightarrow \mathbb{G}_m$ 为代数群同态, 则称 f 为具有特征 χ 的**相对不变量** (relative invariant)。若多项式映射 $F: U \rightarrow W$ 作为代数态射满足 $F(gu) = gF(u)$, 则称 F 为**协变式** (covariant)。相对不变量也可看作取值于一维表示 k_χ 的协变式, 其中 G 在 k_χ 上按 χ 数乘作用。

设 k 的特征零, 令 GL_2 在二元型上作用为 $(g \cdot F)(X, Y) = F(g^{-1}(X, Y)^T)$ 。对二次型

$$F = aX^2 + bXY + cY^2, \quad Q = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix},$$

变换后矩阵为 $g^{-T}Qg^{-1}$, 故判别式 $\Delta = b^2 - 4ac = -4 \det Q$ 满足

$$\Delta(g \cdot F) = (\det g)^{-2} \Delta(F).$$

因此它在一般线性群下是相对不变量, 在特殊线性群下是不变量。

一个实际的协变构造是 **Hessian**。对次数 $d \geq 2$ 的二元型, 置

$$\mathcal{H}(F) = \det \begin{pmatrix} F_{XX} & F_{XY} \\ F_{XY} & F_{YY} \end{pmatrix}.$$

链式法则给出

$$\mathcal{H}(g \cdot F)(X, Y) = (\det g)^{-2} \mathcal{H}(F)(g^{-1}(X, Y)^T).$$

故在 SL_2 下, $\mathcal{H}$ 是从 d 次型空间到 $2d - 4$ 次型空间的协变式; 在 GL_2 下须把值域作用另乘 $(\det g)^{-2}$ 。例如

$$F = aX^3 + 3bX^2Y + 3cXY^2 + dY^3$$

给出

$$\mathcal{H}(F) = 36((ac - b^2)X^2 + (ad - bc)XY + (bd - c^2)Y^2).$$

它随型变成另一个型, 通常不是标量不变量。区分“系数次数”和“关于 X, Y 的次数”也很必要: 这里前者为二, 后者也为二; 对一般 d , 二者分别为二和 $2d - 4$ 。

22.6 仿射商与轨道闭包

不变环可以看作商空间上的函数环，但“商”不一定就是原有轨道组成的集合。有限群作用时二者十分接近；连续变化的代数群作用则会把不同轨道合并。下面先从坐标环说明商的确切含义，再计算这些合并怎样发生。

22.6.1 由不变环构造仿射商

定义 22.6.1. 设 G 为域 k 上的仿射代数群，作用在仿射 k 概形 $X = \operatorname{Spec} A$ 上， $\delta: A \rightarrow A \otimes_k k[G]$ 为诱导的右余作用。若不变子代数 $B = A^G$ 是有限生成 k 代数，则把

$$X//G = \operatorname{Spec} B, \quad \pi: X \rightarrow X//G$$

称为由不变环定义的**仿射商** (affine quotient)；其中 π 由包含 $B \hookrightarrow A$ 给出。不变元是余作用满足 $\delta(b) = b \otimes 1$ 的元，这一定义也适用于非代数闭域和群概形。

命题 22.6.2. 设 k 为域，仿射代数群 G 作用在 $X = \operatorname{Spec} A$ 上，且 $B = A^G$ 是有限生成 k 代数。令 $\pi: X \rightarrow X//G = \operatorname{Spec} B$ 为包含 $B \hookrightarrow A$ 定义的态射。对任意仿射 k 概形 $Y = \operatorname{Spec} C$ ，每个 G 不变态射 $f: X \rightarrow Y$ 都唯一分解为

$$X \xrightarrow{\pi} X//G \xrightarrow{\bar{f}} Y.$$

这里 G 在 Y 上平凡作用，不变性是作用态射与投影复合后相等。

证明. 态射 f 对应代数同态 $f^*: C \rightarrow A$ 。不变性恰表示其每个像元素满足余作用等式，因而像包含在 B 中。限制值域得到唯一同态 $C \rightarrow B$ ，反变地就是所需 $\bar{f}$ 。唯一性来自 $B \hookrightarrow A$ 为单射。□

这里证明的是相对于仿射目标的泛性质；它没有自行断言对任意概形目标也成立。即使 π 存在，同一个商点也可能代表多个轨道。

22.6.2 有限群商与有限态射

定理 22.6.3. 设 k 为代数闭域，有限群 G 作用在仿射代数集 $X = \operatorname{Spec} A$ 上。则 $B = A^G$ 有限生成，商态射 $\pi: X \rightarrow \operatorname{Spec} B$ 有限且满射；在 k 点上，其每个纤维恰为一个 G 轨道。

证明. 定理 22.2.3 给出 B 有限生成及 A 为有限生成 B 模；后者正是仿射态射有限的定义。整扩张的上覆性质给出素谱满射。回顾该性质在此的理由：对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} B$ ，局部化 $A_{B \setminus \mathfrak{p}}$ 非零且在 $B_{\mathfrak{p}}$ 上整；取其极大理想，收缩是 $B_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想，所以为 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ 。收缩为极大的依据是整扩张中，上环为域时下环也为域：任意非零下环元素的逆在上环中满足首一整性方程，乘以适当幂就把该逆写回下环。再收缩到 A 即得覆盖 $\mathfrak{p}$ 的素理想。

对 B 的极大理想，覆盖它的素理想亦为极大，商域是 k 的有限扩张；代数闭性使它仍是 k ，所以 k 点上的映射也满射。同一轨道显然有同样的不变量值。若两个点不在同一轨道，命题 22.1.3 给出在它们上取零、一的不变量，故不会映到同一商点。于是各纤维恰为轨道。□

对同时变号作用, 商是方程 $uw = v^2$ 定义的二次锥, 商映射为

$$(x, y) \mapsto (x^2, xy, y^2).$$

在特征不为二的代数闭域上, 每个非原点纤维有两个点, 原点纤维只有一个点。商可以产生奇点, 即使原来的平面光滑; 这是不能把“有限商”理解成处处局部同构的一个简单理由。

22.6.3 代数环面作用与轨道闭包

设 k 为代数闭域, $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{A}^2$ 上作用为

$$t \cdot (x, y) = (tx, t^{-1}y).$$

由单项式的权, $k[x, y]^{\mathbb{G}_m} = k[xy]$, 所以仿射商映射是 $\pi(x, y) = xy$ 。当 $c \neq 0$ 时, 曲线 $xy = c$ 是一个轨道: 给定两点, 取 $t = x'/x$ 即可互相变换, 而且该轨道为闭集。

零纤维却包含三个轨道: 原点、去掉原点的 x 轴、去掉原点的 y 轴。后两个轨道都不是闭集, 其闭包都包含原点; 只有原点是闭轨道。因此商点零合并了三个轨道, 而保留了它们共同趋向的闭轨道。

若改成 $t \cdot (x, y) = (tx, ty)$, 所有非恒定单项式都有非零权, 不变环只有 k , 仿射商只有一点。每条过原点直线去掉原点都给出一个轨道, 其闭包仍包含原点。在射影空间中这些直线却是不同的点; 要保留这种信息, 需要后面带有线性化的射影构造, 不能直接沿用这个仿射商。

22.6.4 矩阵共轭与闭轨道

命题 22.6.4. 设 k 为代数闭域。矩阵 $A \in M_n(k)$ 的共轭轨道为 Zariski 闭集, 当且仅当 A 半单, 即可对角化。每个轨道闭包包含一个且仅一个半单共轭轨道, 它由 A 的特征多项式确定。

证明. 在 Jordan 标准形中写 $A = D + N$, 其中 D 在各块上为标量, N 具有通常的超对角一。在一个大小 r 的块上用 $\text{diag}(t^{r-1}, t^{r-2}, \dots, 1)$ 共轭, 便把 N 变为 tN 。合并各块得到: $t \neq 0$ 时 $D + tN$ 与 A 共轭, $t = 0$ 时等于 D 。由多项式映射 $t \mapsto D + tN$, D 在轨道闭包中; 若 A 不是半单的, 二者不共轭, 原轨道因此不闭。

反过来, 设 D 的不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 其固定特征多项式为 $P(T)$ 。矩阵集合

$$\left\{ B \in M_n(k) \mid \det(TI - B) = P(T), \prod_{i=1}^r (B - \lambda_i I) = 0 \right\}$$

是闭集, 因为它由矩阵条目的多项式方程定义。第二条件使最小多项式无重根, 故 B 可对角化; 第一条条件又固定各特征值的重数, 所以这个闭集恰为 D 的共轭轨道。半单轨道于是闭。

特征多项式系数在一个轨道闭包上恒定。任何落在闭包中的半单矩阵均具有 A 的特征多项式, 因而与 D 共轭。这给出唯一性。 $\square$

定理 22.5.2 与此命题相互解释：所有不变量只记住半单共轭类，而不会区分具有相同特征值和重数的不同 Jordan 块。一般约化群仿射作用也有以闭轨道解释商纤维的理论；这里只对上面的环面模型和矩阵共轭完整证明该现象，不由个别模型推断任意代数群都有同样性质。

22.7* 约化群与几何不变量理论初步

有限群平均可以把系数投影到不变部分。对于无限代数群，有理表示的完全可约性也能给出这样的投影。本节先用这一投影证明有限生成，再介绍正特征的几何约化性与射影商的构造。

22.7.1 线性约化性与 Hilbert 有限生成定理

定义 22.7.1. 设 G 为域 k 上的仿射群概形。若每个有限维有理 G 表示都可分解为简单有理表示的直和，则称 G 为**线性约化群** (linearly reductive group)。对可能无限维的有理表示，本节使用右 $k[G]$ 余模的含义。

引理 22.7.2. 设 G 为域 k 上的线性约化仿射群概形， M 为有理 G 表示， M^G 为其不动子空间。则有自然的 G 等变投影 $\mathcal{R}_M: M \rightarrow M^G$ 。取不变量保持有理表示的短正合列。若 A 是有理 G 代数，则 $\mathcal{R}_A$ 是 A^G 线性的。

证明. 有限维时，将 M 分解为简单模。平凡简单模之和恰为 M^G ，其余简单模之和记为 M' 。没有非零同态能在平凡简单模与非平凡简单模之间来回映射：非零简单模同态必为同构。因此这两个等型部分及投影均不依赖分解的选择，并且任意等变同态保持它们。

由引理 21.3.3，一般 M 中每个向量都属于有限维子表示。两个这样的子表示都包含在它们的有限维和中；投影的自然性使定义相容。因此有限维投影黏合为 $\mathcal{R}_M$ ，且仍对所有同态自然。

取不变量本来左正合。对等变满射 $M \rightarrow N$ 和 $n \in N^G$ ，选原像 m ；自然性说明 $\mathcal{R}_M(m)$ 映到 $\mathcal{R}_N(n) = n$ ，所以右端也满射。最后，若 $a \in A^G$ ，乘法映射 $x \mapsto ax$ 是等变线性映射；对它用自然性即得 $\mathcal{R}_A(ax) = a\mathcal{R}_A(x)$ 。□

定理 22.7.3 (线性约化群的有限生成). 设 k 为域， G 为 k 上的线性约化群， A 为有限生成交换 k 代数，具有有理 G 作用。则 A^G 是有限生成 k 代数。

证明. 先设 $A = S = \text{Sym}(W)$ ，其中 W 有限维，作用保持标准分次。令 $I \subseteq S$ 为全部正次齐次不变量生成的理想。Hilbert 基定理说明 S 为 Noether 环，所以可从这些不变量中选出有限个齐次元 $f_1, \dots, f_r$ 生成 I 。确实，先取有限理想生成元，再展开它们所用的有限多个原始不变量即可。

对不变量的次数归纳。常数不需要生成；若 $f \in S_d^G$ ， $d > 0$ ，由 $f \in I$ 可写

$$f = \sum_i a_i f_i, \quad \deg a_i = d - \deg f_i < d,$$

只保留相应齐次部分即可。引理 22.7.2 以及分次投影的自然性给出

$$f = \sum_i \mathcal{R}_S(a_i) f_i.$$

这些系数不变且次数下降, 由归纳假设属于 $k[f_1, \dots, f_r]$, 所以 $S^G = k[f_1, \dots, f_r]$ 。

一般情形先取 A 的有限个代数生成元。余模局部有限性使它们包含在有限维 G 稳定子空间 $W \subseteq A$ 中。乘法延拓给出等变满射 $\text{Sym}(W) \rightarrow A$ 。引理的不变量正合性又给出 $\text{Sym}(W)^G \rightarrow A^G$ 满射。前者已经有限生成, 故其商 A^G 也有限生成。□

分裂环面在任意特征都线性约化: 定理 21.3.5 把表示分成一维权表示, Reynolds 算子就是取权零部分。有限群在群阶可逆时则由 Maschke 定理得到这一性质。这里的一般证明没有给出类似 $|G|$ 的次数上界; 有限生成与有效的次数估计仍应区分。

22.7.2 正特征、几何约化性及适用范围

在代数闭域上, 连通光滑仿射代数群若没有非平凡连通正规么幂子群, 便称为约化群; 么幂群是能够表示为对角元全为一的上三角矩阵群的代数群。约化性是群本身的结构条件, 线性约化性则是全部有限维有理表示的分解条件。特征零时两者对连通群等价; 正特征时不能这样替换。

例如在特征 $p > 0$ 的代数闭域上, 考虑 SL_2 的 p 次对称幂 $k[X, Y]_p$ 。子空间

$$U = kX^p + kY^p$$

因 $(aX + bY)^p = a^p X^p + b^p Y^p$ 而稳定。假设存在稳定补空间 L 。对角环面的权分别为 $p, p-2, \dots, -p$, 作为代数群的特征它们仍互不相同; 中间权 $p-2$ 迫使 $X^{p-1}Y \in L$ 。然而使 $X \mapsto X, Y \mapsto Y + tX$ 的么幂元将它送为

$$X^{p-1}Y + tX^p.$$

取 $t \neq 0$, 稳定性便迫使 $X^p \in L \cap U$, 矛盾。因此这个表示不完全可约, 即使 SL_2 是约化群。

定义 22.7.4. 设 k 为代数闭域, G 为 k 上的仿射代数群。若对每个有限维有理 G 表示 V 及每个非零固定向量 $v \in V^G$, 都有某个正次齐次不变量 $f \in k[V]^G$ 满足 $f(v) \neq 0$, 则称 G 为**几何约化群** (geometrically reductive group)。

线性约化时可将不变直线 kv 等变地投影出来, 得到在 v 上非零的不变线性函数, 因此必几何约化。几何约化允许使用更高次数, 这是它能够适应正特征的关键区别。

定理 22.7.5 (Haboush 定理). 设 k 为代数闭域, G 为 k 上的连通约化仿射代数群。则 G 几何约化。

证明概要. 环面的有理表示按权分解, 因而已线性约化。取半单部分的单连通覆盖, 再与中心环面作乘积, 可用满同态覆盖 G ; 对满同态的拉回表示, 不变向量和不变多项式都不变。因此只须处理半单单连通群。固定最大环面 T 。

给定 $0 \neq v \in V^G$, 选 $\ell \in V^*$ 使 $\ell(v) = 1$ 。矩阵系数映射

$$\phi: V \longrightarrow k[G], \quad \phi(w)(g) = \ell(g^{-1}w)$$

对于左平移 $(h \cdot f)(g) = f(h^{-1}g)$ 等变, 且 $\phi(v) = 1$ 。右 T 作用与左 G 作用交换; 取右权零部分的 Reynolds 投影, 便得到 G 等变映射 $\pi\phi: V \rightarrow k[G]^T$, 仍把 v 送到 1。

关键表示论输入是: $k[G]^T$ 是一族有限维 G 子模的递增并, 这些子模同构于 $\text{End}(E)$, G 在后者按共轭作用, 常数 1 对应恒等自同态的非零倍数。这个输入的构造取相反 Borel 子群 B, B^- , 利用 G/T 在 $G/B \times G/B^-$ 中的开轨道, 把正则函数写成线丛截面的带分母张量。清去大胞腔定义截面的幂后, 所得有限维子模为 $E_{n\rho} \otimes E_{n\rho}$, 其中 $E_{n\rho} = H^0(G/B, \mathcal{L}_{n\rho})$, ρ 是正根半和。特征零时这些模不可约; 特征 $p > 0$ 时取 $n = p^r - 1$, Steinberg 表示⁵的不可约性与维数 p^{rN} (N 为正根数), 结合 Weyl 维数公式和充分大 n 时的 Serre 消失, 给出所需无限多个不可约 $E_{n\rho}$ 。这些自对偶模的张量正是 $\text{End}(E_{n\rho})$ 。

$\pi\phi(V)$ 有限维, 故包含在某个这样的子模中。记相应同构为 σ , 则

$$f(w) = \det(\sigma\pi\phi(w))$$

是正次齐次多项式, 因行列式保持共轭而 G 不变, 且 $f(v) = \det(cI_E) = c^{\dim E} \neq 0$ 。这就得到几何约化定义要求的多项式; 不需除以 $\dim E$ 。

这里省略了约化群的中心覆盖结构、大胞腔截面的构造, 以及 Steinberg 模、Serre 消失与模的约化比较。矩阵系数、 $k[G]^T$ 的递增并和行列式论证见 [1, Section 3, Propositions 1–2, pp. 140–143], 该讲稿完整讲述 Haboush 的证明; 原论文为 [6]。这些深层输入解释了正特征为何可以得到高次不变量, 却不能一般地得到不变线性投影。□

引理 22.7.6 (不变量的幂提升). 设 k 为代数闭域, G 为几何约化仿射代数群, A 为有理 G 作用的交换 k 代数, $I \subseteq A$ 为 G 稳定理想。对每个 $u \in (A/I)^G$, 存在整数 $m > 0$ 及 $b \in A^G$, 使 b 在 A/I 中的像为 u^m 。

证明. $u = 0$ 时取 $b = 0$ 。否则选原像 $a \in A$, 令 W 为其 G 平移生成的有限维子表示。所有平移在商中都映到 u , 故商映射限制为等变满射 $q: W \rightarrow ku$; 以 u 识别 $ku = k$, 把 q 看作 W^* 中的非零固定向量。几何约化给出齐次不变量 $F \in k[W^*]^G = \text{Sym}(W)^G$, 满足 $F(q) \neq 0$ 。除以这个非零标量, 可设 $F(q) = 1$ 。

包含 $W \subseteq A$ 延拓为等变代数映射 $\text{Sym}(W) \rightarrow A$ 。令 b 为 F 的像, 便有 $b \in A^G$ 。若 F 的次数为 $m > 0$, 每个 $w \in W$ 在商中等于 $q(w)u$, 故 b 的商像恰为 $F(q)u^m = u^m$ 。□

定理 22.7.7 (Nagata 有限生成定理). 设 k 为代数闭域, G 为几何约化仿射代数群, A 为有限生成约化交换 k 代数, 具有有理 G 作用。则 A^G 有限生成。

证明概要. 引理 22.7.6 说明 $A^G/(I \cap A^G) \subseteq (A/I)^G$ 是整扩张: 商中每个不变量的某个正幂来自左边。这是取代 Reynolds 满射的关键, 不能把它误写为不变量函子正合。

虽然定理只陈述约化代数, 证明同时推进较强的归纳断言: 任意有限生成交换有理 G 代数的不变环均有限生成, 允许代数带幂零元。这样对 G 稳定理想取商后仍在同一归纳范围内; 不能只对约化商使用归纳假设。对保持分次且零次为 k 的代数, 先按稳定理想作 Noether 归纳, 可假设每个非零真商的不变环已有限生成。

若没有正次不变量, 则 $A^G = k$; 否则选正次齐次 $0 \neq f \in A^G$ 。若 f 在 A 中不为零因子, 由幂提升, $(A/fA)^G$ 整于 A^G/fA^G ; 这里 $fA \cap A^G = fA^G$, 因为 f 可以从不变等式中消去。有限型代数的整子代数仍有限型, 故 A^G/fA^G 有限生成。提升其正次

⁵斯坦伯格 (Robert Steinberg, 1922–2014), 加拿大裔美国数学家, 研究代数群及其有限群的表示论。

生成元并添上 f , 再按次数归纳, 就生成 A^G 。若 f 在 A 中为零因子, 则同时对 fA 与 $\text{Ann}_A(f)$ 取商; 从两商提升有限生成元, 再添上有限多个 fb_i , 即可恢复 A^G 。因为 b_i 的作用差落在 $\text{Ann}_A(f)$, 这些 fb_i 都不变。幂零的 f 也按这一双商分支处理。

一般 A 是某个有限维有理表示的对称代数 S 的等变商。已证的齐次情形使 S^G 有限生成, 幂提升使 A^G 整于其像 B 。当 A^G 为整环时, 它的分式域嵌入 A 某个整环分量的有限型分式域, 因而自身为有限生成域; 它对 $\text{Frac}(B)$ 既代数又有限生成, 故为有限扩张。有限型代数在有限分式域扩张中的整闭包是有限生成的 B 模; B 为 Noether 环, 故 A^G 作为该整闭包的 B 子模也有限生成。零因子情形继续沿前面的两个真商归纳。

本概要省略 Noether 归纳中零因子的双商粘接及包含非约化商的完整归纳、有限型整子代数的交换代数引理和整闭包有限性。双商分支同时处理幂零不变量, 归纳范围因而必须允许非约化代数; 其余步骤分别保证整性足以传递有限生成, 以及一般商情形可结束。完整归纳方法与幂提升引理见 [2, Section 3.4, Theorem 3.3 and Lemma 3.5, pp. 41–45]。结合定理 22.7.5, 便得到约化群在这里所述有限型约化代数上的不变环有限生成。□

22.7.3 稳定性与射影商的一个例子

设代数闭域 k 上的线性约化群 G 线性作用于 V 。这个线性作用诱导 $\mathbb{P}(V)$ 及其同义反复线丛 $\mathcal{O}(-1)$ 上的作用, 因而给出对偶线丛 $\mathcal{O}(1)$ 的线性化。选择提升到线丛的作用称为选择线性化; 同一个射影作用可以有不同选择。

定义 22.7.8. 设 k 为代数闭域, 线性约化群 G 线性作用在有限维 k 空间 V 上, 并在 $\mathbb{P}(V)$ 上取此作用诱导的 $\mathcal{O}(1)$ 线性化。点 $[v] \in \mathbb{P}(V)$ 若存在正次齐次不变量 $f \in k[V]^G$ 使 $f(v) \neq 0$, 称为**半稳定点** (semistable point)。若还可选择这样的 f , 使轨道在仿射开集 $D_+(f) = \{[w] \mid f(w) \neq 0\}$ 中闭, 且稳定子群有限, 则称为**稳定点** (stable point)。

这一定义与线性化有关。先说明不变齐次环如何给出半稳定集上的商映射, 再用一个环面作用计算其纤维。

命题 22.7.9. 设 k 为代数闭域, 线性约化群 G 线性作用在有限维 k 向量空间 V 上, 在 $\mathbb{P}(V)$ 上取诱导的 $\mathcal{O}(1)$ 线性化。记 $S = k[V]$ 、 $R = S^G$, $\mathbb{P}(V)^{\text{ss}}$ 为半稳定点构成的开子集。则 R 是有限生成分次代数, 并有自然的 G 不变态射

$$\pi : \mathbb{P}(V)^{\text{ss}} \longrightarrow \text{Proj } R.$$

对每个非零正次齐次 $f \in R$, 其限制 $D_+(f) \rightarrow \text{Spec}(R_f)_0$ 是由该仿射开集的不变环定义的仿射商。下标零表示齐次局部化的次数零部分。

证明. 定理 22.7.3 给出有限生成, 作用保持次数使 R 保持分次。半稳定定义说明 $\mathbb{P}(V)^{\text{ss}}$ 正是这些 $D_+(f)$ 的并。按 Proj 的仿射图构造, $D_+(f)$ 的坐标环为 $A_f = (S_f)_0$, 目标相应图的坐标环为 $B_f = (R_f)_0$ 。

因为 f 不变, $A_f^G = B_f$ 。确实, A_f 的元可写成 a/f^m , 其中 a 齐次且 $\deg a = m \deg f$; 它不变时, 其余作用满足 $\delta(a)/(f^m \otimes 1) = (a \otimes 1)/(f^m \otimes 1)$ 。 S 是整环, 且 $S \otimes_k k[G]$

作为 S 模自由, 所以 $f \otimes 1$ 不为零因子. 清分母得到 $\delta(a) = a \otimes 1$, 即 $a \in R$, 反向显然. 这也适用于非光滑的线性约化群概形. 命题 22.6.2 于是给出每张图上的仿射商.

两张图的交是 $D_+(ff')$. 在次数零环中, 若 $\deg f = r$, $\deg f' = s$, 这一交由不变函数 $(f')^r/f^s$ 的非零条件截出; 两张图之间的坐标变换就是进一步局部化. 因此上述商态射在交上相容, 粘合为 π . 这证明所陈述的射影构造; 关于稳定点上的轨道商及完整数值判据, 还须另作论证. $\square$

例 22.7.10. 设 k 为代数闭域, $G = \mathbb{G}_m$ 在 $V = k^3$ 上作用为

$$t \cdot (x, y, z) = (tx, y, t^{-1}z).$$

取这个线性作用给出的 $\mathcal{O}(1)$ 线性化. 单项式的权为 $a - c$, 所以

$$k[V]^G = k[y, xz], \quad \deg y = 1, \quad \deg(xz) = 2.$$

正次不变量同时为零的射影点恰为 $[1:0:0]$ 、 $[0:0:1]$. 因此半稳定集是去掉这两点的开集.

取第二个 Veronese 子环, 得到 $k[y^2, xz]$, 两个生成元重分次均为一, 其 Proj 是 $\mathbb{P}^1$. 原分次环与此子环具有相同的 Proj: 在 $D_+(y)$ 与 $D_+(xz)$ 的次数零局部化中, 分子分母可以同乘一个齐次元, 使次数成为二的倍数, 因此对应仿射图及其交完全相同. 商映射在本例具体为

$$[x:y:z] \mapsto [y^2:xz].$$

两坐标在半稳定集上不同时为零, 故这是正则映射.

若 $xz \neq 0$, 稳定子群有限: 当 $y \neq 0$ 时为单位群, 当 $y = 0$ 时满足 $t^2 = 1$, 作为群概形也是有限的. 轨道在 $D_+(xz)$ 中闭. 事实上, 给定比例 $y^2/(xz)$, 在代数闭域上可用射影倍数及群参数把任意两个 $xz \neq 0$ 的点互相变换; 所以该轨道就是 $D_+(xz)$ 中商映射的一个闭纤维.

若 $xz = 0$, $y \neq 0$, 则 $[0:1:0]$ 是固定点, 不稳定; 其余点在半稳定集中沿轨道趋向这个固定点, 也不稳定. 因此稳定集恰为 $xz \neq 0$, 而商点 $[1:0]$ 对应一个固定轨道与两个退化到它的非闭轨道.

这个例子已经显示射影商保留了仿射商未必保留的方向信息, 也显示半稳定集必须先选出来. 完整的 Hilbert–Mumford 判据⁶、一般商的几何性质与改变线性化时的变化, 可以继续阅读 [2, Chapters 7–9]; 这些内容不由一个环面例子的计算代替.

本章小结

有限群的轨道多项式给出整性, Artin–Tate 引理再给出不变环的有限生成; 这个论证在模特征也成立. 群阶可逆时, Reynolds 投影能够改造系数; 特征零的极化进一步将生成次数限制在群阶以内. Molien 公式计算各齐次分量的维数, 但不能独自代替生成元与关系的证明.

⁶芒福德 (David Bryant Mumford, 1937–), 美国数学家, 在代数几何和几何不变量理论方面作出重要贡献; 希尔伯特已在本卷前文介绍.

消去把代入同态的核写成一个理想的交。候选关系给出保持分次的满射之后，Hilbert 级数相等才保证没有遗漏关系。循环作用的曲面、矩阵的特征多项式及向量与对偶向量的配对这几类算例，分别采用单项式、稠密性和张量中心化子的方法。

有限群商的几何纤维是轨道，一般代数群的商则可能合并多个轨道。矩阵共轭下，每个轨道闭包中有唯一半单轨道，不变量正好记住它。线性约化性使 Reynolds 投影推广到有理表示，并支持 Hilbert 的有限生成证明；正特征的一般约化群需要几何约化理论。射影商还依赖线性化和半稳定点的选择。

习题

习题 22.1* 在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中，令乘法群 $\mathbb{F}_q^\times$ 通过 $x \mapsto ax$ 作用。求形式多项式的不变环，并给出其中在所有 $\mathbb{F}_q$ 点上取零的非零元。

解. 单项式 x^d 不变当且仅当 $q-1 \mid d$ ，因为 $\mathbb{F}_q^\times$ 为循环群。因此不变环为 $\mathbb{F}_q[x^{q-1}]$ 。非零多项式 $x^{q-1}(x^{q-1}-1)$ 在零点及每个非零点上均为零；在 $q=2$ 时也得到 $x(x-1)$ 。所以到点集函数的求值映射并非单射。□

习题 22.2* 设 $\text{char } k \neq 2$, $s(x) = -x, s(y) = y$ 。求 $k[x, y]^{(s)}$ ，并写出 $x^3 + x^2y + xy^2 + y^3$ 的 Reynolds 平均。

解. 不变单项式恰有偶数的 x 指数，所以不变环为 $k[x^2, y]$ ；二者代数独立，因为其不同幂积给出不同单项式。平均删去奇数 x 指数项，结果为 $x^2y + y^3$ 。□

习题 22.3* 设有限群 G 作用于交换 k 代数 A ，且 $N \trianglelefteq G$ 。证明 A^N 上有良定的 G/N 作用，并证明 $(A^N)^{G/N} = A^G$ 。

解. 若 $a \in A^N$ ，则对 $n \in N$ 有 $n(ga) = g(g^{-1}ng)a = ga$ ，故 $ga \in A^N$ 。代表元 gn 与 g 在 A^N 上相同，因此商群作用良定。一个 $a \in A^N$ 被每个陪集固定，当且仅当被每个 $g \in G$ 固定，这正给出所述等式。□

习题 22.4* 设 C_3 循环置换 x, y, z 。写出 x 的轨道多项式，并据此给出 $k[x, y, z]$ 在不变环上的有限个模生成元；说明该组未必最小。

解. 轨道多项式为

$$T^3 - (x + y + z)T^2 + (xy + yz + zx)T - xyz.$$

三个变量都满足它，因此 $x^a y^b z^c$ 、 $0 \leq a, b, c < 3$ 这 27 个元生成该模。首一关系保证可以逐次降低每个指数。这仅给上界；三元和等不变量还能产生额外线性关系，例如 $z = (x + y + z) - x - y$ ，所以不能据此声称模秩为 27。□

习题 22.5* 设 $\text{char } k = p > 0$ ，阶 p 群在 $k[x]$ 上按 $\sigma(x) = x + 1$ 作用。求不变环。

解. 令 $z = x^p - x$ ，则 $\sigma(z) = z$ 。每个多项式唯一写成 $\sum_{i=0}^{p-1} a_i(z)x^i$ ：首一关系给出存在，不同 i 的最高 x 次数模 p 不同给出唯一。若最大非零正指标为 i ，差 $\sigma(f) - f$ 的 x^{i-1} 基系数是 $i \cdot a_i(z) \neq 0$ ，矛盾。因此 $k[x]^{C_p} = k[z]$ 。□

习题 22.6*. 在复数域上构造一个阶为 m 的有限群线性作用, 使不变环不能由次数严格小于 m 的元生成。

解. 取 C_m 在一维上由本原 m 次单位根作用. 不变环为 $\mathbb{C}[x^m]$. 所有小于 m 次的不变量都是常数, 不能生成 x^m . 因此统一的 Noether 上界在这族例子中达到. $\square$

习题 22.7*. 让 C_2 在 $\mathbb{C}^3$ 上同时变号. 求 Hilbert 级数及次数 $2r$ 的系数, 并指出二次生成元有多少个。

解. Molien 公式给出

$$H(t) = \frac{1}{2}((1-t)^{-3} + (1+t)^{-3}) = \frac{1+3t^2}{(1-t^2)^3}.$$

次数 $2r$ 的系数为 $\binom{2r+2}{2}$, 奇数次为零. 二次单项式有六个. 每个偶数次单项式可把其变量因子两两配对, 故六个二次元确能生成; 级数却不等于 $(1-t^2)^{-6}$, 说明它们有关系. $\square$

习题 22.8*. 让 C_2 在 $\mathbb{C}^2$ 上由 $\text{diag}(-1, 1)$ 作用. 用 Molien 公式求级数, 并解释为什么它与同时变号作用不同。

解. 结果为

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{(1-t)^2} + \frac{1}{1-t^2} \right) = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)}.$$

它对应自由生成元 y, x^2 , 各次维数为 $\lfloor d/2 \rfloor + 1$. 同时变号没有一次不变量且有二次元之间的关系; 这两个作用虽来自同一个群, 却不是同一个表示. $\square$

习题 22.9*. 令 C_3 在 $\mathbb{C}[x, y]$ 上作用为 $x \mapsto \zeta x, y \mapsto \zeta^{-1}y$. 在次数六中列出一组不变量基, 并与展示 $uv = w^3$ 比较。

解. 单项式 $x^a y^{6-a}$ 的权为 $2a-6$, 故 $a=0, 3, 6$. 基为 $y^6, x^3 y^3, x^6$. 展示中它们分别为 v^2, w^3, u^2 , 而看似第四个的 uv 等于 w^3 . 带权次数分别为 $\deg u = \deg v = 3, \deg w = 2$, 不能把 $uv = w^3$ 当成通常三变量次数下的齐次关系. $\square$

习题 22.10*. 对同态 $k[u, v] \rightarrow k[t], (u, v) \mapsto (t^2, t^3)$, 求核及像的 Hilbert 级数, 取 $\deg t = 1$.

解. 关系为 $v^2 - u^3$. 模它后每个多项式形如 $A(u) + v \cdot B(u)$, 其像分别含偶次幂 t^{2a} 和奇次幂 t^{2b+3} , 互不相交且各自独立, 故核就是该主理想. 级数为

$$\frac{1-t^6}{(1-t^2)(1-t^3)} = 1 + t^2 + t^3 + t^4 + \dots.$$

消去计算求出了子代数 $k[t^2, t^3]$ 的生成关系. 要把它识别为某个群作用的不变环, 还须给出该群作用并证明相应的不变性与生成性. $\square$

习题 22.11*. 给出两个 Hilbert 级数相同但不同构的非负分次 k 代数, 说明为什么不能省略引理 22.4.2 中的满射。

解. 取 $A = k[x, y]/(xy)$ 与 $B = k[x, y]/(x^2)$, 变量次数一。两者级数均为 $(1-t^2)/(1-t)^2$ 。但 A 约化: 若多项式幂被 xy 整除, 两个素元 x, y 都整除该多项式, 故它本身被 xy 整除; 而 B 中非零的 x 平方为零。因此两环不同构。若存在保持次数的满射, 级数判别反而会迫使同构, 说明本例中不存在这种满射。□

习题 22.12*. 在三个变量中把 $x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2$ 写成初等对称多项式, 并由根为 1, 2, 3 的首一多项式的系数计算它在这组三根上的值。

解. 展开 e_2^2 得 $x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2 + 2xyz(x+y+z)$, 故所求为 $e_2^2 - 2e_1e_3$ 。根 1, 2, 3 给出 $e_1 = 6, e_2 = 11, e_3 = 6$, 所以值为 $121 - 72 = 49$, 也等于 $4 + 9 + 36$ 。□

习题 22.13*. 在特征不为二的域上, 求独立变号及坐标互换生成的二维群的不变环和 Hilbert 级数。

解. 先对变号取不变量得到 $k[x^2, y^2]$, 再对互换取不变量得到 $k[x^2 + y^2, x^2y^2]$ 。对称多项式基本定理说明两个生成元代数独立, 次数为二、四, 故级数为 $(1-t^2)^{-1}(1-t^4)^{-1}$ 。□

习题 22.14*. 在特征零域上, 用 $p_i = \text{tr}(A^i)$, $1 \leq i \leq 3$, 表示三阶矩阵的特征多项式系数。

解. Newton 递推依次给出

$$c_1 = p_1, \quad c_2 = \frac{p_1^2 - p_2}{2}, \quad c_3 = \frac{p_1^3 - 3p_1p_2 + 2p_3}{6}.$$

因此特征多项式为 $T^3 - c_1T^2 + c_2T - c_3$ 。分母说明这个直接计算在特征二、三中不能照搬; 系数 c_i 本身仍可由行列式定义。□

习题 22.15*. 设 k 为特征零域, $V = k$, 取两个向量变量 a, b 及两个对偶变量 c, d 。求 $\text{GL}(V)$ 作用下配对不变量的全部关系。

解. 四个配对为 $u = ac, v = bc, w = ad, z = bd$, 满足 $uz - vw = 0$ 。由配对定理, 它们生成全部不变环。消去 uz 后留下不同时含 u, z 的单项式。若两个这样的单项式有相同的 a, b, c, d 指数, 其 u, v, w, z 指数差必为 $(r, -r, -r, r)$; 若 $r > 0$, 第一个同时含 u, z , 若 $r < 0$, 第二个同时含 u, z , 均矛盾。因此标准单项式的像互不相同, 核就是 $(uz - vw)$ 。□

习题 22.16*. 设 k 特征零, $V \neq 0$ 。证明 $\text{GL}(V)$ 在 $V^{\oplus r}$ 上的多项式不变量只有常数, 并说明为什么 $\text{SL}(V)$ 未必如此。

解. 次数 $d > 0$ 的齐次函数在标量矩阵 tI 下使函数值乘以 t^d 。无限域中可取 $t^d \neq 1$, 不变性迫使函数为零。若 $\dim V = n, r \geq n$, 在 $\text{SL}(V)$ 下, 前 n 个向量的行列式是非恒定不变量, 因为左乘群矩阵只使它乘以行列式一。□

习题 22.17*. 在特征零域上, 计算 $F = X^2 + XY + Y^2$ 在 $g = \text{diag}(2, 1)$ 下的新型及判别式, 并核验相对不变因子。

解. 在特征零域中,

$$g \cdot F = \frac{1}{4}X^2 + \frac{1}{2}XY + Y^2.$$

原判别式为 -3 , 新判别式为 $1/4 - 1 = -3/4$, 恰等于 $(\det g)^{-2}(-3)$. 若把它误当作一般线性群不变量, 两数就会发生矛盾. $\square$

习题 22.18*. 在特征零域上, 计算 $F = X^3 + Y^3$ 与 $F = X^3$ 的 Hessian, 说明该构造如何辨认这两个型.

解. 第一种的二阶导数矩阵为 $\text{diag}(6X, 6Y)$, Hessian 为 $36XY$; 第二种矩阵为 $\text{diag}(6X, 0)$, Hessian 为零. 因此在特征零时, 协变性质说明二者不可能在 GL_2 下互相变换, 因为变换不能把零 Hessian 变为非零 Hessian. $\square$

习题 22.19*. 令 C_2 在实直线上变号. 写出实代数簇的商态射, 并说明为什么它在实点上不满足, 这是否与有限群商定理矛盾.

解. 不变环为 $\mathbb{R}[x^2]$, 商态射为 $x \mapsto u = x^2$. 其在实点上的像为非负实数, 遗漏负数. 素谱态射仍满射, 例如 $u + 1$ 上方有极大理想 $(x^2 + 1)$, 其剩余域为 $\mathbb{C}$; 它不是实点. 正文的 k 点满射结论假定 k 代数闭, 因此没有矛盾. $\square$

习题 22.20*. 令 $\mathbb{G}_m$ 在 k^2 上作用为 $t \cdot (x, y) = (t^2x, t^{-1}y)$, k 代数闭. 求仿射不变环, 描述非零商纤维及零纤维的轨道.

解. 单项式不变当且仅当 $2a - b = 0$, 故不变环为 $k[xy^2]$. 若 $xy^2 = c \neq 0$, 取 $t = y/y'$ 就把任意一点送到另一点, 因为 $x' = x(y/y')^2$, 所以非零纤维是一个轨道. 零纤维是两坐标轴, 分为原点及两条去原点的轴; 在代数闭域中平方映射满射, 故去原点的 x 轴也只有一个轨道. $\square$

习题 22.21*. 设 k 为特征零的代数闭域. 在 $M_3(k)$ 中写出从大小三的幂零 Jordan 块到零矩阵的显式共轭退化, 并说明秩为什么不能由这个作用下的多项式不变量给出.

解. 取 $D(t) = \text{diag}(t^2, t, 1)$, 则 $D(t)J_3D(t)^{-1} = tJ_3$. 当 $t \rightarrow 0$ 的代数族取值为零, 而 $t \neq 0$ 时都属于同一轨道. 若秩由一个不变多项式给出, 该多项式在所有 $t \neq 0$ 上为二, 因而作为 t 的多项式在零处也应为二; 实际零矩阵秩为零, 矛盾. $\square$

习题 22.22*. 设 G 线性约化, 有理作用在有限生成交换代数 A 上, $B = A^G$. 对理想 $J \subseteq B$ 证明 $JA \cap B = J$.

解. 包含 $J \subseteq JA \cap B$ 显然. 若 $b \in JA \cap B$, 写 $b = \sum_i j_i a_i$, 其中 $j_i \in J$. 应用 B 线性的 Reynolds 投影得 $b = \sum_i j_i \mathcal{R}_A(a_i) \in J$, 所以等号成立. $\square$

习题 22.23*. 在特征二的代数闭域上, 将正文 SL_2 表示 $k[X, Y]_2$ 的不可分裂性写成一个三维矩阵计算.

解. 取基 X^2, XY, Y^2 , 子模 $U = \langle X^2, Y^2 \rangle$. 对角元 $\text{diag}(t, t^{-1})$ 的权为 $2, 0, -2$, 因此任何稳定一维补空间都必须为 kXY . 但上么幂变换 $Y \mapsto Y + X$ 将 XY 送到 $XY + X^2$, 其矩阵的第二列含非零的第一分量, 所以 kXY 不稳定. 这里权 2 与权 -2 是不同的环面特征, 不能因域的特征二而将它们当作相同. $\square$

习题 22.24*. 在 $\mathbb{P}^1$ 上考虑 $t \cdot [x : y] = [tx : y]$ 。分别使用线性提升 $(x, y) \mapsto (tx, y)$ 和 $(x, y) \mapsto (x, t^{-1}y)$ 给出的 $\mathcal{O}(1)$ 线性化, 求半稳定集。

解. 两个线性提升相差整体标量 t^{-1} , 所以给出同一射影作用。第一个提升的不变多项式环为 $k[y]$, 半稳定集为 $y \neq 0$; 第二个为 $k[x]$, 半稳定集为 $x \neq 0$ 。因此同一射影作用在不同线性化下, 半稳定集确可不同; 不能只由点上的群作用确定它。 $\square$

附录

附录 A 组合代数与反射群

本附录由 Coxeter 词与长度进入 Bruhat 序¹、Hecke 代数和 Kazhdan–Lusztig 规范基，同时用 Young 表、插入算法及有限计数连接组合方法与表示论。

本章目标

- 在对称群中计算约化词、长度及低秩 Bruhat 序。
- 用横条链、行插入与逆插入处理 Young 表计数。
- 根据作用群和权重建立轨道计数式，使用分次生成函数及有限域计数。
- 比较 Hecke 代数的两组基，核验低秩乘法和胞腔表示矩阵。

在 S_3 中，用相邻换位 $s_1 = (12)$ 、 $s_2 = (23)$ 书写同一个置换，可以得到 $s_1 s_2 s_1$ 与 $s_2 s_1 s_2$ 两个不同的最短字。若只把「词」当作群元素的名字，这种不唯一会令人困惑；若记录字长及允许的交换、编织关系，它反而揭示了置换之间的次序结构。一般反射群也有相似的词与长度问题。我们将从这些可手算的关系出发，再看 Young 表、Hecke 代数²和规范基怎样把组合数据转为表示论的计算。

所需基础是有限群作用及本卷第 6、7 章的 Young 表、Schur 函数和 Pieri 规则。一般 Coxeter 词性质以根的符号变化和秩二反射计算给出证明概要；在此基础上，Hecke 标准基和 Kazhdan–Lusztig 规范基³的证明在本附录展开。所选计数结果均作证明，并给出秩一和 S_3 的具体代数计算。一般胞腔分类、规范基正性和 Schubert 簇的上同调理论可留待进一步学习。

A.1 Coxeter 群、长度与 Bruhat 序

Weyl 群的元素可以写成简单反射组成的词，从而通过生成关系进行计算。Coxeter 群把这种计算抽象出来。这里先给出一般定义，再在对称群中证明长度公式，并用低秩例子区分两种常见的偏序。

A.1.1 反射关系与 Coxeter 系统

定义 A.1.1. 设 S 为有限集合，整数或符号 m_{st} 满足 $m_{ss} = 1$ 、 $m_{st} = m_{ts} \in \{2, 3, \dots, \infty\}$ 对 $s \neq t$ 成立。由生成元 S 及关系

$$s^2 = 1, \quad (st)^{m_{st}} = 1 \quad (m_{st} < \infty)$$

¹布吕阿 (François Georges René Bruhat, 1929-2007)，法国数学家，研究代数群及其表示；相关次序以他命名。

²赫克 (Erich Hecke, 1887-1947)，德国数学家，在解析数论、模形式及相关算子理论方面作出重要贡献。

³卡日丹 (Дмитрий Александрович Каждан, 1946-)，俄裔以色列数学家，研究表示论；卢斯蒂格 (Gheorge Lusztig, 1946-)，罗马尼亚裔美国数学家，研究代数群及几何表示论。两人共同引入这里的规范基与多项式。

定义的群 W ，连同指定的生成集 S ，称为 **Coxeter 系统** (Coxeter system)。 $m_{st} = \infty$ 表示不添加这一对的关系。与某个 $s \in S$ 共轭的群元素称为该系统的反射。

当 s, t 为对合时，关系 $(st)^m = 1$ 等价于两边各有 m 项的辫关系

$$sts \cdots = tst \cdots.$$

这是将右端逆词乘到左端后得到的同一个交替词。因此 $m = 2$ 表示交换， $m = 3$ 表示 $sts = tst$ 。秩二情形设 $r = st$ ，则 $srs = r^{-1}$ ，每个词都可化为 r^i 或 $r^i s$ ；若 $m < \infty$ ，再令 $0 \leq i < m$ ，群至多有 $2m$ 个元素。正 m 边形的旋转和反射实现这些不同元素，所以 $m \geq 3$ 时恰为阶 $2m$ 的二面体群； $m = 2$ 给出四元交换群。

对称群 S_n 的邻位换位 $s_i = (i, i+1)$ 满足

$$s_i^2 = 1, \quad s_i s_j = s_j s_i \quad (|i - j| > 1), \quad s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}.$$

它们给出 A_{n-1} 型 Coxeter 系统。为证明由这些关系定义的抽象群确实同构于 S_n ，记该群为 W_n ，其子群 H 由 $s_1, \dots, s_{n-2}$ 生成。置

$$r_n = 1, \quad r_j = s_{n-1} s_{n-2} \cdots s_j \quad (1 \leq j < n).$$

集合 $\bigcup_{j=1}^n H r_j$ 对右乘每个 s_i 封闭：若 $i < j-1$ ，将 s_i 交换到左侧；若 $i = j-1$ 或 $i = j$ ，结果分别是 r_{j-1} 或 r_{j+1} ；若 $i > j$ ，辫关系和交换关系给出 $r_j s_i = s_{i-1} r_j$ 。对 $r_n = 1$ 则直接处理 $i < n-1$ 与 $i = n-1$ 。故它覆盖 W_n ，于是归纳得到 $|W_n| \leq n!$ 。另一方面，把生成元送到邻位换位得到满射 $W_n \rightarrow S_n$ ，而 $|S_n| = n!$ ，所以此映射是同构。

A.1.2 约化表达式与逆序数

定义 A.1.2. 设 (W, S) 为 Coxeter 系统， $w \in W$ 。在所有满足 $w = s_1 \cdots s_r$ 、 $s_i \in S$ 、 $r \geq 0$ 的表达式中，最小的 r 记为 $\ell(w)$ 。达到这个长度的表达式称为**约化表达式** (reduced expression)；空词表示单位元。

这里的“长度”依赖指定的 S ，不是任意群生成集给出的不变数量。因为生成元为对合，反转一个最短词给出 $\ell(w^{-1}) = \ell(w)$ 。

命题 A.1.3. 设 $n \geq 1$ 为整数， $w \in S_n$ ，用单行记号 $(w(1), \dots, w(n))$ 表示，并用邻位换位 $s_i = (i, i+1)$ 、 $1 \leq i < n$ ，定义长度 ℓ 。则

$$\ell(w) = \text{inv}(w) := \#\{(i, j) \mid i < j, w(i) > w(j)\}.$$

特别地， $\ell(ws_i) = \ell(w) + 1$ 当且仅当 $w(i) < w(i+1)$ 。

证明. 右乘 s_i 交换相邻位置的值。除它们彼此形成的那一对外，它们与其他位置贡献的逆序总数不变，所以逆序数恰增减一。因此从单位元出发的任意表达式至少有 $\text{inv}(w)$ 项。

若 $w \neq 1$ ，它的单行记号不严格递增，故存在相邻下降 $w(i) > w(i+1)$ 。右乘 s_i 减少一个逆序。重复此过程，经过恰 $\text{inv}(w)$ 步得到单位元；反转这些换位就给出同长表达式。因此下界达到，并得到最后的增减判断。 $\square$

例如 $w = 3412$ 有四个逆序,

$$w = s_2 s_1 s_3 s_2.$$

该词有四项, 因而约化。逆序数也立即给出最长置换 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$ 的长度 $n(n-1)/2$ 。

A.1.3 Bruhat 序与弱序的区别

定义 A.1.4. 设 (W, S) 为 Coxeter 系统, ℓ 为关于 S 的长度函数, $T = \{ws w^{-1} \mid w \in W, s \in S\}$, $u, v \in W$ 。若存在链

$$u = u_0, u_1, \dots, u_r = v, \quad u_{i+1} = u_i t_i, \quad t_i \in T, \quad \ell(u_{i+1}) > \ell(u_i),$$

则记 $u \leq v$, 称为 **Bruhat 序** (Bruhat order); 允许空链。若每步只许右乘简单生成元且长度增加一, 则得到右弱序。

反身性和传递性由链直接得到; 非空链长度严格增加, 所以同时 $u \leq v$ 与 $v \leq u$ 只能有 $u = v$, 这证明它们都是偏序。弱序可描述为约化词的前缀关系: 增加简单生成元的链拼成约化词; 反过来, 每个约化词的前缀仍约化, 否则用更短词代换前缀会缩短整个词。

在 S_n 中, 反射就是所有换位, 不限于邻位换位。以 $S_3 = \langle s, t \rangle$ 为例, Bruhat 序按长度分层为

$$\{1\}, \quad \{s, t\}, \quad \{st, ts\}, \quad \{sts = tst\}.$$

相邻两层之间所有可能的连接都存在。特别地 $s \leq ts$, 因为 $s(sts) = ts$ 且长度从一增加到二; 但在右弱序中没有 $s \leq ts$, 因为 $\ell(s^{-1}ts) = 3$, 不能只增加一步简单生成元。

后面构造 Hecke 代数需要三项一般词性质。

定理 A.1.5 (交换性质与子词判据). 设 (W, S) 为 Coxeter 系统, ℓ 为关于 S 的长度函数, T 为该系统的反射集合, $\leq$ 为 Bruhat 序。则对 $u, v, w \in W$ 有下列性质。

1. 若 $w = s_1 \cdots s_r$ 为约化词, $s_i \in S$, 反射 $t \in T$ 满足 $\ell(wt) < \ell(w)$, 则 wt 可由该词删去一个生成元得到。特别地, $\ell(ws) = \ell(w) \pm 1$ 对 $s \in S$ 成立。
2. 同一元素的任意两个约化词可用有限次辫关系相互变换。
3. 对 v 的任意固定约化词, $u \leq v$ 当且仅当 u 是该词的一个子词的乘积。每个区间 $\{u : u \leq v\}$ 都有限。

证明概要. 在实向量空间 $\bigoplus_{s \in S} \mathbb{R}\alpha_s$ 上规定

$$B(\alpha_s, \alpha_s) = 1, \quad B(\alpha_s, \alpha_t) = -\cos(\pi/m_{st}), \quad s(x) = x - 2B(x, \alpha_s)\alpha_s,$$

其中 $m_{st} = \infty$ 时取 $\cos(\pi/m_{st}) = 1$ 。秩二反射计算验证这些算子满足群的生成关系。根是各个 $w\alpha_s$ 。基本的根符号引理说: 每个根的简单根系数全非负或全非正, 而且 $w\alpha_s$ 为负根恰当 $\ell(ws) < \ell(w)$ 。其证明按词长归纳, 将末尾两个不同生成元组成的交替词

单独处理；有限二面体情形是相邻反射轴的夹角 π/m 的计算，无限情形的系数递推一直留在正锥中。这是本概要省略的主要归纳，详见 [9, Sections 5.3–5.7, pp. 108–116]。

简单反射只把它对应的简单正根变负，其余正根仍为正。根符号判别对一般反射给出：若 $\ell(wt) < \ell(w)$ ，则相应正根 α 满足 $w\alpha < 0$ 。从约化词右端逐次作用，必有第一次发生符号变化的位置；当时的根只能是该位置的简单根。将这个等式共轭回去，便得到 wt 正好是删除该位置的词。这给出第一项。对非约化词取最早的非约化前缀，其末字母使前一约化前缀变短；交换性质删去前缀中的一位，再删去末字母，得到不改变乘积的双位置删除。重复便可将任何非约化词变为约化子词。

第二项按 $\ell(w)$ 归纳。两个约化词首字母相同，就约去首字母；不同，记为 s, t 。用交换性质把 w 写成秩二抛物子群的元素乘一个最短左陪集代表，长度相加。由于 s, t 都使左乘长度下降，该秩二因子必须是有限二面体群的最长元。它的两个交替约化词正由一条辫关系联系；余下较短词再用归纳。这一步省略最短陪集代表的唯一性验证，它同样由交换性质得到。

若 $u \leq v$ ，沿反射下降链重复使用第一项，每步所得词若不约化，就先作双位置删除；整个过程始终只从原词删除位置，故得到子词。反向按原词长度归纳：不选末字母时使用较短前缀；选末字母时，交换性质给出的提升性质说明， $x \leq v$ 蕴含 $xs \leq v$ 或 $xs \leq vs$ 。这把已选子词接到最后一位。提升性质的两个长度情形及此项归纳见 [9, Sections 5.8–5.10, pp. 117–121]。最后，一个长度 r 的固定词仅有 2^r 个位置子集，所以区间有限。□

A.2 对称函数、Young 表与组合恒等式

第 6 章用 Young 表构造 Specht 模，第 7 章用对称函数计算它们的特征标。这里补充表格本身的计数解释，并证明置换与成对标准表之间的对应。行表类是按行内置换得到的等价类，列交错元则属于以行表类为基的模；以下的插入算法始终操作具体的表，不对等价类作插入。

A.2.1 半标准表与 Schur 多项式

定义 A.2.1. 设 λ 为分拆， $N \geq 1$ 为整数， T 为在 Young 图 $[\lambda]$ 各格填入 $1, \dots, N$ 得到的表。若每行从左到右弱递增、每列从上到下严格递增，则称 T 为**半标准 Young 表** (semistandard Young tableau)。若数字 j 出现 a_j 次，称 $(a_1, \dots, a_N)$ 为其重量，并对形式变量 $x_1, \dots, x_N$ 记 $x^T = \prod_{j=1}^N x_j^{a_j}$ 。

命题 A.2.2. 设 λ 为分拆， $N \geq 1$ 为整数， $x_1, \dots, x_N$ 为形式变量， $s_\lambda \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_N]$ 为 Schur 多项式。则

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_N) = \sum_T x^T,$$

其中 T 遍历用 $1, \dots, N$ 填写的形状 λ 的半标准表， $x^T = \prod_{j=1}^N x_j^{a_j(T)}$ ， $a_j(T)$ 为数字 j 在 T 中出现的次数。

证明. 对半标准表 T , 数字不超过 j 的格子组成一个 Young 图 $\lambda^{(j)}$: 行弱递增保证每行是前缀, 列严格递增保证上面的格子先出现。同一个数字不能出现在同列, 所以 $\lambda^{(j)}/\lambda^{(j-1)}$ 为横条。反过来, 由一条

$$\emptyset = \lambda^{(0)} \subseteq \lambda^{(1)} \subseteq \dots \subseteq \lambda^{(N)} = \lambda$$

且每次增加横条的链, 把第 j 步新增格子填为 j , 就得到半标准表。这是互逆对应。

由引理 7.1.5, 对另一组变量 z 有

$$\prod_{i,j} (1 - z_i x_j)^{-1} = \sum_{\lambda} s_{\lambda}(z) s_{\lambda}(x).$$

左端也等于 $\prod_{j=1}^N \sum_{r \geq 0} h_r(z) x_j^r$ 。使用定理 7.4.5 逐次展开各 $h_r(z)$ 的乘积, $s_{\lambda}(z)$ 的系数恰为上述横条链的重量和。Schur 函数在每个次数构成一组基, 比较系数就得到公式。□

例如形状 $(2, 1)$ 使用 $1, 2$ 时只有两张半标准表, 重量分别为 $(2, 1)$ 、 $(1, 2)$, 所以 $s_{(2,1)}(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$ 。当允许 N 个数字时, 代入 $x_i = 1$ 就计数全部半标准表; 这一数目也等于第 7 章中对应 Schur 模的维数。

A.2.2 行插入与成对标准表

对数字互异、行列均严格递增的表, 插入一个未出现的数字 a 的规则如下。先在第一行找到第一个严格大于 a 的数字 b , 用 a 替换它, 并把 b 插入下一行; 若本行没有大于待插数字的项, 就把该数字附到本行末尾并停止。若下一行原不存在, 就新建一行。

引理 A.2.3. 设 T 为 Young 图上的填数表, 所有数字互异且行列均严格递增, a 为未出现在 T 中的数字。把 a 插入第一行: 每行用待插数字替换该行第一个严格大于它的数字, 并将被替换的数字继续插入下一行; 若没有更大的数字, 就在该行末尾追加并停止, 必要时新建一行。这个行插入过程保持行列严格递增, 并且只在一个外角增加一格。给定插入后的表及该新增外角, 可以唯一恢复原表和最初插入的数字。

证明. 每行的替换位置取第一个大于待插数字的位置, 故替换后该行仍严格递增。设上一行在第 c 列弹出了数字 b 。下一行原第 c 列若存在, 其数字大于 b , 所以这次替换或追加的位置 $c' \leq c$ 。在第 c' 列上方, 若 $c' < c$, 数字小于原上一行第 c 列的 b ; 若 $c' = c$, 它已被更小的数字替换。因此新放入的 b 大于其上方数字。它又小于被替换的旧数字, 因而仍小于下方原有数字。追加时没有下方格子: 上一行长度至少达到追加位置, 而本行原先比该位置短, 下方各行更短。故新图仍为 Young 图且新增格为外角。

逆过程从指定外角取出数字 b , 删掉该格; 在上一行找到最右边严格小于 b 的数字 a , 用 b 替换它, 再将 a 向上一行继续传递, 直至离开第一行。所需位置存在, 因为当前列的上方数字小于正在向上移动的数字。正向过程中, 被插数字左边的数都小于它, 右边的数都大于被弹数字; 所以逆向选择的“最右边小于”恰找回原替换位置。逐行反转即恢复每一步, 证明存在性及唯一性。□

下面的 Robinson–Schensted 对应⁴把置换配上一对表。

定理 A.2.4 (Robinson–Schensted 对应). 设 n 为非负整数。置换 $w \in S_n$ 与一对同形状、各用 $1, \dots, n$ 填数的标准 Young 表 (P, Q) 一一对应：按 $w_i = w(i)$ 的次序行插入，得到插入表 P ，并在每步的新增格记录步数，得到记录表 Q 。

证明. 依次把 $w_1, \dots, w_n$ 行插入到空表，得到 P 。第 i 步新增一格，在第二张图的相同位置写上 i ，得到记录表 Q 。前一引理保证 P 为标准表；各步形状都是 Young 图，格子右边或下边的格子必后加入，所以 Q 也是标准表。

反过来，从 Q 中找到最大数字 n 所在的外角，在 P 中从同一外角作逆插入，得到数字 w_n ，并删去 Q 的这格。递减重复，得到 $w_{n-1}, \dots, w_1$ 。每个数字恰从原来填有 $1, \dots, n$ 的 P 中移出一次，所以输出是一个置换。引理的逐步互逆性说明两个整体过程互逆。 $\square$

算法 A-1 把这两个互逆过程写成可逐格执行的步骤。正向新增的格由记录表保存，逆向按记录数字从大到小删除外角。

算法 A-1 Robinson–Schensted 行插入与逆插入

输入： 置换 $w \in S_n$ ，或一对同形状、各填 $1, \dots, n$ 的标准 Young 表 (P, Q) 。

输出： 输入为置换时输出对应的表对 (P, Q) ；输入为表对时输出置换 w 。

```

1: if 输入为置换  $w$  then
2:   置  $P, Q$  为空表。
3:   for  $i = 1, \dots, n$  do
4:     从首行起把  $w_i$  插入  $P$ ：在每行替换第一个更大的数，把被替换数送往下一
       行；若没有更大的数，就在该行末添格并停止。记新增格为  $c_i$ 。
5:     在  $Q$  的同一格  $c_i$  填入  $i$ 。
6:   end for
7:   输出  $(P, Q)$ 。
8: else
9:   for  $i = n, n-1, \dots, 1$  do
10:    找到  $Q$  中数字  $i$  所在的外角，记其行为  $r$ ，并删去该格；从  $P$  的同一格取出
       数字  $b$  并删格。
11:    依次经过第  $r-1, \dots, 1$  行：找本行最右边小于  $b$  的数  $a$ ，用  $b$  替换它，再令
        $b \leftarrow a$ 。最后置  $w_i = b$ 。
12:   end for
13:   输出  $w$ 。
14: end if

```

每次正向插入至多新建一行，逆向每步都向上一行移动，因此两种操作均在有限步终止；其互逆性由前述引理保证。

⁴鲁宾逊 (Gilbert de Beauregard Robinson, 1906-1992)，加拿大数学家，研究对称群表示和组合学；申斯特德 (Craige Schensted, 1927-2021)，美国数学家、物理学家，提出行插入算法。

例如 $w = 312$ 的插入过程先得到单格 3，再把 1 插入并弹出 3，最后将 2 附到第一行。于是

$$P = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & \end{array}, \quad Q = \begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 2 & \end{array}.$$

从 Q 的格子 3, 2, 1 依次逆插入，正好恢复 2, 1, 3 的逆读取次序。

A.2.3 维数恒等式与格路径计数

推论 A.2.5. 设 n 为非负整数，对每个分拆 $\lambda \vdash n$ ，记 f^λ 为形状 λ 的标准表数，则

$$\sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2 = n!.$$

证明. 对固定形状，可独立选择 P, Q ，共有 $(f^\lambda)^2$ 对。上一对应把所有这些对恰好与 $n!$ 个置换对应，求和即得。□

复群代数分解也给出这一维数恒等式；插入法则直接给出组合证明。

两行形状 (a, b) 、 $a \geq b$ 还有直接的路径计数。按 $1, \dots, a+b$ 的次序读取标准表，把数字位于第一行记为一步向上，位于第二行记为一步向下。列严格递增等价于每个前缀的向上步数不少于向下步数。总路径数为 $\binom{a+b}{b}$ 。对第一次越到高度 -1 的坏路径，把到该点为止的上、下步互换，就得到具有 $a+1$ 个上步、 $b-1$ 个下步的任意路径；反向在第一次达到高度 1 的位置反射，恢复坏路径。因此

$$f^{(a,b)} = \binom{a+b}{b} - \binom{a+b}{b-1}.$$

当 $a = b = r$ 时，这是 Catalan 数

$$f^{(r,r)} = \frac{1}{r+1} \binom{2r}{r}.$$

该推导与定理 6.5.4 给出的两行钩长计算一致，但它还解释了相减的那项在数什么。

A.3 代数组合中的计数方法

用表示或生成函数描述一个集合后，计数往往可以通过取迹、取系数或比较基来完成。使用这些方法时，须说明每个代数项所代表的对象。下面分别讨论对称性、长度和有限域上的子空间。

A.3.1 轨道计数与带权循环指标

命题 A.3.1. 设有限群 G 作用于有限集 X ，记 X/G 为轨道集、 $X^g = \{x \in X : gx = x\}$ 为 $g \in G$ 的不动点集，则

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

若每个 $x \in X$ 另带一个在轨道上恒定的有理多项式环中的单项式权重 $m(x)$ ，记其在轨道 O 上的共同值为 $m(O)$ ，则轨道的权重和为

$$\sum_{O \in X/G} m(O) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{x \in X^g} m(x).$$

证明. 固定一个轨道 O 。右端双和中该轨道的贡献是

$$\frac{1}{|G|} \sum_{x \in O} |G_x| m(O).$$

轨道稳定子群公式使每项 $|G_x| = |G|/|O|$ ，故贡献恰为 $m(O)$ 。逐个轨道相加就得到带权式；令全部权重为一得到第一式。□

设 $G \leq S_n$ 置换 n 个位置，用 r 种颜色染色，并用 z_i 记录颜色 i 出现次数。若 g 有 $m_j(g)$ 个长度 j 的轮换，固定染色必须在每个轮换上同色，因此轨道重量生成函数为

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \prod_{j \geq 1} (z_1^j + \cdots + z_r^j)^{m_j(g)}. \quad (\text{A.1})$$

这就是**循环指标** (cycle index) 在染色问题中的替换规则，它适用于染色轨道大小不相同的情形。

例如四个位置只允许旋转、使用红蓝两色时，四个旋转的循环型为 $1^4, 4, 2^2, 4$ 。所以计数多项式为

$$\frac{1}{4}((a+b)^4 + (a^2+b^2)^2 + 2(a^4+b^4)) = a^4 + a^3b + 2a^2b^2 + ab^3 + b^4.$$

共有六类，两红两蓝有两类，分别是同色相邻与红蓝交替。若还允许翻转或全体颜色交换，作用群就改变了，必须重新计算。

A.3.2 分拆与逆序数的生成函数

整数分拆可以按每个部分的出现次数计数。每个正整数 j 可出现 $0, 1, \dots$ 次，所以形式级数恒等式为

$$\sum_{n \geq 0} p(n)t^n = \prod_{j \geq 1} (1 - t^j)^{-1}.$$

固定 t^n 时只有 $j \leq n$ 的因子有贡献，故右端在形式意义下良定。将只出现零或一次的选择编码为 $1 + t^j$ ，又得到

$$\prod_{j \geq 1} (1 + t^j) = \prod_{j \geq 1} \frac{1 - t^{2j}}{1 - t^j} = \prod_{\substack{j \geq 1 \\ j \text{ odd}}} (1 - t^j)^{-1}.$$

因此不同部分的分拆与全部部分为奇数的分拆等数。这是逐次形式消去，不能解读为任意数值 t 下都可重排的无穷乘积。

命题 A.3.2. 设 n 为非负整数, q 为形式变量, $\ell(w)$ 为 $w \in S_n$ 关于邻位换位的长度。则在 $\mathbb{Z}[q]$ 中有

$$\sum_{w \in S_n} q^{\ell(w)} = \prod_{j=1}^n (1 + q + \cdots + q^{j-1}).$$

证明. 由命题 A.1.3, 长度等于逆序数。在一个 S_{n-1} 置换中插入最大数字 n 。若它右边有 r 个数字, 就新增恰 r 个逆序, 而 r 唯一遍历 $0, \dots, n-1$ 。因此长度多项式递推为前一级乘 $1 + q + \cdots + q^{n-1}$ 。从 $n=1$ 的初值一开始便得到公式。□

在 $q=1$ 处恢复 $n!$, 在 $q=-1$ 处 ($n \geq 2$) 得到零, 表示奇、偶置换等数。最高次数为 $n(n-1)/2$, 最高项系数一, 正对应唯一的最长置换。这个多项式记录了各长度的置换数, 后面还会出现在旗空间的计数中。

A.3.3 有限域子空间与 Gaussian 二项式

命题 A.3.3. 设 q 为素数幂, n, r 为满足 $0 \leq r \leq n$ 的整数, $\mathbb{F}_q$ 为 q 元有限域。向量空间 $\mathbb{F}_q^n$ 中 r 维 $\mathbb{F}_q$ 子空间的数目为

$$\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}_q = \frac{(q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{r-1})}{(q^r - 1)(q^r - q) \cdots (q^r - q^{r-1})} = \prod_{i=1}^r \frac{1 - q^{n-r+i}}{1 - q^i}.$$

取空乘积为一。

证明. 有序线性无关 r 元组可逐个选择: 第 $i+1$ 个向量不得落在前 i 个生成的 q^i 元子空间中, 所以共有分子的数目。每个固定 r 维子空间的有序基数为分母, 且每个独立元组唯一确定其生成子空间。相除得到第一式; 提出相应的 q^i 并调整指标得到第二式。□

尽管最后写成有理表达式, 它实际是关于 q 的整系数多项式。固定超平面 $H = \mathbb{F}_q^{n-1}$, 将 r 维子空间分成包含于 H 和不包含于 H 两类。后一类的交 $U = W \cap H$ 维数为 $r-1$ 。在 V/U 中, W/U 是不落在超平面 H/U 中的一条直线; 把最后一坐标归一为一, 其数目是 q^{n-r} 。于是

$$\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}_q = \begin{bmatrix} n-1 \\ r \end{bmatrix}_q + q^{n-r} \begin{bmatrix} n-1 \\ r-1 \end{bmatrix}_q. \quad (\text{A.2})$$

边界值为一, 越界值为零, 归纳便给出整系数多项式性。令形式参数 $q=1$ 时递推变成普通二项式递推, 故其值为 $\binom{n}{r}$; 这不是声称存在一个单元素的域。

完整旗 $0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = \mathbb{F}_q^n$ 、 $\dim V_i = i$, 可先选一条直线, 再在商空间中选完整旗。因此旗的数目为

$$\prod_{j=1}^n \frac{q^j - 1}{q - 1} = \prod_{j=1}^n (1 + q + \cdots + q^{j-1}).$$

它与置换长度多项式相同, 提示了长度与旗几何之间的联系; 两边在此均有独立的计数证明。

A.4 Hecke 代数与 Kazhdan–Lusztig 理论

群代数中简单反射满足平方为一。如果把这个二次关系变形，同时保留辫关系，就得到 Hecke 代数。它的标准基仍由群元素标号，却还存在与一个参数反演相容的特殊基。本节固定一种归一化，并通过 S_3 把不同基与胞腔表示具体算出来。

A.4.1 参数、二次关系与标准基

定义 A.4.1. 设 (W, S) 为 Coxeter 系统， v 为形式变量， $R = \mathbb{Z}[v, v^{-1}]$ 。用生成元 H_s ($s \in S$)、关系

$$(H_s - v)(H_s + v^{-1}) = 0$$

以及与 Coxeter 系统相同的辫关系定义的含单位结合 R 代数，称为等参数 Hecke 代数 (Hecke algebra)，记为 $\mathcal{H}(W)$ 。

定理 A.4.2 (Hecke 标准基). 设 (W, S) 为 Coxeter 系统， ℓ 为关于 S 的长度函数， v 为形式变量， $R = \mathbb{Z}[v, v^{-1}]$ 。令 $\mathcal{H}(W)$ 为以 H_s 、 $s \in S$ ，生成的等参数 Hecke R 代数，满足 $(H_s - v)(H_s + v^{-1}) = 0$ 及该 Coxeter 系统的辫关系。对约化词 $w = s_1 \cdots s_r$ ，乘积 $H_w = H_{s_1} \cdots H_{s_r}$ 与约化词的选择无关，而且 $\{H_w \mid w \in W\}$ 为 R 基。乘法满足

$$H_s H_w = \begin{cases} H_{sw}, & \ell(sw) = \ell(w) + 1, \\ H_{sw} + (v - v^{-1})H_w, & \ell(sw) = \ell(w) - 1. \end{cases} \quad (\text{A.3})$$

证明. 记 $d = v - v^{-1}$ 。由定理 A.1.5 的辫词性质， H_w 良定义。若 sw 较短，则 $w = s(sw)$ 是约化分解，二次关系 $H_s^2 = 1 + dH_s$ 给出第二种乘法；较长时直接接上 s 。因此所有生成元乘积都在这些 H_w 的生成空间中。

为证线性无关，取自由模 $E = \bigoplus_{w \in W} R e_w$ ，按同一长度规则定义算子

$$L_s e_w = e_{sw} + \begin{cases} 0, & \ell(sw) > \ell(w), \\ d e_w, & \ell(sw) < \ell(w), \end{cases} \quad R_t e_w = e_{wt} + \begin{cases} 0, & \ell(wt) > \ell(w), \\ d e_w, & \ell(wt) < \ell(w). \end{cases}$$

在 e_w, e_{sw} 上直接算得 $L_s^2 = 1 + dL_s$ 。还须验证 $L_s R_t = R_t L_s$ 。如果 $sw \neq wt$ ，交换性质说明：两次长度改变方向相同时， swt 的长度再沿该方向改变一次；方向相反时，最终长度回到 $\ell(w)$ 。例如两边都增加而最终不增加，则对约化词 wt 左乘 s 的交换性质只能删去末尾的 t ，否则会使 sw 较短，故只能有 $sw = wt$ ；两边都减少的情形将这个论证反用即可。在这些长度情形中代入上式，两种复合具有相同的各基系数。若 $sw = wt$ ，两边都增加时，两种复合均为 $e_w + d e_{sw}$ ；两边都减少时，均为 $(1 + d^2)e_w + d e_{sw}$ 。于是左右算子确实交换。

当 $m_{st} < \infty$ 时， s, t 的两条长度 m_{st} 交替词是该二面体子群最长元的约化词，故相应左算子乘积在 e_1 上有相同值。两种乘积都与全部 R_u 交换，而各个 e_w 都能由 e_1 沿一个约化词依次右乘得到，故两种乘积在全 E 上相同。这样 L_s 满足全部定义关系，给出 $\mathcal{H}(W)$ 在 E 上的表示。最后 $H_w e_1 = e_w$ ，所以任何 H_w 的线性关系作用到 e_1 后都只能有零系数。□

原始 Hecke 代数的基及乘法约定见 [11, Section 1, p. 165]。原文使用 $q = v^2$ 与 $T_w = v^{\ell(w)} H_w$ ，于是二次式变为 $(T_s + 1)(T_s - q) = 0$ 。比较公式时须先写清参数与归一化的对应。

在秩一情形无需任何一般词理论：

$$\mathcal{H}(C_2) = R[H]/(H^2 - (v - v^{-1})H - 1).$$

首一除法直接给出基 $1, H$ 。当 $v = 1$ 时，关系成为 $H^2 = 1$ ，恢复群环 $\mathbb{Z}[C_2]$ ；一般 Coxeter 情形由标准基定理同样得到 $\mathcal{H}(W)/(v - 1) \simeq \mathbb{Z}[W]$ 。

在 $S_3 = \langle s, t \rangle$ 中，标准基为

$$1, H_s, H_t, H_{st}, H_{ts}, H_{sts},$$

而 (A.3) 给出

$$H_s H_{st} = H_t + (v - v^{-1}) H_{st}, \quad H_s H_{ts} = H_{sts}.$$

一个乘法用了长度下降，另一个用了长度上升；不能在两种情况下都直接把群元素下标相乘。

A.4.2 反演算子与规范基

二次关系给出 $H_s^{-1} = H_s - (v - v^{-1})$ 。由此可定义半线性环对合

$$\bar{v} = v^{-1}, \quad \overline{H_w} = H_w^{-1}.$$

它保持乘法而反演系数参数。良定义可从生成关系核验：逆元满足参数反演后的二次关系，取逆并反向读取辫关系仍得到同一对辫词；再作一次变换恢复各生成元。因此它不是把乘法次序倒转的反自同构。

定理 A.4.3 (Kazhdan–Lusztig 规范基). 设 (W, S) 为 Coxeter 系统， ℓ 为关于 S 的长度函数， v 为形式变量， $R = \mathbb{Z}[v, v^{-1}]$ 。令 $\mathcal{H}(W)$ 为满足 $(H_s - v)(H_s + v^{-1}) = 0$ 及 Coxeter 辫关系的等参数 Hecke R 代数， H_w 为其标准基。以 $\bar{v} = v^{-1}$ 、 $\overline{H_w} = H_w^{-1}$ 定义半线性环对合。对每个 $w \in W$ ，存在唯一元素 $C'_w \in \mathcal{H}(W)$ 满足

$$\overline{C'_w} = C'_w, \quad C'_w = H_w + \sum_{y < w} a_{y,w}(v) H_y, \quad a_{y,w}(v) \in v^{-1} \mathbb{Z}[v^{-1}],$$

其中 $<$ 为 Bruhat 严格序。这些元素构成 $\mathcal{H}(W)$ 的 R 基，且对形式变量 q 有

$$a_{y,w}(v) = v^{\ell(y) - \ell(w)} \cdot P_{y,w}(v^2), \quad P_{y,w}(q) \in \mathbb{Z}[q],$$

对 $y < w$ 有 $\deg P_{y,w} \leq (\ell(w) - \ell(y) - 1)/2$ ，并置 $P_{w,w} = 1$ 。

证明. 先注意 $\overline{H_w} = H_w + \sum_{y < w} r_{y,w} H_y$ ：沿约化词把每个 H_s 换成 $H_s - d$ ，非最高项来自删去位置的子词，利用乘法规则和子词判据便得到所示三角形展开。所有涉及的 Bruhat 区间有限。

按长度构造 C'_w , 取 $C'_1 = 1$. 设 $w = su$ 且 $\ell(w) = \ell(u) + 1$, 较短元素的规范基已经构造. 乘积 $D = (H_s + v^{-1})C'_u$ 自对偶, 最高项为 H_w , 其余项的下标都小于 w . 由乘法规则, D 的低项系数没有正次幂; 唯一可能的常数项是 $\mu(y, u)$, 即 $a_{y,u}$ 中 v^{-1} 的系数, 而且只在 $y < u$ 、 $sy < y$ 时出现. 因此定义

$$C'_w = D - \sum_{\substack{y < u \\ sy < y}} \mu(y, u) C'_y.$$

减项仍自对偶, 恰消去各个常数项; 其低项系数原本只有负次幂, 故不会产生新的常数项. 这给出所需存在性.

同时归纳验证: $a_{y,w}$ 中每个指数不小于 $\ell(y) - \ell(w)$, 且与该数同奇偶. 初始情形成立; 乘法规则中的 v^{-1} 及 $v - v^{-1}$ 各移动一次指数, 与长度改变相符. 减项中 $\mu(y, u) \neq 0$ 要求 $\ell(u) - \ell(y)$ 为奇数, 所以 $\ell(w) - \ell(y)$ 为偶数; 该减项也保持奇偶性和指数下界. 结合所有指数严格为负, 便可唯一写成 $v^{\ell(y) - \ell(w)} \cdot P_{y,w}(v^2)$, 其中 $P_{y,w}$ 为整系数多项式, 次数不超过所给上界.

若有两个符合刻画元素, 取其差中 Bruhat 极大的非零下标 y . 三角形反演说明对应系数 f 必满足 $f(v) = f(v^{-1})$. 但 f 只有严格负次幂, 只能为零, 矛盾. 这证明唯一性. 最后, 有限下区间上的单位三角形变换可逐项反解, 故全部 C'_w 组成 R 基. $\square$

这是原论文 [11, Theorem 1.1, equivalent formulation (1.1.c), p. 166] 的归一化改写. 多项式 $P_{y,w}$ 称为 **Kazhdan–Lusztig 多项式** (Kazhdan–Lusztig polynomial). 下述低秩计算可直接检验递推; 一般系数的正性以及 Lie 代数中的特征标公式则是另外的结果.

对简单反射,

$$C'_s = H_s + v^{-1}.$$

由逆元公式, $\overline{H_s + v^{-1}} = H_s - (v - v^{-1}) + v = H_s + v^{-1}$, 所以确为自对偶. 若记 $a = v^{-1}$, 在 S_3 中得到

$$\begin{aligned} C'_{st} &= C'_s C'_t = H_{st} + a(H_s + H_t) + a^2, \\ C'_{ts} &= C'_t C'_s = H_{ts} + a(H_s + H_t) + a^2, \\ C'_{sts} &= C'_s C'_t C'_s - C'_s \\ &= H_{sts} + a(H_{st} + H_{ts}) + a^2(H_s + H_t) + a^3. \end{aligned}$$

每个乘积和差均自对偶; 展开后最高项系数一, 其余系数只含严格负次幂, 且下标在已计算的 Bruhat 区间中. 因此它们就是所求规范基. 最后一个式子的减项不可省略: 未减之前 H_s 的系数为 $1 + a^2$, 含常数项, 不满足规范条件. 这里所有 $P_{y,w}$ ($y \leq w$) 都等于一, 但高秩时不会一直如此.

A.4.3 胞腔与一个二维表示

定义 A.4.4. 设 (W, S) 为 Coxeter 系统, v 为形式变量, $\mathcal{H}(W)$ 为满足 $(H_s - v)(H_s + v^{-1}) = 0$ 的等参数 Hecke $\mathbb{Z}[v, v^{-1}]$ 代数, C'_w 、 $w \in W$, 为 Kazhdan–Lusztig 规范基.

对 $x, y \in W$, 若某个 $s \in S$ 使 $C'_s C'_y$ 的展开含非零的 C'_x 系数, 就画有向关系 $y \rightarrow x$ 。令 $x \preceq_L y$ 表示存在从 y 到 x 的有向链, 允许空链。互相可达给出的等价类称为左胞腔 (left cell)。改用右乘定义右胞腔, 同时允许两种乘法则定义双边胞腔。

这不是 Bruhat 偏序: 它由乘法结构常数决定, 互相可达还可能把不同长度的元素放在一起。定义采用的规范基版本必须一致; 原文同时使用 C_w, C'_w , 其等价的图定义及表示论用途见 [11, Section 1, Definition 1.2 and Theorems 1.3–1.4, pp. 166–167]。

令 Γ 是一个左胞腔。所有满足 $x \preceq_L y$ 、某个 $y \in \Gamma$ 的基元的线性生成空间是左理想, 因为乘以 C'_s 只能沿有向关系继续向下走, 而 $H_s = C'_s - v^{-1}$ 。其中不属于 Γ 的那些基元也生成左理想: 若还能乘回 Γ , 它就与 Γ 互相可达, 矛盾。这两个左理想的商因而给出一个以 Γ 为基的胞腔表示。这一步只用定义与基的线性无关性。

在 S_3 中, 置 $b = v + v^{-1}$, 直接由前面的展开和二次关系得到

$$(C'_s)^2 = bC'_s, \quad C'_t C'_s = C'_{ts}, \quad C'_s C'_{ts} = C'_{sts} + C'_s, \quad C'_t C'_{ts} = bC'_{ts}.$$

交换 s, t 给出另外四式, 而 $C'_s C'_{sts} = C'_t C'_{sts} = bC'_{sts}$ 。由此左胞腔恰为

$$\{1\}, \quad \{s, ts\}, \quad \{t, st\}, \quad \{sts\}.$$

对 $\Gamma = \{s, ts\}$, 令商中的两基向量为 e_s, e_{ts} 。在商中删去 C'_{sts} 项后,

$$[C'_s]_{\Gamma} = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad [C'_t]_{\Gamma} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}.$$

由 $H_i = C'_i - v^{-1}$ 得到 Hecke 生成元矩阵。在 $v = 1$ 处, 它们成为

$$s \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad t \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

两者平方为一, 乘积迹为 -1 、行列式为一, 且满足辫关系。三个换位的迹为零, 两个三轮换的迹为 -1 , 所以在复数域上它就是 S_3 的二维标准表示。胞腔方法由此把一个乘法基中的组合结构变成了实际的表示矩阵。

本章小结

邻位换位每次改变一个逆序, 所以最短词与逆序数一致。Bruhat 序允许乘任意反射, 弱序只允许简单生成元; 两者从 S_3 开始已有区别。半标准表通过逐次加横条解释 Schur 多项式, 而行插入与逆插入把置换分配到同形状的成对标准表, 给出标准表数平方和的恒等式。

轨道计数利用轨道大小与稳定子群阶的关系, 子空间计数则把线性无关元组的数目除以每个子空间的有序基数。生成函数记录次数、逆序数或颜色数量。Hecke 代数将反射的二次关系变形; 它的规范基以自对偶和三角条件刻画, 低秩胞腔已经能产生非平凡表示矩阵。

习题

习题 A.1. 设 $W = \langle s, t \mid s^2 = t^2 = 1, (st)^4 = 1 \rangle$. 列出全部元素的长度, 并求长度生成多项式。

解. 元素依次为

$$1; \quad s, t; \quad st, ts; \quad sts, tst; \quad stst = tsts.$$

在长度小于四时, 约去相邻相同字母后只剩交替词, 两个不同交替词在正方形的旋转反射模型中不同. 长度四的两词由辫关系相等, 其他更长词可利用这个关系并约去相同邻字继续缩短. 因而所列长度分别为 0, 1, 2, 3, 4, 生成多项式为 $1 + 2q + 2q^2 + 2q^3 + q^4$. $\square$

习题 A.2. 求置换 4213 的长度, 并用邻位换位写出一个约化表达式。

解. 四贡献三个逆序, 二与一再贡献一个, 所以长度四. 从 4213 右乘 s_2, s_1, s_2, s_3 , 依次得到 4123, 1423, 1243, 1234. 因此 $4213 = s_3 s_2 s_1 s_2$. 这个词有四项, 达到逆序下界, 故约化. $\square$

习题 A.3. 在 S_3 中给出两个长度相同却不能在 Bruhat 序下比较的不同元素; 再给出一对在 Bruhat 序下可比而在右弱序下不可比的元素, 并直接核验。

解. s 与 t 均长度一. Bruhat 的非空链严格增加长度, 所以二者不可比. 另一例取 t 与 st : 右乘反射 tst 有 $t(tst) = st$, 长度增加, 故 $t \leq st$. 若右弱序可比, 长度差一迫使 $st = tr$, $r \in \{s, t\}$, 但 $ts \neq st$, $tt = 1$, 矛盾. $\square$

习题 A.4. 设 $w_0 = n(n-1)\cdots 1 \in S_n$. 证明 $\ell(w_0 w) = \binom{n}{2} - \ell(w)$, 并据此说明长度多项式的系数为何对称。

解. $(w_0 w)(i) = n+1-w(i)$, 所以每一对位置在 $w_0 w$ 中逆序, 当且仅当在 w 中不逆序. 位置对共有 $\binom{n}{2}$, 由长度等于逆序数得到公式. 映射 $w \mapsto w_0 w$ 是双射, 因此长度 d 与长度 $\binom{n}{2} - d$ 的置换等数. $\square$

习题 A.5. 求用 1, 2, 3 填写的形状 (2, 1) 的半标准表数, 并按重量说明计数。

解. 重量为某两个数字中的一个出现两次、另一个一次时, 只要确有两个不同数字, 恰有一张半标准表; 三个数字中选择重复数字及另一数字, 给出六张. 重量 (1, 1, 1) 时, 左上角必须是一, 二、三可以交换放在右上角和左下角, 给出两张. 只有一个数字时列严格递增不可能. 因此共八张, 对应

$$s_{(2,1)}(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i \neq j} x_i^2 x_j + 2x_1 x_2 x_3.$$

$\square$

习题 A.6. 对置换 2413 进行行插入, 求 P, Q , 再从所得表对逆向恢复置换。

解. 前两步第一行为 2, 4. 插入一时弹出二, 得到第一行 1, 4、第二行 2; 插入三时弹出四, 附到第二行, 故

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

先删 Q 的四所在格：取出 P 的四，向上替换最右边小于四的三，输出三。删三所在格：取出二，向上替换一，输出一。余下第一行 2, 4，依次输出四、二。逆序读取输出即恢复 2, 4, 1, 3。□

习题 A.7. 给定

$$P = \begin{array}{ccc} 1 & 3 & 4 \\ 2 & & \end{array}, \quad Q = \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 4 \\ & 3 & \end{array},$$

求对应的置换。

解. 删记录数字四的格子直接输出四。删数字三所在的第二行格子，取出二，在上行把一替换为二，输出一。此时上行为 2, 3，接着输出三、二。因此置换为 2314。正向插入二、三后第一行为 2, 3，插入一弹出二，最后把四附到第一行，核验了原表对。□

习题 A.8. 列出形状 $(3, 3)$ 的全部标准表，只写第一行即可，并与 Catalan 数核验。

解. 第一行可能是 123, 124, 125, 134, 135，第二行由其余三个数字递增填入。它们的每个读取前缀均满足第一行数字数不少于第二行数字数；其他选择会违反该条件。共有五张，符合 $\frac{1}{4}\binom{6}{3} = 5$ 。□

习题 A.9. 四个圆周位置用三种固定颜色染色，只把旋转视为相同。求总轨道数，并求其中第一种颜色出现两次、其余颜色各一次的轨道数。

解. 循环指标给出总数 $(3^4 + 3^2 + 2 \cdot 3)/4 = 24$ 。指定重量为 a^2bc 时，只有恒等置换的固定染色有贡献，系数为

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{4!}{2!1!1!} = 3.$$

半周旋转强迫每种颜色出现偶数次，四分之一周旋转强迫全部同色，故其余项不贡献。□

习题 A.10. 把上一题的等价关系扩大为正方形的全部旋转和反射，求三色染色的轨道数。

解. 四个旋转的固定染色总和为 96。两条经过对顶点的反射轴具有循环型 1^22 ，各固定 $3^3 = 27$ 种；两条经过对边中点的轴具有型 2^2 ，各固定 $3^2 = 9$ 种。因此总轨道数为 $(96 + 54 + 18)/8 = 21$ 。这小于只允许旋转时的二十四，说明多三对旋转轨道被反射合并。□

习题 A.11. 分别列出六的不同部分分拆与全部部分为奇数的分拆，核验二者等数。

解. 不同部分分拆为 6, 5 + 1, 4 + 2, 3 + 2 + 1。奇数部分分拆为 5 + 1, 3 + 3, 3 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1，各四个。两张清单中的对象并不按写法直接相同，等数来自生成函数恒等式。□

习题 A.12. 求 S_4 中长度为二的置换数，不必逐个列出置换。

解. 长度多项式为 $(1 + q)(1 + q + q^2)(1 + q + q^2 + q^3)$ 。取得 q^2 有两种方式：从后二个因子之一取 q^2 ，共二种；或从三个非平凡因子中选两个取 q ，共三种。所以系数为五。□

习题 A.13. 求 $\mathbb{F}_2^4$ 的二维子空间数, 并求包含一条指定直线的二维子空间数。

解. 总数为

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}_2 = \frac{(16-1)(16-2)}{(4-1)(4-2)} = 35.$$

包含指定直线 L 的二维空间与 $\mathbb{F}_2^4/L$ 的直线一一对应, 故数目为 $(2^3-1)/(2-1) = 7$. 商空间对应的原像维数为二, 这说明对应确实双向成立. $\square$

习题 A.14. 计算 $\mathbb{F}_3^3$ 的完整旗数, 并用“先选直线, 再选平面”重新计算。

解. 公式给出 $(1)(1+3)(1+3+9) = 52$. 直接计算时, 直线共有十三条; 固定直线 L 后, 包含它的平面对应二维商空间的直线, 共四条. 因此也得到 $13 \cdot 4 = 52$. $\square$

习题 A.15. 在秩一 Hecke 代数中, 令 $d = v - v^{-1}$. 计算 H^3, H^4 , 并核验 $v = 1$ 时的结果。

解. 由 $H^2 = dH + 1$,

$$H^3 = (d^2 + 1)H + d, \quad H^4 = (d^3 + 2d)H + d^2 + 1.$$

令 $v = 1$ 后 $d = 0$, 分别得到 $H^3 = H, H^4 = 1$, 符合二阶群生成元的幂. $\square$

习题 A.16. 在 S_3 的 Hecke 代数中计算 H_{st}^{-1} , 并解释为什么它不同于 $\overline{H_{st}}$.

解. 令 $d = v - v^{-1}$. 则

$$H_{st}^{-1} = H_t^{-1}H_s^{-1} = H_{ts} - d(H_s + H_t) + d^2.$$

而 $\overline{H_{st}} = H_s^{-1}H_t^{-1} = H_{st} - d(H_s + H_t) + d^2$. 标准基中 $H_{st} \neq H_{ts}$, 所以两者不同. 反演参数的横线映射保持乘法次序, 取群元素逆的运算则反转次序. $\square$

习题 A.17. 在系数域 $\mathbb{Q}(v)$ 上, 构造秩一 Hecke 代数的两个正交本原幂等元; 说明它们在 $v = 1$ 时的意义, 以及为什么不能将同一分式直接特化到 $v^2 = -1$.

解. 令 $b = v + v^{-1}$, 取

$$e_+ = \frac{H_s + v^{-1}}{b}, \quad e_- = \frac{v - H_s}{b}.$$

二者之和为一, 乘积由二次关系为零, 所以各自平方等于自身. 它们对应不同根 $v, -v^{-1}$ 的两个一维代数分量, 因而本原. 在 $v = 1$ 处, 得到 $(1+s)/2$ 与 $(1-s)/2$, 分别投影到平凡和符号部分. 若 $v^2 = -1$, 分母为零且二次关系的两根重合; 所得代数形如 $k[H]/(H-v)^2$, 不是两个域的乘积, 不能延用这个幂等分解. $\square$

习题 A.18. 对正文的二维胞腔表示, 计算 H_s, H_t 在 $R = \mathbb{Z}[v, v^{-1}]$ 上的矩阵, 并验证其中一条二次关系. 再求 $v = 1$ 时两个一维胞腔的表示。

解. 从规范基矩阵减去 $v^{-1}I$, 得到

$$H_s = \begin{pmatrix} v & 1 \\ 0 & -v^{-1} \end{pmatrix}, \quad H_t = \begin{pmatrix} -v^{-1} & 0 \\ 1 & v \end{pmatrix}.$$

对于 H_s , 矩阵 $H_s - vI$ 与 $H_s + v^{-1}I$ 相乘, 对角项为零, 右上项为 $0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$, 其余也为零, 故二次关系成立。胞腔 $\{1\}$ 中, $C'_s \cdot 1 = C'_s$ 属于被取商去掉的部分, 所以 H_s 作用为 $-v^{-1}$, 特化为符号表示。胞腔 $\{sts\}$ 中 C'_s 作用为 $v + v^{-1}$, 故 H_s 作用为 v , 特化为平凡表示。 $\square$

附录 B 量子群、簇代数与范畴化

本附录选取量子 $\mathfrak{sl}_2$ 、五周期簇变异与 Grothendieck 群三个模型，分别讨论参数变形、有理坐标变换和正合列产生的环关系。

本章目标

- 核验量子包络代数的关系与 Hopf 公式，判断普通张量翻转为何可能不等变。
- 计算二阶簇变量，区分单个算例的 Laurent 性与一般定理。
- 比较分裂 Grothendieck 群和短正合 Grothendieck 群，并用张量函子解释乘法。
- 在单位根、参数退化及点代入中检查原有证明的假设。

从两个代数独立的变量 x, y 出发，先令 $x' = (1 + y)/x$ ，再令 $y' = (1 + x')/y = (x + 1 + y)/(xy)$ 。每走一步，新的变量都是旧变量的有理式，分母似乎会越来越复杂；交替继续下去，出现的簇变量却只有五种。这种小规模周期现象可以直接核对，但一般簇变异是否总能化成初始变量的 Laurent 多项式，需要更深的理由。另一方面，给 $\mathfrak{sl}_2$ 的关系引入参数 q ，又会改变表示中的系数与张量规则。本附录分别从可计算的模型看这些变化，而不把不同理论之间的类比当作证明。

本附录需要第 14—15 章的 $\mathfrak{sl}_2$ 与包络代数、第 21 章的 Hopf 代数，以及有限长度模的合成列。簇代数小例只用有理函数的恒等变形，一般 Laurent 现象的证明概要另用通用系数和唯一分解。其余证明围绕所选模型展开；一般量子群、簇代数和高阶范畴化的系统理论可参阅相应专著。

量子 $\mathfrak{sl}_2$ 与参数版本可参阅 [3, Section 5.6]；簇代数原始文献为 [5, Sections 2–3, 6]，所引节号依作者公开稿。

B.1 量子群与 Hopf 代数

本节以 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 介绍量子群，验证它的 Hopf 结构，并比较参数对表示的影响。量子半单代数的一般理论及其分类可留待进一步学习。

B.1.1 生成关系与余乘法

定义 B.1.1. 设 k 为特征零域， $q \in k^\times$ 、 $q^2 \neq 1$ 。由生成元 E, F, K, K^{-1} 及关系

$$KK^{-1} = K^{-1}K = 1, \quad KEK^{-1} = q^2E, \quad KFK^{-1} = q^{-2}F, \quad EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}$$

定义的含么结合 k 代数，记为 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ，称为相应的量子包络代数。

命题 B.1.2. 设 k 为特征零域, $q \in k^\times$, $q^2 \neq 1$, $U = U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 为由 E, F, K, K^{-1} 生成的含么结合 k 代数, 关系为

$$KK^{-1} = K^{-1}K = 1, \quad KEK^{-1} = q^2E, \quad KFK^{-1} = q^{-2}F, \quad EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}.$$

则以下公式延伸为代数同态 $\Delta : U \rightarrow U \otimes_k U$ 、 $\varepsilon : U \rightarrow k$ 和反代数同态 $S : U \rightarrow U$, 并给出 U 的 Hopf 结构:

$$\begin{aligned} \Delta(K) &= K \otimes K, \quad \Delta(E) = E \otimes K + 1 \otimes E, \quad \Delta(F) = F \otimes 1 + K^{-1} \otimes F, \\ \varepsilon(K) &= 1, \quad \varepsilon(E) = 0, \quad \varepsilon(F) = 0, \\ S(K) &= K^{-1}, \quad S(E) = -EK^{-1}, \quad S(F) = -KF. \end{aligned}$$

证明. 先检查余乘法在自由代数上定义的同态保持关系. 关于 K 的逆及共轭等式逐项由 $KE = q^2EK$ 、 $KF = q^{-2}FK$ 得到. 交换子中两项交叉乘积相消, 因为 $EK^{-1} = q^2K^{-1}E$ 、 $KF = q^{-2}FK$. 故

$$[\Delta(E), \Delta(F)] = [E, F] \otimes K + K^{-1} \otimes [E, F] = \frac{K \otimes K - K^{-1} \otimes K^{-1}}{q - q^{-1}},$$

正是右侧关系的余乘法. 余单位也保持关系. 对极按反同态延拓; 例如 $S(E)S(K) - q^2 \cdot S(K)S(E) = 0$ 对应 $KE = q^2EK$ 的反序像; F 的共轭关系同理由 $KF = q^{-2}FK$ 给出. 剩下的交换子关系为

$$S(F)S(E) - S(E)S(F) = KFEK^{-1} - EF = FE - EF = \frac{K^{-1} - K}{q - q^{-1}},$$

正是 $S((K - K^{-1})/(q - q^{-1}))$; 这里 K 与 FE 交换. 逆元关系也被保持, 故三映射在商代数上良定义. 余结合与余单位只需在 $E, F, K^{\pm 1}$ 上核验; 例如两种三重余乘法在 E 上都为 $E \otimes K \otimes K + 1 \otimes E \otimes K + 1 \otimes 1 \otimes E$. 对极的左、右等式在 E 上分别为 $-EK^{-1}K + E = 0$ 、 $EK^{-1} - EK^{-1} = 0$, 在 F 上分别为 $-KF + KF = 0$ 、 $F - K^{-1}KF = 0$, 在 $K^{\pm 1}$ 上都是逆元等式. 还须说明生成元上的核验能推广到乘积. 用 $\Delta(a) = \sum a_{(1)} \otimes a_{(2)}$ 的记号, 若左对极等式已对 a, b 成立, 则

$$\begin{aligned} \sum S(a_{(1)}b_{(1)})a_{(2)}b_{(2)} &= \sum S(b_{(1)})S(a_{(1)})a_{(2)}b_{(2)} \\ &= \varepsilon(a) \sum S(b_{(1)})b_{(2)} = \varepsilon(a)\varepsilon(b)1. \end{aligned}$$

右等式按相反次序先消去 b 的两项, 得到同一结论. 由乘积归纳及线性性, 全部对极等式成立. $\square$

这些公式及其版本可对照 [3, Definition 5.6.1, Theorem 5.6.2]. 同一量子代数有不同但等价的余乘法惯例, 计算张量表示时必须选定一套, 不能混合来自两套惯例的公式.

B.1.2 权模与量子整数

对整数 r ，定义量子整数

$$[r]_q = \frac{q^r - q^{-r}}{q - q^{-1}}.$$

对 $m \geq 0$ ，在基 $v_0, \dots, v_m$ 上规定

$$Kv_i = q^{m-2i}v_i, \quad Fv_i = v_{i+1}, \quad Ev_i = [i]_q[m-i+1]_qv_{i-1},$$

其中两端之外的向量为零。关于 K 的两个关系直接由权变化得到；交换子关系等价于

$$[i+1]_q[m-i]_q - [i]_q[m-i+1]_q = [m-2i]_q,$$

把各量按定义展开就能核验。所以这些矩阵确实构成一个 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 模。

若 q 不是单位根，则这些 K 特征值互异，所有内部升算子系数非零。对不变子空间先用 K 作多项式投影得到某个基向量，再升到 v_0 、降到所有向量，证明该模不可约。上述结论针对这组最高权模型；一般量子群模的分类还须规定相应的表示类别。

B.1.3 张量次序与非余交换性

在 $m=1$ 的二维模型中， $Ev_1 = v_0$ 、 $Ev_0 = 0$ 、 $Kv_0 = qv_0$ 。由固定的余乘法，

$$E(v_1 \otimes v_0) = qv_0 \otimes v_0, \quad E(v_0 \otimes v_1) = v_0 \otimes v_0.$$

当 $q \neq 1$ 时，普通交换两因子的线性映射不与 E 交换。因此即使底层空间仍是通常张量积，表示范畴中的交换同构也不再由直接翻转给出。

在合适的有限维表示类别中，可以引入 R 矩阵来修正交换，并由此研究辫群作用。 R 矩阵是额外结构，须满足相应的相容恒等式；拟三角 Hopf 代数的一般理论见 [3, Section 8.3]。

B.2 簇代数的变异与小秩例子

簇代数通过一串有理变量替换生成交换环。每次替换只改变一个变量，新变量的分子是两个单项式的和。这些替换不断引入分母，但在某些小秩例子中会出现有限循环，变量仍能写成 Laurent 多项式。下面从一个二阶例子说明这一现象。

B.2.1 种子与交换关系

先取特征零域 k 、有理函数域 $k(x_1, \dots, x_n)$ ，以及反对称整数矩阵 $B = (b_{ij})$ 。向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 的分量代数独立，这一对数据称为一个无系数种子。沿位置 r 的变异保留 x_i 、 $i \neq r$ ，并用

$$x_r x'_r = \prod_{b_{ir} > 0} x_i^{b_{ir}} + \prod_{b_{ir} < 0} x_i^{-b_{ir}}$$

定义 x'_r 。空乘积取一。矩阵改为

$$b'_{ij} = \begin{cases} -b_{ij}, & i=r \text{ 或 } j=r, \\ b_{ij} + [b_{ir}]_+ [b_{rj}]_+ - [-b_{ir}]_+ [-b_{rj}]_+, & i, j \neq r, \end{cases} \quad [a]_+ = \max(a, 0).$$

全部有限次变异得到的变量称为簇变量，它们在原有理函数域中生成的 k 子代数称为此种子的簇代数。

两次在相同位置变异会回到原种子。因为第 r 列变号，两交换单项式互换，分子不变，故 $x_r'' = x_r$ 。矩阵的两项修正也互换符号，相消后恢复原值；同时 $b'_{ji} = -b'_{ij}$ ，所以反对称性保持。这个可逆有理替换还说明新变量仍然代数独立并生成同一有理函数域。这里采用无冻结变量、反对称矩阵的基本版本；带系数、冻结变量和反对称可对称化矩阵的其他版本还需补充相应定义。

B.2.2 二阶五周期的完整计算

取 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ，沿两个位置交替变异。令连续簇变量为 $z_1 = x, z_2 = y$ ，则 $z_{i-1}z_{i+1} = 1 + z_i$ 。直接计算得

$$z_3 = \frac{1+y}{x}, \quad z_4 = \frac{1+x+y}{xy}, \quad z_5 = \frac{1+x}{y}, \quad z_6 = x, \quad z_7 = y.$$

例如 $1 + z_4 = (x+1)(y+1)/(xy)$ ，除以 z_3 得到 z_5 ；再继续两步就回到原来的两变量。任意变异串可消去相邻两次相同位置的变异；两个位置之间剩下的串必然交替，所以这个递推穷尽了所有可能。五个所列有理式两两不同，因此恰有五个可能簇变量，并有五个无序簇 $\{z_i, z_{i+1}\}$ ，下标模五。这里五周期指无序簇；保留位置编号的种子还须考虑两个位置的交换。它们都为原变量的 Laurent 多项式，但一般不是普通多项式。

原始论文中的二阶递推见 [5, Example 2.5, Section 6]，本节选择了其中系数一、两个指数都为二的无系数 A_2 情形。

B.2.3 Laurent 现象与计算范围

定理 B.2.1 (Laurent 现象). 设 k 为特征零域， $n \geq 1$ 为整数， $x_1, \dots, x_n$ 在 k 上代数独立， $\mathcal{F} = k(x_1, \dots, x_n)$ ， $B \in M_n(\mathbb{Z})$ 为反对称交换矩阵。以 $\Sigma = ((x_1, \dots, x_n), B)$ 为 $\mathcal{F}$ 中没有系数、没有冻结变量的初始种子，按无系数种子变异产生的每个簇变量都属于 $k[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ 。

证明概要. 证明不能只对路径长度直接使用交换式，因为除以一个已知 Laurent 多项式可能带来非单项式分母。解决这一点的办法，是把有限变异路径与每个路径顶点的邻边一起放进一棵有限树，并同时比较几条较短路径所得的表达。

先把交换式的系数提升到通用系数的多项式环：初始交换多项式及其变换关系所需的独立系数暂作不定元，最后统一代入一。对连续标号 i, j, i 的三步变异，省略未改变的变量，写成

$$z = \frac{P(y)}{x}, \quad u = \frac{Q(z)}{y}, \quad v = \frac{R(u)}{z}.$$

矩阵变异规定的指数变换给出交换多项式的相容关系 $R(U) = C(U)P(Q(0)/U)$ ，其中 C 对 U 是多项式，对未改变变量是 Laurent 多项式。于是

$$v = \frac{R(Q(z)/y) - R(Q(0)/y)}{z} + xC(Q(0)/y).$$

第一项的分子是关于 z 的多项式且常数项为零，所以能够除以 z 而不增加分母。这先证明三步后的变量仍在初始 Laurent 环中。

在通用系数环中还可证明 $\gcd(z, u) = \gcd(z, v) = 1$ 。前一式由 $u \equiv Q(0)/y \pmod{z}$ 得到， P 与 $Q(0)$ 的独立系数使公因子只能是单位。后一式将上述差商模 z 化成 $R'(Q(0)/y)Q'(0)/y + xC(Q(0)/y)$ ，再利用 C 与 P 的独立系数。现在对有限树的路径长度归纳：某个目标变量沿两条较短路径，分别写成分母为 z^a 和 $u^b v^c$ 的分式，分子均在初始 Laurent 环中。这个环是唯一分解环，而两分母互素，故该变量没有非单位分母。

这里省略了通用系数的统一选取、相容关系的逐指数核验，以及有限树归纳的顶点记号；它们分别保证系数特殊化合合法、三步消去可在每个位置实行、任意有限路径都被覆盖。完整论证见 [5, Section 3, Theorem 3.2 and Lemma 3.3]。归纳所得系数是通用参数的多项式，因此参数代入一后仍只有初始变量的单项式分母，给出本节的无系数版本。 $\square$

即使交换时分子越来越复杂，约掉因子后的分母仍只有单项式；前一小节的 A_2 计算是这一结论的具体实例。

Laurent 性也不自动意味着只有有限多个簇变量。例如改成二阶递推 $z_{i-1}z_{i+1} = 1 + z_i^2$ ，会出现不同的行为。有限型分类需要控制全部变异，不是看到前几步没有新变量就能断定。类似地，正系数性、规范基、量子化和表示论实现分别是额外问题，不能都从 Laurent 现象本身推出。

B.3 表示论中的范畴化

一个表示环只记住同构类型的加法和乘法。回到表示、态射与函子以后，原来的整数恒等式可能来自更具体的直和分解或正合列。范畴化研究的正是这种提升；首先要说明取的是哪一种 Grothendieck 群，以及哪些信息在取群时被忘掉。

B.3.1 Grothendieck 群与两种加法

设 $\mathcal{A}$ 为对象同构类构成集合的加性范畴。由对象符号 $[X]$ 生成，并加入 $[X \oplus Y] = [X] + [Y]$ 的交换群，称为分裂 Grothendieck 群。若 $\mathcal{A}$ 还是交换范畴，则可以进一步对所有短正合列加入 $[M] = [L] + [N]$ ，得到这里记为 $G_0(\mathcal{A})$ 的群。

两种关系不能混同。对特征 p 的循环群 C_p ，不可分解模 $M_1, \dots, M_p$ 在分裂群中各给独立的基元，因为 Krull–Schmidt 分解唯一；而在 G_0 中，它们都满足 $[M_d] = d[M_1]$ ，故只剩一个基元。短正合群保存简单合成因子，分裂群则仍可区分非分裂的不可分解对象。

命题 B.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 为对象同构类构成集合的有限长度交换范畴，配双加性且在每个变量上正合的张量积 $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 。记 $G_0(\mathcal{A})$ 为对对象同构类加入全部短正合列关系的 Grothendieck 群， $[X]$ 为对象 X 的类。则对 $X, Y \in \mathcal{A}$ ，乘法 $[X][Y] = [X \otimes Y]$ 在 $G_0(\mathcal{A})$ 上良定义；若有结合约束及单位对象，就得到相应的结合含么环。其加法群以简单对象同构类为基。

证明. 固定一个对象作张量保持短正合列, 所以对象乘法尊重定义群时加入的关系, 双加性便使乘法下降. 结合与单位同构给出环的结合律及单位. 每个对象沿合成列等于其简单因子之和; Jordan–Hölder 保证重数不依赖列, 所以取各简单重数给出到自由交换群的逆映射. $\square$

Hopf 代数的有限维模范畴中, 张量在底层域上正合, 便给出这种环. 这里的“有限长度”不意味着只有有限多个简单类型, 也不意味着整个范畴半单. 基础定义及例子可对照 [3, Definition 1.5.8, Section 4.5].

B.3.2 从张量恒等式到函子

取 $\mathfrak{sl}_2$ 的有限维复表示范畴, 全部对象完全可约. 以 L_m 、 $m \geq 0$ 为简单对象, 则

$$[L_1][L_m] = [L_{m+1}] + [L_{m-1}] \quad (m \geq 1), \quad [L_1][L_0] = [L_1].$$

这是定理 14.3.4 在复数域上取一个张量因子为 L_1 所得的分解, 在 Grothendieck 环中的像. 令 $t = [L_1]$, 便可递推地把每个 $[L_m]$ 写成 t 的一个首一 m 次整数多项式. 不同简单类线性无关, 所以这些首一递推多项式也保证

$$G_0(\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}} \mathfrak{sl}_2) \cong \mathbb{Z}[t].$$

在范畴中, 乘以 t 被提升为函子 $F(V) = L_1 \otimes V$, 其在简单对象上的作用就是上述直和分解. 对象以外还有交织映射、自然变换以及张量结合约束; 这些信息在只取环时看不见. 因此给出一个环同构, 并没有自动构造范畴等价; 给出一串正整数, 也没有自动指定相应的自然变换及其关系.

B.3.3 分次与复形中的符号

有限维分次向量空间的分裂 Grothendieck 环可用 Laurent 变量 v 记录次数平移:

$$[V] = \sum_{j \in \mathbb{Z}} (\dim V_j) v^j.$$

张量积按次数相加, 这个对应给出与 $\mathbb{Z}[v, v^{-1}]$ 的环同构. 每个分次片的维数都非负, 而形式差允许负系数. 若再取有限复形, 其 Euler 类为 $\sum_i (-1)^i [C^i]$; 短正合列逐次可加, 且等于上同调各项的交错和, 因为边界和圈的两组短正合列使非上同调部分成对抵消.

于是有两种性质不同的符号: 内部次数平移产生 v , 复形移位产生负号. 把二者混为一谈, 会把分次维数和 Euler 特征写错. 本节用张量函子和分次空间介绍范畴化的基本想法; 更深的范畴化还要求生成函子及其自然变换满足量子群或 Hecke 关系.

B.4 参数特殊化与理论的适用范围

量子参数和簇变量都能代入具体值, 但代入可能使原来可逆的系数消失. 要比较一般参数与特殊参数, 须先确定在哪个整系数或 Laurent 系数环上定义对象, 再说明取商后哪些结论仍然成立.

B.4.1 单位根处的表示变化

在 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 的模型中, 不可约性证明使用 $[i]_q \neq 0$ 以及 K 的权互异。若 q 为奇数阶 $\ell \geq 3$ 的本原单位根, 则 $[\ell]_q = 0$ 。例如取 $m = \ell$, 向量 $v_1, \dots, v_\ell$ 生成一个非零真子模: K 保持它, F 只向后移, 且 $Ev_1 = [1]_q[\ell]_q v_0 = 0$, 其余 Ev_i 仍在其中。所以一般参数下的不可约性在这个值上失效。

把 q 取为一时, 不能直接代入 $(K - K^{-1})/(q - q^{-1})$, 因为分母变为零。须先选择适当的整形式或引入额外生成元, 再讨论特殊化。不同整形式在单位根处可能给出不同代数, 见 [3, Section 5.6, Remark 5.6.5]; 形式极限本身不足以确定特殊化后的代数。

B.4.2 有理变异与点上的退化

簇变异是一项可逆有理坐标变换, 不是每个仿射点上都定义的正则同构。前面的 A_2 例子中, 若取 $x = y = -1$, 五个 Laurent 表达均有意义, 得到

$$(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5) = (-1, -1, 0, -1, 0).$$

交换恒等式仍成立, 但若从含 $z_3 = 0$ 的簇出发, 用除以 z_3 的公式恢复邻近变量, 就不能直接在这个点上操作。一个在有理函数域中合法的逆变换, 可能在特定点失去意义。

计算时应区分这两种情形: 变量作为代数独立有理函数时, 变异可逆且满足已证恒等式; 变量代入一个点时, 需要逐项检查所用分母。类似的区分也适用于量子参数的特殊化和范畴化中的基变换。进一步学习时, 还需分别讨论规范基、正性、量子簇结构和高阶范畴化的定义与定理。

本章小结

量子包络代数改变了乘法和余乘法的具体公式, 簇变异改变生成元的选择, 范畴化则用对象与映射解释数值或环中的等式。三者的联系须通过具体构造来说明。

泛型参数的结论可能在单位根处失效, 有理变换也可能在特定点无定义。保留工作环、分母、分次和正合关系, 才能准确判断一种计算在变化后的环境中是否仍然有效。

习题

习题 B.1. 从量子整数定义证明 $[r+1]_q = q[r]_q + q^{-r}$, 并计算 $[2]_q, [3]_q$ 。

解. 把两边乘 $q - q^{-1}$, 右边为 $q^{r+1} - q^{1-r} + q^{1-r} - q^{-r-1}$, 即所需分子。所以 $[2]_q = q + q^{-1}$, $[3]_q = q^2 + 1 + q^{-2}$ 。这两个表达式已经是 Laurent 多项式, 即使原来的分式写法需要排除 $q = \pm 1$, 它们本身仍可特殊化。□

习题 B.2. 写出 $m = 2$ 量子模型的 E, F, K 矩阵, 并指出使正文不可约性证明成立的系数条件。

解. 依基 v_0, v_1, v_2 , 有 $K = \text{diag}(q^2, 1, q^{-2})$, F 在次对角线两个位置为一, E 在上对角线两个位置均为 $[2]_q$, 其余为零。正文方法要求三个 K 特征值互异且 $[2]_q \neq 0$ 。一般参数满足这些条件; 若 $q^2 = -1$, 则 $[2]_q = 0$, 而首尾权也相同, 方法失效。□

习题 B.3. 在两个二维量子模型的张量积中, 求一个被 E, F 零化且被 K 固定的非零向量。

解. 令 $w = v_0 \otimes v_1 - q^{-1}v_1 \otimes v_0$. 两项权都是一, 故 $Kw = w$. 余乘法给 $Ew = (1 - q^{-1}q)v_0 \otimes v_0 = 0$. 又 $F(v_0 \otimes v_1) = v_1 \otimes v_1$, $F(v_1 \otimes v_0) = qv_1 \otimes v_1$, 所以 $Fw = 0$. 因此 w 张成一个平凡子模. $\square$

习题 B.4. 计算 $S^2(E), S^2(F), S^2(K)$, 说明对极的平方未必为恒等。

解. 反乘法性给 $S^2(E) = -S(K^{-1})S(E) = KEK^{-1} = q^2E$, 同理 $S^2(F) = KFK^{-1} = q^{-2}F$, $S^2(K) = K$. 故 $S^2 = \text{Int}(K)$. 当 $q^2 \neq 1$ 时, 从非零二维表示上也能看出它一般不等于恒等. $\square$

习题 B.5. 设 q 为奇数阶 $\ell \geq 3$ 的本原单位根. 求 $m = \ell$ 模型商去 $\text{span}\{v_1, \dots, v_\ell\}$ 后的一维表示。

解. 商由 v_0 的类生成. $Ev_0 = 0$, $Fv_0 = v_1$ 在商中为零, 且 $Kv_0 = q^\ell v_0 = v_0$, 所以商为平凡模. 所取子空间非零, 故原模型可约; 这也具体显示最高权标记相同不保证在特殊参数上保持泛型简单性. $\square$

习题 B.6. 取无系数种子 (x_1, x_2, x_3) 及矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

沿第二个位置变异, 求新变量和新矩阵, 指出原来零条目处出现了什么变化。

解. 第二列的正、负条目分别位于第一、第三行, 所以 $x'_2 = (x_1 + x_3)/x_2$, 其余变量不变. 第二行、列反号, 而 $b'_{13} = 0 + [1]_+[1]_+ - [-1]_+[-1]_+ = 1$, 故

$$B' = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

原来第一、第三位置之间的零条目变成非零; 变异不仅反转相邻条目的符号, 也会改变未涉及该位置的条目. $\square$

习题 B.7. 对正文的 A_2 五个变量验证恒等式 $z_1z_3 - z_2 = 1, z_2z_4 - z_3 = 1, z_3z_5 - z_4 = 1$, 并解释为什么这没有直接给出全部代数关系的生成理想。

解. 将五个有理式代入, 前两式即递推; 第三式分子为 $(1+x)(1+y) - (1+x+y) = xy$, 除以 xy 为一. 因此这些多项式属于相应参数映射的核. 要说明它们生成全部核, 仍须消去或证明商到目标的单射, 不能从发现三条关系直接断定完整展示. $\square$

习题 B.8. 在 A_2 的初始点 $x = y = 1$ 计算五变量; 再在 $x = y = -1$ 计算, 比较哪个相邻簇可作为非零坐标。

解. 第一点得到 $1, 1, 2, 3, 2$, 全部非零。第二点得到 $-1, -1, 0, -1, 0$, 只有初始簇两变量都非零; 其他四个相邻簇至少含一个零。原初始 Laurent 表达在两点都有意义, 但把含零的簇直接作为可逆坐标会出现分母问题。□

习题 B.9. 令 $z_1 = x, z_2 = y$, 并取递推 $z_{i-1}z_{i+1} = 1 + z_i^2$ 。计算 z_3, z_4 , 证明这两步仍为 Laurent 多项式。

解. $z_3 = (1 + y^2)/x$, 而 $z_4 = (x^2 + (1 + y^2)^2)/(x^2y)$ 。分母均为单项式, 所以是 Laurent 表达。这只核验两步, 不能据此证明所有变异的 Laurent 性或有限型。□

习题 B.10. 设 $A = k[t]/(t^2)$ 。比较其有限维模范畴的分裂 Grothendieck 群与 G_0 , 并写出自然满同态的核。

解. 不可分解模为 k 和 A , 故分裂群为 $\mathbb{Z}[k] \oplus \mathbb{Z}[A]$ 。合成列 $0 \rightarrow k \rightarrow A \rightarrow k \rightarrow 0$ 给 $[A] = 2[k]$, 所以 $G_0 \cong \mathbb{Z}[k]$, 自然映射的核由 $[A] - 2[k]$ 生成。□

习题 B.11. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示 Grothendieck 环中, 以 $t = [L_1]$ 表示 $[L_2], [L_3], [L_4]$, 并求 $[L_2]^2$ 。

解. 递推给 $[L_2] = t^2 - 1, [L_3] = t^3 - 2t, [L_4] = t^4 - 3t^2 + 1$ 。因此 $[L_2]^2 = t^4 - 2t^2 + 1 = [L_4] + [L_2] + [L_0]$, 与完整 Clebsch–Gordan 分解一致。多项式中的负系数来自换基, 并不意味着实际张量分解有负重数。□

习题 B.12. 令 $C^\bullet$ 为两项分次复形, $C^0 = k \oplus k\langle 1 \rangle, C^1 = k\langle 1 \rangle$, 其中 $k\langle 1 \rangle$ 表示集中在内部次数一的一维空间。若微分在次数一上为恒等, 求其 Euler 类与上同调分次。

解. Euler 类为 $(1 + v) - v = 1$ 。微分把唯一内部次数一部分同构送到后一项, 所以 $H^0 \cong k$ 在内部次数零, $H^1 = 0$ 。若把整个复形移一位, Euler 类变成 -1 , 而若只把内部次数平移一位, 则变成 v 。□

附录 C Lie 群、算术表示与几何表示 论简介

本附录研究 Lie 代数表示积分的全局条件、紧 Lie 群的函数分解、 p 进群的连续表示，并以射影直线上的线丛和微分算子模介绍几何表示方法。

本章目标

- 区分积分到单连通群与下降到指定商群，并计算圆群及 $SO(3)$ 的下降条件。
- 从 Haar 平均推出完全可约性和矩阵系数正交性，说明 Peter–Weyl 展开的收敛含义。
- 区分光滑、连续与可容许表示，计算 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的一个 Hecke 代数。
- 在 $\mathbb{P}^1$ 上计算线丛截面、微分算子和中心商，并说明这一算例的适用范围。

给定一张矩阵 A ，函数 $t \mapsto e^{tA}$ 给出实直线加法群的一个表示。若要让它下降为圆周群 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 的表示，还必须有 $e^{2\pi A} = I$ ；单凭无穷小的矩阵 A 看不出这项周期条件。例如在一维复空间上取 $A = i/2$ ，沿 2π 转一圈得到 -1 ，不能下降到圆周。Lie 代数表示积分到 Lie 群时，也会遇到由覆盖核和闭路带来的限制。紧群上的平均、连续表示的完备化以及几何表示，又让分析和空间结构进入同一问题。

前两节需要有限维流形、覆盖空间及基本积分和 Hilbert 空间知识；本附录直接使用这些分析基础。第三节使用完备化与投射有限群，第四节使用仿射簇、射影空间和层的粘合。具体表示计算使用本卷的 $\mathfrak{sl}_2$ 、张量积与中心理论。一般 Lie 群积分和 Peter–Weyl 理论¹参见 [12, Chapters 3–4]；后续几何理论只作简要说明并给出阅读建议。

C.1 Lie 代数表示与 Lie 群表示的积分

Lie 代数记录单位元附近的一阶变化。要把这种变化沿整个群延伸，还须检查群的连通性与绕闭路的影响。本节只讨论有限维表示；无限维空间上还要指定算子的定义域和拓扑，不能直接沿用这里的结论。

C.1.1 微分表示与积分定理

定义 C.1.1. 设 G 为实 Lie 群， V 为有限维复向量空间。光滑群同态 $\pi : G \rightarrow \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 称为 G 的有限维复表示。它在单位元处的微分 $d\pi : \mathrm{Lie}(G) \rightarrow \mathfrak{gl}_{\mathbb{C}}(V)$ 是实线性 Lie 代数同态。给定实线性 Lie 代数表示 $\rho : \mathrm{Lie}(G) \rightarrow \mathfrak{gl}_{\mathbb{C}}(V)$ ，若 $d\pi = \rho$ ，就称 π 是 ρ 的**积**

¹彼得 (Fritz Peter, 1899-1949)，德国数学家，与外尔证明了紧群表示的矩阵系数在平方可积函数空间中的完备性；外尔已在本卷前文介绍。

分表示 (integrated representation)。若 G 为复 Lie 群，则本节所说的复表示要求群同态全纯，其微分要求复线性。

对一参数子群有

$$\pi(\exp_G tx) = \exp(t d\pi(x)).$$

左边是一般线性群中的一参数子群，其单位元处导数为 $d\pi(x)$ ；常微分方程 $Y' = d\pi(x)Y$ 、 $Y(0) = I$ 的唯一解就是右边。微分保持括号可以从群交换子在二阶处的展开得到；同样的展开已经在矩阵 Lie 代数中出现。

定理 C.1.2 (Lie 代数表示的积分)。设 G 为连通且单连通的实 Lie 群， $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$ ， V 为有限维复向量空间。每个实线性 Lie 代数表示 $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}_{\mathbb{C}}(V)$ 都唯一积分为光滑群表示 $\pi: G \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 。微分给出有限维光滑复 G -表示与有限维实线性 $\mathfrak{g}$ -表示的范畴等价。若 G 为连通且单连通的复 Lie 群，则每个有限维复线性 Lie 代数表示都唯一积分为全纯群表示，并给出相应的范畴等价。

证明. 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow G$ 是从单位元到 g 的分段光滑路径，令 $a(t) = (dL_{\gamma(t)^{-1}})\gamma'(t) \in \mathfrak{g}$ 。沿这条路径解矩阵常微分方程

$$U'(t) = U(t)\rho(a(t)), \quad U(0) = I.$$

解在有限区间上存在唯一且可逆；例如行列式满足一个标量线性方程，初值为一。拟定义 $\pi(g) = U(1)$ ，关键是验证其与路径无关。

对保持端点的光滑同伦 $\gamma(t, s)$ ，再令 $b(t, s) = (dL_{\gamma(t, s)^{-1}})\partial_s \gamma(t, s)$ 。左 Maurer–Cartan 形式²的恒等式给出

$$\partial_s a - \partial_t b = [a, b].$$

由于 ρ 保持括号，直接对 $W = \partial_s U - U\rho(b)$ 求 t 导数，得到 $\partial_t W = W\rho(a)$ 。端点固定使 $b(0, s) = b(1, s) = 0$ ，故 $W(0, s) = 0$ ，唯一性推出 $W = 0$ ，进而 $\partial_s U(1, s) = 0$ 。分段光滑同伦可逐段使用同一计算。Lie 群上的路径及同伦可以光滑化，而单连通性保证任意两条同端点路径同伦，所以定义良好。

把通向 g 的路径与左平移后的通向 h 的路径拼接，第二段的左对数导数仍为原路径的 $a(t)$ 。解方程便得 $\pi(gh) = \pi(g)\pi(h)$ 。在单位元附近取路径 $t \mapsto \exp(tx)$ ，则 $\pi(\exp x) = e^{\rho(x)}$ ，所以 π 光滑且 $d\pi = \rho$ 。复 Lie 群情形中，这一局部公式是全纯的，再用群平移得到全群上的全纯性。

指数像含单位元邻域，而连通群由任何这样的邻域生成，故微分相同的两个表示必在全群上相同。若线性映射与两个 Lie 代数作用交换，它便与相应矩阵指数交换，因而与群作用交换；反向对群同态求微分即可。于是微分既在对象上给出存在唯一性，又在同态上给出双射，得到范畴等价。上述路径构造使用常微分方程的存在唯一性及 Maurer–Cartan 恒等式；Lie 群同态版本见 [12, Theorem 3.41 and Theorem 4.3]。□

²毛雷尔 (Ludwig Maurer, 1859-1927)，德国数学家，研究连续变换群；嘉当已在本卷前文介绍。

C.1.2 下降到商群的条件

连通 Lie 群 G 的普遍覆盖可以带上唯一使覆盖映射成为群同态的 Lie 群结构。记为 $p: \tilde{G} \rightarrow G$, 其核 D 是离散中心子群。离散性来自覆盖; 中心性则因为对固定 $d \in D$, 连续映射 $g \mapsto gdg^{-1}$ 从连通的 $\tilde{G}$ 进入离散集合 D , 只能恒为 d 。

命题 C.1.3. 设 G 为连通实 Lie 群, $p: \tilde{G} \rightarrow G$ 为作为 Lie 群同态的普遍覆盖, V 为有限维复向量空间, $\rho: \text{Lie}(G) \rightarrow \mathfrak{gl}_{\mathbb{C}}(V)$ 为实线性 Lie 代数表示。记 $\tilde{\pi}: \tilde{G} \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为 $\rho \circ dp$ 的唯一积分。则 ρ 能积分为 G 的光滑复表示, 当且仅当 $\tilde{\pi}(d) = 1_V$ 对每个 $d \in \ker p$ 成立。

证明. 若已有 G 表示, 复合 p 后必零化覆盖核。反之, 在覆盖核上平凡时, 定义 $\pi(g) = \tilde{\pi}(\tilde{g})$, 其中 $p(\tilde{g}) = g$ 。任意两个提升相差核元素, 所以值不依赖提升。群乘法相容性由 $\tilde{\pi}$ 保证; 覆盖局部是微分同胚, 所以 π 光滑且具有原微分。□

这说明“Lie 代数表示可以积分”必须说明积分到哪个群。连通但非单连通的群可能丢掉一些表示; 非连通群还需要补充连通分支群的作用, 这些信息根本不在单位元切空间中。

例 C.1.4. 对圆群 $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, 一个 Lie 代数复表示由算子 A 给出, 在普遍覆盖上的积分为 $t \mapsto e^{tA}$ 。下降条件为 $e^{2\pi A} = I$, 等价于 A 可对角化且特征值属于 $i\mathbb{Z}$ 。确实, Jordan 块的半单部分必须满足 $e^{2\pi\lambda} = 1$, 其幂零部分 N 满足 $e^{2\pi N} = I$ 。但 $e^{2\pi N} - I = N \cdot Q(N)$, 其中 $Q(0) = 2\pi \neq 0$, 故 $Q(N)$ 可逆, 迫使 $N = 0$ 。反向验证则直接代入。因此 $A = i\alpha$ 的一维表示仅当 $\alpha \in \mathbb{Z}$ 时下降; 一个非零幂零 Jordan 块也不能下降。

C.1.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的表示差别

群 $SU(2)$ 可写成

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \mid |a|^2 + |b|^2 = 1 \right\}.$$

作为流形它是三维球面, 故单连通。其 Lie 代数的复化为 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, 因此前文的每个 L_m 唯一积分到 $SU(2)$ 。可以直接把它实现为自然二维表示的对称幂 $\text{Sym}^m \mathbb{C}^2$ 。

$SU(2)$ 在实三维空间 $\mathfrak{su}_2$ 上的共轭作用保持正定内积 $-\text{tr}(XY)$, 给出 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 。它的微分是三维单 Lie 代数的伴随表示, 单射且两边等维, 故像含单位元邻域; $SO(3)$ 连通使像为整个群。核由与全部 $\mathfrak{su}_2$ 交换的矩阵组成, 只能为 $\{I, -I\}$ 。因此它是二重覆盖。

命题 C.1.5. 设 m 为非负整数, L_m 为最高权 m 的有限维简单左 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ -模。将它限制到实 Lie 代数 $\mathfrak{su}_2$, 并积分为 $SU(2)$ 的光滑复表示。对由伴随作用给出的二重覆盖 $SU(2) \rightarrow SO(3)$, 其核为 $\{I, -I\}$, 该积分表示能够下降为 $SO(3)$ 表示, 当且仅当 m 为偶数。

证明. 在 $\text{Sym}^m \mathbb{C}^2$ 上, $-I$ 对每个次数 m 单项式按 $(-1)^m$ 作用。覆盖核由 $-I$ 生成, 所以命题 C.1.3 恰给出偶数条件。□

自然二维模是最小的反例：它是 $SU(2)$ 的表示，却不是 $SO(3)$ 的表示。三维伴随模对应 $m = 2$ ，可以下降。同一个复化 Lie 代数因此并不意味着两个给定 Lie 群具有相同的表示。

C.2 紧 Lie 群与 Peter–Weyl 理论

有限群的平均可以推广到紧群，但有限求和必须改成测度积分。平均后仍能证明有限维完全可约性；若要描述整个函数空间，还需要 Hilbert 空间的完备性以及矩阵系数的稠密性。

C.2.1 Haar 测度与有限维平均

设 K 为紧实 Lie 群。它具有唯一归一化的左右不变正则 Borel 测度 dg ，满足 $\int_K 1 dg = 1$ ，称为 **Haar 测度** (Haar measure)。³ 下列构造说明紧 Lie 群情形为何可以从流形积分得到它；相关论述见 [12, Section 4.6, Theorem 4.36]。

证明. 在单位元切空间上取一个正定内积，按左平移延伸成左不变 Riemann 度量⁴。其体积密度无需选择定向，给出左不变的正则 Borel 测度；紧性保证总体积有限且非零。右平移后的密度仍左不变，而左不变密度由单位元处的值唯一决定，故每个右平移只乘以一个正实数。这个倍数构成 $K \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 的连续群同态。其像紧；取对数后，实数加法群的紧子群只有零，故倍数恒为一。除以总体积便得到左右不变的概率测度 dg 。

若 $d\nu$ 是另一左不变概率测度，对任意连续函数 f ，用 Fubini 定理⁵分别按两种次序积分 $\int_K \int_K f(xy) dg(x) d\nu(y)$ 。先对 x 积分，右不变性给出 $\int f dg$ ；先对 y 积分，左不变性给出 $\int f d\nu$ 。两者相等，正则测度由连续函数积分唯一确定，所以 $d\nu = dg$ 。□

命题 C.2.1. 设 K 为紧实 Lie 群， V 为有限维复向量空间， $\pi: K \rightarrow GL_{\mathbb{C}}(V)$ 为连续群表示。则 V 有 K 不变的正定 Hermitian 内积，因而这个表示完全可约。

证明. 取任意正定内积 $\langle -, - \rangle_0$ ，第一变量共轭线性。定义

$$\langle v, w \rangle_K = \int_K \langle \pi(g)v, \pi(g)w \rangle_0 dg.$$

积分对两变量保持所需线性性质。若 $v \neq 0$ ，被积函数连续且处处为正，故积分为正。右不变性使 $\langle \pi(k)v, \pi(k)w \rangle_K = \langle v, w \rangle_K$ 。任意不变子空间的正交补仍不变：若 $w \perp U$ ，则 $\langle \pi(k)w, u \rangle_K = \langle w, \pi(k)^{-1}u \rangle_K = 0$ 。按维数归纳即可分成简单模直和。□

³这里的博雷尔指埃米尔·博雷尔 (Émile Borel, 1871-1956)，法国数学家，研究测度论和概率论，不同于前文博雷尔子代数所纪念的阿尔芒·博雷尔。哈尔 (Alfréd Haar, 1885-1933) 是匈牙利数学家，研究正交函数系与不变测度。

⁴黎曼 (Georg Friedrich Bernhard Riemann, 1826-1866)，德国数学家，在复分析、微分几何和数论方面作出奠基性贡献。

⁵富比尼 (Guido Fubini, 1879-1943)，意大利数学家，研究分析、变分法与群论；此处的积分次序交换定理以他命名。

命题 C.2.2. 设 K 为紧实 Lie 群, dg 为总测度为一的 Haar 测度, π, σ 为 K 的有限维不可约连续复酉表示, 均取正交规范基。若它们不同构, 则任意矩阵系数满足 $\int_K \overline{\pi_{ij}(g)} \sigma_{ab}(g) dg = 0$ 。对于同一个 d 维不可约表示,

$$\int_K \overline{\pi_{ij}(g)} \pi_{ab}(g) dg = \frac{\delta_{ia} \delta_{jb}}{d}.$$

证明. 对线性映射 $T: V_\pi \rightarrow V_\sigma$ 作平均 $A(T) = \int_K \sigma(g) T \pi(g)^{-1} dg$ 。左不变性说明 $A(T)$ 是交织算子。因此不同构时由 Schur 引理为零; 同一不可约表示时为标量, 取迹得到 $A(T) = \text{tr}(T) I/d$ 。

取矩阵单位 $T = E_{ai}$ 。平均矩阵的 (b, j) 项为 $\int_K \sigma_{ba}(g) \overline{\pi_{ji}(g)} dg$ 。不同构时它为零; 同一表示时等于 $\delta_{ai} \delta_{bj}/d$ 。重新排列四个指标即为陈述。□

C.2.2 Peter-Weyl 定理的准确含义

在 $L^2(K, dg)$ 中使用内积 $\langle f, h \rangle = \int_K \overline{f(g)} h(g) dg$ 。每个不可约表示取一组正交规范基, 令其维数为 d_π 。上面的正交关系说明 $\sqrt{d_\pi} \pi_{ij}$ 是一个正交规范族, 但正交性本身不能证明它张成整个空间。

定理 C.2.3 (Peter-Weyl). 设 K 为紧实 Lie 群, dg 为总测度为一的 Haar 测度, $\widehat{K}$ 为全部有限维不可约连续复表示的一套同构类代表。为每个代表 $\pi: K \rightarrow U(V_\pi)$ 选定不变正定 Hermitian 内积及正交规范基, 令 $d_\pi = \dim_{\mathbb{C}} V_\pi$ 、 π_{ij} 为相应矩阵系数。则 $\{\sqrt{d_\pi} \pi_{ij}\}_{\pi, i, j}$ 在以 $\langle f, h \rangle = \int_K \overline{f(g)} h(g) dg$ 配内积的 $L^2(K, dg)$ 中完备。等价地, 令 $(a, b) \in K \times K$ 在函数上以 $((a, b)F)(g) = F(a^{-1}gb)$ 作用, 在 $V_\pi^* \otimes_{\mathbb{C}} V_\pi$ 上以对偶表示和原表示分别作用, 则有酉 $K \times K$ 表示同构

$$L^2(K, dg) \cong \bigoplus_{\pi \in \widehat{K}} V_\pi^* \otimes_{\mathbb{C}} V_\pi,$$

其中第 π 项由 V_π 及其对偶上的内积诱导的张量积内积按 $1/d_\pi$ 缩放, 映射为 $\ell \otimes v \mapsto (g \mapsto \ell(\pi(g)v))$ 。帽号表示 Hilbert 直和。

证明. 取一族连续、非负的函数 h_ε , 其积分为一, 支撑逐渐缩到单位元, 并满足 $h_\varepsilon(g^{-1}) = h_\varepsilon(g)$ 。这样的函数可由单位元附近的连续凸起函数与其逆映像相加再归一化得到。定义

$$(T_\varepsilon f)(x) = \int_K h_\varepsilon(y^{-1}x) f(y) dy.$$

连续核在紧空间上平方可积, 所以 T_ε 是紧算子; 核的对称性又使它自伴。变量代换说明它与所有左平移 $L_a f(x) = f(a^{-1}x)$ 交换。它的每个非零特征值的特征空间因此有限维且左平移不变。

这些特征空间的向量有连续代表, 因为 $f = \lambda^{-1} T_\varepsilon f$, 而连续核把 L^2 函数送到连续函数。设 E 为其中一个空间, 左平移在 E 上给出有限维酉表示。对 $f \in E$, 有 $f(x) = (L_{x^{-1}} f)(1)$, 故 f 是这个表示的对偶表示的矩阵系数的线性组合。由命题 C.2.1, 该表示分解成不可约表示, 所以 E 包含在不可约矩阵系数的生成空间中。

现在设 f 与全部这样的矩阵系数正交。紧自伴算子的谱定理说明它与 T_ε 的全部非零特征空间正交, 因而 $T_\varepsilon f = 0$ 。另一方面, 支撑缩小与连续函数的一致连续性给出

$T_\varepsilon f \rightarrow f$: 先对连续 f 得到一致收敛, 再用连续函数在 L^2 中稠密以及 $\|T_\varepsilon\| \leq 1$ 推广到所有 $f \in L^2$ 。于是 $f = 0$, 证明正交规范族完备。

矩阵系数映射在每个不可约分量上的内积由命题 C.2.2 给出, 故缩放因子为 $1/d_\pi$; 不同分量正交, 完备性使它延伸成所述 Hilbert 直和的西同构。左右作用取 $(a, b)F(g) = F(a^{-1}gb)$, 在张量端分别对应偶表示与原表示, 因而同构与 $K \times K$ 作用相容。证明用到的分析基础是紧自伴算子的谱定理和连续函数的 L^2 稠密性; 参见 [12, Section 4.7, Theorems 4.47 and 4.49]。□

代数直和只允许有限多个不可约分量, Hilbert 直和则允许平方可和的无限分量, 两者不是同一个函数空间。

若 $a_{ij}^\pi = \langle \sqrt{d_\pi} \pi_{ij}, f \rangle$, 则

$$f = \sum_{\pi, i, j} a_{ij}^\pi \sqrt{d_\pi} \pi_{ij}, \quad \|f\|_2^2 = \sum_{\pi, i, j} |a_{ij}^\pi|^2.$$

第一式按 L^2 范数理解, 第二式是 Parseval 等式。它们并不保证每个点上的 Fourier 级数都收敛, 也不保证任意枚举方式的一致收敛。

C.2.3 圆群与低维矩阵系数

圆群的归一化 Haar 测度为 $d\theta/(2\pi)$ 。它的不可约表示是一维的: 群交换, 所有表示矩阵彼此交换, 而在不可约表示中 Schur 引理迫使它们为标量。例 C.1.4 给出的下降条件于是将它们编号为 $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$ 、 $n \in \mathbb{Z}$ 。直接积分得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-im\theta} e^{in\theta} d\theta = \delta_{mn}.$$

例如 $f(e^{i\theta}) = 2 + e^{i\theta} - 3e^{-2i\theta}$ 的平方范数为 $4 + 1 + 9 = 14$ 。Peter–Weyl 的额外结论是这些指数在整个 $L^2(S^1)$ 中完备, 而不只是相互正交。

再取 $SU(2)$ 的自然表示。用上一节的矩阵坐标, 它的四个系数为 $a, b, -\bar{b}, \bar{a}$ 。由命题 C.2.2, 每个系数平方范数为 $1/2$, 不同矩阵位置的系数相互正交。自然表示的特征标为 $a + \bar{a}$, 因此其范数为一。

在极大环面 $\text{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$ 上, L_m 的特征标为

$$\chi_m(\theta) = \sum_{j=0}^m e^{i(m-2j)\theta} = \frac{\sin((m+1)\theta)}{\sin \theta} \quad (\sin \theta \neq 0).$$

最后一式由几何级数相减得到, 端点值应由前面的有限和连续延拓。例如 $\chi_m(0) = m+1$ 、 $\chi_m(\pi) = (-1)^m(m+1)$ 。不能把环面上的均匀积分直接当作 $SU(2)$ 上的类函数积分; 从群积分化到环面积分还需要相应的 Jacobian 因子。本附录的正交性始终使用群上的 Haar 测度。

C.3 p 进群与连续表示

实 Lie 群中可以沿实参数微分； p 进群的拓扑则由开子群控制。研究它的复表示时，常见的“光滑”指每个向量被某个开子群固定，并不表示对实或复坐标求导。本节以紧开子群的平均和一个可完全计算的 Hecke 代数说明这一点。

C.3.1 p 进拓扑与光滑表示

对素数 p ，有理数上的绝对值规定为 $|p^r u/v|_p = p^{-r}$ ，其中 u, v 都不被 p 整除。其完备化为 $\mathbb{Q}_p$ ，单位球为 $\mathbb{Z}_p$ 。超度量不等式 $|x+y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p)$ 使 $p^r \mathbb{Z}_p$ 同时开闭。展开 p 进数的各位数字可得

$$\mathbb{Z}_p \cong \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}.$$

每个有限商紧，兼容数列在其乘积中构成闭集，故 $\mathbb{Z}_p$ 紧。于是 $\mathbb{Q}_p$ 是局部紧且完全不连通的拓扑域。

在 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$ 中， $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ 是紧开子群，而 $1 + p^r M_n(\mathbb{Z}_p)$ 、 $r \geq 1$ ，组成单位元的开邻域基础。逆矩阵由收敛的几何级数给出，所以这些集合确实是子群。紧开子群可看成有限矩阵群的逆极限，故平均许多局部常值对象时仍能归结为有限商。

定义 C.3.1. 设 G 为 Hausdorff 局部紧群，单位元处有紧开子群组成的邻域基础， V 为复向量空间， $\pi: G \rightarrow \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为群表示。若每个 $v \in V$ 的稳定子群开，就称 (V, π) 为 **光滑表示** (smooth representation)。若它光滑，并且每个紧开子群 $K \subseteq G$ 的不变量空间 V^K 都有限维，就称为 **可容许表示** (admissible representation)。

当 V 取离散拓扑时，光滑性等价于作用映射 $G \times V \rightarrow V$ 连续。它不是任意 Hilbert 空间连续表示的同义词。有限维连续复表示限制到一个紧开投射有限子群时确实光滑。理由是一般线性群的邻域 $\|A - I\| < 1/2$ 不含非平凡子群：若一个矩阵的全部整数次幂都在其中，模不为 1 的特征值会使正幂或负幂离开邻域；模为 1 而不等于 1 的特征值也有某个幂离开；所有特征值为 1 时，非平凡 Jordan 块的幂无界。因此这样的矩阵只能为 I 。连续性及开子群基础给出一个开子群，其像包含在这个邻域，故像平凡。这也表明无限维表示所需的拓扑不能省略。

C.3.2 紧开子群的不变量与平均

命题 C.3.2. 设 K 为带逆极限拓扑的投射有限群， V 为复向量空间， $\pi: K \rightarrow \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为光滑表示。对每个 $v \in V$ ，可选一个固定它的开正规子群 $N \trianglelefteq K$ ，并定义

$$e_K v = \frac{1}{[K:N]} \sum_{g \in K/N} \pi(g)v.$$

此式与 N 及代表元选择无关，给出 $V \rightarrow V^K$ 的投影。在光滑复表示范畴中，函子 $V \mapsto V^K$ 正合。

证明。一个向量的开稳定子群在紧群中有有限指数；取它有限多个共轭的交，得到开正规子群 N 。代表元改变不影响 v 的像。若缩小到 $N' \subseteq N$ ，每个原陪集重复 $[N:N']$

次, 分母也同倍增大, 故平均不变。两个选择都可与其交比较, 所以良定义。对不同向量共同缩小正规子群, 便可验证线性性。左乘置换有限商, 故平均结果 K 不变; 对已经不变的向量平均等于自身。

不变量函子保持核。对于满射 $V \rightarrow W$, 若 $w \in W^K$, 先任意取提升 v , 则 $e_K v$ 是不变提升, 因为平均与同态交换且 $e_K w = w$ 。因此也保持满射, 得到正合性。□

这正是有限群 Reynolds 平均在投射有限群上的逐向量版本, 分母可以在 $\mathbb{C}$ 中求逆。若改用特征 p 的系数, 而有限商含 p 因子, 平均分母不再可逆, 正合性可能失败。

例 C.3.3. 令加法群 $G = \mathbb{Q}_p$ 在 $V = \mathbb{C}[\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p]$ 上平移作用, 方括号表示以陪集为基的有限支集向量空间。每个向量被开子群 $\mathbb{Z}_p$ 固定, 故表示光滑。但 $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ 无限, 且 $V^{\mathbb{Z}_p} = V$, 所以它不可容许。光滑性只控制每个向量的不变性邻域, 不能控制整个固定空间的维数。

C.3.3 一个 Hecke 代数与非分歧特征标

取 $G = \mathbb{Q}_p^\times$ 、 $K = \mathbb{Z}_p^\times$ 。每个元素唯一写成 $p^n u$, $n \in \mathbb{Z}, u \in K$, 因此 $G/K \cong \mathbb{Z}$ 。令 $\mathcal{H}(G, K)$ 为紧支集、双 K 不变的复值函数空间。把 K 的体积归一化为一, 并以卷积

$$(f_1 * f_2)(g) = \int_G f_1(x) f_2(x^{-1}g) d^\times x$$

定义乘法。这里函数只在有限个 K 陪集上非零, 积分可直接按有限陪集和计算, 无须引入无限级数。它称为相对于 K 的 **Hecke 代数** (Hecke algebra)。

命题 C.3.4. 设 p 为素数, $G = \mathbb{Q}_p^\times$ 、 $K = \mathbb{Z}_p^\times$ 带 p 进拓扑, $\mathcal{H}(G, K)$ 为紧支集双 K 不变复值函数的卷积代数, 所用乘法 Haar 测度使 K 的体积为一。对 $n \in \mathbb{Z}$, 令 T_n 为 $p^n K$ 的示性函数, T 为形式变量。则对 $m, n \in \mathbb{Z}$ 有

$$T_m * T_n = T_{m+n}, \quad \mathcal{H}(\mathbb{Q}_p^\times, \mathbb{Z}_p^\times) \cong \mathbb{C}[T, T^{-1}], \quad T_n \mapsto T^n.$$

对任意 $a \in \mathbb{C}^\times$, 公式 $\chi_a(p^n u) = a^n$, $n \in \mathbb{Z}, u \in K$, 给出 G 的一个光滑可容许一维复表示; T_n 在其 K 不变量上按 a^n 作用。

证明. 卷积被积函数非零, 恰当 $x \in p^m K$ 且 $x^{-1}g \in p^n K$, 即 $g \in p^{m+n} K$ 。在这种情况下整个 $p^m K$ 都贡献一, 其乘法 Haar 体积为一; 否则积分为零。所有双不变紧支集函数是有限个 T_n 的线性组合, 且这些函数线性无关, 故得到 Laurent 多项式代数。

乘法中赋值相加, 故 χ_a 是群同态; 其核含开子群 K , 所以光滑。一维空间对任何紧开子群的固定空间至多一维, 故可容许。积分作用 $\pi(T_n)v = \int_{p^n K} \chi_a(g)v d^\times g = a^n v$, 给出最后结论。□

对 K 平凡的一维表示通常称为**非分歧特征标** (unramified character)。这个算例把群表示中的参数 a 化成 Hecke 代数生成元 T 的特征值。更高秩群会出现非交换的卷积代数, 以及双陪集和诱导表示的问题; 此时不能把 G/K 一概当作群。Hilbert 空间表示和算子范数完备化需要第二卷附录 D 所述的群算子代数理论, 所用拓扑条件与这里的光滑代数表示不同。

C.4 旗簇、层与 D-模的几何方法

最高权表示可以由几何对象上的截面构造。秩一时, 旗簇只有两个仿射坐标图, 线丛的截面与 Lie 代数微分算子都可以直接写出。这些计算有助于分清三种对象: 几何空间、其上的层, 以及作用于层截面的微分算子。

C.4.1 完全旗与射影直线

定义 C.4.1. 设 n 为非负整数, V 为 n 维复向量空间。满足

$$0 = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n = V, \quad \dim_{\mathbb{C}} F_i = i \quad (0 \leq i \leq n),$$

的子空间列, 称为 V 的**完全旗** (complete flag)。所有完全旗组成的代数簇称为**旗簇** (flag variety), 记 $\text{Fl}(V)$ 。

其代数结构可以放在 $\prod_{i=1}^{n-1} \text{Gr}(i, V)$ 中, 由相邻子空间包含的关联方程给出。 $\text{GL}(V)$ 对旗传递作用: 给每面旗选择适应它的基, 换基矩阵就把标准旗送到所给旗。标准旗的稳定子群是可逆上三角矩阵群 B , 故旗簇也是齐性空间 GL_n/B 。

当 $n = 2$ 时, 一面旗只需选择一条直线, 所以 $\text{Fl}(\mathbb{C}^2) = \mathbb{P}^1$ 。上三角群有两个轨道: 点 $[1:0]$ 与其补 $\{[z:1]\} \cong \mathbb{A}^1$ 。前者闭, 后者的闭包为整个射影直线。这是 Schubert 分解的最小例子, 两个轨道对应 S_2 的两个元素。这里所有闭包都光滑; 高维旗簇的胞腔仍光滑, 但胞腔的闭包可以奇异, 不能把二者混称。

C.4.2 线丛截面与最高权模

射影直线用坐标 $z = Y/X$ 与 $w = X/Y$ 的两个仿射图覆盖。对整数 m , 线丛 $\mathcal{O}(m)$ 的正则截面可以写成一对多项式 $a(z), b(w)$, 在交上满足

$$b(w) = w^m \cdot a(1/w).$$

这个相容条件是层的粘合要求, 而不是任意选择两个无关的函数。

命题 C.4.2. 设 m 为整数, $\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$, $\mathcal{O}(m)$ 为在坐标 $z = Y/X$ 、 $w = X/Y$ 的两图上按 $b(w) = w^m \cdot a(1/w)$ 粘合截面的线丛, $\mathbb{C}[X, Y]_m$ 为全次数 m 的齐次多项式空间。则

$$H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m)) \cong \begin{cases} \mathbb{C}[X, Y]_m, & m \geq 0, \\ 0, & m < 0. \end{cases}$$

当 $m \geq 0$ 时, 算子 $e = X\partial_Y$ 、 $f = Y\partial_X$ 、 $h = X\partial_X - Y\partial_Y$ 给出 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 作用, 所得左模为最高权 m 的简单模 L_m 。

证明. 若 $a(z) = \sum_{j \geq 0} a_j z^j$, 粘合条件给出 $b(w) = \sum_j a_j w^{m-j}$ 。两边都是多项式, 恰当 $a_j = 0$ 对所有 $j > m$ 成立。 $m < 0$ 时全部系数为零; $m \geq 0$ 时对应齐次多项式 $\sum_{j=0}^m a_j X^{m-j} Y^j$ 。

三个算子保持全次数, 直接计算得 $[h, e] = 2e$ 、 $[h, f] = -2f$ 、 $[e, f] = h$ 。 X^m 是权 m 的最高向量, 而反复作用 f 得到 $X^{m-j} Y^j$ 的非零倍数, 生成全空间。 e 在除最高向量以外的基向量上系数非零, 所以任一非零子模取最高向量后必含 X^m , 进而为全模。因此它是 L_m 。□

这里约定变量 X, Y 按自然二维表示变换。若把同一多项式空间解释成对偶空间上的函数，并令群通过逆变换拉回，便会出现对偶表示；比较几何文献时应先核对作用方向。

在 $X \neq 0$ 图中把齐次式写成 $X^m \cdot a(z)$ ，直接求导得到

$$e = \partial_z, \quad h = m - 2z\partial_z, \quad f = mz - z^2\partial_z.$$

在另一图则变成

$$e = mw - w^2\partial_w, \quad h = -m + 2w\partial_w, \quad f = \partial_w.$$

例如 e 的换图由 $b(w) = w^m \cdot a(1/w)$ 推出 $w^m \cdot a'(1/w) = mw \cdot b(w) - w^2 \cdot b'(w)$ 。三个算子的换图因此与线丛粘合相容，确实定义在几何截面上。

C.4.3 微分算子模与中心关系

对光滑复代数簇 X ，将正则函数的乘法算子记为零阶算子；递归规定线性算子 P 阶数至多为 r ，当且仅当对所有局部正则函数 a ，交换子 $[P, a]$ 阶数至多为 $r-1$ 。它们按局部限制组成微分算子层 $\mathcal{D}_X$ 。带有 $\mathcal{D}_X$ 左作用的层称为 D -模 (D -module)。该作用同时包含函数乘法和微分作用，二者必须满足 Leibniz 关系。

命题 C.4.3. 设 z 为复仿射直线 $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ 的坐标， $\partial = d/dz$ 为 $\mathbb{C}[z]$ 上的求导算子。整体代数微分算子环 $\Gamma(\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1, \mathcal{D}_{\mathbb{A}^1})$ 是第一 Weyl 代数

$$D = \mathbb{C}\langle z, \partial \rangle / (\partial z - z\partial - 1).$$

每个算子唯一写成有限和 $\sum_{j=0}^r a_j(z)\partial^j$ ，其中 $r \geq 0$ 为整数、 $a_j(z) \in \mathbb{C}[z]$ 。

证明. 关系来自多项式求导的乘法法则。按算子阶数归纳：若 P 阶数至多 r ，则 $[P, z]$ 阶数至多 $r-1$ ，归纳可写成 $\sum_j b_j(z)\partial^j$ 。令 $Q = \sum_j b_j(z)\partial^{j+1}/(j+1)$ ，利用 $[\partial^{j+1}, z] = (j+1)\partial^j$ 得到 $[P - Q, z] = 0$ 。故 $P - Q$ 与全部多项式乘法交换，必为乘以 $(P - Q)(1)$ 的算子。这证明所需表达存在。若一个这样的表达为零，依次作用于 $1, z, z^2, \dots$ ，在已知较低系数为零之后，第 j 次给出 $j! \cdot a_j(z) = 0$ ，故所有系数为零，证明唯一性。 $\square$

例如多项式模 $\mathbb{C}[z]$ 可写成 $D/D\partial$ 。另一个循环模 D/Dz 由向量 δ 生成，满足 $z\delta = 0$ ，并有

$$z\partial^j\delta = -j\partial^{j-1}\delta.$$

它以 $\delta, \partial\delta, \partial^2\delta, \dots$ 为基，是集中在原点的微分算子模的代数模型。多项式模与这个模都在 $\mathbb{C}$ 上无限维，但函数和微分算子在两者上的作用不同。

在线丛 $\mathcal{O}(m)$ 上作用的微分算子组成扭曲的算子层 $\mathcal{D}_{\mathcal{O}(m)}$ 。在每个平凡化图上它与通常的 $\mathcal{D}$ 同构；换平凡化时须用线丛过渡函数共轭算子，因此不同图上的写法并不只差坐标代换。上一小节的三个算子给出

$$U(\mathfrak{sl}_2) \longrightarrow \Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{D}_{\mathcal{O}(m)}).$$

直接展开可得 $h^2 + 2h + 4fe = m(m+2)$, 所以该映射通过中心商 $U(\mathfrak{sl}_2)/(\Omega - m(m+2))$ 分解。它把最高权参数、中心关系与同一个线丛的局部算子联系起来。

一般旗簇的局部化理论进一步研究何种中心商模能够由这样的算子层恢复; 要得到范畴等价, 还须规定中心参数的正则性、支配或反支配约定, 以及所用 D -模的有限性条件。上面的中心分解计算本身没有证明这些等价。几何表示论还研究 D -模的好滤过、余切丛中的特征簇和 holonomic 条件; 它们涉及微分方程的维数限制, 与“全纯函数”这一概念不同。这里保留 holonomic 原文。关于这些方法与最高权表示的关系, 参见 [12, Further reading, Geometric representation theory]; 进入系统学习前, 可先用本节两个坐标图把层、扭曲和中心参数的区别算清楚。

本章小结

相同 Lie 代数并不决定指定 Lie 群的表示: 从普遍覆盖下降时还要零化离散中心核。紧群平均延续了有限群的分裂与正交方法, 而 Peter-Weyl 的新内容是矩阵系数在函数空间中的完备性; 其自然结论是 Hilbert 范数收敛。

p 进光滑表示由开稳定子群控制, 紧开群平均可以逐向量在有限商上计算。对 $\mathbb{Q}_p^\times$ 而言, 双陪集卷积就是 Laurent 多项式乘法, 非分歧特征标成为生成元的非零特征值。几何算例中, 线丛的过渡函数决定截面与微分算子的相容性, 并把 $\mathfrak{sl}_2$ 的中心参数具体化为 $m(m+2)$ 。这些附加结构各有自己的条件, 不能仅因都称为表示就互相替换。

习题

习题 C.1. 判断 $A = \text{diag}(i, 3i)$ 与 $B = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ 所给实一维 Lie 代数表示能否下降到 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 。

解. $e^{2\pi A} = I$, 故前者可以, 两个特征标分别为 z 和 z^3 。后者写成 $iI + N$, $N^2 = 0$, $N \neq 0$, 所以 $e^{2\pi B} = I + 2\pi N \neq I$, 不能下降。特征值满足整数条件仍不够, 还需排除平凡 Jordan 块。□

习题 C.2. 给出两个不同构的有限维 Lie 群表示, 它们的微分相同, 说明积分唯一性中的连通条件。

解. 取离散有限 Lie 群 C_2 。其 Lie 代数为零, 平凡一维表示和符号表示的微分都是零, 却因非单位元分别作用为 $1, -1$ 而不同构。微分无法看到不属于单位连通分支的群元素。□

习题 C.3. 判断 $L_m \otimes L_n$ 的 $SU(2)$ 表示何时下降到 $SO(3)$, 并与 Clebsch-Gordan 分解核对。

解. 中心 $-I$ 在张量积上按 $(-1)^{m+n}$ 作用, 所以下降当且仅当 $m+n$ 偶数。分解中的简单项最高权为 $m+n, m+n-2, \dots, |m-n|$, 全部同奇偶; 故恰在同一条件下, 每一简单项都能下降。□

习题 C.4. 对于 $SU(2) \times SU(2)$ 的表示 $L_m \boxtimes L_n$, 分别求下降到 $SO(3) \times SO(3)$ 及下降到由 $(-I, -I)$ 生成的中心子群的商的条件。

解. 前一商的核由 $(-I, I)$ 与 $(I, -I)$ 生成, 两者分别作用为 $(-1)^m$ 、 $(-1)^n$, 所以要求 m, n 都偶数。后一商只要求 $(-1)^{m+n} = 1$, 即两者同奇偶。不同中心商具有不同的下降条件。□

习题 C.5. 圆群在 $\mathbb{C}^3$ 上按 $\text{diag}(1, z, z^{-1})$ 作用。计算 Haar 平均投影, 以及任意线性算子 $T = (t_{ij})$ 的共轭平均。

解. 各非零整数指数的积分为零, 所以向量平均为 $\text{diag}(1, 0, 0)$ 。三条权两两不同, 共轭作用下矩阵单位 E_{ij} 带权等于第 i 条权减第 j 条权; 只有 $i = j$ 的权为零。因此 T 的共轭平均为 $\text{diag}(t_{11}, t_{22}, t_{33})$ 。□

习题 C.6. 以 $SU(2)$ 的矩阵坐标 a, b 表示群元素。利用对称平方的矩阵系数正交性, 计算 $\int |a|^4 dg$ 与 $\int |a|^2 \cdot |b|^2 dg$ 。

解. 在对称平方的规范基 $e_1^2, (e_1 e_2 + e_2 e_1)/\sqrt{2}, e_2^2$ 中, 自然作用的一列含 $a^2, -\sqrt{2}ab, \bar{b}^2$ 。该表示是三维不可约 L_2 , 每个矩阵系数的平方范数为 $1/3$ 。故两积分分别为 $1/3, 1/6$ 。这也与 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 及对称性相容。□

习题 C.7. 对圆群上的有限 Fourier 和 $f = \sum a_n z^n, h = \sum b_n z^n$, 计算归一化卷积 $(f * h)(z) = \int f(w)h(w^{-1}z)dw$, 并比较点乘。

解. 展开后 w 的指数为 $r - s$, 积分只保留 $r = s$, 故 $f * h = \sum a_n b_n z^n$ 。点乘却为 $fh = \sum_n (\sum_r a_r b_{n-r})z^n$ 。因此卷积在 Fourier 系数上逐项相乘, 点乘在系数上卷积, 二者不能混同。□

习题 C.8. 说明 $SU(2)$ 的不可约特征标不能线性稠密地生成全部 $L^2(SU(2))$ 。给出一个非零函数与全部特征标正交。

解. 取自然矩阵的 $(1, 2)$ 系数 b , 其范数平方为 $1/2$ 。它与其他不可约表示的所有矩阵系数正交, 也与自然表示的两个对角系数正交, 因此与所有不可约特征标正交。特征标只张成共轭不变函数空间; 全部矩阵系数才给出 Peter-Weyl 完备族。□

习题 C.9. 把 $SU(2)$ 自然表示的特征标限制到环面, 得到 $2 \cos \theta$ 。计算它关于 $d\theta/(2\pi)$ 的平方范数, 并与群 Haar 范数比较。

解. $(2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} 4 \cos^2 \theta d\theta = 2$ 。但不可约群特征标的 Haar 范数平方为一。差别说明环面均匀测度不是由 $SU(2)$ 共轭类参数直接得到的积分测度; 不能省去 Weyl 积分公式中的权因子。□

习题 C.10. 证明 $p^r \mathbb{Z}_p$ 在加法群 $\mathbb{Q}_p$ 中既紧又开, 并计算 $\mathbb{Z}_p/p^r \mathbb{Z}_p$ 在 $r \geq 0$ 时的阶。

解. 乘以非零 p^r 是拓扑自同构, 故将紧开的 $\mathbb{Z}_p$ 送成紧开集合。模掉 p^r 只保留前 r 个 p 进数字, 每位有 p 种选择, 所以商有 p^r 个元素; $r = 0$ 时为平凡群。□

习题 C.11. 让 $\mathbb{Z}_p$ 经有限商 $\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ 在其复正则表示上作用。求 $p^r \mathbb{Z}_p$ 不变量空间的维数。

解. 在有限商上, 固定函数必须在 $p^r\mathbb{Z}_p$ 的平移轨道上常值. 若 $r < n$, 共有 p^r 个陪集; 若 $r \geq n$, 作用平凡而维数为 p^n . 所以维数为 $p^{\min(r,n)}$. 该表示光滑且有限维, 因而可容许. $\square$

习题 C.12. 对每个 $n \geq 1$, 取 $\mathbb{Z}_p$ 上核为 $p^n\mathbb{Z}_p$ 的单位圆值特征标 χ_n . 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上按 $\pi(g)v_n = \chi_n(g)v_n$ 作用. 证明它强连续, 却有非光滑向量.

解. 对任意平方可和向量, 先使尾部范数足够小; 酉作用使变化后的尾部差范数至多为原尾部范数的两倍. 前有限个坐标上的特征标连续, 故它们的差同时趋零, 证明强连续. 取 $v = \sum_{n \geq 1} 2^{-n}v_n$. 若某个开子群固定它, 则包含某个 $p^r\mathbb{Z}_p$, 从而这个子群必须包含于全部 $\ker \chi_n$, 不可能, 因为 $n > r$ 时 $p^r\mathbb{Z}_p \not\subseteq p^n\mathbb{Z}_p$. 所以该向量不光滑. $\square$

习题 C.13. 对 $\chi_a(p^n u) = a^n$, 判断何时可选择正定 Hermitian 内积使该一维表示酉.

解. 一维内积只差一个正常数, 不能改变标量算子的模. p 作用为 a , 故酉性必要要求 $|a| = 1$. 此条件成立时所有 a^n 的模都为一, 单位群作用又平凡, 所以也充分. 光滑可容许条件只要求 $a \neq 0$, 比酉性宽. $\square$

习题 C.14. 取奇素数 p , $K' = 1 + p\mathbb{Z}_p \subset \mathbb{Q}_p^\times$. 把 K' 的乘法体积归一化为一, 计算 $\mathcal{H}(\mathbb{Q}_p^\times, K')$.

解. 赋值及单位模 p 给出 $\mathbb{Q}_p^\times/K' \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{F}_p^\times$. 各陪集示性函数的卷积仍按群乘法相乘, 故

$$\mathcal{H}(\mathbb{Q}_p^\times, K') \cong \mathbb{C}[T, T^{-1}] \otimes \mathbb{C}[\mathbb{F}_p^\times].$$

有限交换群 $\mathbb{F}_p^\times$ 有 $p-1$ 个复特征标, 其群代数为 $p-1$ 份 $\mathbb{C}$ 的直积. 因此该 Hecke 代数为 $p-1$ 份 Laurent 多项式代数的直积; 额外的离散参数记录单位群模 p 的特征标. $\square$

习题 C.15. 说明紧开平均的正合性对特征 p 系数可能失败, 给出一个通过有限商的例子.

解. 让 $\mathbb{Z}_p$ 经过商 C_p , 在 $k[C_p]$ 上正则作用, $\text{char } k = p$. 增广满射 $k[C_p] \rightarrow k$ 的源不变量由 $\sum_{g \in C_p} g$ 张成, 但它在增广下映为 $p = 0$. 目标不变量为全部 k , 所以不变量函子不保持该满射. 两表示都光滑, 失败来自系数特征而不是拓扑不连续. $\square$

习题 C.16. 在 $\mathbb{C}^3$ 的旗簇中, 用 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix}$ 作用于标准旗, 描述所得旗, 并说明三个参数唯一.

解. 所得直线由 $(1, a, b)$ 张成, 二维平面由该向量与 $(0, 1, c)$ 张成. 直线第一坐标不为零时可以唯一归一为一, 确定 a, b ; 平面中第一坐标为零的方向若第二坐标不为零, 可唯一归一为 $(0, 1, c)$, 确定 c . 这些非零条件定义开集, 故得到旗簇中的一个仿射三维开图. $\square$

习题 C.17. 设 $m \geq 1$. 计算 $\mathcal{O}(m)$ 的整体截面在点 $[1:0]$ 的求值核的维数, 并用齐次多项式描述这个核.

解. 在 $X \neq 0$ 的平凡化中, 求值为 $a(z) \mapsto a(0)$. 核由 $z, z^2, \dots, z^m$ 张成, 维数 m . 齐次描述是所有被 Y 整除的次数 m 多项式, 即 $Y\mathbb{C}[X, Y]_{m-1}$. 核对固定该点的子群稳定, 却一般不对全群稳定. $\square$

习题 C.18. 对 $m, n \geq 0$, 证明截面乘法 $H^0(\mathcal{O}(m)) \otimes H^0(\mathcal{O}(n)) \rightarrow H^0(\mathcal{O}(m+n))$ 满射, 求核维数并解释其表示意义.

解. 任何次数 $m+n$ 单项式都可把 Y 的次数拆成 $j+k$, 其中 $0 \leq j \leq m, 0 \leq k \leq n$, 从而写成两个所需次数的单项式之积. 故乘法满射, 核维数为 $(m+1)(n+1) - (m+n+1) = mn$. 微分算子对乘积满足 Leibniz 法则, 所以该映射保持 $\mathfrak{sl}_2$ 作用; 它正是从 $L_m \otimes L_n$ 投到最高权 $m+n$ 的简单分量的满射. $\square$

习题 C.19. 证明第一 Weyl 代数在特征零域上没有非零有限维模.

解. 若有维数 $d > 0$ 的模, 则关系 $\partial z - z\partial = 1$ 在该模上成为两个 d 阶矩阵的交换子等于 I_d . 取迹得到 $0 = d$, 在特征零域中矛盾. 正文的多项式模与 D/Dz 因此必为无限维, 这与它们的显式基相符. $\square$

习题 C.20. 证明第一 Weyl 代数模 D/Dz 简单.

解. 其元素可唯一写成 $P(\partial)\delta$. 若非零子模含次数 r 的此类向量, 反复作用 z , 由 $z\partial^j\delta = -j\partial^{j-1}\delta$, 得到 δ 的非零标量倍数. 再作用全部 ∂ 幂就生成整个模. 因此没有非零真子模. $\square$

习题 C.21. 在 $\mathbb{C}[z]$ 上取 $e = \partial_z, h = m - 2z\partial_z, f = mz - z^2\partial_z$, 其中 $m \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$. 证明这个 $\mathfrak{sl}_2$ 模简单, 并解释 $m = -1$ 时它不等于 $H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(-1))$.

解. 非零子模取任意非零多项式, 反复求导可得非零常数. 又 $f^j 1 = m(m-1)\cdots(m-j+1)z^j$, 因参数不为非负整数, 所有系数均非零, 所以子模含全部单项式, 等于 $\mathbb{C}[z]$. $m = -1$ 时这是一个非零无限维局部截面模, 而线丛的整体截面必须同时满足另一张图的正则性, $H^0(\mathcal{O}(-1)) = 0$. 局部算子作用不等于已经完成全局粘合. $\square$

习题 C.22. 对 $\mathcal{O}(0)$ 核验 $e = \partial_z, h = -2z\partial_z, f = -z^2\partial_z$ 在 $w = 1/z$ 图中的表达, 并说明它们没有在无穷远处产生极点.

解. 链式法则给出 $\partial_z = -w^2\partial_w$. 所以三个算子分别变成 $-w^2\partial_w, 2w\partial_w, \partial_w$. 系数都是 w 的多项式, 故在 $w = 0$ 即无穷远处正则. 一个图上出现二次多项式系数并不表示在射影直线上有奇点, 必须实际做坐标变换. $\square$

附录 D 微分算子、D-模与几何解析方法

本附录以微分算子模研究线性微分方程的代数约束，计算阶滤过与特征簇，再比较形式、解析及渐近解，并介绍 Stokes 现象与正则情形的对应。

本章目标

- 会从线性方程或方程组构造左微分算子模，并用同态恢复解。
- 区分阶滤过与 Bernstein 滤过，计算主理想商模的特征簇。
- 根据特征簇检验 holonomic 条件，辨别联络、点支撑模及一般相干 D-模。
- 比较形式存在性、解析单值和扇形渐近数据，用非正则算例说明正则条件的作用。

代数部分需要左模、滤过与伴随分次、仿射簇和层的基本语言；最后的解析讨论另需复函数的 Laurent 展开、解析延拓及留数定理。导出 Hom 算例只需自由消解，一般对应的概要则涉及消解奇点、GAGA 和导出层论。第 D.2.1 小节用到的 Picard–Vessiot 术语和例子在附录 E 说明。

在解析函数中， $y' = 0$ 有常数解，而 $xy = 0$ 只有零解；若允许点支撑对象，后一方程又会出现别的行为。把两条方程写成微分算子环 D 上的左模 $D/D\partial$ 与 D/Dx ，可以在指定解空间以前先研究算子之间的代数关系。主符号和特征簇将给出第一层几何信息；随后还要说明，局部化、解析延拓与渐近条件怎样改变实际能看到的解。

D.1 从微分模到 D-模

线性方程 $P(y) = 0$ 中，未知量所在的函数空间可以改变，算子之间的代数关系却可以预先记录下来。D-模把这些关系组成一个模，再通过模同态求解。以下先在仿射直线上计算，随后说明在光滑簇上需要添加哪些几何结构。

D.1.1 Weyl 代数模与线性方程组

设 k 为特征零域。在 $k[x]$ 上，把乘以 x 的算子仍记为 x ，把求导算子记为 ∂ 。Leibniz 法则给出

$$\partial x - x\partial = 1.$$

这些算子生成的 k 代数为一阶 Weyl 代数 (Weyl algebra) $A_1(k)$ 。它的每个元素唯一写为 $\sum_{j=0}^m a_j(x)\partial^j$ 。存在性来自交换关系不断把 x 移到左边。若这种表达为零算子，取最大 m ，对该算子反复与乘法算子 x 取交换子 m 次，便得乘法算子 $m! \cdot a_m(x)$ 为零，从而 $a_m = 0$ ，归纳得所有系数为零。这也证明抽象生成关系没有额外隐藏关系。

命题 D.1.1. 设 k 为特征零域, $D = A_1(k)$, $P \in D$, V 为左 D 模。则

$$\mathrm{Hom}_D(D/DP, V) \longrightarrow \{v \in V : Pv = 0\}, \quad f \longmapsto f(1 + DP)$$

是 k 线性同构。

证明. 左模同态由 $1 + DP$ 的像决定, 而 $P(1 + DP) = 0$, 故其像必须被 P 零化。反过来, 对满足 $Pv = 0$ 的 v , 令 $f(Q + DP) = Qv$ 。若两个代表元相差 RP , 其作用差为 $R(Pv) = 0$, 所以此式良定义且为左模同态。两个构造互逆。□

对方程组 $\sum_j P_{ij}y_j = 0$, 取自由左模 D^r 的基 $e_1, \dots, e_r$, 再模去由关系 $\sum_j P_{ij}e_j$ 生成的左子模。同样的论证把该商模到 V 的同态, 识别为 V^r 中的解。因而系数作用在左边, 关系也必须按左模生成, 不能随意交换微分算子的次序。

例如 $D/D\partial$ 的多项式解是常数, $D/D(\partial - 1)$ 的多项式解为零; 第二个模本身却非零, 在解析函数中还有 e^x 这样的解。方程模是否为零与某一函数空间里是否有非零解, 是不同问题。

D.1.2 微分算子、滤过与伴随分次

定义 D.1.2. 设 k 为特征零域, R 为交换含么 k 代数。在 $\mathrm{End}_k(R)$ 中递归规定 $F_{-1} = 0$, 并令

$$F_m = \{P : [P, a] \in F_{m-1} \text{ 对所有 } a \in R\} \quad (m \geq 0),$$

其中 $P \in \mathrm{End}_k(R)$, a 表示乘以 a 的算子, $[P, a] = Pa - aP$ 。 $\mathcal{D}(R) = \bigcup_{m \geq 0} F_m$ 的元素称为 R 上的 **代数微分算子** (algebraic differential operator), 最小的相应 m 称为其阶。

$F_0 = \mathrm{End}_R(R) = R$, 所以零阶算子就是乘法。恒等式 $[PQ, a] = P[Q, a] + [P, a]Q$ 归纳给出 $F_m F_n \subset F_{m+n}$ 。在 $R = k[x]$ 中, 归纳还给出

$$F_m = \sum_{j=0}^m k[x] \partial^j.$$

事实上, 若 $[P, x] = \sum_{j < m} b_j(x) \partial^j$, 令 $Q = \sum_{j < m} b_j(x) \partial^{j+1} / (j+1)$, 则 $[P - Q, x] = 0$ 。因此 $P - Q$ 与一切多项式乘法交换, 必为乘法算子。这证明 $\mathcal{D}(k[x]) = A_1(k)$ 。

这个阶滤过把 x 放在零阶, 把 ∂ 放在一阶。其伴随分次环为

$$\mathrm{gr}_F D \simeq k[x, \xi],$$

其中 ξ 是 ∂ 的一阶符号; 对 $P = a_m(x) \partial^m + \dots$, $a_m \neq 0$, 主符号是 $a_m(x) \xi^m$ 。因为交换子降低阶, 原来的非交换关系在伴随分次环中变为交换关系。

还有常用于增长估计的 Bernstein 滤过, 把 x, ∂ 都放在一次。它同样产生多项式分次环, 但滤过不相同。例如 $\partial - x$ 的阶主符号为 ξ , Bernstein 主符号却为 $\xi - x$ 。以下几何特征簇始终用阶滤过; 不能因两个分次环抽象同构就把两个主符号混用。两种滤过的区别亦见 [7, Section 3.2, pp. 88–90]。

D.1.3 光滑代数簇上的 D-模与特征簇

设 X 为光滑复代数簇, $\mathcal{O}_X$ 为正则函数层. 对开集上的正则函数使用定义 D.1.2, 并按限制映射粘合, 得到微分算子层 $\mathcal{D}_X$. 在局部坐标 $x_1, \dots, x_n$ 中, 它由函数及 $\partial_1, \dots, \partial_n$ 生成, 满足

$$[\partial_i, a] = \frac{\partial a}{\partial x_i}, \quad [\partial_i, \partial_j] = 0.$$

这些局部坐标允许取为 étale 坐标. 上述生成关系以及 $\mathrm{gr} \mathcal{D}_X \simeq \mathrm{Sym}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{T}_X$ 可由以下符号计算得到; 右侧是余切丛 T^*X 上沿纤维的多项式函数.

证明概要. 先在多项式环中反复与各个 x_i 取交换子. 若 P 阶数至多 m , 任取 $|\alpha| = m$, 相应的 m 重交换子是乘以某个函数的零阶算子. 除以 $\alpha!$ 便提取出 P 的最高项系数 a_α . 减去 $\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha \partial^\alpha$ 后, 所有最高阶交换子为零, 阶数降到 $m-1$; 归纳得到正规表达. 最高系数的提取也证明表达唯一, 所以伴随分次环是 $\mathcal{O}_X[\xi_1, \dots, \xi_n]$.

光滑簇的局部 étale 坐标中, 微分算子和主符号具有同样的描述: 对角线理想的商 $\mathcal{O}_{X \times X} / I_\Delta^{m+1}$ 描述 m 阶主部, 微分算子是它对第一因子的线性对偶; étale 坐标的主部由坐标差的次数至多 m 的单项式自由生成. 这是从多项式情形推广到光滑情形所用的局部事实. 换坐标时一次符号按切向量变换, 各阶符号按其对称幂变换, 故局部识别粘合成所示对称代数同构. 这里省略主部的 étale 基变换验证; 详见 [7, Section 1.1, Proposition 1.1.3, pp. 15–17]. $\square$

求出某个函数空间中的全部解, 往往比记录方程的最高阶约束困难. 阶滤过使最高阶关系落在交换的符号代数中, 因而可以用其支撑描述约束所在的余切方向. 对一个模需要同时记录全部关系, 并保证所选滤过由有限数据控制; 良滤过提供了这个条件.

定义 D.1.3. 设 X 为光滑复代数簇, $\mathcal{O}_X$ 为正则函数层, $\mathcal{D}_X$ 为 $\mathcal{O}_X$ 上的代数微分算子层, $F_i \mathcal{D}_X$ 为阶数不超过 i 的算子层 ($i < 0$ 时取零). $\mathcal{D}_X$ 的左模层称为左 D-模; 若它局部有限展示, 则称为相干 D-模. 设 M 为相干左 D-模, $(F_j M)_{j \in \mathbb{Z}}$ 为递增、穷尽、局部下有界的滤过. 若各 $F_j M$ 为相干 $\mathcal{O}_X$ 模, $F_i \mathcal{D}_X F_j M \subset F_{i+j} M$, 且 $\mathrm{gr}_F M$ 在 $\mathrm{gr} \mathcal{D}_X$ 上局部有限生成, 则称为 **良滤过** (good filtration). 通过 $\mathrm{gr} \mathcal{D}_X \simeq \mathrm{Sym}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{T}_X$, 其中 $\mathcal{T}_X$ 为切向量层, 将 $\mathrm{gr}_F M$ 视为余切丛 T^*X 上的相干层. 其支撑集称为 M 的 **特征簇** (characteristic variety), 记为 $\mathrm{Ch}(M)$.

命题 D.1.4 (良滤过与特征簇). 设 X 为光滑复代数簇, $\mathcal{D}_X$ 为代数微分算子层, M 为相干左 $\mathcal{D}_X$ 模. 它局部具有关于阶滤过的良滤过, 以其伴随分次模在 T^*X 上的支撑定义的特征簇 $\mathrm{Ch}(M)$ 不依赖良滤过的选择. 对相干左 $\mathcal{D}_X$ 模的短正合列 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, 有 $\mathrm{Ch}(M) = \mathrm{Ch}(M') \cup \mathrm{Ch}(M'')$.

证明. 局部取有限个 $\mathcal{D}_X$ 生成元 u_i , 指定它们的整数滤过次数 d_i , 令 $F_j M = \sum_i F_{j-d_i} \mathcal{D}_X u_i$. 每项在 $\mathcal{O}_X$ 上相干, 分次模由这些元的符号生成, 故为良滤过.

两个良滤过 F, G 的有限个分次生成元提升到模中, 分别在另一滤过的有限次数出现. 因此可取 $c \geq 0$, 使 $F_j M \subseteq G_{j+c} M$, $G_j M \subseteq F_{j+c} M$ 对所有 j 成立. 设次数 m 的

齐次符号 a 零化 $\mathrm{gr}_F M$, 取它的算子提升 P , 则 $PF_j M \subseteq F_{j+m-1} M$. 对 $N > 2c$, 得到

$$P^N G_j M \subseteq F_{j+c+Nm-N} M \subseteq G_{j+Nm+2c-N} M \subseteq G_{j+Nm-1} M.$$

所以 a^N 零化 $\mathrm{gr}_G M$. 交换 F, G 后得到反向包含, 故两分次模的零化理想有相同根理想, 支撑相同。

最后, 在 M' 上取 M 的交滤过, 在 M'' 上取商滤过, 得到分次短正合列。分次环局部为 Noether 多项式环, 所以分次子模和商模都有限生成, 各滤过项也相干; 这些仍为良滤过。交换环上短正合列的支撑是两端支撑的并, 故得到结论。参见 [7, Theorems 2.1.3 and 2.2.1, pp. 58–59]。□

这里相干性是对 $\mathcal{D}_X$ 而言, 不要求 M 在 $\mathcal{O}_X$ 上有限生成。

命题 D.1.5. 设 $X = \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$, $D = A_1(\mathbb{C})$ 取阶滤过, ξ 为 ∂ 的一阶符号。设非零算子 $P = a_m(x)\partial^m + \cdots \in D$, 其中 $m \geq 0$, $a_m \in \mathbb{C}[x] \setminus \{0\}$ 。对左商模 $M = D/DP$ 的商滤过, 有

$$\mathrm{gr} M \simeq \mathbb{C}[x, \xi]/(a_m(x)\xi^m), \quad \mathrm{Ch}(M) = V(a_m(x)\xi^m).$$

证明. 主符号的乘积满足 $\sigma(QP) = \sigma(Q)\sigma(P)$: 最高阶系数的乘积非零, 故阶相加。左理想 DP 的每个元素就是某个 QP , 所以其分次理想恰由 $\sigma(P) = a_m(x)\xi^m$ 生成。商滤过的分次模于是为所写商环, 它的支撑为该理想的零点集。□

例如 $D/D\partial$ 的特征簇是零截面 $\xi = 0$, D/Dx 的特征簇是点 $x = 0$ 上的整条余切纤维。后一簇非零: 在 $\mathbb{C}[z]$ 上令 ∂ 乘以 z , $x = -d/dz$, 可验证 $\partial x - x\partial = 1$, 且向量 1 被 x 零化。这给出了该商模的具体模型。

再取 $P = x\partial - \lambda$, $\lambda \in \mathbb{C}$ 。它的阶主符号为 $x\xi$, 所以

$$\mathrm{Ch}(D/D(x\partial - \lambda)) = V(x\xi) = V(\xi) \cup V(x).$$

在 $x \neq 0$ 处只留下零截面; 在原点, 最高阶系数消失, 整条余切纤维出现。不同的 λ 都给出同一特征簇, 而方程 $xy' = \lambda y$ 在避开原点的单连通解析区域内有解 $y = cx^\lambda$, 其绕圈因子随 λ 改变。特征簇保留了最高阶约束的几何形状, 低阶参数及解析延拓还需要其他资料。

D.1.4 holonomic D-模与术语辨析

特征簇越小, 方程的约束通常越强。不过约束不能任意增加而仍保留非零相干模。

定理 D.1.6 (Bernstein 不等式). 设 $n \geq 0$, X 为纯 n 维光滑复代数簇, $\mathcal{D}_X$ 为代数微分算子层, $M \neq 0$ 为相干左 $\mathcal{D}_X$ 模, $\mathrm{Ch}(M) \subseteq T^*X$ 为其关于阶滤过的特征簇。则 $\dim \mathrm{Ch}(M) \geq n$ 。

证明概要. 按 $n = \dim X$ 归纳。若特征簇的某个分量在 X 中投影稠密, 该分量的维数已经至少为 n 。否则, 模的支撑是一个真闭子集; 取其光滑部分附近的一个开集, 可将支撑包含在光滑超曲面 $S = \{x_1 = 0\}$ 中。取相容局部坐标和法向算子 ∂_1 。支撑条件意味着每个模元素都被某个 x_1 的幂零化。

令 $N = \ker(x_1 : M \rightarrow M)$ 。它是非零 $\mathcal{D}_S$ 模。Weyl 关系给出一个有限求和的投影

$$p(m) = \sum_{j \geq 0} \frac{\partial_1^j x_1^j m}{j!} \in N, \quad m = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j}{j!} \partial_1^j p(x_1^j m).$$

第一式确实被 x_1 零化，因为相邻项用 $x_1 \partial_1^j = \partial_1^j x_1 - j \partial_1^{j-1}$ 相消；第二式是同一有限 Taylor 消去。不同 $\partial_1^j N$ 之间的线性无关性由反复作用 x_1 检验。因此局部有 $M \simeq \mathbb{C}[\partial_1] \otimes N$ ，其中法向坐标 x_1 按 $-d/d\partial_1$ 作用。

这一分解还说明 N 在 $\mathcal{D}_S$ 上相干：把有限个 $\mathcal{D}_X$ 生成元及其有限个 x_1 次幂作上述投影，便得到有限个切向生成元。给 N 取良滤过，法向 ∂_1 各增加一阶，所得分次模局部为 $\mathbb{C}[\xi_1] \otimes \text{gr } N$ ，而 x_1 作用为零。这说明 $\dim \text{Ch}(M) = \dim \text{Ch}(N) + 1$ 。归纳假设给出后者至少为 $(n-1) + 1 = n$ 。维数零时结论直接成立，归纳完成。

这里省略了局部 étale 坐标中该分解的层化及相干生成元的整理；它们是超曲面支撑的 Kashiwara 等价的局部证明。上述法向分次计算及支撑归纳见 [7, Corollary 2.3.2 and Lemma 2.3.5, pp. 62–64]。本证明只需总维数的下界，没有借此断言特征簇的全部辛几何性质。□

设 X 为纯 n 维光滑复代数簇， $\mathcal{D}_X$ 为代数微分算子层。零左 $\mathcal{D}_X$ 模，以及满足 $\dim \text{Ch}(M) = n = \dim X$ 的非零相干左 $\mathcal{D}_X$ 模，称为 **holonomic D-模** (holonomic D-module)。因此命题 D.1.5 中，凡商模非零且 $P \neq 0$ ，其特征簇在平面里是一条曲线，所得模便是 holonomic；反之自由模 D 的特征簇是整个二维余切丛，故不是 holonomic。

有限秩向量丛上的平坦联络给出另一类例子。在局部基中，把 ∂_i 作用写成 $\nabla_i = \partial_i + B_i$ ，Leibniz 法则处理它与函数的关系，而

$$[\nabla_i, \nabla_j] = 0 \iff \partial_i B_j - \partial_j B_i + [B_i, B_j] = 0$$

保证各偏导作用满足 D-模关系。这就是平坦性。取 $F_j M = M$ 对 $j \geq 0$ 、 $F_j M = 0$ 对 $j < 0$ ，便得良滤过，其正次符号全部作用为零，特征簇为零截面，所以非零联络是 holonomic。一般 holonomic 模却未必是向量丛上的联络， D/Dx 就说明了点支撑的可能性。

英文 holonomic 表示这里的特征簇维数条件，holomorphic 则表示复解析意义的“全纯”，二者不能互译。D-模与第三卷的微分代数也有不同的研究对象：前者研究线性微分算子作用及其模，后者还允许非线性微分多项式关系；两者的联系须在具体对象上讨论。

D.2 代数、形式与解析解

同一个有理系数方程可以在函数域、形式 Laurent 级数域，或复解析函数空间中求解。前两者关心相应域中的代数关系，第三种解释还记录沿路径延拓和接近奇点时的增长。以下以一阶方程说明这些信息为何不能相互替代。

D.2.1 有理函数域与形式局部方程

在 $\mathbb{C}(x)$ 上, 线性系统 $Y' = A(x)Y$ 的 Picard–Vessiot 理论研究由基本解矩阵生成、且没有新常数的微分域; 其定义、对应和算例详见附录 E。若选定有限点 a , 令 $z = x - a$, 有理函数又可以展开到 $\mathbb{C}((z))$ 中; 这一步改变了基域, 局部的微分 Galois 群¹一般也随之改变。

命题 D.2.1. 设 $n \geq 1$, $A(z) = \sum_{j \geq 0} A_j z^j \in M_n(\mathbb{C}[[z]])$, $Z_0 \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, 撇号表示形式求导 d/dz 。则存在唯一 $Z(z) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}[[z]])$ 满足 $Z' = AZ$ 且 $Z(0) = Z_0$ 。

证明. 写 $Z = \sum_{m \geq 0} Z_m z^m$, 比较系数得到递推

$$(m+1)Z_{m+1} = \sum_{j=0}^m A_j Z_{m-j}.$$

特征零保证可以除以 $m+1$, 所以给定 Z_0 后依次唯一确定各系数; 反向代入保证方程成立。行列式的常数项为 $\det Z_0 \neq 0$, 故 Z 在幂级数环上可逆。□

该命题给出形式解的存在唯一性, 级数的收敛性还须另证。当 A 在圆盘内解析时, 解析常微分方程的存在唯一性给出收敛解, 并与上述形式解相符。穿孔圆盘中, 解可以沿闭路延拓; 若延拓后的基本解矩阵为 ZM , 则 $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, 因为 $(Z^{-1}\tilde{Z})' = 0$ 。这就是 **单值矩阵** (monodromy matrix), 换基本解矩阵只改变其共轭类。

例如 $y' = \lambda y/z$ 在通用覆盖上有解 $z^\lambda = \exp(\lambda \log z)$, 一次正向绕原点后乘以 $e^{2\pi i \lambda}$ 。这个数描述局部解析延拓; 它并不单独描述所有非正则奇点的渐近行为。

D.2.2 奇点与 Stokes 数据的分析前提

单值矩阵只记录绕圈前后的变化, 尚未说明解接近奇点时怎样增长。为限制这种增长, 可以寻找一个局部基, 使联络矩阵至多有一阶极点。基的选择会改变极点的外观, 因此应把条件写成稳定格的存在性。

定义 D.2.2. 设 $\mathcal{O} = \mathbb{C}\{z\}$ 为原点处收敛幂级数环, $K = \mathcal{O}[z^{-1}]$ 为亚纯函数芽域, M 为有限维 K 向量空间, 配有沿 $\partial_z = d/dz$ 的联络 ∇_{∂_z} 。若存在有限自由 $\mathcal{O}$ 子模 $\Lambda \subseteq M$, 使 $K \otimes_{\mathcal{O}} \Lambda \simeq M$, 并满足

$$z\nabla_{\partial_z}(\Lambda) \subset \Lambda,$$

则称该联络在 $z=0$ 有**正则奇点** (regular singularity); 否则称为非正则奇点。

在格的基下, 条件表示联络矩阵至多有一阶极点。它允许先作亚纯换基, 因此不能只根据某个任意基中出现的高阶极点下结论。此局部条件及等价刻画见 [7, Theorem 5.1.4 and Definition 5.1.6, pp. 131–133]。

秩一情形可以直接检验。若 $y' = a(z)y$, 其中 $a(z) = \lambda/z + b(z)$ 、 b 全纯, 则解是 $z^\lambda \exp \int b(z) dz$, 故为正则奇点。若 a 有真正的二阶或更高阶极点, 则任何非零亚纯换

¹伽罗瓦 (Évariste Galois, 1811–1832), 法国数学家, 以方程根的置换研究根式可解性, 奠定了群论与域论的重要基础。

基 $y = g(z)v$ 只把系数改为 $a - g'/g$; 写 $g = z^m h$, $h(0) \neq 0$, 便有 $g'/g = m/z + h'/h$, 它只能改变一阶极点和全纯部分。因此高阶极点不能消去。特别地, $y' = -y/z^2$ 的解 $e^{1/z}$ 单值, 却在不同方向上有急剧不同的增长, 是非正则情形。

正则奇点也允许对数项。取

$$Y' = \frac{N}{z}Y, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = I + N \log z = \begin{pmatrix} 1 & \log z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因 $N^2 = 0$, 有 $Z' = NZ/z$ 且 $\det Z = 1$ 。联络 $\nabla_{\partial_z} = \partial_z - N/z$ 的标准格 $\mathcal{O}^2$ 被 $z\nabla_{\partial_z}$ 保持, 所以原点为正则奇点。正向绕圈后, 基本解矩阵变为 $Z(I + 2\pi i N)$, 单值矩阵非平凡; 解中的对数增长仍符合正则条件。正则性因而既不要求解单值, 也不要求解都是亚纯函数。

例 D.2.3 (发散形式解与扇形解). 方程

$$x^2 y' - y = -x$$

有唯一形式幂级数解

$$\hat{y} = \sum_{m \geq 1} (m-1)! x^m,$$

该级数的收敛半径为零。它仍能描述不同扇形解析解的共同渐近展开, 而这些解析解可能相差非零的 $ce^{-1/x}$ 。

证明. 比较常数项得 $a_0 = 0$, 比较一次项得 $a_1 = 1$, 随后递推 $a_m = (m-1)a_{m-1}$, 得到所写级数。相邻系数比为 m , 故正的收敛半径不可能存在。

取从 0 沿正实轴趋向无穷、但从上方或下方绕开 $t = 1$ 的固定路径 γ_+, γ_- , 在 $\operatorname{Re}(1/x) > 0$ 且靠近正实方向的扇形中定义

$$y_{\pm}(x) = \int_{\gamma_{\pm}} \frac{e^{-t/x}}{1-t} dt.$$

积分在无穷远指数收敛, 绕极点的有限路径上被积函数解析, 因此在该扇形内可对参数求导。利用 $t/(1-t) = -1 + 1/(1-t)$, 得

$$x^2 y'_{\pm} = y_{\pm} - \int_{\gamma_{\pm}} e^{-t/x} dt = y_{\pm} - x,$$

其中最后的积分由原函数 $-xe^{-t/x}$ 算出。

在原点附近把 $1/(1-t)$ 展开为有限几何和; 每个 t^j 的 Laplace 积分为 $j!x^{j+1}$ 。截断余项含因子 t^N , 在任意较小闭扇形中缩放 $t = xs$ 可界为 $O(|x|^{N+1})$; 路径远离 0 的部分则指数衰减。因此两解都有 $\hat{y}$ 作为渐近展开。两条路径之差绕极点一周, 留数定理给出两积分相差 $\pm 2\pi i e^{-1/x}$, 符号随路径方向约定。这也与齐次方程 $x^2 h' - h = 0$ 的解相符。□

这个例子展示了 **Stokes 现象** (Stokes phenomenon) 所涉及的信息²：同一发散形式展开可以对应不同扇形上的解析解，重叠处的差别未被任何有限阶幂级数近似记录。一般线性齐次系统的 Stokes 矩阵需要指定扇形、形式正规形及相容的渐近归一化；例中的非齐次方程可添一个常数坐标后齐次化。相应解析条件和局部 Galois 群关系参阅 [15, Section 1.4, pp. 35–38]，所引节号与页码依作者公开稿。形式微分域上的方程还需补充相应的解析条件，才能讨论这些数据。

D.2.3 Riemann–Hilbert 对应简介

在没有奇点的复流形上，平坦全纯联络的水平截面局部组成有限维常数层，即局部系统。若 X 连通并选基点，沿路径的解析延拓给出 $\pi_1(X)$ 的有限维表示。反向则把通用覆盖上的平凡向量丛按该表示粘合，得到平坦向量丛；这说明局部系统为何是线性微分方程的自然拓扑对象。

定理 D.2.4 (正则联络的 Riemann–Hilbert 对应). 设 X 为光滑复代数簇， X^{an} 为其解析化。 X 上有限秩代数向量丛的正则可积联络组成的范畴，通过解析化和取水平截面，与 X^{an} 上的有限秩复局部系统范畴等价。这里正则性要求在光滑完备紧化的简单正规交叉边界上局部存在对数联络格，以控制无穷远处的奇点。

证明概要. 平坦解析联络与局部系统之间的对应已由节首的路径延拓和粘合构造给出；所需的新步骤是得到代数联络，以及证明解析同态也是代数的。

取 X 的光滑完备紧化 $\bar{X}$ ，经消解奇点使边界 D 成为简单正规交叉除子。给定局部系统，在边界附近的穿孔坐标图中，各坐标环路的单值矩阵 M_i 彼此交换。选择特征值实部落在固定长度一的半开区间中的对数 A_i ，使 $e^{2\pi i A_i} = M_i$ ；这些对数可取为 M_i 的函数，故仍彼此交换。局部模型

$$\nabla = d - \sum_i A_i \frac{dz_i}{z_i}, \quad Z = \prod_i z_i^{A_i}$$

具有指定单值群，并给出至多对数极点的联络格。固定残数代表的选择使这些格在坐标交上相容，从而粘合成 $\bar{X}^{\text{an}}$ 上的对数联络。GAGA 将这一相干解析格及其对数联络代数化，限制到 X 就得到所需正则代数联络。

对两个正则联络之间的水平解析同态，局部基本解的增长至多是有限次幂乘对数幂；其逆矩阵也满足同类估计。因此同态矩阵在边界附近只有有限阶增长。逐坐标用 Laurent 展开和 Cauchy 系数估计，有限阶增长的单值全纯函数只有有限阶极点，所以该同态亚纯延伸到 $\bar{X}$ 。选一个足够大的极点界后，又由 GAGA 得到代数同态。于是函子满忠实；忠实性也可从解析化或水平局部基直接看出。

这里省略光滑正规交叉紧化的存在、对数格的唯一粘合及 GAGA 的证明；前两步保证在无穷远也满足正则性，第三步把解析构造变成代数对象。具体的对数格及代数化论证见 [7, Sections 5.2–5.3, Theorem 5.3.8 and Corollary 5.3.10, pp. 155–158]。这给出 **Riemann–Hilbert 对应** (Riemann–Hilbert correspondence) 的联络版本。□

²斯托克斯 (George Gabriel Stokes, 1819–1903)，爱尔兰数学家、物理学家，研究流体力学、光学和渐近级数。

无穷远条件不可省略。例如在 $X = \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ 上, $y' = y$ 与 $y' = 0$ 都只有平凡单值群; 其解析联络由乘以 e^x 联系。但 e^x 不是正则可逆函数, 也不是有理函数, 所以它们在代数联络范畴中不同构。在 $z = 1/x$ 坐标下, 前一方程为 $dy/dz = -y/z^2$, 由上一小节的秩一判别可知它在无穷远非正则; 这正是定理排除的情形。

若允许奇点处的支撑和延拓, 局部系统已不够, 需要构造性层复形。

定理 D.2.5 (导出 Riemann–Hilbert 对应). 设 X 为纯 n 维光滑复代数簇, $\mathcal{D}_X$ 为代数微分算子层, X^{an} 为其解析化。解析化后的 de Rham 复形³整体移位 $[n]$, 得到函子 DR, 它给出范畴等价

$$\text{DR} : D_{\text{rh}}^b(\mathcal{D}_X) \simeq D_c^b(X^{\text{an}}, \mathbb{C}).$$

左边的对象是左 $\mathcal{D}_X$ 模的有界复形, 其上同调模正则且 holonomic; 右边的对象是复向量空间层的有界复形, 其上同调层沿有限代数分层局部常值且纤维有限维。正则性包括无穷远处的正则条件。该函子把单个正则 holonomic 左 $\mathcal{D}_X$ 模送到反常层。

证明概要. 先看正规交叉边界上的正则亚纯联络。它的 de Rham 复形在局部坐标中是由互相交换的 $\partial_i - A_i/z_i$ 组成的 Koszul 复形。逐坐标 Laurent 展开将其上同调与穿孔图上局部系统的上同调比较; 正则性保证以亚纯函数或以所有解析函数计算时, 包含映射给出同一个上同调。这是证明与开嵌入的延拓相容所需的局部比较。对一般边界, 先消解成正规交叉边界, 再用适当直接像下降; 该比较见 [7, Theorem 5.2.24 and Remark 5.2.25, pp. 151–153]。

满忠实的验证使用对偶、外张量积、对角线逆像和到点的直接像: 两个对象的导出 Hom 可由这些操作表达。正则增长的局部比较使 de Rham 函子与上述操作相容, 因而把该表达转成两个可构造复形的导出 Hom。取零次上同调便得到 Hom 集合的双射, 各次上同调则同时控制扩张。这里还须核对所得同构与 de Rham 实际诱导的同态一致, 而不能仅比较两个复形的抽象同构类。

再证本质满射。可构造导出范畴由 $Ri_*\mathcal{L}$ 生成, 其中 $i : S \hookrightarrow X$ 是光滑局部闭代数子簇的仿射嵌入, $\mathcal{L}$ 为其有限秩局部系统。对有限分层使用开闭区别三角并逐层归纳, 就得到这一生成陈述。由定理 D.2.4, 在 S 上取对应的正则联络 N ; 微分算子直接像 $i_+N[-\dim S]$ 是正则 holonomic 复形, 其 de Rham 复形为 $Ri_*\mathcal{L}$ 。闭嵌入的法向部分可由上一节的 $\mathbb{C}[\partial_1, \dots, \partial_c] \otimes N$ 模型理解, 开嵌入则使用最初的正则亚纯比较。函子的像已包含这些生成元, 满忠实又允许将所有连接映射与映射锥提升, 故它覆盖整个可构造导出范畴。

这里省略正规 holonomic 模在这些操作下的保持性、de Rham 与各操作相容的比较, 以及导出 Hom 同构的自然性检查; 这些是一般对应的大部分技术内容。相关证明及自然性问题见 [7, Sections 7.1–7.2, Theorems 7.2.2 and 7.2.5, Remark 7.2.3, pp. 174–177]。在纯 n 维光滑层上, 一个联络的 de Rham 复形是相应局部系统移位 $[n]$, 支撑较小时用该层自身的维数; 这正给出反常层的支撑与余支撑条件, 说明维数移位不可省略。一般非正则模不满足前述增长比较, 因而不属于这个对应。□

³德拉姆 (Georges de Rham, 1903–1990), 瑞士数学家, 研究微分拓扑与代数拓扑, 建立了微分形式上同调与拓扑上同调的联系。

D.2.4 与分析学、几何表示论的联系

下面计算导出 Hom ，比较两种系数环所产生的上同调。令 $D = A_1(\mathbb{C})$ ， $M = D/D\partial$ 。右乘 ∂ 是左 D 线性单射，因为正规表达保证 D 无零因子，故有自由消解

$$0 \longrightarrow D \xrightarrow{R_\partial} D \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

对左模 $\mathbb{C}[x]$ 取 $\text{Hom}_D(-, \mathbb{C}[x])$ ，所得两项复形为

$$\mathbb{C}[x] \xrightarrow{d/dx} \mathbb{C}[x].$$

其零次上同调为常数，一次上同调为零，因为多项式在特征零下总可逐项积分。

若改在穿孔直线上，用 $D^\times = \mathbb{C}[x, x^{-1}][\partial; d/dx]$ 及同样的常数方程模，计算变为

$$\mathbb{C}[x, x^{-1}] \xrightarrow{d/dx} \mathbb{C}[x, x^{-1}].$$

核仍为 $\mathbb{C}$ ，余核却是一维，由 x^{-1} 的类生成：除 x^{-1} 外，每个 Laurent 单项式都有 Laurent 原函数。这个余核记录原函数无法在穿孔直线全局选取的障碍，与沿圈积分 $\int dx/x = 2\pi i$ 相呼应。此处算的是全局代数模的导出 Hom ；局部解析求导仍满射，所以不能把这项全局上同调误称为每个点的局部解障碍。

几何表示论还把 Lie 代数的包络代数模与旗簇上的适当扭曲 D-模联系起来。局部化定理需要指定中心特征、参数与正则性条件。本附录介绍了微分算子、特征簇和层复形等所需概念；局部化与表示分类的系统理论可参阅 [7, Chapter 11]。

本章小结

Leibniz 法则成为 Weyl 代数的交换关系，线性方程则成为自由左模中的关系。阶滤过把这种非交换结构转为余切空间上的交换代数；特征簇据此记录约束的几何形状。它不能用任意滤过的符号零点集代替，计算一般左理想时也必须掌握整个分次理想。

形式级数递推、解析延拓和扇形渐近各自保存不同的信息。正则联络可以由局部系统描述，但非正则方程还可能带有 Stokes 数据；全局原函数的障碍又需要上同调记录。因此 Riemann–Hilbert 对应中的正则性、构造性和导出范畴都有具体作用。

习题

习题 D.1. 设 k 为特征零域， $m \geq 1$ 。在 $A_1(k)$ 中求 $\partial^m x$ 与 $\partial^2 x^3$ 的正规表达。

解. 由 $\partial x = x\partial + 1$ 归纳得 $\partial^m x = x\partial^m + m\partial^{m-1}$ 。先算 $\partial x^3 = x^3\partial + 3x^2$ ，再求导一次，得

$$\partial^2 x^3 = x^3\partial^2 + 6x^2\partial + 6x.$$

额外项来自求导对系数的作用，不能按交换多项式相乘。□

习题 D.2. 在特征零域 k 上证明 Weyl 代数没有非零有限维左模。说明这不妨碍存在在 $k(x)$ 上有限维的微分模。

解. 若模在 k 上维数为正整数 d , 对作用关系 $[\partial, x] = I$ 取矩阵迹, 左边为零, 右边为 $d \neq 0$, 矛盾。微分模有限维是指对系数域 $k(x)$ 的维数; 把它仅看作 k 向量空间通常无限维, 故上述迹论证并不适用。□

习题 D.3. 设 $D = A_1(\mathbb{C})$ 。构造一个左 D 模, 使其到任意函数模 V 的同态对应方程组 $y'_1 = y_2, y'_2 = -y_1$ 的解。把它化为单个循环模。

解. 取 D^2 的基 e_1, e_2 , 模去关系 $\partial e_1 - e_2, \partial e_2 + e_1$ 生成的左子模。同态把基送到 y_1, y_2 , 故关系恰好成为所给方程。由第一关系 $e_2 = \partial e_1$, 第二关系化为 $(\partial^2 + 1)e_1 = 0$ 。映射 $D/D(\partial^2 + 1) \rightarrow M, 1 \mapsto e_1$ 与 $e_1 \mapsto \bar{1}, e_2 \mapsto \partial \bar{1}$ 互逆。□

习题 D.4. 在 $D = A_1(\mathbb{C})$ 中, 求 $P = x^2\partial^3 + \partial - x^5$ 的阶主符号与 Bernstein 主符号, 说明相应零点集为何不同。

解. 最大微分阶为 3, 故阶主符号是 $x^2\xi^3$ 。Bernstein 次数把 x, ∂ 都计为一次; 首项和末项的次数均为 5, 故符号是 $x^2\xi^3 - x^5 = x^2(\xi^3 - x^3)$ 。前者零点为坐标轴之并, 后者还带有 $\xi^3 = x^3$ 的斜线; 它们不能用作同一个阶特征簇。□

习题 D.5. 在 $D = A_1(\mathbb{C})$ 中, 令 $I = D\partial + Dx$ 。证明 $I = D$ 。说明为什么仅取这两个生成元的主符号零点集会给出错误的特征簇。这是 [7, Exercise 2.2.6, pp. 61–62] 所问现象的一个具体例子。

解. $\partial x \in Dx, x\partial \in D\partial$, 故 $1 = \partial x - x\partial \in I$ 。于是商模为零, 特征簇为空。但生成元的阶符号为 ξ, x , 其共同零点是 $(0, 0)$ 。真正的分次理想还含 1 的符号, 等于整个分次环。一般左理想的生成元主符号不必生成其整个分次理想。□

习题 D.6. 对 $D = A_1(\mathbb{C})$ 及 $a \in \mathbb{C}$, 计算 $D/D((x-a)\partial)$ 的特征簇, 并求该方程在 $\mathbb{C}[x]$ 中的解。

解. 命题 D.1.5 给出 $\text{Ch} = V((x-a)\xi)$, 即零截面与 a 上余切纤维之并。多项式解满足 $(x-a)y' = 0$, 多项式环无零因子, 故 $y' = 0$, 解仅为常数。特征簇的额外分支不等于新增的多项式解, 它记录方程在特殊点的退化。□

习题 D.7. 在 $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ 的平凡线丛上设 $\nabla_x = \partial_x + a(x, y), \nabla_y = \partial_y + b(x, y)$, 其中 $a, b \in \mathbb{C}[x, y]$ 。求成为 D-模的条件, 并判定 $a = y, b = x$ 与 $a = y, b = 0$ 两例。

解. 对任意函数作用后相减, 所有一阶求导项抵消, 留下乘法算子 $\partial_x b - \partial_y a$ 。所以条件为 $\partial_x b = \partial_y a$ 。第一例两边都是 1, 成立; 第二例两边为 0, 1, 不成立。Leibniz 法则自身不足以保证多个微分方向相容。□

习题 D.8. 在 $\mathbb{C}[[x]]$ 中, 对形式方程 $y' = xy, y(0) = 1$, 求全部形式系数, 并决定是否收敛。

解. 设 $y = \sum a_m x^m$, 有 $a_1 = 0$ 及 $(m+1)a_{m+1} = a_{m-1}$ 对 $m \geq 1$ 成立。于是奇数系数为零, $a_{2j} = 1/(2^j j!)$, 即 $y = \exp(x^2/2)$ 。比值判别表明对每个 x 都收敛; 这里收敛性是另外核验的, 不能只由形式递推推出。□

习题 D.9. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 、 $m \in \mathbb{Z}$ 。比较穿孔复圆盘上的方程 $y' = \lambda y/z$ 与 $v' = (\lambda - m)v/z$ 。求两者的亚纯换基及单值，并说明参数相差整数为何不改变局部系统。

解. 令 $y = z^m v$ ，代入后正得第二方程； z^m 是穿孔圆盘上的可逆亚纯函数。两单值分别为 $e^{2\pi i \lambda}$ 与 $e^{2\pi i (\lambda - m)}$ ，它们相等。联络矩阵的留数随格的选择可相差整数，而拓扑延拓只保留其指数。□

习题 D.10. 判断秩一方程 $y' = (z^{-3} + 2z^{-1})y$ 在 0 的正则性，求一个解析基本解和单值。解释单值能否判定正则性。

解. 积分得 $y = z^2 \exp(-1/(2z^2))$ ，它在穿孔圆盘单值，故单值为 1。但是系数的三阶极点不能由亚纯 g'/g 消去，由定义 D.2.2 前后的秩一判别，它非正则。单值为 1 并不意味着正则或解析可去。□

习题 D.11. 在任意闭扇形 $|\arg x| \leq \theta < \pi/2$ 中证明 $e^{-1/x} = O(|x|^N)$ 对每个整数 $N \geq 0$ 成立。由此说明发散形式解的渐近展开不能唯一确定例 D.2.3 的解析解。

解. 有 $\operatorname{Re}(1/x) \geq \cos \theta/|x|$ ，故 $|e^{-1/x}| \leq e^{-\cos \theta/|x|}$ 。令 $s = 1/|x|$ ，函数 $s^N e^{-\cos \theta s}$ 有界，给出所需估计。因此给某个扇形解加上 $ce^{-1/x}$ ，所有有限阶渐近系数都不改变，却一般得到不同解析函数。□

习题 D.12. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。在 $R = \mathbb{C}[x, x^{-1}]$ 上求线性映射 $T_\lambda(f) = xf' - \lambda f$ 的核与余核，分别讨论 $\lambda \in \mathbb{Z}$ 和 $\lambda \notin \mathbb{Z}$ 。

解. Laurent 单项式是基，且 $T_\lambda(x^m) = (m - \lambda)x^m$ 。若 $\lambda \notin \mathbb{Z}$ ，每个系数均非零，对有限 Laurent 和逐项相除即可，故核和余核均为零。若 $\lambda \in \mathbb{Z}$ ，核由 x^λ 生成，像恰为缺少这一项的 Laurent 多项式，故余核也由 x^λ 的类生成。这是一个同时计算零次解和一次障碍的两项复形。□

附录 E 微分模与微分 Galois 理论

本附录从带导子的域与微分模建立 Picard–Vessiot 扩张，研究无新常数条件、微分 Galois 群及基本对应，并计算指数、对数和根式型扩张。

本章目标

- 能在微分模、线性系统及微分算子商模之间转换，并正确处理对偶的符号。
- 检验基本解矩阵和无新常数条件，验证具体 PV 扩张并求出其全部自同构。
- 通过解的代数关系区分乘法群、加法群、有限群及其子群。
- 使用单位连通分支的可解性准则，计算张量与行列式对群的限制。

需要特征零域扩张、左模、张量积和矩阵代数；存在唯一性的证明还用到 Noether 规范化、整扩张与弱 Nullstellensatz。Galois 对应及重构使用线性代数群、Zariski 闭子群和有理表示。第三卷附录 E.1 的导子语言在此重新给出。

在微分域 $(\mathbb{C}(x), d/dx)$ 上添入 $u' = u$ 的一个非零解，并要求扩张不增加常数。固定 $\mathbb{C}(x)$ 且与求导交换的自同构只能把 u 送到 cu ，其中 $c \in \mathbb{C}^\times$ 。多项式根的 Galois 群由有限置换描述，这里却自然出现一个代数群。线性微分方程的对称性为何有这种形式，保持全部代数关系又如何限制常数矩阵？本附录由具体扩张进入 Picard–Vessiot 理论与微分 Galois 对应。

Singer 的综述收入 2009 年的《Algebraic Theory of Differential Equations》[15]，下文所引定理号及页码依作者公开稿。较详细的证明参见 van der Put 与 Singer 的专著 [13]，本附录对它的编号按作者 2002 年修订公开稿核对。

E.1 微分模与线性方程

线性微分方程的未知量可以写成函数，也可以组织成向量空间上的附加算子。后者允许我们谈论子模、张量积和对偶；换基时变化的是方程矩阵，方程所描述的微分模则不变。本节固定一个导子，不讨论若干偏导算子的相容性。

E.1.1 微分模、Leibniz 条件与线性系统

定义 E.1.1. 设 K 为特征零域， $\delta: K \rightarrow K$ 为加法映射，满足 $\delta(ab) = \delta(a)b + a \cdot \delta(b)$ 。二元组 (K, δ) 称为**微分域** (differential field)，其**常数域** (field of constants) 为 $C_K = \ker \delta$ 。若有限维 K 向量空间 M 上的加法算子 ∇ 满足

$$\nabla(am) = \delta(a)m + a\nabla(m) \quad (a \in K, m \in M),$$

则 (M, ∇) 称为 (K, δ) 上的**微分模** (differential module)。两个微分模之间与这些算子交换的 K 线性映射称为微分模同态。

常数域确实是域：由 $\delta(1) = 0$ 和 $\delta(a^{-1}) = -a^{-2} \cdot \delta(a)$ ，非零常数的逆仍为常数。第三卷命题 E.1.2 证明了整环上的导子向分式域的唯一延拓；这里所需的公式就是

$$\delta(a/b) = \frac{\delta(a)b - a \cdot \delta(b)}{b^2}.$$

∇ 一般只对常数域线性。它是联络方向上的算子，不是复形的微分，定义不要求 $\nabla^2 = 0$ 。

把一组基写成行 $e = (e_1, \dots, e_n)$ ，约定 $\nabla(e_j) = -\sum_i A_{ij}e_i$ 。对坐标列 v 有

$$\nabla(ev) = e(\delta(v) - Av). \quad (\text{E.1})$$

所以 $\nabla(ev) = 0$ 恰好是线性系统 $\delta(v) = Av$ 。这里的负号使水平向量与通常写法的解相符。若新基 $\tilde{e} = eP$ ，其中 $P \in \text{GL}_n(K)$ ，则直接应用 Leibniz 法则得到

$$\tilde{A} = P^{-1}AP - P^{-1} \cdot \delta(P). \quad (\text{E.2})$$

这称为**规范变换** (gauge transformation)；它不是通常的矩阵相似，因为基向量的系数也要被求导。

例如 $K = \mathbb{C}(x)$ 、 $\delta = d/dx$ 上的二阶方程 $y'' + ay' + by = 0$ 等价于

$$\begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}.$$

第一行保证第二坐标是第一坐标的导数，第二行再恢复原方程，因而两个方向都成立。一般系统能否化成单个标量方程，还需要循环向量定理。

E.1.2 微分算子环、张量与水平截面

形式多项式 $\sum_{j=0}^m a_j \partial^j$ 在关系

$$\partial a = a\partial + \delta(a)$$

下组成环 $K[\partial; \delta]$ ，系数一律写在左边。第二卷定理 20.5.2 证明了 Ore 扩张¹乘法的存在与结合性；这里取底环 K 、自同态 $\sigma = \text{id}_K$ ，其 σ 导子条件恰为通常的 Leibniz 法则。微分模对应于在 K 上有限维的左 $K[\partial; \delta]$ 模：令 $\partial m = \nabla(m)$ ，上面的环关系正好成为定义中的 Leibniz 法则。

命题 E.1.2. 设 (M, ∇_M) 、 (N, ∇_N) 为特征零微分域 (K, δ) 上的有限维微分模， $C_K = \ker \delta$ ， $M^* = \text{Hom}_K(M, K)$ 。下列公式分别在 $M \otimes_K N$ 和 M^* 上定义微分模结构：

$$\begin{aligned} \nabla(m \otimes n) &= \nabla_M(m) \otimes n + m \otimes \nabla_N(n), \\ (\nabla\varphi)(m) &= \delta(\varphi(m)) - \varphi(\nabla_M(m)) \quad (\varphi \in M^*). \end{aligned}$$

若 $H(M) = \ker \nabla_M$ ，则 $H(M)$ 是 C_K 向量空间，且 $\dim_{C_K} H(M) \leq \dim_K M$ 。

¹奥尔 (Øystein Ore, 1899-1968)，挪威数学家，研究环论、Galois 理论和图论；其非交换多项式环以他命名。

证明. 将 $(am) \otimes n$ 代入第一式得到的额外项是 $\delta(a)m \otimes n$, 将 $m \otimes (an)$ 代入也得到同一项, 故公式尊重张量平衡关系. 再把 a 提到任一因子外即可验证 Leibniz 法则. 对偶公式中, 将 am 代入时两个 $\delta(a)\varphi(m)$ 项抵消, 故 $\nabla\varphi$ 仍为 K 线性泛函; 对 $a\varphi$ 代入则给出相应 Leibniz 法则.

最后证明任意常数线性无关的水平向量也在 K 上线性无关. 若不然, 取项数最少的非平凡关系, 归一化为 $m_r = \sum_{i < r} a_i m_i$. 其前 $r-1$ 项在 K 上无关; 对关系施加 ∇ , 得到 $\sum_{i < r} \delta(a_i)m_i = 0$, 从而所有 a_i 都是常数, 与原来的常数线性无关矛盾. 维数上界随即成立. $\square$

$H(M)$ 中的元素称为**水平截面** (horizontal section). 在微分扩域 L/K 中, 延拓公式为 $\nabla(\ell \otimes m) = \delta(\ell) \otimes m + \ell \otimes \nabla(m)$. 延拓后可能出现足够多的水平截面. 例如 $\nabla(e) = -e$ 在 $\mathbb{C}(x)e$ 中没有非零水平截面, 而加入 t 满足 $t' = t$ 后, te 就是水平基向量.

E.1.3 Ore 扩张与 D-模的低维比较

在 $K = \mathbb{C}(x)$ 中, $D = K[\partial; d/dx]$ 含有多项式系数的 Weyl 代数 $A_1(\mathbb{C})$. 但 D 模忘记了有限点上的部分信息: 在 A_1 模 A_1/A_1x 中, 非零向量 $\bar{1}$ 被 x 零化, 扩系数到 K 后它变为零, 整个模也变为零. 这样的点支撑模不可能由一个非零的有限维微分域模反映.

还应区别两种“解”. 非零标量算子 $P \in D$ 给出左模 $Q = D/DP$, 它在 K 上有限维: 若 P 的阶为 r , 利用可逆首系数逐次减去 P 的左倍数, 便得到阶小于 r 的唯一余式; 唯一性来自非零乘积的阶相加. 因此 $1, \partial, \dots, \partial^{r-1}$ 的类为基 ($r=0$ 时商模为零). 对任意微分扩域 L/K , 映射

$$\mathrm{Hom}_D(Q, L) \longrightarrow \{y \in L : P(y) = 0\}, \quad f \longmapsto f(\bar{1})$$

是双射: 从解 y 反向定义 $f(R + DP) = R(y)$, 关系 $P(y) = 0$ 保证良定义. 这是反变的解空间. 与之相对, (E.1)用的是指定微分模的水平截面; 前者等于对偶微分模的水平截面. 若 $P = \partial - a$, 则 $\partial\bar{1} = a\bar{1}$, 该商模本身的水平坐标满足 $v' = -av$, 而其同态解满足 $y' = ay$. 这里的符号差别来自对偶, 比较两种解空间时须注意这一点.

E.2 Picard–Vessiot 扩张与对应

一个方程可能没有足够多的有理函数解. 为研究全部线性解, 应当加入基本解矩阵, 同时控制新增的常数. 这里始终固定特征零微分域 (K, δ) , 并要求常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭. 这个假设保证下述存在唯一性具有最简洁的形式.

E.2.1 PV 环、基本解矩阵与无新常数条件

定义 E.2.1. 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, $n \geq 1$, $A \in M_n(K)$. 设交换微分 K 代数 R 是整环. 若存在 $Z \in \mathrm{GL}_n(R)$ 满足 $\delta(Z) = AZ$, 有 $R = K[Z_{ij}, (\det Z)^{-1}]$, 且 R 的微分理想只有 $0, R$, 则称 R 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 **Picard–**

Vessiot 环 (Picard–Vessiot ring), 简称 PV 环。这里微分理想指满足 $\delta(I) \subset I$ 的理想; Z 称为**基本解矩阵** (fundamental solution matrix)。分式域 $L = \text{Frac } R$ 称为相应的**Picard–Vessiot 扩张** (Picard–Vessiot extension)。

微分单性不等于环是域: 稍后会出现 $K[t, t^{-1}]$ 这样的 PV 环。其作用是排除与方程无关的微分商; 而在上述常数假设下, PV 分式域满足 $C_L = C$, 这称为无新常数。反过来, 由基本解矩阵的系数生成、且无新常数的微分域扩张, 也给出这样的 PV 环。下一小节证明这些性质。

若只要求存在解矩阵, 就可以把 Z 乘以任意新增的超越常数, 因而无法确定扩张。无新常数限制的是全部分式域, 不能只检查所选解的几个系数。基本解矩阵也不是逐列任取非零解: 必须要求行列式非零。

E.2.2 微分自同构群与存在唯一性

引理 E.2.2. 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭。若非零交换微分 K 代数 S 作为 K 代数有限生成, 且其微分理想只有 $0, S$, 则 S 是整环, 且 $\text{Frac } S$ 的常数域为 C 。

证明. 若 $a \in S$ 不幂零, 则 $I_a = \{b : a^m b = 0 \text{ 对某个 } m \geq 1\}$ 是一个真微分理想: 对 $a^m b = 0$ 求导再乘 a , 得到 $a^{m+1} b' = 0$ 。故 $I_a = 0$, a 不是零因子。若非零 a 幂零, 取最小 m 使 $a^m = 0$, 则 $ma^{m-1} a' = 0$ 且 $ma^{m-1} \neq 0$, 所以 a' 是零因子, 按刚才的结论必幂零。于是幂零元构成微分理想, 只能为零。这证明 S 为整环。

若 $c \in \text{Frac } S$ 满足 $c' = 0$, 非零理想 $\{b \in S : bc \in S\}$ 对导子稳定, 故为 S , 从而 $c \in S$ 。若 $c \notin C$, 则对每个 $a \in C$, $(c-a)S$ 是非零微分理想, 所以 $c-a$ 都可逆。

这迫使 c 在 K 上代数。确实, 若 c 超越, 在 $K(c)$ 上对 $S \otimes_{K[c]} K(c)$ 作 Noether 规范化并清去有限多个分母, 可取非零 $f \in K[T]$, 使 $S[f(c)^{-1}]$ 整于某个多项式环 $K[c, f(c)^{-1}][u_1, \dots, u_d]$ 。取 $a \in C$ 使 $f(a) \neq 0$, 整扩张的 lying-over 性质便给出一个包含 $c-a$ 的素理想, 与 $c-a$ 可逆矛盾。最后, c 的首一最小多项式求导后, 最高项消失; 最小性说明其全部系数的导数为零。该多项式因此在 $C[T]$ 中, C 代数闭又推出 $c \in C$ 。□

定理 E.2.3 (Picard–Vessiot 存在唯一性). 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, $n \geq 1$, $A \in M_n(K)$ 。则系统 $\delta(Y) = AY$ 存在 PV 环, 任意两个这样的环在微分 K 代数意义下同构; 其分式域的常数域均为 C 。反之, 若 L/K 是微分域扩张, $Z \in \text{GL}_n(L)$ 满足 $\delta(Z) = AZ$, $L = K(Z_{ij})$ 且 $C_L = C$, 则 $K[Z_{ij}, (\det Z)^{-1}]$ 是该系统的 PV 环。

证明. 在 $S_0 = K[X_{ij}, (\det X)^{-1}]$ 上按 $X' = AX$ 延伸导子, 取一个极大真微分理想 I 。商环 $R = S_0/I$ 微分单, 且仍有可逆基本解矩阵。由引理 E.2.2, 它是整环, 分式域没有新常数, 所以是所需 PV 环。

若 R_1, R_2 是两个 PV 环, 在 $R_1 \otimes_K R_2$ 中取极大真微分理想并作商, 得到微分单环 T 。两个 $R_i \rightarrow T$ 都单射, 且由同一引理 T 的常数为 C 。两基本解矩阵在 T 中的比

值导数为零, 故相差一个 $\mathrm{GL}_n(C)$ 矩阵。它们的系数及逆行列式因而是生成同一个子环, 于是两个嵌入的像相等, 给出所需同构。

为证反向陈述, 需要一个常数变量引理: 若微分域 F 的常数为 C , 且变量 U_{ij} 的导数全为零, 则 $F[U_{ij}, (\det U)^{-1}]$ 中的每个微分理想都由它与 $C[U_{ij}, (\det U)^{-1}]$ 的交生成。取常数多项式环的一组 C 基, 把理想元写成有限项 $\sum a_\alpha e_\alpha$ 。按非零系数个数归纳: 先除以一个非零系数, 使其成为一; 求导后这一项消失。若另一个系数 a 不为常数, 对原式除以 a 再求导也减少一项, 两式相减便给出 $-(a'/a^2)$ 乘原式。归纳和 $a' \neq 0$ 说明原式由常数关系生成; 全部系数已为常数时结论直接成立。

现设 $L = K(Z_{ij})$ 、 $Z' = AZ$ 、 $C_L = C$ 。仍取 S_0 的极大真微分理想 I , 在 $L \otimes_K S_0$ 中改变量为 $X = ZU$ 。此时 $U' = 0$, 刚才的引理把 I 的延伸化成由常数多项式理想 J 生成的理想。它是真理想, 因为 $L \otimes_K (S_0/I) \neq 0$ 。由弱 Nullstellensatz, J 有一个可逆常数矩阵零点 c 。代入 $X = Zc$ 得到微分同态 $S_0 \rightarrow L$, 其核包含 I ; 极大微分性使二者相等。其像正好是 $K[Z_{ij}, (\det Z)^{-1}]$, 故此环微分单, 证明反向陈述。完整证明的相同代数构造见 [13, Section 1.3, Lemmas 1.17 and 1.23, Propositions 1.20 and 1.22]。□

同构一般不唯一, 其不唯一性正是下一定义要研究的对象。概念及存在唯一性的概述见 [15, Definition 1.3.2 and the following discussion, pp. 10–11]。

定义 E.2.4. 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, L/K 为 PV 扩张。所有固定 K 且满足 $\sigma\delta = \delta\sigma$ 的 L 的域自同构组成群

$$G = \mathrm{Gal}_\delta(L/K).$$

这个群称为该扩张的**微分 Galois 群** (differential Galois group)。

命题 E.2.5. 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, $n \geq 1$, $A \in M_n(K)$ 。设 L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张, $Z \in \mathrm{GL}_n(L)$ 为基本解矩阵。每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}_\delta(L/K)$ 唯一写成 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$, 其中 $C_\sigma \in \mathrm{GL}_n(C)$; 对应 $\sigma \mapsto C_\sigma$ 是忠实群表示。换用另一基本解矩阵只使此表示共轭。

证明. 利用 $\delta(Z^{-1}) = -Z^{-1} \cdot \delta(Z)Z^{-1}$, 直接求导得到 $\delta(Z^{-1} \cdot \sigma(Z)) = 0$ 。无新常数保证该矩阵在 C 上。因为自同构固定常数, $\sigma\tau(Z) = ZC_\sigma C_\tau$, 所以这是群同态。 Z 的系数生成 L , 故核平凡。若 Z' 是另一基本解矩阵, 同一求导计算给出 $Z' = ZB$ 、 $B \in \mathrm{GL}_n(C)$, 于是新矩阵为 $B^{-1}C_\sigma B$ 。□

推论 E.2.6. 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, $n \geq 1$, $A \in M_n(K)$, L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张, $Z \in \mathrm{GL}_n(L)$ 为基本解矩阵。由 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 给出的微分 Galois 群矩阵像, 是 $\mathrm{GL}_n(C)$ 中的 Zariski 闭子群。

证明. 将 PV 环写成 $R = K[X_{ij}, (\det X)^{-1}]/I$, 其中 I 是极大真微分理想。取有限个理想生成元 $f_1, \dots, f_r$ 。常数矩阵 c 给出自同构, 恰当各个 $f_j(Zc) = 0$: 此条件让 $X \mapsto Zc$ 通过商环; 所得微分同态的像含 $Z = (Zc)c^{-1}$, 所以满射, 微分单性又保证单射。

对每个 j , 把 $f_j(Zc)$ 展开为 R 中有限多个 C 线性无关元素的组合, 其系数是 c_{ij} 与 $(\det c)^{-1}$ 的多项式。它为零恰当这些有限个系数全部为零。这是一组 $\mathrm{GL}_n(C)$ 上的正则方程, 因而给出闭性; 其含义正是保持解矩阵的全部代数关系。亦见 [15, Proposition 1.3.6, p. 12]。□

下一节会直接检查具体关系及全部允许的变换。

E.2.3 中间微分域与 Zariski 闭子群

定理 E.2.7 (微分 Galois 对应). 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, L/K 为 PV 扩张, $G = \text{Gal}_\delta(L/K)$ 为相应的 C 上线性代数群。则

$$H \mapsto L^H, \quad F \mapsto \text{Gal}_\delta(L/F)$$

给出 G 的 Zariski 闭子群与中间微分域 $K \subset F \subset L$ 之间逆序的双射。其中 L^H 是被 H 全部元素固定的子域。对应的 F/K 为 PV 扩张当且仅当 H 正规, 此时 $\text{Gal}_\delta(F/K) \cong G/H$ 。

证明概要. 记 R 为 PV 环。在 $R \otimes_K R$ 中, 两基本解矩阵 $Z_1 = Z \otimes 1$ 、 $Z_2 = 1 \otimes Z$ 的比较矩阵 $U = Z_1^{-1}Z_2$ 满足 $U' = 0$ 。证明定理 E.2.3 时的常数变量引理, 先在 $L \otimes_K R$ 中把全部关系化为常数关系, 再收缩回 $R \otimes_K R$, 得到

$$R \otimes_K R \simeq R \otimes_C C[G], \quad Z_2 = Z_1 U.$$

这些常数关系的零点 c 给出 $Z \mapsto Zc$ 的微分自同构, 反向每个微分自同构也给出一个零点。特征零使这里的张量代数约简, 故常数关系的理想是根理想, 由 Nullstellensatz 它正好定义闭群 G , 商环即 $C[G]$ 。这个同构表示 $\text{Spec } R$ 是一个 G 主齐性空间: 选定一组解后, 另一组解由唯一的群元素联系。

若 $f \in L$ 被全部 G 元素固定, 群常数点的 Zariski 稠密性使上述比较恒等式给出 $f \otimes 1 = 1 \otimes f$ 在 $L \otimes_K L$ 中成立。域扩张的忠实平坦下降于是推出 $f \in K$ 。该最后步骤也可取一组含一的 K 基直接比较张量系数。对任意中间微分域 F , L 仍由同一 Z 在 F 上生成, 且常数不变; 定理 E.2.3 说明它是 F 上的 PV 域。重复这一步得到 $L^{\text{Gal}_\delta(L/F)} = F$, 而固定 F 的群在保持代数关系的方程中增加固定各个 $f \in F$ 的方程, 仍为 Zariski 闭群。

另一个方向使用闭子群的有理不变量分离陪集引理: 线性代数群 G 的闭子群 H 有齐性空间 G/H , 其有理函数能分离一般陪集, 故固定全部右 H 不变有理函数的右平移恰来自 H 。构造这个齐性空间时, 取定义 H 的理想的一个有限维平移稳定生成空间, 将其相应子空间或外幂直线嵌入 Grassmann 簇, H 正是该点的稳定子群。对上述主齐性空间作同样的下降, 就得到 $\text{Gal}_\delta(L/L^H) = H$ 。这里省略齐性空间的代数构造和有理函数的下降验证; 它们是这一方向的主要技术步骤。

当 H 正规时, G/H 是线性代数群, 主齐性空间的商可用它的一组忠实矩阵坐标描述。把这些坐标写成解矩阵的有限张量构造, 导子给出一个 K 系数线性系统, 其解坐标生成 L^H , 所以该域是 PV 域。反之, 若 F/K 是 PV 扩张, G 的每个元素都把它的基本解矩阵变成同一矩阵乘一个可逆常数矩阵, 故保持 F 。限制自同构因此得到 $G \rightarrow \text{Gal}_\delta(F/K)$ 。 F 的任意微分 K 自同构 τ 都能延伸到 L : 将 L/F 的系统沿 τ 搬运, 因其系数在 K 中而得到同一系统, 再用 PV 唯一性取得延伸。因此限制满射, 核为 H , 故 H 正规且商群为所述 Galois 群。这部分省略商主齐性空间的坐标与线性系统的下降。详细的主齐性空间及对应证明见 [13, Section 1.4, Theorem 1.28, Proposition

1.34 and Corollary 1.40], 结果的概述见 [15, Theorem 1.3.9 and Proposition 1.3.20, pp. 13–17]。□

对应中的中间域须对导子稳定, 子群须为 Zariski 闭子群, 两项条件都不可删去。

例如在下一节的乘法群例子中, 子群 $\{2^m : m \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}^\times$ 是真子群, 却 Zariski 稠密: 一元非零多项式不可能有无限多个根。若有理函数 $f(t) \in K(t)$ 被这些伸缩全部固定, 恒等式 $f(ct) = f(t)$ 清去分母后是关于 c 的多项式等式, 既然在无限多个 c 上成立, 就在所有 $c \neq 0$ 上成立。故该真子群与整个乘法群有相同不动域, 不能在删去闭性后仍要求双射。

E.3 算例与可解性

下面都在 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$ 上讨论。先用形式变量规定导子, 再证明没有新常数, 这样不必预先选择复对数的分支, 也不把函数名称当作代数独立性的证明。

E.3.1 指数型、对数型与根式型方程

我们需要两个有理函数事实。非零 $r \in \mathbb{C}(x)$ 在无穷远处满足 $r'/r = O(1/x)$, 故其对数导数不可能是非零常数。另一方面, r' 在有限点的 Laurent 展开没有 $(x-a)^{-1}$ 项: 该项只能来自常数项的导数, 而它为零。因此 $r' = 1/x$ 没有有理解。

例 E.3.1 (指数型扩张). 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, 取在 K 上超越的元 t , 规定 $\delta(t) = t$ 。则 $L = K(t)$ 是 $y' = y$ 的 PV 扩张, 微分 Galois 群为 $\mathbb{G}_m(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^\times$, 作用为 $t \mapsto ct$ 。

证明. 导子先由 Leibniz 法则延拓到 $K[t]$, 再按商法则延拓到 $K(t)$ 。每个 $f \in K(t)$ 在 $t=0$ 有唯一形式 Laurent 展开

$$f = \sum_{j \geq j_0} a_j(x) t^j \in K((t)).$$

这来自分母提出最低次幂后对常数项非零的幂级数求逆, 因而展开映射是单射。若 $f' = 0$, 比较系数得 $a'_j + j a_j = 0$ 。当 $j \neq 0$ 且 $a_j \neq 0$ 时, 这要求 $a'_j/a_j = -j$, 与无穷远处的计算矛盾; 而 $a'_0 = 0$ 给出 $a_0 \in \mathbb{C}$ 。故 $C_L = \mathbb{C}$ 。

一阶基本解 t 生成 L , 所以定理 E.2.3 的反向陈述给出 PV 环 $K[t, t^{-1}]$ 。若 σ 是微分自同构, 则 $(\sigma(t)/t)' = 0$, 故 $\sigma(t) = ct$ 。反过来, t 的超越性保证每个非零常数伸缩都给出域自同构, 且与导子交换。□

例 E.3.2 (对数型扩张). 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, 取在 K 上超越的元 u , 规定 $\delta(u) = 1/x$ 。则 $L = K(u)$ 是齐次系统

$$Y' = \begin{pmatrix} 0 & 1/x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Y$$

的 PV 扩张, 群为 $\mathbb{G}_a(\mathbb{C}) = (\mathbb{C}, +)$, 作用为 $u \mapsto u + c$ 。

证明. 把非零 $f \in K(u)$ 在 $u = \infty$ 展开为 $f = \sum_{j \leq d} a_j(x)u^j$, 其中 $a_d \neq 0$. 若 $f' = 0$, 最高次项给出 $a'_d = 0$, 故 $a_d \in \mathbb{C}^\times$; 再比较 u^{d-1} 项得到

$$a'_{d-1} = -d a_d / x.$$

有理函数导数在 0 的留数为零, 故 $d = 0$. 此时 a_0 为常数; 若 $f - a_0 \neq 0$, 它仍是常数元, 却有严格负的最高次数, 重复论证又要求该次数为零, 矛盾. 因此 $C_L = \mathbb{C}$.

基本解矩阵可以取

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它的行列式为 1, 系数生成 L , 所以由定理 E.2.3 得到 PV 环 $K[u]$. 自同构满足 $(\sigma(u) - u)' = 0$, 必为常数平移; u 的超越性保证每个这样的平移均可实行. 在基本解矩阵上, 群元素为 $\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $\square$

原式 $u' = 1/x$ 是非齐次标量方程. 增加满足 $v' = 0$ 的坐标, 并写 $u' = v/x$, 才得到 PV 定义要求的齐次系统; 取 $v = 1$ 恢复原式.

例 E.3.3 (根式型扩张). 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, $n \geq 2$, 令 $t^n = x$, 并将导子延拓到 $L = K(t) = \mathbb{C}(t)$. 则 L/K 是 $y' = y/(nx)$ 的 PV 扩张, 群为 $\mu_n(\mathbb{C})$, 作用为 $t \mapsto \zeta t$, $\zeta^n = 1$.

证明. $T^n - x$ 对素元 $x \in \mathbb{C}[x]$ 满足 Eisenstein 条件², 所以在 $K[T]$ 中不可约, $[L : K] = n$. 求导关系得

$$t' = \frac{1}{nt^{n-1}} = \frac{t}{nx}.$$

在 $\mathbb{C}(t)$ 中, 导子为 $(nt^{n-1})^{-1}d/dt$, 其核为 $\mathbb{C}$, 因为特征零有理函数的通常导数为零当且仅当函数为常数. 于是 t 是生成无新常数扩张的基本解, 可用定理 E.2.3.

自同构必须保持 $t^n = x$, 故 $\sigma(t) = \zeta t$. 反之, 每个 n 次单位根均给出固定 x 的自同构, 导子公式表明它与求导交换. 因此群恰为所述有限循环群. $\square$

E.3.2 解的代数关系与 Galois 群

基本解矩阵的常数变换必须保持其代数关系. 在例 E.3.3 中, $t^n = x$ 把伸缩限制为 $c^n = 1$; 在例 E.3.1 中, 没有这种关系, 全部非零伸缩便都存在.

对系统 $Y' = \text{diag}(1, 2)Y$, 沿用 $t' = t$, 可取

$$Z = \text{diag}(t, t^2).$$

第二个非零对角元是第一个的平方, 所以群不是两个独立乘法群, 而是

$$\{\text{diag}(c, c^2) : c \in \mathbb{C}^\times\}.$$

这里也能核验全部关系: 从 $K[T_1^{\pm 1}, T_2^{\pm 1}]$ 代入 (t, t^2) 的核恰为 $(T_2 - T_1^2)$, 因为商环就是 $K[T_1, T_1^{-1}]$, 而 t 超越.

²艾森斯坦 (Ferdinand Gotthold Max Eisenstein, 1823-1852), 德国数学家, 研究数论、代数形式和高次互反律。

命题 E.3.4. 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, t 在 K 上超越且 $\delta(t) = t$, $L = K(t)$ 。其微分 Galois 群 $\mathbb{C}^\times$ 以 $t \mapsto ct$ 作用。对每个 $n \geq 1$, 子群 $\mu_n = \{c \in \mathbb{C}^\times : c^n = 1\}$ 的不动域为 $K(t^n)$, 整个 $\mathbb{C}^\times$ 的不动域为 K 。

证明. $1, t, \dots, t^{n-1}$ 是 $K(t^n)$ 上的基: 以超越元 $s = t^n$ 对 $T^n - s$ 用 Eisenstein 判别即可。取本原 n 次单位根 ζ , 若 $\sum_{j=0}^{n-1} b_j t^j$ 被 $t \mapsto \zeta t$ 固定, 比较基系数便得 $b_j = 0$ 对 $j > 0$ 成立。

若 f 被全部伸缩固定, 在 $t = 0$ 的 Laurent 展开中便有 $a_j c^j = a_j$ 对所有 $c \neq 0$ 成立。对 $j \neq 0$ 可取 $c^j \neq 1$, 故只留下常数项, $f \in K$ 。□

由于 $(t^n)' = nt^{n-1}$, $K(t^n)$ 对导子稳定, 确实是定理 E.2.7 所要求的中间微分域。

E.3.3 Liouvillian 可解性与 Kovacic 算法

定义 E.3.5. 设 (K, δ) 为特征零微分域。给定有限微分域塔

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_r, \quad K_{i+1} = K_i(a_i) \quad (0 \leq i < r),$$

若每步满足下列条件之一: a_i 在 K_i 上代数、 $\delta(a_i) \in K_i$ 、或 $a_i \neq 0$ 且 $\delta(a_i)/a_i \in K_i$, 则称为 **Liouvillian 塔** (Liouvillian tower)。³ 在常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭的情形, 对 $n \geq 1$, $A \in M_n(K)$, 设 L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张。若存在 L 到这样的塔顶的微分 K 嵌入, 则称该系统 **Liouvillian 可解** (Liouvillian solvable)。

后两类步骤分别对应积分和积分的指数。第一类允许一般代数扩张, 并不要求由根式组成; 这解释了下面为何只出现单位连通分支。

定理 E.3.6 (Liouvillian 可解性准则). 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, $n \geq 1$, $A \in M_n(K)$, L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张, $G = \text{Gal}_\delta(L/K)$ 。该系统 Liouvillian 可解, 当且仅当 C 上线性代数群 G 的单位连通分支 G° 可解。

证明概要. 先设 G° 可解。由定理 E.2.7, $F = L^{G^\circ}$ 是 K 的有限代数扩张。可解连通线性代数群在代数闭特征零域上的有限维表示有不变完全旗: 对其可解 Lie 代数使用 Lie 三角化, 再注意完全旗的稳定子群包含整个连通群。正文定理 12.2.3 的证明同样适用于这里的代数闭特征零常数域。

在原 PV 域 L 中选取适配这条旗的基本解列。前 j 列所张成的 L -子空间在群作用下稳定, 将其作行最简化后, 唯一的规范矩阵也在群作用下不变, 系数便落在 $L^{G^\circ} = F$ 。这些子空间因此下降为 F 上的微分子模旗。选取适配旗的 F 基, 令换基矩阵为 $B \in \text{GL}_n(F)$, 就使

$$T = B^{-1}Z, \quad \tilde{A} = B^{-1}AB - B^{-1} \cdot \delta(B), \quad \delta(T) = \tilde{A}T$$

中的 T 与 $\tilde{A}$ 都为上三角矩阵。

³刘维尔 (Joseph Liouville, 1809-1882), 法国数学家, 研究分析与数论, 构造了早期的超越数例子, 并研究微分方程的积分表达。

现在完全在 L 内构造塔。先加入各个非零对角元 $t_i = T_{ii}$, 它们满足 $\delta(t_i)/t_i = \tilde{A}_{ii} \in F$, 是定义中允许的指数步骤。随后逐列处理 T_{ij} , 在第 j 列中按 $i = j-1, j-2, \dots, 1$ 的次序进行。变常数公式给出

$$\delta(T_{ij}/t_i) = \frac{1}{t_i} \sum_{k=i+1}^j \tilde{A}_{ik} T_{kj}.$$

右侧只涉及此前已经加入的元素, 所以加入 T_{ij}/t_i 是一个原函数步骤。这样取得 T 的全部条目, 而 $L = F(T_{ij})$, 塔顶就是原来的 L 。每层均为 L 的微分子域, 其常数自然仍为 C ; 这避免了在另一扩张中形式加入指数和原函数后, 尚须另证与原 PV 域对应的问题。

反向的关键是从一个 Liouvillian 塔中下降出微分模的不变直线。其具体方法是逐步取最后一个超越生成元的 Laurent 展开的最高项。若 $t' = a$ 且向量解以 $t^r v$ 为首项, 首项比较给出较低域中的向量解; 若 $t'/t = a$, 首项比较给出 $v' = Av - rav$, 所以 v 所生成的直线对微分模结构稳定。若已知的是一个稳定直线而非水平向量, 同样比较 $v' - Av = bv$ 的最高项; 右端 b 的次数不能超过零, 故仍得到较低域中的稳定直线。代数步骤则在代数闭包中作 Puiseux 展开, 允许 r 为有理数, 首项系数落在较低域的某个有限代数扩张中。

对塔长度归纳, 这种首项论证给出 K 的某个有限代数扩张上的稳定直线; 再对商微分模重复, 便得到一个有限代数扩张 K' 上的完全旗。原系统的全部解在塔顶存在, 保证每一步的商仍有足够的 Liouvillian 解。代数基域扩张只把微分 Galois 群换成有限指数闭子群, 单位连通分支不变; 它保持这条完全旗, 所以是上三角群的子群, 因而可解。

以上省略的实质步骤是 Puiseux 展开对导子的延拓、首项下降引理在任意代数步骤后的归纳, 以及基域扩张与群单位分支的比较; 这里不能把整个塔直接当作一个 PV 扩张。塔长度归纳及稳定直线的详细论证见 [13, Section 1.5, Theorem 1.43 and Proposition 1.45], 准则的陈述与定义见 [15, Definition 1.5.6 and Theorem 1.5.7, pp. 43–44]。□

乘法群、加法群均可解, 有限群的单位连通分支平凡, 所以三个算例都符合准则。即使有限微分 Galois 群本身不可解, 相应代数解仍属于允许的代数步骤; 把条件误写成“ G 可解”会排除这些情形。另外, “存在一个非零 Liouvillian 解”弱于整个系统可解, 本定理说的是足够组成基本解矩阵的全部解。

对二阶方程 $y'' = r(x)y$, $r \in \mathbb{C}(x)$, 非零解的对数导数 $v = y'/y$ 满足 Riccati 方程

$$v' + v^2 = r.$$

若找到有理 v , 则 $y = \exp \int v dx$ 是 Liouvillian 解, 另一解可通过降阶得到。Kovacic 算法还处理适当代数扩域中的候选对数导数, 以判定此类二阶方程的 Liouvillian 可解性; 实行算法要求常数域中的必要代数运算可以有效进行。其有限分类与次数界见 [15, Section 1.5, pp. 49–51]。这里没有给出完整算法, 尤其不能因找不到有理 v 就断言不可解。

E.4 张量结构与解空间上的表示

微分 Galois 群在原方程解空间上的作用，可以延伸到张量积、交替积和商空间。方程已有的配对和张量关系也会约束群。以下先讨论张量不变量，再比较改变基域对微分 Galois 群的影响。

E.4.1 张量不变量与 Tannaka 重构

设 K 的特征为零，常数域 C 代数闭， M 为有限维微分模， L/K 为其系统的 PV 域。记 $\langle M \rangle_{\otimes}$ 为由 M 和平凡微分模 K ，经有限直和、张量积、对偶、子模及商模得到的微分模所成的满子范畴。对其中的对象 N ，取

$$\omega(N) = \ker(\nabla : L \otimes_K N \longrightarrow L \otimes_K N).$$

它是 C 向量空间。微分自同构 σ 只作用于 L 因子，因与导子交换而保持水平截面；于是 $\omega(N)$ 得到 $G = \text{Gal}_{\delta}(L/K)$ 的表示。张量积上的作用和通常的表示张量积相符。

定理 E.4.1 (PV 理论的张量表述). 设 (K, δ) 为特征零微分域，其常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭； (M, ∇_M) 为 K 上的有限维微分模， L/K 为其线性系统的 PV 扩张， $G = \text{Gal}_{\delta}(L/K)$ 。令 $\langle M \rangle_{\otimes}$ 为有限维微分 K 模范畴中，由 M 及平凡微分模 (K, δ) 经有限直和、张量积、对偶及子商生成的满子范畴。对其中的对象 (N, ∇_N) ，在 $L \otimes_K N$ 上取延拓联络 $\nabla(\ell \otimes v) = \delta(\ell) \otimes v + \ell \otimes \nabla_N(v)$ ，并令 $\omega(N) = \ker \nabla$ 。则 ω 将 $\langle M \rangle_{\otimes}$ 等价地映到 C 上线性代数群 G 的有限维有理表示范畴。它保持张量积，并且是忠实、正合的；每个 N 都满足 $\dim_C \omega(N) = \dim_K N$ 。对任意交换 C 代数 S ，有自然同构 $G(S) \simeq \text{Aut}^{\otimes}(S \otimes_C \omega)$ ，因而 G 可由这一范畴连同函子 ω 恢复。

证明. $L \otimes_K M$ 由基本解矩阵给出水平基，因而是平凡微分模。直和、张量与对偶显然保持这一性质，子商也保持：在水平基下，设 $W \subset L^r$ 是对逐系数求导稳定的子空间，取它唯一的行最简形基。每个基向量求导后主元位置全为零；它又属于 W ，只能为零，所以所有非主元系数均在 C 中。于是 W 有水平基，商也有水平基。由此，对所有 $N \in \langle M \rangle_{\otimes}$ ，自然映射

$$\eta_N : L \otimes_C \omega(N) \longrightarrow L \otimes_K N, \quad \ell \otimes s \mapsto \ell s$$

是同构，给出维数等式及张量相容性。微分模同态在水平基下是常数矩阵；对短正合列取这些矩阵，秩在 C 与 L 上相同，所以取水平截面保持满射，也保持正合性。张量 L 是忠实的，故 ω 忠实。

若 $T : \omega(N_1) \rightarrow \omega(N_2)$ 与 G 作用交换，把它用上述同构延伸为 L 线性映射。这个映射在原来的 K 基下的矩阵系数被 G 固定，由定理 E.2.7 属于 K ，故下降成微分模同态 $f : N_1 \rightarrow N_2$ 。其标量扩张由下面的交换图唯一确定：

$$\begin{array}{ccc} L \otimes_C \omega(N_1) & \xrightarrow{1 \otimes T} & L \otimes_C \omega(N_2) \\ \sim \downarrow \eta_{N_1} & & \sim \downarrow \eta_{N_2} \\ L \otimes_K N_1 & \xrightarrow{1 \otimes f} & L \otimes_K N_2 \end{array}$$

反向取水平截面即可，证明满忠实。

还要说明全部有理表示都能得到。记 $V = \omega(M)$ ，它是 G 的忠实表示。 $C[G]$ 由 V 的矩阵坐标及逆行列式生成，因而每个有限维、平移稳定的坐标函数空间都是有限个 V, V^* 的张量幂的子商。任意有限维有理表示 U 用各坐标泛函的矩阵系数嵌入有限份 $C[G]$ ：在群单位元处求值便说明这个嵌入单射，有限个系数又落在一个有限维坐标函数空间中。因此 U 是这些张量幂直和的子商。

将相应的 G 不变子空间在 L 上张成，得到张量微分模基变换中的子空间。它对导子稳定，也对群的半线性作用稳定。在原 K 基下作行最简化，唯一性使每个矩阵系数被 G 固定，故均属于 K 。这个子空间于是下降为微分子模，商同样下降。这样每个 U 都由某个 N 得到，证明范畴等价。

最后，张量自同构由它在 V 上的矩阵 g 决定，并须保持各个张量构造中的子空间与关系。取定义闭群 $G \subset \mathrm{GL}(V)$ 的理想 I ，在矩阵坐标和逆行列式的多项式环中，选择一个有限维、 $\mathrm{GL}(V)$ 平移稳定的空间 E ，使 $I \cap E$ 生成 I 。这样的 E 可按有限个生成元的次数及逆行列式的最高幂选取，它是有限张量构造的子商。 $I \cap E$ 是 G 不变子空间，所以张量自同构必须保持它，进而保持 I 。右平移保持 G 的定义理想，且单位元属于 G ，于是 $g \in G$ 。反过来每个 $g \in G$ 都给出张量自同构。对任意交换 C 代数延伸同样的有限关系，便得到群函子的恢复，即 **Tannaka 重构** (Tannaka reconstruction)。

⁴有关 PV 范畴的表述见 [15, Theorem 1.5.2, pp. 40–41] 及 [13, Section 2.4]。□

正合性依赖于这些微分模被同一 PV 域平凡化；在一般微分域中，取水平截面只有左正合性，不能仅由“取一个算子的核”推出上述结论。

对具体张量，群的限制常可直接核验。例如系统 $Y' = AY$ 上若存在可逆矩阵 $B \in M_n(K)$ ，满足

$$B' + A^T B + BA = 0, \quad (\text{E.3})$$

则对基本解矩阵 Z 求导给出 $(Z^T B Z)' = 0$ 。故 $Q = Z^T B Z \in M_n(C)$ 可逆。任意 $\sigma(Z) = Z C_\sigma$ 都满足

$$C_\sigma^T Q C_\sigma = Q,$$

因为 σ 固定 B 和 Q 。当 B 对称或交替时，这分别把群限制在相应正交群或辛群内。这只证明包含关系；若还有别的张量关系，实际群可能更小。定理 E.4.1 说明为什么必须同时考虑所有这些构造。

E.4.2 形式局部分类与解析方法

一个方程的群依赖于所选基域。例 E.3.1 中 $y' = y$ 在 $\mathbb{C}(x)$ 上的群是 $\mathbb{G}_m$ ，但把基域扩大为 $\mathbb{C}((x))$ 后，

$$t_0 = \sum_{m \geq 0} \frac{x^m}{m!}$$

⁴淡中忠郎（假名：たんなただお，罗马音：Tadao Tannaka，1908-1986），日本数学家，研究表示论与对偶理论；以其名字命名的重构思想从张量表示恢复群。

已是该域中的可逆基本解。形式求导给出 $t'_0 = t_0$ ，而 Laurent 级数的导数为零恰好意味着它是常数。因此这个局部形式基域上的 PV 扩张就是基域自身，群平凡。全局的代数关系和一个普通点附近的形式关系不能混为一谈。

对 $u' = 1/x$ 则不同： $\mathbb{C}((x))$ 中任何元素的导数仍没有 x^{-1} 项，故不能在基域内找到 u 。取形式超越元 u 并规定 $u' = 1/x$ ，例 E.3.2 中的证明仍成立：其中只用了基域常数为 $\mathbb{C}$ 及“导数留数为零”，这两个性质对 Laurent 级数同样成立。因此局部形式群仍是加法群。若改在穿孔圆盘的通用覆盖上解释解析解，一次绕原点的延拓又把 $\log x$ 变成 $\log x + 2\pi i$ ，给出群中的一个具体元素。

这两例区分了有理系数、形式局部和解析延拓三种问题。非正则奇点还需要扇形渐近解和 Stokes 数据，具体说明见附录 D。只有形式级数而没有解析收敛或渐近条件时，尚不能谈论这种延拓。

E.4.3 行列式方程与群的限制

命题 E.4.2 (行列式方程). 设 (K, δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭， $n \geq 1$ ， $A \in M_n(K)$ ， L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张， $Z \in \mathrm{GL}_n(L)$ 为基本解矩阵，撇号表示 δ 。则

$$(\det Z)' = \mathrm{tr}(A) \det Z.$$

若 $\mathrm{tr}(A) = f'/f$ 对某个 $f \in K^\times$ 成立，则 $\det Z = cf$ 、 $c \in C^\times$ ，且对每个 $\sigma \in G = \mathrm{Gal}_\delta(L/K)$ ，由 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 定义的群矩阵 C_σ 都有行列式 1。

证明。按行列式的多线性逐列求导，得到 $(\det Z)' = \mathrm{tr}(Z^{-1}Z') \det Z$ 。代入 $Z' = AZ$ 并利用矩阵迹在共轭下不变，便得第一式。在附加假设下，商 $\det Z/f$ 的导数为零；无新常数给出该商为 $c \in C^\times$ 。自同构固定 cf ，故对 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 取行列式得到 $\det C_\sigma = 1$ 。□

特别地， $y'' = r(x)y$ 的一阶系统矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ r & 0 \end{pmatrix}$ ，迹为零，所以微分 Galois 群包含在 $\mathrm{SL}_2(C)$ 中。这给出上一节二阶算法所研究的群范围。这个包含关系可能为真包含：例如 $y'' = y$ 的基本解可以在指数型 PV 域中取为 t, t^{-1} ，其群仅为对角子群。

配对和行列式是可实际计算的张量不变量；它们给出群的上界，而找全解之间的代数关系才能确定群。多参数理论还要加入与主导子交换的其他导子，所得群一般由微分多项式方程刻画，已不属于本附录的普通线性代数群情形。相关概念放在第三卷附录 E.4；有效群计算和高阶算法可继续阅读 [15, Sections 1.3–1.5]。

本章小结

微分模中的 Leibniz 法则使换基公式多出导数项，也决定了张量和对偶的作用。PV 理论在代数闭常数域上选取由基本解矩阵生成且无新常数的扩张，把微分域的中间结构与代数群的闭子群相联系。具体群必须由全部代数关系核验，不能仅凭解的函数名称判断。

Liouvillian 塔允许代数扩张、积分与积分的指数，所以判别条件落在群的单位连通分支上。张量重构从表示论解释这种群如何编码微分模；实际计算时，配对和

行列式常先给出可核验的限制。全局有理函数域、形式局部域和解析函数域的选择会改变问题，使用这些结果前应始终写清基域和常数域。

习题

习题 E.1. 设 (K, δ) 是微分域。由 Leibniz 法则推出 $\delta(1) = 0$ 、逆元公式及商法则。再说明特征 $p > 0$ 时 $(\mathbb{F}_p(x), d/dx)$ 的常数域不是 $\mathbb{F}_p$ 。

解. 对 $1 \cdot 1$ 求导得 $\delta(1) = 2\delta(1)$, 故 $\delta(1) = 0$ 。对 $aa^{-1} = 1$ 求导得 $\delta(a^{-1}) = -a^{-2} \cdot \delta(a)$; 再对 ab^{-1} 求导即可得 $\delta(a/b) = (\delta(a)b - a \cdot \delta(b))/b^2$ 。在正特征中, $(x^p)' = 0$, 所以常数域含 $\mathbb{F}_p(x^p)$, 严格大于 $\mathbb{F}_p$ 。本附录的特征零假设排除了这一现象。 $\square$

习题 E.2. 在微分域 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$ 上考虑 $y' = y/x$ 。以换基矩阵 $P = x$ 计算新系统, 并求原微分模的水平基。

解. 由 (E.2), $\tilde{A} = P^{-1}AP - P^{-1}P' = 1/x - 1/x = 0$ 。若原基 e 满足 $\nabla(e) = -e/x$, 则 $\nabla(xe) = e + x(-e/x) = 0$, 所以 xe 是水平基。这个方程已经在基域中平凡化, PV 群为平凡群。 $\square$

习题 E.3. 设 (K, δ) 为特征零微分域, (M, ∇) 为 n 维微分 K 模, 在基 $e = (e_1, \dots, e_n)$ 下满足 $\nabla(e) = -eA$, 其中 $A \in M_n(K)$ 。证明其对偶微分模的水平坐标方程为 $w' = -A^T w$, 并验证在任意微分扩域中, 解 v, w 的配对 $w^T v$ 为常数; 撇号表示延拓后的导子。

解. 对偶基 e_i^* 满足 $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$ 。对该恒等式求导, 并代入对偶联络定义, 得到对偶联络矩阵为 $+A^T$, 而水平系统矩阵是联络矩阵的负值, 所以 $w' = -A^T w$ 。于是

$$(w^T v)' = -w^T A v + w^T A v = 0.$$

若漏掉对偶中的负号, 两项就不会抵消。 $\square$

习题 E.4. 在微分域 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$ 上令 $M = Ke_1 \oplus Ke_2$, $\nabla e_1 = 0$, $\nabla e_2 = -e_1/x$ 。证明 $0 \rightarrow Ke_1 \rightarrow M \rightarrow K \rightarrow 0$ 是平凡微分模的非分裂扩张; 求 $H(M)$, 并解释取水平截面为何不右正合。

解. 商中 $\bar{e}_2$ 水平, 故两端均平凡。分裂必须把 1 送到某个 $e_2 + fe_1$, 其导数为 $(f' - 1/x)e_1$, 但有理函数导数在 0 的留数为零, 不可能等于 $1/x$ 。所以扩张不分裂。若 $ae_1 + be_2$ 水平, 便有 $b' = 0$, $a' = b/x$ 。前式给出 $b \in \mathbb{C}$, 后式迫使 $b = 0$, $a \in \mathbb{C}$, 故 $H(M) = \mathbb{C}e_1$ 。它在商的水平空间 $\mathbb{C}$ 中的像为零, 故不是满射。 $\square$

习题 E.5. 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, 微分模 $M = Ke_1 \oplus Ke_2$ 满足 $\nabla e_1 = 0$, $\nabla e_2 = -e_1/x$ 。取 K 上超越元 u , 规定 $\delta(u) = 1/x$, 扩域到 $L = K(u)$ 。求 $L \otimes_K M$ 的一组水平基及其微分 Galois 群作用矩阵。

解. e_1 和 $ue_1 + e_2$ 水平, 因为第二个向量的导数为 $u'e_1 - e_1/x = 0$ 。二者的坐标矩阵行列式为 1, 故构成基。自同构 $u \mapsto u + c$ 固定第一向量, 把第二向量送到自身加 ce_1 , 所以作用矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。扩域后的平凡化不意味着基域上的扩张已分裂。 $\square$

习题 E.6. 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, 取 K 上超越元 t , 规定 $\delta(t) = t$, 令 $L = K(t)$. 在该 PV 扩张中为 $y'' = y$ 写出基本解矩阵, 求其行列式及全部微分 Galois 群矩阵.

解. 解 t, t^{-1} 的导数分别为 $t, -t^{-1}$, 所以可取

$$Z = \begin{pmatrix} t & t^{-1} \\ t & -t^{-1} \end{pmatrix}, \quad \det Z = -2.$$

矩阵系数生成 $K(t)$, 无新常数由例 E.3.1 给出. 自同构 $t \mapsto ct$ 对应 $C_\sigma = \text{diag}(c, c^{-1})$. 这些矩阵行列式为 1, 但仅组成 SL_2 的真子群. $\square$

习题 E.7. 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, $n \geq 2$, $t^n = x$, 将导子延拓到 $L = K(t)$. 取正整数 d 并令 $g = \gcd(n, d)$. 求 $K(t^d)$ 在根式 PV 扩张 L/K 中的对应子群及其对基域的次数.

解. 固定 t^d 的自同构须满足 $\zeta^n = \zeta^d = 1$, 故子群为 μ_g , 阶为 g . 取整数 a, b 使 $ad + bn = g$, 则 $t^g = (t^d)^a x^b$, 而 t^d 又是 t^g 的幂, 所以中间域为 $K(t^g)$. 其生成元满足 $(t^g)^{n/g} = x$, Eisenstein 判别给出次数 n/g , 与群的指数一致. $\square$

习题 E.8. 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, u 在 K 上超越且 $\delta(u) = 1/x$, 扩张 $K(u)/K$ 无新常数. 若 $v \in K(u)$ 满足 $v' = 2/x$, 证明 $v = 2u + c$, 其中 $c \in \mathbb{C}$. 用此结论求对角块由两个这样的加法型系统组成时的实际群.

解. $(v - 2u)' = 0$, 而常数域为 $\mathbb{C}$, 故 $v = 2u + c$. 选择基本解时可令 $v = 2u$. 两个块上的平移参数必须分别为 $a, 2a$, 不能独立选择; 群为一个加法群, 在两块中分别以 $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 作用. $\square$

习题 E.9. 取相互独立的超越元 t, c , 在 $L = \mathbb{C}(x)(t, c)$ 上规定 $t' = t, c' = 0$. 说明为什么这个含有基本解 t 的域不是 $y' = y$ 的 PV 扩张.

解. 常数域至少含 $\mathbb{C}(c)$, 已超过基域常数 $\mathbb{C}$, 违反无新常数条件. 另外基本解 t 本身只生成 $\mathbb{C}(x)(t)$, 无法生成另一个独立元 c . 存在某个基本解矩阵不是定义的全部内容. $\square$

习题 E.10. 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), d/dx)$, u 在 K 上超越且 $\delta(u) = 1/x$. 在对数型 PV 扩张 $K(u)/K$ 中, 证明整数平移子群 $\{u \mapsto u + m : m \in \mathbb{Z}\}$ 的不动域也为 K . 这是否违反 Galois 对应?

解. 若 $f(u+1) = f(u)$, 在 $u = \infty$ 展开. 若非零最高次数为 $d \neq 0$, 则 $f(u+1) - f(u)$ 的最高非零项为 $da_d u^{d-1}$, 矛盾. 若最高次数为零, 先减去常数项; 只要还有非零项, 其最高次数严格负, 再用同一论证便矛盾. 因此 $f \in K$. 整数子群是加法群的 Zariski 稠密真子群, 不是闭子群, 故不在定理 E.2.7 要求双射的对象中. $\square$

习题 E.11. 对 $y'' = (x^2 + 1)y$, 找一个 Liouvillian 解, 并用它写出第二个解的积分表达式. 证明两解线性无关.

解. Riccati 方程 $v' + v^2 = x^2 + 1$ 有解 $v = x$, 故可取 $y_1 = e^{x^2/2}$. 令

$$y_2 = y_1 \int y_1^{-2} dx = e^{x^2/2} \int e^{-x^2} dx.$$

写 $y_2 = y_1 w$, 代入原方程后剩下 $y_1 w'' + 2y_1' w' = 0$, 由 $w' = y_1^{-2}$ 可核验。Wronskian $y_1 y_2' - y_1' y_2 = y_1^2 w' = 1$, 故两解无关。所用操作属于 Liouvillian 塔, 尽管积分未必是初等函数。□

习题 E.12. 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, 某线性系统的 PV 扩张 L/K 的微分 Galois 群为有限不可解群。按本附录定义, 该系统是否 Liouvillian 可解? 它的解是否因此必能用根式表达?

解. 有限代数群的单位连通分支平凡, 故由定理 E.3.6, 系统 Liouvillian 可解。定义允许任意代数步骤, 而不是仅允许根式步骤, 所以不能由此推出根式表达; 有限不可解 Galois 群恰好说明这两种可解性条件不同。□

习题 E.13. 在常数域为代数闭域 C 的特征零微分域 K 上, 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad a \in K.$$

证明相应 PV 群保持某个非退化对称型且行列式为 1。能否仅由此断定群等于完整的特殊正交群?

解. 取 $B = I$, 有 $B' = 0$, $A^T + A = 0$, 所以 (E.3) 成立。于是 $Q = Z^T Z$ 为非退化常数对称型, 群保持 Q 。同时 $\operatorname{tr} A = 0$, 命题 E.4.2 给出行列式为 1。只能得到包含关系: 若 $a = 0$, 系统已在基域中有常数基本解, 群平凡, 而二维非退化型的特殊正交群并不平凡。□

习题 E.14. 设 (K, δ) 为特征零微分域, 常数域 $C = \ker \delta$ 代数闭, $A \in M_n(K)$, L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张, 基本解矩阵为 $Z \in \operatorname{GL}_n(L)$, 并以 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 定义群矩阵。证明 $\det C_\sigma = 1$ 对所有微分自同构成立, 当且仅当 $\det Z \in K^\times$ 。由此得到迹的一个判别。

解. 若 $\det Z \in K^\times$, 对 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 取行列式立即给出 $\det C_\sigma = 1$ 。反之, 该条件说明 $\det Z$ 被全群固定; 定理 E.2.7 给出 $L^G = K$, 故 $\det Z \in K^\times$ 。行列式方程于是说明群包含在 $\operatorname{SL}_n(C)$ 中, 当且仅当 $\operatorname{tr} A = f'/f$ 对某个 $f \in K^\times$ 成立; 充分性是命题 E.4.2, 必要性取 $f = \det Z$ 。□

习题 E.15. 比较 $y' = y$ 在 $\mathbb{C}(x)$ 与 $\mathbb{C}((x))$ 上的 PV 群, 并解释为什么这不与基本解矩阵换基只引起共轭相矛盾。

解. 前者由例 E.3.1 得乘法群; 后者已经含有可逆基本解 $\sum_{m \geq 0} x^m/m!$, 且 Laurent 级数域常数为 $\mathbb{C}$, 故 PV 扩张平凡, 群也平凡。命题 E.2.5 比较的是同一个基域和同一个 PV 扩张中的基本解矩阵, 此处则扩大了基域, 假设不同。□

习题 E.16* 设 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$, 取在 $K = \mathbb{C}(x)$ 上代数独立的 s, t , 规定 $s' = s, t' = \lambda t$ 。证明 $K(s, t)$ 无新常数, 并求 $Y' = \operatorname{diag}(1, \lambda)Y$ 的 PV 群。

解. 将有理函数域嵌入迭代 Laurent 级数域 $K((s))((t))$ 。展开中的系数 $a_{ij}(x)$ 若对应常数元, 便满足

$$a'_{ij} + (i + \lambda j)a_{ij} = 0.$$

有理函数的非零常数对数导数不存在，所以非零系数只能出现在 $i + \lambda j = 0$ 。由于 $i, j \in \mathbb{Z}$ 且 $\lambda \notin \mathbb{Q}$ ，这迫使 $i = j = 0$ ，相应系数属于 $\mathbb{C}$ 。故无新常数。基本解矩阵 $\text{diag}(s, t)$ 生成该域，自同构必须分别作常数伸缩。代数独立性保证任意 $(s, t) \mapsto (cs, dt)$ 、 $c, d \neq 0$ 都给出微分自同构，群因此为 $\mathbb{G}_m^2$ 。□

后记

本卷从有限群的线性作用出发，最后走到不变量环、代数群与微分方程。回看这些内容，表示论让我们能够换一种方式认识代数对象：同一个群可以通过特征标、张量积或坐标函数来研究；同一个代数可以通过简单模、投射模或箭图中的线性映射来研究。每换一种表示，原先隐蔽的关系便可能成为一条可以计算的公式。

这种转变也有代价。特征标看得见合成因子，却不总能看见扩张；维数向量记录各顶点的大小，却不能独自决定箭图表示；相同的根系也未必决定实际基域上的群。不变量所能区分的对象、一个函子所遗忘的数据、一个公式成立所需的条件，都是本卷反复要求读者检查的事。希望这些提醒最终成为习惯，而不只是定理旁的一行限制。

若要把几种表示方法放在一起复习，可以从同一个问题出发，再回到相应章节核对条件：

共同问题	可对照的内容	需要辨别的差别
何时能分解成简单对象？	Maschke 定理、第 8 章的模特征例子、第 18 章的 Weyl 完全可约性	底域、特征及表示类别不同，平均算子不能替代一般证明。
数值不变量能记录多少结构？	普通与 Brauer 特征标、箭图维数向量、形式特征标	有些量记录合成因子或权重，却不能单独恢复扩张与箭头映射。
怎样从较小的数据构造表示？	群的诱导、路径代数模、泛包络代数诱导与 Verma 模	分别检查所用代数、泛性质及构造后是否仍有限维。
分类为何要分别证明存在与穷尽？	Specht 模、Gabriel 对应、最高权分类	给出参数与构造对象后，仍须证明无遗漏并区分同构类。
只保留数值或商会遗忘什么？	特征标、箭图维数向量、第 22 章的商；附录 E 的张量重构作对照	数值未必确定扩张或箭头映射，商可能合并轨道；附录 E 在所述条件下保留带 Galois 作用的张量解空间，则能恢复相应微分模。

几项较长的证明值得在读完后再回顾。对称群的标准基把组合重写和线性无关联起来；箭图的反射把维数变换变成表示之间的操作；最高权分类先构造模，再证明有限维，特征标公式才随后计算它。它们都不只是得出结论的方法，也解释了为什么那些参数、图形和整数会出现在答案中。把一个证明重新用于最小的非平凡例子，往往比继续记住更多定理名称更有收获。

本书没有试图把表示论的每个方向都压缩成一章。模表示的深层块论、一般代数群的算术形式、几何表示论、量子群与范畴化，以及解析和微分 Galois 理论，都有超出本卷的内容。附录选取定义、代表性结果和可以核验的模型，较深的结果给出注明输入与省略步骤的证明概要，并提供准确出处。读者若准备深入某一方向，应沿相应资料学习完整理论，也应重新检查那一领域对底域、拓扑、光滑性及有限性的约定。

五卷的写作到这里告一段落，修订仍将继续。一个证明有没有说清当前使用的是哪条结论，一个定义能否独立查阅，一道练习是否真正检验了某个新的判断，这些问题都需要在教学、阅读与反复计算中继续回答。愿本书能让读者带走一些可靠的方法，也留下值得自己追问的问题。

参考文献

- [1] M. Demazure. “Démonstration de la conjecture de Mumford”. In: Collectif. Séminaire Bourbaki : vol. 1974/75, exposés 453–470. Séminaire Bourbaki 17. Exposé 462. Springer-Verlag, 1976, pp. 138–144. url: https://www.numdam.org/item/SB_1974-1975__17__138_0/.
- [2] I. Dolgachev. Lectures on Invariant Theory. Vol. 296. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, 2003. doi: 10.1017/CB09780511615436. url: <https://www.math.ens.psl.eu/~benoist/refs/Dolgachev.pdf>.
- [3] P. Etingof, S. Gelaki, D. Nikshych and V. Ostrik. Tensor Categories. Mathematical Surveys and Monographs 205. American Mathematical Society, 2015. isbn: 9781470420246. url: <https://math.mit.edu/~etingof/egnobookfinal.pdf>.
- [4] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob and E. Yudovina. Introduction to Representation Theory. Student Mathematical Library 59. American Mathematical Society, 2011. doi: 10.1090/stml/059.
- [5] S. Fomin and A. Zelevinsky. “Cluster algebras I: Foundations”. In: Journal of the American Mathematical Society 15.2 (2002), pp. 497–529. doi: 10.1090/S0894-0347-01-00385-X. arXiv: math/0104151. url: <https://arxiv.org/pdf/math/0104151>.
- [6] W. J. Haboush. “Reductive Groups Are Geometrically Reductive”. In: Annals of Mathematics 102.1 (1975), pp. 67–83. doi: 10.2307/1970974.
- [7] R. Hotta, K. Takeuchi and T. Tanisaki. D-Modules, Perverse Sheaves, and Representation Theory. Trans. by K. Takeuchi. Vol. 236. Progress in Mathematics. Birkhäuser, 2008. doi: 10.1007/978-0-8176-4523-6.
- [8] J. E. Humphreys. Introduction to Lie Algebras and Representation Theory. Graduate Texts in Mathematics 9. Third printing, revised. Springer, 1980. doi: 10.1007/978-1-4612-6398-2.
- [9] J. E. Humphreys. Reflection Groups and Coxeter Groups. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 29. Cambridge University Press, 1990. doi: 10.1017/CB09780511623646.
- [10] J. E. Humphreys. Representations of Semisimple Lie Algebras in the BGG Category O. Graduate Studies in Mathematics 94. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2008. isbn: 9780821846780. doi: 10.1090/gsm/094.

- [11] D. Kazhdan and G. Lusztig. “Representations of Coxeter groups and Hecke algebras”. In: *Inventiones Mathematicae* 53.2 (1979), pp. 165–184. doi: 10.1007/BF01390031. url: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?GDZPPN002095319>.
- [12] A. Kirillov Jr. *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*. Vol. 113. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2008. doi: 10.1017/CB09780511755156. url: <https://www.math.stonybrook.edu/~kirillov/liegroups/liegroups.pdf>.
- [13] M. van der Put and M. F. Singer. *Galois Theory of Linear Differential Equations*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, 2003. doi: 10.1007/978-3-642-55750-7.
- [14] J.-P. Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Graduate Texts in Mathematics 42. Springer, 1977. doi: 10.1007/978-1-4684-9458-7.
- [15] M. F. Singer. “Introduction to the Galois Theory of Linear Differential Equations”. In: *Algebraic Theory of Differential Equations*. Ed. by M. A. H. MacCallum and A. V. Mikhailov. Vol. 357. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, 2009, pp. 1–82. doi: 10.1017/CB09780511721564.002. url: <https://singer.math.ncsu.edu/papers/LMSlectures.pdf>.
- [16] P. Webb. *A Course in Finite Group Representation Theory*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2016. doi: 10.1017/CB09781316677216. url: <https://www-users.cse.umn.edu/~webb/RepBook/RepBookLatex.pdf>.

中文索引

Artin 诱导定理	68	代数环面	361
Auslander-Reiten 序列	189	代数微分算子	440
半标准 Young 表	402	代数整数	65
半单 Lie 代数	208	单 Lie 代数	208
伴随表示	205	单项式特征标	70
半稳定点	389	单值矩阵	444
BGG 消解	349	等型分量	13
半单表示	7	对称函数	115
次数	6	对极	357
延拓	54	对偶表示	8
表示环	65	Dynkin 图	178
标准 Young 表	92	Engel 定理	216
Borel 子代数	301	二重传递	36
Brauer 特征标	142	2-余边	55
Brauer 映射	146	Euler 型	177
Brauer 诱导定理	70	Ext 箭图	167
Bruhat 序	401	范畴 $\mathcal{O}$	340
不变多项式	10	泛包络代数	256
不变环	10, 373	仿射代数群	360
不变双线性型	228	仿射商	384
不可分解	7	非分歧特征标	432
不可约	7	分解映射	144
Burnside 矩阵代数定理	80	分解数	144
Burnside 可解性定理	77	分圆域	66
Cartan 子代数	269	Frobenius 互反律	33
Cartan 矩阵	285	Frobenius 特征映射	119
Cartan 半单性判据	230	Garnir 关系	97
Cartan 矩阵	140	根数据	364
Cartan 可解性判据	230	共轭表示	49
Casimir 元	298	共轭分拆	93
常数域	451	钩长	105
Chevalley-Eilenberg 复形	345	钩长公式	105
初等对称函数	115	光滑表示	431
初等群	70	惯性群	52
Clifford 理论	52	规范变换	452
Coxeter 变换	184	归一化 2-余圈	55
Coxeter 系统	400	Haar 测度	428
D -模	434	Hall 配对	118

行表类	94	Liouvillian 塔	459
行表类的列交错元	94	Littlewood–Richardson 系数	126
Hecke 代数	408, 432	路径代数	157
Heisenberg Lie 代数	202	Mackey 分解	49
横条	127	Maschke 定理	10
Hilbert 级数	376	幂零根	219
holonomic D-模	443	幂和对称函数	115
Hopf 代数	357	幂零	208
Jacobi 恒等式	201	模表示	136
迹型	227	顶	137
箭理想	158	根	137
箭图	156	扭曲群代数	56
表示	158	p -模系统	142
不可分解表示	161	p -正则元素	141
交织算子	6	p -初等群	70
基本代数	166	Picard–Vessiot 环	454
基本解矩阵	454	Picard–Vessiot 扩张	454
积分表示	426	p -正则元素	73
几何约化群	387	旗簇	433
基座	138	权	301
局部有限	340	权重数	315
Kazhdan–Lusztig 多项式	410	权空间	301
可对角化群	361	权偏序	302
可解根	219	缺陷群	146
可解	208	区间表示	160
可解群	76	群代数	6
可容许表示	431	块	23
可移方格	93	Reynolds 算子	10, 373
Killing 型	227	Riemann–Hilbert 对应	446
Kostant 分拆函数	326	容许关系理想	158
Kronecker 箭图	187	Schur 多项式	116
块	140	Schur 函数	116
类函数	18	Schur 函子	126
类和	67	Schur 引理	12
Levi 分解	221	Serre 关系	290
Levi–Malcev 定理	221	射影表示	55
Levi 子代数	221	双代数	357
良滤过	441	双陪集	48
Lie 代数	201	水平截面	453
表示	206	竖条	127
导子	204	Specht 模	94
Lie 代数上调	345	Stokes 现象	446
Lie 定理	218	Tannaka 重构	462
列交错元	94		
Liouvillian 可解	459		

特征簇	441	余模	358
特征理想	220	余诱导表示	39
特征标	18	张量积表示	8
Tits 型	177	张量恒等式	38
投射覆盖	139	格	143
Verma 模	263	分拆	92
完全对称函数	115	正则表示	8
完全可约	7	正则奇点	444
完全旗	433	置换表示	7
微分 Galois 群	455	置换特征标	35
微分模	451	支配序	93
微分域	451	忠实	6
维数向量	159	子表示	7
稳定点	389	最高权范畴	351
Weyl 室	283	最高权模	302
Weyl 群	282	最高权向量	243
Weyl 代数	439	左胞腔	411
Weyl 反对称元素	320	三角分解	278
Whitehead 引理	348	不可约根系	286
无穷小特征标	342	内自同构	271
相对不变量	383	几乎分裂序列	189
线性表示	6	右几乎分裂态射	189
线性约化群	386	基本权	284
限制表示	31	左几乎分裂态射	189
斜 Young 图	107	支配整权	284
协变式	383	有限约化结晶根系	276
形式特征标	315	有限表示型	183
循环指标	406	权格	284
虚特征标	65	根	179
因子集	55	根格	284
一维表示	8	根空间	273
诱导乘积	119	正则元素	271
诱导表示	31	正定二次型	177
有理表示	361	正根	179
Young 表	92	汇点反射函子	180
Young 对称化子	95	源点反射函子	180
Young 图	92	环面子代数	269
Young 子群	94	秩	273
有向路径	157	简单反射	179
余代数	357	简单根	179
约化表达式	400	野表示型	188
约化群	364	驯表示型	188

外文索引

p -elementary group	70	Chevalley–Eilenberg complex	345
p -modular system	142	class function	18
p -regular element	73, 141	class sum	67
2-coboundary	55	Clifford theory	52
adjoint representation	205	coalgebra	357
admissible ideal	158	coinduced representation	39
admissible representation	431	comodule	358
affine algebraic group	360	complete flag	433
affine quotient	384	complete symmetric function	115
algebraic differential operator	440	completely reducible representation	7
algebraic integer	65	conjugate partition	93
algebraic torus	361	conjugate representation	49
almost split sequence	189	covariant	383
antipode	357	Coxeter system	400
arrow ideal	158	Coxeter transformation	184
Artin's induction theorem	68	cycle index	406
		cyclotomic field	66
basic algebra	166	D-module	434
Bernstein–Gelfand–Gelfand resolution	349	decomposition map	144
bialgebra	357	decomposition numbers	144
block	140	defect group	146
block of a group algebra	23	degree of a representation	6
Borel subalgebra	301	derivation of a Lie algebra	204
Brauer character	142	diagonalizable group	361
Brauer map	146	differential field	451
Brauer's induction theorem	70	differential Galois group	455
Bruhat order	401	differential module	451
Burnside's $p^a q^b$ theorem	77	dimension vector	159
Burnside's matrix algebra theorem	80	dominance order	93
Cartan matrix	285	dominant integral weight	284
Cartan matrix of an algebra	140	double coset	48
Cartan subalgebra	269	doubly transitive	36
Cartan's semisimplicity criterion	230	dual representation	8
Cartan's solvability criterion	230	Dynkin diagram	178
Casimir element	298	elementary group	70
category $\mathcal{O}$	340	elementary symmetric function	115
character	18	Engel's theorem	216
characteristic ideal	220	Euler form	177
characteristic variety	441	Ext quiver	167

extension of a representation	54	irreducible representation	7
factor set	55	irreducible root system	286
faithful representation	6	isotypic component	13
field of constants	451	Jacobi identity	201
finite reduced crystallographic root system	276	Kazhdan–Lusztig polynomial	410
finite representation type	183	Killing form	227
flag variety	433	Kostant partition function	326
formal character	315	Kronecker quiver	187
Frobenius characteristic map	119	lattice	143
Frobenius reciprocity	33	left almost split morphism	189
fundamental solution matrix	454	left cell	411
fundamental weight	284	Levi decomposition	221
Garnir relation	97	Levi subalgebra	221
gauge transformation	452	Levi–Malcev theorem	221
geometrically reductive group	387	Lie algebra	201
good filtration	441	Lie algebra cohomology	345
group algebra	6	Lie’s theorem	218
Haar measure	428	linear representation	6
Hall pairing	118	linearly reductive group	386
Hecke algebra	408, 432	Liouvillian solvable	459
Heisenberg Lie algebra	202	Liouvillian tower	459
highest weight category	351	Littlewood–Richardson coefficient	126
highest weight module	302	locally finite	340
highest weight vector	243	Mackey decomposition	49
Hilbert series	376	Maschke’s theorem	10
holonomic D-module	443	modular representation	136
hook length	105	monodromy matrix	444
hook-length formula	105	monomial character	70
Hopf algebra	357	nilpotent	208
horizontal section	453	nilradical	219
horizontal strip	127	normalized 2-cocycle	55
indecomposable representation	7, 161	one-dimensional representation	8
induced representation	31	oriented path	157
induction product	119	partition	92
inertia group	52	path algebra	157
infinitesimal character	342	permutation character	35
inner automorphism	271	permutation representation	7
integrated representation	426	Picard–Vessiot extension	454
intertwining operator	6	Picard–Vessiot ring	454
interval representation	160	polytabloid	94
invariant bilinear form	228	positive definite quadratic form	177
invariant polynomial	10	positive root	179
invariant ring	10, 373	power-sum symmetric function	115

projective cover	139	solvable group	76
projective representation	55	solvable radical	219
quiver	156	source reflection functor	180
radical of a module	137	Specht module	94
rank	273	stable point	389
rational representation	361	standard Young tableau	92
reduced expression	400	Stokes phenomenon	446
reductive group	364	subrepresentation	7
regular element	271	symmetric function	115
regular representation	8	tabloid	94
regular singularity	444	tame representation type	188
relative invariant	383	Tannaka reconstruction	462
removable box	93	tensor identity	38
representation of a Lie algebra	206	tensor product representation	8
representation of a quiver	158	Tits form	177
representation ring	65	top of a module	137
restricted representation	31	toral subalgebra	269
Reynolds operator	10, 373	trace form	227
Riemann–Hilbert correspondence	446	triangular decomposition	278
right almost split morphism	189	twisted group algebra	56
root	179	universal enveloping algebra	256
root datum	364	unramified character	432
root lattice	284	Verma module	263
root space	273	vertical strip	127
Schur function	116	virtual character	65
Schur functor	126	weight	301
Schur polynomial	116	weight lattice	284
Schur's lemma	12	weight multiplicity	315
semisimple Lie algebra	208	weight order	302
semistable point	389	weight space	301
semistandard Young tableau	402	Weyl algebra	439
Serre relations	290	Weyl anti-invariant element	320
simple Lie algebra	208	Weyl chamber	283
simple reflection	179	Weyl group	282
simple root	179	Whitehead lemmas	348
sink reflection functor	180	wild representation type	188
skew Young diagram	107	Young diagram	92
smooth representation	431	Young subgroup	94
socle	138	Young symmetrizer	95
solvable	208	Young tableau	92

符号索引

$\text{Hom}_G(V, W)$: 表示之间的交织算子空间	6	M_R^λ : 表类置换模	94
$\langle f, h \rangle_G$: 有限群类函数的内积	19	S_R^λ : Specht 模	94
Res_H^G : 从 G 到 H 的限制	31	kQ : 箭图的路径代数	157
Ind_H^G : 从 H 到 G 的诱导	31	$I[a, b]$: 线性定向箭图的区间表示	160
Coind_H^G : 从 H 到 G 的余诱导	39	$\mathfrak{gl}(V), \mathfrak{sl}_n(k)$: 一般线性与特殊线性 Lie 代数	202
$K \backslash G/H$: 双陪集集	48	$\mathfrak{so}(B), \mathfrak{sp}_{2n}(k)$: 正交与辛 Lie 代数	203
${}^x W$: 共轭表示	49	$\text{rad } \mathfrak{g}$	219
$I_G(W)$: 不可约表示的惯性群	52	$\text{nilrad } \mathfrak{g}$	219
$\mathbb{C}^\alpha[Q]$: 扭曲群代数	56	$\kappa_{\mathfrak{g}}$	227
$R(G)$: 有限群的复表示环	65	$U(\mathfrak{g})$: Lie 代数的泛包络代数	256
$\lambda \vdash n$: 整数分拆	93		