

分析学

第一卷

# 实分析：测度、几何测度与 Sobolev 空间

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月



# 序言

分析学常从极限开始，却不只研究数列和函数的收敛。给集合定义长度或体积、把函数列的极限移入积分号、由局部微分信息控制整体形状，都要先回答一组基本问题：对象在哪个空间里，以何种方式收敛，误差怎样控制，取极限后哪些结构仍然保留。偏微分方程中的近似解也有同样的问题。初等微积分的计算由此进入更精细的语言。

严格性不是事后的修饰。有限可加性不能推出可数可加性，逐点收敛也不能保证积分收敛。在不完备的测度空间中，可测零集的子集甚至可能不可测；在这样的子集上修改可测函数，所得函数也可能不再可测。许多看似抽象的定义正是为了区分这些情形。判断一个定义是否合用，要看它能否承受后续的极限与逼近。

这套《分析学》反复使用三类方法。从近似序列中取得极限时常需紧性；把局部结论推广到整体时常用尺度分解和覆盖；变换与表示则把问题转入更合适的空间。第一卷在测度、函数空间和几何结构中建立这些方法；第二卷把它们用于 Fourier 分析、偏微分方程与调和函数；第三卷从全纯函数出发，讨论解析性同共形几何、势论和算术问题的联系。三卷分别成册，并在这些方法上相互衔接。

第一卷从可测结构、测度和积分起步。建立  $L^p$  空间及所需的泛函分析之后，本卷转向测度的局部结构：覆盖定理支撑测度微分，从缩小邻域上的平均恢复局部行为；Hausdorff 测度、面积公式和余面积公式把这一思想带入几何。末一编用分布和弱导数处理不光滑函数，再进入 Sobolev、BV 与有限周长集合。后半卷的论证不断调用前面建立的可测性、逼近、紧性和积分工具。

本卷面向已经学过单变量与多变量微积分、线性代数，并接受过基本证明训练的高年级本科生和研究生。读者应熟悉集合、映射、数列与函数列的基本语言，能够使用  $\varepsilon$ - $\delta$  语言完成基本证明；测度论和泛函分析不作先修要求。本卷在附录中补充度量空间、点集拓扑、多线性代数和泛函分析，并为高阶几何测度论保留一个入口；读者可按需查阅。附录不代替相应课程或专题专著。

各章通常先交代问题和前置依赖，再给出定义、主要结果及必要的例子或反例，章末以小结和习题收束。核心构造从原始数据推进到目标对象；良定义、可数操作、有限测度截断和紧性等实质步骤都应展开。特别长且会打断主线的结果采用明确标示的证明概要。带星号的单元供选读，附录按需查阅。习题配有解答或提示，宜在独立尝试后使用。

阅读时，建议在核心证明旁标出：极限在哪个空间中取得，控制量从哪里来，关键假设在哪一步使用。遇到反例，则要追问删去了哪条假设，以及结论从何处开始失效。这些标注会逐渐成为阅读新证明时的检查表。

本卷覆盖从 Lebesgue 理论到几何测度、Sobolev 与 BV 的一条主线，但不试图包办所有相关领域。概率论、算子理论、非线性偏微分方程和更高阶的几何测度论都需要另行学习。完成本卷后，读者可按兴趣转向相邻领域的标准教材；进入论文阅读，还需补足所选方向的专门背景。



# 目录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 序言                               | iii       |
| <b>第一编 测度与 Lebesgue 积分</b>       | <b>1</b>  |
| <b>第一章 集合系、可测空间与可测映射</b>         | <b>4</b>  |
| 1.1 集合系                          | 4         |
| 1.1.1 集合环                        | 5         |
| 1.1.2 集合代数                       | 5         |
| 1.1.3 $\sigma$ -代数               | 6         |
| 1.1.4 集合系的基本运算                   | 7         |
| 1.2 生成的 $\sigma$ -代数             | 8         |
| 1.2.1 由集合族生成的 $\sigma$ -代数       | 8         |
| 1.2.2 初始 $\sigma$ -代数            | 9         |
| 1.2.3 可数生成性                      | 10        |
| 1.2.4 Borel $\sigma$ -代数         | 10        |
| 1.3 $\pi$ -系统、 $\lambda$ -系统与单调类 | 12        |
| 1.3.1 $\pi$ -系统                  | 12        |
| 1.3.2 Dynkin $\lambda$ -系统       | 12        |
| 1.3.3 $\pi$ - $\lambda$ 定理       | 13        |
| 1.3.4 单调类定理                      | 15        |
| 1.3.5 函数型单调类定理                   | 15        |
| 1.4 可测空间与可测映射                    | 17        |
| 1.4.1 可测空间                       | 17        |
| 1.4.2 可测映射                       | 17        |
| 1.4.3 Borel 可测映射                 | 19        |
| 1.4.4 乘积可测结构初步                   | 20        |
| <b>第二章 测度、外测度与测度延拓</b>           | <b>27</b> |
| 2.1 测度                           | 27        |
| 2.1.1 测度的定义                      | 28        |
| 2.1.2 有限可加性与可数次可加性               | 29        |
| 2.1.3 从下连续性与从上连续性                | 30        |
| 2.1.4 有限测度与概率测度                  | 30        |
| 2.1.5 $\sigma$ -有限测度             | 31        |
| 2.2 测度的基本构造                      | 31        |

|            |                           |           |
|------------|---------------------------|-----------|
| 2.2.1      | 测度的限制                     | 31        |
| 2.2.2      | 子空间测度                     | 32        |
| 2.2.3      | 完备测度                      | 33        |
| 2.2.4      | 测度的完备化                    | 33        |
| 2.3        | 外测度                       | 35        |
| 2.3.1      | 外测度的定义                    | 35        |
| 2.3.2      | Carathéodory 可测性          | 36        |
| 2.3.3      | Carathéodory 可测集          | 37        |
| 2.3.4      | Carathéodory 测度与由测度诱导的外测度 | 38        |
| 2.4        | 测度延拓                      | 39        |
| 2.4.1      | 前测度                       | 40        |
| 2.4.2      | Carathéodory 延拓定理         | 41        |
| 2.4.3      | $\sigma$ -有限条件下的唯一性       | 42        |
| 2.4.4      | Hahn–Kolmogorov 定理: 总结形式  | 44        |
| 2.4.5      | 从半环、环和代数构造测度              | 44        |
| <b>第三章</b> | <b>Lebesgue 测度</b>        | <b>53</b> |
| 3.1        | 欧氏空间中的外测度                 | 53        |
| 3.1.1      | 长度、面积与体积                  | 54        |
| 3.1.2      | Lebesgue 外测度              | 56        |
| 3.1.3      | 长方体与立方体覆盖                 | 57        |
| 3.1.4      | 开集的测度                     | 57        |
| 3.2        | Lebesgue 可测集              | 58        |
| 3.2.1      | Carathéodory 可测性          | 59        |
| 3.2.2      | Borel 集的可测性               | 59        |
| 3.2.3      | 零测集                       | 59        |
| 3.2.4      | Lebesgue $\sigma$ -代数     | 61        |
| 3.3        | 正则性                       | 61        |
| 3.3.1      | 外正则性                      | 62        |
| 3.3.2      | 内正则性                      | 62        |
| 3.3.3      | 开集与紧集逼近                   | 63        |
| 3.3.4      | 可测集的 Borel 逼近             | 64        |
| 3.4        | 欧氏变换下的行为                  | 64        |
| 3.4.1      | 平移不变性                     | 64        |
| 3.4.2      | 可逆线性变换与行列式                | 65        |
| 3.4.3      | 正交变换与伸缩                   | 68        |
| 3.4.4      | 奇异线性变换                    | 68        |
| 3.5*       | 不可测集合                     | 69        |
| 3.5.1      | Vitali 集                  | 69        |
| 3.5.2      | 选择公理的作用                   | 70        |

|            |                                 |            |
|------------|---------------------------------|------------|
| 3.5.3      | 完备性与不可测性 . . . . .              | 70         |
| <b>第四章</b> | <b>可测函数与可测逼近</b>                | <b>75</b>  |
| 4.1        | 可测函数 . . . . .                  | 76         |
| 4.1.1      | 实值及扩展实值函数 . . . . .             | 76         |
| 4.1.2      | Borel 可测函数 . . . . .            | 77         |
| 4.1.3      | 复值可测函数 . . . . .                | 78         |
| 4.1.4      | 可测函数的代数运算 . . . . .             | 78         |
| 4.2        | 极限运算 . . . . .                  | 81         |
| 4.2.1      | 上确界与下确界 . . . . .               | 81         |
| 4.2.2      | $\limsup$ 、 $\liminf$ . . . . . | 82         |
| 4.2.3      | 逐点极限 . . . . .                  | 83         |
| 4.2.4      | 几乎处处性质 . . . . .                | 84         |
| 4.3        | 简单函数逼近 . . . . .                | 86         |
| 4.3.1      | 简单函数 . . . . .                  | 86         |
| 4.3.2      | 非负函数的单调逼近 . . . . .             | 87         |
| 4.3.3      | 正部与负部 . . . . .                 | 88         |
| 4.3.4      | 截断方法 . . . . .                  | 88         |
| 4.4        | Lusin 定理 . . . . .              | 89         |
| 4.4.1      | 可测函数与连续函数 . . . . .             | 89         |
| 4.4.2      | Lusin 定理的证明 . . . . .           | 90         |
| 4.4.3      | “几乎连续性” . . . . .               | 93         |
| 4.5        | Egoroff 定理 . . . . .            | 94         |
| 4.5.1      | 逐点与一致收敛 . . . . .               | 94         |
| 4.5.2      | 几乎一致收敛 . . . . .                | 96         |
| 4.5.3      | Egoroff 定理的证明 . . . . .         | 97         |
| <b>第五章</b> | <b>Lebesgue 积分与收敛理论</b>         | <b>104</b> |
| 5.1        | 非负函数的积分 . . . . .               | 104        |
| 5.1.1      | 简单函数积分 . . . . .                | 104        |
| 5.1.2      | 非负可测函数积分 . . . . .              | 104        |
| 5.1.3      | 单调性 . . . . .                   | 104        |
| 5.1.4      | 可数可加性 . . . . .                 | 104        |
| 5.2        | 一般可积函数 . . . . .                | 104        |
| 5.2.1      | 正部与负部 . . . . .                 | 104        |
| 5.2.2      | 可积性 . . . . .                   | 104        |
| 5.2.3      | $L^1$ 的初步定义 . . . . .           | 104        |
| 5.2.4      | 积分的绝对连续性 . . . . .              | 104        |
| 5.3        | 基本收敛定理 . . . . .                | 105        |
| 5.3.1      | Fatou 引理 . . . . .              | 105        |
| 5.3.2      | 单调收敛定理 . . . . .                | 105        |

|            |                                    |            |
|------------|------------------------------------|------------|
| 5.3.3      | 控制收敛定理                             | 105        |
| 5.3.4      | 反向 Fatou 型结论                       | 105        |
| 5.4        | 参数积分: 极限与微分                        | 105        |
| 5.4.1      | 参数积分的连续性                           | 105        |
| 5.4.2      | 积分号下取极限                            | 105        |
| 5.4.3      | 积分号下求导                             | 105        |
| 5.4.4      | 无穷区间积分中的参数依赖                       | 105        |
| 5.5        | 一致可积性                              | 105        |
| 5.5.1      | 一致可积族                              | 105        |
| 5.5.2      | 一致绝对连续性                            | 105        |
| 5.5.3      | Vitali 收敛定理                        | 105        |
| 5.5.4      | $L^1$ 收敛判据                         | 106        |
| <b>第六章</b> | <b>有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理</b> | <b>107</b> |
| 6.1        | 有符号测度                              | 107        |
| 6.1.1      | 正集与负集                              | 107        |
| 6.1.2      | Hahn 分解                            | 107        |
| 6.1.3      | Jordan 分解                          | 107        |
| 6.2        | 全变差                                | 107        |
| 6.2.1      | 全变差测度                              | 107        |
| 6.2.2      | 有限变差测度                             | 107        |
| 6.2.3      | 有符号测度空间的范数                         | 107        |
| 6.3        | 绝对连续与奇异                            | 107        |
| 6.3.1      | $\nu \ll \mu$                      | 107        |
| 6.3.2      | $\nu \perp \mu$                    | 108        |
| 6.3.3      | 奇异测度                               | 108        |
| 6.3.4      | Lebesgue 分解的动机                     | 108        |
| 6.4        | Radon–Nikodym 定理                   | 108        |
| 6.4.1      | Radon–Nikodym 导数                   | 108        |
| 6.4.2      | 定理及证明                              | 108        |
| 6.4.3      | 唯一性                                | 108        |
| 6.4.4      | Lebesgue 分解定理                      | 108        |
| 6.5*       | 复测度                                | 108        |
| 6.5.1      | 复测度                                | 108        |
| 6.5.2      | 全变差                                | 108        |
| 6.5.3      | 极分解                                | 108        |
| 6.5.4      | 复测度上的积分                            | 108        |
| <b>第七章</b> | <b>乘积测度、Fubini 理论与换元公式</b>         | <b>110</b> |
| 7.1        | 乘积可测结构                             | 110        |
| 7.1.1      | 乘积 $\sigma$ -代数                    | 110        |



|       |                      |     |
|-------|----------------------|-----|
| 7.1.2 | 可测矩形                 | 110 |
| 7.1.3 | 截面                   | 110 |
| 7.1.4 | 截面的可测性               | 110 |
| 7.2   | 乘积测度                 | 110 |
| 7.2.1 | 矩形上的测度               | 110 |
| 7.2.2 | 乘积测度的构造              | 110 |
| 7.2.3 | 唯一性                  | 110 |
| 7.2.4 | 多重乘积                 | 110 |
| 7.3   | Tonelli–Fubini 定理    | 111 |
| 7.3.1 | Tonelli 定理           | 111 |
| 7.3.2 | Fubini 定理            | 111 |
| 7.3.3 | 截面与零测集               | 111 |
| 7.3.4 | 多重积分                 | 111 |
| 7.4   | 参数积分的可测性             | 111 |
| 7.4.1 | 参数可测性                | 111 |
| 7.4.2 | 参数积分                 | 111 |
| 7.4.3 | 与 Tonelli–Fubini 的结合 | 111 |
| 7.4.4 | 与控制收敛的结合             | 111 |
| 7.5   | 欧氏空间中的换元公式           | 111 |
| 7.5.1 | 线性换元                 | 111 |
| 7.5.2 | $C^1$ 微分同胚           | 111 |
| 7.5.3 | Jacobi 行列式           | 111 |
| 7.5.4 | 换元公式                 | 112 |

## 第二编 泛函分析基础与 $L^p$ 空间 113

|       |                       |     |
|-------|-----------------------|-----|
| 第八章   | Banach 空间与 Hilbert 空间 | 116 |
| 8.1   | 赋范空间                  | 116 |
| 8.1.1 | 范数与等价范数               | 116 |
| 8.1.2 | 连续线性映射                | 116 |
| 8.1.3 | 算子范数                  | 116 |
| 8.1.4 | Banach 空间             | 116 |
| 8.2   | 线性泛函与 Hahn–Banach     | 116 |
| 8.2.1 | 对偶空间                  | 116 |
| 8.2.2 | Hahn–Banach 定理        | 116 |
| 8.2.3 | 分离定理                  | 116 |
| 8.2.4 | 对偶范数                  | 116 |
| 8.3   | Banach 空间基本原理         | 117 |
| 8.3.1 | Baire 类定理             | 117 |
| 8.3.2 | 一致有界原理                | 117 |

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 8.3.3      | 开映射定理                      | 117        |
| 8.3.4      | 闭图像定理                      | 117        |
| 8.4        | Hilbert 空间                 | 117        |
| 8.4.1      | 内积空间                       | 117        |
| 8.4.2      | 正交投影                       | 117        |
| 8.4.3      | Riesz 表示定理                 | 117        |
| 8.4.4      | 正交系与正交基                    | 117        |
| 8.5*       | 紧算子与紧自伴谱理论                 | 117        |
| 8.5.1      | 紧算子                        | 117        |
| 8.5.2      | 紧自伴算子                      | 117        |
| 8.5.3      | 谱定理                        | 117        |
| 8.5.4      | Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景  | 118        |
| <b>第九章</b> | <b>弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性</b>       | <b>119</b> |
| 9.1        | 弱拓扑                        | 119        |
| 9.1.1      | 弱拓扑                        | 119        |
| 9.1.2      | 弱收敛                        | 119        |
| 9.1.3      | 弱 Cauchy 序列                | 119        |
| 9.1.4      | 范数收敛与弱收敛                   | 119        |
| 9.2        | 弱-* 拓扑                     | 119        |
| 9.2.1      | 对偶空间上的弱-* 拓扑               | 119        |
| 9.2.2      | 弱-* 收敛                     | 119        |
| 9.2.3      | 弱拓扑与弱-* 拓扑的区别              | 119        |
| 9.3        | Banach–Alaoglu 定理          | 119        |
| 9.3.1      | 对偶单位球                      | 119        |
| 9.3.2      | Banach–Alaoglu 定理          | 120        |
| 9.3.3      | 可分情形的序列版本                  | 120        |
| 9.4        | 反身性与弱紧性                    | 120        |
| 9.4.1      | 反身空间                       | 120        |
| 9.4.2      | 有界序列的弱收敛子列                 | 120        |
| 9.4.3      | Hilbert 空间中的弱紧性            | 120        |
| 9.4.4*     | Eberlein–Šmulian 定理        | 120        |
| 9.5        | 凸性与弱下半连续性                  | 120        |
| 9.5.1      | 凸集                         | 120        |
| 9.5.2      | 闭凸集的弱闭性                    | 120        |
| 9.5.3      | 范数的弱下半连续性                  | 120        |
| 9.5.4      | 凸泛函的弱下半连续性                 | 120        |
| 9.5.5      | 变分法中的意义                    | 120        |
| <b>第十章</b> | <b><math>L^p</math> 空间</b> | <b>122</b> |
| 10.1       | $L^p$ 的基本结构                | 122        |

|                                       |                       |            |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 10.1.1                                | 等价类                   | 122        |
| 10.1.2                                | $L^p$ 范数              | 122        |
| 10.1.3                                | Hölder 不等式            | 122        |
| 10.1.4                                | Minkowski 不等式         | 122        |
| 10.1.5                                | 完备性                   | 122        |
| 10.2                                  | 稠密性                   | 122        |
| 10.2.1                                | 简单函数                  | 122        |
| 10.2.2                                | 截断                    | 122        |
| 10.2.3                                | 有限测度支集函数              | 122        |
| 10.2.4                                | 欧氏空间中的光滑逼近预告          | 123        |
| 10.3                                  | $L^p$ 对偶              | 123        |
| 10.3.1                                | $1 < p < \infty$      | 123        |
| 10.3.2                                | Radon–Nikodym 方法      | 123        |
| 10.3.3                                | $L^1$ 的对偶             | 123        |
| 10.3.4                                | $L^\infty$ 的特殊性       | 123        |
| 10.4                                  | 反身性与弱收敛               | 123        |
| 10.4.1                                | $1 < p < \infty$ 的反身性 | 123        |
| 10.4.2                                | 有界序列的弱收敛子列            | 123        |
| 10.4.3                                | 凸泛函与弱下半连续性            | 123        |
| 10.5*                                 | $L^1$ 的特殊性            | 123        |
| 10.5.1                                | 一致可积性再论               | 123        |
| 10.5.2                                | Dunford–Pettis 定理     | 123        |
| 10.5.3                                | $L^1$ 弱紧性             | 123        |
| 10.5.4                                | Chacon 咬引理            | 124        |
| <b>第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示</b> |                       | <b>125</b> |
| 11.1                                  | 局部紧 Hausdorff 空间      | 125        |
| 11.1.1                                | $C_c(X)$              | 125        |
| 11.1.2                                | $C_0(X)$              | 125        |
| 11.1.3                                | 支集                    | 125        |
| 11.1.4                                | 局部紧性                  | 125        |
| 11.2                                  | Radon 测度              | 125        |
| 11.2.1                                | 局部有限 Borel 测度         | 125        |
| 11.2.2                                | 内正则性                  | 125        |
| 11.2.3                                | 外正则性                  | 125        |
| 11.2.4                                | Radon 测度的基本性质         | 125        |
| 11.3                                  | 正线性泛函                 | 126        |
| 11.3.1                                | $C_c(X)$ 上的正泛函        | 126        |
| 11.3.2                                | 局部有界性                 | 126        |
| 11.3.3                                | 支集与正则性                | 126        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 11.4 Riesz–Markov 表示定理                  | 126        |
| 11.4.1 正泛函版本                            | 126        |
| 11.4.2 有界泛函版本                           | 126        |
| 11.4.3 $C_0(X)^*$                       | 126        |
| 11.4.4 有符号及复测度版本                        | 126        |
| <b>第十二章* 测度的弱收敛与紧性</b>                  | <b>127</b> |
| 12.1 模糊收敛与弱收敛                           | 127        |
| 12.1.1 测试函数                             | 127        |
| 12.1.2 模糊收敛                             | 127        |
| 12.1.3 弱收敛                              | 127        |
| 12.1.4 概率测度情形                           | 127        |
| 12.2 总括定理                               | 127        |
| 12.2.1 连续测试函数判据                         | 127        |
| 12.2.2 开集判据                             | 127        |
| 12.2.3 闭集判据                             | 127        |
| 12.2.4 边界零测集判据                          | 127        |
| 12.3 紧性                                 | 128        |
| 12.3.1 紧族                               | 128        |
| 12.3.2 质量逃逸                             | 128        |
| 12.3.3 模糊收敛与弱收敛的差别                      | 128        |
| 12.4 Prokhorov 定理                       | 128        |
| 12.4.1 Polish 空间                        | 128        |
| 12.4.2 紧性与相对紧性                          | 128        |
| 12.4.3 概率测度中的应用                         | 128        |
| 12.4.4 Radon 空间版本                       | 128        |
| <b>第三编 测度微分与几何测度论</b>                   | <b>129</b> |
| <b>第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数</b> | <b>132</b> |
| 13.1 Vitali 覆盖                          | 132        |
| 13.1.1 Vitali 覆盖族                       | 132        |
| 13.1.2 不交子族选择                           | 132        |
| 13.1.3 Vitali 覆盖定理                      | 132        |
| 13.1.4 Vitali 覆盖关系                      | 132        |
| 13.2 Besicovitch 覆盖                     | 132        |
| 13.2.1 Besicovitch 覆盖定理                 | 132        |
| 13.2.2 有界覆盖重数                           | 132        |
| 13.2.3 与 Vitali 定理的区别                   | 132        |
| 13.2.4 高维几何意义                           | 132        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 13.3 Hardy–Littlewood 最大函数 . . . . .     | 133        |
| 13.3.1 最大算子 . . . . .                    | 133        |
| 13.3.2 弱型 $(1,1)$ . . . . .              | 133        |
| 13.3.3 强型 $(p,p)$ . . . . .              | 133        |
| 13.3.4 局部最大算子 . . . . .                  | 133        |
| 13.4 极大不等式的基本应用 . . . . .                | 133        |
| 13.4.1 微分基 . . . . .                     | 133        |
| 13.4.2 $L^p$ 控制 . . . . .                | 133        |
| 13.4.3 逼近恒等 . . . . .                    | 133        |
| 13.4.4 后续调和分析中的作用 . . . . .              | 133        |
| <b>第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点</b>            | <b>134</b> |
| 14.1 密度与测度比 . . . . .                    | 134        |
| 14.1.1 上、下密度 . . . . .                   | 134        |
| 14.1.2 密度比 . . . . .                     | 134        |
| 14.1.3 测度相对于测度的导数 . . . . .              | 134        |
| 14.2 Lebesgue 微分定理 . . . . .             | 134        |
| 14.2.1 局部平均 . . . . .                    | 134        |
| 14.2.2 最大函数方法 . . . . .                  | 134        |
| 14.2.3 Lebesgue 微分定理 . . . . .           | 134        |
| 14.2.4 $L^p_{\text{loc}}$ 版本 . . . . .   | 134        |
| 14.3 Radon 测度的微分 . . . . .               | 134        |
| 14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示 . . . . .   | 134        |
| 14.3.2 绝对连续部分 . . . . .                  | 135        |
| 14.3.3 奇异部分 . . . . .                    | 135        |
| 14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释 . . . . .        | 135        |
| 14.4 Lebesgue 点 . . . . .                | 135        |
| 14.4.1 Lebesgue 点定理 . . . . .            | 135        |
| 14.4.2 精确代表 . . . . .                    | 135        |
| 14.4.3 局部平均 . . . . .                    | 135        |
| 14.4.4 $L^p$ 函数的 Lebesgue 点 . . . . .    | 135        |
| 14.5 近似极限与近似连续性 . . . . .                | 135        |
| 14.5.1 近似极限 . . . . .                    | 135        |
| 14.5.2 近似连续性 . . . . .                   | 135        |
| 14.5.3 密度拓扑的直观 . . . . .                 | 135        |
| 14.5.4 近似微分的预告 . . . . .                 | 135        |
| <b>第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法</b> | <b>137</b> |
| 15.1 Hausdorff 测度 . . . . .              | 137        |
| 15.1.1 Hausdorff 含量 . . . . .            | 137        |
| 15.1.2 $\mathcal{H}^s$ . . . . .         | 137        |

|                                         |                               |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 15.1.3                                  | 基本性质                          | 137        |
| 15.1.4                                  | Lipschitz 映射下的行为              | 137        |
| 15.2                                    | Hausdorff 维数                  | 137        |
| 15.2.1                                  | 临界指数                          | 137        |
| 15.2.2                                  | Hausdorff 维数                  | 137        |
| 15.2.3                                  | 可数稳定性                         | 137        |
| 15.2.4                                  | Cantor 型集合                    | 137        |
| 15.3                                    | $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度 | 138        |
| 15.3.1                                  | 等直径问题                         | 138        |
| 15.3.2                                  | 欧氏球的极值性质                      | 138        |
| 15.3.3                                  | $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度 | 138        |
| 15.3.4                                  | 归一化常数                         | 138        |
| 15.4                                    | Frostman 引理                   | 138        |
| 15.4.1                                  | 质量分布原理                        | 138        |
| 15.4.2                                  | Frostman 测度                   | 138        |
| 15.4.3                                  | Hausdorff 维数下界                | 138        |
| 15.4.4                                  | 能量方法初步                        | 138        |
| 15.5                                    | Hausdorff 密度                  | 138        |
| 15.5.1                                  | $s$ -维密度                      | 138        |
| 15.5.2                                  | 密度存在问题                        | 138        |
| 15.5.3                                  | 局部结构                          | 138        |
| 15.5.4                                  | 可整流性的预告                       | 139        |
| <b>第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理</b> |                               | <b>140</b> |
| 16.1                                    | Lipschitz 映射                  | 140        |
| 16.1.1                                  | Lipschitz 常数                  | 140        |
| 16.1.2                                  | 双 Lipschitz 映射                | 140        |
| 16.1.3                                  | Lipschitz 像                   | 140        |
| 16.1.4                                  | Hausdorff 测度估计                | 140        |
| 16.2                                    | Rademacher 定理                 | 140        |
| 16.2.1                                  | 一维 Lipschitz 函数               | 140        |
| 16.2.2                                  | 高维可微性                         | 140        |
| 16.2.3                                  | Rademacher 定理                 | 140        |
| 16.2.4                                  | 几乎处处线性化                       | 140        |
| 16.3                                    | 近似微分                          | 141        |
| 16.3.1                                  | 近似可微性                         | 141        |
| 16.3.2                                  | 与普通微分的关系                      | 141        |
| 16.3.3                                  | 可测函数中的精细结构                    | 141        |
| 16.4*                                   | 绝对连续曲线与度量导数                   | 141        |
| 16.4.1                                  | 绝对连续曲线                        | 141        |

|                             |                          |            |
|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 16.4.2                      | 度量导数                     | 141        |
| 16.4.3                      | 长度公式                     | 141        |
| <b>第十七章 Jacobi 行列式与面积公式</b> |                          | <b>142</b> |
| 17.1                        | 线性映射的 Jacobi 行列式         | 142        |
| 17.1.1                      | Gram 行列式                 | 142        |
| 17.1.2                      | $m$ -维 Jacobi 行列式        | 142        |
| 17.1.3                      | 体积伸缩                     | 142        |
| 17.1.4                      | 外代数解释                    | 142        |
| 17.2                        | Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式 | 142        |
| 17.2.1                      | 微分与 Jacobi 行列式           | 142        |
| 17.2.2                      | 几何意义                     | 142        |
| 17.2.3                      | 退化点                      | 142        |
| 17.2.4                      | 近似 Jacobi 行列式            | 142        |
| 17.3                        | 面积公式                     | 143        |
| 17.3.1                      | 单射情形                     | 143        |
| 17.3.2                      | 重数函数                     | 143        |
| 17.3.3                      | 一般面积公式                   | 143        |
| 17.3.4                      | 加权面积公式                   | 143        |
| 17.4                        | 应用                       | 143        |
| 17.4.1                      | 曲线长度                     | 143        |
| 17.4.2                      | 曲面积                      | 143        |
| 17.4.3                      | Lipschitz 参数曲面           | 143        |
| 17.4.4                      | 图像的面积                    | 143        |
| <b>第十八章 余面积公式</b>           |                          | <b>144</b> |
| 18.1                        | 水平集                      | 144        |
| 18.1.1                      | Lipschitz 函数的水平集         | 144        |
| 18.1.2                      | 法方向                      | 144        |
| 18.1.3                      | 切空间                      | 144        |
| 18.1.4                      | 余面积 Jacobi 行列式           | 144        |
| 18.2                        | 余面积公式                    | 144        |
| 18.2.1                      | 标量函数                     | 144        |
| 18.2.2                      | 向量值映射                    | 144        |
| 18.2.3                      | 可积函数版本                   | 144        |
| 18.2.4                      | 几何解释                     | 144        |
| 18.3                        | 应用                       | 145        |
| 18.3.1                      | 层析积分                     | 145        |
| 18.3.2                      | 水平集的 Hausdorff 测度        | 145        |
| 18.3.3                      | 分布函数                     | 145        |
| 18.3.4                      | Cavalieri 原理             | 145        |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>第十九章* 可整流集与可整流性</b>           | <b>146</b>     |
| 19.1 可整流集                        | 146            |
| 19.1.1 Lipschitz 像               | 146            |
| 19.1.2 可数 $m$ -可整流集              | 146            |
| 19.1.3 纯不可整流集                    | 146            |
| 19.1.4 可整流测度                     | 146            |
| 19.2 近似切空间                       | 146            |
| 19.2.1 近似切平面                     | 146            |
| 19.2.2 近似法向量                     | 146            |
| 19.2.3 密度与切空间                    | 146            |
| 19.2.4 Lipschitz 图表示             | 146            |
| 19.3 可整流集上的面积公式                  | 147            |
| 19.3.1 参数化                       | 147            |
| 19.3.2 变量代换                      | 147            |
| 19.3.3 切向 Jacobi 行列式             | 147            |
| 19.3.4 可整流测度                     | 147            |
| 19.4 密度与可整流性                     | 147            |
| 19.4.1 密度为 1 的现象                 | 147            |
| 19.4.2 可整流性的密度判据                 | 147            |
| 19.4.3 Federer 型结构定理             | 147            |
| 19.4.4 Preiss 定理概览               | 147            |
| <br><b>第四编 分布、Sobolev 空间与 BV</b> | <br><b>149</b> |
| <b>第二十章 分布与弱导数</b>               | <b>152</b>     |
| 20.1 测试函数                        | 152            |
| 20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$      | 152            |
| 20.1.2 基本操作                      | 152            |
| 20.1.3 单位分解                      | 152            |
| 20.1.4 测试函数空间拓扑                  | 152            |
| 20.2 分布                          | 152            |
| 20.2.1 分布的定义                     | 152            |
| 20.2.2 正则分布                      | 152            |
| 20.2.3 Dirac 分布                  | 152            |
| 20.2.4 分布导数                      | 152            |
| 20.3 卷积与光滑化                      | 153            |
| 20.3.1 磨光子                       | 153            |
| 20.3.2 分布卷积                      | 153            |
| 20.3.3 正则化                       | 153            |
| 20.3.4 逼近恒等                      | 153            |



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 20.4 弱导数 . . . . .                   | 153        |
| 20.4.1 定义 . . . . .                  | 153        |
| 20.4.2 唯一性 . . . . .                 | 153        |
| 20.4.3 分部积分 . . . . .                | 153        |
| 20.4.4 与经典导数的关系 . . . . .            | 153        |
| <b>第二十一章 Sobolev 空间</b>              | <b>154</b> |
| 21.1 定义 . . . . .                    | 154        |
| 21.1.1 $W^{1,p}$ . . . . .           | 154        |
| 21.1.2 $W^{k,p}$ . . . . .           | 154        |
| 21.1.3 $H^k = W^{k,2}$ . . . . .     | 154        |
| 21.1.4 局部 Sobolev 空间 . . . . .       | 154        |
| 21.2 基本结构 . . . . .                  | 154        |
| 21.2.1 Banach 结构 . . . . .           | 154        |
| 21.2.2 Hilbert 结构 . . . . .          | 154        |
| 21.2.3 完备性 . . . . .                 | 154        |
| 21.2.4 弱收敛 . . . . .                 | 154        |
| 21.3 运算规则 . . . . .                  | 155        |
| 21.3.1 乘积法则 . . . . .                | 155        |
| 21.3.2 链式法则 . . . . .                | 155        |
| 21.3.3 截断 . . . . .                  | 155        |
| 21.3.4 坐标变换 . . . . .                | 155        |
| 21.4 Sobolev 函数的代表 . . . . .         | 155        |
| 21.4.1 一维绝对连续代表 . . . . .            | 155        |
| 21.4.2 ACL 性质 . . . . .              | 155        |
| 21.4.3 几乎处处可微 . . . . .              | 155        |
| 21.4.4 近似可微性 . . . . .               | 155        |
| <b>第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓</b>    | <b>156</b> |
| 22.1 光滑逼近 . . . . .                  | 156        |
| 22.1.1 局部卷积 . . . . .                | 156        |
| 22.1.2 Friedrichs 磨光子 . . . . .      | 156        |
| 22.1.3 Meyers–Serrin 定理 . . . . .    | 156        |
| 22.1.4 $C_c^\infty$ 的稠密性问题 . . . . . | 156        |
| 22.2 $W_0^{1,p}$ . . . . .           | 156        |
| 22.2.1 定义 . . . . .                  | 156        |
| 22.2.2 零边界条件 . . . . .               | 156        |
| 22.2.3 截断逼近 . . . . .                | 156        |
| 22.2.4 与迹的关系 . . . . .               | 156        |
| 22.3 延拓算子 . . . . .                  | 157        |
| 22.3.1 半空间反射 . . . . .               | 157        |

|              |                                 |            |
|--------------|---------------------------------|------------|
| 22.3.2       | Lipschitz 区域                    | 157        |
| 22.3.3       | 延拓算子                            | 157        |
| 22.3.4       | 有界延拓                            | 157        |
| 22.4         | 局部化                             | 157        |
| 22.4.1       | 截断函数                            | 157        |
| 22.4.2       | 单位分解                            | 157        |
| 22.4.3       | 局部 Sobolev 空间                   | 157        |
| 22.4.4       | 局部估计                            | 157        |
| <b>第二十三章</b> | <b>迹理论与分数阶 Sobolev 空间</b>       | <b>158</b> |
| 23.1         | Sobolev 迹                       | 158        |
| 23.1.1       | 光滑函数的边界限制                       | 158        |
| 23.1.2       | 迹算子                             | 158        |
| 23.1.3       | $W^{1,p}$ 的迹                    | 158        |
| 23.1.4       | 零迹与 $W_0^{1,p}$                 | 158        |
| 23.2         | 分数阶 Sobolev 空间                  | 158        |
| 23.2.1       | Slobodeckij 半范数                 | 158        |
| 23.2.2       | $W^{s,p}, 0 < s < 1$            | 158        |
| 23.2.3       | 基本嵌入                            | 158        |
| 23.2.4       | 光滑函数的稠密性                        | 158        |
| 23.3         | Lipschitz 边界上的迹空间               | 159        |
| 23.3.1       | 局部图表示                           | 159        |
| 23.3.2       | 半空间迹定理                          | 159        |
| 23.3.3       | 迹的满射性与右逆                        | 159        |
| 23.4*        | 高阶迹理论                           | 159        |
| 23.4.1       | $W^{k,p}$ 的边界数据                 | 159        |
| 23.4.2       | 法向导数                            | 159        |
| 23.4.3       | Besov 空间作为自然迹空间的预告              | 159        |
| <b>第二十四章</b> | <b>Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入</b> | <b>160</b> |
| 24.1         | Poincaré 型不等式                   | 160        |
| 24.1.1       | 平均值版本                           | 160        |
| 24.1.2       | 零边界版本                           | 160        |
| 24.1.3       | Poincaré–Wirtinger 不等式          | 160        |
| 24.1.4       | 局部形式                            | 160        |
| 24.2         | Sobolev 不等式                     | 160        |
| 24.2.1       | $p < n$                         | 160        |
| 24.2.2       | 临界指数                            | 160        |
| 24.2.3       | Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式 | 160        |
| 24.2.4       | 缩放                              | 160        |
| 24.3         | Morrey 理论                       | 161        |

|               |                        |            |
|---------------|------------------------|------------|
| 24.3.1        | $p > n$                | 161        |
| 24.3.2        | Hölder 连续性             | 161        |
| 24.3.3        | Morrey 不等式             | 161        |
| 24.3.4        | 精确代表                   | 161        |
| 24.4          | 高阶 Sobolev 嵌入          | 161        |
| 24.4.1        | 高阶导数                   | 161        |
| 24.4.2        | Hölder 空间              | 161        |
| 24.4.3        | 整数阶与非整数阶               | 161        |
| 24.5*         | 临界嵌入                   | 161        |
| 24.5.1        | $p = n$                | 161        |
| 24.5.2        | Trudinger–Moser 不等式    | 161        |
| 24.5.3        | Morrey–Campanato 观点    | 161        |
| 24.5.4        | 临界现象                   | 161        |
| <b>第二十五章</b>  | <b>Sobolev 空间中的紧性</b>  | <b>163</b> |
| 25.1          | $L^p$ 中的平移判据           | 163        |
| 25.1.1        | 平移连续性                  | 163        |
| 25.1.2        | Fréchet–Kolmogorov 定理  | 163        |
| 25.1.3        | 紧性与支集控制                | 163        |
| 25.2          | Rellich–Kondrachov 定理  | 163        |
| 25.2.1        | 有界区域                   | 163        |
| 25.2.2        | 次临界嵌入                  | 163        |
| 25.2.3        | 边界条件                   | 163        |
| 25.2.4        | 高阶版本                   | 163        |
| 25.3          | 弱收敛方法                  | 163        |
| 25.3.1        | 有界序列                   | 163        |
| 25.3.2        | 弱极限                    | 164        |
| 25.3.3        | 强收敛的恢复                 | 164        |
| 25.3.4        | 变分问题中的应用               | 164        |
| <b>第二十六章*</b> | <b>Sobolev 容量与精细性质</b> | <b>165</b> |
| 26.1          | $p$ -容量                | 165        |
| 26.1.1        | 定义                     | 165        |
| 26.1.2        | 单调性                    | 165        |
| 26.1.3        | 次可加性                   | 165        |
| 26.1.4        | 容量零集                   | 165        |
| 26.2          | 拟处处性质                  | 165        |
| 26.2.1        | 拟处处                    | 165        |
| 26.2.2        | 拟连续代表                  | 165        |
| 26.2.3        | 拟连续代表的唯一性              | 165        |
| 26.2.4        | Sobolev 函数的精细代表        | 165        |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 26.3 容量与 Hausdorff 测度           | 166        |
| 26.3.1 维数估计                     | 166        |
| 26.3.2 零容量集                     | 166        |
| 26.3.3 奇异集                      | 166        |
| 26.3.4 临界维数                     | 166        |
| 26.4 精细拓扑                       | 166        |
| 26.4.1 稀薄性                      | 166        |
| 26.4.2 精细连续性                    | 166        |
| 26.4.3 Wiener 型思想               | 166        |
| 26.4.4 势论联系                     | 166        |
| <b>第二十七章 BV 函数与有限周长集合</b>       | <b>167</b> |
| 27.1 BV 函数                      | 167        |
| 27.1.1 分布导数为 Radon 测度           | 167        |
| 27.1.2 全变差                      | 167        |
| 27.1.3 BV 范数                    | 167        |
| 27.1.4 基本例子                     | 167        |
| 27.2 BV 的逼近与紧性                  | 167        |
| 27.2.1 光滑逼近                     | 167        |
| 27.2.2 下半连续性                    | 167        |
| 27.2.3 BV 紧性定理                  | 167        |
| 27.2.4 弱-* 收敛                   | 167        |
| 27.3 BV 的余面积公式                  | 168        |
| 27.3.1 超水平集                     | 168        |
| 27.3.2 周长                       | 168        |
| 27.3.3 余面积公式                    | 168        |
| 27.3.4 Cavalieri 型公式            | 168        |
| 27.4 有限周长集合                     | 168        |
| 27.4.1 周长测度                     | 168        |
| 27.4.2 测度论内部与外部                 | 168        |
| 27.4.3 测度论边界                    | 168        |
| 27.4.4 约化边界                     | 168        |
| 27.4.5 测度论法向                    | 168        |
| 27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构 | 168        |
| 27.5.1 Gauss–Green 公式           | 168        |
| 27.5.2 约化边界的可整流性                | 168        |
| 27.5.3 De Giorgi 结构定理           | 169        |
| 27.5.4 周长测度的表示                  | 169        |
| 27.6 等周不等式                      | 169        |
| 27.6.1 BV 形式                    | 169        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 27.6.2 有限周长集合形式 . . . . .          | 169        |
| 27.6.3 Sobolev 与等周不等式的联系 . . . . . | 169        |
| <b>第二十八章* BV 函数的精细结构</b>           | <b>170</b> |
| 28.1 精确代表与近似极限 . . . . .           | 170        |
| 28.1.1 近似上、下极限 . . . . .           | 170        |
| 28.1.2 近似连续点 . . . . .             | 170        |
| 28.1.3 不连续点集 . . . . .             | 170        |
| 28.2 跳跃集 . . . . .                 | 170        |
| 28.2.1 跳跃点 . . . . .               | 170        |
| 28.2.2 单侧近似极限 . . . . .            | 170        |
| 28.2.3 跳跃法向量 . . . . .             | 170        |
| 28.2.4 $J_u$ 的可整流性 . . . . .       | 170        |
| 28.3 导数测度的分解 . . . . .             | 170        |
| 28.3.1 绝对连续部分 . . . . .            | 170        |
| 28.3.2 跳跃部分 . . . . .              | 171        |
| 28.3.3 Cantor 部分 . . . . .         | 171        |
| 28.4 SBV 与自由间断问题概览 . . . . .       | 171        |
| 28.4.1 特殊有界变差函数 . . . . .          | 171        |
| 28.4.2 Mumford–Shah 型能量 . . . . .  | 171        |
| 28.4.3 紧性 . . . . .                | 171        |
| 28.4.4 变分法中的位置 . . . . .           | 171        |
| <b>附录</b>                          | <b>173</b> |
| 附录 A1 拓扑与度量空间基础                    | 173        |
| 附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式        | 174        |
| 附录 C1 泛函分析补充                       | 175        |
| 附录 D1 高阶几何测度论与流                    | 176        |
| 后记                                 | a          |
| 参考文献                               | c          |
| 中文索引                               | e          |
| 外文索引                               | g          |
| 符号索引                               | i          |



# 第一编 测度与 Lebesgue 积分





# 本编导读

待填充。

# 第一章 集合系、可测空间与可测映射

测度并不先验地要求定义在所有子集上。为了使可数极限过程与测量相容，我们首先指定一族对补集和可数并封闭的集合，并在其上讨论大小。本章先建立这种集合语言，再说明如何从区间、矩形或映射反像等少量数据生成最小的可测结构。随后证明  $\pi$ - $\lambda$  定理和单调类定理，把生成元上的验证推广到完整的  $\sigma$ -代数；最后定义可测空间、可测映射、迹结构与乘积结构。整章只使用集合论、映射与初等拓扑，不预先调用测度或积分。

## 本章目标

- 区分集合环、集合代数与  $\sigma$ -代数，能判断有限闭性与可数闭性的差别；
- 掌握集合列的上、下极限，并能核验反像与各种集合运算相容；
- 能使用最小性比较不同生成族，理解初始  $\sigma$ -代数和可数生成性；
- 能完整复述  $\pi$ - $\lambda$  定理与单调类定理中两次闭性推广的逻辑；
- 能通过生成元、实值阈值和坐标分量判定映射的可测性；
- 理解迹  $\sigma$ -代数不要求所取子集原先可测，并掌握乘积结构的最小性。

## 阅读提示

本章只以基本集合运算、映射反像和实直线的通常拓扑为先修内容。第 1.1 节建立封闭性语言，第 1.2 节回答如何从生成元构造结构；这两节是后半章的前提。第 1.3 节给出两种核心推广原理，证明中的“先固定一个变量，再固定另一个变量”应重点掌握。第 1.4 节把前述工具用于映射、限制与乘积。首次阅读不应跳过第 1.3 节中  $\pi$ - $\lambda$  定理的证明，因为下一章的测度延拓唯一性将直接复用这种闭性论证；函数型单调类定理则将在后续积分与函数空间理论中反复出现。

## 1.1 集合系

长度可以先在区间上定义，面积可以先在长方形上定义，但极限过程很快会产生远比区间和长方形复杂的集合。若想让“把集合拆开再求和”与“用可数个简单集合逼近”成为合法操作，就必须预先规定一族对相应集合运算封闭的集合。本节比较三种常用的封闭层次，并把以后反复使用的集合列运算整理出来。

设  $X$  是一个非空集合， $\mathcal{P}(X)$  表示  $X$  的幂集。以下各集合系都是  $\mathcal{P}(X)$  的子集；未特别说明时，补集均相对于  $X$  而言。

### 1.1.1 集合环

若一族集合要容许有限次切割与拼接，它至少应当对差和并封闭。这正是集合环所表达的要求。

**定义 1.1.1.** 集合环 (ring of sets) 是非空集合族  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ，满足对任意  $A, B \in \mathcal{R}$ ,

$$A \setminus B \in \mathcal{R}, \quad A \cup B \in \mathcal{R}.$$

定义不要求全集  $X$  属于  $\mathcal{R}$ 。例如，在无界空间上只讨论有限个有界区间的并时，整个空间未必是允许的集合；集合环恰好能够保留这种“局部”性质。

**命题 1.1.2.** 若  $\mathcal{R}$  是集合环，则  $\emptyset \in \mathcal{R}$ ，并且  $\mathcal{R}$  对正整数个集合的交、任意有限并、相对补和对称差封闭。

证明. 取  $A \in \mathcal{R}$ 。由  $A \setminus A = \emptyset$  得  $\emptyset \in \mathcal{R}$ 。对任意  $A, B \in \mathcal{R}$ ，差运算的封闭性给出  $A \setminus B \in \mathcal{R}$ ，再次作差便有

$$A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{R}.$$

而

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

也属于  $\mathcal{R}$ 。二元并已包含在定义中；对集合个数作归纳，就得到有限交与有限并的封闭性。□

两个例子说明“环”为什么不等同于幂集。第一， $X$  的全体有限子集构成集合环；当  $X$  无限时，它不含全集。第二，实直线上有限个有界半开区间  $[a, b)$  的不交并（连同空集）构成集合环：把两个这样的集合的全部端点排成有限序列后，它们的并与差仍可写成有限个半开区间的不交并。这个例子将在下一章成为长度的自然定义域。

集合环只保证有限运算。若  $X = \mathbb{N}$ ，全体有限子集组成的集合环包含每个单点集，但这些单点集的可数并是  $X$ ，不再属于该环。因此，不能从“含有每个  $A_n$ ”推断“含有  $\bigcup_n A_n$ ”。

### 1.1.2 集合代数

当讨论范围固定为整个  $X$  时，允许的集合通常也应当连同其补集一起出现。若一个集合环还包含全集  $X$ ，那么差运算立即给出补集封闭性；这样的集合环正是集合代数。

**定义 1.1.3.** 集合代数 (algebra of sets) 是集合族  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ，满足  $X \in \mathcal{A}$ ，且对任意  $A, B \in \mathcal{A}$ ,

$$A^c \in \mathcal{A}, \quad A \cup B \in \mathcal{A}.$$

由 De Morgan 公式，集合代数也对有限交封闭。下面的等价刻画说明，集合代数与集合环之间只差“是否含有全集”这一项。

**命题 1.1.4.** 集合族  $\mathcal{A}$  是集合代数，当且仅当它是含  $X$  的集合环。

证明. 若  $\mathcal{A}$  是集合代数, 则

$$A \setminus B = A \cap B^c = (A^c \cup B)^c \in \mathcal{A},$$

所以  $\mathcal{A}$  对差封闭; 它本来就对并封闭, 因而是集合环。

反之, 若  $\mathcal{A}$  是集合环且  $X \in \mathcal{A}$ , 则对  $A \in \mathcal{A}$  有

$$A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}.$$

再结合集合环对并的封闭性, 便得到集合代数的全部条件。  $\square$

若  $X$  是无限集合, 则全体有限子集及其补集组成一个集合代数, 称为有限-余有限集合代数。它比有限子集环多了全集与余有限集, 但一般仍不对可数并封闭。例如在  $X = \mathbb{N}$  中, 每个偶数单点集都在这个代数里, 而它们的并既非有限集, 也非余有限集。这同时表明, 从集合环到集合代数、再到下一小节的  $\sigma$ -代数, 两次加强都可能是严格的。

### 1.1.3 $\sigma$ -代数

分析中的逼近通常要进行可数多步。若允许的集合只对有限并封闭, 取极限时就可能离开原有集合系。 $\sigma$ -代数正是把有限封闭提升到可数封闭所得的结构。

**定义 1.1.5.**  $\sigma$ -代数 (sigma-algebra) 是集合族  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{D}(X)$ , 满足:

1.  $X \in \mathcal{F}$ ;
2. 若  $A \in \mathcal{F}$ , 则  $A^c \in \mathcal{F}$ ;
3. 若  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ , 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ 。

字母  $\sigma$  提醒我们第三条允许的是可数次并, 而不是任意并。这一限制至关重要: 可数运算足以容纳数列极限, 却仍能保留有用的结构; 若要求任意并封闭并同时要求补集封闭, 在含有所有单点集时往往会直接得到整个幂集。

**命题 1.1.6.** 每个  $\sigma$ -代数都是集合代数, 并且对可数交封闭; 从  $\mathcal{F}$  中的一个集合删去  $\mathcal{F}$  中可数多个集合的并后, 所得集合仍属于  $\mathcal{F}$ 。具体地, 若  $A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ , 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

证明. 由 定义 1.1.5 的前两条,  $\emptyset = X^c \in \mathcal{F}$ 。把有限列的尾部补成空集, 可知  $\mathcal{F}$  对有限并封闭。由 De Morgan 公式,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{F}.$$

最后,

$$A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \in \mathcal{F}.$$

因此  $\mathcal{F}$  满足集合代数的条件, 并具有所述更强闭性。  $\square$

集合列还有两种在分析中十分常见的极限。定义

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

一个点属于下极限，当且仅当它从某一项起始终属于  $A_n$ ；它属于上极限，当且仅当它属于无穷多个  $A_n$ 。所以总有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

若二者相等，就把公共集合记为  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。由 [命题 1.1.6](#)，当每个  $A_n \in \mathcal{F}$  时，上、下极限也属于  $\mathcal{F}$ 。这正是  $\sigma$ -代数适合处理集合逼近的第一个迹象。

三类集合系之间的关系是

$$\sigma\text{-代数} \implies \text{集合代数} \implies \text{集合环},$$

而前面的有限子集例和有限-余有限例说明逆向蕴含均不成立。

### 1.1.4 集合系的基本运算

构造新集合系时，交运算比并运算可靠。其原因是：某个集合若属于每一个给定的  $\sigma$ -代数，那么对它作补或与同类集合作可数并，结果仍同时属于每一个  $\sigma$ -代数。

**命题 1.1.7.** 任意非空族  $X$  上的  $\sigma$ -代数的交仍为  $X$  上的  $\sigma$ -代数。

证明. 设  $\{\mathcal{F}_i : i \in I\}$  是一族  $\sigma$ -代数，并令

$$\mathcal{F} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i.$$

全集  $X$  属于每个  $\mathcal{F}_i$ ，故属于  $\mathcal{F}$ 。若  $A \in \mathcal{F}$ ，则对每个  $i \in I$  都有  $A \in \mathcal{F}_i$ ，从而  $A^c \in \mathcal{F}_i$ ；于是  $A^c \in \mathcal{F}$ 。若每个  $A_n \in \mathcal{F}$ ，则对每个  $i \in I$ ，可数并  $\bigcup_n A_n$  都属于  $\mathcal{F}_i$ ，因而属于它们的交。三条公理均成立。□

并运算没有这一性质。令  $X = \{1, 2, 3\}$ ，并取

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}, \quad \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, X\}.$$

二者都是  $\sigma$ -代数，但  $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$  不含  $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\}$ ，所以不是  $\sigma$ -代数。下一节的生成构造不是简单取并，而是取所有可能上界的交；这恰好利用了 [命题 1.1.7](#)。

最后记录反像运算。它是可测映射定义能够正常工作的集合论原因。

**命题 1.1.8.** 设  $f : X \rightarrow Y$  是任意映射。对  $B, B_1, B_2, \dots \subseteq Y$ ，有

$$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c, \quad f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n),$$

以及

$$f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n).$$

第一式中的  $B^c$  是  $B$  相对于  $Y$  的补集, 右端的补集则相对于  $X$  取得。因而, 若  $\mathcal{B}$  是  $Y$  上的  $\sigma$ -代数, 则

$$f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\}$$

是  $X$  上的  $\sigma$ -代数。

证明. 对任意  $x \in X$ , 逐一展开 “ $x$  属于等式左端” 的含义, 便得到前三个等式。例如,  $x \in f^{-1}(B^c)$  当且仅当  $f(x) \notin B$ , 这又当且仅当  $x \notin f^{-1}(B)$ 。

由于  $f^{-1}(Y) = X$ , 反像族含有  $X$ ; 前三个等式又分别给出补集与可数并的封闭性, 故该反像族是  $\sigma$ -代数。□

这里不能把反像随意换成像。一般映射的像虽与并运算交换, 却未必与补或交交换。例如常值映射可能把两个不交集合送到同一个点。以后所有可测性判别都使用反像, 正是为了保留本命题中的完整运算规则。

## 1.2 生成的 $\sigma$ -代数

直接列出一个  $\sigma$ -代数的全部成员通常既困难又没有必要。在实际问题中, 我们往往只知道哪些基本集合必须被纳入, 例如直线上的区间、乘积空间中的矩形, 或若干映射的反像。其余集合应由补与可数并被强迫产生。本节把这种 “只加入必需集合” 的最小化思想写成精确定义。

### 1.2.1 由集合族生成的 $\sigma$ -代数

**定义 1.2.1.** 设  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(X)$ 。由  $\mathcal{E}$  生成的  $\sigma$ -代数 (generated sigma-algebra) 定义为

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \{ \mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数, 且 } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \}.$$

集合族  $\mathcal{E}$  称为  $\sigma(\mathcal{E})$  的一个生成族 (generating family)。

定义式右端所交的集合族非空, 因为幂集  $\mathcal{D}(X)$  总是包含  $\mathcal{E}$  的  $\sigma$ -代数。由命题 1.1.7, 这个交本身仍是  $\sigma$ -代数, 所以定义确实给出了所需对象。

**命题 1.2.2.**  $\sigma(\mathcal{E})$  是包含  $\mathcal{E}$  的唯一最小  $\sigma$ -代数。也就是说, 它包含  $\mathcal{E}$ , 并且对任一  $X$  上的  $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}$ ,

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \implies \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}.$$

证明. 定义式中参与求交的每个  $\sigma$ -代数都包含  $\mathcal{E}$ , 故它们的交也包含  $\mathcal{E}$ 。若  $\mathcal{F}$  是任意一个包含  $\mathcal{E}$  的  $\sigma$ -代数, 它就是该交中的一个成员, 因而  $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}$ 。这给出最小性。若有两个对象都满足这一最小性, 它们彼此包含, 故相等。□

生成运算有几条常用而容易混淆的规则。它们允许我们更换生成族, 而不必尝试逐个描述生成后的全部集合。

**命题 1.2.3.** 设  $\mathcal{E}, \mathcal{G} \subseteq \mathcal{D}(X)$ , 则:

1. 若  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$ , 则  $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$ ;

2.  $\sigma(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(\mathcal{E})$ ;

3. 若  $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{G})$  且  $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$ , 则  $\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{G})$ 。

证明. 若  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$ , 则  $\sigma(\mathcal{G})$  是一个包含  $\mathcal{E}$  的  $\sigma$ -代数, 由最小性得到第一条。由于  $\sigma(\mathcal{E})$  已是  $\sigma$ -代数, 对它再作生成不会增加新集合, 第二条成立。第三条分别使用第一条与第二条:

$$\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(\mathcal{G}),$$

交换  $\mathcal{E}$  与  $\mathcal{G}$  后得到反向包含。 □

最简单的非平凡例子是单个集合  $A \subseteq X$ 。若  $A$  既非空集也非全集, 则

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

更一般地, 有限个集合  $A_1, \dots, A_n$  会把  $X$  切成至多  $2^n$  个互不相交的部分: 每一部分都从  $A_j$  与  $A_j^c$  中各选一个再取交。生成的  $\sigma$ -代数恰好由这些非空部分的任意并组成。这个有限模型提示了生成的含义: 生成元记录若干“是或否”的问题, 生成的  $\sigma$ -代数则包含仅凭这些答案能够区分的全部集合。

必须注意,  $\sigma(\mathcal{E})$  一般不能通过有限多次补与并得到。即使  $\mathcal{E}$  很简单, 可数运算仍可能产生无限层次; 生成定义给出的首先是最小性, 而不是一张可执行的有限运算清单。第 1.3 节将给出更有效的比较方法。

### 1.2.2 初始 $\sigma$ -代数

设对每个  $i \in I$ , 映射  $f_i: X \rightarrow Y_i$  的目标集合  $Y_i$  上已经给定  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B}_i$ 。若想让  $X$  上的结构能够识别条件  $f_i(x) \in B$  是否成立, 就必须把反像  $f_i^{-1}(B)$  纳入其中。由这些反像生成的最小结构有一个专门名称。

**定义 1.2.4.** 映射族  $\{f_i: i \in I\}$  诱导的**初始  $\sigma$ -代数** (initial sigma-algebra) 是

$$\sigma(f_i: i \in I) = \sigma(\{f_i^{-1}(B) : i \in I, B \in \mathcal{B}_i\}).$$

第 1.4 节将把“所有上述反像都属于源空间的  $\sigma$ -代数”称为映射  $f_i$  的可测性。这里的定义本身只使用已经建立的反像与生成运算, 不依赖这一术语。

**命题 1.2.5.** 初始  $\sigma$ -代数是  $X$  上具有下述性质的最小  $\sigma$ -代数  $\mathcal{A}$ : 对每个  $i \in I$  及每个  $B \in \mathcal{B}_i$ , 均有

$$f_i^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

证明. 定义中的每个反像都属于  $\sigma(f_i: i \in I)$ , 所以这一  $\sigma$ -代数具有所述性质。反之, 若  $\mathcal{A}$  具有该性质, 它便包含定义中的整个生成族; 由 [命题 1.2.2](#),  $\sigma(f_i: i \in I) \subseteq \mathcal{A}$ 。 □

例如, 对集合  $A \subseteq X$ , 定义它的**示性函数** (indicator function)

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$



令  $f = \mathbf{1}_A : X \rightarrow \{0, 1\}$ , 并在  $\{0, 1\}$  上取幂集作为  $\sigma$ -代数。若  $A$  非平凡, 则

$$\sigma(f) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

函数  $f$  只能回答“点是否属于  $A$ ”这一个问题, 初始  $\sigma$ -代数也恰好只保留这一信息。若加入更多函数, 生成的结构可能变细; 这与 命题 1.2.3 的单调性一致。

### 1.2.3 可数生成性

一个  $\sigma$ -代数可能包含不可数多个集合, 却仍可由可数多个基本集合完全确定。若待验证性质所对应的集合族具有足以从生成元推广到  $\sigma$ -代数的闭性, 核验工作便可先缩减到一张可枚举的生成元清单。

**定义 1.2.6.** 若存在至多可数的集合族  $\mathcal{E}$  使  $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E})$ , 则称  $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}$  是**可数生成的** (countably generated)。

“可数生成”不等于“只有可数多个成员”。例如, 只要  $X$  含有可数个互不相同的点  $x_n$ , 由单点集  $\{x_n\}$  生成的  $\sigma$ -代数就包含

$$\bigcup_{n \in J} \{x_n\} \quad (J \subseteq \mathbb{N}).$$

不同的  $J$  给出不同的集合, 所以这个  $\sigma$ -代数至少有  $2^{\aleph_0}$  个成员。可数性约束的是生成信息, 而不是生成结果的基数。

**命题 1.2.7.** 设指标集  $I$  至多可数, 并且每个  $\mathcal{B}_i$  都可数生成, 则初始  $\sigma$ -代数  $\sigma(f_i : i \in I)$  也可数生成。

证明. 对每个  $i \in I$ , 选取一个至多可数的生成族  $\mathcal{E}_i$ , 使  $\mathcal{B}_i = \sigma(\mathcal{E}_i)$ 。令

$$\mathcal{G} = \sigma(\{f_i^{-1}(E) : i \in I, E \in \mathcal{E}_i\}).$$

由于可数个可数集之并仍至多可数,  $\mathcal{G}$  可数生成。对固定的  $i$ , 考虑

$$\mathcal{D}_i = \{B \subseteq Y_i : f_i^{-1}(B) \in \mathcal{G}\}.$$

由 命题 1.1.8,  $\mathcal{D}_i$  是  $Y_i$  上的  $\sigma$ -代数; 按  $\mathcal{G}$  的定义, 它包含  $\mathcal{E}_i$ 。因此  $\mathcal{B}_i = \sigma(\mathcal{E}_i) \subseteq \mathcal{D}_i$ , 即每个  $B \in \mathcal{B}_i$  的反像都属于  $\mathcal{G}$ 。由初始结构的最小性,  $\sigma(f_i : i \in I) \subseteq \mathcal{G}$ 。反向包含直接来自两边生成族的包含关系, 故二者相等。□

指标集可数这一条件不能无故删去。不可数多个映射可能分别带来彼此不同的新反像集合, 而这些集合未必能压缩成可数生成族。命题的真正内容是: 每个目标只需可数份测试, 再对至多可数个目标汇总, 所得测试仍然可枚举。

### 1.2.4 Borel $\sigma$ -代数

拓扑和测度论关心同一个底集, 却使用不同的封闭运算。拓扑对任意并和有限交封闭;  $\sigma$ -代数对补和可数并封闭。把拓扑中的开集作为生成元, 就得到连接二者的标准可测结构。



**定义 1.2.8.** 设  $(S, \tau)$  是拓扑空间。由全部开集生成的  $\sigma$ -代数

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\tau)$$

称为  $S$  上的 **Borel  $\sigma$ -代数** (Borel sigma-algebra)；其中的集合称为 **Borel 集** (Borel set)。

闭集是开集的补，因而都是 Borel 集；开集的可数交、闭集的可数并也都是 Borel 集。Borel 集远不止这些最初几层，但在证明某个集合是 Borel 集时，通常只需展示它如何由已知 Borel 集经过可数运算得到。

**命题 1.2.9.** 若拓扑空间  $S$  有可数拓扑基  $\mathcal{U} = \{U_1, U_2, \dots\}$ ，则

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\mathcal{U}).$$

特别地， $\mathcal{B}(S)$  可数生成。

证明. 每个基元素都是开集，所以  $\sigma(\mathcal{U}) \subseteq \mathcal{B}(S)$ 。反过来，任一开集  $G$  等于所有满足  $U_n \subseteq G$  的基元素之并。由于  $\mathcal{U}$  可数，这个并至多可数，故  $G \in \sigma(\mathcal{U})$ 。于是  $\sigma(\mathcal{U})$  包含全部开集；再由生成结构的最小性得到反向包含。□

**定理 1.2.10.** 实直线上的 Borel  $\sigma$ -代数满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}) = \sigma(\{(-\infty, q) : q \in \mathbb{Q}\}).$$

证明. 有理端点开区间构成  $\mathbb{R}$  的可数拓扑基。对任意开集  $G$  和任意  $x \in G$ ，可以在  $x$  两侧选取有理数  $a < b$ ，使  $x \in (a, b) \subseteq G$ 。因此第一个等式由 命题 1.2.9 得到。

记有理开半直线生成的  $\sigma$ -代数为  $\mathcal{G}$ 。每个  $(-\infty, q)$  都是开集，故  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。若  $a < b$  为有理数，则

$$(-\infty, a] = \bigcap_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} (-\infty, q), \quad (a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a].$$

第一个交可数，因为有理数集可数。因此每个有理端点开区间都属于  $\mathcal{G}$ ，第一个等式遂给出  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{G}$ 。□

同一论证表明， $\mathbb{R}^d$  的 Borel  $\sigma$ -代数由有理端点开矩形生成，因为这些矩形构成可数拓扑基。第 1.4 节将利用这一事实识别欧氏空间的乘积结构。

**命题 1.2.11.** 若  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ，则相对于目标空间  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  有

$$\sigma(f) = \sigma(\{f^{-1}((-\infty, q)) : q \in \mathbb{Q}\}).$$

因此，由单个实值函数诱导的初始  $\sigma$ -代数可数生成。

证明. 右端的每个生成元都出现在  $\sigma(f)$  的定义中，所以右端包含于左端。反过来，把右端记为  $\mathcal{D}$ ，并令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{G}\}.$$

由 命题 1.1.8,  $\mathcal{D}$  是  $\mathbb{R}$  上的  $\sigma$ -代数；它包含每个有理开半直线。由 定理 1.2.10,  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}$ 。所以每个 Borel 集的反像都属于  $\mathcal{G}$ ，进而  $\sigma(f) \subseteq \mathcal{G}$ 。□

这个证明展示了一种以后会反复使用的“生成元判别”：先把具有目标性质的集合收集成一个  $\sigma$ -代数，再检查它包含生成族。第 1.3 节将把这一策略推广到闭性更弱、因而更容易验证的集合类。

### 1.3 $\pi$ -系统、 $\lambda$ -系统与单调类

生成定义把一个庞大的  $\sigma$ -代数压缩到少量生成元，但还留下一个实际困难：为了证明某种性质对  $\sigma(\mathcal{E})$  中所有集合成立，若把满足该性质的集合记为  $\mathcal{D}$ ，直接验证  $\mathcal{D}$  是  $\sigma$ -代数往往要求过强。更常见的情形是， $\mathcal{D}$  只对差与不交并封闭，或只对单调极限封闭。本节两个推广定理说明，只要生成元本身具有适当的有限运算结构，这些较弱闭性已经足够。

#### 1.3.1 $\pi$ -系统

许多自然生成族不对补或并封闭，却对有限交封闭。区间相交仍是同类区间或空集，矩形相交仍是同类矩形或空集；这一条简单闭性正是后面论证所需的有限结构。

**定义 1.3.1.** 非空集合族  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}(X)$  若对任意  $A, B \in \mathcal{C}$  都有  $A \cap B \in \mathcal{C}$ ，则称为  $\pi$ -系统 (pi-system)。

例如，实直线上的闭半直线族  $\{(-\infty, t] : t \in \mathbb{R}\}$  是  $\pi$ -系统，因为两个成员的交取较小端点。若  $\mathcal{A}$  与  $\mathcal{B}$  分别是  $X$  与  $Y$  上的集合代数，则矩形族

$$\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$$

也是  $\pi$ -系统，这是因为

$$(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2).$$

另一方面，所有开区间组成的集合族若不把空集计入，就不是  $\pi$ -系统：两个不相交开区间的交为空集。使用  $\pi$ -系统时不能只凭“形状相交后不变”而忽略退化情形。

#### 1.3.2 Dynkin $\lambda$ -系统

$\sigma$ -代数要求任意可数并封闭，而很多等式只能自然地对两两不交的集合求和。Dynkin  $\lambda$ -系统把公理调整为“嵌套差与不交可数并”，因而特别适合承载这类性质。

**定义 1.3.2.** Dynkin  $\lambda$ -系统 (Dynkin lambda-system) 是集合族  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}(X)$ ，满足：

1.  $X \in \mathcal{D}$ ;
2. 若  $A, B \in \mathcal{D}$  且  $A \subseteq B$ ，则  $B \setminus A \in \mathcal{D}$ ;
3. 若  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{D}$  两两不交，则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$ 。

对任意集合族  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(X)$ ，所有包含  $\mathcal{E}$  的  $\lambda$ -系统之交仍是  $\lambda$ -系统。把这个交记为  $\lambda(\mathcal{E})$ ，称为由  $\mathcal{E}$  生成的  $\lambda$ -系统。幂集保证参与求交的集合族非空。

**命题 1.3.3.** 若  $\mathcal{D}$  是  $\lambda$ -系统，则  $\emptyset \in \mathcal{D}$ ，并且  $\mathcal{D}$  对补集、递增并和递减交封闭。

证明. 在定义的第二条中取  $A = B = X$ , 得到  $\emptyset \in \mathcal{D}$ ; 取  $B = X$ , 得到  $X \setminus A = A^c \in \mathcal{D}$ .

若  $A_n \uparrow A$ , 令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

由嵌套差的封闭性, 每个  $B_n \in \mathcal{D}$ ; 这些集合两两不交, 且  $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n = A$ . 所以  $A \in \mathcal{D}$ . 若  $A_n \downarrow A$ , 则  $A_n^c \uparrow A^c$ , 先使用补集与递增并的封闭性得到  $A^c \in \mathcal{D}$ , 再取一次补便有  $A \in \mathcal{D}$ .  $\square$

每个  $\sigma$ -代数都是  $\lambda$ -系统, 反过来却不成立. 令

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, \quad \mathcal{D} = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}\}.$$

除相等情形外,  $\mathcal{D}$  中两个嵌套成员只能以下端为空集或以上端为  $X$ , 故其差仍在  $\mathcal{D}$  中. 两个非空、非全集的成员只有在互补时才不交, 此时其并为  $X$ . 所以  $\mathcal{D}$  是  $\lambda$ -系统. 然而  $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{D}$ , 所以它不是  $\pi$ -系统, 更不是  $\sigma$ -代数. 缺失的有限交正是下一定理需要由生成元补回的结构.

### 1.3.3 $\pi$ - $\lambda$ 定理

**定理 1.3.4.** 若  $\mathcal{D}$  是  $X$  上的  $\pi$ -系统, 则

$$\lambda(\mathcal{D}) = \sigma(\mathcal{D}).$$

因而, 任何包含  $\mathcal{D}$  的  $\lambda$ -系统都包含  $\sigma(\mathcal{D})$ .

证明. 令  $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{D})$ . 证明的关键是把  $\mathcal{D}$  的交封闭性分两次推广到  $\mathcal{D}$ .

先固定  $P \in \mathcal{D}$ , 并令

$$\mathcal{D}_P = \{A \in \mathcal{D} : A \cap P \in \mathcal{D}\}.$$

下面逐条验证  $\mathcal{D}_P$  是  $\lambda$ -系统. 由于  $X \cap P = P \in \mathcal{D}$ , 有  $X \in \mathcal{D}_P$ . 若  $A, B \in \mathcal{D}_P$  且  $A \subseteq B$ , 则  $B \setminus A \in \mathcal{D}$ , 并且

$$(B \setminus A) \cap P = (B \cap P) \setminus (A \cap P) \in \mathcal{D},$$

故  $B \setminus A \in \mathcal{D}_P$ . 若  $A_n \in \mathcal{D}_P$  两两不交, 则  $A_n \cap P$  也两两不交, 而且

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap P = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap P) \in \mathcal{D}.$$

同时,  $\bigcup_n A_n \in \mathcal{D}$ , 所以不交可数并仍属于  $\mathcal{D}_P$ .

对每个  $Q \in \mathcal{D}$ ,  $\pi$ -系统的交封闭性给出  $Q \cap P \in \mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}$ , 从而  $Q \in \mathcal{D}_P$ . 因此  $\mathcal{D}_P$  是包含  $\mathcal{D}$  的  $\lambda$ -系统. 由  $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{D})$  的最小性,  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_P$ ; 定义又给出反向包含, 故  $\mathcal{D}_P = \mathcal{D}$ . 于是

$$A \cap P \in \mathcal{D} \quad (A \in \mathcal{D}, P \in \mathcal{D}).$$

再固定  $A \in \mathcal{D}$ , 令

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathcal{D} : A \cap B \in \mathcal{D}\}.$$

这里  $A \cap X = A \in \mathcal{D}$ , 故  $X \in \mathcal{D}_A$ . 若  $B, C \in \mathcal{D}_A$  且  $B \subseteq C$ , 则  $C \setminus B \in \mathcal{D}$ , 并且

$$A \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus (A \cap B),$$

右端属于  $\mathcal{D}$ , 所以  $C \setminus B \in \mathcal{D}_A$ . 若  $B_n \in \mathcal{D}_A$  两两不交, 则  $\bigcup_n B_n \in \mathcal{D}$ , 且

$$A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n) \in \mathcal{D}.$$

所以  $\mathcal{D}_A$  是  $\lambda$ -系统. 上一段已经表明每个  $P \in \mathcal{D}$  都属于  $\mathcal{D}_A$ , 最小性再次给出  $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}$ . 因此  $\mathcal{D}$  对有限交封闭.

由 命题 1.3.3,  $\mathcal{D}$  对补集封闭; 结合有限交, 它也对有限并封闭. 对任意  $A_n \in \mathcal{D}$ , 令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

有限并、补集与有限交的封闭性保证  $B_n = A_n \cap (\bigcup_{k < n} A_k)^c \in \mathcal{D}$ , 而  $B_n$  两两不交且  $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$ . 由  $\lambda$ -系统的第三条, 任意可数并仍在  $\mathcal{D}$  中. 于是  $\mathcal{D}$  是包含  $\mathcal{D}$  的  $\sigma$ -代数, 故  $\sigma(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{D}$ . 另一方面,  $\sigma(\mathcal{D})$  本身是包含  $\mathcal{D}$  的  $\lambda$ -系统, 所以  $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$ . 两边相等.  $\square$

证明中两次固定集合并非重复: 第一次把“与生成元相交”推广到  $\mathcal{D}$ , 第二次再把另一个变量也从生成元推广到  $\mathcal{D}$ . 这类“双重推广”会在乘积空间和测度唯一性中多次出现.

下面给出一个完全不使用测度概念的应用, 它已经体现了生成元判别的力量.

**推论 1.3.5.** 设  $f, g: Z \rightarrow Y$  是两个映射,  $\mathcal{D}$  是  $Y$  上的  $\pi$ -系统. 若

$$f^{-1}(P) = g^{-1}(P) \quad (P \in \mathcal{D}),$$

则该等式对每个  $B \in \sigma(\mathcal{D})$  都成立.

证明. 令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) = g^{-1}(B)\}.$$

两个映射对  $Y$  的反像都是  $Z$ , 故  $Y \in \mathcal{D}$ . 若  $A \subseteq B$  且二者属于  $\mathcal{D}$ , 则反像与差运算交换, 从而

$$f^{-1}(B \setminus A) = f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(A) = g^{-1}(B) \setminus g^{-1}(A) = g^{-1}(B \setminus A).$$

对两两不交集的可数并, 反像与并交换, 同样保留等式. 因此  $\mathcal{D}$  是包含  $\mathcal{D}$  的  $\lambda$ -系统, 结论由 定理 1.3.4 得到.  $\square$

本章没有提前给出“概率测度的唯一性”作为推论, 因为测度及其可数可加性要到下一章才正式定义. 届时只需把“两个测度取值相等的集合”验证为  $\lambda$ -系统, 就能直接调用本节定理.

### 1.3.4 单调类定理

$\lambda$ -系统仍然要求处理两两不交的可数并。有些极限论证天然只对递增列或递减列成立，这就引出更弱的单调闭性。

**定义 1.3.6.** 集合族  $M \subseteq \mathcal{P}(X)$  若满足：当  $A_n \uparrow A$  或  $A_n \downarrow A$ ，且每个  $A_n \in M$  时，均有  $A \in M$ ，则称  $M$  为**单调类** (monotone class)。

这里  $A_n \uparrow A$  表示  $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$  且  $\bigcup_n A_n = A$ ；记号  $A_n \downarrow A$  表示反向包含且  $\bigcap_n A_n = A$ 。所有包含集合族  $\mathcal{E}$  的单调类之交仍是单调类；把这个最小单调类记为  $M(\mathcal{E})$ 。

单调类本身可能非常弱。例如在有限集合  $X = \{1, 2\}$  上，集合族  $\{\{1\}\}$  已是单调类，因为其中的单调集合列只能是常值列；但它既不含  $X$ ，也不对补封闭。因此，下一定理要求起始生成族是集合代数，而不能是任意集合族。

**定理 1.3.7.** 若  $\mathcal{A}$  是  $X$  上的集合代数，则

$$M(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A}).$$

证明. 记  $M = M(\mathcal{A})$ 。第一步证明  $M$  对补集封闭。令

$$C = \{E \in M : E^c \in M\}.$$

若  $E_n \uparrow E$  且每个  $E_n \in C$ ，则  $E_n^c \downarrow E^c$ ；由  $M$  的单调闭性， $E^c \in M$ ，故  $E \in C$ 。递减列的情形相同，只是补集列递增。因此  $C$  是单调类。集合代数  $\mathcal{A}$  对补封闭，所以  $\mathcal{A} \subseteq C$ 。由  $M$  的最小性， $M \subseteq C$ ，即  $C = M$ 。

第二步证明有限交封闭。先固定  $A \in \mathcal{A}$ ，令

$$M_A = \{E \in M : A \cap E \in M\}.$$

交运算与递增并、递减交交换，所以  $M_A$  是单调类。对任意  $B \in \mathcal{A}$ ，集合代数的交封闭性给出  $A \cap B \in \mathcal{A} \subseteq M$ ，故  $\mathcal{A} \subseteq M_A$ 。最小性推出  $M_A = M$ 。于是

$$A \cap E \in M \quad (A \in \mathcal{A}, E \in M).$$

现在固定  $E \in M$ ，再令

$$N_E = \{F \in M : F \cap E \in M\}.$$

同样地， $N_E$  是单调类；刚得到的结论说明  $\mathcal{A} \subseteq N_E$ ，故  $N_E = M$ 。所以任意两个  $M$  中的集合相交后仍属于  $M$ 。

由补集和有限交的封闭性， $M$  对有限并封闭。若  $E_1, E_2, \dots \in M$ ，则有限并  $F_n = \bigcup_{k=1}^n E_k$  属于  $M$ ，且  $F_n \uparrow \bigcup_k E_k$ 。单调闭性给出  $\bigcup_k E_k \in M$ 。于是  $M$  是包含  $\mathcal{A}$  的  $\sigma$ -代数，因而  $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq M$ 。反过来， $\sigma(\mathcal{A})$  自身是包含  $\mathcal{A}$  的单调类；最小性给出  $M \subseteq \sigma(\mathcal{A})$ 。□

### 1.3.5 函数型单调类定理

集合型定理可以转化为函数上的推广工具。本小节的陈述会先使用下一节才正式命名的 Borel 可测性；第一次阅读时可以先掌握结论，读完第 1.4.3 小节后再返回核对

证明。为避免预先使用后章才系统发展的简单函数理论，下面把所需逼近直接写成有限个示性函数之和。

**定理 1.3.8.** 设  $\mathcal{A}$  是  $X$  上的集合代数， $\mathcal{H}$  是一族有界实值函数，满足：

1.  $\mathcal{H}$  是实向量空间；
2. 对每个  $A \in \mathcal{A}$ ，示性函数  $\mathbf{1}_A$  属于  $\mathcal{H}$ ；
3. 若  $0 \leq h_n \uparrow h$ ，每个  $h_n \in \mathcal{H}$ ，且  $h$  有界，则  $h \in \mathcal{H}$ 。

那么，每个满足

$$f^{-1}(B) \in \sigma(\mathcal{A}) \quad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

的有界实值函数  $f$  都属于  $\mathcal{H}$ 。

证明。先从函数类恢复一个集合类：

$$\mathcal{D} = \{E \subseteq X : \mathbf{1}_E \in \mathcal{H}\}.$$

假设  $E_n \uparrow E$  且每个  $E_n \in \mathcal{D}$ 。则  $0 \leq \mathbf{1}_{E_n} \uparrow \mathbf{1}_E$ ，由第三条得到  $E \in \mathcal{D}$ 。又因  $X \in \mathcal{A}$ ，第二条给出常值函数  $\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$ 。所以  $E \in \mathcal{D}$  时  $\mathbf{1}_{E^c} = \mathbf{1}_X - \mathbf{1}_E \in \mathcal{H}$ ，即  $\mathcal{D}$  对补集封闭。若  $E_n \downarrow E$ ，则  $E_n^c \uparrow E^c$ ；先对补集列使用递增情形，再取补，得到  $E \in \mathcal{D}$ 。因此  $\mathcal{D}$  是包含  $\mathcal{A}$  的单调类。由 定理 1.3.7，

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{D}.$$

换言之，每个  $\sigma(\mathcal{A})$  中集合的示性函数都属于  $\mathcal{H}$ 。

现设  $f$  非负、有界，并满足定理中的反像条件。选取正整数  $M$ ，使  $f(x) < M$  对所有  $x \in X$  成立。定义

$$s_n = 2^{-n} \sum_{k=1}^{M2^n} \mathbf{1}_{\{f \geq k2^{-n}\}}.$$

闭半直线  $[k2^{-n}, \infty)$  是 Borel 集，所以求和中的每个集合都属于  $\sigma(\mathcal{A})$ ；上一段与向量空间性质给出  $s_n \in \mathcal{H}$ 。对每个  $x \in X$ ，

$$s_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor,$$

故  $0 \leq s_n \uparrow f$ ，且所有  $s_n$  都由  $M$  一致控制。第三条于是给出  $f \in \mathcal{H}$ 。

最后令  $f$  为任意满足反像条件的有界实值函数。选取常数  $c$ ，使  $f + c \geq 0$ 。对任意 Borel 集  $B$ ，有

$$(f + c)^{-1}(B) = f^{-1}(B - c),$$

平移  $x \mapsto x - c$  是  $\mathbb{R}$  的同胚，故  $B - c$  仍是 Borel 集。因此  $f + c$  满足同一反像条件。由非负情形， $f + c \in \mathcal{H}$ 。又因  $c\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$ ，向量空间性质给出  $f = (f + c) - c\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$ 。□

定理中的反像条件将在下一节被正式称为 Borel 可测性。它的典型用法是：先对集合代数中的示性函数验证一个等式，再检查等式对线性组合和有界单调极限保持，便能将等式推广到所有有界可测函数。该证明只使用集合论闭性，不依赖积分理论。



## 1.4 可测空间与可测映射

前面三节解决了“哪些子集可以由基本集合经过可数运算得到”以及“怎样把生成元上的性质推广出去”。现在把底集与选定的  $\sigma$ -代数视为一个整体，并考察映射如何传递这种结构。核心选择是使用反像：由 命题 1.1.8，反像严格保持补、交与并，所以无需给映射附加单射或满射条件。

### 1.4.1 可测空间

**定义 1.4.1.** 由集合  $X$  与其上的  $\sigma$ -代数  $\mathcal{A}$  组成的二元组  $(X, \mathcal{A})$  称为**可测空间** (measurable space)。 $\mathcal{A}$  的成员称为该空间的**可测集** (measurable set)。

可测性总是相对于指定结构而言，而不是子集自身的绝对属性。同一个底集  $X$  至少有两个极端结构。最粗的是  $\{\emptyset, X\}$ ，称为**平凡  $\sigma$ -代数** (trivial sigma-algebra)，只区分“不发生”与“必然发生”；最细的是  $\mathcal{D}(X)$ ，称为**离散  $\sigma$ -代数** (discrete sigma-algebra)，它把每个子集都视为可测。夹在二者之间的结构记录了不同精细程度的信息。

从一个可测空间取任意子集时，即使该子集在原空间中不可测，仍可以把原有可测集限制到它上面。

**定义 1.4.2.** 设  $(X, \mathcal{A})$  是可测空间， $E \subseteq X$  是任意子集。 $E$  上的**迹  $\sigma$ -代数** (trace sigma-algebra) 定义为

$$\mathcal{A}|_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}.$$

这里不要求  $E \in \mathcal{A}$ 。若预先增加这一要求，就会无故排除不可测子集上的相对可测结构；而下面的证明并不需要它。

**命题 1.4.3.** 对任意  $E \subseteq X$ ， $\mathcal{A}|_E$  是  $E$  上的  $\sigma$ -代数。自然嵌入

$$\iota : E \longrightarrow X, \quad \iota(x) = x,$$

满足

$$\iota^{-1}(A) = A \cap E \in \mathcal{A}|_E \quad (A \in \mathcal{A}).$$

证明. 由于  $E = X \cap E$ ，全集  $E$  属于  $\mathcal{A}|_E$ 。若  $A \cap E \in \mathcal{A}|_E$ ，它相对于  $E$  的补集为

$$E \setminus (A \cap E) = A^c \cap E \in \mathcal{A}|_E.$$

若  $A_n \cap E \in \mathcal{A}|_E$ ，则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap E) = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap E \in \mathcal{A}|_E.$$

所以迹集合族满足三条  $\sigma$ -代数公理。关于自然嵌入的等式由反像定义直接得到。  $\square$

### 1.4.2 可测映射

连续映射用开集的反像保持开性来定义。可测映射采用完全平行的方式，只把“开集”换成“可测集”。

**定义 1.4.4.** 设  $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$  是可测空间。映射  $f: X \rightarrow Y$  称为**可测映射** (measurable map), 若

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{对每个 } B \in \mathcal{B} \text{ 成立.}$$

定义同时涉及源与目标的结构。若目标带平凡  $\sigma$ -代数, 则任何映射都可测; 若源带离散  $\sigma$ -代数, 则任何映射也都可测。相反, 从平凡可测空间映入离散空间的映射通常不可测: 只要某个单点的反像既非空集也非全集, 可测性就失败。这些边界例说明, 省略  $\mathcal{A}$  或  $\mathcal{B}$  会使“ $f$  可测”失去明确含义。

当目标  $\sigma$ -代数由较小集合族生成时, 不必检验它的每一个成员。

**命题 1.4.5.** 设  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(Y)$  且  $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E})$ 。映射  $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$  可测, 当且仅当

$$f^{-1}(E) \in \mathcal{A} \quad (E \in \mathcal{E}).$$

证明. 必要性直接来自可测映射的定义。反过来, 假设所有生成元的反像都属于  $\mathcal{A}$ , 并令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

由 **命题 1.1.8**,  $\mathcal{D}$  是  $Y$  上的  $\sigma$ -代数。假设说明  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$ , 所以  $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{D}$ 。这正是  $f$  可测。  $\square$

这个命题也解释了 **定义 1.2.4** 的名称:  $\sigma(f_i : i \in I)$  恰是使每个  $f_i$  可测的最小源空间结构。

**命题 1.4.6.** 若

$$f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}), \quad g: (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$$

都可测, 则复合映射  $g \circ f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$  可测。

证明. 对任意  $C \in \mathcal{C}$ , 先由  $g$  可测得到  $g^{-1}(C) \in \mathcal{B}$ , 再由  $f$  可测得到

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathcal{A}.$$

因此复合映射满足定义。  $\square$

**命题 1.4.7.** 若  $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$  可测, 且  $E \subseteq X$ , 则限制映射

$$f|_E: (E, \mathcal{A}|_E) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$$

可测。特别地, **命题 1.4.3** 中的自然嵌入  $\iota: (E, \mathcal{A}|_E) \rightarrow (X, \mathcal{A})$  可测。

证明. 对  $B \in \mathcal{B}$ , 有

$$(f|_E)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap E.$$

由于  $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ , 右端属于  $\mathcal{A}|_E$ 。自然嵌入的结论也可由同一等式取  $f$  为  $X$  上的恒等映射得到。  $\square$

**命题 1.4.8.** 设  $A \subseteq X$ 。示性函数  $\mathbf{1}_A: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  可测, 当且仅当  $A \in \mathcal{A}$ 。

证明. 若  $\mathbf{1}_A$  可测, 则  $A = \mathbf{1}_A^{-1}((1/2, 3/2)) \in \mathcal{A}$ 。反之, 若  $A \in \mathcal{A}$ , 对任意 Borel 集  $B \subseteq \mathbb{R}$ , 反像  $\mathbf{1}_A^{-1}(B)$  只能是  $\emptyset, A, A^c, X$  四者之一, 因而属于  $\mathcal{A}$ 。  $\square$



### 1.4.3 Borel 可测映射

设  $(X, \mathcal{A})$  是可测空间,  $T$  是拓扑空间。若映射

$$f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (T, \mathcal{B}(T))$$

可测, 就称它为  $T$  值 **Borel 可测映射** (Borel measurable map); 当  $T = \mathbb{R}$  时, 也称为实值 Borel 可测函数。若源空间本身是拓扑空间  $S$  并赋予  $\mathcal{B}(S)$ , 仍简称  $f: S \rightarrow T$  为 Borel 可测映射。连续映射必然属于后一类, 但可测性只记录集合的反像, 不要求保持邻近关系, 所以它比连续性弱得多。

**命题 1.4.9.** 连续映射  $f: S \rightarrow T$  一定是 Borel 可测映射。

证明. 目标空间的 Borel  $\sigma$ -代数由开集生成。对任意开集  $U \subseteq T$ , 连续性给出开集  $f^{-1}(U) \subseteq S$ , 而开集属于  $\mathcal{B}(S)$ 。因此  $f$  对全部生成元满足反像条件, 结论由 命题 1.4.5 得到。□

反命题不成立。函数  $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  是 Borel 可测映射, 因为  $\mathbb{Q}$  是可数个闭单点集的并, 故为 Borel 集, 再用 命题 1.4.8 即可; 但每个开区间都同时含有有理数和无理数, 所以该函数在每一点都不连续。

对实值函数, 定理 1.2.10 把可测性进一步化成一族可数测试。

**命题 1.4.10.** 映射  $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$  Borel 可测, 当且仅当对每个  $q \in \mathbb{Q}$ ,

$$\{x \in X : f(x) < q\} \in \mathcal{A}.$$

当这一条件成立时, 对每个  $a \in \mathbb{R}$ , 集合

$$\{f < a\}, \quad \{f \leq a\}, \quad \{f > a\}, \quad \{f \geq a\}$$

也都属于  $\mathcal{A}$ 。

证明. 若  $f$  Borel 可测, 则每个开半直线的反像都可测, 必要性成立。反过来, 有理开半直线生成  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ , 所以充分性由 命题 1.4.5 得到。

对任意  $a \in \mathbb{R}$ , 选取有理数列  $q_n \downarrow a$  与  $r_n \uparrow a$ , 并要求每个  $q_n > a$ 、每个  $r_n < a$ 。于是

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < q_n\}, \quad \{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f < r_n\}.$$

由这两个等式,  $\{f \leq a\}$  与  $\{f < a\}$  可测; 再取补得到  $\{f > a\}$  与  $\{f \geq a\}$  可测。□

这个阈值判别也补全了 定理 1.3.8 与本节术语之间的接口: 该定理中的反像条件正是实值函数的 Borel 可测性。

### 1.4.4 乘积可测结构初步

要同时记录两个可测映射的取值，最自然的目标空间是笛卡儿积。我们希望两个坐标投影可测，又不希望无根据地加入更多集合；因此仍采用最小生成结构。

**定义 1.4.11.** 设  $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$  是可测空间。 $X \times Y$  上由全部可测矩形  $A \times B$ （其中  $A \in \mathcal{A}$ 、 $B \in \mathcal{B}$ ）生成的  $\sigma$ -代数

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$$

称为**乘积  $\sigma$ -代数**（product sigma-algebra）。

对有限多个可测空间  $(X_j, \mathcal{A}_j)$  ( $1 \leq j \leq d$ )，本书直接约定

$$\bigotimes_{j=1}^d \mathcal{A}_j = \sigma\left(\left\{\prod_{j=1}^d A_j : A_j \in \mathcal{A}_j\right\}\right).$$

因此有限重乘积记号不依赖未说明的括号结合方式。

矩形族对有限交封闭，所以是一个  $\pi$ -系统。它一般不是  $\sigma$ -代数：即使每一块都是矩形，两块矩形的并通常也不是单个矩形。因此定义中必须取生成的  $\sigma$ -代数，而不能只取矩形族本身。

**命题 1.4.12.** 坐标投影

$$\pi_X : (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad \pi_Y : (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$$

都可测。进一步，若

$$f : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}),$$

则配对映射

$$(f, g) : Z \rightarrow X \times Y, \quad z \mapsto (f(z), g(z))$$

可测，当且仅当  $f$  与  $g$  都可测。

**证明.** 对  $A \in \mathcal{A}$ ， $\pi_X^{-1}(A) = A \times Y$  是生成矩形，故投影  $\pi_X$  可测； $\pi_Y$  同理。

若  $f, g$  可测，则对每个生成矩形  $A \times B$  有

$$(f, g)^{-1}(A \times B) = f^{-1}(A) \cap g^{-1}(B) \in \mathcal{C}.$$

由生成元判别， $(f, g)$  可测。反过来，若配对映射可测，则

$$f = \pi_X \circ (f, g), \quad g = \pi_Y \circ (f, g).$$

投影可测，再用 **命题 1.4.6**，便知两个分量都可测。 □

由于

$$A \times B = (A \times Y) \cap (X \times B) = \pi_X^{-1}(A) \cap \pi_Y^{-1}(B),$$

乘积  $\sigma$ -代数也等于两个坐标投影诱导的初始  $\sigma$ -代数。这给出定义的另一个解释：它是使两个投影同时可测的最小结构。

**命题 1.4.13.** 对任意正整数  $d$ ,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ 个因子}}.$$

因此, 映射  $f = (f_1, \dots, f_d) : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}^d$  Borel 可测, 当且仅当每个分量  $f_j$  Borel 可测。

证明. 对  $1 \leq j \leq d$ , 坐标投影  $p_j : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  连续. 因此, 任一生成矩形都可写成

$$\prod_{j=1}^d B_j = \bigcap_{j=1}^d p_j^{-1}(B_j) \quad (B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

所以它属于  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ . 由生成的最小性,  $d$  重乘积  $\sigma$ -代数包含于  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ . 反过来, 有理端点开矩形构成  $\mathbb{R}^d$  的可数拓扑基, 并且每个这样的矩形都属于乘积  $\sigma$ -代数. 由命题 1.2.9, 全部 Borel 集都属于乘积  $\sigma$ -代数, 所述等式成立。

若  $f$  Borel 可测, 则每个分量  $f_j = p_j \circ f$  可测. 反过来, 若每个  $f_j$  可测, 则任一生成矩形的反像为

$$f^{-1}\left(\prod_{j=1}^d B_j\right) = \bigcap_{j=1}^d f_j^{-1}(B_j) \in \mathcal{A}.$$

生成元判别给出  $f$  的可测性。 □

例如, 若实值函数  $f, g$  Borel 可测, 则配对映射  $(f, g)$  可测. 连续函数

$$(u, v) \mapsto \max\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto \min\{u, v\}$$

与它复合后仍可测, 所以  $\max\{f, g\}$  与  $\min\{f, g\}$  都可测. 这里的证明路线具有代表性: 先把多个分量组合成乘积映射, 再与一个已知连续的运算复合。

本节只建立乘积空间的可测结构, 尚未在其上构造乘积测度. 结构与测度应分两步完成: 前者回答哪些集合允许被测量, 后者才回答这些集合有多大。

### 本章小结

集合环容许有限切割与拼接; 含有全集  $X$  的集合环自动对补集封闭, 因而正是集合代数;  $\sigma$ -代数再把有限并提升为可数并, 因而也容许可数交、集合列的上极限与下极限. 三者的区别不在名称, 而在它们能够安全承受哪些极限操作. 反像与补、交、并严格交换, 这是本章各种映射构造的共同基础。

由集合族  $\mathcal{E}$  生成的  $\sigma$ -代数  $\sigma(\mathcal{E})$  是包含  $\mathcal{E}$  的最小可测结构. 初始  $\sigma$ -代数把基本数据写成映射反像; 可数生成性则表明, 一个含有大量集合的结构仍可能由可枚举的测试完全决定. 具有可数拓扑基的空间, 其 Borel  $\sigma$ -代数可数生成; 在实直线上, 只需使用有理端点区间或有理开半直线。

$\pi$ - $\lambda$  定理把  $\pi$ -系统提供的有限交闭性与  $\lambda$ -系统提供的嵌套差、不交可数并闭性结合起来, 最终恢复整个生成  $\sigma$ -代数. 单调类定理从集合代数出发, 只依靠递增并与递减交也能得到同一结构; 函数型版本再把示性函数上的结论推广到有界可测函数。

这些定理的共同方法不是“在所有可测集上逐个验证”，而是构造满足目标性质的集合类并核对它的闭性。

可测映射由目标可测集的反像定义。若目标结构已有生成族，只需检验生成元；对实值函数，只需检验集合  $\{f < q\}$  ( $q \in \mathbb{Q}$ )。迹  $\sigma$ -代数把结构限制到任意子集，乘积  $\sigma$ -代数则是使坐标投影可测的最小结构。在欧氏空间中，乘积 Borel 结构与通常拓扑产生的 Borel 结构一致，因此向量值映射的可测性可以逐分量判定。

## 习题

**习题 1.1.** 完成三类集合系的基本辨析。

1. 设  $\mathcal{R}$  是  $X$  上的集合环。证明对任意  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{R}$ ，集合  $\bigcap_{k=1}^n A_k$  与  $\Delta_{k=1}^n A_k$  都属于  $\mathcal{R}$ 。
2. 分别构造“不是集合代数的集合环”和“不是  $\sigma$ -代数的集合代数”。

解. 对第一问, 命题 1.1.2 已给出二元交与二元对称差的封闭性。假设前  $n-1$  个集合的交属于  $\mathcal{R}$ , 再与  $A_n$  相交即可完成交运算的归纳; 对称差同理, 因为  $(A_1 \Delta \dots \Delta A_{n-1}) \Delta A_n$  仍是一次二元对称差。

对第二问, 取  $X = \mathbb{N}$ 。全体有限子集组成集合环, 但不含  $X$ , 所以不是集合代数。全体有限集与余有限集组成集合代数; 然而每个单点集  $\{2n\}$  都属于它, 而  $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{2n\}$  是偶数集, 既非有限集也非余有限集。因此这个集合代数不是  $\sigma$ -代数。□

**习题 1.2.** 设  $X$  为不可数集合,  $\mathcal{C}$  为所有可数子集及其补集组成的集合族。证明  $\mathcal{C}$  是  $\sigma$ -代数, 并证明

$$\sigma(\{\{x\} : x \in X\}) = \mathcal{C}.$$

再说明不可数假设在“可数集”和“余可数集”两类互不混同这一点上有何作用。

解. 全集的补集为空集, 故  $X \in \mathcal{C}$ ; 可数集的补集余可数, 余可数集的补集可数, 所以  $\mathcal{C}$  对补封闭。设  $C_n \in \mathcal{C}$ 。若每个  $C_n$  都可数, 则  $\bigcup_n C_n$  可数。若某个  $C_m$  余可数, 则

$$X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \subseteq X \setminus C_m,$$

右端可数, 故该并余可数。因此  $\mathcal{C}$  是  $\sigma$ -代数。

它包含全部单点集, 故  $\sigma(\{\{x\} : x \in X\}) \subseteq \mathcal{C}$ 。反过来, 每个可数集是至多可数个单点集的并, 因而属于左端; 再取补就得到全部余可数集。两边相等。

当  $X$  不可数时, 一个集合不可能同时可数且余可数, 因为否则  $X$  是两个可数集的并。这个假设让两类集合形成真正的二分; 上述  $\sigma$ -代数证明本身在  $X$  可数时仍能进行, 但此时每个子集都可数,  $\mathcal{C}$  退化为  $\mathcal{P}(X)$ 。□

**习题 1.3.** 设  $A_1, \dots, A_n \subseteq X$ 。对  $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0, 1\}^n$ , 约定

$$A_j^{(1)} = A_j, \quad A_j^{(0)} = A_j^c, \quad C_\varepsilon = \bigcap_{j=1}^n A_j^{(\varepsilon_j)}.$$

证明所有非空的  $C_\varepsilon$  构成  $X$  的一个有限分割, 并证明

$$\sigma(A_1, \dots, A_n) = \{\text{这些非空 } C_\varepsilon \text{ 的任意并}\}.$$

这里  $\sigma(A_1, \dots, A_n)$  表示  $\sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$ 。

解. 对任意  $x \in X$ , 令  $\varepsilon_j = 1$  当且仅当  $x \in A_j$ , 便有  $x \in C_\varepsilon$ , 所以这些集合覆盖  $X$ . 若  $\varepsilon \neq \delta$ , 存在  $j$  使  $\varepsilon_j \neq \delta_j$ ; 此时一个交集要求点属于  $A_j$ , 另一个要求点属于  $A_j^c$ , 故二者不交。

每个  $C_\varepsilon$  由生成元及其补集作有限交得到, 所以属于  $\sigma(A_1, \dots, A_n)$ . 非空块至多  $2^n$  个, 它们的任意并实际上是有限并, 因而也属于该  $\sigma$ -代数. 反过来, 所有块的任意并组成一个  $\sigma$ -代数: 取补只是在有限分割中选择其余块, 可数并也只是把被选择的块汇总. 每个  $A_j$  恰是所有满足  $\varepsilon_j = 1$  的块之并, 所以该  $\sigma$ -代数包含全部生成元. 由最小性, 两边相等.  $\square$

**习题 1.4.** 设  $\mathcal{D}$  是  $\mathbb{R}$  上的  $\lambda$ -系统, 并且对每个  $q \in \mathbb{Q}$  都有  $(-\infty, q] \in \mathcal{D}$ . 证明

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}.$$

解. 令  $\mathcal{D} = \{(-\infty, q] : q \in \mathbb{Q}\}$ . 两个成员之交等于端点较小的成员, 所以  $\mathcal{D}$  是  $\pi$ -系统. 由  $\pi$ - $\lambda$  定理,  $\sigma(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{D}$ .

还需识别  $\sigma(\mathcal{D})$ . 对  $q \in \mathbb{Q}$ ,

$$(-\infty, q) = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r < q}} (-\infty, r],$$

所以所有有理开半直线都属于  $\sigma(\mathcal{D})$ . 由定理 1.2.10,  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$ . 反向包含来自每个闭半直线都是 Borel 集, 故实际上  $\sigma(\mathcal{D}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , 所求包含成立.  $\square$

**习题 1.5.** 令  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ , 并设

$$\mathcal{D} = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}\}.$$

逐条验证  $\mathcal{D}$  是  $\lambda$ -系统但不是  $\sigma$ -代数. 再令  $Y = \{1, 2\}$ , 说明包含  $\{1\}$  的最小单调类不等于  $\sigma(\{\{1\}\})$ , 并指出这为何不与单调类定理矛盾.

解. 集合  $X$  在  $\mathcal{D}$  中, 且六个成员按

$$\emptyset^c = X, \quad \{1, 2\}^c = \{3, 4\}, \quad \{1, 3\}^c = \{2, 4\}$$

两两配对. 若  $A \subseteq B$  且  $A, B \in \mathcal{D}$ , 则必有  $A = \emptyset$ ,  $B = X$  或  $A = B$ ; 相应差集分别为  $B$ ,  $A^c$  或  $\emptyset$ , 仍在  $\mathcal{D}$  中. 两两不交的非空非全成员只有上述互补对, 其并为  $X$ . 所以  $\mathcal{D}$  是  $\lambda$ -系统. 但  $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{D}$ , 故它不是  $\sigma$ -代数.

在有限集合  $Y$  上, 成员全为  $\{1\}$  的单调集合列只能是常值列, 所以单元素集合族  $\{\{1\}\}$  本身已经是单调类. 于是它就是包含  $\{1\}$  的最小单调类. 另一方面,

$$\sigma(\{\{1\}\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, Y\}.$$

单调类定理要求起始集合族是集合代数, 而  $\{\{1\}\}$  不是集合代数, 因此没有矛盾.  $\square$

**习题 1.6.** 设  $\mathcal{A}$  是  $X$  上的集合代数,  $\mathcal{U}$  是全体从  $(X, \sigma(\mathcal{A}))$  到  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  的有界可测函数组成的向量空间。设  $L, K: \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$  是线性映射, 并且各自在  $\mathcal{U}$  中对递增列单调连续: 若  $f_n, f \in \mathcal{U}$  且  $0 \leq f_n \uparrow f$ , 则

$$L(f_n) \rightarrow L(f), \quad K(f_n) \rightarrow K(f).$$

若  $L(\mathbf{1}_A) = K(\mathbf{1}_A)$  对每个  $A \in \mathcal{A}$  成立, 证明  $L(f) = K(f)$  对每个  $f \in \mathcal{U}$  成立。

解. 令

$$\mathcal{H} = \{f \in \mathcal{U} : L(f) = K(f)\}.$$

由  $L, K$  的线性,  $\mathcal{H}$  是实向量空间。题设给出  $\mathbf{1}_A \in \mathcal{H}$  对每个  $A \in \mathcal{A}$  成立。若  $0 \leq f_n \uparrow f$ , 每个  $f_n \in \mathcal{H}$ , 且  $f$  有界, 则对任意  $a \in \mathbb{R}$  有

$$\{f > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\} \in \sigma(\mathcal{A}).$$

由阈值判别, 函数  $f$  可测; 结合有界性可知  $f \in \mathcal{U}$ 。现在可以使用题设的单调连续性, 得到

$$L(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} K(f_n) = K(f),$$

所以  $f \in \mathcal{H}$ 。  $\mathcal{H}$  满足 定理 1.3.8 的全部条件, 因而包含每个从  $(X, \sigma(\mathcal{A}))$  到  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  的有界可测函数, 即  $\mathcal{H} = \mathcal{U}$ 。  $\square$

**习题 1.7.** 设  $(X, \mathcal{A})$  是可测空间,  $F \subseteq E \subseteq X$ 。

1. 证明  $(A|_E)|_F = A|_F$ 。

2. 若  $E \in \mathcal{A}$ , 证明

$$A|_E = \{A \in \mathcal{A} : A \subseteq E\}.$$

构造一个  $E \notin \mathcal{A}$  的例子, 使右端不再等于  $A|_E$ 。

3. 若  $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$  可测, 直接由定义证明  $f|_F: (F, A|_F) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$  可测。

解. 第一问中,

$$(A|_E)|_F = \{(A \cap E) \cap F : A \in \mathcal{A}\} = \{A \cap F : A \in \mathcal{A}\} = A|_F,$$

其中使用了  $F \subseteq E$ 。

若  $E \in \mathcal{A}$ , 则每个  $A \cap E$  同时属于  $\mathcal{A}$  且包含于  $E$ , 所以左端包含于右端; 若  $B \in \mathcal{A}$  且  $B \subseteq E$ , 则  $B = B \cap E \in A|_E$ , 故反向包含成立。若  $X = \{1, 2\}$ 、 $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$ 、 $E = \{1\}$ , 则  $A|_E = \{\emptyset, E\}$ , 而  $\{A \in \mathcal{A} : A \subseteq E\} = \{\emptyset\}$ , 两者不等。

对第三问, 任取  $B \in \mathcal{B}$ 。由于  $f$  可测,  $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ , 从而

$$(f|_F)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap F \in A|_F.$$

这正是限制映射的可测性。  $\square$



**习题 1.8.** 设  $f, g : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$  都是 Borel 可测映射。

1. 证明  $(f, g) : X \rightarrow \mathbb{R}^2$  Borel 可测。
2. 证明  $\max\{f, g\}$ 、 $\min\{f, g\}$  与  $f - g$  都 Borel 可测。
3. 证明  $\{x \in X : f(x) < g(x)\} \in \mathcal{A}$ 。

解. 由 命题 1.4.13,  $\mathbb{R}^2$  的 Borel 结构就是两个实直线 Borel 结构的乘积; 再由 命题 1.4.12, 两个分量可测推出  $(f, g)$  可测。

函数

$$(u, v) \mapsto \max\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto \min\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto u - v$$

在  $\mathbb{R}^2$  上连续, 因而 Borel 可测。分别与  $(f, g)$  复合, 并使用复合可测性, 便得到第二问。

由第二问,  $h = f - g$  可测。阈值判别给出

$$\{x : f(x) < g(x)\} = \{x : h(x) < 0\} \in \mathcal{A}.$$

□

**习题 1.9.** 设  $f : X \rightarrow Y$  是任意映射,  $(A_n)_{n \geq 1}$  是  $Y$  中的一列子集。证明

$$f^{-1}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(A_n), \quad f^{-1}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(A_n).$$

再分别用“从某项起始终属于”和“属于无穷多项”解释这两个等式。

解. 由反像与可数并、可数交交换,

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} f^{-1}(A_k), \\ f^{-1}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} f^{-1}(A_k). \end{aligned}$$

右端分别就是反像列的下极限与上极限。逐点地看,  $x$  属于第一个等式的任一边, 当且仅当  $f(x)$  从某项起始终属于  $A_n$ ; 它属于第二个等式的任一边, 当且仅当  $f(x)$  属于无穷多个  $A_n$ 。□

**习题 1.10.** 对每个  $i \in I$ , 设  $(Y_i, \mathcal{B}_i)$  是可测空间,  $f_i : W \rightarrow Y_i$  是映射, 并令  $\mathcal{G} = \sigma(f_i : i \in I)$ 。证明: 对任意可测空间  $(Z, \mathcal{C})$  和映射  $g : Z \rightarrow W$ , 映射

$$g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (W, \mathcal{G})$$

可测, 当且仅当每个复合映射  $f_i \circ g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (Y_i, \mathcal{B}_i)$  都可测。

再设  $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$  是可测空间。把上述结论用于两个坐标投影, 证明

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\pi_X, \pi_Y),$$

并证明：若

$$u : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad v : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}),$$

则配对映射

$$(u, v) : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$$

可测，当且仅当两个分量  $u, v$  都可测。

解. 若  $g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (W, \mathcal{G})$  可测，则每个  $f_i : (W, \mathcal{G}) \rightarrow (Y_i, \mathcal{B}_i)$  都由初始结构的定义可测，故复合映射  $f_i \circ g$  可测。

反过来， $\mathcal{G}$  由集合

$$f_i^{-1}(B) \quad (i \in I, B \in \mathcal{B}_i)$$

生成，而

$$g^{-1}(f_i^{-1}(B)) = (f_i \circ g)^{-1}(B) \in \mathcal{C}.$$

生成元判别于是给出  $g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (W, \mathcal{G})$  的可测性。

对坐标投影有

$$\pi_X^{-1}(A) = A \times Y, \quad \pi_Y^{-1}(B) = X \times B.$$

这些集合都是可测矩形，所以  $\sigma(\pi_X, \pi_Y) \subseteq \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 。反过来，每个生成矩形满足

$$A \times B = \pi_X^{-1}(A) \cap \pi_Y^{-1}(B),$$

故  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \subseteq \sigma(\pi_X, \pi_Y)$ ，两者相等。最后对映射  $(u, v) : Z \rightarrow X \times Y$  使用刚才证明的判别；两个坐标复合分别是  $\pi_X \circ (u, v) = u$  与  $\pi_Y \circ (u, v) = v$ ，结论随即成立。  $\square$



## 第二章 测度、外测度与测度延拓

本章研究怎样从“互不重叠的部分应当相加”这一原则得到稳定的大小概念。前半章从已有测度出发，建立可数次可加性、单调集合列的连续性、限制、子空间与完备化；后半章从覆盖代价出发，完整证明 Carathéodory 可测集形成  $\sigma$ -代数，并把集合环或半环上的前测度延拓到所生成的  $\sigma$ -代数。存在性来自外测度构造， $\sigma$ -有限性则通过有限质量局部化保证唯一性。

### 本章目标

- 理解可数可加性如何推出单调性、可数次可加性以及从上、从下连续性；
- 能区分限制测度与子空间测度，并完整核验测度完备化的良定义和最小性；
- 能从覆盖代价构造外测度，并证明 Carathéodory 可测集形成  $\sigma$ -代数、限制外测度成为完备测度；
- 能追踪前测度、外测度和最终延拓各自的定义域，证明延拓的存在性与  $\sigma$ -有限条件下的唯一性；
- 能把半环上的前测度良定义地扩张到有限不交并组成的集合环，并识别缺少  $\sigma$ -有限性时的不唯一现象。

### 阅读提示

本章分成两条相接的路线。第 2.1–2.2 节回答“已有测度可以做什么”，其关键是可数可加性和零测误差；第 2.3–2.4 节回答“尚无测度时怎样构造”，其主链为

基本集合上的前测度  $\rightarrow$  幂集上的外测度  $\rightarrow$  Carathéodory 可测域上的完备测度。

阅读时应始终标明集合属于半环、集合环、生成的  $\sigma$ -代数还是幂集；许多看似短小的错误都来自定义域混用。第一章的  $\pi$ - $\lambda$  定理只在唯一性证明中使用，其余核心步骤均在本章内完成。

### 2.1 测度

长度、面积、质量和概率来自不同问题，却遵守同一条相加原则：若干部分互不重叠时，整体的大小应等于各部分大小之和。只要求有限个部分相加还不够。例如把一个区间分成可数个小区间、把一个事件分成可数种互斥结果时，必须控制无限分割。测度以可数可加性为公理，把这些情形放在同一框架中。

### 2.1.1 测度的定义

**定义 2.1.1.** 设  $(X, \mathcal{A})$  是可测空间。映射

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

若满足  $\mu(\emptyset) = 0$ ，并且对任意两两不交的可测集列  $(A_n)_{n \geq 1}$  有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

其中第二个条件称为**可数可加性**(countable additivity), 则称为  $\mathcal{A}$  上的**测度**(measure), 并把  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  称为**测度空间** (measure space)。

值域允许出现  $\infty$ 。这不是技术上的宽松，而是为了让无界空间的长度、无限集合的计数等自然对象仍是测度。扩展非负实数的加法没有歧义，但  $\infty - \infty$  没有定义；凡是把测度等式改写成差公式，都要检查被减去的量是否有限。

先看三个可以直接核验的模型。任意可测空间上都有零测度  $\mu(A) = 0$ 。若  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ ，则

$$\mu(A) = \#A$$

给出**计数测度** (counting measure)，这里把所有无限集合的值统一记为  $\infty$ 。固定一点  $x_0 \in X$  后，公式

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases}$$

给出集中在  $x_0$  的**点质量** (point mass)。更一般地，若  $X$  至多可数，并为每个  $x \in X$  指定权重  $w(x) \geq 0$ ，则

$$\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x)$$

是幂集上的测度。由于各项非负，这个和可理解为所有有限部分和的上确界，因而不依赖枚举顺序。

**命题 2.1.2.** 设  $\mu$  是  $(X, \mathcal{A})$  上的测度， $A, B \in \mathcal{A}$ ，且  $A \subseteq B$ 。则

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

若另有  $\mu(A) < \infty$ ，则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

证明。集合  $B$  有不交分解

$$B = A \dot{\cup} (B \setminus A).$$

在可数可加性中令其余各项为空集，便得到

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

第一条结论来自  $\mu(B \setminus A) \geq 0$ 。当  $\mu(A) < \infty$  时，上式可以合法移项，得到差公式。□

这段证明也说明，测度首先是有限可加的。反过来，有限可加性不能代替定义中的可数可加性：在  $\mathbb{N}$  上令每个有限集的“大小”为 0，令每个余有限集的“大小”为 1，就在有限集与余有限集组成的代数上得到有限可加函数；但把  $\mathbb{N}$  分成单点集后，可数可加性会要求  $1 = \sum_n 0$ ，因而失败。

### 2.1.2 有限可加性与可数次可加性

实际使用中，集合往往彼此重叠。把重叠部分按首次出现的位置分配出去，就能把可数可加性转化为可数次可加性（countable subadditivity）。

**命题 2.1.3.** 对任意可测集列  $(A_n)_{n \geq 1}$ ，有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

若  $A_1, \dots, A_m$  两两不交，则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right) = \sum_{k=1}^m \mu(A_k).$$

证明. 令  $B_1 = A_1$ ，并对  $n \geq 2$  令

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k.$$

各集合  $B_n$  两两不交，满足  $B_n \subseteq A_n$ ，并且

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

由可数可加性和单调性，

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(B_n) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

有限不交并的等式可在定义中把其余集合取为空集得到。□

**命题 2.1.4.** 对任意  $A, B \in \mathcal{A}$ ，有

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

这里的等式在扩展非负实数中理解；它没有使用  $\infty - \infty$ 。

证明. 由两个不交分解

$$A \cup B = A \dot{\cup} (B \setminus A), \quad B = (A \cap B) \dot{\cup} (B \setminus A),$$

可得

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

整个推导只用非负量的加法，所以即使两边都为  $\infty$  也成立。□

例如，对事件  $A, B$  而言，这个等式说明把  $\mu(A)$  与  $\mu(B)$  直接相加会把交集计算两次。对三个以上集合也可以继续分解，但在本书中通常直接使用可数次可加性，而不展开冗长的容斥公式。

### 2.1.3 从下连续性与从上连续性

可数可加性还控制单调集合列的极限, 相应性质称为**从下连续性** (continuity from below) 与**从上连续性** (continuity from above)。这里  $A_n \uparrow A$  表示  $A_n \subseteq A_{n+1}$  且  $A = \bigcup_n A_n$ ; 类似地,  $A_n \downarrow A$  表示  $A_{n+1} \subseteq A_n$  且  $A = \bigcap_n A_n$ 。

**定理 2.1.5.** 设  $(A_n)$  是可测集列。

1. 若  $A_n \uparrow A$ , 则  $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$ ;
2. 若  $A_n \downarrow A$ , 且  $\mu(A_1) < \infty$ , 则  $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$ 。

证明. 对 (1), 令  $B_1 = A_1$ , 并对  $n \geq 2$  令  $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ 。集合  $B_n$  两两不交, 而且

$$A_n = \bigcup_{k=1}^n B_k, \quad A = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k.$$

因此

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(B_k) \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \mu(A).$$

对 (2), 集合  $A_1 \setminus A_n$  递增到  $A_1 \setminus A$ 。由第一部分,

$$\mu(A_1 \setminus A_n) \rightarrow \mu(A_1 \setminus A).$$

由于  $\mu(A_1) < \infty$ , 差公式给出

$$\mu(A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A_n) \rightarrow \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A).$$

□

从上连续性的有限性条件确实不可删去。在  $\mathbb{R}$  的计数测度下, 令  $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ 。这些集合递减到空集, 但每个  $A_n$  的测度都是  $\infty$ , 并不收敛到 0。失败的原因正是证明中会遇到  $\infty - \infty$ 。

一个常用的等价表述是: 若  $A_n \downarrow \emptyset$  且某个  $A_n$  具有有限测度, 则  $\mu(A_n) \downarrow 0$ 。在核验一个有限可加函数是否真正可数可加时, 这种“空交极限”形式尤其方便, 本章习题将给出相应判据。

### 2.1.4 有限测度与概率测度

**定义 2.1.6.** 若  $\mu(X) < \infty$ , 则称  $\mu$  为**有限测度** (finite measure)。若  $\mu(X) = 1$ , 则称  $\mu$  为**概率测度** (probability measure), 并把  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  称为**概率空间** (probability space)。

有限且非零的测度可以归一化: 若  $0 < \mu(X) < \infty$ , 则

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$$

是概率测度。反过来，概率测度只是总质量已经归一化为 1 的有限测度，所以

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(A^c) = 1 - P(A).$$

在有限测度空间中，定理 2.1.5 的从上连续性可用于任意递减可测集列；这正是有限性在极限论证中的主要便利。

### 2.1.5 $\sigma$ -有限测度

许多自然空间的总测度为无穷，但可以分成可数个有限质量的区域。此时，有限测度上的论证往往能够逐块完成，再用从下连续性拼回整个空间。

**定义 2.1.7.** 若存在可测集列  $(X_n)_{n \geq 1}$ ，使

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \quad \mu(X_n) < \infty \quad (n \geq 1),$$

则称  $\mu$  为  $\sigma$ -有限测度 (sigma-finite measure)。

覆盖中的集合可以改成递增集合而不失有限性：把  $X_n$  换成  $X_1 \cup \dots \cup X_n$  即可。每个有限测度都是  $\sigma$ -有限的；计数测度在可数集合上也是  $\sigma$ -有限的，因为可用有限集递增覆盖。计数测度在不可数集合上则不是  $\sigma$ -有限的：有限测度集只能是有限集，而可数个有限集的并仍然可数。

$\sigma$ -有限性并不把总质量变成有限，而是提供一种可数的有限质量局部化。第 2.4.3 小节将看到，它恰好允许我们把有限测度情形的唯一性论证逐块推广到整个空间；没有这一条件，延拓可能不唯一。

## 2.2 测度的基本构造

一个测度给定以后，常见的新测度不必从头构造。我们可以只保留某个可测区域内的质量，可以把该区域本身改作底集，也可以把所有零测集的子集补入可测结构。本节逐一完成这些操作，并特别核验完备化中的良定义问题。

### 2.2.1 测度的限制

**定义 2.2.1.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间， $E \in \mathcal{A}$ 。 $\mu$  到  $E$  的**限制测度** (restricted measure) 是  $(X, \mathcal{A})$  上的集合函数

$$(\mu|_E)(A) = \mu(A \cap E), \quad A \in \mathcal{A}.$$

注意，限制测度的底集仍是  $X$ 。它只是忽略了  $E$  以外的质量：若  $A \cap E = \emptyset$ ，则  $(\mu|_E)(A) = 0$ 。

**命题 2.2.2.** 集合函数  $\mu|_E$  是  $(X, \mathcal{A})$  上的测度，并且

$$(\mu|_E)(X) = \mu(E).$$

证明. 首先,  $(\mu|_E)(\emptyset) = 0$ . 若  $(A_n)$  是两两不交的可测集列, 则  $(A_n \cap E)$  仍两两不交, 而且

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap E).$$

因此

$$(\mu|_E)\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n \cap E) = \sum_n (\mu|_E)(A_n).$$

最后,  $(\mu|_E)(X) = \mu(X \cap E) = \mu(E)$ . □

若  $0 < \mu(E) < \infty$ , 还可以把限制测度归一化为

$$P_E(A) = \frac{\mu(A \cap E)}{\mu(E)}.$$

这是概率测度。若原测度  $\mu = P$  本来就是概率测度, 上式便是条件概率  $P(A | E)$ ; 对一般有限测度, 它只是归一化后的限制测度。

### 2.2.2 子空间测度

限制测度仍把  $X$  当作底集。有时我们希望真正只在  $E$  内工作, 这就要同时改变可测空间。

**定义 2.2.3.** 设  $E \in \mathcal{A}$ , 并令

$$\mathcal{A}|_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}.$$

在可测空间  $(E, \mathcal{A}|_E)$  上定义**子空间测度** (subspace measure)

$$\mu_E(B) = \mu(B), \quad B \in \mathcal{A}|_E.$$

因为  $E$  本身可测, 所以  $B = A \cap E$  仍属于  $\mathcal{A}$ , 右端确有意义。也可以写成  $\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E)$ ; 这一写法与代表元  $A$  的选择无关, 因为右端实际测量的是同一个集合  $A \cap E$ 。

**命题 2.2.4.**  $\mu_E$  是可测空间  $(E, \mathcal{A}|_E)$  上的测度。它与  $\mu|_E$  具有相同的非零质量信息, 但二者的底集分别为  $E$  与  $X$ 。

证明. 迹集合族  $\mathcal{A}|_E$  是  $E$  上的  $\sigma$ -代数。若  $(B_n)$  是其中两两不交的集合列, 则每个  $B_n$  都是  $X$  中的可测集, 故

$$\mu_E\left(\bigcup_n B_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) = \sum_n \mu_E(B_n).$$

空集条件同样由  $\mu(\emptyset) = 0$  得到。 □

这一区分在局部论证中很重要。例如, 在  $(E, \mathcal{A}|_E, \mu_E)$  中整个空间的测度是  $\mu(E)$ ; 在  $(X, \mathcal{A}, \mu|_E)$  中, 集合  $X \setminus E$  仍然存在, 只是其限制测度为零。

### 2.2.3 完备测度

原来的  $\sigma$ -代数未必包含零测集的任意子集；但若把这些子集纳入定义域，单调性又会迫使它们取零值。完备性要求可测结构与这一数值事实相容。

**定义 2.2.5.** 测度空间  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  称为**完备测度空间** (complete measure space)，若每当  $Z \in \mathcal{A}$ 、 $\mu(Z) = 0$  且  $N \subseteq Z$  时，总有  $N \in \mathcal{A}$ 。

不完备现象在很小的空间中已经出现。设  $X = \{0, 1\}$ ， $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$ ，并令  $\mu(\emptyset) = \mu(X) = 0$ 。这是一个测度，但单点集  $\{0\} \subseteq X$  不可测，所以该测度不完备。这个例子说明，完备性是“可测结构是否已经包含全部零测误差”的问题，而不是数值函数是否满足可数可加性的问题。

### 2.2.4 测度的完备化

记所有包含在可测零集中的集合为

$$\mathcal{N}_\mu = \{N \subseteq X : \text{存在 } Z \in \mathcal{A} \text{ 使 } N \subseteq Z \text{ 且 } \mu(Z) = 0\}.$$

这些集合未必属于  $\mathcal{A}$ ，但它们对可测集合造成的增删不应改变测度。

**定义 2.2.6.** 令

$$\overline{\mathcal{A}} = \{A \triangle N : A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}_\mu\},$$

其中  $\triangle$  表示对称差。对  $E = A \triangle N \in \overline{\mathcal{A}}$ ，规定

$$\overline{\mu}(E) = \mu(A).$$

集合族  $\overline{\mathcal{A}}$  及其上的函数  $\overline{\mu}$  称为  $(\mathcal{A}, \mu)$  的**完备化** (completion)。

定义中的可测集合  $A$  并不唯一，所以首先要证明数值  $\overline{\mu}(E)$  与表示无关；还要证明可数集合运算不会累积出非零误差。下面的证明把这两个隐含步骤都展开。

**定理 2.2.7.** 集合族  $\overline{\mathcal{A}}$  是  $X$  上包含  $\mathcal{A}$  的  $\sigma$ -代数， $\overline{\mu}$  定义良好并且是完备测度；对每个  $A \in \mathcal{A}$ ，有  $\overline{\mu}(A) = \mu(A)$ 。

证明. 先证定义良好。设

$$E = A \triangle N = B \triangle M,$$

其中  $A, B \in \mathcal{A}$ ，并且  $N \subseteq Z$ 、 $M \subseteq W$ ，这里  $Z, W \in \mathcal{A}$  且  $\mu(Z) = \mu(W) = 0$ 。由对称差的三角关系，

$$A \triangle B \subseteq (A \triangle E) \cup (E \triangle B) \subseteq Z \cup W.$$

因而可测集  $A \setminus B$  与  $B \setminus A$  都是零测集。把  $A$  和  $B$  分别写成它们的交与差的不交并，得到

$$\mu(A) = \mu(A \cap B) = \mu(B).$$

所以  $\overline{\mu}(E)$  不依赖表示。



接着证明  $\overline{\mathcal{A}}$  是  $\sigma$ -代数。集合  $\emptyset = \emptyset \Delta \emptyset$  属于其中。若  $E = A \Delta N$ , 则

$$E^c = A^c \Delta N,$$

故它对补集封闭。若  $E_n = A_n \Delta N_n$ , 并选择可测零集  $Z_n \supseteq N_n$ , 则

$$\left(\bigcup_n E_n\right) \Delta \left(\bigcup_n A_n\right) \subseteq \bigcup_n (E_n \Delta A_n) \subseteq \bigcup_n Z_n.$$

右端是可测零集, 因此  $\bigcup_n E_n \in \overline{\mathcal{A}}$ 。

还需核验可数可加性。设  $(E_n)$  是  $\overline{\mathcal{A}}$  中两两不交的集合列, 取  $A_n \in \mathcal{A}$ , 使  $E_n \Delta A_n$  包含在某个可测零集  $Z_n$  中。令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

集合  $B_n$  可测且两两不交。由于  $E_n \cap E_k = \emptyset$ , 每个交集  $A_n \cap A_k$  都包含在  $Z_n \cup Z_k$  中。于是

$$A_n \setminus B_n = \bigcup_{k=1}^{n-1} (A_n \cap A_k) \subseteq \bigcup_{k=1}^n Z_k.$$

令  $W_n = \bigcup_{k=1}^n Z_k$ , 则  $W_n$  是可测零集, 并且

$$E_n \Delta B_n \subseteq (E_n \Delta A_n) \cup (A_n \Delta B_n) \subseteq W_n.$$

这里使用了  $B_n \subseteq A_n$ , 所以  $A_n \Delta B_n = A_n \setminus B_n$ 。因此

$$\left(\bigcup_n E_n\right) \Delta \left(\bigcup_n B_n\right) \subseteq \bigcup_n (E_n \Delta B_n) \subseteq \bigcup_n W_n,$$

而右端仍是可测零集。特别地,  $\mu(B_n) = \mu(A_n)$ 。由定义良好与  $\mu$  的可数可加性,

$$\bar{\mu}\left(\bigcup_n E_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) = \sum_n \bar{\mu}(E_n).$$

最后证明完备性。若  $E \in \overline{\mathcal{A}}$  且  $\bar{\mu}(E) = 0$ , 取表示  $E = A \Delta N$ , 其中  $N \subseteq Z$ ,  $\mu(Z) = 0$ 。此时  $\mu(A) = 0$ , 并且  $E \subseteq A \cup Z$ , 而  $A \cup Z$  是可测零集。对任意  $F \subseteq E$ , 有  $F = \emptyset \Delta F$  且  $F \in \mathcal{N}_\mu$ , 故  $F \in \overline{\mathcal{A}}$  且  $\bar{\mu}(F) = 0$ 。这就证明了完备性。取  $N = \emptyset$  还表明  $\bar{\mu}$  在  $\mathcal{A}$  上等于  $\mu$ 。□

完备化还有一个最小性性质: 它只加入完备性强迫我们加入的集合。

**命题 2.2.8.** 设  $(X, \mathcal{B}, \nu)$  是完备测度空间,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ , 且  $\nu|_{\mathcal{A}} = \mu$ 。则

$$\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{B}, \quad \nu|_{\overline{\mathcal{A}}} = \bar{\mu}.$$



证明. 若  $N \in \mathcal{N}_\mu$ , 则存在  $Z \in \mathcal{A}$  使  $N \subseteq Z$  且  $\nu(Z) = \mu(Z) = 0$ 。由  $\nu$  的完备性,  $N \in \mathcal{B}$  且  $\nu(N) = 0$ 。所以每个  $A \triangle N$  都属于  $\mathcal{B}$ , 并且它与  $A$  只相差一个  $\nu$ -零测集, 从而

$$\nu(A \triangle N) = \nu(A) = \mu(A) = \bar{\mu}(A \triangle N).$$

□

因此, 限制与子空间是对已有质量作局部化, 完备化则是对可测结构作最小扩张。下一节的外测度构造会自动产生完备测度, 这两个观点将在 Carathéodory 理论中汇合。

## 2.3 外测度

测度的定义预先要求一个  $\sigma$ -代数, 但在几何构造中, 哪些集合可测往往不是事先知道的。外测度把顺序倒过来: 先在  $X$  的所有子集上定义大小, 只要求空集取零、单调性和可数次可加性, 暂时不要求不交集合的并取等号; 随后再筛出那些能够把任意测试集合无损切开的集合。这个筛选同时给出可测集族和真正的测度。

### 2.3.1 外测度的定义

**定义 2.3.1.** 定义在  $\mathcal{P}(X)$  上的函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$$

若满足:

1.  $\mu^*(\emptyset) = 0$ ;
2. 当  $A \subseteq B$  时,  $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ ;
3. 对任意子集列  $(A_n)_{n \geq 1}$ ,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n),$$

则称  $\mu^*$  为  $X$  上的**外测度** (outer measure)。

外测度虽然定义在所有子集上, 却不要求不交并取等号。一个极端而有用的有限模型是

$$\mu^*(E) = \begin{cases} 0, & E = \emptyset, \\ 1, & E \neq \emptyset. \end{cases}$$

它在任意非空集合  $X$  上都是外测度。若  $X$  至少有两个点, 两个不交单点集的并的外测度是 1, 而两项外测度之和是 2。因此, “定义在幂集上” 不表示它已经是幂集上的测度。

最常见的外测度来自覆盖。下面的表述明确允许用空集填充有限覆盖; 若某个集合没有可数覆盖, 则相应下确界按约定为  $\infty$ 。

**命题 2.3.2.** 设  $C \subseteq \mathcal{D}(X)$  满足  $\emptyset \in C$ , 并设代价函数

$$c: C \rightarrow [0, \infty]$$

满足  $c(\emptyset) = 0$ 。对每个  $E \subseteq X$ , 定义

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} c(C_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, C_n \in C \right\},$$

其中若花括号中的集合为空, 则下确界为  $\infty$ 。那么  $\mu^*$  是外测度。

证明. 把每个  $C_n$  都取为空集, 便得到空集的一个总代价为 0 的覆盖; 非负性于是给出  $\mu^*(\emptyset) = 0$ 。若  $E \subseteq F$ , 则每个覆盖  $F$  的可数列也覆盖  $E$ , 所以  $\mu^*(E) \leq \mu^*(F)$ 。

只剩可数次可加性。给定子集列  $(E_k)$ 。若  $\sum_k \mu^*(E_k) = \infty$ , 所需不等式自动成立。设该和有限, 并固定  $\varepsilon > 0$ 。此时每个  $\mu^*(E_k)$  都有限, 因此可为每个  $k$  选择覆盖  $(C_{k,j})_{j \geq 1}$ , 使

$$E_k \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} C_{k,j}, \quad \sum_{j=1}^{\infty} c(C_{k,j}) \leq \mu^*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}.$$

双重可数族  $(C_{k,j})_{k,j \geq 1}$  可以排成一个序列, 并覆盖  $\bigcup_k E_k$ 。故

$$\mu^*\left(\bigcup_k E_k\right) \leq \sum_{k,j} c(C_{k,j}) \leq \sum_k \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

令  $\varepsilon \downarrow 0$ , 即得结论。 □

覆盖族不必覆盖整个  $X$ : 无法覆盖的集合只会得到外测度  $\infty$ 。要求  $\emptyset \in C$  且代价为零, 则确保空集条件, 并让有限覆盖可以补成可数列。这两个小约定将在延拓定理中避免边界漏洞。

### 2.3.2 Carathéodory 可测性

可数次可加性总给出

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

若反向不等式也成立, 说明用  $E$  切开  $A$  不会增加覆盖代价。

**定义 2.3.3.** 设  $\mu^*$  是  $X$  上的外测度。若集合  $E \subseteq X$  对每个  $A \subseteq X$  都满足

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

则称  $E$  为 **Carathéodory 可测集** (Carathéodory measurable set)。

定义要求对所有测试集  $A$  成立, 而不只要求对  $A = X$  成立。前面那个“非空集外测度恒为 1”的例子清楚地展示了这一点: 若  $\emptyset \neq E \neq X$ , 取  $A = X$  就得到  $1 \neq 1 + 1$ , 所以只有  $\emptyset$  与  $X$  可测。

**命题 2.3.4.** 空集是 Carathéodory 可测的；若  $E$  可测，则  $E^c$  可测；若  $E, F$  都可测，则  $E \cap F$  可测。因此 Carathéodory 可测集对有限并、有限交和差集封闭。

证明. 空集条件直接来自

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \setminus \emptyset).$$

把  $E$  换成  $E^c$  只会交换切分等式右边的两项，所以可测性对补集封闭。

设  $E, F$  可测，并固定  $A \subseteq X$ 。先用  $E$  切分  $A$ ，再分别用  $F$  切分所得的两部分，得到

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*((A \cap E) \setminus F) \\ &\quad + \mu^*((A \setminus E) \cap F) + \mu^*((A \setminus E) \setminus F). \end{aligned}$$

后三个集合的并恰为  $A \setminus (E \cap F)$ 。由可数次可加性，

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*(A \setminus (E \cap F)).$$

反向不等式由外测度的可数次可加性给出，故  $E \cap F$  可测。有限并和差集再由补与交封闭得到。  $\square$

### 2.3.3 Carathéodory 可测集

有限封闭性尚不足以得到  $\sigma$ -代数。关键步骤是反复使用切分等式，把一个测试集合依次切过两两不交的可测集列，再令有限切分次数趋于无穷。

**定理 2.3.5.** 设  $\mu^*$  是  $X$  上的外测度，记

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \{E \subseteq X : E \text{ 满足 定义 2.3.3}\}.$$

则  $\mathcal{M}_{\mu^*}$  是  $X$  上的  $\sigma$ -代数，并且  $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$  是完备测度。

证明. 由 命题 2.3.4， $\mathcal{M}_{\mu^*}$  对有限集合运算封闭。先证明它对两两不交的可数并封闭。设  $(E_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$  两两不交，令

$$F_N = \bigcup_{n=1}^N E_n, \quad E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

对任意  $A \subseteq X$ ，依次用  $E_1, \dots, E_N$  切分，并利用它们互不相交，可由归纳得到

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus F_N).$$

因为  $A \setminus E \subseteq A \setminus F_N$ ，单调性给出

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus E).$$

令  $N \rightarrow \infty$ ，再由可数次可加性使用

$$\mu^*(A \cap E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n),$$

可得

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

另一方向正是外测度的可数次可加性，所以  $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 。

对一般可测集列  $(G_n)$ ，令

$$E_1 = G_1, \quad E_n = G_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} G_k \quad (n \geq 2).$$

由有限集合运算封闭，各  $E_n$  可测；它们两两不交，并且  $\bigcup_n E_n = \bigcup_n G_n$ 。故  $\mathcal{M}_{\mu^*}$  对可数并封闭。结合补集封闭，它是  $\sigma$ -代数。

下面证明  $\mu^*$  在该  $\sigma$ -代数上可数可加。仍设  $(E_n)$  两两不交且可测，令  $E = \bigcup_n E_n$ 。外测度的可数次可加性给出

$$\mu^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

另一方面，在前面的有限切分公式中取  $A = E$ ，并舍去非负的余项，得到

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$$

对每个  $N$  都成立。令  $N \rightarrow \infty$ ，便得到反向不等式。空集条件已经包含在外测度公理中，所以限制后的函数是测度。

最后证明完备性。设  $Z \in \mathcal{M}_{\mu^*}$  且  $\mu^*(Z) = 0$ ，并取任意  $N \subseteq Z$ 。对每个  $A \subseteq X$ ，单调性给出  $\mu^*(A \cap N) = 0$ ，而  $A \setminus N \subseteq A$  给出

$$\mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \setminus N) \leq \mu^*(A).$$

反向不等式来自可数次可加性，故  $N$  满足 Carathéodory 条件。于是所有可测零集的子集都可测， $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$  是完备测度。□

这个可测域由外测度内在决定，适合用来构造测度；但它一般不具有“所有可加定义域中最大者”的性质。单看外测度在某个  $\sigma$ -代数上可加，也不能反推出其中每个集合都满足对所有测试集的 Carathéodory 切分等式。

### 2.3.4 Carathéodory 测度与由测度诱导的外测度

本小节不作为下一节延拓定理的前置条件；它的作用是说明 Carathéodory 构造所得的完备测度，以及这一构造与已有测度、完备化之间的关系。

Carathéodory 构造可以简记为

$$\mu^* \mapsto (X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}).$$

这里限制的是定义域，而不是底集。所有外测度零集都会被纳入这个定义域：若  $\mu^*(N) = 0$ ，则上一证明已经说明  $N \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 。这正是所得测度自动完备的原因。

这个过程也能从一个已有测度出发。设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间，对任意  $E \subseteq X$  定义

$$\mu^0(E) = \inf\{\mu(A) : E \subseteq A, A \in \mathcal{A}\}.$$

因为  $X \in \mathcal{A}$ ，取下确界的集合总非空。空集条件和单调性直接成立。再取任意集合列  $(E_n)$ 。若  $\sum_n \mu^0(E_n) = \infty$ ，可数次可加不等式没有内容；否则，对每个  $n$  选取可测超集  $A_n \supseteq E_n$ ，使

$$\mu(A_n) \leq \mu^0(E_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

于是  $\bigcup_n A_n$  是  $\bigcup_n E_n$  的可测超集，由  $\mu$  的可数次可加性，

$$\mu^0\left(\bigcup_n E_n\right) \leq \mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n) \leq \sum_n \mu^0(E_n) + \varepsilon.$$

令  $\varepsilon \downarrow 0$ ，便得到可数次可加性。因此  $\mu^0$  是外测度。

**命题 2.3.6.** 对上述外测度  $\mu^0$ ，有

$$A \subseteq \mathcal{M}_{\mu^0}, \quad \mu^0(A) = \mu(A) \quad (A \in \mathcal{A}).$$

因此 Carathéodory 构造至少恢复原来的测度，并可能把其定义域扩张。

证明. 若  $A \in \mathcal{A}$ ，用  $A$  自身作可测超集得到  $\mu^0(A) \leq \mu(A)$ ；任何包含  $A$  的可测集都由单调性具有不小于  $\mu(A)$  的测度，所以等号成立。

固定  $E \in \mathcal{A}$  与  $B \subseteq X$ 。对每个可测超集  $C \supseteq B$ ，有不交分解

$$C = (C \cap E) \dot{\cup} (C \setminus E).$$

其中两部分分别覆盖  $B \cap E$  与  $B \setminus E$ ，故

$$\mu(C) = \mu(C \cap E) + \mu(C \setminus E) \geq \mu^0(B \cap E) + \mu^0(B \setminus E).$$

对所有  $C$  取下确界，得到 Carathéodory 条件中所需的反向不等式；另一方向由可数次可加性成立。因此  $E \in \mathcal{M}_{\mu^0}$ 。□

下一节将把这个思想用于尚未成为测度的集合函数：先在集合环上给出前测度，再以覆盖生成外测度。Carathéodory 定理正是把覆盖数据转化为测度的中间桥梁。

## 2.4 测度延拓

在实际构造中，我们通常只会给区间或长方体等基本集合指定大小。这些基本集合未必组成  $\sigma$ -代数，却往往组成集合环或半环。本节要把局部数据沿着一条完整链条推进：先核验前测度对可数覆盖的估计，再由覆盖生成外测度，证明基本集合满足 Carathéodory 条件，最后把测度限制到所生成的  $\sigma$ -代数。存在性之外，还要说明唯一性为何需要  $\sigma$ -有限性。

### 2.4.1 前测度

**定义 2.4.1.** 设  $\mathcal{R}$  是  $X$  上的集合环或集合代数。函数

$$p: \mathcal{R} \rightarrow [0, \infty]$$

称为**前测度** (premeasure), 若  $p(\emptyset) = 0$ , 并且每当  $(A_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{R}$  两两不交且  $\bigcup_n A_n \in \mathcal{R}$  时, 都有

$$p\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

前测度与测度使用同一条可数可加性, 只是定义域还不是  $\sigma$ -代数。条件中必须要求并集仍属于  $\mathcal{R}$ , 否则等式左端没有定义。有限可加性可通过补入空集得到; 若  $A, B \in \mathcal{R}$  且  $A \subseteq B$ , 则

$$p(B) = p(A) + p(B \setminus A),$$

所以前测度也具有单调性。

延拓证明需要把“互不相交的并”推广到“一系列集合覆盖另一个集合”。这一步不能只写成前测度的可数次可加性, 因为覆盖的并集未必属于集合环。

**引理 2.4.2.** 设  $p$  是集合环  $\mathcal{R}$  上的前测度。若  $A, A_n \in \mathcal{R}$  且

$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

则

$$p(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

证明. 令

$$B_1 = A \cap A_1, \quad B_n = A \cap \left( A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) \quad (n \geq 2).$$

集合环对有限并、差和交封闭, 所以每个  $B_n$  都属于  $\mathcal{R}$ 。它们两两不交, 并且覆盖条件保证

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

这里并集  $A$  属于  $\mathcal{R}$ , 故可以使用前测度的可数可加性。再由  $B_n \subseteq A_n$  和单调性,

$$p(A) = \sum_n p(B_n) \leq \sum_n p(A_n).$$

□

**定义 2.4.3.** 若  $\mu$  是  $\sigma(\mathcal{R})$  上的测度, 并且

$$\mu(A) = p(A) \quad (A \in \mathcal{R}),$$

则称  $\mu$  是  $p$  到  $\sigma(\mathcal{R})$  的一个**测度延拓** (measure extension)。

这里的目标定义域明确是  $\sigma(\mathcal{R})$ 。Carathéodory 构造还会给出一个可能更大的完备可测域, 但那是延拓后的进一步扩张, 不能与上述定义域混为一谈。

### 2.4.2 Carathéodory 延拓定理

用  $\mathcal{R}$  中集合覆盖任意子集, 并把前测度之和作为覆盖代价, 得到

$$p^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{R} \right\}.$$

因为  $\emptyset \in \mathcal{R}$  且  $p(\emptyset) = 0$ , 这正是 命题 2.3.2 的情形。即使  $\mathcal{R}$  不能以可数个集合覆盖  $X$ , 公式也仍有意义: 没有可数  $\mathcal{R}$ -覆盖的集合取得值  $\infty$ 。

**定理 2.4.4.** 设  $p$  是集合环或集合代数  $\mathcal{R}$  上的前测度, 并以上式定义  $p^*$ 。则:

1.  $p^*$  是  $X$  上的外测度;
2.  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{M}_{p^*}$ ;
3. 对每个  $A \in \mathcal{R}$ , 有  $p^*(A) = p(A)$ 。

特别地,

$$\mu_C = p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$$

是  $p$  到  $\sigma(\mathcal{R})$  的测度延拓; 而  $p^*|_{\mathcal{M}_{p^*}}$  是定义在可能更大可测域上的完备测度延拓。

证明. 第 (1) 项直接来自 命题 2.3.2。

为证明第 (2) 项, 固定  $A \in \mathcal{R}$  与  $E \subseteq X$ 。对任意  $\mathcal{R}$ -覆盖

$$E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

集合  $A_n \cap A$  与  $A_n \setminus A$  都属于  $\mathcal{R}$ , 分别覆盖  $E \cap A$  与  $E \setminus A$ 。有限可加性给出

$$p(A_n) = p(A_n \cap A) + p(A_n \setminus A).$$

因此

$$\begin{aligned} p^*(E \cap A) + p^*(E \setminus A) &\leq \sum_n p(A_n \cap A) + \sum_n p(A_n \setminus A) \\ &= \sum_n p(A_n). \end{aligned}$$

左端只依赖于  $E, A$ , 与当前选取的覆盖  $(A_n)$  无关; 因此这个不等式对所有  $\mathcal{R}$ -覆盖成立后, 可以对右端的覆盖代价取下确界, 得到

$$p^*(E \cap A) + p^*(E \setminus A) \leq p^*(E).$$

若不存在覆盖, 则右端为  $\infty$ , 不等式仍成立。反向不等式由外测度的可数次可加性给出, 所以  $A$  满足 Carathéodory 条件。

最后证明第 (3) 项。用单个集合  $A$  覆盖自身, 再以空集补足序列, 可得  $p^*(A) \leq p(A)$ 。反过来, 对任意覆盖  $A \subseteq \bigcup_n A_n$ , 引理 2.4.2 给出

$$p(A) \leq \sum_n p(A_n).$$



对所有覆盖取下确界, 得到  $p(A) \leq p^*(A)$ , 故二者相等。

由于  $M_{p^*}$  是包含  $\mathcal{R}$  的  $\sigma$ -代数, 必有

$$\sigma(\mathcal{R}) \subseteq M_{p^*}.$$

由定理 2.3.5,  $p^*$  在  $M_{p^*}$  上是测度; 将它进一步限制到  $\sigma(\mathcal{R})$ , 并结合第 (3) 项, 就得到所需的  $\mu_C$ .  $\square$

这段证明中有三处定义域转换。把各对象都写成同一个字母, 容易掩盖“哪一步已经具有可数可加性”以及“哪一个集合可以代入函数”; 它们的角色如下。

| 对象               | 定义域                   | 作用                       |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| $p$              | $\mathcal{R}$         | 原始前测度                    |
| $p^*$            | $\mathcal{D}(X)$      | 由覆盖代价生成的外测度              |
| $p^* _{M_{p^*}}$ | $M_{p^*}$             | Carathéodory 可测域上的完备测度   |
| $\mu_C$          | $\sigma(\mathcal{R})$ | $p^*$ 在目标域上的限制, 即原前测度的延拓 |

### 2.4.3 $\sigma$ -有限条件下的唯一性

存在性不需要有限性。唯一性则先在有限质量区域上利用补集差公式, 再通过递增覆盖回到整个空间。

**定理 2.4.5.** 设  $p$  是集合环或集合代数  $\mathcal{R}$  上的  $\sigma$ -有限前测度, 即存在  $R_n \in \mathcal{R}$ , 使

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, \quad p(R_n) < \infty \quad (n \geq 1).$$

若  $\mu, \nu$  都是  $p$  到  $\sigma(\mathcal{R})$  的测度延拓, 则  $\mu = \nu$ 。

证明. 把  $R_n$  换成  $X_n = R_1 \cup \cdots \cup R_n$ . 集合环对有限并封闭, 故  $X_n \in \mathcal{R}$ ; 将  $R_1, \dots, R_n$  按首次出现的位置不变化, 再用有限可加性与单调性, 得到

$$p(X_n) \leq \sum_{k=1}^n p(R_k) < \infty.$$

而且  $X_n \uparrow X$ 。

固定  $n$ , 定义

$$\mathcal{D}_n = \{E \in \sigma(\mathcal{R}) : \mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n)\}.$$

我们逐项核验  $\mathcal{D}_n$  是  $\lambda$ -系统。首先,

$$\mu(X \cap X_n) = \mu(X_n) = p(X_n) = \nu(X_n) = \nu(X \cap X_n),$$

所以  $X \in \mathcal{D}_n$ 。若  $A, B \in \mathcal{D}_n$  且  $A \subseteq B$ , 则  $A \cap X_n \subseteq B \cap X_n$ , 并且两者的测度都不超过  $p(X_n) < \infty$ 。差公式合法, 并给出

$$\begin{aligned} \mu((B \setminus A) \cap X_n) &= \mu(B \cap X_n) - \mu(A \cap X_n) \\ &= \nu(B \cap X_n) - \nu(A \cap X_n) \\ &= \nu((B \setminus A) \cap X_n). \end{aligned}$$



故  $B \setminus A \in \mathcal{D}_n$ 。若  $(E_j) \subseteq \mathcal{D}_n$  两两不交，则  $(E_j \cap X_n)$  也两两不交，由两个延拓的可数可加性，

$$\begin{aligned} \mu\left(\left(\bigcup_j E_j\right) \cap X_n\right) &= \sum_j \mu(E_j \cap X_n) \\ &= \sum_j \nu(E_j \cap X_n) = \nu\left(\left(\bigcup_j E_j\right) \cap X_n\right). \end{aligned}$$

所以  $\bigcup_j E_j \in \mathcal{D}_n$ 。

集合环  $\mathcal{R}$  对有限交封闭，因而是  $\pi$ -系统。对任意  $A \in \mathcal{R}$ ，还有  $A \cap X_n \in \mathcal{R}$ ，于是

$$\mu(A \cap X_n) = p(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n).$$

这说明  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}_n$ 。由  $\pi$ - $\lambda$  定理，

$$\mathcal{D}_n = \sigma(\mathcal{R}).$$

现在取任意  $E \in \sigma(\mathcal{R})$ 。对每个  $n$ ，已有

$$\mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n).$$

又因  $E \cap X_n \uparrow E$ ，两边分别使用从下连续性，得到

$$\mu(E) = \lim_n \mu(E \cap X_n) = \lim_n \nu(E \cap X_n) = \nu(E).$$

□

没有  $\sigma$ -有限性时，唯一性确实会失败。设  $X$  是不可数集合， $\mathcal{R}$  是所有有限子集组成的集合环，并令  $p(A) = 0$ 。这个前测度不是  $\sigma$ -有限的，因为可数个有限集不能覆盖  $X$ 。它所生成的  $\sigma$ -代数是

$$\mathcal{C} = \{E \subseteq X : E \text{ 可数或 } E^c \text{ 可数}\}.$$

在  $\mathcal{C}$  上，零测度

$$\mu_0(E) = 0$$

和集合函数

$$\mu_1(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ \infty, & E^c \text{ 可数} \end{cases}$$

都是测度，也都在有限集上等于  $p$ ，但  $\mu_0(X) = 0$  而  $\mu_1(X) = \infty$ 。具体地，若一列不交集合中有一个余可数集，其余集合都包含在它的可数补集中；若没有余可数集，则整列都是可数集，它们的并仍可数。这就核验了  $\mu_1$  的可数可加性。这个例子表明，没有  $\sigma$ -有限性时确实可能出现多个延拓。

### 2.4.4 Hahn–Kolmogorov 定理：总结形式

把前两小节的存在性与唯一性合并，就得到通常使用的延拓定理形式。本书用 **Carathéodory 延拓定理** 强调外测度与可测性筛选的构造过程，并把存在性、唯一性合并后的表述称为 **Hahn–Kolmogorov 定理**。

**定理 2.4.6.** 集合环或集合代数上的每个前测度，都至少有一个到所生成  $\sigma$ -代数的测度延拓；若该前测度  $\sigma$ -有限，则这个延拓唯一。

证明. 存在性由 **定理 2.4.4** 给出；在  $\sigma$ -有限条件下，唯一性由 **定理 2.4.5** 给出。□

本书引用 Hahn–Kolmogorov 定理时，默认使用“存在性加  $\sigma$ -有限条件下唯一性”的合并表述；只需调用外测度构造时，则明确引用 Carathéodory 延拓定理。无论采用哪个名称，都要写清前测度的定义域与延拓的目标域。

### 2.4.5 从半环、环和代数构造测度

区间和长方体通常不组成集合环：两个长方体的差未必还是一个长方体，却能分成有限个长方体。这正是半环的作用。

**定义 2.4.7.** 集合族  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$  称为**半环** (semiring)，若：

1.  $\emptyset \in \mathcal{S}$ ;
2. 对任意  $A, B \in \mathcal{S}$ ，都有  $A \cap B \in \mathcal{S}$ ;
3. 对任意  $A, B \in \mathcal{S}$ ，差集  $A \setminus B$  可以写成有限个两两不交的  $\mathcal{S}$  中集合之并。

例如， $\mathbb{R}$  上的空集与有界半开区间  $[a, b)$  组成半环。两个半开区间的交仍是同类集合，而一个区间减去另一个区间至多留下两个半开区间。

**定义 2.4.8.** 设  $\mathcal{S}$  是半环。函数  $p: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$  称为  $\mathcal{S}$  上的前测度，若  $p(\emptyset) = 0$ ，并且每当  $(S_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{S}$  两两不交、其并  $S = \bigcup_n S_n$  仍属于  $\mathcal{S}$  时，都有

$$p(S) = \sum_{n=1}^{\infty} p(S_n).$$

这个定义明确了在半环上能够合法写出的可数可加性。有限情形同样包含在内。令

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigcup_{k=1}^m S_k : m \geq 0, S_k \in \mathcal{S} \right\},$$

其中  $m = 0$  表示空集。

**定理 2.4.9.** 设  $\mathcal{S}$  是半环， $p$  是  $\mathcal{S}$  上的前测度。则  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$  是包含  $\mathcal{S}$  的最小集合环，而且公式

$$\tilde{p} \left( \bigcup_{k=1}^m S_k \right) = \sum_{k=1}^m p(S_k)$$

定义了  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$  上唯一的前测度延拓  $\tilde{p}$ 。因此  $\tilde{p}$  至少有一个到  $\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S}))$  的测度延拓；若  $X$  可由可数个有限  $p$ -值的  $\mathcal{S}$  中集合覆盖，则该测度延拓唯一。

证明. 先说明  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$  是集合环. 两个有限不交并的交可以分配为有限个交集, 而这些交集仍属于  $\mathcal{S}$ . 从一个半环集合中减去另一个半环集合, 按定义可作有限不交分解; 依次减去有限多个半环集合, 仍得到有限个半环集合的不交并. 因此  $R, T \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$  时,  $R \setminus T \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$ . 再用

$$R \cup T = R \dot{\cup} (T \setminus R)$$

可知它对有限并封闭, 故为集合环.

取  $m = 1$  可知  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S})$ . 若  $\mathcal{Q}$  是任意包含  $\mathcal{S}$  的集合环, 则  $\mathcal{Q}$  对有限并封闭, 因而包含  $\mathcal{S}$  中集合的每个有限不交并. 这说明

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{Q},$$

所以  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$  确为包含  $\mathcal{S}$  的最小集合环. 特别地,

$$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S}) \implies \sigma(\mathcal{S}) \subseteq \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S})).$$

反过来,  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$  的每个成员都是有限个  $\mathcal{S}$  中集合的并, 故属于  $\sigma(\mathcal{S})$ . 因此

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) \subseteq \sigma(\mathcal{S}) \implies \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S})) \subseteq \sigma(\mathcal{S}).$$

两边结合便得到  $\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S}))$ .

接着证明  $\tilde{p}$  定义良好. 设同一集合有两个有限不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m S_i = \bigsqcup_{j=1}^{\ell} T_j.$$

对每个  $i$ , 集合  $(S_i \cap T_j)_{1 \leq j \leq \ell}$  两两不交且并为  $S_i$ . 半环上的有限可加性给出

$$p(S_i) = \sum_{j=1}^{\ell} p(S_i \cap T_j).$$

同理,

$$p(T_j) = \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_j).$$

将这些非负项求和并交换两个有限求和次序, 得到

$$\sum_{i=1}^m p(S_i) = \sum_{i,j} p(S_i \cap T_j) = \sum_{j=1}^{\ell} p(T_j).$$

所以定义与不交表示无关. 把单个集合看作只有一项的不交并, 可知它在  $\mathcal{S}$  上等于  $p$ ; 而任何延拓  $p$  的有限可加函数都必须在有限不交并上取上述值, 故唯一.

最后核验可数可加性. 设  $R, R_n \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$ , 集合  $R_n$  两两不交且  $R = \bigsqcup_n R_n$ . 选取不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m S_i, \quad R_n = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} T_{n,j}.$$

对固定的  $i$ , 集合族  $(S_i \cap T_{n,j})_{n,j}$  两两不交, 其并为  $S_i$ , 故半环上前测度的可数可加性给出

$$p(S_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} p(S_i \cap T_{n,j}).$$

另一方面, 对每个  $n, j$ , 有限可加性给出

$$p(T_{n,j}) = \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_{n,j}).$$

所有项非负, 可以重排求和, 于是

$$\begin{aligned} \tilde{p}(R) &= \sum_{i=1}^m p(S_i) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_{n,j}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} p(T_{n,j}) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{p}(R_n). \end{aligned}$$

所以  $\tilde{p}$  是集合环上的前测度。现在应用 [定理 2.4.6](#) 即得存在性。若  $X = \bigcup_n S_n$  且  $p(S_n) < \infty$ , 则这些  $S_n$  也属于  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ , 说明  $\tilde{p}$  是  $\sigma$ -有限的, 唯一性随之成立。□

由此, 常见构造并不需要在每一层重新发明测度: 先在半环上核验几何大小的可数可加性, 再唯一地通过有限不交并扩到集合环, 最后用 **Carathéodory** 构造延拓到生成的  $\sigma$ -代数。第三章将以半开长方体及其体积为原始数据, 完成 **Lebesgue** 测度的具体构造。

### 本章小结

测度是  $\sigma$ -代数上空集取零、可数可加且取非负扩展实值的集合函数。可数可加性通过不变化给出可数次可加性, 并通过把单调集合列分解为不交层给出从下连续性; 从上连续性需要一个有限测度起点, 以免出现  $\infty - \infty$ 。限制测度只改变质量分布, 子空间测度同时改变底集, 完备化则把所有可测零集的子集以最小方式加入定义域。外测度先定义在全部子集上。**Carathéodory** 条件要求一个集合把任意测试集合的外测度无损切成两部分; 反复有限切分再取极限, 证明了这类集合形成  $\sigma$ -代数, 且外测度在其上成为完备测度。这个可测域由外测度内在确定, 但一般不具有所有可加定义域中的最大性。

集合环上的前测度经可数覆盖公式生成外测度。集合环中的每个集合都满足 **Carathéodory** 条件, 且外测度在原集合环上等于前测度, 所以限制到  $\sigma(\mathcal{R})$  就得到延拓。若前测度  $\sigma$ -有限, 则可以在递增的有限质量区域上使用  $\pi$ - $\lambda$  定理, 再由从下连续性拼回全空间, 从而得到唯一性。半环上的数据先通过有限不交并唯一扩到集合环, 随后进入同一条延拓链。

## 习题

**习题 2.1.** 设  $\mu$  是  $(X, \mathcal{A})$  上的测度,  $A, B \in \mathcal{A}$  且  $A \subseteq B$ . 证明: 若  $\mu(A) < \infty$ , 则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

再在同一个测度空间中构造三组  $A \subseteq B$ , 使  $\mu(A) = \mu(B) = \infty$ , 而  $\mu(B \setminus A)$  分别为 0、一个正的有限数和  $\infty$ 。

解. 由不交分解  $B = A \dot{\cup} (B \setminus A)$ , 有

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

当  $\mu(A) < \infty$  时可以移项, 得到差公式。

对第二问, 在  $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$  上取计数测度, 令  $A$  为偶数集。依次取

$$B = A, \quad B = A \cup \{1\}, \quad B = \mathbb{N}_0,$$

则  $A$  与三个  $B$  都具有无限测度, 而差集的测度依次为 0、1 与  $\infty$ 。所以在  $\mu(A) = \mu(B) = \infty$  时, 表达式  $\mu(B) - \mu(A)$  不仅没有定义, 也不能仅由  $\mu(A)$  与  $\mu(B)$  推断差集的测度。□

**习题 2.2.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间,  $(A_n) \subseteq \mathcal{A}$ , 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty.$$

证明属于无穷多个  $A_n$  的点集测度为零, 即

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = 0.$$

解. 令  $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ . 集合列  $(B_n)$  递减, 而且由可数次可加性,

$$\mu(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k).$$

特别地,  $\mu(B_1) < \infty$ , 所以可以使用从上连续性。级数尾部趋于 0, 从而

$$\mu\left(\bigcap_n B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) = 0.$$

交集正是属于无穷多个  $A_n$  的点集。□

**习题 2.3.** 设  $X$  是任意集合,  $w: X \rightarrow (0, \infty)$ . 对  $A \subseteq X$  定义

$$\mu(A) = \sup \left\{ \sum_{x \in F} w(x) : F \subseteq A \text{ 为有限集} \right\}.$$

证明  $\mu$  是  $\mathcal{P}(X)$  上的测度, 并证明它是  $\sigma$ -有限的, 当且仅当  $X$  至多可数。

解. 空集只有空的有限子集, 故  $\mu(\emptyset) = 0$ . 设  $(A_n)$  两两不交. 对任意有限集  $F \subseteq \bigcup_n A_n$ , 令  $F_n = F \cap A_n$ . 只有有限多个  $F_n$  非空, 因而

$$\sum_{x \in F} w(x) = \sum_n \sum_{x \in F_n} w(x) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

对  $F$  取上确界, 得到  $\mu(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu(A_n)$ . 反过来, 固定正整数  $N$ , 并在每个  $A_n$  中选取有限集  $F_n$ . 有限并  $\bigcup_{n=1}^N F_n$  包含于  $\bigcup_n A_n$ , 所以

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \geq \sum_{n=1}^N \sum_{x \in F_n} w(x).$$

依次对各个  $F_n$  取上确界, 再令  $N \rightarrow \infty$ , 便得到反向不等式. 因此  $\mu$  可数可加.

若  $X$  至多可数, 就可用递增有限集覆盖  $X$ ; 每个有限集的  $\mu$ -值都是有限数, 故  $\mu$  是  $\sigma$ -有限的. 反之, 设  $X = \bigcup_n E_n$  且  $\mu(E_n) < \infty$ . 对正整数  $k$  令

$$E_{n,k} = \{x \in E_n : w(x) \geq 1/k\}.$$

每个  $E_{n,k}$  必为有限集, 否则从中任取足够多个点就会使有限和超过  $\mu(E_n)$ . 又因  $w(x) > 0$ , 有  $E_n = \bigcup_k E_{n,k}$ . 所以每个  $E_n$  可数, 进而  $X$  至多可数.  $\square$

**习题 2.4.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间. 证明集合  $E \subseteq X$  属于  $\overline{\mathcal{A}}$ , 当且仅当存在  $A, B \in \mathcal{A}$  使

$$A \subseteq E \subseteq B, \quad \mu(B \setminus A) = 0.$$

并证明此时  $\overline{\mu}(E) = \mu(A) = \mu(B)$ .

解. 若  $E = C \triangle N$ , 其中  $C \in \mathcal{A}$ ,  $N \subseteq Z \in \mathcal{A}$  且  $\mu(Z) = 0$ , 则

$$C \setminus Z \subseteq E \subseteq C \cup Z.$$

取  $A = C \setminus Z$ ,  $B = C \cup Z$ , 就有  $B \setminus A \subseteq Z$ , 因而其测度为零.

反过来, 若  $A \subseteq E \subseteq B$  且  $\mu(B \setminus A) = 0$ , 则

$$E \triangle A = E \setminus A \subseteq B \setminus A.$$

所以  $E \in \overline{\mathcal{A}}$ . 又由  $B = A \cup (B \setminus A)$ , 得到  $\mu(B) = \mu(A)$ ; 完备化的定义给出  $\overline{\mu}(E) = \mu(A)$ .  $\square$

**习题 2.5.** 设  $X$  是不可数集, 并定义

$$\mu^*(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ 1, & E \text{ 不可数}. \end{cases}$$

证明  $\mu^*$  是外测度, 并求它的 Carathéodory 可测域  $\mathcal{M}_{\mu^*}$ .

解. 空集条件和单调性直接成立. 对集合列  $(E_n)$ , 若  $\bigcup_n E_n$  可数, 则可数次可加性不等式左端为零; 若其并不可数, 则至少有一个  $E_n$  不可数, 否则可数个可数集的并仍可数. 后一情形的右端至少为一, 也得到

$$\mu^*\left(\bigcup_n E_n\right) \leq \sum_n \mu^*(E_n).$$

所以  $\mu^*$  是外测度.

若  $E$  可数, 则对任意  $A \subseteq X$ , 集合  $A \cap E$  可数, 而  $A \setminus E$  与  $A$  同为可数或同为不可数, 故 Carathéodory 切分等式成立. 若  $E^c$  可数, 同样的论证适用于  $E^c$ , 从而也适用于  $E$ . 反之, 若  $E$  与  $E^c$  都不可数, 取  $A = X$  就有

$$\mu^*(X) = 1 < 2 = \mu^*(E) + \mu^*(E^c),$$

所以  $E$  不可测. 因此

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \{E \subseteq X : E \text{ 可数或 } E^c \text{ 可数}\}.$$

□

**习题 2.6.** 设  $\mu^o$  是由测度  $\mu$  的可测超集定义的外测度, 如 命题 2.3.6 所示. 证明

$$\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^o}, \quad \mu^o(E) = \overline{\mu}(E) \quad (E \in \overline{\mathcal{A}}).$$

解. 由 命题 2.3.6,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^o}$ . 若  $N \subseteq Z \in \mathcal{A}$  且  $\mu(Z) = 0$ , 则

$$0 \leq \mu^o(N) \leq \mu(Z) = 0.$$

外测度零集属于  $\mathcal{M}_{\mu^o}$ . 因此对  $E = A \triangle N \in \overline{\mathcal{A}}$ , 集合  $A, N$  都在  $\mathcal{M}_{\mu^o}$  中, 而这个  $\sigma$ -代数对对称差封闭, 故  $E$  也在其中. 由于  $E$  与  $A$  的差异包含在零测集  $N$  中, 测度  $\mu^o|_{\mathcal{M}_{\mu^o}}$  在二者上取同一值, 于是

$$\mu^o(E) = \mu^o(A) = \mu(A) = \overline{\mu}(E).$$

□

**习题 2.7.** 设  $\mathcal{A}$  是  $X$  上的集合代数,  $p : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  有限可加, 且  $p(X) < \infty$ . 证明:  $p$  是前测度, 当且仅当对每个满足  $A_n \downarrow \emptyset$  的集合列  $(A_n) \subseteq \mathcal{A}$ , 都有  $p(A_n) \downarrow 0$ .

解. 若  $p$  是前测度, 其证明与测度的从上连续性相同, 因为所有涉及的集合都仍属于  $\mathcal{A}$ , 且  $p(A_1) \leq p(X) < \infty$ .

反过来, 设在空集处的从上连续性成立. 取两两不交的  $(E_n) \subseteq \mathcal{A}$ , 并假设  $E = \bigcup_n E_n \in \mathcal{A}$ . 令

$$F_N = E \setminus \bigcup_{n=1}^N E_n.$$

则  $F_N \in \mathcal{A}$  且  $F_N \downarrow \emptyset$ . 由有限可加性,

$$p(E) = \sum_{n=1}^N p(E_n) + p(F_N).$$



令  $N \rightarrow \infty$ , 在空集处的从上连续性使最后一项趋于零, 故

$$p(E) = \sum_{n=1}^{\infty} p(E_n).$$

这正是前测度的可数可加性。  $\square$

**习题 2.8.** 设  $X$  不可数,  $\mathcal{R}$  是  $X$  的所有有限子集组成的集合环, 并令  $p(A) = 0$ 。证明  $p$  是前测度, 并完成以下任务:

1. 求由  $\mathcal{R}$ -覆盖定义的外测度  $p^*$ ;
2. 求  $M_{p^*}$ ;
3. 比较  $p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$  与正文中两个延拓  $\mu_0, \mu_1$ , 并说明这个例子怎样体现非  $\sigma$ -有限情形的非唯一性。

解. 若两两不交的有限集列之并仍为有限集, 则其中只有有限多个集合非空, 所以  $p$  满足前测度所要求的可数可加性。

若  $E \subseteq X$  可数, 它可由可数个单点集覆盖, 故  $p^*(E) = 0$ 。若  $E$  不可数, 则不存在可数个  $\mathcal{R}$  中集合覆盖  $E$ ; 按空集上的下确界约定,  $p^*(E) = \infty$ 。于是

$$p^*(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ \infty, & E \text{ 不可数}. \end{cases}$$

任取  $A, E \subseteq X$ 。若  $A$  可数, 则  $A \cap E$  与  $A \setminus E$  都可数, Carathéodory 等式两边均为零。若  $A$  不可数, 则  $A \cap E$  与  $A \setminus E$  至少有一个不可数, 等式两边均为无穷。因此每个  $E \subseteq X$  都属于  $M_{p^*}$ , 即

$$M_{p^*} = \mathcal{D}(X).$$

另一方面,  $\sigma(\mathcal{R})$  是由可数集和余可数集组成的  $\sigma$ -代数。在这个定义域上,  $p^*$  恰好等于正文中的  $\mu_1$ : 它在可数集上取零, 在余可数集上取无穷。恒为零的测度  $\mu_0$  也是  $p$  的延拓, 却与  $p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$  在  $X$  上取值不同。集合环中的可数个有限集只能覆盖可数子集, 不能覆盖  $X$ , 所以  $p$  不满足  $\sigma$ -有限性; 覆盖构造给出了一个延拓, 却不能排除另一个延拓。  $\square$

**习题 2.9.** 设  $\mathcal{S}$  是  $\mathbb{R}$  上由空集与有界半开区间  $[a, b)$  组成的半环。写出  $[a, b) \setminus [c, d)$  的半环不交分解, 并证明长度函数  $p([a, b)) = b - a$ 、 $p(\emptyset) = 0$  对半环中有限个不交区间具有可加性。说明由同一有限个端点形成的共同细分为何保证有限区间并的总长度与表示无关。

解. 把空区间删去后, 有

$$[a, b) \setminus [c, d) = [a, \min\{b, c\}) \cup [\max\{a, d\}, b),$$

其中端点次序不合要求的项按空集处理。这给出至多两个半开区间的不交分解。



若有限个半开区间两两不交且其并仍为一个半开区间  $[a, b)$ , 把所有端点按递增次序排列。相邻端点间的小区间恰好各出现一次, 所有长度相加时内部端点逐项消去, 结果为  $b - a$ 。若同一个有限区间并有两种不交表示, 把两组端点合并排序; 所得相邻小区间同时细分两种表示。两边的总长度都等于这些小区间长度之和, 故与表示无关。这正是定理 2.4.9 中共同细分论证的一维版本。□

**习题 2.10.** 设  $\mathcal{D}$  是包含  $X$  的  $\pi$ -系统,  $\mu, \nu$  是  $\sigma(\mathcal{D})$  上的有限测度。若  $\mu(P) = \nu(P)$  对每个  $P \in \mathcal{D}$  成立, 证明  $\mu = \nu$ 。再说明为什么本章延拓唯一性的证明不能在总测度为无穷时直接照搬这个论证。

解. 令

$$\mathcal{D} = \{E \in \sigma(\mathcal{D}) : \mu(E) = \nu(E)\}.$$

因为  $X \in \mathcal{D}$ , 有  $\mu(X) = \nu(X) < \infty$ , 所以  $X \in \mathcal{D}$ 。若  $A, B \in \mathcal{D}$  且  $A \subseteq B$ , 有限性使差公式合法, 并给出

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A).$$

对两两不交的  $(E_n) \subseteq \mathcal{D}$ , 可数可加性说明  $\bigcup_n E_n \in \mathcal{D}$ 。故  $\mathcal{D}$  满足本书采用的三条  $\lambda$ -系统公理, 并且包含  $\mathcal{D}$ 。由  $\pi$ - $\lambda$  定理,  $\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{D})$ 。

若总测度为  $\infty$ , 补集步骤会出现  $\infty - \infty$ , 集合族  $\mathcal{D}$  未必对补集封闭。本章的做法是先限制到有限质量集合  $X_n$ , 在每一块上完成上述论证, 再借助从下连续性令  $X_n \uparrow X$ 。□

**习题 2.11.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间,  $E \in \mathcal{A}$ 。对每个  $B \in \mathcal{A}|_E$ , 证明

$$\mu_E(B) = (\mu|_E)(B),$$

并对每个  $A \in \mathcal{A}$  证明

$$\mu_E(A \cap E) = (\mu|_E)(A).$$

解释为什么这两个等式并不表示  $(E, \mathcal{A}|_E, \mu_E)$  与  $(X, \mathcal{A}, \mu|_E)$  是同一个测度空间。

解. 因为  $B \subseteq E$  且  $B \in \mathcal{A}|_E \subseteq \mathcal{A}$ , 由两个定义直接得到

$$(\mu|_E)(B) = \mu(B \cap E) = \mu(B) = \mu_E(B).$$

类似地, 对  $A \in \mathcal{A}$ , 集合  $A \cap E$  属于  $\mathcal{A}|_E$ , 所以

$$\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E) = (\mu|_E)(A).$$

然而,  $\mu_E$  的底集是  $E$ , 定义域是  $\mathcal{A}|_E$ ;  $\mu|_E$  的底集仍是  $X$ , 定义域仍是  $\mathcal{A}$ 。例如  $X \setminus E$  在后一个空间中仍是可测集且限制测度为零, 却根本不是前一个空间的子集。两者携带相同的  $E$  内质量信息, 但不是同一个测度空间。□

**习题 2.12.** 设  $\mathcal{S}$  是  $X$  上的半环, 并令

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigsqcup_{k=1}^m S_k : m \geq 0, S_k \in \mathcal{S} \right\}.$$

不直接引用 定理 2.4.9 的最小性结论, 证明  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$  是包含  $\mathcal{S}$  的最小集合环, 并由此推出

$$\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S})).$$

解.  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$  是集合环的证明与正文相同: 半环的交仍在半环中, 差可以有限不交分解; 把这些分解分配到两个有限不交并上, 就得到差的有限不交分解, 再由

$$R \cup T = R \dot{\cup} (T \setminus R)$$

得到有限并封闭。取  $m = 1$  可知  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S})$ 。

若  $\mathcal{Q}$  是任意包含  $\mathcal{S}$  的集合环, 则  $\mathcal{Q}$  对有限并封闭, 故每个有限不交并  $\bigsqcup_{k=1}^m S_k$  都属于  $\mathcal{Q}$ 。所以

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{Q},$$

这就证明了最小性。

由  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S})$  得  $\sigma(\mathcal{S}) \subseteq \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S}))$ 。反过来,  $\mathcal{R}(\mathcal{S})$  的每个成员都是有限个  $\mathcal{S}$  中集合的并, 因而属于  $\sigma(\mathcal{S})$ ; 于是  $\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S})) \subseteq \sigma(\mathcal{S})$ 。两边相等。□

## 第三章 Lebesgue 测度

本章在  $\mathbb{R}^d$  上从长方体的体积出发构造 Lebesgue 测度。构造的实质不在于写出一个覆盖下确界，而在于证明长方体体积确实是半环上的前测度，并核实由此得到的外测度保留原有体积。随后我们辨明 Borel 可测集、Lebesgue 可测集与零测集之间的关系，建立外正则性、内正则性和 Borel 逼近，最后从覆盖定义直接推出平移、正交变换、伸缩及一般线性变换下的测度公式。选读的一节用 Vitali 集说明：完备性虽然补进了所有零测集的子集，却不可能使  $\mathbb{R}^d$  的每个子集都可测。

### 本章目标

- 能证明半开长方体构成半环，体积函数满足可数可加性，并据此合法构造 Lebesgue 外测度；
- 能区分 Borel 集、Lebesgue 可测集和零测集，并能处理 Cantor 集、稠密零测集等边界例子；
- 能在有限与无限测度两种情形下正确使用外正则性、内正则性及 Borel 逼近；
- 能从覆盖估计验证初等线性变换下外测度的变化，并由矩阵分解推出行列式公式；
- 能指出 Vitali 构造中可数可加性、平移不变性、区间测度和代表元选取分别出现在哪里。

### 阅读提示

本章依赖第二章的外测度、Carathéodory 可测性和半环延拓定理。内部路线是

长方体体积  $\rightarrow$  半环前测度  $\rightarrow$  Lebesgue 外测度  
 $\rightarrow$  可测性与正则性  $\rightarrow$  欧氏变换下的行为.

第一次阅读时不宜跳过 定理 3.1.4：如果只验证有限分割可加，后面的测度延拓仍缺少一个实质步骤。正则性一节则要特别留意无穷测度集合；等式  $\infty = \infty$  本身不给出误差小于  $\varepsilon$  的逼近。

### 3.1 欧氏空间中的外测度

本节固定整数  $d \geq 1$ 。直观上，长度、面积和体积都应当先在长方体上确定，再通过覆盖推广到任意集合。困难在于第二步只会产生外测度；要保证它在原来的长方体上没有改变数值，必须先证明体积函数满足可数可加性。

### 3.1.1 长度、面积与体积

记  $Q_d$  为  $\emptyset$  与所有有界半开长方体

$$Q = \prod_{j=1}^d (a_j, b_j], \quad -\infty < a_j < b_j < \infty$$

组成的集合族。

**定义 3.1.1.** 定义  $\emptyset$  的体积为零；对上述非空长方体  $Q$ ，定义其**体积** (volume) 为

$$\text{vol}(Q) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

当  $d = 1, 2, 3$  时，这分别给出通常的长度、面积和体积。采用半开端点不是几何上的偏好，而是为了让相邻长方体能够无重叠地拼接。例如  $(a, c] = (a, b] \sqcup (b, c]$ 。最终我们会证明边界为零测集，届时开闭端点的差别将消失。

**引理 3.1.2.** 集合族  $Q_d$  是半环。更具体地，有限个半开长方体的全部坐标端点会把它们的并细分成有限个两两不交的半开长方体；在该共同细分上有下列结论：

1. 若  $Q_1, \dots, Q_N$  两两不交且都包含于  $Q$ ，则

$$\sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n) \leq \text{vol}(Q);$$

2. 若  $Q \subseteq \bigcup_{n=1}^N Q_n$ ，则

$$\text{vol}(Q) \leq \sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n).$$

**证明.** 两个半开长方体的交仍是半开长方体或空集。对  $Q \setminus R$ ，在每个坐标上加入  $R$  的端点，把  $Q$  切成有限网格；删去落在  $R$  内的网格块后，余下部分是有限个两两不交的  $Q_d$  中集合之并。因此  $Q_d$  是半环。

对有限族同时作上述网格细分。每个原长方体都是若干网格块之并，而且一个网格块的体积是各坐标边长之积。反复使用有限分配律，可知一个长方体的体积等于组成它的网格块体积之和。在 (1) 中，所有  $Q_n$  所含的网格块彼此不同，并且都来自  $Q$ ，所以它们的体积和不超过  $Q$  的体积。在 (2) 中， $Q$  的每个网格块至少被某个  $Q_n$  包含；把每个网格块指派给其中一个这样的  $Q_n$ ，再分别使用有限可加性，便得到所需不等式。□

为了把有限网格论证用于可数覆盖，还需要紧性提供有限子覆盖。

**引理 3.1.3.** 设闭长方体  $K = \prod_{j=1}^d [\alpha_j, \beta_j]$  被有限个有界开长方体  $O_1, \dots, O_N$  覆盖。则

$$\prod_{j=1}^d (\beta_j - \alpha_j) \leq \sum_{n=1}^N \text{vol}(O_n).$$

这里开长方体的体积仍定义为各边长之积。

证明. 对每个  $x \in K$ , 选取一个含  $x$  的  $O_{n(x)}$ , 再取  $\rho_x > 0$ , 使  $B(x, 2\rho_x) \subseteq O_{n(x)}$ . 紧性给出有限个球  $B(x_s, \rho_{x_s})$  覆盖  $K$ . 令  $\rho$  为这些半径的最小值, 并在各坐标方向把  $[\alpha_j, \beta_j]$  分割得足够细, 使每个闭网格盒的直径小于  $\rho$ . 若闭网格盒  $C$  与某个  $B(x_s, \rho_{x_s})$  相交, 则对交点  $y$  和任意  $z \in C$ ,

$$|z - x_s| \leq |z - y| + |y - x_s| < \rho + \rho_{x_s} \leq 2\rho_{x_s}.$$

因此  $C \subseteq O_{n(x_s)}$ .

给每个闭网格盒配上由同一组分点确定的半开网格盒, 并把它指派给一个包含其闭包的  $O_n$ . 这些半开盒两两不交; 各边长度的有限分配律说明, 它们的体积和恰为  $K$  的体积.

对固定的  $n$ , 令  $K_n$  为指派给  $O_n$  的小盒之闭包的并; 若没有小盒被指派给它, 就略去这一项. 集合  $K_n$  是  $O_n$  中的紧集. 写

$$O_n = \prod_{j=1}^d (\alpha_{nj}, \beta_{nj}).$$

各坐标投影  $\pi_j(K_n)$  都是包含于  $(\alpha_{nj}, \beta_{nj})$  的紧集, 故可选取  $c_{nj}, d_{nj}$ , 使

$$\alpha_{nj} < c_{nj} < \min \pi_j(K_n) \leq \max \pi_j(K_n) < d_{nj} < \beta_{nj}.$$

于是半开长方体

$$R_n = \prod_{j=1}^d (c_{nj}, d_{nj}]$$

满足  $K_n \subseteq R_n \subseteq O_n$  以及  $\text{vol}(R_n) < \text{vol}(O_n)$ . 由引理 3.1.2 的 (1), 指派给  $O_n$  的小盒体积和不超过  $\text{vol}(R_n)$ . 对所有实际收到小盒的  $n$  求和, 即得结论.  $\square$

**定理 3.1.4.** 体积函数在半环  $\mathcal{Q}_d$  上可数可加: 若  $Q, Q_n \in \mathcal{Q}_d$ , 各  $Q_n$  两两不交且

$$Q = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Q_n,$$

则

$$\text{vol}(Q) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n).$$

因而体积是  $\mathcal{Q}_d$  上的前测度。

证明. 对每个  $N$ , 有限并  $\bigsqcup_{n=1}^N Q_n$  包含于  $Q$ . 由引理 3.1.2,

$$\sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n) \leq \text{vol}(Q).$$

令  $N \rightarrow \infty$ , 得到级数和不超过  $\text{vol}(Q)$ .

反向设  $Q = \prod_j (a_j, b_j]$  非空, 并固定  $\varepsilon > 0$ . 若右端级数为无穷, 所需不等式自动成立, 故只考虑其为有限的情形. 取足够小的  $\delta > 0$ , 使闭长方体

$$K_\delta = \prod_{j=1}^d [a_j + \delta, b_j]$$

非空且

$$\text{vol}(K_\delta) > \text{vol}(Q) - \varepsilon.$$

将每个  $Q_n$  的各边向外略微扩张, 可得到开长方体  $O_n \supseteq Q_n$ , 并使

$$\text{vol}(O_n) < \text{vol}(Q_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

这些开长方体覆盖紧集  $K_\delta$ , 故其中有限多个已经覆盖  $K_\delta$ . 由引理 3.1.3,

$$\text{vol}(Q) - \varepsilon < \text{vol}(K_\delta) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(O_n) < \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) + \varepsilon.$$

令  $\varepsilon \downarrow 0$  即得反向不等式. 空集情形由定义成立.  $\square$

这一步说明, 体积并非只有有限可加性. 证明中“向内缩进—向外扩张—取有限子覆盖”的三步, 正是从有限几何过渡到可数测度的技术桥梁.

### 3.1.2 Lebesgue 外测度

**定义 3.1.5.** 对任意  $E \subseteq \mathbb{R}^d$ , 定义 **Lebesgue 外测度** (Lebesgue outer measure)

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n, Q_n \in \mathcal{Q}_d \right\}.$$

空集可由恒为空集的序列覆盖, 所以  $m^*(\emptyset) = 0$ .

定义允许覆盖互相重叠, 也允许覆盖代价为无穷. 取下确界之后, 覆盖的位置、尺度和重叠方式都被优化, 只留下集合无法再压低的外部大小.

**命题 3.1.6.** 函数  $m^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, \infty]$  是外测度.

证明. 对每个  $Q \in \mathcal{Q}_d$  取代价  $c(Q) = \text{vol}(Q)$ . 空集属于  $\mathcal{Q}_d$  且代价为零,  $\mathcal{Q}_d$  又覆盖整个  $\mathbb{R}^d$ . 因此命题 2.3.2 可直接应用, 得到空集取零值、单调性和可数次可加性.  $\square$

**命题 3.1.7.** 每个  $Q \in \mathcal{Q}_d$  都是  $m^*$ -可测集, 并且

$$m^*(Q) = \text{vol}(Q).$$

证明. 由定理 3.1.4 与定理 2.4.9, 体积先扩张为  $\mathcal{Q}_d$  所生成集合环上的前测度. 环中每个集合都是有限个两两不交的  $\mathcal{Q}_d$  中集合之并; 把环元素覆盖逐项拆开, 不会改变总代价. 因此, 从该环前测度构造出的覆盖外测度, 恰是定义 3.1.5 中的  $m^*$ .

现在应用定理 2.4.4: 原半环中的长方体属于 Carathéodory 可测集, 而且延拓在它们上保留原前测度的数值. 这正给出两个结论.  $\square$

例如在实直线上,  $m^*((a, b]) = b - a$ . 单点  $\{x\}$  可被长度任意小的区间覆盖, 故外测度为零; 于是开、闭或半开区间只相差至多两个零测点, 它们最终都有相同长度.

### 3.1.3 长方体与立方体覆盖

**命题 3.1.8.** 在定义 3.1.5 中, 把覆盖集限制为半开立方体不会改变  $m^*$ 。进一步, 还可以只使用边长为  $2^{-k}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 的半开二进立方体 (dyadic cube); 对任意  $E \subseteq \mathbb{R}^d$ , 都有

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n, \quad Q_n \text{ 为半开二进立方体} \right\},$$

证明. 立方体本来就是长方体, 所以限制覆盖族所得的下确界不会小于  $m^*$ 。反过来, 设  $Q = \prod_j (a_j, b_j]$  且给定  $\eta > 0$ 。取足够小的二进边长  $h = 2^{-k}$ , 并收集所有与  $Q$  相交的网格立方体

$$\prod_{j=1}^d (hv_j, h(v_j + 1)], \quad v \in \mathbb{Z}^d.$$

这样的立方体只有有限个且覆盖  $Q$ 。它们两两不交, 其并包含于

$$\prod_{j=1}^d (a_j - h, b_j + h],$$

所以由引理 3.1.2, 它们的总体积不超过

$$\prod_{j=1}^d (b_j - a_j + 2h).$$

当  $h \downarrow 0$  时, 该量趋于  $\text{vol}(Q)$ , 故可使总体积小于  $\text{vol}(Q) + \eta$ 。

现在从一个长方体覆盖  $(Q_n)$  出发, 对第  $n$  个长方体使用误差  $\eta 2^{-n}$  作上述替换。所得可数个二进立方体仍覆盖原集合, 总代价至多增加  $\eta$ 。先对原覆盖取下确界, 再令  $\eta \downarrow 0$ , 得到反向不等式。□

二进立方体的好处不仅是形状统一。固定尺度时它们构成  $\mathbb{R}^d$  的一个分割; 两个不同尺度的二进立方体若相交, 则较小者包含于较大者。这种嵌套结构将在覆盖定理和最大函数中再次出现。

### 3.1.4 开集的测度

开集可以拆成没有重叠的基本块。为避免  $G = \mathbb{R}^d$  时不存在最大的任意尺度立方体, 下面只使用边长不超过 1 的二进立方体。

**命题 3.1.9.** 每个开集  $G \subseteq \mathbb{R}^d$  都可写成至多可数个两两不交的半开二进立方体之并:

$$G = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Q_n.$$

因此  $G$  是  $m^*$ -可测集, 并且

$$m^*(G) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n).$$

有限或空的分解按通常方式理解。



证明. 考虑所有边长为  $2^{-k}$ 、 $k \geq 0$ , 且包含于  $G$  的二进立方体. 约定  $\text{dist}(x, \emptyset) = \infty$ . 于是对任意  $x \in G$ , 距离  $\text{dist}(x, G^c)$  为正; 当  $k$  足够大时, 含  $x$  的唯一尺度  $2^{-k}$  二进立方体直径小于该距离, 因而包含于  $G$ . 在含  $x$  且包含于  $G$  的这些立方体中, 取尺度最粗的一个. 由于  $k$  取非负整数, 最粗尺度确实存在.

收集所有这样得到的极大立方体. 二进立方体相交时必有一个包含于另一个, 所以两个不同的极大立方体只能不交. 它们覆盖  $G$ , 而全部二进立方体的集合可数, 故得到所需分解. 每个  $Q_n$  由命题 3.1.7 可测, 故其可数并  $G$  也可测; 限制测度的可数可加性给出最后的等式.  $\square$

例如非空开集一定具有正测度: 它含有一个正边长立方体. 另一方面, 开集可能具有有限或无穷测度, 也可能由无穷多个互相远离的小立方体组成; 上述分解对这些情形一并适用.

**命题 3.1.10.** 对任意  $E \subseteq \mathbb{R}^d$ , 有

$$m^*(E) = \inf\{m^*(G) : E \subseteq G, G \text{ 开}\}.$$

若  $m^*(E) < \infty$ , 则对每个  $\varepsilon > 0$  可取开集  $G \supseteq E$ , 使

$$m^*(G) < m^*(E) + \varepsilon.$$

若  $m^*(E) = \infty$ , 则每个开超集  $G \supseteq E$  都满足  $m^*(G) = \infty$ ; 此时不另写严格小于  $m^*(E) + \varepsilon$  的式子.

证明. 设  $m^*(E) < \infty$ . 先取半开长方体覆盖  $(Q_n)$ , 使

$$\sum_n \text{vol}(Q_n) < m^*(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再把  $Q_n$  的各边略微向外扩张成开长方体  $O_n \supseteq Q_n$ , 并使

$$\text{vol}(O_n) < \text{vol}(Q_n) + \varepsilon 2^{-n-1}.$$

开集  $G = \bigcup_n O_n$  包含  $E$ , 并由外测度的可数次可加性满足

$$m^*(G) \leq \sum_n \text{vol}(O_n) < m^*(E) + \varepsilon.$$

另一方面, 任意  $G \supseteq E$  都由单调性满足  $m^*(E) \leq m^*(G)$ , 故下确界等式成立.

若  $m^*(E) = \infty$ , 则同一单调性迫使每个开超集的外测度为无穷, 所以下确界仍为无穷. 这里不能把  $\infty + \varepsilon$  当作有限误差估计来使用.  $\square$

## 3.2 Lebesgue 可测集

外测度已经能给每个子集指定外部大小, 却一般不满足可数可加性. Carathéodory 条件从所有子集中筛出那些能够把任意测试集准确切成内外两部分的集合; 在这些集合上, 外测度才成为真正的测度.



### 3.2.1 Carathéodory 可测性

**定义 3.2.1.** 集合  $E \subseteq \mathbb{R}^d$  称为 **Lebesgue 可测集** (Lebesgue measurable set), 若对任意  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ ,

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

全体 Lebesgue 可测集组成的  $\sigma$ -代数记为  $\mathcal{L}^d$ , 而

$$m = m^*|_{\mathcal{L}^d}$$

称为  $\mathbb{R}^d$  上的 **Lebesgue 测度** (Lebesgue measure)。

外测度的次可加性总给出上式中的“ $\leq$ ”方向, 所以可测性的内容是反向不等式: 集合  $E$  不会因切割测试集而制造额外的外测度。由 **定理 2.3.5**,  $\mathcal{L}^d$  是  $\sigma$ -代数,  $m$  是其上的完备测度。这里的完备性是外测度构造的结论, 并非事后增加的约定。

**命题 3.1.7** 已证明半开长方体可测。由此, 它们的有限并、差、可数并和可数交都可测。以下各类熟悉集合将沿这条封闭性链进入  $\mathcal{L}^d$ 。

### 3.2.2 Borel 集的可测性

**定理 3.2.2.** 有包含关系

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{L}^d.$$

特别地, 所有开集、闭集以及连续映射对 Borel 集的原像都是 Lebesgue 可测集。

**证明.** 由 **命题 3.1.9**, 每个开集都是可数个半开长方体之并, 因而属于  $\mathcal{L}^d$ 。Borel  $\sigma$ -代数是包含全部开集的最小  $\sigma$ -代数, 而  $\mathcal{L}^d$  已经是含全部开集的  $\sigma$ -代数, 所以前者包含于后者。闭集是开集的补集, 也可测。

若  $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^k$  连续, 则开集的原像为开集。集合族

$$\{B \subseteq \mathbb{R}^k : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$$

是包含全部开集的  $\sigma$ -代数, 故包含  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 。因此每个 Borel 集的原像是 Borel 集, 进而 Lebesgue 可测。□

连续映射的 Borel 原像仍是 Borel 集; 一般连续映射却未必把 Borel 集映成 Borel 集, 因而不能沿用上述原像判别来处理像集。这一现象需要描述集合论中的额外工具, 本书此处不作证明; 线性映射的像将在第 3.4 节直接处理。

### 3.2.3 零测集

**定义 3.2.3.** 若  $N \subseteq \mathbb{R}^d$  满足  $m^*(N) = 0$ , 则称  $N$  为 **Lebesgue 零测集** (Lebesgue null set)。

**命题 3.2.4.** 每个零测集及其任意子集都属于  $\mathcal{L}^d$ , 并且测度为零。零测集的可数并仍是零测集。

证明. 若  $E \subseteq N$  且  $m^*(N) = 0$ , 则单调性给出  $m^*(E) = 0$ . 由 定理 2.3.5 及其完备性结论, 外测度为零的集合满足 Carathéodory 条件, 故  $E \in \mathcal{L}^d$  且  $m(E) = 0$ . 若  $N_k$  都零测, 则外测度的可数次可加性给出

$$m^*\left(\bigcup_k N_k\right) \leq \sum_k m^*(N_k) = 0.$$

□

单点  $\{x\}$  可放入边长为  $\delta$  的立方体中, 故其外测度不超过  $\delta^d$ ; 令  $\delta \downarrow 0$ , 得到  $m(\{x\}) = 0$ . 于是每个可数集都是零测集. 特别地,  $\mathbb{Q}^d$  在  $\mathbb{R}^d$  中稠密却零测. 这说明“稠密”描述集合在每个开集中的出现, 而“零测”描述可用多小的总体积覆盖, 两者并不冲突.

零测集也不必可数. 以下经典例子同时提醒我们: 基数、拓扑大小和测度大小是三种不同的尺度.

**命题 3.2.5.** 三分 Cantor 集 (ternary Cantor set)  $C \subseteq [0, 1]$  不可数、闭且无内点, 但  $m(C) = 0$ .

证明. 令  $C_n$  为删去前  $n$  轮中间三分之一后留下的集合. 它是  $2^n$  个长度为  $3^{-n}$  的闭区间之并, 并且  $C \subseteq C_n$ . 闭区间与同长度的半开区间只差端点, 端点组成有限零测集, 所以

$$m(C) \leq m(C_n) = 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 得到  $m(C) = 0$ . 每个点  $x \in C$  可用一个只含数字 0, 2 的三进展开表示. 映射

$$(\varepsilon_n)_{n \geq 1} \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon_n}{3^n}, \quad \varepsilon_n \in \{0, 1\},$$

把二元序列映入  $C$ . 若两个序列首次在第  $r$  位不同, 不妨设该位分别为 1 与 0, 则两个像之差至少为

$$\frac{2}{3^r} - \sum_{n=r+1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \frac{1}{3^r} > 0.$$

所以该映射是单射; 二元序列全体不可数, 故  $C$  不可数. 集合  $C$  是闭集, 因为它是递减闭集列  $(C_n)$  的交.

若存在非退化区间  $I \subseteq C$ , 可取  $n$  使  $3^{-n} < |I|$ . 但  $C \subseteq C_n$ , 而  $C_n$  的每个连通分支都是长度为  $3^{-n}$  的闭区间. 区间  $I$  既不可能包含于其中一个分支, 也不可能跨过两个分支之间被删去的空隙, 矛盾. 因此  $C$  没有内点. □

反过来, 空内点并不推出零测. 例如  $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$  没有内点, 却与  $[0, 1]$  只差一个可数集, 因而测度为 1. 这里“没有内点”是由于每个开区间都含有有理数.

### 3.2.4 Lebesgue $\sigma$ -代数

Borel 集来自拓扑上的可数操作；Lebesgue 可测集还允许在零测集内部任意改动。下一定理精确说明这就是两者的全部差别。

**定理 3.2.6.**  $\mathcal{L}^d$  是限制测度  $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$  的完备化。等价地，

$$\mathcal{L}^d = \left\{ E \subseteq \mathbb{R}^d : \begin{array}{l} \text{存在 } B, Z \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m(Z) = 0, \\ E \triangle B \subseteq Z \end{array} \right\}.$$

证明. 先设  $E \in \mathcal{L}^d$ 。令

$$E_k = E \cap [-k, k]^d.$$

集合  $E_k$  测度有限。对每个  $k, n \geq 1$ ，由 命题 3.1.10 可取开集  $G_{k,n} \supseteq E_k$ ，使

$$m(G_{k,n}) < m(E_k) + 2^{-n}.$$

由于  $E_k$  可测且测度有限，

$$m(G_{k,n} \setminus E_k) = m(G_{k,n}) - m(E_k) < 2^{-n}.$$

令  $B_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_{k,n}$ 。这是包含  $E_k$  的 Borel 集，而且

$$m(B_k \setminus E_k) \leq 2^{-n}$$

对每个  $n$  成立，故  $m(B_k \setminus E_k) = 0$ 。再令  $B = \bigcup_k B_k$ ，则  $B$  是 Borel 集、 $E \subseteq B$ ，并且

$$B \setminus E \subseteq \bigcup_k (B_k \setminus E_k)$$

为零测集。

还要把这个零测差集放进 Borel 零集，才能得到完备化的标准表述。记  $N = B \setminus E$ 。对每个  $n$ ，再次由覆盖定义取开集  $H_n \supseteq N$ ，使  $m(H_n) < 2^{-n}$ 。于是  $Z = \bigcap_n H_n$  是 Borel 零集且包含  $N = E \triangle B$ 。这证明了从左到右的包含。

反过来，设  $B, Z$  是定理中的 Borel 集。由 定理 3.2.2，二者都 Lebesgue 可测；由完备性， $Z$  的任意子集也可测。因为  $E \triangle B \subseteq Z$ ，集合  $E$  可由  $B$  增删两个  $Z$  的子集得到，故  $E \in \mathcal{L}^d$ 。这也说明  $\mathcal{L}^d$  恰是限制测度  $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$  的完备化。□

无穷测度时不能直接使用  $m(G) < m(E) + \varepsilon$  这一有限误差式，因此证明先用  $[-k, k]^d$  局部化，再合并各个有限测度部分。这个局部化方法将在正则性证明中再次使用。

## 3.3 正则性

Lebesgue 可测集可能由任意零测子集修正而来，外观并不一定规则。正则性却保证：就测度而言，开集、闭集与紧集已经足以逼近任意可测集。外逼近直接继承自覆盖定义；内逼近则要先局部化到有限测度盒子，再对补集使用外逼近。

### 3.3.1 外正则性

**定理 3.3.1.** Lebesgue 测度具有**外正则性** (outer regularity) : 对每个  $E \in \mathcal{L}^d$ ,

$$m(E) = \inf\{m(G) : E \subseteq G, G \text{ 开}\}.$$

而且对每个  $\varepsilon > 0$ , 即使  $m(E) = \infty$ , 也存在开集  $G \supseteq E$ , 使

$$m(G \setminus E) < \varepsilon.$$

证明. 下确界等式已由 [命题 3.1.10](#) 对任意子集证明. 若  $m(E) < \infty$ , 同一命题给出开集  $G \supseteq E$ , 使  $m(G) < m(E) + \varepsilon$ . 由于  $E$  可测且测度有限,

$$m(G) = m(E) + m(G \setminus E),$$

所以  $m(G \setminus E) < \varepsilon$ .

现在设  $m(E) = \infty$ . 把  $E$  写成有限测度可测集的不交并. 例如令

$$A_1 = E \cap [-1, 1]^d, \quad A_k = E \cap ([-k, k]^d \setminus [-k+1, k-1]^d) \quad (k \geq 2).$$

对每个  $k$ , 由有限测度情形可取开集  $G_k \supseteq A_k$ , 使

$$m(G_k \setminus A_k) < \varepsilon 2^{-k}.$$

令  $G = \bigcup_k G_k$ . 于是  $G$  开且包含  $E$ , 并且

$$G \setminus E \subseteq \bigcup_k (G_k \setminus A_k).$$

由可数次可加性,  $m(G \setminus E) < \varepsilon$ . 因此误差式对无穷测度集合也成立.  $\square$

若  $m(E) = \infty$ , 所有开超集同样具有无穷测度, 所以下确界等式本身是退化的. 此时逼近信息体现在差集估计  $m(G \setminus E) < \varepsilon$  中; 这个估计来自刚才的有界分片.

### 3.3.2 内正则性

**定理 3.3.2.** Lebesgue 测度具有**内正则性** (inner regularity) : 对每个  $E \in \mathcal{L}^d$ , 包括  $m(E) = \infty$  的情形, 都有

$$m(E) = \sup\{m(K) : K \subseteq E, K \text{ 紧}\}.$$

若  $m(E) < \infty$ , 则对每个  $\varepsilon > 0$  可取紧集  $K \subseteq E$ , 使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 先设  $E$  测度有限. 由测度的从下连续性,

$$E \cap [-n, n]^d \uparrow E, \quad m(E \cap [-n, n]^d) \uparrow m(E).$$

因此可取  $n$ , 使

$$m(E \setminus [-n, n]^d) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令  $C = [-n, n]^d$  与  $F = C \setminus E$ . 集合  $F$  可测且具有有限测度. 由 定理 3.3.1, 存在开集  $U \supseteq F$ , 使

$$m(U \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

集合  $K = C \setminus U$  是紧集, 并且  $K \subseteq C \cap E$ . 此外

$$E \setminus K \subseteq (E \setminus C) \cup (U \setminus F),$$

故  $m(E \setminus K) < \varepsilon$ . 这证明了有限测度情形的误差式, 也给出相应的上确界等式。

再设  $m(E) = \infty$ . 仍有  $m(E \cap [-n, n]^d) \uparrow \infty$ . 给定  $M > 0$ , 先取  $n$  使  $m(E \cap [-n, n]^d) > M + 1$ , 再把已经证明的有限测度情形应用于  $E \cap [-n, n]^d$ , 得到紧集  $K \subseteq E \cap [-n, n]^d$ , 满足

$$m(K) > m(E \cap [-n, n]^d) - 1 > M.$$

因此所有包含于  $E$  的紧集的测度上确界为无穷, 恰等于  $m(E)$ . □

有限性只在差集误差式中不可缺少. 若  $m(E) = \infty$ , 任何紧集  $K$  都有有限测度, 因而  $m(E \setminus K) = \infty$ ; 此时正确的说法是可在  $E$  内找到测度任意大的紧集, 而不是找到与  $E$  相差有限小误差的单个紧集。

### 3.3.3 开集与紧集逼近

**命题 3.3.3.** 若  $E \in \mathcal{L}^d$  且  $m(E) < \infty$ , 则对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在紧集  $K$  与开集  $G$ , 使

$$K \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 由内正则性取紧集  $K \subseteq E$ , 使  $m(E \setminus K) < \varepsilon/2$ ; 由外正则性取开集  $G \supseteq E$ , 使  $m(G \setminus E) < \varepsilon/2$ . 两个差集不交, 且

$$G \setminus K = (G \setminus E) \sqcup (E \setminus K).$$

可数可加性给出所需估计. □

这条夹逼把测度问题转化为拓扑问题. 例如要证明一个关于有限测度集的性质, 只要该性质对紧集成立、在开集中可稳定扩张, 并且对小测度误差不敏感, 往往就能先在  $K$  上证明, 再通过  $K \subseteq E \subseteq G$  传回  $E$ . 后续的简单函数逼近、Lusin 定理和积分的平移连续性都会使用这一思路。

需要注意,  $m(E) < \infty$  不能从夹逼结论中删除. 若  $E = \mathbb{R}^d$ , 每个紧集  $K$  都有有限测度, 而每个含  $E$  的开集只能是  $\mathbb{R}^d$ , 故  $m(G \setminus K) = \infty$ . 无穷测度情形应先在  $[-n, n]^d$  中局部化。

### 3.3.4 可测集的 Borel 逼近

开集的可数交称为  $G_\delta$  集 (G-delta set), 闭集的可数并称为  $F_\sigma$  集 (F-sigma set)。这两类集合都是 Borel 集。

**定理 3.3.4.** 对每个  $E \in \mathcal{L}^d$ , 存在  $G_\delta$  集  $B$  与  $F_\sigma$  集  $F$ , 使

$$F \subseteq E \subseteq B, \quad m(E \setminus F) = m(B \setminus E) = 0.$$

特别地, 存在 Borel 集  $C$  使

$$m(E \Delta C) = 0.$$

证明. 对每个  $n \geq 1$ , 由 定理 3.3.1 取开集  $G_n \supseteq E$ , 使

$$m(G_n \setminus E) < 2^{-n}.$$

令  $B = \bigcap_n G_n$ . 这是  $G_\delta$  集, 且  $E \subseteq B$ . 对每个  $n$ ,

$$B \setminus E \subseteq G_n \setminus E,$$

故  $m(B \setminus E) \leq 2^{-n}$ . 令  $n \rightarrow \infty$ , 得到  $m(B \setminus E) = 0$ . 这个论证没有用  $m(E) < \infty$ , 因为外正则性的差集版本已经处理了无穷测度。

将刚才的结论应用于  $E^c$ , 得到一个  $G_\delta$  集  $D \supseteq E^c$ , 使  $m(D \setminus E^c) = 0$ . 令  $F = D^c$ , 则  $F$  是  $F_\sigma$  集且包含于  $E$ , 并且

$$E \setminus F = D \setminus E^c$$

为零测集。取  $C = B$  即得最后的对称差结论。  $\square$

定理 3.2.6 给出 Borel 代表, 上述定理进一步控制代表的位置: 外侧代表可取为  $G_\delta$  集, 内侧代表可取为  $F_\sigma$  集。因此, Lebesgue 可测集虽然未必是 Borel 集, 但在忽略零测误差后总能由这两类 Borel 集夹逼。

## 3.4 欧氏变换下的行为

Lebesgue 测度由坐标长方体构造, 但最后的答案不应依赖坐标原点或正交标架。本节从覆盖定义出发验证这一点。平移可以直接搬运覆盖; 可逆线性变换则可分解为坐标置换、反射、单坐标伸缩与剪切 (shear)。剪切是其中唯一不把长方体送成长方体的步骤, 需要单独作覆盖估计。奇异线性变换不能由这些可逆变换复合而成, 将在最后利用其像落在真子空间中单独处理。

### 3.4.1 平移不变性

对  $a \in \mathbb{R}^d$ , 记  $\tau_a(x) = x + a$ 。

**定理 3.4.1.** 对任意  $A \subseteq \mathbb{R}^d$  与  $a \in \mathbb{R}^d$ ,

$$m^*(A + a) = m^*(A).$$

若  $E \in \mathcal{L}^d$ , 则  $E + a \in \mathcal{L}^d$ , 且

$$m(E + a) = m(E).$$

证明. 若  $(Q_n)$  覆盖  $A$ , 则  $(Q_n + a)$  覆盖  $A + a$ , 而每个  $Q_n + a$  仍是半开长方体并满足  $\text{vol}(Q_n + a) = \text{vol}(Q_n)$ . 对全部覆盖取下确界, 得到

$$m^*(A + a) \leq m^*(A).$$

把同一结论应用于集合  $A + a$  和向量  $-a$ , 得到反向不等式。

再设  $E$  可测, 并任取  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ . 将 Carathéodory 等式应用于  $A - a$  与  $E$ , 再使用刚证明的外测度平移不变性, 得到

$$\begin{aligned} m^*(A) &= m^*(A - a) \\ &= m^*((A - a) \cap E) + m^*((A - a) \setminus E) \\ &= m^*(A \cap (E + a)) + m^*(A \setminus (E + a)). \end{aligned}$$

故  $E + a$  可测。对它使用外测度等式即得  $m(E + a) = m(E)$ . □

平移不变性给出一个简单但重要的归一化: 任意长为  $b - a$  的区间都与  $(0, b - a]$  有相同测度, 位置不参与长度计算。

### 3.4.2 可逆线性变换与行列式

先处理坐标超平面。这个零测结论既解决反射后的端点问题, 也将在奇异线性映射处使用。

**引理 3.4.2.** 每个坐标超平面

$$H_i = \{x \in \mathbb{R}^d : x_i = 0\}$$

都是零测集。

证明. 对  $N \geq 1$  与  $\delta, \eta > 0$ , 集合  $H_i \cap [-N, N]^d$  包含于一个第  $i$  条边长度为  $2\delta$ 、其余边长度为  $2N + \eta$  的半开长方体, 故

$$m^*(H_i \cap [-N, N]^d) \leq 2\delta(2N + \eta)^{d-1}.$$

先令  $\eta \downarrow 0$ , 再令  $\delta \downarrow 0$ , 得到这部分外测度为零。再由  $H_i = \bigcup_N (H_i \cap [-N, N]^d)$  与可数次可加性, 得到  $m^*(H_i) = 0$ . □

**引理 3.4.3.** 设  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ . 初等线性映射对外测度有如下作用:

1. 坐标置换与单坐标反射保持  $m^*(A)$ ;
2. 若  $S_{ij,t}$  是剪切

$$S_{ij,t}(x)_i = x_i + tx_j, \quad S_{ij,t}(x)_k = x_k \quad (k \neq i),$$

其中  $i \neq j$ , 则  $m^*(S_{ij,t}A) = m^*(A)$ ;



3. 若  $D_{i,c}$  只把第  $i$  个坐标乘以  $c > 0$ , 则

$$m^*(D_{i,c}A) = c m^*(A).$$

这些映射及其逆映射都把 Lebesgue 可测集送到 Lebesgue 可测集。

证明. 先记录一个反复使用的零误差原则: 若  $m^*(B \triangle C) = 0$ , 则

$$m^*(B) \leq m^*(C) + m^*(B \setminus C) = m^*(C).$$

交换  $B, C$  后得到反向不等式, 故  $m^*(B) = m^*(C)$ 。

坐标置换把半开长方体送到同体积的半开长方体, 因此搬运覆盖即可得到外测度不变。单坐标反射把区间  $(a_i, b_i]$  送到  $[-b_i, -a_i]$ , 后者与同长度的标准半开区间  $(-b_i, -a_i]$  只差至多两个端点。因此, 反射后的长方体与一个同体积半开长方体的对称差包含于有限个平移后的坐标超平面的并。由 定理 3.4.1 与 引理 3.4.2, 这个对称差是零测集; 零误差原则说明二者外测度相同。把任意长方体覆盖逐项反射, 再对反射自身应用同一论证, 便得到 (1)。

下面证明剪切情形。写

$$Q = \prod_{k=1}^d (a_k, b_k], \quad \ell_k = b_k - a_k.$$

把第  $j$  个坐标区间等分成  $N$  段, 便把  $Q$  分成  $N$  个两两不交的薄长方体。对每个薄长方体, 第  $j$  个坐标的振幅为  $\ell_j/N$ , 所以剪切后第  $i$  个坐标的振幅至多

$$\ell_i + \frac{|t|\ell_j}{N};$$

其余坐标振幅不变。固定  $N$ , 并任取  $\eta > 0$ 。把端点略微外扩后, 可用  $N$  个半开长方体覆盖这些像, 并使覆盖总体积小于

$$N \left( \ell_i + \frac{|t|\ell_j}{N} \right) \frac{\ell_j}{N} \prod_{k \neq i,j} \ell_k + \eta.$$

因此

$$\begin{aligned} m^*(S_{ij,t}Q) &\leq N \left( \ell_i + \frac{|t|\ell_j}{N} \right) \frac{\ell_j}{N} \prod_{k \neq i,j} \ell_k + \eta \\ &= \text{vol}(Q) + \frac{|t|\ell_j^2}{N} \prod_{k \neq i,j} \ell_k + \eta. \end{aligned}$$

先令  $\eta \downarrow 0$ , 再令  $N \rightarrow \infty$ , 得到  $m^*(S_{ij,t}Q) \leq \text{vol}(Q)$ 。若  $(Q_n)$  覆盖  $A$ , 则  $(S_{ij,t}Q_n)$  覆盖  $S_{ij,t}A$ ; 利用刚才对每一项的估计以及外测度的可数次可加性, 得到

$$m^*(S_{ij,t}A) \leq \sum_n \text{vol}(Q_n).$$



对覆盖取下确界可得  $m^*(S_{ij,t}A) \leq m^*(A)$ 。逆映射是  $S_{ij,-t}$ ，对它应用同一不等式便得到反向不等式，从而证明 (2)。

最后， $D_{i,c}$  把每个半开长方体送到半开长方体，并把体积乘以  $c$ 。搬运覆盖给出  $m^*(D_{i,c}A) \leq c m^*(A)$ 。再对  $D_{i,c}^{-1} = D_{i,c^{-1}}$  使用同一不等式，得到反向不等式，故 (3) 成立。

剩下验证可测性。上述每个映射  $F$  都是双射，并满足

$$m^*(FA) = \gamma m^*(A)$$

对所有  $A$  成立，其中  $0 < \gamma < \infty$ 。若  $E \in \mathcal{L}^d$ ，则对任意  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ ，

$$\begin{aligned} m^*(A) &= \gamma m^*(F^{-1}A) \\ &= \gamma m^*(F^{-1}A \cap E) + \gamma m^*(F^{-1}A \setminus E) \\ &= m^*(A \cap FE) + m^*(A \setminus FE). \end{aligned}$$

所以  $FE$  可测；对逆映射同理。 □

**定理 3.4.4.** 若  $T: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$  是可逆线性变换，则对每个  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ ，

$$m^*(TA) = |\det T| m^*(A).$$

若  $E \in \mathcal{L}^d$ ，则  $TE \in \mathcal{L}^d$ ，且

$$m(TE) = |\det T| m(E).$$

特别地，正交变换  $U$  满足

$$m^*(UA) = m^*(A), \quad m(UE) = m(E) \quad (E \in \mathcal{L}^d).$$

证明. 高斯消元表明，每个可逆矩阵都可写成有限个初等矩阵的乘积：交换两个坐标、把一个坐标乘以非零常数，或把一个坐标的倍数加到另一个坐标。负的坐标倍乘可再分成反射与正倍乘。由引理 3.4.3，相应外测度因子分别为 1、正倍乘常数的绝对值和 1。这些因子的乘积等于矩阵行列式的绝对值，因为每个初等矩阵的因子正是其行列式绝对值。

把分解中各步的外测度因子相乘，得到

$$m^*(TA) = |\det T| m^*(A).$$

每个初等映射及其逆映射均保持 Lebesgue 可测性，其有限复合也保持；因而  $T$  与  $T^{-1}$  都保持可测性。对可测集限制上式，便得到测度公式。若  $U$  正交，则  $|\det U| = 1$ ，最后两式随即成立。 □

一般旋转把坐标长方体送到斜放的平行多面体，像集不再是坐标长方体，因而不能直接搬运原来的长方体覆盖。上述证明依靠剪切覆盖估计和矩阵的初等分解填补了这一环节。

### 3.4.3 正交变换与伸缩

**命题 3.4.5.** 若  $r \neq 0$ , 则对任意  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ , 有

$$m^*(rA) = |r|^d m^*(A).$$

若  $r = 0$ , 则  $rA$  是空集或单点, 因而  $m^*(rA) = 0$ . 在两种情形下, 若  $E$  Lebesgue 可测, 则  $rE$  也 Lebesgue 可测。

证明. 若  $r \neq 0$ , 映射  $x \mapsto rx$  可逆, 其行列式为  $r^d$ , 故结论直接来自 定理 3.4.4.

若  $r = 0$ , 则  $rA$  为空集或单点, 两者都是零测集, 此时像集自动可测。  $\square$

例如半径为  $r > 0$  的球  $B(0, r) = rB(0, 1)$  满足

$$m(B(0, r)) = r^d m(B(0, 1)).$$

本章尚不需要计算常数  $m(B(0, 1))$ ; 重要的是维数  $d$  决定了伸缩指数。

### 3.4.4 奇异线性变换

先处理奇异线性映射的像空间。

**命题 3.4.6.**  $\mathbb{R}^d$  的每个真线性子空间都是 Lebesgue 零测集; 因此它的任意子集也 Lebesgue 可测且测度为零。

证明. 设  $L$  为真线性子空间。把  $L$  的一组规范正交基扩充为  $\mathbb{R}^d$  的规范正交基; 相应的正交变换  $U$  把  $L$  送入某个坐标超平面。由 定理 3.4.4 与 引理 3.4.2,

$$m^*(L) = m^*(UL) = 0.$$

最后使用 命题 3.2.4。  $\square$

**定理 3.4.7.** 设  $T: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$  为线性映射。对每个  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ ,

$$\begin{cases} m^*(TA) = |\det T| m^*(A), & T \text{ 可逆}, \\ m^*(TA) = 0, & T \text{ 奇异}. \end{cases}$$

若  $E \in \mathcal{L}^d$ , 则  $TE \in \mathcal{L}^d$ , 并且

$$\begin{cases} m(TE) = |\det T| m(E), & T \text{ 可逆}, \\ m(TE) = 0, & T \text{ 奇异}. \end{cases}$$

若约定  $0 \cdot \infty = 0$ , 两种情形才可合并写成统一的行列式公式。

证明. 若  $T$  可逆, 全部结论已经由 定理 3.4.4 证明。

再设  $T$  奇异。其值域  $\text{ran } T$  是真线性子空间, 而

$$TA \subseteq \text{ran } T.$$

由 命题 3.4.6, 集合  $TA$  对任意  $A$  都可测且测度为零, 这正是第二种情形。  $\square$

上述结论包含三种信息:  $|\det T| = 1$  的可逆变换保持体积;  $|\det T| > 1$  或小于 1 时体积按固定比例放大或缩小;  $T$  奇异时, 任意像集的满维外测度都塌缩为零。可逆情形中的绝对值不可省略, 因为改变定向不应产生负体积。

### 3.5\* 不可测集合

本节是选读内容。前面已经把 Lebesgue 测度在 Borel  $\sigma$ -代数上的限制完备化，但“完备”只表示零测集的任意子集可测，并不表示  $\mathbb{R}^d$  的任意子集可测。Vitali 构造说明，若还要求测度可数可加、平移不变，并赋予区间通常的长度，那么不可测集合必然出现。

#### 3.5.1 Vitali 集

在  $[0, 1]$  上定义关系

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

这是等价关系：自反性与对称性直接来自  $0 \in \mathbb{Q}$  和有理数对取负封闭；传递性来自有理数对加法封闭。每个等价类是  $(x + \mathbb{Q}) \cap [0, 1]$ ，因而可数；但等价类的总数不可数，否则  $[0, 1]$  会成为可数个可数集的并。

从每个等价类中选取一个代表元，并把全体代表元组成的集合记为  $V$ 。这样的代表元集合称为 **Vitali 集** (Vitali set)。

**定理 3.5.1.** 上述集合  $V \subseteq [0, 1]$  不是 Lebesgue 可测集。因此实直线存在非 Lebesgue 可测子集。

证明. 记  $D = \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 。先证明平移族  $\{V + q : q \in D\}$  两两不交。若

$$v + q = w + r, \quad v, w \in V, \quad q, r \in D,$$

则  $v - w = r - q \in \mathbb{Q}$ ，所以  $v \sim w$ 。集合  $V$  在每个等价类中只取一个代表，故  $v = w$ ，继而  $q = r$ 。

再核对覆盖和边界。给定  $x \in [0, 1]$ ，其等价类的代表元  $v \in V$  满足  $q = x - v \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1] = D$ ，所以  $x \in V + q$ 。另一方面， $V \subseteq [0, 1]$  且  $q \in [-1, 1]$ ，故

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in D} (V + q) \subseteq [-1, 2].$$

区间端点是零测集，因而  $m([0, 1]) = 1$  且  $m([-1, 2]) = 3$ 。

假设  $V$  可测。由平移不变性，每个  $V + q$  都可测，并具有同一个测度  $\alpha = m(V)$ 。又因  $V \subseteq [0, 1]$ ，有  $0 \leq \alpha \leq 1$ 。枚举可数集  $D = \{q_n : n \geq 1\}$ ，利用两两不交性和可数可加性可得

$$m\left(\bigcup_{q \in D} (V + q)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(V + q_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha.$$

若  $\alpha = 0$ ，右端为零，与该并包含  $[0, 1]$  矛盾；若  $\alpha > 0$ ，右端为无穷，与该并包含于有限测度区间  $[-1, 2]$  矛盾。两种可能都被排除，所以  $V$  不可测。□

代表元的唯一性保证有理平移彼此不交，平移不变性使这些平移集等测度，可数可加性计算它们的并；区间具有有限正测度，因而共同测度为零和为正两种可能都导致矛盾。

### 3.5.2 选择公理的作用

Vitali 集的定义要求对商集  $[0, 1]/\sim$  中的每个等价类同时选取一个元素。这里需要一个选择原则；在本书默认的 ZFC 公理体系中，**选择公理** (axiom of choice) 保证这个代表元集合存在。上述构造并不给出依次写下所有代表元的算法。

选择公理只负责保证代表元集合  $V$  存在，之后的测度论矛盾只使用平移不变性、可数可加性与区间测度。由此构造的不可测集也说明，积分理论必须先指定可测集合族。

### 3.5.3 完备性与不可测性

完备性与“处处有定义”之间存在容易混淆的界线。若  $N$  为零测集，则每个  $A \subseteq N$  都可测；这是因为任意测试集被  $A$  切分后，两部分的外测度不可能超过原测试集与零误差之和。Vitali 集却不能藏在零测集中。

**命题 3.5.2.** Vitali 集  $V$  满足以下两条性质：

1. 每个 Lebesgue 可测子集  $A \subseteq V$  都有  $m(A) = 0$ ；
2. 其外测度满足  $m^*(V) > 0$ 。

因此不能通过给  $V$  增删一个零测集而把它变成 Borel 集。

证明. 若可测集  $A \subseteq V$  满足  $m(A) > 0$ ，则上一证明中的不交性同样适用于  $A + q$  ( $q \in D$ )。这些集合都具有测度  $m(A) > 0$ ，其可数并却包含于  $[-1, 2]$ 。可数可加性迫使该并测度为无穷，与  $m([-1, 2]) = 3$  矛盾。这证明 (1)。

若  $m^*(V) = 0$ ，则由命题 3.2.4，集合  $V$  本身可测，与定理 3.5.1 矛盾，故 (2) 成立。最后，若  $V \triangle B$  包含于某个 Borel 零集，其中  $B$  为 Borel 集，则定理 3.2.6 会推出  $V \in \mathcal{L}^1$ ，再次矛盾。□

所以，Lebesgue 完备化只填补 Borel 零集内部的空隙。它允许在零测集上修改函数而仍保留可测性，却不能把任意集合都纳入测度的定义域。

#### 本章小结

本章完成了从欧氏几何体积到完备测度的整条构造链。半开长方体构成半环；有限网格给出有限可加性，紧集的有限子覆盖把它提升为可数可加性。由半环延拓得到的覆盖外测度在长方体上恰等于体积，其 Carathéodory 可测集组成  $\mathcal{L}^d$ ，限制后的测度记为  $m$ 。Borel  $\sigma$ -代数包含于  $\mathcal{L}^d$ ，而  $\mathcal{L}^d$  正是限制测度  $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$  的完备化。外正则性从覆盖定义而来，内正则性则由有界截断和对补集的外逼近推出。局部化到有界盒子后，这些结论同样能处理无穷测度集合。初等矩阵对长方体覆盖的作用给出平移不变性、剪切不变性和单坐标伸缩公式；高斯消元再把它们组合成可逆情形的公式

$$m(TE) = |\det T| m(E).$$

当  $T$  奇异时, 像落在零测的真子空间中, 因而直接有  $m(TE) = 0$ , 无需进行  $0 \cdot \infty$  运算。Vitali 集最后说明, 可数可加、平移不变并且赋予区间通常长度的测度, 不能定义在实直线的全部子集上。

## 习题

**习题 3.1.** 设  $Q = \prod_{j=1}^d (a_j, b_j]$ . 证明  $\partial Q$  是零测集, 并由此证明把任意若干坐标区间的端点改成开端点或闭端点, 不会改变所得长方体的测度。

解. 边界  $\partial Q$  包含于有限个坐标超平面

$$\{x : x_j = a_j\}, \quad \{x : x_j = b_j\} \quad (1 \leq j \leq d).$$

由命题 3.4.6, 每个这样的超平面都是零测集, 故它们的有限并也是零测集。改变端点只会增删  $\partial Q$  的子集; Lebesgue 测度完备, 因而改变后的集合仍可测, 并与  $Q$  有相同测度。□

**习题 3.2.** 给定  $\varepsilon > 0$ , 在子空间  $[0, 1]$  中构造一个开且稠密的集合  $G$ , 使  $m(G) < \varepsilon$ 。进而给出一个正测度、无内点的闭集。

解. 枚举  $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_n : n \geq 1\}$ , 并令

$$G = [0, 1] \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} (q_n - \varepsilon 2^{-n-2}, q_n + \varepsilon 2^{-n-2}).$$

集合  $G$  在子空间  $[0, 1]$  中开且稠密, 并且由可数次可加性

$$m(G) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-n-1} < \varepsilon.$$

其补集  $F = [0, 1] \setminus G$  闭且没有内点, 同时  $m(F) = 1 - m(G) > 1 - \varepsilon$ 。取  $0 < \varepsilon < 1$  即得所求正测度例子。□

**习题 3.3.** 设  $0 < \rho < 1/2$ 。从  $[0, 1]$  开始, 每一步在每个保留下来的区间中保留左右两个长度为原来  $\rho$  倍的闭子区间。证明极限集合  $C_\rho$  不可数且为零测集。

解. 第  $n$  步留下  $2^n$  个长度为  $\rho^n$  的闭区间, 故

$$m(C_\rho) \leq 2^n \rho^n = (2\rho)^n.$$

令  $n \rightarrow \infty$  得  $m(C_\rho) = 0$ 。另一方面, 每个无限序列  $(\omega_n) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  唯一指定逐层选择左区间或右区间所得的一点; 两个不同序列在第一次选择不同处落入两个不交区间, 因此得到不同的点。于是  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  单射到  $C_\rho$ , 后者不可数。□

**习题 3.4.** 设  $E \in \mathcal{L}^d$  且  $m(E) < \infty$ 。证明对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在半开长方体的有限并  $R$ , 使

$$m(E \triangle R) < \varepsilon.$$

解. 由 命题 3.3.3, 可取紧集  $K$  与开集  $G$ , 使  $K \subseteq E \subseteq G$  且  $m(G \setminus K) < \varepsilon$ . 对每个  $x \in K$ , 取一个含  $x$  且闭包包含于  $G$  的足够小半开长方体. 紧性给出有限子覆盖, 其并记为  $R$ . 于是  $K \subseteq R \subseteq G$ , 从而

$$E \Delta R \subseteq G \setminus K.$$

有限个半开长方体的并属于它们生成的集合环, 故可测, 结论由单调性得到.  $\square$

**习题 3.5.** 设  $E \in \mathcal{L}^d$ . 证明存在一个  $F_\sigma$  集  $F$  和一个  $G_\delta$  集  $B$ , 使

$$F \subseteq E \subseteq B, \quad m(E \setminus F) = m(B \setminus E) = 0.$$

解. 由 定理 3.3.4 的证明, 对每个  $n$  可取开集  $G_n \supseteq E$ , 使  $m(G_n \setminus E) < 2^{-n}$ . 于是  $B = \bigcap_n G_n$  是  $G_\delta$  集, 且

$$m(B \setminus E) \leq m(G_n \setminus E) < 2^{-n}$$

对每个  $n$  都成立, 故该测度为零. 将同一结论应用于  $E^c$ , 得到一个  $G_\delta$  集  $C \supseteq E^c$ , 使  $m(C \setminus E^c) = 0$ . 令  $F = C^c$ , 则  $F$  是  $F_\sigma$  集, 且  $F \subseteq E$ ,  $m(E \setminus F) = 0$ .  $\square$

**习题 3.6.** 设  $A \subseteq \mathbb{R}^d$  是零测集. 证明  $A \times \mathbb{R}^k \subseteq \mathbb{R}^{d+k}$  是零测集.

解. 只需对每个整数  $N \geq 1$  证明  $A \times [-N, N]^k$  零测, 再对  $N$  取可数并. 给定  $\varepsilon > 0$ , 用长方体  $Q_n \subseteq \mathbb{R}^d$  覆盖  $A$ , 使

$$\sum_n \text{vol}_d(Q_n) < \frac{\varepsilon}{(2N+1)^k}.$$

则  $Q_n \times (-N-1, N]^k$  覆盖  $A \times [-N, N]^k$ , 且总体积小于  $\varepsilon$ . 令  $\varepsilon \downarrow 0$  即得结论.  $\square$

**习题 3.7.** 设  $A(x) = Tx + a$  是仿射映射. 证明对每个 Lebesgue 可测集  $E$ , 集合  $A(E)$  可测; 若  $T$  可逆, 则

$$m(A(E)) = |\det T| m(E),$$

而当  $T$  奇异时,  $m(A(E)) = 0$ .

解. 由 定理 3.4.7, 集合  $T(E)$  可测; 在  $T$  可逆时其测度为  $|\det T| m(E)$ , 在  $T$  奇异时其测度为零. 再由 定理 3.4.1, 平移  $T(E) + a$  可测且不改变测度. 两者合并即得结论.  $\square$

**习题 3.8.** 设  $d \geq 2$ ,  $f: \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$ . 若存在常数  $L \geq 0$ , 使任意  $x, y \in \mathbb{R}^{d-1}$  都满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|,$$

就称  $f$  为 **Lipschitz 函数** (Lipschitz function). 仅用长方体覆盖证明其图像

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^{d-1}\}$$

是  $\mathbb{R}^d$  中的零测集.



解. 先固定  $N$ , 只考虑

$$\Gamma_{f,N} = \{(x, f(x)) : x \in [-N, N]^{d-1}\}.$$

给定  $0 < \delta \leq 2N$ , 令

$$M = \left\lceil \frac{2N}{\delta} \right\rceil, \quad h = \frac{2N}{M}.$$

于是  $h \leq \delta$ . 把每个坐标区间  $[-N, N]$  等分为  $M$  段, 得到恰好  $M^{d-1}$  个边长为  $h$  的底面小立方体. 每个小立方体的直径为  $\sqrt{d-1}h$ , 故  $f$  在其上的振幅至多

$$L\sqrt{d-1}h.$$

任取  $\eta > 0$ . 把各底面与相应的值域区间略微外扩, 可用半开长方体覆盖每块图像, 并使这些长方体的总体积小于

$$M^{d-1}h^{d-1}(L\sqrt{d-1}h) + \eta = (2N)^{d-1}L\sqrt{d-1}h + \eta.$$

因此

$$m^*(\Gamma_{f,N}) \leq (2N)^{d-1}L\sqrt{d-1}h + \eta.$$

先令  $\eta \downarrow 0$ , 再令  $\delta \downarrow 0$ , 得到  $m^*(\Gamma_{f,N}) = 0$ . 最后由  $\Gamma_f = \bigcup_{N=1}^{\infty} \Gamma_{f,N}$  和可数次可加性, 得到  $m^*(\Gamma_f) = 0$ .  $\square$

**习题 3.9.** 令  $V$  为定理 3.5.1 中选出的 Vitali 集. 证明  $V$  的每个 Lebesgue 可测子集都具有测度零, 并推出

$$\sup\{m(A) : A \subseteq V, A \in \mathcal{L}^1\} = 0, \quad m^*(V) > 0.$$

解. 若可测集  $A \subseteq V$  满足  $m(A) > 0$ , 则  $A + q$  ( $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ ) 两两不交且测度均为  $m(A)$ . 它们的并包含于  $[-1, 2]$ , 但可数可加性会使该并具有无穷测度, 矛盾. 因此每个这样的  $A$  都零测, 左式成立.

另一方面, 若  $m^*(V) = 0$ , 则  $V$  可测; Vitali 构造中的覆盖  $[0, 1] \subseteq \bigcup_q (V + q)$  随即给出  $1 \leq 0$ , 矛盾. 因此  $m^*(V) > 0$ .  $\square$

**习题 3.10.** 记

$$\mathcal{R}(Q_d) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^m Q_i : m \geq 0, Q_i \in Q_d \right\}.$$

对有限不交表示  $R = \bigsqcup_{i=1}^m Q_i$ , 定义

$$v(R) = \sum_{i=1}^m \text{vol}(Q_i).$$

1. 证明  $v(R)$  与所选表示无关;
2. 不直接引用半环延拓定理, 利用定理 3.1.4 证明  $v$  是集合环  $\mathcal{R}(Q_d)$  上的前测度。

解. 若

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m Q_i = \bigsqcup_{j=1}^k P_j,$$

则每个  $Q_i$  都被有限不交族  $(Q_i \cap P_j)_{1 \leq j \leq k}$  分割, 每个  $P_j$  也被  $(Q_i \cap P_j)_{1 \leq i \leq m}$  分割. 由引理 3.1.2 的有限网格可加性,

$$\sum_{i=1}^m \text{vol}(Q_i) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \text{vol}(Q_i \cap P_j) = \sum_{j=1}^k \text{vol}(P_j).$$

所以  $v$  定义良好.

再设  $(R_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{R}(Q_d)$  两两不交, 且其并  $R \in \mathcal{R}(Q_d)$  满足

$$R = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} R_n.$$

分别取有限不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m P_i, \quad R_n = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} Q_{n,j}.$$

对固定的  $i$ , 可数族  $(P_i \cap Q_{n,j})_{n,j}$  两两不交并覆盖  $P_i$ , 故 定理 3.1.4 给出

$$\text{vol}(P_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} \text{vol}(P_i \cap Q_{n,j}).$$

另一方面, 有限网格可加性给出

$$\text{vol}(Q_{n,j}) = \sum_{i=1}^m \text{vol}(P_i \cap Q_{n,j}).$$

所有项均非负, 因而可以重排求和次序, 得到

$$v(R) = \sum_{i=1}^m \text{vol}(P_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} \text{vol}(Q_{n,j}) = \sum_{n=1}^{\infty} v(R_n).$$

这正是  $v$  在该集合环上的可数可加性; 又  $v(\emptyset) = 0$ , 所以  $v$  是前测度。 □



## 第四章 可测函数与可测逼近

集合的可测性只回答哪些区域可以赋予测度；积分理论还需要判断函数是否与这些区域相容。本章从第一章的一般可测映射出发，建立实值、扩展实值和复值函数的可测性判别，证明可测性在代数运算、可数上下确界和逐点极限下保持。随后用二进量化和截断把扩展实值可测函数逼近为实值简单函数列。若  $E \subseteq \mathbb{R}^d$  可测、 $m(E) < \infty$ ，且函数在  $E$  上几乎处处有限，Lusin 定理说明：对任意  $\varepsilon > 0$ ，可以在  $E$  内找到紧集  $K$ ，使  $m(E \setminus K) < \varepsilon$  且限制函数在  $K$  上连续。Egoroff 定理则在一般有限测度空间中，把几乎处处收敛化为删去任意小测度集合后的一致收敛。

### 本章目标

- 能用阈值集判断扩展实值函数的可测性，并能处理复值函数、复合函数与合法的代数运算；
- 能证明可数上确界、下确界、上极限、下极限及逐点极限保持可测性，并指出可数性不可删；
- 能写出非负可测函数的显式单调简单函数逼近，并正确使用正部、负部和值域截断；
- 能区分“几乎处处相等”“在大紧集上连续”与“几乎处处连续”，并说明完备性在零测集修改中的作用；
- 能复原 Lusin 定理和 Egoroff 定理的证明，准确标出有限测度、几乎处处有限与正则性假设的使用位置。

### 阅读提示

本章调用前三章的三组工具。第一章已经给出可测映射、生成元判别、复合、示性函数和实值阈值判别，本章只把这些工具扩展到积分所需的函数类；第二章的测度连续性控制递减坏集；第三章的完备性与正则性负责处理零测例外和紧集逼近。内部路线是

可测性判别  $\rightarrow$  极限封闭性  $\rightarrow$  简单函数与截断  $\rightarrow \begin{cases} \text{Lusin 的大集连续性,} \\ \text{Egoroff 的大集一致性.} \end{cases}$

其中第 4.3 节是第五章定义积分的直接接口。Lusin 定理在本书中先于 Egoroff 定理，因此其证明直接使用值域分割、尾集控制、测度连续性和内正则性，不预借后一结果。

## 4.1 可测函数

前三章建立了可测集合和测度。本章转而研究函数：一个函数是否可测，取决于它能否把值域中的 Borel 集拉回定义域的可测集。实值函数可以用半直线检验，这使函数的代数运算和极限运算都能还原成可数次集合运算。本节先把第 1.4 节的可测映射语言扩展到允许无穷值的函数，再处理 Borel 可测性、复值函数和常用运算。

### 4.1.1 实值及扩展实值函数

在通常实数直线两端添入两个点，记

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$$

并按  $-\infty < a < +\infty$  ( $a \in \mathbb{R}$ ) 排序。以下总给  $\overline{\mathbb{R}}$  配备序拓扑及其 Borel  $\sigma$ -代数；例如  $(a, +\infty]$  和  $[-\infty, a)$  都是开集。

**定义 4.1.1.** 设  $(X, \mathcal{A})$  是可测空间。映射  $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  称为**扩展实值可测函数** (extended-real-valued measurable function)，若对每个  $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$  都有

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

若  $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ ，则称它为**实值可测函数** (real-valued measurable function)。集合  $\{x \mid f(x) > a\}$  简记为  $\{f > a\}$ ，其余不等式采用同样的简记。

扩展实数不是为了形式上的完备而加入。非负函数的单调极限可能取  $+\infty$ ，积分也可能取无穷值；把端点纳入值域以后，这些对象仍是通常意义下的可测映射。

常值函数总是可测。可测集  $A \in \mathcal{A}$  的示性函数也是实值可测函数，因为它对任意 Borel 集的反像只可能是  $\emptyset$ 、 $A$ 、 $A^c$  或  $X$ 。反过来，命题 1.4.8 表明示性函数可测恰好刻画集合可测。这一对应会把集合上的运算转成函数上的运算，例如

$$\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B, \quad \mathbf{1}_{A \cup B} = \max\{\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B\}.$$

后续定义简单函数和积分时，示性函数将是连接集合与函数的基本部件。

第 1.4.3 小节已经给出实值函数的有理阈值判别。下面补入两个无穷端点，并把几种常用不等式写在同一结论中。

**命题 4.1.2.** 对函数  $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ，下列条件等价：

- I.  $f$  可测；
- II. 对每个  $a \in \mathbb{R}$ ，集合  $\{f > a\}$  可测；
- III. 对每个  $q \in \mathbb{Q}$ ，集合  $\{f > q\}$  可测。

而且把  $>$  同时换成  $\geq$ 、 $<$  或  $\leq$ ，仍得到等价判别。

证明. 若  $f$  可测，则  $(a, +\infty]$  是  $\overline{\mathbb{R}}$  中的 Borel 集，故  $\{f > a\} \in \mathcal{A}$ 。这给出从 (I) 到 (II)，而后者直接推出 (III)。

反过来, 假设 (III) 成立。对任意  $a \in \mathbb{R}$ , 有

$$\{f > a\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} \{f > q\},$$

所以所有实阈值的严格上水平集都可测。再由

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > a - 1/n\}, \quad \{f < a\} = X \setminus \{f \geq a\}, \quad \{f \leq a\} = X \setminus \{f > a\},$$

其余三类阈值集也可测。

只剩证明这些阈值足以检验全部 Borel 集。开上射线  $(a, +\infty]$  属于所生成的集合族; 闭上射线满足  $[a, +\infty] = \bigcap_n (a - 1/n, +\infty]$ , 故  $[-\infty, a)$  也在其中。取有理端点的开区间, 再加上有理端点的两类开射线, 便得到  $\overline{\mathbb{R}}$  的一个可数拓扑基; 每个基元素都是上述射线的有限交。每个开集因而是这些基元素的可数并, 所以开上射线生成  $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ 。由 命题 1.4.5,  $f$  可测。若最初给出的是另外三种阈值条件, 上述补集与可数交、并关系会先恢复严格上水平集, 故结论相同。□

特别地, 无穷值出现在哪里仍是可测信息:

$$\{f = +\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > n\}, \quad \{f = -\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < -n\}.$$

同样, 有限值点集

$$\{|f| < +\infty\} = X \setminus (\{f = +\infty\} \cup \{f = -\infty\})$$

以及每个水平集  $\{f = a\} = \{f \leq a\} \cap \{f \geq a\}$  都可测。不过, 只检验水平集并不足以推出函数可测。给  $\mathbb{R}$  配备由可数集与余可数集组成的  $\sigma$ -代数, 并取恒等映射  $f(x) = x$ 。每个水平集都是可测单点集, 但  $\{f > 0\} = (0, +\infty)$  既不可数, 其补集也不可数, 因而不在这个  $\sigma$ -代数中。阈值判别控制的是整族上、下水平集, 而非单个函数值的纤维。

例如在  $\mathbb{R}$  上令  $f(0) = +\infty$ , 并令  $f(x) = 1/|x|$  ( $x \neq 0$ )。它的每个上水平集都是区间、空集或整条实线的有限组合, 因而  $f$  是扩展实值 Borel 可测函数。这里  $+\infty$  是函数在一点的真实取值, 不是未定义的记号。

### 4.1.2 Borel 可测函数

若定义域  $S$  是拓扑空间, 并取  $\mathcal{B}(S)$  作为源空间的  $\sigma$ -代数, 则可测函数称为 Borel 可测函数。这个名称已在第 1.4.3 小节随 Borel 可测映射引入。若  $E \in \mathcal{L}^d$ , 则从  $(E, \mathcal{L}^d|_E)$  出发的可测函数称为 **Lebesgue 可测函数** (Lebesgue measurable function)。两个名称说明的是定义域采用哪一种可测结构; 值域仍采用实数、扩展实数或复数的 Borel 结构。

**命题 4.1.3.** 设  $E \in \mathcal{L}^d$ 。每个定义在子空间  $E$  上的 Borel 可测函数都是 Lebesgue 可测函数。反命题一般不成立, 即使  $E = [0, 1]$  且函数只取 0, 1 两个值。

证明. 子空间的 Borel  $\sigma$ -代数满足

$$\mathcal{B}(E) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)|_E \subseteq \mathcal{L}^d|_E.$$

因此, Borel 可测函数对目标 Borel 集的反像都属于  $\mathcal{L}^d|_E$ , 也就是 Lebesgue 可测。

为说明反命题失败, 取三分 Cantor 集  $C \subseteq [0, 1]$ 。由 命题 3.2.5, 集合  $C$  是 Borel 零测集, 并且不可数。Borel 子集总共只有连续统多个, 而  $C$  的全部子集有严格更多个, 故存在非 Borel 子集  $N \subseteq C$ 。Lebesgue 测度完备, 所以  $N$  仍是 Lebesgue 可测零集。由 命题 1.4.8, 示性函数  $\mathbf{1}_N$  Lebesgue 可测; 若它 Borel 可测, 则

$$N = \mathbf{1}_N^{-1}((1/2, 3/2))$$

应为 Borel 集, 矛盾。  $\square$

这里用到的计数可以从第三章的构造中读出。二元序列全体单射到  $C$ , 而  $C \subseteq \mathbb{R}$ , 所以  $C$  与实数集具有相同基数。实直线有可数拓扑基, 每个 Borel 集都由可数层次的补与可数并编码, 因此 Borel 集族仍只有连续统多个; Cantor 定理则给出  $C$  的子集族基数严格更大。零测集的全部子集因此不可能全是 Borel 集。

连续函数一定 Borel 可测, 因而在 Lebesgue 可测定义域上也 Lebesgue 可测; 后一类函数还容许在零测集内部作更多修改。这个差别将在第 4.2.4 小节中由完备性精确处理。

### 4.1.3 复值可测函数

把  $\mathbb{C}$  与  $\mathbb{R}^2$  按  $z \mapsto (\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$  识别, 并给它通常的 Borel  $\sigma$ -代数。

**定义 4.1.4.** 映射  $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C}$  若对每个  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{C})$  都有  $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ , 则称为**复值可测函数** (complex-valued measurable function)。

**命题 4.1.5.** 复值函数  $f$  可测, 当且仅当实值函数  $\operatorname{Re} f$  与  $\operatorname{Im} f$  都可测。

证明. 若  $f$  可测, 则坐标函数  $\operatorname{Re}, \operatorname{Im} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 因而 Borel 可测。由 命题 1.4.6, 两个复合函数都可测。

反过来, 若两个分量可测, 则由 命题 1.4.13, 映射

$$x \mapsto (\operatorname{Re} f(x), \operatorname{Im} f(x))$$

从  $X$  到  $\mathbb{R}^2$  可测。它在上述识别下就是  $f$ , 所以  $f$  可测。  $\square$

只知道模长可测并不足以恢复复值可测性。给  $\mathbb{R}$  配备 Lebesgue  $\sigma$ -代数, 取 定理 3.5.1 中的不可测集  $V$ , 并令  $h = 1$  于  $V$ 、 $h = -1$  于  $V^c$ 。函数  $|h| \equiv 1$  可测, 但若  $h$  可测, 则  $V = h^{-1}(\{1\})$  也应可测。因此, 模长丢失的相位信息可能恰好携带不可测性。

### 4.1.4 可测函数的代数运算

复合运算先在值域中完成, 再由反像拉回定义域; 分片运算则先把定义域拆成可测块。下面的分片原则会同时用于商函数和带无穷值的乘积。

**引理 4.1.6.** 设  $(A_j)_{j \geq 1}$  是  $X$  的可数可测分割。若每个  $f_j: (A_j, \mathcal{A}|_{A_j}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$  可测, 并定义

$$f(x) = f_j(x) \quad (x \in A_j),$$

则  $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$  可测。

证明. 对任意  $B \in \mathcal{B}$ , 函数  $f_j$  的可测性给出某个  $E_j \in \mathcal{A}$ , 使  $f_j^{-1}(B) = A_j \cap E_j$ 。因此

$$f^{-1}(B) = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap E_j) \in \mathcal{A}.$$

这正是  $f$  可测。  $\square$

**命题 1.4.6** 已经给出一般的复合原则。特别地, 若  $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}(Y))$  可测, 而拓扑空间之间的映射  $\Phi: Y \rightarrow Z$  Borel 可测, 则  $\Phi \circ f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{B}(Z))$  可测; 连续的  $\Phi$  自动满足这一条件。

复合结论并不要求  $\Phi$  连续。取整函数  $t \mapsto [t]$  在每个整数处不连续, 但每个水平集  $\{t \mid [t] = k\} = [k, k+1)$  都是 Borel 集。它的值域  $\mathbb{Z}$  可数, 所以对任意 Borel 集  $B \subseteq \mathbb{R}$ , 反像

$$\{t \mid [t] \in B\} = \bigcup_{k \in B \cap \mathbb{Z}} [k, k+1)$$

是可数个 Borel 集的并。因此取整函数 Borel 可测; 若  $f$  实值可测, 则  $[f]$  仍可测。更一般地, 实直线上的单调函数总是 Borel 可测: 任一严格上水平集是空集、整条实线或某条端点开闭未定的射线, 而这些集合都是 Borel 集。这个事实允许使用带跳跃的取整、截断和分段函数, 而不必把它们误当成连续函数; 这种离散化将在简单函数逼近中使用。

**命题 4.1.7.** 若  $f, g: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  可测, 则集合

$$\{f < g\}, \quad \{f \leq g\}, \quad \{f = g\}, \quad \{f \neq g\}$$

都可测。

证明. 实数的稠密性给出

$$\{f < g\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f < q\} \cap \{g > q\}).$$

若  $f(x) < g(x)$ , 即使其中一个值是无穷, 也能在二者之间选到有理数; 反向包含由不等式的传递性成立。因此  $\{f < g\}$  可测。交换  $f, g$  得到  $\{f > g\}$  可测, 继而

$$\{f \leq g\} = X \setminus \{f > g\}, \quad \{f = g\} = \{f \leq g\} \cap \{g \leq f\}, \quad \{f \neq g\} = X \setminus \{f = g\}$$

依次可测。  $\square$

**命题 4.1.8.** 设  $f, g$  是同一可测空间上的函数。

1. 若  $f, g$  为实值可测函数, 则  $f+g, f-g, fg, |f|, \max\{f, g\}$  与  $\min\{f, g\}$  都可测; 在可测集  $\{g \neq 0\}$  上, 商  $f/g$  可测。
2. 若  $f, g$  为复值可测函数, 则  $f+g, f-g, fg, \bar{f}$  与  $|f|$  都可测; 在  $\{g \neq 0\}$  上, 商  $f/g$  可测。
3. 若  $f, g$  为扩展实值可测函数, 则  $-f, |f|, \max\{f, g\}$  与  $\min\{f, g\}$  总是可测。若扩展实数意义下的  $f+g, f-g$  或  $fg$  在每一点都有定义, 相应函数也可测。

证明. 对 (1), 配对映射  $(f, g): X \rightarrow \mathbb{R}^2$  可测。加、减、乘、绝对值、最大值和最小值都是相应欧氏空间上的连续函数, 故结论由 命题 1.4.6 得到。集合  $D = \{g \neq 0\}$  可测; 在  $D$  上, 映射  $(u, v) \mapsto u/v$  连续, 所以  $f/g$  对迹  $\sigma$ -代数  $A|_D$  可测。若  $f, g$  为复值函数, 则  $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f, \operatorname{Re} g, \operatorname{Im} g$  都可测; 由 命题 1.4.13 的逐分量判别, 映射

$$x \mapsto (\operatorname{Re} f(x), \operatorname{Im} f(x), \operatorname{Re} g(x), \operatorname{Im} g(x))$$

从  $X$  到  $\mathbb{R}^4$  可测, 也就是在  $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$  的识别下, 配对映射  $(f, g)$  可测。复数上的加、减、乘、共轭和模长连续, 商映射在分母非零处连续, 这证明 (2)。

下面处理扩展实值函数。阈值等式

$$\begin{aligned} \{-f > a\} &= \{f < -a\}, \\ \{\max(f, g) > a\} &= \{f > a\} \cup \{g > a\}, \\ \{\min(f, g) < a\} &= \{f < a\} \cup \{g < a\}. \end{aligned}$$

给出取负、最大值与最小值的可测性, 而  $|f| = \max\{f, -f\}$ 。若  $f+g$  处处有定义, 则对每个  $a \in \mathbb{R}$ ,

$$\{f+g > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g > a-q\}).$$

等式对有限值和允许的无穷值都成立, 故和函数可测。差函数是  $f + (-g)$ , 只要逐点有定义, 同一结论便可应用。

最后设  $fg$  处处有定义, 并令

$$F = \{|f| < +\infty\} \cap \{|g| < +\infty\}.$$

集合  $F$  可测, 且  $fg|_F$  由实值函数的乘法可测。在  $X \setminus F$  上, 避开零乘无穷的未定义情形后, 乘积只能取  $+\infty$  或  $-\infty$ 。例如正无穷值点集是下列可测集:

$$\begin{aligned} P &= (\{f = +\infty\} \cap \{g > 0\}) \cup (\{f = -\infty\} \cap \{g < 0\}) \\ &\quad \cup (\{g = +\infty\} \cap \{f > 0\}) \cup (\{g = -\infty\} \cap \{f < 0\}). \end{aligned}$$

负无穷值点集则是

$$\begin{aligned} M &= (\{f = +\infty\} \cap \{g < 0\}) \cup (\{f = -\infty\} \cap \{g > 0\}) \\ &\quad \cup (\{g = +\infty\} \cap \{f < 0\}) \cup (\{g = -\infty\} \cap \{f > 0\}). \end{aligned}$$

在乘积处处有定义的假设下,  $F, P, M$  是覆盖  $X$  的可测分割;  $fg$  在三块上分别等于实值可测函数、常值  $+\infty$  和常值  $-\infty$ 。由 引理 4.1.6, 乘积可测。这证明 (3)。  $\square$



实值或复值情形还给出常用的闭包性质。有限个可测函数代入任意多项式, 所得函数仍可测; 若一个有理函数的分母在所考察集合上不为零, 其复合也可测。商若要定义在整个  $X$  上, 可以在  $\{g = 0\}$  上补任一固定值: 分母非零处的商与补上的常值函数构成两个可测分片, 引理 4.1.6 保证补值后的函数可测。补值只服务于定义域完整性, 并不改变  $\{g \neq 0\}$  上的商。

扩展实数的运算必须先检查是否有定义。本书在没有另行约定时, 不定义

$$(+\infty) + (-\infty), \quad (-\infty) + (+\infty), \quad (+\infty) - (+\infty), \quad (-\infty) - (-\infty)$$

以及  $0 \cdot (\pm\infty)$  和  $(\pm\infty) \cdot 0$ ; 也不默认为除零、 $0/0$  或  $\infty/\infty$  指定值。例如常值函数  $f \equiv +\infty$  与  $g \equiv -\infty$  都可测, 但符号  $f + g$  不表示一个函数。若应用中需要在未定义点补值, 应明确写出补值规则; 补成的函数是否可测, 再按阈值集或分片原则检验。

## 4.2 极限运算

有限次代数运算只需要有限交并, 可测性因而能够直接保持。函数列的极限则把问题推进到可数次运算: 每个点处的上确界、下确界和尾部振荡, 都要翻译成可数个水平集的并与交。本节完成这条翻译, 并区分处处收敛与几乎处处收敛; 后一种收敛能否自动给出可测极限, 取决于测度空间是否完备。

### 4.2.1 上确界与下确界

设  $(f_n)_{n \geq 1}$  是  $X$  上的扩展实值函数列。逐点定义

$$\left( \sup_{n \geq 1} f_n \right)(x) = \sup_{n \geq 1} f_n(x), \quad \left( \inf_{n \geq 1} f_n \right)(x) = \inf_{n \geq 1} f_n(x).$$

右端在  $\overline{\mathbb{R}}$  中总有意义, 并允许取  $\pm\infty$ 。

**定理 4.2.1.** 若每个  $f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  都可测, 则

$$\sup_{n \geq 1} f_n, \quad \inf_{n \geq 1} f_n$$

都是扩展实值可测函数。

证明. 记  $u = \sup_n f_n$ 。对每个  $a \in \mathbb{R}$ , 逐点上确界的定义给出

$$\{u > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}.$$

右端是可测集的可数并, 所以  $u$  可测。类似地, 若  $v = \inf_n f_n$ , 则

$$\{v < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n < a\}.$$

由 命题 4.1.2 的严格下水平集判别,  $v$  可测。 □

有限最大值

$$u_N = \max\{f_1, \dots, f_N\}$$

组成递增函数列, 并且  $u_N(x) \uparrow \sup_n f_n(x)$ 。类似地, 有限最小值  $v_N = \min\{f_1, \dots, f_N\}$  递减到  $\inf_n f_n$ 。所以可数上下确界也可以看成有限格运算的逐步极限; 这个观察在实际计算中常比直接操作无限族更方便。若指标集只是任意可数集, 先作一次枚举即可, 结论并不依赖枚举顺序。

这里的可数性不可删去。在  $(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1)$  上, 令  $V \subseteq \mathbb{R}$  为定理 3.5.1 中的不可测集, 并对每个  $t \in V$  取可测函数  $f_t = \mathbf{1}_{\{t\}}$ 。单点可测, 所以每个  $f_t$  都可测; 但

$$\sup_{t \in V} f_t = \mathbf{1}_V$$

不可测。失败的原因正是  $\sigma$ -代数只要求对可数并封闭, 而不要求对任意并封闭。

## 4.2.2 $\limsup$ 、 $\liminf$

当函数列不收敛时, 尾部的上界与下界仍能记录其最终振荡范围。

**定义 4.2.2.** 对扩展实值函数列  $(f_n)$ , 定义逐点的上极限 (limit superior) 与下极限 (limit inferior) 为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{N \geq 1} \sup_{n \geq N} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{N \geq 1} \inf_{n \geq N} f_n.$$

令  $u_N = \sup_{n \geq N} f_n$ 、 $\ell_N = \inf_{n \geq N} f_n$ 。随着  $N$  增大, 可供取上下确界的尾部变小, 故  $u_N$  递减而  $\ell_N$  递增。因而上极限是尾部上确界的递减极限, 下极限是尾部下确界的递增极限。

**命题 4.2.3.** 若每个  $f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  都可测, 则  $\limsup_n f_n$  与  $\liminf_n f_n$  都可测, 并且逐点满足

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

对固定的  $x \in X$ , 数列  $(f_n(x))$  在  $\overline{\mathbb{R}}$  中收敛, 当且仅当上下极限相等; 相等时共同值就是其极限。

证明. 每个尾部上确界  $u_N$  和尾部下确界  $\ell_N$  都由定理 4.2.1 可测。再次应用该定理,  $\inf_N u_N$  与  $\sup_N \ell_N$  可测。对每个  $N$  都有  $\ell_N \leq u_N$ ; 取  $N \rightarrow \infty$  得到上下极限不等式。

固定一点并暂时省略  $x$ 。若  $f_n \rightarrow L \in \mathbb{R}$ , 则给定  $\varepsilon > 0$ , 从某一项起有  $L - \varepsilon/2 < f_n < L + \varepsilon/2$ 。因此, 相应的尾部满足

$$L - \varepsilon < \ell_N \leq u_N < L + \varepsilon,$$

从而上下极限都等于  $L$ 。当  $L = +\infty$  时, 对每个  $M \in \mathbb{R}$ , 数列最终大于  $M$ , 故  $\ell_N \rightarrow +\infty$ ;  $L = -\infty$  同理。

反过来, 若共同值为有限数  $L$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 可取  $N_1, N_2$ , 使

$$u_{N_1} < L + \varepsilon, \quad \ell_{N_2} > L - \varepsilon.$$



当  $n \geq \max\{N_1, N_2\}$  时便有  $L - \varepsilon < f_n < L + \varepsilon$ , 所以  $f_n \rightarrow L$ . 若共同值为  $+\infty$ , 则  $l_N \uparrow +\infty$ , 故数列最终超过任意实数  $M$ ; 这正是收敛到  $+\infty$ . 共同值为  $-\infty$  时使用  $u_N \downarrow -\infty$ .  $\square$

上下极限不受有限多个首项影响, 因为从足够大的  $N$  起, 相应尾部已经删去这些首项. 它们也分别控制数列的聚点: 若上极限为有限数  $L$ , 则任意  $\varepsilon > 0$  下, 只有有限多项能超过  $L + \varepsilon$ , 而又有无穷多项大于  $L - \varepsilon$ . 第一点来自某个尾部上确界小于  $L + \varepsilon$ ; 第二点若失败, 则某个尾部上确界至多为  $L - \varepsilon$ . 两者都直接使用尾部上确界递减到  $L$ . 下极限有对称的描述.

例如常值于  $(-1)^n$  的函数列满足  $\liminf_n f_n = -1$ ,  $\limsup_n f_n = 1$ , 所以它在每一点都不收敛. 上极限的阈值还可以直接写成

$$\left\{ \limsup_n f_n > a \right\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq N} \{f_n > q\}.$$

内侧的交并表示 “ $f_n > q$  发生无穷多次”; 外层再选取严格位于  $a$  与上极限之间的有理数, 避免把  $\limsup f_n = a$  的边界误收进来.

**推论 4.2.4.** 若扩展实值可测函数列满足  $f_n \leq f_{n+1}$ , 则它逐点收敛于可测函数  $\sup_n f_n$ . 若满足  $f_n \geq f_{n+1}$ , 则它逐点收敛于可测函数  $\inf_n f_n$ .

证明. 在递增情形, 对固定的  $x$ , 数列  $(f_n(x))$  的每个尾部与原数列有同一上确界, 而第  $N$  个尾部的下确界为  $f_N(x)$ . 所以

$$\limsup_n f_n(x) = \sup_n f_n(x) = \liminf_n f_n(x).$$

由 命题 4.2.3, 数列收敛到该上确界; 极限的可测性来自 定理 4.2.1. 递减情形交换上、下确界即可.  $\square$

记号  $f_n \uparrow f$  表示  $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$  对每个  $x$  成立, 并且  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ;  $f_n \downarrow f$  作对称解释. 单有递增性时, 极限依然存在于  $\overline{\mathbb{R}}$ , 但可能等于  $+\infty$ . 例如常值函数  $f_n \equiv n$  递增到  $+\infty$ , 并不收敛于任何实值函数.

### 4.2.3 逐点极限

**定义 4.2.5.** 设  $Y = \overline{\mathbb{R}}$  或  $\mathbb{C}$ , 并设  $f_n, f: X \rightarrow Y$ . 若对每个  $x \in X$ , 数列  $(f_n(x))$  都在  $Y$  中收敛到  $f(x)$ , 则称  $(f_n)$  **逐点收敛** (pointwise convergence) 于  $f$ , 记为  $f_n \rightarrow f$  (逐点).

**命题 4.2.6.** 扩展实值可测函数列的逐点极限仍是扩展实值可测函数; 复值可测函数列的逐点极限仍是复值可测函数.

证明. 先设  $f_n: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  可测且逐点收敛于  $f$ . 由 命题 4.2.3,

$$f = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

可测。若  $f_n$  为复值函数，则逐点收敛等价于其实部、虚部分别逐点收敛。函数  $\operatorname{Re} f_n$ 、 $\operatorname{Im} f_n$  可测，实值情形给出  $\operatorname{Re} f$ 、 $\operatorname{Im} f$  可测，再用 命题 4.1.5 即知  $f$  可测。□

逐点极限保持可测性，却不保持连续性。在  $[0, 1]$  上取  $f_n(x) = x^n$ ，每个  $f_n$  连续，而逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

这个极限在 1 处不连续，但仍 Borel 可测。可测性只要求反像经受可数集合运算；它不控制邻近点的函数值是否接近。

上下极限还说明函数列在哪些点收敛。令

$$C = \left\{ x \mid \liminf_n f_n(x) = \limsup_n f_n(x) \right\}.$$

对两个扩展实值可测函数  $u, v$ ，命题 4.1.7 的证明给出

$$\{u < v\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{u < q\} \cap \{v > q\}),$$

所以比较集合  $\{u < v\}$  可测。由于下极限不超过上极限， $X \setminus C$  正是二者严格不等的集合，故  $C \in \mathcal{A}$ 。因此可测函数列的逐点收敛点集本身总是可测。

复值函数列的收敛点集同样可测。由于  $\mathbb{C}$  完备，Cauchy 判别给出

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m, n \geq N} \{|f_m - f_n| < 1/k\}.$$

每个差与模长都可测，所以式中集合可测；它恰由那些使数列  $(f_n(x))$  在  $\mathbb{C}$  中收敛的点组成。这里必须使用目标空间的完备性：在不完备的度量空间中，Cauchy 并不保证极限仍落在该空间内。

若只知道  $(f_n)$  在子集  $E \subseteq X$  上逐点收敛，则应先说明  $E$  所带的可测结构。由 命题 1.4.7，无论  $E$  本身是否属于  $\mathcal{A}$ ，每个限制函数  $f_n|_E$  都对迹  $\sigma$ -代数  $\mathcal{A}|_E$  可测，故其逐点极限在  $E$  上可测；这并不自动规定极限在  $X \setminus E$  上的取值。若  $E \in \mathcal{A}$ ，可以在可测补集上补一个常值，再用 引理 4.1.6 把极限扩张到整个  $X$ 。当  $E$  不可测时，这个分片论证不能使用。

#### 4.2.4 几乎处处性质

**定义 4.2.7.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间。若存在  $Z \in \mathcal{A}$  满足  $\mu(Z) = 0$ ，并且性质  $P(x)$  对每个  $x \in X \setminus Z$  成立，则称  $P$  在  $X$  上几乎处处 (almost everywhere) 成立。函数  $f, g$  几乎处处相等记为  $f = g$  a.e.；函数列在  $X \setminus Z$  上逐点收敛于  $f$  时，称它几乎处处收敛于  $f$ 。

定义要求例外点集包含在某个可测零集内，并不预先要求所有失败点组成的集合可测。若失败集合本身可测，这一条件当然等价于它的测度为零。使用“包含于零集”的表述，恰好把完备测度空间和不完备测度空间的差别保留下来。

**命题 4.2.8.** 可数多个几乎处处成立的性质可以在同一个满测度集合上同时成立。特别地, 几乎处处相等是任意同值域函数之间的等价关系; 若同一列扩展实值函数或复值函数分别几乎处处收敛于  $f$  和  $g$ , 则  $f = g$  几乎处处。

证明. 设第  $n$  个性质在可测零集  $Z_n$  外成立。由测度的可数次可加性,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Z_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(Z_n) = 0.$$

所以在同一个零集  $\bigcup_n Z_n$  外, 全部性质同时成立。自反性与对称性不需要额外论证; 传递性把  $f = g$  和  $g = h$  的两个例外零集合并, 故几乎处处相等是等价关系。若  $f_n \rightarrow f$  与  $f_n \rightarrow g$  分别在零集  $Z_1, Z_2$  外成立, 则在  $X \setminus (Z_1 \cup Z_2)$  上, 同一个数列有两个极限; 目标空间中的极限唯一, 故  $f = g$  于该集合。□

可数性在这里同样重要。不可数多个零集的并可能有正测度, 甚至等于整个空间, 例如  $[0, 1] = \bigcup_{x \in [0, 1]} \{x\}$ 。因此, 从“对每个参数, 某性质几乎处处成立”推出“几乎处处对所有参数成立”时, 必须检查参数是否可数, 或另有能够统一控制例外集的论证。

**定理 4.2.9.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是完备测度空间。若扩展实值可测函数  $f$  与任意函数  $g: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  几乎处处相等, 则  $g$  可测。同一结论对复值函数成立。

证明. 取可测零集  $Z$ , 使  $f = g$  于  $X \setminus Z$ 。对每个  $a \in \mathbb{R}$ , 有分解

$$\{g > a\} = (\{f > a\} \setminus Z) \cup (\{g > a\} \cap Z).$$

第一项可测。第二项虽然由任意函数  $g$  决定, 却是零集  $Z$  的子集; 完备性保证它也属于  $\mathcal{A}$ 。因此每个  $\{g > a\}$  可测, 命题 4.1.2 给出  $g$  可测。

若  $f, g$  为复值函数, 则其实部几乎处处相等, 虚部也几乎处处相等。把刚证明的实值结论分别用于两个分量, 再由 命题 4.1.5 得到  $g$  可测。□

定理的作用不只是确认一个函数是否可测。它还说明, 在完备空间上研究几乎处处等价类时, 可以自由选择零集上的代表值: 把无穷值改成零、把未指定点补成常数, 或使两个版本在某个零集上一致, 都不会离开可测函数类。这里允许的是零集内部的任意修改; 若修改集合只有“小测度”但不为零, 则不能把修改前后的函数视为几乎处处相等。

**推论 4.2.10.** 在完备测度空间上, 扩展实值或复值可测函数列的几乎处处极限可测。

证明. 先设  $f_n$  为扩展实值函数, 并且  $f_n \rightarrow f$  于某个可测零集  $Z$  的补集。函数  $h = \limsup_n f_n$  由 命题 4.2.3 可测, 并且  $h = f$  于  $X \setminus Z$ 。由 定理 4.2.9,  $f$  可测。复值情形分别考察实部与虚部; 它们在  $X \setminus Z$  上逐点收敛于  $\operatorname{Re} f$  与  $\operatorname{Im} f$ , 应用实值结论后再用 命题 4.1.5。□

完备性确实不可省略。给  $[0, 1]$  配备 Borel  $\sigma$ -代数和限制后的 Lebesgue 测度; 这个测度空间不完备。沿用 命题 4.1.3 证明中的非 Borel 集  $N \subseteq C$ , 令  $f_n \equiv 0$ , 并令  $g = \mathbf{1}_N$ 。

函数列  $(f_n)$  处处可测, 并且在 Borel 零集  $C$  之外逐点收敛于  $g$ , 所以  $f_n \rightarrow g$  几乎处处; 但  $g^{-1}((1/2, 3/2)) = N$  不是 Borel 集, 故  $g$  不可测。同一个例子也说明, 在不完备空间中, 任意改变可测函数在零集上的取值可能破坏可测性。

若把这个 Borel 测度空间完备化,  $N$  以及所有 Borel 零集的子集都会进入新的  $\sigma$ -代数, 反例中的  $g$  随即变为可测。可见需要补充的不是新的极限定理, 而是源空间对零测子集的封闭性。

## 4.3 简单函数逼近

一般可测函数可能取得无穷多个乃至连续统多个值, 测度却首先只会计算集合的大小。把两者接起来的办法, 是先用只取有限多个值的函数编码有限个可测集合, 再让这些函数逐点逼近原函数。第五章的积分正是沿这条路线定义; 因此, 本节不仅要证明逼近存在, 还要给出一列可以直接计算的逼近函数。

### 4.3.1 简单函数

**定义 4.3.1.** 设  $(X, \mathcal{A})$  是可测空间。若可测函数  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{C}$  的值域是有限集, 则称  $\varphi$  为 **简单函数** (simple function)。实值或非负简单函数分别指值域包含于  $\mathbb{R}$  或  $[0, \infty)$  的简单函数。

简单函数之所以简单, 不是因为其定义域有限, 而是因为它只把定义域分成有限个可测水平集。例如, 可测集  $A$  的示性函数  $\mathbf{1}_A$  只取 0, 1 两个值, 是最基本的非负简单函数。

**命题 4.3.2.** 函数  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{C}$  是简单函数, 当且仅当存在两两不同的复数  $a_1, \dots, a_N$  和构成  $X$  的可测分割  $A_1, \dots, A_N$ , 使

$$\varphi = \sum_{j=1}^N a_j \mathbf{1}_{A_j}.$$

此时  $A_j = \varphi^{-1}(\{a_j\})$ , 所以在不计排列次序的意义下, 这一表示唯一, 称为  $\varphi$  的规范表示。

证明. 若  $\varphi$  是简单函数, 把它的有限值域写成  $\{a_1, \dots, a_N\}$ 。单点集是  $\mathbb{C}$  的 Borel 集, 故  $A_j = \varphi^{-1}(\{a_j\}) \in \mathcal{A}$ 。这些集合两两不交, 其并为  $X$ , 而所述等式在每个  $A_j$  上都成立。水平集由函数本身确定, 故规范表示唯一。

反过来, 设右端表示成立。对任意 Borel 集  $B \subseteq \mathbb{C}$ , 有

$$\varphi^{-1}(B) = \bigcup_{\{j|a_j \in B\}} A_j.$$

右端是有限个可测集之并, 因而可测。函数  $\varphi$  的值域又包含于有限集  $\{a_1, \dots, a_N\}$ , 所以它是简单函数。□

实际书写时常允许集合彼此重叠, 也不要求把零值对应的部分列出。例如  $2\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B$  仍是简单函数。只要把所有参与的集合及其补集取共同有限分割, 再合并函数值相同

的分块, 就能恢复规范表示。由同一细分也可看出, 简单函数对加法、乘法、取绝对值、取实部与虚部封闭; 在分母不为零处作商后仍是简单函数。

### 4.3.2 非负函数的单调逼近

任意非负可测函数都可以从下方由简单函数逼近。这里“从下方”保证第五章定义积分时不会因逼近函数偶尔越过原函数而引入修正项; 单调性则使不同精度之间彼此相容。定理 1.3.8 的证明已经对有界非负函数使用过二进分割; 下面的构造把同一想法推广到可能无界、甚至取值  $+\infty$  的函数, 并显式保证逼近列单调。

**定理 4.3.3.** 设  $f: X \rightarrow [0, \infty]$  可测。存在一系列非负简单函数  $(\varphi_n)$ , 使

$$0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1} \leq f, \quad \varphi_n(x) \rightarrow f(x) \quad (x \in X).$$

若  $f$  有界, 则可以选择同一列, 使  $\varphi_n \rightarrow f$  一致收敛。

证明. 对每个整数  $n \geq 1$ , 令

$$A_{n,k} = \left\{ x \in X \mid \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \right\} \quad (0 \leq k < n2^n),$$

并令  $A_{n,\infty} = \{f \geq n\}$ 。这些集合由阈值集作有限次交、补得到, 因而可测。定义

$$\varphi_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{A_{n,k}} + n \mathbf{1}_{A_{n,\infty}}.$$

函数  $\varphi_n$  非负、可测且只取有限多个值, 所以是简单函数。定义还直接给出  $\varphi_n \leq f$ 。

下面核对随  $n$  的单调性。若  $f(x) < n$ , 则

$$\varphi_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor.$$

由  $\lfloor 2t \rfloor \geq 2 \lfloor t \rfloor$ , 细分一次二进网格不会降低这个值。若  $n \leq f(x) < n+1$ , 则  $\varphi_n(x) = n$ , 而  $\varphi_{n+1}(x) \geq n$ ; 若  $f(x) \geq n+1$ , 则  $\varphi_n(x) = n$ 、 $\varphi_{n+1}(x) = n+1$ , 仍有  $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$ 。

当  $f(x) < \infty$  时, 对所有充分大的  $n > f(x)$ , 有

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n};$$

当  $f(x) = \infty$  时,  $\varphi_n(x) = n$ 。两种情形都给出逐点收敛。若  $0 \leq f \leq M$ , 则对所有  $n > M$ , 上述误差估计对每个  $x$  同时成立, 故收敛是一致的。□

以  $f(x) = x$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 为例,  $\varphi_n$  把区间分成长度  $2^{-n}$  的小段, 并在每段取左端点值。图像是一列逐层加密的阶梯, 始终位于直线  $y = x$  下方, 误差的上确界等于  $2^{-n}$ , 但不取到。对于无界函数, 公式中的高度  $n$  同时承担截断作用; 没有这一项, 每个  $\varphi_n$  的值域就可能不是有限集。



### 4.3.3 正部与负部

**定义 4.3.4.** 对扩展实值函数  $f$ , 定义其**正部** (positive part) 与**负部** (negative part) 为

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \quad f^- = \max\{-f, 0\}.$$

于是

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-, \quad \min\{f^+, f^-\} = 0.$$

这里在  $f = +\infty$  或  $f = -\infty$  处, 第一式分别按  $+\infty - 0 = +\infty$  与  $0 - \infty = -\infty$  理解。

**命题 4.3.5.** 扩展实值函数  $f$  可测, 当且仅当  $f^+$  与  $f^-$  都可测。此时  $|f|$  也可测。

证明. 若  $f$  可测, 则  $-f$  可测; 取有限最大值保持可测性, 所以  $f^+$  与  $f^-$  可测, 它们的和  $|f|$  也可测。反过来, 若  $f^+$  与  $f^-$  可测, 则二者在每一点至多一个非零, 差  $f^+ - f^-$  不会出现  $\infty - \infty$ ; 可测函数的合法差仍可测, 故  $f$  可测。□

**推论 4.3.6.** 扩展实值函数可测, 当且仅当它是某列实值简单函数的逐点极限。

证明. 设  $f$  可测。分别对  $f^+$  与  $f^-$  使用 定理 4.3.3, 得到  $\varphi_n \uparrow f^+$  与  $\psi_n \uparrow f^-$ 。令  $s_n = \varphi_n - \psi_n$ 。共同细分两者的有限水平集可知  $s_n$  是实值简单函数, 并且  $s_n(x) \rightarrow f(x)$ , 包括  $f(x) = \pm\infty$  的情形。反过来, 简单函数可测, 而可测函数列的逐点极限可测; 使用 命题 4.2.6 即得结论。□

上述证明没有断言差  $s_n = \varphi_n - \psi_n$  随  $n$  单调: 两个递增列相减一般不保序。第五章定义积分时真正需要的是两个非负分量各自的单调结构, 因此这里保留正部与负部的分解。

### 4.3.4 截断方法

**定义 4.3.7.** 给定  $M > 0$ , 定义函数

$$T_M(t) = \max\{-M, \min\{t, M\}\} \quad (t \in \overline{\mathbb{R}}),$$

并称  $T_M f$  为  $f$  在高度  $M$  的**截断** (truncation)。

截断把  $-\infty$  与  $+\infty$  分别送到  $-M$  与  $M$ , 所以  $T_M f$  总是有限值函数。它保留  $[-M, M]$  内的函数值, 只削去过大的正负峰值。

**命题 4.3.8.** 若扩展实值函数  $f$  可测, 则每个  $T_M f$  都是有界可测函数, 并且当  $M \rightarrow \infty$  时

$$T_M f(x) \rightarrow f(x) \quad (x \in X).$$

若  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间,  $E \in \mathcal{A}$ 、 $\mu(E) < \infty$ , 且  $f$  在  $E$  上几乎处处有限, 则

$$\mu(E \cap \{T_M f \neq f\}) = \mu(E \cap \{|f| > M\}) \rightarrow 0.$$

证明. 函数  $T_M f$  是  $f$ 、常值函数  $-M, M$  经过有限次最大与最小运算所得, 故可测; 由定义有  $|T_M f| \leq M$ . 逐点收敛可直接分成  $f(x) \in \mathbb{R}$ 、 $f(x) = +\infty$  和  $f(x) = -\infty$  三种情形核对。

令  $A_M = E \cap \{|f| > M\}$ . 当  $M$  递增时, 集合  $A_M$  递减, 并且

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E \cap \{|f| = \infty\}.$$

右端因  $f$  几乎处处有限而为零测集; 又有  $\mu(A_1) \leq \mu(E) < \infty$ . 测度的从上连续性于是给出  $\mu(A_n) \rightarrow 0$ . 一般实数  $M \rightarrow \infty$  的结论由单调性夹在相邻整数之间得到, 而等号来自截断的定义.  $\square$

在  $\mathbb{R}^d$  上还常把值域截断与空间局部化合并. 令

$$g_n = \mathbf{1}_{B(0,n)} T_n f.$$

它是有界可测函数, 并在有限测度集  $B(0,n)$  外恒为零. 对每个  $x \in \mathbb{R}^d$ , 当  $n > |x|$  后, 空间截断不再改变该点的函数值; 再由  $T_n f(x) \rightarrow f(x)$ , 得到  $g_n(x) \rightarrow f(x)$ . 这种同时控制函数值与所在区域的两重截断会反复用于积分、 $L^p$  逼近和局部化论证。

## 4.4 Lusin 定理

连续函数一定可测, 可测函数却可能处处不连续. 二者之间仍有一种测度意义下的联系: 若只要求函数在定义域的一个大子集上连续, 那么几乎处处有限的可测函数总能满足要求. 这里的“大”是指舍去部分的测度可以任意小; 所得连续性则是限制函数在子集的相对拓扑中的连续性。

### 4.4.1 可测函数与连续函数

设  $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 、 $K \subseteq E$ , 并设  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ . 把  $K$  看成带有欧氏空间相对拓扑的空间. 如果限制  $f|_K: K \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 就说  $f$  在  $K$  上**相对连续** (relative continuity). 换成量词, 这表示对每个  $x \in K$  和每个  $\eta > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$y \in K, |x - y| < \delta \implies |f(y) - f(x)| < \eta.$$

这里的  $y$  只能在  $K$  中趋近  $x$ . 定义域  $E \setminus K$  中的点即使任意接近  $x$ , 也不参与  $f|_K$  的连续性检验. 相对连续弱于原函数在  $E$  中各点处的连续; 若  $K$  不是  $E$  的相对邻域, 二者尤其不能混为一谈。

由于欧氏空间是度量空间, 这一定义也可用序列检验: 对任意  $x \in K$  和任意满足  $x_\nu \in K$ 、 $x_\nu \rightarrow x$  的序列, 都有  $f(x_\nu) \rightarrow f(x)$ . 若把条件  $x_\nu \in K$  擅自换成  $x_\nu \in E$ , 检验的已经是原函数在  $x$  处的连续性。

**命题 4.4.1.** 设  $E \in \mathcal{L}^d$ . 若  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  相对于  $E$  连续, 则  $f$  是 Lebesgue 可测函数. 复值函数也有相同结论。



证明. 对任意开集  $V \subseteq \mathbb{R}$ , 连续性说明  $f^{-1}(V)$  是  $E$  中的相对开集, 因而存在开集  $G \subseteq \mathbb{R}^d$ , 使

$$f^{-1}(V) = E \cap G.$$

集合  $E$  Lebesgue 可测, 开集  $G$  是 Borel 集, 所以  $E \cap G \in \mathcal{L}^d$ . 开集生成  $\mathbb{R}$  的 Borel  $\sigma$ -代数, 故  $f$  可测. 对复值函数, 把  $\mathbb{C}$  识别为  $\mathbb{R}^2$ , 同一论证仍然适用.  $\square$

反命题不成立; 可测性只要求开集的反像可测, 并不要求这些反像在  $E$  中开. 先看只取有限多个值的情形, 可以直接看出测度正则性如何制造相对连续性.

**命题 4.4.2.** 设  $E \in \mathcal{L}^d$ 、 $m(E) < \infty$ , 并设  $s: E \rightarrow \mathbb{R}$  是简单函数. 对每个  $\varepsilon > 0$ , 都存在紧集  $K \subseteq E$ , 使  $m(E \setminus K) < \varepsilon$ , 而且  $s|_K$  局部常值, 因而连续.

证明. 若  $E = \emptyset$ , 取  $K = \emptyset$  即可. 以下设  $E \neq \emptyset$ , 并把  $s$  的规范表示写成

$$s = \sum_{j=1}^N a_j \mathbf{1}_{A_j},$$

其中  $A_1, \dots, A_N$  是  $E$  的可测分割. 对每个  $j$ , 由内正则性选取紧集  $K_j \subseteq A_j$ , 使

$$m(A_j \setminus K_j) < \frac{\varepsilon}{N}.$$

令  $K = \bigcup_{j=1}^N K_j$ . 它是紧集, 并且

$$m(E \setminus K) = \sum_{j=1}^N m(A_j \setminus K_j) < \varepsilon.$$

其中非空的  $K_j$  两两不交. 若至多只有一个非空, 则  $s|_K$  为常值函数; 否则, 这些紧集中任意两个之间的距离为正, 而它们的数目有限. 因此每个  $x \in K_j$  在  $K$  中都有一个邻域只与  $K_j$  相交. 函数  $s$  在这个邻域上恒等于  $a_j$ , 故  $s|_K$  局部常值.  $\square$

对示性函数  $s = \mathbf{1}_A$ , 这个构造尤其直观. 分别从  $E \cap A$  与  $E \setminus A$  中取损失很小的紧集  $K_1, K_0$ , 再令  $K = K_0 \cup K_1$ . 两个紧集之间有正距离; 在  $K$  的相对拓扑中, 它们既闭又开, 示性函数分别恒为 0 与 1. 原来可能十分复杂的边界被包含在舍去的部分中.

这个命题没有要求简单函数的水平集本身闭合. 内正则性从每个水平集内部留下一个紧片, 有限性则保证不同紧片之间有正距离. 对一般可测函数, 需要在越来越细的值域分割上重复这一步, 再留下同时属于各级紧片的点. **Lusin 定理**给出准确结论.

#### 4.4.2 Lusin 定理的证明

**定理 4.4.3.** 设  $E \in \mathcal{L}^d$ 、 $m(E) < \infty$ , 并设扩展实值函数  $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  可测且几乎处处有限. 则对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在紧集  $K \subseteq E$ , 使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon,$$

并且  $f$  在  $K$  上取有限值, 限制  $f|_K: K \rightarrow \mathbb{R}$  连续; 而且  $f|_K$  一致连续.

证明. 固定  $\varepsilon > 0$ , 并对每个整数  $n \geq 1$  置

$$\eta_n = \varepsilon 2^{-n-1}.$$

为了先控制函数值, 令

$$H_M = E \cap \{|f| > M\}.$$

当整数  $M$  递增时,  $H_M$  递减到

$$N_\infty = E \cap \{|f| = \infty\}.$$

集合  $N_\infty$  为零测集, 而  $m(H_1) \leq m(E) < \infty$ , 所以测度的从上连续性给出

$$m(H_M) \rightarrow m(N_\infty) = 0.$$

这也是 命题 4.3.8 中的值域截断估计. 现在可以选取整数  $M_n \geq 1$ , 使

$$m(E \cap \{|f| > M_n\}) < \frac{\eta_n}{2}.$$

把闭区间  $[-M_n, M_n]$  分成有限个两两不交的 Borel 区间  $I_{n,1}, \dots, I_{n,N_n}$ , 并使每个区间的直径不超过  $2^{-n}$ . 具体地, 可以等分  $[-M_n, M_n]$ , 把除最后一个以外的各段取成左闭右开, 最后一段取闭区间. 令

$$A_{n,j} = \{x \in E \mid f(x) \in I_{n,j}\} \quad (1 \leq j \leq N_n).$$

这些集合可测、两两不交, 其并为  $E \cap \{|f| \leq M_n\}$ . 每个  $A_{n,j}$  都有有限测度. 由 定理 3.3.2, 可在其中选取紧集  $C_{n,j} \subseteq A_{n,j}$ , 满足

$$m(A_{n,j} \setminus C_{n,j}) < \frac{\eta_n}{2N_n}.$$

令

$$K_n = \bigcup_{j=1}^{N_n} C_{n,j}.$$

这是有限个紧集的并, 因而紧; 并且

$$\begin{aligned} m(E \setminus K_n) &\leq m(E \cap \{|f| > M_n\}) + \sum_{j=1}^{N_n} m(A_{n,j} \setminus C_{n,j}) \\ &< \eta_n. \end{aligned}$$

现在取所有精度共同保留的集合

$$K = \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n.$$

集合  $K$  是紧集, 因为它是紧集  $K_1$  的闭子集. 又因  $K \subseteq E$ , 且

$$E \setminus K = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus K_n),$$

测度的可数次可加性给出

$$m(E \setminus K) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E \setminus K_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \eta_n = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

此外  $K \subseteq K_1 \subseteq \{|f| \leq M_1\}$ , 所以  $f$  在  $K$  上有限。

这里各个  $K_n$  不必嵌套。取交仍保持紧性, 而补集变成各级误差的可数并; 选择可求和的  $\eta_n$  正是为了控制这个并。若只保留某一个  $K_n$ , 只能得到函数值在每个紧片上的振幅不超过  $2^{-n}$ , 还不能推出任意精度下的连续性。

若  $K = \emptyset$ , 连续性结论平凡。以下设  $K \neq \emptyset$ , 并固定  $n$ 。集合  $C_{n,1}, \dots, C_{n,N_n}$  中的非空者是有限个两两不交的紧集, 任意两个之间的距离为正。若其中至少两个非空, 令

$$\delta_n = \frac{1}{2} \min\{\text{dist}(C_{n,i}, C_{n,j}) \mid i \neq j, C_{n,i} \neq \emptyset, C_{n,j} \neq \emptyset\} > 0;$$

若至多一个非空, 则取  $\delta_n = 1$ 。当  $x, y \in K$  且  $|x - y| < \delta_n$  时, 二者作为  $K_n$  中的点必落在同一个  $C_{n,j}$  中, 否则它们的距离至少为  $2\delta_n$ 。相应的函数值同属区间  $I_{n,j}$ , 故

$$|f(x) - f(y)| \leq \text{diam}(I_{n,j}) \leq 2^{-n}.$$

给定  $\eta > 0$ , 取  $n$  使  $2^{-n} < \eta$ , 上述  $\delta_n$  便对所有  $x, y \in K$  同时有效。这证明了  $f|_K$  的一致连续性。□

因为  $K \subseteq E$  且  $m(E) < \infty$ , 测度估计也可写成

$$m(K) > m(E) - \varepsilon.$$

定理所给的  $K$  是欧氏空间中的紧集, 不只是  $E$  中的相对闭集。因此, 即使  $E$  本身不闭或无界, 保留下来的部分仍同时有测度控制与紧性。若  $m(E) < \varepsilon$ , 空集已经满足结论; 有实质内容的是误差远小于  $m(E)$  的情形。

证明中的每一级只处理有限个值域区间。内正则性把相应的可测水平集缩成紧集; 同一级中不同紧片之间的正距离, 使函数在这一精度下不会突然跳入另一个值域区间。最后的可数交让所有精度同时成立。这里没有把函数列的逐点收敛提升为一致收敛, 因而不使用下一节的 Egoroff 定理。

**定理 4.3.3** 已经把非负可测函数写成简单函数的逐点极限, 但仅把 **命题 4.4.2** 分别用于每个简单函数还不够。各次所得紧集若没有共同控制, 取交可能损失过多测度; 即使每个近似函数在自己的紧集上连续, 逐点极限也未必连续。上面的证明同时安排了可求和的测度预算与趋于零的值域网格, 正是为了补上这两个环节。

**推论 4.4.4.** 若  $E \in \mathcal{L}^d$ 、 $m(E) < \infty$ , 且  $f: E \rightarrow \mathbb{C}$  可测, 则对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在紧集  $K \subseteq E$ , 使  $m(E \setminus K) < \varepsilon$  且  $f|_K$  连续。

证明. 分别把 **定理 4.4.3** 应用于  $\text{Re}f$  与  $\text{Im}f$ , 误差各取  $\varepsilon/2$ , 得到紧集  $K_1, K_2 \subseteq E$ 。令  $K = K_1 \cap K_2$ , 则

$$m(E \setminus K) \leq m(E \setminus K_1) + m(E \setminus K_2) < \varepsilon.$$

实部与虚部在  $K$  上都连续, 所以  $f|_K$  连续。□

同样的坐标论证适用于取值于任意有限维欧氏空间的 measurable 函数。对 measurable 函数

$$f = (f^1, \dots, f^q) : E \rightarrow \mathbb{R}^q,$$

依次为每个坐标保留误差小于  $\varepsilon/q$  的紧集，再取有限交即可。有限维在这里使坐标数有限；一般度量值函数的版本需要改用值域中的可数细网覆盖，不能只说“逐坐标证明”。

Lusin 定理同时使用了拓扑与测度。值域区间控制函数振幅，紧集之间的距离提供相对连续性，Lebesgue 测度的内正则性则控制删去部分的大小。因此它不是任意有限测度空间上的纯测度结论；若定义域没有拓扑，“限制后连续”本身便没有意义。对带拓扑的更一般测度空间，通常要以相应的内正则性假设代替定理 3.3.2。

定理的两个限制各有明确作用。若

$$N_\infty = \{x \in E \mid |f(x)| = \infty\}$$

具有正测度，那么任何使  $f|_K$  为实值函数的集合  $K$  都避开  $N_\infty$ ，从而

$$m(E \setminus K) \geq m(N_\infty).$$

误差不可能任意小。因此，“几乎处处有限”是实值连续结论所必需的。

例如在  $E = [0, 1]$  上令  $f = +\infty$  于  $[0, 1/2]$ ，并令  $f = 0$  于  $(1/2, 1]$ 。这个扩展实值函数可测，但凡  $f|_K$  取实值，便有  $K \cap [0, 1/2] = \emptyset$ ，从而  $m(E \setminus K) \geq 1/2$ 。若不要求限制函数为实值，而把  $\overline{\mathbb{R}}$  另赋拓扑再谈连续，得到的是另一种定理，不是这里的结论。

有限测度则是大紧集结论所必需的。以  $E = \mathbb{R}^d$  和常值函数  $f = 0$  为例，每个紧集  $K \subseteq E$  的测度都有限，故  $m(E \setminus K) = \infty$ 。无穷测度定义域上仍可把定理用于  $E \cap [-R, R]^d$ ，得到逐个有界区域内的结论；不能据此得到一个与整个  $E$  只差任意小测度的紧集。

函数本身无界并不妨碍定理。以  $E = (0, 1]$  上的  $f(x) = x^{-1}$  为例，给定  $\varepsilon > 0$ ，取  $0 < a < \min\{1, \varepsilon\}$ ，则  $K = [a, 1] \subseteq E$  紧， $m(E \setminus K) = a < \varepsilon$ ，并且  $f|_K$  连续。一般证明中的  $M_n$  所做的也是这种值域尾部控制，只是可测函数的高值集合未必是区间。

### 4.4.3 “几乎连续性”

Lusin 定理常被口头概括为“可测函数几乎连续”。这句话只应理解为：给定任意小的测度预算，可以找到一个依赖于该预算的大紧集，使限制函数连续。它不表示原函数的不连续点集为零测集。

更形式地，记

$$D_E(f) = \{x \in E \mid f \text{ 在定义域 } E \text{ 中的 } x \text{ 处不连续}\}.$$

Lusin 定理没有断言  $m(D_E(f)) = 0$ 。它甚至没有直接给出  $D_E(f) \subseteq E \setminus K$ ：点  $x \in K$  处的限制函数可以连续，而原函数仍可能沿着  $E \setminus K$  中趋于  $x$  的点不连续。

令  $E = [0, 1]$ ，并考虑 **Dirichlet 函数**

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}.$$

集合  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$  可数, 因而是零测 Borel 集; 由 命题 1.4.8, 函数  $f$  可测。另一方面, 每个点在  $E$  中的任意相对邻域都同时含有有理数与无理数, 函数值在 0 与 1 之间跳动。因此  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  在  $E$  的每一点都不连续, 其不连续点集就是整个  $[0, 1]$ , 测度为 1。

这并不违背 Lusin 定理。集合  $E \setminus \mathbb{Q}$  可测且测度为 1。由内正则性, 对每个  $\varepsilon > 0$  都能取紧集  $K \subseteq E \setminus \mathbb{Q}$ , 使

$$m((E \setminus \mathbb{Q}) \setminus K) < \varepsilon.$$

于是  $m(E \setminus K) < \varepsilon$ , 而  $f|_K = 0$ , 当然连续。原函数在  $x \in K$  处的连续性仍会考察  $E$  中趋于  $x$  的有理点; 限制函数的连续性只考察  $K$  中的点。所谓“几乎连续”描述的是删去小集合以后得到的相对连续性, 不是原定义域上逐点连续性的几乎处处成立。

紧集  $K$  也确实需要随误差预算改变。对这个 Dirichlet 函数, 不存在测度为 1 且使限制连续的紧集。若  $K \subseteq [0, 1]$  紧且  $m(K) = 1$ , 则相对开集  $[0, 1] \setminus K$  的测度为零; 非空相对开集含有一个非退化区间, 测度为正, 故只能有  $K = [0, 1]$ 。但原函数在整个区间上并不连续。Lusin 定理提供任意接近满测度的紧集, 不保证误差恰为零。

“舍去小集合”也不同于“在零测集上修改函数值”。例如  $g = \mathbf{1}_{[0, 1/2]}$  在  $[0, 1]$  上可测, 并且只有  $1/2$  是不连续点; 但是不存在与  $g$  几乎处处相等的连续函数  $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 。否则,  $h = g$  的点在  $(0, 1/2)$  与  $(1/2, 1)$  中分别稠密, 连续性迫使  $h$  在前一区间恒为 1、在后一区间恒为 0, 这与  $h$  在  $1/2$  处连续矛盾。Lusin 定理始终保留原函数, 只把连续性检验限制到选出的紧集上。

## 4.5 Egoroff 定理

逐点收敛允许收敛开始的时刻随空间点改变, 一致收敛则要求同一个时刻对所有点有效。两者通常相差很远。有限测度使这种差距可以集中到任意小的例外集上: 舍去该集合以后, 逐点收敛能够提升为一致收敛。

### 4.5.1 逐点与一致收敛

定义 4.2.5 已经定义逐点收敛。对实值或复值函数列, 它表示: 对每个  $x \in E$  和每个  $\eta > 0$ , 都存在可以依赖于  $x$  与  $\eta$  的整数  $N = N(x, \eta)$ , 使

$$n \geq N \implies |f_n(x) - f(x)| < \eta,$$

也就是先固定空间点, 再考察相应的数列。

**定义 4.5.1.** 设  $E$  是集合,  $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$  或  $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 。如果对每个  $\eta > 0$ , 存在只依赖于  $\eta$  的整数  $N = N(\eta)$ , 使

$$n \geq N, x \in E \implies |f_n(x) - f(x)| < \eta,$$

就称  $f_n$  在  $E$  上**一致收敛** (uniform convergence) 于  $f$ 。

两个定义的差别在量词次序。逐点收敛先固定  $x$ , 再选择  $N$ ; 一致收敛先选择  $N$ , 这个  $N$  随后要适用于每个  $x$ 。当  $E \neq \emptyset$  时, 后一条件等价于

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0,$$

其中上确界允许暂时取  $+\infty$ 。一致收敛必然推出逐点收敛，反命题一般不成立。

例如在  $E = [0, 1]$  上令  $f_n(x) = x^n$ 。它逐点收敛于函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

然而

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 1$$

对每个  $n$  都成立，因为  $x^n$  在  $x < 1$  时可以任意接近 1。所以收敛不一致。这个例子也说明，连续函数的逐点极限可以不连续。

**命题 4.5.2.** 若  $E \subseteq \mathbb{R}^d$ ，每个  $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$  都相对于  $E$  连续，且  $f_n \rightarrow f$  一致收敛，则  $f$  相对于  $E$  连续。复值函数同样成立。

证明. 固定  $x \in E$  与  $\eta > 0$ 。由一致收敛，可取  $N$ ，使

$$|f_N(y) - f(y)| < \frac{\eta}{3} \quad (y \in E).$$

由  $f_N$  在  $x$  处连续，存在  $\delta > 0$ ，使得  $y \in E$ 、 $|x - y| < \delta$  时

$$|f_N(y) - f_N(x)| < \frac{\eta}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f_N(y)| + |f_N(y) - f_N(x)| + |f_N(x) - f(x)| \\ &< \eta. \end{aligned}$$

这正是  $f$  在  $x$  处相对于  $E$  的连续性。 □

一致收敛也可以不预先知道极限而加以判定。

**命题 4.5.3.** 函数列  $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$  一致收敛，当且仅当它满足一致 Cauchy 条件 (uniform Cauchy condition)：对每个  $\eta > 0$ ，存在  $N$ ，使得

$$m, n \geq N, x \in E \implies |f_m(x) - f_n(x)| < \eta.$$

证明. 若  $f_n \rightarrow f$  一致，取  $N$  使  $|f_n(x) - f(x)| < \eta/2$  对所有  $n \geq N$ 、 $x \in E$  成立。三角不等式立即给出一致 Cauchy 条件。

反过来，设该条件成立。固定  $x \in E$  后，数列  $(f_n(x))$  是  $\mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$  中的 Cauchy 列，由完备性收敛到某个值，记为  $f(x)$ 。给定  $\eta > 0$ ，在一致 Cauchy 条件中把误差取为  $\eta/2$ ，得到  $N$ 。若  $m \geq N$ ，则对所有  $n \geq N$  和  $x \in E$  都有

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\eta}{2}.$$

固定  $m, x$  并令  $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$|f_m(x) - f(x)| \leq \frac{\eta}{2} < \eta.$$

同一个  $N$  对所有  $x$  有效，故  $f_n \rightarrow f$  一致收敛。 □



逐点收敛缺少的正是这种统一尾部控制。在  $x^n$  的例子中, 每个  $x < 1$  都有自己的收敛速度; 当  $x$  越靠近 1, 使  $x^n$  变小所需的  $n$  越大, 因而不存在适用于整个区间的指标。

### 4.5.2 几乎一致收敛

**定义 4.5.4.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间,  $E \in \mathcal{A}$ , 并设  $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$  可测。如果对每个  $\varepsilon > 0$ , 都存在可测集  $A \subseteq E$ , 使

$$\mu(A) < \varepsilon$$

并且  $f_n \rightarrow f$  在  $E \setminus A$  上一致收敛, 就称  $f_n$  在  $E$  上**几乎一致收敛** (almost uniform convergence) 于  $f$ 。

例外集  $A$  可以随  $\varepsilon$  改变。定义要求的是在整个  $E \setminus A$  上统一选择收敛指标, 而不是对其中每个点分别选择。用上确界写, 这个要求是

$$\sup_{x \in E \setminus A} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

若原收敛已经一致, 可取  $A = \emptyset$ , 所以一致收敛蕴含几乎一致收敛。

把所有量词写出, 几乎一致收敛的次序是

对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A$ ,  $\mu(A) < \varepsilon$ ; 对每个  $\eta > 0$ , 存在  $N$ ; 对所有  $n \geq N$ ,  $x \in E \setminus A$ .

相比之下, 几乎处处收敛只在开头删去一个零测集, 随后逐点收敛所需的  $N$  仍可依赖于  $x$ 。Egoroff 定理的内容不是把例外集从正测度改成零测度, 而是在有限测度条件下交换“选取  $N$ ”与“选取  $x$ ”的先后。

前面的  $x^n$  已经给出一个不一致而几乎一致的例子。给定  $\varepsilon > 0$ , 取

$$0 < \delta < \min\{1, \varepsilon\}, \quad A = (1 - \delta, 1].$$

集合  $A$  的测度为  $\delta < \varepsilon$ , 而在  $E \setminus A = [0, 1 - \delta]$  上, 极限函数恒为零, 并且

$$\sup_{x \in [0, 1 - \delta]} |f_n(x) - f(x)| \leq (1 - \delta)^n \rightarrow 0.$$

例外集删去了收敛速度最慢、不断向端点 1 靠近的区域。

这里不能把正测度但任意小的  $A$  换成一个固定零测集。事实上, 若  $N \subseteq [0, 1]$  为零测集, 那么对每个  $a < 1$ , 区间  $(a, 1) \setminus N$  都非空。即使把端点 1 放入  $N$ , 仍有

$$\sup_{x \in [0, 1] \setminus N} |x^n - f(x)| = 1.$$

所以  $x^n \rightarrow f$  不会在任何删去零测集后的定义域上一致收敛。几乎一致收敛允许例外集依精度改变, 并允许它有正但任意小的测度。

另一个例子把例外集的作用显示得更直接。在  $E = [0, 1]$  上令

$$g_n = \mathbf{1}_{[0, 1/n]}, \quad g = \mathbf{1}_{\{0\}}.$$



函数列逐点收敛, 但不一致收敛, 因为对每个  $n$  都能在  $(0, 1/n]$  中找到误差为 1 的点。给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $0 < \delta < \min\{1, \varepsilon\}$  并删去  $A = (0, \delta)$ 。只要  $n > \delta^{-1}$ , 就在  $[0, 1] \setminus A = \{0\} \cup [\delta, 1]$  上有  $g_n = g$ 。这里收敛甚至从某一项起完全相等。

**命题 4.5.5.** 在任意测度空间中, 几乎一致收敛蕴含几乎处处收敛。

证明. 对每个  $r \geq 1$ , 由几乎一致收敛取可测集  $A_r \subseteq E$ , 使  $\mu(A_r) < 2^{-r}$ , 且  $f_n \rightarrow f$  在  $E \setminus A_r$  上一致收敛。令

$$N = \bigcap_{r=1}^{\infty} A_r.$$

对每个  $r$ , 都有  $\mu(N) \leq \mu(A_r) < 2^{-r}$ , 故  $\mu(N) = 0$ 。若  $x \in E \setminus N$ , 则至少存在一个  $r$ , 使  $x \notin A_r$ ; 在  $E \setminus A_r$  上的一致收敛特别给出  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 。所以收敛在  $E \setminus N$  上逐点成立。□

这个方向不需要  $\mu(E) < \infty$ 。反向推理要把每个误差尺度下收敛过慢的点装进小集合, 有限测度由此进入证明。

### 4.5.3 Egoroff 定理的证明

**Egoroff 定理**把逐点收敛中的无穷多个点依赖指标集中到一个小例外集。先固定误差尺度, 再控制从某一项起仍然违反该尺度的点。

**定理 4.5.6.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间,  $E \in \mathcal{A}$  且  $\mu(E) < \infty$ 。设可测函数  $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$  在  $E$  上满足  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 。则  $f_n \rightarrow f$  在  $E$  上几乎一致收敛。

证明. 固定  $\varepsilon > 0$ 。对整数  $r, N \geq 1$ , 令

$$B_{r,N} = \bigcup_{n=N}^{\infty} \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| \geq r^{-1}\}.$$

函数均可测, 所以每个  $B_{r,N}$  可测。固定  $r$  后, 集合列  $(B_{r,N})_N$  随  $N$  递减。逐点收敛说明

$$\bigcap_{N=1}^{\infty} B_{r,N} = \emptyset.$$

一个点若属于这个交集, 就会对每个  $N$  找到某个  $n \geq N$ , 使误差至少为  $r^{-1}$ , 这与该点处的收敛矛盾。

可测性在此处不能省略: 它保证每一个误差集以及可数并  $B_{r,N}$  都可测, 因而能够比较其测度并使用从上连续性。

又因  $B_{r,1} \subseteq E$  且  $\mu(E) < \infty$ , 测度的从上连续性给出

$$\mu(B_{r,N}) \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

也可以改看好点集合

$$G_{r,N} = E \setminus B_{r,N} = \bigcap_{n=N}^{\infty} \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < r^{-1}\}.$$

对固定的  $r$ , 这些集合随  $N$  递增并覆盖  $E$ . 有限测度允许把  $\mu(G_{r,N}) \uparrow \mu(E)$  改写成  $\mu(E \setminus G_{r,N}) \downarrow 0$ . 后一种写法就是坏点集合的估计. 因此可以为每个  $r$  选取整数  $N_r$ , 使

$$\mu(B_{r,N_r}) < \varepsilon 2^{-r-1}.$$

把所有误差尺度下的坏点放在一起, 令

$$A = \bigcup_{r=1}^{\infty} B_{r,N_r}.$$

于是  $A \subseteq E$  可测, 并且

$$\mu(A) \leq \sum_{r=1}^{\infty} \mu(B_{r,N_r}) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

若  $x \in E \setminus A$ , 则对每个  $r$  都有  $x \notin B_{r,N_r}$ . 按照  $B_{r,N_r}$  的定义, 只要  $n \geq N_r$ , 就有

$$|f_n(x) - f(x)| < r^{-1}.$$

这个  $N_r$  与  $x$  无关. 给定  $\eta > 0$ , 选择  $r$  使  $r^{-1} < \eta$ , 便知对所有  $n \geq N_r$  和所有  $x \in E \setminus A$ , 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \eta.$$

所以  $f_n \rightarrow f$  在  $E \setminus A$  上一致收敛。□

若只假设每个  $f_n$  可测, 极限函数  $f$  的可测性也会由逐点极限保持可测性得到; 定理把它列入假设, 是为了让所有误差集合的可测性在陈述中直接可见. 整个证明没有使用  $X$  上的拓扑, 也不要求函数连续. 与 **Lusin 定理** 不同, **Egoroff 定理** 是纯测度论结论.

证明可以直接按量词阅读. 逐点收敛为每个  $x$  和每个精度  $r^{-1}$  提供一个依赖于  $x$  的起始位置; 集合  $B_{r,N}$  记录起始位置晚于  $N$  的点. 有限测度使这类点的测度随  $N$  趋于零. 选出的  $N_r$  只依赖精度  $r^{-1}$ , 删除所有  $B_{r,N_r}$  后, 便恢复了一致收敛所需的量词次序.

定理只要求  $\mu(E) < \infty$ , 不要求  $E$  有界、闭或紧. 例如欧氏空间中可以取一个向无穷处延伸但总测度有限的可测集; 只要它的测度有限, 同一坏点集合论证仍然成立. 紧集只在后面的 **Lebesgue 正则性加强版** 中出现.

结合 **命题 4.5.5** 可知, 在  $\mu(E) < \infty$  时, 几乎处处收敛与几乎一致收敛等价. 前者允许先舍去一个零测集, 后者则要求每个给定的正误差预算都留下一个一致收敛的大集合. 下面把零测例外并入 **Egoroff 定理**.

**推论 4.5.7 (几乎处处版本).** 设  $\mu(E) < \infty$ , 可测函数  $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$  满足  $f_n \rightarrow f$  几乎处处. 则  $f_n \rightarrow f$  几乎一致.

证明. 取可测零测集  $N \subseteq E$ , 使收敛在  $E \setminus N$  上逐点成立. 给定  $\varepsilon > 0$ , 把 **定理 4.5.6** 应用于有限测度集  $E \setminus N$ , 得到可测集  $A_0 \subseteq E \setminus N$ , 满足  $\mu(A_0) < \varepsilon$ , 且收敛在  $(E \setminus N) \setminus A_0$  上一致. 令  $A = N \cup A_0$ . 由于  $\mu(N) = 0$ , 有  $\mu(A) < \varepsilon$ , 而

$$E \setminus A = (E \setminus N) \setminus A_0,$$

结论成立。□

同一结论适用于几乎处处有限的扩展实值函数列。若每个  $f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  及极限  $f$  都几乎处处有限, 并且  $f_n \rightarrow f$  几乎处处, 那么先删去收敛失败的零测集, 再删去

$$\{|f| = \infty\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \{|f_n| = \infty\}.$$

这是零测集的可数并。余下集合上所有函数均为实值, 可以使用上述推论。“几乎处处有限”这一条件使通常的绝对值误差在保留下来的集合上有定义。

在欧氏空间中还可把一致收敛集合取得紧一些。

**推论 4.5.8.** 设  $E \in \mathcal{L}^d$ 、 $m(E) < \infty$ , 且可测函数  $f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$  几乎处处收敛。则对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在紧集  $K \subseteq E$ , 使  $m(E \setminus K) < \varepsilon$ , 并且  $f_n \rightarrow f$  在  $K$  上一致收敛。

证明. 先由 推论 4.5.7 取可测集  $A \subseteq E$ , 使  $m(A) < \varepsilon/2$ , 且收敛在  $F = E \setminus A$  上一致。由内正则性在  $F$  中取紧集  $K$ , 使  $m(F \setminus K) < \varepsilon/2$ 。由于

$$E \setminus K = A \sqcup (F \setminus K),$$

所以  $m(E \setminus K) < \varepsilon$ , 而一致收敛在子集  $K \subseteq F$  上仍然成立。□

若上述推论中的每个  $f_n$  都相对于  $E$  连续, 则限制  $f_n|_K$  在  $K$  上连续。结合 命题 4.5.2, 可知极限  $f|_K$  也连续。这个结论常用于已有连续逼近列的场合; 它与上一节 Lusin 定理的直接证明相容, 但不能反过来充当那一证明, 因为构造连续逼近列本身还需要额外论证。

有限测度假设不能删除。令  $E = \mathbb{R}$ , 并取

$$f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1)}, \quad f = 0.$$

对每个固定的  $x \in \mathbb{R}$ , 只有有限多个区间  $[n, n+1)$  能含  $x$ , 所以  $f_n(x) \rightarrow 0$ 。但若可测集  $A \subseteq \mathbb{R}$  满足  $m(A) < 1/2$ , 那么对每个  $n$  都有

$$m([n, n+1) \setminus A) \geq 1 - m(A) > \frac{1}{2}.$$

故  $[n, n+1) \setminus A$  非空, 并且

$$\sup_{x \in \mathbb{R} \setminus A} |f_n(x)| = 1 \quad (n \geq 1).$$

收敛在  $\mathbb{R} \setminus A$  上不一致, 因此也不几乎一致。在定理的证明中, 有限测度正是用来从  $B_{r,N} \downarrow \emptyset$  推出  $\mu(B_{r,N}) \rightarrow 0$ ; 本例在  $r = 2$  时有  $B_{2,N} = [N, \infty)$ , 其测度始终为无穷。

无穷测度空间上的局部结论仍然成立。若  $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ , 其中  $E_j \uparrow E$  且  $\mu(E_j) < \infty$ , 则可在每个  $E_j$  上分别使用 Egoroff 定理。不过, 所得一致收敛指标通常依赖于  $j$ , 不能拼成整个  $E$  上的一致收敛; 移动区间的例子正表明这种局部结论不能自动升级为全局结论。

## 本章小结

实值或扩展实值函数的可测性可以由半直线阈值集检验, 复值函数的可测性则等价于实部和虚部可测。借助乘积映射与连续运算, 有限的和、积、最大值及最小值都保持可测; 扩展实值运算若可能出现  $\infty - \infty$  或  $0 \cdot \infty$ , 必须先排除未定义点。可数上确界和下确界仍可测, 因而上极限、下极限和存在的逐点极限也可测。完备测度空间还允许在零测集上任意修改可测函数; 在非完备空间中, 这一结论会失败。

非负可测函数可以由一系列逐点递增的非负简单函数从下逼近。显式的二进构造同时控制量化误差和函数高度; 正部、负部把一般扩展实值函数分解成两个非负分量, 截断  $T_M f$  则把无界问题化为有界问题。于是, 简单函数负责离散化函数值, 截断负责限制极端值, 空间局部化负责把问题压到有限测度区域。

在有限测度条件下, **Lusin 定理**把几乎处处有限的可测函数限制为大紧集上的连续函数, **Egoroff 定理**把几乎处处收敛的可测函数列限制为大可测集上的一致收敛。两者都只改变一个任意小测度的集合, 却不声称原函数全局连续或原序列全局一致收敛; 无限测度空间中的反例说明, 有限测度假设不是证明上的便利条件。

## 习题

**习题 4.1.** 设  $(A_n)_{n \geq 1}$  是可测空间  $(X, \mathcal{A})$  的一个可数可测覆盖。对每个  $n$ , 函数  $f_n : (A_n, \mathcal{A}|_{A_n}) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  可测, 并且

$$f_n = f_m \quad \text{在 } A_n \cap A_m \text{ 上成立.}$$

证明公式  $f(x) = f_n(x) \ (x \in A_n)$  给出了良定义的可测函数  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 。

解. 相容条件保证同一点无论选取哪个包含它的  $A_n$ , 所得函数值都相同, 故  $f$  良定义。令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k \quad (n \geq 2).$$

这些集合可测、两两不交, 且其并为  $X$ 。每个限制  $f_n|_{B_n}$  可测; 相容性又说明,  $f$  在  $B_n$  上恰等于  $f_n|_{B_n}$ 。对可测分割应用 **引理 4.1.6**, 便知  $f$  可测。□

**习题 4.2.** 设  $(f_n)_{n \geq 1}$  是一列非负可测函数。对每个  $k$ , 把 **定理 4.3.3** 的第  $k$  级二进公式分别应用于  $f_1, \dots, f_k$ , 所得简单函数记为  $\varphi_{1,k}, \dots, \varphi_{k,k}$ 。证明可以令

$$s_k = \max_{1 \leq j \leq k} \varphi_{j,k},$$

从而得到一系列非负简单函数  $s_k \uparrow \sup_{n \geq 1} f_n$ 。

解. 同一级有限多个简单函数的最大值仍是简单函数, 故  $s_k$  非负且简单。显式二进公式对逼近层级单调, 所以当  $j \leq k$  时  $\varphi_{j,k} \leq \varphi_{j,k+1}$ ; 第  $k+1$  项还在最大值中增加了一个候选函数。因此

$$s_k \leq s_{k+1} \leq \sup_{n \geq 1} f_n.$$

反过来, 固定  $j$ . 当  $k \geq j$  时有  $s_k \geq \varphi_{j,k}$ , 而  $\varphi_{j,k} \uparrow f_j$ . 于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_k \geq f_j$$

对每个  $j$  成立. 取  $j$  的上确界并结合前面的上界, 得到  $s_k \uparrow \sup_j f_j$ .  $\square$

**习题 4.3.** 设  $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  Lebesgue 可测. 证明存在 Borel 可测函数  $g: \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , 使  $f = g$  几乎处处.

解. 由 推论 4.3.6, 可取实值简单函数  $s_n \rightarrow f$  逐点成立. 把  $s_n$  的规范表示写成

$$s_n = \sum_{j=1}^{N_n} a_{n,j} \mathbf{1}_{E_{n,j}}.$$

由 定理 3.3.4, 对每个  $E_{n,j}$  可取 Borel 集  $B_{n,j}$ , 使  $E_{n,j} \Delta B_{n,j}$  为零测集. 令  $t_n = \sum_j a_{n,j} \mathbf{1}_{B_{n,j}}$ , 则  $t_n$  Borel 可测, 而且  $t_n = s_n$  在一个零测集外成立. 所有这些例外集的可数并仍为零测集, 所以在其补集上  $t_n \rightarrow f$ . 定义

$$g = \limsup_{n \rightarrow \infty} t_n.$$

函数  $g$  Borel 可测, 并在上述补集上等于  $f$ , 即为所求 Borel 代表.  $\square$

**习题 4.4.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  不一定完备, 扩展实值或复值可测函数列  $(f_n)$  几乎处处收敛于同值域函数  $f$ . 证明总存在一个可测函数  $g$ , 使  $f = g$  几乎处处; 再说明为何在完备空间中可以进一步断定给定的  $f$  本身可测.

解. 对扩展实值函数令

$$g = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

由极限运算的可测性,  $g$  可测; 在  $(f_n)$  收敛于  $f$  的点, 上极限等于普通极限, 所以  $g = f$  几乎处处.

若  $(f_n)$  为复值函数列, 令  $C$  为它的逐点收敛点集. 第 4.2.3 小节的 Cauchy 判别已经说明  $C \in \mathcal{A}$ . 在  $C$  上令

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

在  $X \setminus C$  上令  $g(x) = 0$ . 限制函数  $f_n|_C$  的逐点极限在  $C$  上可测, 再由 引理 4.1.6,  $g$  在  $X$  上可测. 几乎处处收敛保证  $X \setminus C$  是零测集, 且  $g = f$  几乎处处.

若空间完备, 则可测函数  $g$  在一个可测零集上任意修改后仍可测; 既然  $f = g$  几乎处处, 定理 4.2.9 便给出  $f$  可测.  $\square$

**习题 4.5.** 在  $(0, 1]$  上令  $f(x) = x^{-1}$ , 并对它写出 定理 4.3.3 中的  $\varphi_n$ . 证明  $\varphi_n \uparrow f$  逐点成立, 但收敛不一致.

解. 把定理中的水平集与  $f(x) = x^{-1}$  代入即可得到

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 2^{-n} \lfloor 2^n/x \rfloor, & x > 1/n, \\ n, & 0 < x \leq 1/n. \end{cases}$$

在分界点  $x = 1/n$  两个表达式都给出  $n$ . 固定  $x$ . 当  $n > 1/x$  时,  $x > 1/n$ , 于是

$$0 \leq \frac{1}{x} - \varphi_n(x) < 2^{-n};$$

故  $\varphi_n(x) \rightarrow x^{-1}$ . 再核对单调性: 若  $x \leq 1/(n+1)$ , 则  $\varphi_n(x) = n < n+1 = \varphi_{n+1}(x)$ ; 若  $1/(n+1) < x \leq 1/n$ , 则  $n \leq x^{-1} < n+1$ , 从而  $\varphi_n(x) = n \leq \varphi_{n+1}(x)$ ; 若  $x > 1/n$ , 则

$$\varphi_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n/x \rfloor \leq 2^{-n-1} \lfloor 2^{n+1}/x \rfloor = \varphi_{n+1}(x).$$

因此  $\varphi_n \uparrow f$  逐点成立. 另一方面, 对每个固定  $n$ , 当  $x \downarrow 0$  时

$$f(x) - \varphi_n(x) = x^{-1} - n \rightarrow \infty.$$

所以  $\sup_{0 < x \leq 1} |f(x) - \varphi_n(x)| = \infty$ , 不可能一致收敛. 这说明非负简单逼近的有界情形加强不能推广到无界函数.  $\square$

**习题 4.6.** 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是测度空间,  $E \in \mathcal{A}$ ,  $\mu(E) < \infty$ , 且  $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  可测. 证明下列条件等价:

- I.  $f$  几乎处处有限;
- II.  $\mu(\{|f| > M\}) \rightarrow 0$  当  $M \rightarrow \infty$ ;
- III. 对每个  $\eta > 0$ ,

$$\mu(\{|T_M f - f| > \eta\}) \rightarrow 0.$$

解. 由 **命题 4.3.8**, (I) 推出 (II). 又因

$$\{|T_M f - f| > \eta\} \subseteq \{|f| > M\},$$

故 (II) 推出 (III). 最后, 集合  $N = \{|f| = \infty\}$  包含于每个  $\{|T_M f - f| > 1\}$ ; 若 (III) 成立, 则  $\mu(N) = 0$ , 所以 (I) 成立.  $\square$

**习题 4.7.** 设  $E \subseteq \mathbb{R}^d$  可测且  $m(E) < \infty$ , 函数列  $(f_j)_{j \geq 1}$  中每个  $f_j: E \rightarrow \mathbb{R}$  都可测. 证明对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在同一个紧集  $K \subseteq E$ , 使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon$$

且每个限制函数  $f_j|_K$  都连续.



解. 对第  $j$  个函数应用 **Lusin** 定理, 并把误差预算取为  $\varepsilon 2^{-j-1}$ , 得到紧集  $K_j \subseteq E$ , 使

$$m(E \setminus K_j) < \varepsilon 2^{-j-1}$$

且  $f_j|_{K_j}$  连续. 令  $K = \bigcap_{j=1}^{\infty} K_j$ . 它是紧集  $K_1$  的闭子集, 因而紧, 并且

$$m(E \setminus K) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m(E \setminus K_j) < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

限制一个连续函数到更小的子集仍连续; 由于  $K \subseteq K_j$  对每个  $j$  成立, 所有  $f_j|_K$  都连续.  $\square$

**习题 4.8.** 在  $[0, 1]$  上令  $f_n = \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ . 证明  $f_n \rightarrow 0$  处处成立但不一致收敛. 对给定的  $\varepsilon > 0$ , 显式写出一个紧集  $K \subseteq [0, 1]$ , 使  $m([0, 1] \setminus K) < \varepsilon$  且  $f_n \rightarrow 0$  在  $K$  上一致收敛.

解. 点  $x = 0$  不属于任何  $(0, 1/n)$ ; 若  $x > 0$ , 则当  $n > 1/x$  时也有  $x \notin (0, 1/n)$ . 所以  $f_n(x) \rightarrow 0$  对每个  $x$  成立. 另一方面, 每个区间  $(0, 1/n)$  非空, 故

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = 1,$$

收敛不一致. 取  $0 < \delta < \min\{1, \varepsilon\}$ , 并令  $K = \{0\} \cup [\delta, 1]$ . 这是紧集, 补集测度为  $\delta < \varepsilon$ . 当  $n > 1/\delta$  时,  $(0, 1/n) \cap K = \emptyset$ , 因而  $f_n|_K \equiv 0$ ; 收敛在  $K$  上甚至从某一项起恒等成立.  $\square$

**习题 4.9.** 设测度空间  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  是  $\sigma$ -有限的,  $f_n, f: X \rightarrow \mathbb{R}$  (或均取值于  $\mathbb{C}$ ) 为可测函数, 并且  $f_n \rightarrow f$  几乎处处. 证明存在递增可测集列

$$E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots, \quad \mu(E_j) < \infty, \quad \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = X,$$

使得给定  $\varepsilon > 0$  后, 可以为每个  $j$  取  $A_j \subseteq E_j$ 、 $\mu(A_j) < \varepsilon 2^{-j}$ , 且  $f_n \rightarrow f$  在  $E_j \setminus A_j$  上一致. 解释为什么这只给出逐层的一致收敛, 而不保证在  $X \setminus \bigcup_j A_j$  上全局一致收敛.

解. 由  $\sigma$ -有限性, 可取有限测度可测集  $(F_j)$  覆盖  $X$ . 令  $E_j = \bigcup_{k=1}^j F_k$ , 便得到题设的递增有限测度穷竭. 把 **Egoroff** 定理的几乎处处版本应用于每个  $E_j$ , 并使用误差预算  $\varepsilon 2^{-j}$ , 即可得到所需的  $A_j$ . 此外

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-j} = \varepsilon.$$

然而, 第  $j$  层的一致收敛指标可以依赖于  $j$ . 给定误差尺度后, 这些指标未必对  $j$  有共同上界; 对所有层取并便不能得到一个同时控制整个  $X \setminus \bigcup_j A_j$  的指标. 实直线上的平移指示函数反例正体现了这种指标向无穷远逃逸的现象.  $\square$



# 第五章 Lebesgue 积分与收敛理论

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 5.1 非负函数的积分

### 5.1.1 简单函数积分

待填充。

### 5.1.2 非负可测函数积分

待填充。

### 5.1.3 单调性

待填充。

### 5.1.4 可数可加性

待填充。

## 5.2 一般可积函数

### 5.2.1 正部与负部

待填充。

### 5.2.2 可积性

待填充。

### 5.2.3 $L^1$ 的初步定义

待填充。

### 5.2.4 积分的绝对连续性

待填充。

## 5.3 基本收敛定理

### 5.3.1 Fatou 引理

待填充。

### 5.3.2 单调收敛定理

待填充。

### 5.3.3 控制收敛定理

待填充。

### 5.3.4 反向 Fatou 型结论

待填充。

## 5.4 参数积分：极限与微分

### 5.4.1 参数积分的连续性

待填充。

### 5.4.2 积分号下取极限

待填充。

### 5.4.3 积分号下求导

待填充。

### 5.4.4 无穷区间积分中的参数依赖

待填充。

## 5.5 一致可积性

### 5.5.1 一致可积族

待填充。

### 5.5.2 一致绝对连续性

待填充。

### 5.5.3 Vitali 收敛定理

待填充。

### 5.5.4 $L^1$ 收敛判据

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第六章 有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 6.1 有符号测度

### 6.1.1 正集与负集

待填充。

### 6.1.2 Hahn 分解

待填充。

### 6.1.3 Jordan 分解

待填充。

## 6.2 全变差

### 6.2.1 全变差测度

待填充。

### 6.2.2 有限变差测度

待填充。

### 6.2.3 有符号测度空间的范数

待填充。

## 6.3 绝对连续与奇异

### 6.3.1 $\nu \ll \mu$

待填充。

### 6.3.2 $\nu \perp \mu$

待填充。

### 6.3.3 奇异测度

待填充。

### 6.3.4 Lebesgue 分解的动机

待填充。

## 6.4 Radon–Nikodym 定理

### 6.4.1 Radon–Nikodym 导数

待填充。

### 6.4.2 定理及证明

待填充。

### 6.4.3 唯一性

待填充。

### 6.4.4 Lebesgue 分解定理

待填充。

## 6.5\* 复测度

### 6.5.1 复测度

待填充。

### 6.5.2 全变差

待填充。

### 6.5.3 极分解

待填充。

### 6.5.4 复测度上的积分

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 7.1 乘积可测结构

### 7.1.1 乘积 $\sigma$ -代数

待填充。

### 7.1.2 可测矩形

待填充。

### 7.1.3 截面

待填充。

### 7.1.4 截面的可测性

待填充。

## 7.2 乘积测度

### 7.2.1 矩形上的测度

待填充。

### 7.2.2 乘积测度的构造

待填充。

### 7.2.3 唯一性

待填充。

### 7.2.4 多重乘积

待填充。



## 7.3 Tonelli–Fubini 定理

### 7.3.1 Tonelli 定理

待填充。

### 7.3.2 Fubini 定理

待填充。

### 7.3.3 截面与零测集

待填充。

### 7.3.4 多重积分

待填充。

## 7.4 参数积分的可测性

### 7.4.1 参数可测性

待填充。

### 7.4.2 参数积分

待填充。

### 7.4.3 与 Tonelli–Fubini 的结合

待填充。

### 7.4.4 与控制收敛的结合

待填充。

## 7.5 欧氏空间中的换元公式

### 7.5.1 线性换元

待填充。

### 7.5.2 $C^1$ 微分同胚

待填充。

### 7.5.3 Jacobi 行列式

待填充。

### 7.5.4 换元公式

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

## 第二编 泛函分析基础与 $L^p$ 空间



# 本编导读

待填充。

# 第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 8.1 赋范空间

### 8.1.1 范数与等价范数

待填充。

### 8.1.2 连续线性映射

待填充。

### 8.1.3 算子范数

待填充。

### 8.1.4 Banach 空间

待填充。

## 8.2 线性泛函与 Hahn–Banach

### 8.2.1 对偶空间

待填充。

### 8.2.2 Hahn–Banach 定理

待填充。

### 8.2.3 分离定理

待填充。

### 8.2.4 对偶范数

待填充。

## 8.3 Banach 空间基本原理

### 8.3.1 Baire 类定理

待填充。

### 8.3.2 一致有界原理

待填充。

### 8.3.3 开映射定理

待填充。

### 8.3.4 闭图像定理

待填充。

## 8.4 Hilbert 空间

### 8.4.1 内积空间

待填充。

### 8.4.2 正交投影

待填充。

### 8.4.3 Riesz 表示定理

待填充。

### 8.4.4 正交系与正交基

待填充。

## 8.5\* 紧算子与紧自伴谱理论

### 8.5.1 紧算子

待填充。

### 8.5.2 紧自伴算子

待填充。

### 8.5.3 谱定理

待填充。



### 8.5.4 Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第九章 弱拓扑、弱-\* 拓扑与紧性

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 9.1 弱拓扑

### 9.1.1 弱拓扑

待填充。

### 9.1.2 弱收敛

待填充。

### 9.1.3 弱 Cauchy 序列

待填充。

### 9.1.4 范数收敛与弱收敛

待填充。

## 9.2 弱-\* 拓扑

### 9.2.1 对偶空间上的弱-\* 拓扑

待填充。

### 9.2.2 弱-\* 收敛

待填充。

### 9.2.3 弱拓扑与弱-\* 拓扑的区别

待填充。

## 9.3 Banach–Alaoglu 定理

### 9.3.1 对偶单位球

待填充。

### 9.3.2 Banach–Alaoglu 定理

待填充。

### 9.3.3 可分情形的序列版本

待填充。

## 9.4 反身性与弱紧性

### 9.4.1 反身空间

待填充。

### 9.4.2 有界序列的弱收敛子列

待填充。

### 9.4.3 Hilbert 空间中的弱紧性

待填充。

### 9.4.4\* Eberlein–Šmulian 定理

待填充。

## 9.5 凸性与弱下半连续性

### 9.5.1 凸集

待填充。

### 9.5.2 闭凸集的弱闭性

待填充。

### 9.5.3 范数的弱下半连续性

待填充。

### 9.5.4 凸泛函的弱下半连续性

待填充。

### 9.5.5 变分法中的意义

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十章 $L^p$ 空间

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 10.1 $L^p$ 的基本结构

### 10.1.1 等价类

待填充。

### 10.1.2 $L^p$ 范数

待填充。

### 10.1.3 Hölder 不等式

待填充。

### 10.1.4 Minkowski 不等式

待填充。

### 10.1.5 完备性

待填充。

## 10.2 稠密性

### 10.2.1 简单函数

待填充。

### 10.2.2 截断

待填充。

### 10.2.3 有限测度支集函数

待填充。

### 10.2.4 欧氏空间中的光滑逼近预告

待填充。

## 10.3 $L^p$ 对偶

### 10.3.1 $1 < p < \infty$

待填充。

### 10.3.2 Radon–Nikodym 方法

待填充。

### 10.3.3 $L^1$ 的对偶

待填充。

### 10.3.4 $L^\infty$ 的特殊性

待填充。

## 10.4 反身性与弱收敛

### 10.4.1 $1 < p < \infty$ 的反身性

待填充。

### 10.4.2 有界序列的弱收敛子列

待填充。

### 10.4.3 凸泛函与弱下半连续性

待填充。

## 10.5\* $L^1$ 的特殊性

### 10.5.1 一致可积性再论

待填充。

### 10.5.2 Dunford–Pettis 定理

待填充。

### 10.5.3 $L^1$ 弱紧性

待填充。

### 10.5.4 Chacon 咬引理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第十一章 Radon 测度与 Riesz-Markov 表示

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 11.1 局部紧 Hausdorff 空间

### 11.1.1 $C_c(X)$

待填充。

### 11.1.2 $C_0(X)$

待填充。

### 11.1.3 支集

待填充。

### 11.1.4 局部紧性

待填充。

## 11.2 Radon 测度

### 11.2.1 局部有限 Borel 测度

待填充。

### 11.2.2 内正则性

待填充。

### 11.2.3 外正则性

待填充。

### 11.2.4 Radon 测度的基本性质

待填充。



## 11.3 正线性泛函

### 11.3.1 $C_c(X)$ 上的正泛函

待填充。

### 11.3.2 局部有界性

待填充。

### 11.3.3 支集与正则性

待填充。

## 11.4 Riesz–Markov 表示定理

### 11.4.1 正泛函版本

待填充。

### 11.4.2 有界泛函版本

待填充。

### 11.4.3 $C_0(X)^*$

待填充。

### 11.4.4 有符号及复测度版本

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十二章\* 测度的弱收敛与紧性

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 12.1 模糊收敛与弱收敛

### 12.1.1 测试函数

待填充。

### 12.1.2 模糊收敛

待填充。

### 12.1.3 弱收敛

待填充。

### 12.1.4 概率测度情形

待填充。

## 12.2 总括定理

### 12.2.1 连续测试函数判据

待填充。

### 12.2.2 开集判据

待填充。

### 12.2.3 闭集判据

待填充。

### 12.2.4 边界零测集判据

待填充。

## 12.3 紧性

### 12.3.1 紧族

待填充。

### 12.3.2 质量逃逸

待填充。

### 12.3.3 模糊收敛与弱收敛的差别

待填充。

## 12.4 Prokhorov 定理

### 12.4.1 Polish 空间

待填充。

### 12.4.2 紧性与相对紧性

待填充。

### 12.4.3 概率测度中的应用

待填充。

### 12.4.4 Radon 空间版本

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第三编 测度微分与几何测度论



# 本编导读

待填充。

# 第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 13.1 Vitali 覆盖

### 13.1.1 Vitali 覆盖族

待填充。

### 13.1.2 不交子族选择

待填充。

### 13.1.3 Vitali 覆盖定理

待填充。

### 13.1.4 Vitali 覆盖关系

待填充。

## 13.2 Besicovitch 覆盖

### 13.2.1 Besicovitch 覆盖定理

待填充。

### 13.2.2 有界覆盖重数

待填充。

### 13.2.3 与 Vitali 定理的区别

待填充。

### 13.2.4 高维几何意义

待填充。

## 13.3 Hardy–Littlewood 最大函数

### 13.3.1 最大算子

待填充。

### 13.3.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

### 13.3.3 强型 $(p, p)$

待填充。

### 13.3.4 局部最大算子

待填充。

## 13.4 极大不等式的基本应用

### 13.4.1 微分基

待填充。

### 13.4.2 $L^p$ 控制

待填充。

### 13.4.3 逼近恒等

待填充。

### 13.4.4 后续调和和分析中的作用

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



# 第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点

待填充。

## 本章目标

待填充。

### 14.1 密度与测度比

#### 14.1.1 上、下密度

待填充。

#### 14.1.2 密度比

待填充。

#### 14.1.3 测度相对于测度的导数

待填充。

### 14.2 Lebesgue 微分定理

#### 14.2.1 局部平均

待填充。

#### 14.2.2 最大函数方法

待填充。

#### 14.2.3 Lebesgue 微分定理

待填充。

#### 14.2.4 $L^p_{\text{loc}}$ 版本

待填充。

### 14.3 Radon 测度的微分

#### 14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示

待填充。

### 14.3.2 绝对连续部分

待填充。

### 14.3.3 奇异部分

待填充。

### 14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释

待填充。

## 14.4 Lebesgue 点

### 14.4.1 Lebesgue 点定理

待填充。

### 14.4.2 精确代表

待填充。

### 14.4.3 局部平均

待填充。

### 14.4.4 $L^p$ 函数的 Lebesgue 点

待填充。

## 14.5 近似极限与近似连续性

### 14.5.1 近似极限

待填充。

### 14.5.2 近似连续性

待填充。

### 14.5.3 密度拓扑的直观

待填充。

### 14.5.4 近似微分的预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 15.1 Hausdorff 测度

### 15.1.1 Hausdorff 含量

待填充。

### 15.1.2 $\mathcal{H}^s$

待填充。

### 15.1.3 基本性质

待填充。

### 15.1.4 Lipschitz 映射下的行为

待填充。

## 15.2 Hausdorff 维数

### 15.2.1 临界指数

待填充。

### 15.2.2 Hausdorff 维数

待填充。

### 15.2.3 可数稳定性

待填充。

### 15.2.4 Cantor 型集合

待填充。

## 15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

### 15.3.1 等直径问题

待填充。

### 15.3.2 欧氏球的极值性质

待填充。

### 15.3.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

待填充。

### 15.3.4 归一化常数

待填充。

## 15.4 Frostman 引理

### 15.4.1 质量分布原理

待填充。

### 15.4.2 Frostman 测度

待填充。

### 15.4.3 Hausdorff 维数下界

待填充。

### 15.4.4 能量方法初步

待填充。

## 15.5 Hausdorff 密度

### 15.5.1 $s$ -维密度

待填充。

### 15.5.2 密度存在问题

待填充。

### 15.5.3 局部结构

待填充。

### 15.5.4 可整流性的预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 16.1 Lipschitz 映射

### 16.1.1 Lipschitz 常数

待填充。

### 16.1.2 双 Lipschitz 映射

待填充。

### 16.1.3 Lipschitz 像

待填充。

### 16.1.4 Hausdorff 测度估计

待填充。

## 16.2 Rademacher 定理

### 16.2.1 一维 Lipschitz 函数

待填充。

### 16.2.2 高维可微性

待填充。

### 16.2.3 Rademacher 定理

待填充。

### 16.2.4 几乎处处线性化

待填充。

## 16.3 近似微分

### 16.3.1 近似可微性

待填充。

### 16.3.2 与普通微分的关系

待填充。

### 16.3.3 可测函数中的精细结构

待填充。

## 16.4\* 绝对连续曲线与度量导数

### 16.4.1 绝对连续曲线

待填充。

### 16.4.2 度量导数

待填充。

### 16.4.3 长度公式

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



# 第十七章 Jacobi 行列式与面积公式

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 17.1 线性映射的 Jacobi 行列式

### 17.1.1 Gram 行列式

待填充。

### 17.1.2 $m$ -维 Jacobi 行列式

待填充。

### 17.1.3 体积伸缩

待填充。

### 17.1.4 外代数解释

待填充。

## 17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式

### 17.2.1 微分与 Jacobi 行列式

待填充。

### 17.2.2 几何意义

待填充。

### 17.2.3 退化点

待填充。

### 17.2.4 近似 Jacobi 行列式

待填充。

## 17.3 面积公式

### 17.3.1 单射情形

待填充。

### 17.3.2 重数函数

待填充。

### 17.3.3 一般面积公式

待填充。

### 17.3.4 加权面积公式

待填充。

## 17.4 应用

### 17.4.1 曲线长度

待填充。

### 17.4.2 曲面积

待填充。

### 17.4.3 Lipschitz 参数曲面

待填充。

### 17.4.4 图像的面积

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十八章 余面积公式

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 18.1 水平集

### 18.1.1 Lipschitz 函数的水平集

待填充。

### 18.1.2 法方向

待填充。

### 18.1.3 切空间

待填充。

### 18.1.4 余面积 Jacobi 行列式

待填充。

## 18.2 余面积公式

### 18.2.1 标量函数

待填充。

### 18.2.2 向量值映射

待填充。

### 18.2.3 可积函数版本

待填充。

### 18.2.4 几何解释

待填充。

## 18.3 应用

### 18.3.1 层析积分

待填充。

### 18.3.2 水平集的 Hausdorff 测度

待填充。

### 18.3.3 分布函数

待填充。

### 18.3.4 Cavalieri 原理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十九章\* 可整流集与可整流性

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 19.1 可整流集

### 19.1.1 Lipschitz 像

待填充。

### 19.1.2 可数 $m$ -可整流集

待填充。

### 19.1.3 纯不可整流集

待填充。

### 19.1.4 可整流测度

待填充。

## 19.2 近似切空间

### 19.2.1 近似切平面

待填充。

### 19.2.2 近似法向量

待填充。

### 19.2.3 密度与切空间

待填充。

### 19.2.4 Lipschitz 图表示

待填充。

## 19.3 可整流集上的面积公式

### 19.3.1 参数化

待填充。

### 19.3.2 变量代换

待填充。

### 19.3.3 切向 Jacobi 行列式

待填充。

### 19.3.4 可整流测度

待填充。

## 19.4 密度与可整流性

### 19.4.1 密度为 1 的现象

待填充。

### 19.4.2 可整流性的密度判据

待填充。

### 19.4.3 Federer 型结构定理

待填充。

### 19.4.4 Preiss 定理概览

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



## 第四编 分布、Sobolev 空间与 BV





# 本编导读

待填充。

## 第二十章 分布与弱导数

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 20.1 测试函数

#### 20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$

待填充。

#### 20.1.2 基本操作

待填充。

#### 20.1.3 单位分解

待填充。

#### 20.1.4 测试函数空间拓扑

待填充。

### 20.2 分布

#### 20.2.1 分布的定义

待填充。

#### 20.2.2 正则分布

待填充。

#### 20.2.3 Dirac 分布

待填充。

#### 20.2.4 分布导数

待填充。

## 20.3 卷积与光滑化

### 20.3.1 磨光子

待填充。

### 20.3.2 分布卷积

待填充。

### 20.3.3 正则化

待填充。

### 20.3.4 逼近恒等

待填充。

## 20.4 弱导数

### 20.4.1 定义

待填充。

### 20.4.2 唯一性

待填充。

### 20.4.3 分部积分

待填充。

### 20.4.4 与经典导数的关系

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十一章 Sobolev 空间

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 21.1 定义

### 21.1.1 $W^{1,p}$

待填充。

### 21.1.2 $W^{k,p}$

待填充。

### 21.1.3 $H^k = W^{k,2}$

待填充。

### 21.1.4 局部 Sobolev 空间

待填充。

## 21.2 基本结构

### 21.2.1 Banach 结构

待填充。

### 21.2.2 Hilbert 结构

待填充。

### 21.2.3 完备性

待填充。

### 21.2.4 弱收敛

待填充。

## 21.3 运算规则

### 21.3.1 乘积法则

待填充。

### 21.3.2 链式法则

待填充。

### 21.3.3 截断

待填充。

### 21.3.4 坐标变换

待填充。

## 21.4 Sobolev 函数的代表

### 21.4.1 一维绝对连续代表

待填充。

### 21.4.2 ACL 性质

待填充。

### 21.4.3 几乎处处可微

待填充。

### 21.4.4 近似可微性

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 22.1 光滑逼近

### 22.1.1 局部卷积

待填充。

### 22.1.2 Friedrichs 磨光子

待填充。

### 22.1.3 Meyers–Serrin 定理

待填充。

### 22.1.4 $C_c^\infty$ 的稠密性问题

待填充。

## 22.2 $W_0^{1,p}$

### 22.2.1 定义

待填充。

### 22.2.2 零边界条件

待填充。

### 22.2.3 截断逼近

待填充。

### 22.2.4 与迹的关系

待填充。

## 22.3 延拓算子

### 22.3.1 半空间反射

待填充。

### 22.3.2 Lipschitz 区域

待填充。

### 22.3.3 延拓算子

待填充。

### 22.3.4 有界延拓

待填充。

## 22.4 局部化

### 22.4.1 截断函数

待填充。

### 22.4.2 单位分解

待填充。

### 22.4.3 局部 Sobolev 空间

待填充。

### 22.4.4 局部估计

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



# 第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 23.1 Sobolev 迹

### 23.1.1 光滑函数的边界限制

待填充。

### 23.1.2 迹算子

待填充。

### 23.1.3 $W^{1,p}$ 的迹

待填充。

### 23.1.4 零迹与 $W_0^{1,p}$

待填充。

## 23.2 分数阶 Sobolev 空间

### 23.2.1 Slobodeckij 半范数

待填充。

### 23.2.2 $W^{s,p}, 0 < s < 1$

待填充。

### 23.2.3 基本嵌入

待填充。

### 23.2.4 光滑函数的稠密性

待填充。

## 23.3 Lipschitz 边界上的迹空间

### 23.3.1 局部图表示

待填充。

### 23.3.2 半空间迹定理

待填充。

### 23.3.3 迹的满射性与右逆

待填充。

## 23.4\* 高阶迹理论

### 23.4.1 $W^{k,p}$ 的边界数据

待填充。

### 23.4.2 法向导数

待填充。

### 23.4.3 Besov 空间作为自然迹空间的预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 24.1 Poincaré 型不等式

### 24.1.1 平均值版本

待填充。

### 24.1.2 零边界版本

待填充。

### 24.1.3 Poincaré–Wirtinger 不等式

待填充。

### 24.1.4 局部形式

待填充。

## 24.2 Sobolev 不等式

### 24.2.1 $p < n$

待填充。

### 24.2.2 临界指数

待填充。

### 24.2.3 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式

待填充。

### 24.2.4 缩放

待填充。

## 24.3 Morrey 理论

### 24.3.1 $p > n$

待填充。

### 24.3.2 Hölder 连续性

待填充。

### 24.3.3 Morrey 不等式

待填充。

### 24.3.4 精确代表

待填充。

## 24.4 高阶 Sobolev 嵌入

### 24.4.1 高阶导数

待填充。

### 24.4.2 Hölder 空间

待填充。

### 24.4.3 整数阶与非整数阶

待填充。

## 24.5\* 临界嵌入

### 24.5.1 $p = n$

待填充。

### 24.5.2 Trudinger–Moser 不等式

待填充。

### 24.5.3 Morrey–Campanato 观点

待填充。

### 24.5.4 临界现象

待填充。

**本章小结**

待填充。

**习题**

待填充。

## 第二十五章 Sobolev 空间中的紧性

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 25.1 $L^p$ 中的平移判据

#### 25.1.1 平移连续性

待填充。

#### 25.1.2 Fréchet–Kolmogorov 定理

待填充。

#### 25.1.3 紧性与支集控制

待填充。

### 25.2 Rellich–Kondrachov 定理

#### 25.2.1 有界区域

待填充。

#### 25.2.2 次临界嵌入

待填充。

#### 25.2.3 边界条件

待填充。

#### 25.2.4 高阶版本

待填充。

### 25.3 弱收敛方法

#### 25.3.1 有界序列

待填充。

### 25.3.2 弱极限

待填充。

### 25.3.3 强收敛的恢复

待填充。

### 25.3.4 变分问题中的应用

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十六章\* Sobolev 容量与精细性质

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 26.1 $p$ -容量

### 26.1.1 定义

待填充。

### 26.1.2 单调性

待填充。

### 26.1.3 次可加性

待填充。

### 26.1.4 容量零集

待填充。

## 26.2 拟处处性质

### 26.2.1 拟处处

待填充。

### 26.2.2 拟连续代表

待填充。

### 26.2.3 拟连续代表的唯一性

待填充。

### 26.2.4 Sobolev 函数的精细代表

待填充。



## 26.3 容量与 Hausdorff 测度

### 26.3.1 维数估计

待填充。

### 26.3.2 零容量集

待填充。

### 26.3.3 奇异集

待填充。

### 26.3.4 临界维数

待填充。

## 26.4 精细拓扑

### 26.4.1 稀薄性

待填充。

### 26.4.2 精细连续性

待填充。

### 26.4.3 Wiener 型思想

待填充。

### 26.4.4 势论联系

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十七章 BV 函数与有限周长集合

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 27.1 BV 函数

### 27.1.1 分布导数为 Radon 测度

待填充。

### 27.1.2 全变差

待填充。

### 27.1.3 BV 范数

待填充。

### 27.1.4 基本例子

待填充。

## 27.2 BV 的逼近与紧性

### 27.2.1 光滑逼近

待填充。

### 27.2.2 下半连续性

待填充。

### 27.2.3 BV 紧性定理

待填充。

### 27.2.4 弱-\* 收敛

待填充。

## 27.3 BV 的余面积公式

### 27.3.1 超水平集

待填充。

### 27.3.2 周长

待填充。

### 27.3.3 余面积公式

待填充。

### 27.3.4 Cavalieri 型公式

待填充。

## 27.4 有限周长集合

### 27.4.1 周长测度

待填充。

### 27.4.2 测度论内部与外部

待填充。

### 27.4.3 测度论边界

待填充。

### 27.4.4 约化边界

待填充。

### 27.4.5 测度论法向

待填充。

## 27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

### 27.5.1 Gauss–Green 公式

待填充。

### 27.5.2 约化边界的可整流性

待填充。

### 27.5.3 De Giorgi 结构定理

待填充。

### 27.5.4 周长测度的表示

待填充。

## 27.6 等周不等式

### 27.6.1 BV 形式

待填充。

### 27.6.2 有限周长集合形式

待填充。

### 27.6.3 Sobolev 与等周不等式的联系

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第二十八章\* BV 函数的精细结构

待填充。

### 本章目标

待填充。

## 28.1 精确代表与近似极限

### 28.1.1 近似上、下极限

待填充。

### 28.1.2 近似连续点

待填充。

### 28.1.3 不连续点集

待填充。

## 28.2 跳跃集

### 28.2.1 跳跃点

待填充。

### 28.2.2 单侧近似极限

待填充。

### 28.2.3 跳跃法向量

待填充。

### 28.2.4 $J_u$ 的可整流性

待填充。

## 28.3 导数测度的分解

### 28.3.1 绝对连续部分

待填充。

### 28.3.2 跳跃部分

待填充。

### 28.3.3 Cantor 部分

待填充。

## 28.4 $SBV$ 与自由间断问题概览

### 28.4.1 特殊有界变差函数

待填充。

### 28.4.2 Mumford–Shah 型能量

待填充。

### 28.4.3 紧性

待填充。

### 28.4.4 变分法中的位置

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



## 附录 A1 拓扑与度量空间基础



## 附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式

## 附录 C1 泛函分析补充

## 附录 D1 高阶几何测度论与流

# 后记

第一卷起初追问哪些集合可以测量，以及怎样定义能承受可数极限的积分。建立  $L^p$  空间和弱收敛之后，覆盖与测度微分把缩小邻域上的平均同点态行为联系起来；几何测度、Sobolev 空间与 BV 理论则把这些方法用于低正则函数和不规则集合。弱导数容纳经典意义下不可微的函数，有限周长集合用导数测度描述边界。

本卷把重点放在构造的来源和假设的用处。测度延拓需要区分前测度、外测度与可测域；收敛理论需要分清点态、几乎处处、弱收敛与范数收敛。覆盖、逼近和截断的中间步骤也不能省略，因为无穷值、完备性或紧性一旦缺失，论证往往正是在这些地方断开。习题解答用于核验，读者仍应先独立作答。

复习时，可以先合上书，重写几条主链：从前测度构造测度，从简单函数建立积分，再从覆盖定理推出测度微分；随后在 Sobolev 或 BV 中选择一条路线继续。写不下去时，回查定义域、极限步骤和假设的使用位置。章末习题也宜脱离原解重做；若错误来自误用某个命题，再为删去的假设寻找反例。

下一步取决于读者关心的问题。方程、频率与振荡通向第二卷；奇异集合、界面与变分问题可沿 Hausdorff 测度、可整流性和 BV 深入。概率论可从测度与积分继续，算子理论则接在泛函分析之后。先选一条路线读完一部标准专著，通常比同时铺开多条路线更有效。

附录只提供主线所需的技术接口和若干专题入口。转向专著或论文时，先整理结果的依赖关系并核对对象所在的空间；遇到“标准论证”，要判断其中是否省略了逼近、局部化或完备化。

转读下一本书或第一篇论文时，仍可先弄清对象所在的空间和所用的收敛，再检查已有估计是否足以通过极限。其余能力只能在具体问题中继续练习。



## 参考文献



# 中文索引

半环, 44

Borel  $\sigma$ -代数, 11

Borel 集, 11

Borel 可测映射, 19

三分 Cantor 集, 60

Carathéodory 可测集, 36

Carathéodory 延拓定理, 44

测度, 28

测度空间, 28

乘积  $\sigma$ -代数, 20

初始  $\sigma$ -代数, 9

从上连续性, 30

从下连续性, 30

单调类, 15

点质量, 28

Dirichlet 函数, 93

Dynkin  $\lambda$ -系统, 12

Egoroff 定理, 97

二进立方体, 57

$F_\sigma$  集, 64

负部, 88

复值可测函数, 78

$G_\delta$  集, 64

概率测度, 30

概率空间, 30

Hahn-Kolmogorov 定理, 44

迹  $\sigma$ -代数, 17

简单函数, 86

剪切, 64

截断, 88

集合代数, 5

集合环, 5

几乎一致收敛, 96

几乎处处, 84

计数测度, 28

可测集, 17

可测空间, 17

可测映射, 18

可数次可加性, 29

可数可加性, 28

可数生成的, 10

扩展实值可测函数, 76

Lebesgue 测度, 59

Lebesgue 可测函数, 77

Lebesgue 可测集, 59

Lebesgue 外测度, 56

Lebesgue 零测集, 59

Lipschitz 函数, 72

离散  $\sigma$ -代数, 17

Lusin 定理, 90

内正则性, 62

$\pi$ -系统, 12

平凡  $\sigma$ -代数, 17

前测度, 40

上极限, 82

生成的  $\sigma$ -代数, 8

生成族, 8

示性函数, 9

实值可测函数, 76

$\sigma$ -代数, 6

$\sigma$ -有限测度, 31

体积, 54



Vitali 集, 69

外正则性, 62

外测度, 35

完备测度空间, 33

完备化, 33

下极限, 82

相对连续, 89

限制测度, 31

选择公理, 70

测度延拓, 40

一致 Cauchy 条件, 95

一致收敛, 94

有限测度, 30

正部, 88

逐点收敛, 83

子空间测度, 32

# 外文索引

- algebra of sets, 5
- almost everywhere, 84
- almost uniform convergence, 96
- axiom of choice, 70
  
- Borel measurable map, 19
- Borel set, 11
- Borel sigma-algebra, 11
  
- Carathéodory extension theorem, 44
- Carathéodory measurable set, 36
- complete measure space, 33
- completion, 33
- complex-valued measurable function, 78
  
- continuity from above, 30
- continuity from below, 30
- countable additivity, 28
- countable subadditivity, 29
- countably generated, 10
- counting measure, 28
  
- Dirichlet function, 93
- discrete sigma-algebra, 17
- dyadic cube, 57
- Dynkin lambda-system, 12
  
- Egoroff theorem, 97
- extended-real-valued measurable function, 76
  
- F-sigma set, 64
- finite measure, 30
  
- G-delta set, 64
- generated sigma-algebra, 8
- generating family, 8
  
- Hahn–Kolmogorov theorem, 44
  
- indicator function, 9
- initial sigma-algebra, 9
- inner regularity, 62
  
- Lebesgue measurable function, 77
- Lebesgue measurable set, 59
- Lebesgue measure, 59
- Lebesgue null set, 59
- Lebesgue outer measure, 56
- limit inferior, 82
- limit superior, 82
- Lipschitz function, 72
- Lusin theorem, 90
  
- measurable map, 18
- measurable set, 17
- measurable space, 17
- measure, 28
- measure extension, 40
- measure space, 28
- monotone class, 15
  
- negative part, 88
  
- outer measure, 35
- outer regularity, 62
  
- pi-system, 12
- point mass, 28
- pointwise convergence, 83
- positive part, 88
- premeasure, 40
- probability measure, 30
- probability space, 30
- product sigma-algebra, 20

real-valued measurable function, 76

relative continuity, 89

restricted measure, 31

ring of sets, 5

semiring, 44

shear, 64

sigma-algebra, 6

sigma-finite measure, 31

simple function, 86

subspace measure, 32

ternary Cantor set, 60

trace sigma-algebra, 17

trivial sigma-algebra, 17

truncation, 88

uniform Cauchy condition, 95

uniform convergence, 94

Vitali set, 69

volume, 54

# 符号索引

$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$ : 扩展实数直线, 76

$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ : 函数列的上极限, 82

$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ : 函数列的下极限, 82

a.e.: 几乎处处, 84

$f^+$ : 函数的正部, 88

$f^-$ : 函数的负部, 88

$T_M f$ : 函数  $f$  的高度截断, 88