

"Description": "나는 여드름과 흰 머리가있는 지성 피부가 갈색 흉터를 남깁니다.해결책을 제안하십시오.",

"Doctor": "안녕하세요.자세한 내용은 병변 사진을 첨부하십시오.Ahaglow 페이스 워시를 15 일 동안 매일 두 번 사용하십시오.농포가 있습니까?염증성 붉은 병변?감광성?",

"Patient": "안녕하세요 의사님, 기름진 피부 타입이 있습니다.최근에 나는 귀에 가까운 뺨의 여드름, 흰색 범프, 붉은 점을 경험하고 있습니다.때때로 나는 여드름 근처에서 매우 가려운 느낌이 듭니다.나는 내 이마에 하나 또는 두 개의 새로운 큰 여드름을 개발했습니다.1 ~ 2 주 후에 여드름이 가라 앉으면 해당 지역에 붉은 갈색 자국이 남습니다.나는 얼굴의 모든 기름에서 매우 무겁고 끈적 거리는 느낌이 들기 시작하면서 얼굴을 자주 씻어야 할 필요성을 느낍니다.나는 한동안 투명 젤을 사용했지만 피부에서는 작동하지 않습니다.현재 다른 약물을 사용하지 않습니다.친절하게 도와주세요."

"Description": "나는 당뇨병이며 지난 4 개월 동안 응급실을 가지고 있습니다.발기를 개선하는 방법?",

"Doctor": "안녕하세요, 발기를 얻기가 어렵습니까 ??또는 오랫동안 발기를 유지하기가 어렵고 조기 사정?통제되지 않은 당뇨병 환자는 발기 부전으로 이어질 수 있습니다.따라서 우수한 당뇨병 관리를 유지하십시오.녹색 잎이 많은 채소와 과일을 섭취하십시오.흡연과 알코올 소비를 피하십시오.규칙적인 운동과 요가를하십시오.테블릿 나노 레오를 3 주 동안 하루에 두 번 사용하십시오.조기 사정 간헐적 압착 및 중단으로 고통받는 경우 파트너 공동 운영이 필요할 수 있습니다.포스포 디에스 테라 제 억제제는 ED에 유용 할 수있다.그러나 심장 약물 복용을 사용하지 마십시오.불안 및 조기 사정 정제 Dopaxetine 30 mg의 경우 침대 1 시간 전에 유용 할 수 있습니다.혈청 테스토스테론, 초음파 및 음경 도플러, 야행성 Tumnesense 테스트는 문제를 진단하는 데 유용 할 수 있습니다.약물을 개선하지 않으면 보철 장치 삽입이 필요하거나 국소 주사가 유용 할 수 있습니다.잘 지내세요.",

"Patient": "나는 53 세 남성이고, 나는 당뇨병이며 지난 4 개월 동안 ED 문제가 있습니다. 나는 곧 발기를 풀어줍니다.나는 심지어 두 차례에 ect X를 복용하려고 시도했지만 작동하지는 않았지만 계속해서 가져 가야합니까?발기를 개선하기 위해 어떤 조치를 취해야하는지 알려주십시오.테리 식물"

"Description": "나는 기간 동안 거의 3 개월 늦었고 체중 감소는 도움이되지 않았습니다.왜?",

"Doctor": "안녕하세요.예, 과도한 체중은 호르몬 장애가 발생하여 기간이 지연 될 수 있습니다.그러나 지연된 기간의 원인을 찾기 위해 평가해야하는 갑상선 및 프로락틴과 같은 다른 호르몬 변화가있을 수 있습니다.때로는 스트레스가 지연을 일으킬 수 있습니다.그리고 네, 배란이 발생하면 화폐 단계에서 배출의 일관성이 조금 더 두껍을 수 있지만, 기간을 얻을 수 있는지 여부에 따라 예측할 수는 없습니다.이미 3 개월이 지났고 임신 가능성이 없다면 금단을 위해 약물을 복용하고 불규칙한 생리주기 문제에 대해 평가하는 것이 좋습니다.이게 도움이 되길 바란다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 저는 19 살입니다.나는 내 시대에 거의 3 개월 늦었고 무엇을 해야할지 모릅니다.나는 몇 가지 기사를 읽고 체중 감량이 기간을 유발한다는 것을 알았고 작년에 약 50 파운드를 잃어 122 파운드에 체중을 줄였습니다.나는 내 시대에 대해 매우 무서워합니다.또한 오늘 아침 나는 백인 퇴원이 있었는데, 그것은 내 시대의 징후 일 수 있습니까?"

"Description": "나는 단단한 의자를 지나가는 동안 항문 통증으로 대체 의자 패턴을 연습합니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕하세요.글쎄, 누군가가 장 습관을 변경했을 때 항문에서 화상을 입는 것은 드문 일입니다.당신의 증상은식이 예방 조치와 현지 크림과 Sitz 욕조를 올바르게 복용 한 항문 균열에 이차적으로 발생할 수 있습니다.이제식이 요법에서 섬유질을 계속 복용하거나 일시적으로 사용하면 시럽을 시작할 수 있습니다.밤에 락툴 로스 15 ml.방금해야 할 일은 변비를 피하는 것입니다.xylocaine 2% 4 ~ 6 시간 동안 계속 며칠 더 계속할 수 있습니다.항문 균열.다음 3 일 동안 증상이 더 나아지지 않으면 후속 조치.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 2 주 전, 나는 느슨한 움직임으로 고통 받았다.주사와 식염수 후, 나는 건강했지만 3 일 후에 나는 단단한 의자 때문에 항문 부분에 통증을 느꼈습니다.그것은 매우 고통스럽고 나는 의료 상점에서 얻은 택시와 sitz 욕조와 크림을 이야기하기 시작했습니다.나는 며칠이 지나간 가려움증이 시작된 후 그것을 적용하기 시작했고 고통은 사라졌습니다.요즘에는 달, 커드, 녹색 및 채소와 같은 마살라 음식을 먹지 않았습니다.어제 아침에 나는 대변과 복통과 항문 통증도 시작되었습니다.나는 약을 바르는 동안 만지는 데 고통을 겪고 있습니다."

"Description": "과립 형 인두염에 대한 약을 제안하십시오.",

"Doctor": "안녕!나는 당신이 보낸 사진을 보았습니다.이것은 만성 인두염처럼 보입니다.당신이 지적한 붉은 반점은 크기가 약간 증가하고 우리 모두에게 존재하는 림프절 모양입니다.이것이 우리가 만나는 매우 일반적인 실체이기 때문에 걱정할 필요가 없습니다.1,2 및 3에 언급 된 약물 아래에 언급 된 조언을 따르는 동안 통증과 관련된 급성 감염이있는 경우에만 복용 할 수 있습니다.통증이나 감염이없는 경우 1,2와 3에 언급 된 약물은 필요하지 않습니다.이로 인해 목구멍 감염이 발생할 가능성을 방지하므로 가능한 한 4, 5 및 6의 포인트를 따라야합니다.암이나 악성 종양을 나타내지 않으며 이전의 목구멍 감염으로 인해 크기가 증가한 림프절 모양 일뿐입니다.나는 당신의 질문에 자세히 답변했으면 좋겠다.더 이상 알고 싶은 것이 있거나 문의하고 싶은 것이 있으면 알려 주시면 최대한 빨리 귀하에게 다시 연락 드리겠습니다.따뜻하게 조심하십시오",

"Patient": "나는 세분화 된 인두염 문제가 있습니다. 60 일 plz 의학 이름을 도와주세요?"

"Description": "내 사타구니 탈장이 갑자기 통증을 유발하고 있습니다.한 달 동안 통증을 줄일 수 있는 방법은 무엇입니까?",

"Doctor": "안녕하세요, 탈장과 관련된 고통에 대한 불만을 검토해야 합니다.정상적인 상황에서 허니 내에 합병증이 없다면 모든 탈장이 수술해야 한다고 제안하지만 검사를 받고 있기 때문에 신체 검사와 초음파에서는 합병증이 없다는 점에서 수술을 지연시킬 수 있습니다.당분간 임시 조치로 온라인에서도 시장에서 이용할 수 있는 TRUS라고 불리는 것을 사용할 수 있습니다.그러나 일시적이며 일단 당신이 무료로 시험을 받으면 TRU 또는 다른 치료가 일시적이며 자체 프로 및 단점이 있기 때문에 그곳에서 운영하는 것이 좋습니다.그러나 초음파에서 합병증이 있음을 보여 주면 즉시 수술이 필요합니다.무거운 무게를 들어 올리지 않으면식이에 섬유질이 풍부한 음식을 추가하고 탈장의 악화를 방지하기 위해 변비를 피하십시오.도움이 되었기를 바랍니다",

"Patient": "안녕하세요, 저는 18 살짜리 소년입니다.나는 선천적 인 사타구니 탈장이 있습니다.그러나 지금까지 그것은 지금 당장주고있는 것만 큼 많은 고통을주지 않았습니다.2 시간 이상 누워 있으면 아프기 시작하고 더 이상 잠을 잘 수 없습니다.통증은 하부 복부, 골반 영역에서 피미머의 상부로 확장됩니다.한 달 안에 입학 시험이 있고 외부에 코로나가 발생하여 병원에 갈 두려움이 있기 때문에 지금 수술을받을 수 없습니다.그러니 선생님, 적어도 이번 달에 어떻게 통증을 줄일 수 있는지 말씀해 주시겠습니까?또한 즉시 수술을 받아야 하니까, 아니면 이번 달을 기다릴 수 있습니까?"

"Description": "HIV 트리 도트 항체 테스트 10 주까지 음성.12 주에 긍정적으로 변할 가능성이 있습니까?",

"Doctor": "안녕.다음은 질문에 대한 내 의견입니다.HIV TRI DOT 항체 검사는 4 세대 ELISA와 마찬가지로 HIV를 배제 할 때 우수한 민감도와 특이성을 가지고 있습니다.일반적으로 Tri Dot HIV 검사는 6 주간 노출 후 HIV를 배제 할 수 있습니다.그러나 HIV 검사는 3 개월의 노출 후 HIV를 배제하는 데 결정적인 것으로 간주 될 수 있습니다.12 주 후에 다시 HIV 빠른 테스트를 조사하는 것이 좋습니다.12 주간 노출 된 후 HIV 보고서로 되돌아 가서 확인할 수 있습니다.",

"Patient": "HI Doctor, HIV Tridot 항체 검사 6 주, 8 주 및 10.5 주에 수행되었습니다.모든 부정.지금 12 주에 긍정적으로 변할 가능성이 있습니까?정맥에서 가져온 혈액으로 테스트."

"Description": "버핑을 위해 짝은 오메프라졸은 근육 약화, 두통 및 호흡 곤란을 유발합니다.왜?",

"Doctor": "안녕하세요.나는 당신의 문제에 대해 확실히 당신을 도울 것입니다.식사 후 버핑은 매우 흔한 문제입니다.위식도 역류 질환으로 알려져 있습니다.나는 그것을 막기위한 몇 가지 예방 조치를 제안 할 것입니다.전보다 매번 음식을 적게 섭취하십시오.하루에 5 ~ 6 회, 양이 적을 수 있습니다.먹은 후 밤에 2 시간의 간격이 있어야하고 잠자리에 든다.때때로 걷는 것은 모든 음식을 먹은 후에 필수입니다.최대한 매운 음식과 지방이 많은 음식을 피하십시오.EsomePrazole로 전환 하면 더 효과적입니다.또한 15 일 동안 약물 levosulpiride를 하나 더 첨가하십시오.시럽 수 크랄을 하루에 세 번 두 테이블 스푼으로 가져 가야합니다.그것은 궤양을 치유하고 빠른 회복에 도움이 될 것입니다.이게 도움이 되길 바랍니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사님, 저는 산성 문제를 겪고 있습니다.나는 먹은 후에도 계속 튀어 나온다.나는 20 mg 오메프라졸을 섭취하기 시작했다.나는 매일 3 일 동안 복용했지만 근육 약화, 두통 및 호흡 곤란과 같은 부작용을 경험합니다.약을 먹는 시간은 얼마나 됩니까?그리고 esomeprazole로 전환 할 수 있습니까?"

"Description": "나는 부비동염이 있습니다.코로나 바이러스 감염에 걸릴 위험이 있습니까?",

"Doctor": "안녕.코로나는 우리 모두에게 위험합니다.그러나 환자의 신체 면역이 하단에있는 조건은 거의 없습니다.그러한 상태 중 하나는 반복 알레르기 관련 부비동염입니다.당신은 완전히 무증상 일 수 있지만, 일반적인 환자는 알레르기 및 관련 부비동염에 대한 조사가 그 문제에 대한 감염을 획득 할 위험이 약간 높습니다.적절한 치료를받는 것이 항상 낫습니다. 예방 조치는 자신을 노출시킬뿐만 아니라 다른 사람들도 노출시키는 모든 비용에 대해 준수해야 합니다.부비동염 및

관련 증상이 효과적인 방식으로 치료되는지 확인하십시오.부비동염 환자에서 코로나 바이러스의 치명적과 관련하여 귀하의 질문이 매우 구체적이었기 때문에 부비동염 치료에 참여하지 않았습니다.이게 도움이 되길 바랍니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 저는 부비동염 환자입니다.그러나 나는 호흡 문제에 직면하지 않습니다.그리고 저는 21 살입니다.코로나는 부비동염 환자에게 위험합니까?정말 알고 싶다고 말해주세요."

"Description": "나는 임신 6 개월이고 잇몸이 잇솔질에 출혈하고 있습니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕하세요.잇몸 출혈, 파울 호흡은 치은염의 증상입니다.임신 중에는 일반적이며 호르몬 변화로 인해 임신 치은염으로 알려져 있습니다.걱정할 것이 없습니다.Betadine 구강 세정제, 미지근한 물에 양치질을 할 수 있으며 하루에 두 번 또는 3 번의 3 번, 태블릿 메트로 기 400mg 1 정제 BD를 5 일 동안 섭취하십시오.스케일링이 필요하지만 현재의 잠금 상황에서는 귀하와 귀하의 아기의 안전이 가장 중요하기 때문에 서두르지 말 것을 권합니다.나중에 가질 수 있습니다.부드러운 브러시를 사용하고 강력한 수평 움직임 대신 브러싱의 적절한 현악 뇌졸중 기술을 배우십시오.최대한 끈적 끈적하거나 달콤한 음식을 피하십시오.임신 중 호르몬 변화는 치은염을 시작합니다.치은염.지금은 약물입니다.약물은 일시적 금속 맛을 유발할 수 있지만 걱정할 필요는 없습니다.달콤하거나 끈적 끈적한 음식을 피하십시오.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 저는 임신 6 개월입니다.나는 잇솔질하는 동안 앞니 뒤쪽에서 잇몸을 출혈했습니다.임신 전도 치아에 플라크 형성의 역사가 있습니다.잇몸 출혈의 치료법은 무엇입니까?"

"Description": "양성 ANA 테스트와 정상적인 ESR 및 CRP로 관절과 근육 통증이 발생합니다.내 문제는 무엇입니까?",

"Doctor": "안녕하세요.몇 가지 쿼리를 더 묻고 싶습니다.수면 패턴이 정상입니까?아침 피로가 있습니까?바이러스 성은 얼마나 오래 지속 되었습니까?머리카락이 떨어지거나 구강 궤양, 건조한 눈 또는 구강 건조?최근의 과민성이나 건망증이 있습니까?그것은 일반적으로 이전 바이러스 성 질환을 가진 만성 피로 증후군 인 것으로 보입니다.그러나이 쿼리를 알려 주시고 더 안내해 드리겠습니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 나는 관절과 근육 통증과 타는 다리로 자주 아프게됩니다.나는 물리적 인 상담을했고, ANA를 테스트했으며 긍정적 인 것이 긍정적 이었지만 ESR과 CRP는 정상이기

때문에 더 이상 테스트 할 필요가 없으며 완벽하게 건강하다고 말했습니다.그러나 내 통증은 결코 가라 앉지 않았고, AC와 관절 통증으로 인해 사무실에 갈 수 없습니다.그것은 빈번한 질병으로 인해 내 일과 삶의 질에 영향을 미치고 정상적인 활동을 할 수 없습니다.류마티스 전문의와상의한 후 그는 ANA 프로파일과 항 DS DNA를 추가로 테스트했습니다.그것은 또한 완벽하게 괜찮아졌습니다.나는 내 관절이 왜 질병없이 너무 고통스럽게 지내고 있습니까?"

"Description": "나는 복통, 위 화상 및 두통으로 인해 열이 나고 있습니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕하세요.CT 스캔 보고서와 혈액 검사 보고서를 공유하여 문제에 대해 알려 주면 좋았을 것입니다.당신이 언급 한 증상은 소화성 궤양 질환, 과민성 대장 증후군, 소장 박테리아과 성장 등 다양한 원인으로 인한 것일 수 있습니다.지금은 통증이 있기 때문에 아침 식사 전에 매일 한 번 캡슐 Esomeprazole 40mg을 복용하는 것이 좋습니다. 소화성 궤양 질환 또는 산도에 이차적 인 것 같습니다.",

"Patient": "안녕 의사, 나는 지난 2 개월 동안 복통으로 고통 받고 있습니다.CT 스캔, 대변 검사 및 혈액 검사와 같은 테스트를 수행했습니다.이제 나는 열이 나고 두통, 위 화상, 심한 통증을 느낍니다."

"Description": "내부 허벅지에 가려운 붉은 발진이 있습니다.의약품을 제안하십시오.",

"Doctor": "안녕.퀴리를 공유해 주셔서 감사합니다.당신은 문제에 매우 고민하는 것 같습니다.사진에서 볼 수 있듯이 Tinea입니다.광범위하기 때문에 감염을 제거하기 위해 오랫동안 구강 항진균제로 적절한 치료를 시작하는 것이 중요합니다.감염을 악화시키고 더 확산시킬 스테로이드 크림을 사용해 왔습니다.따라서 Dipsalic 및 기타 스테로이드 응용 분야 사용을 중단하고 적절한 치료를 시작해야 합니다.LFT와 KFT를 완료해야 하며 피부과 전문의와 후속 조치를 취할 수 있습니다.일반적으로 Itraconazole 또는 Terbinafine은 Luliconazole 또는 Sertaconazole 등과 같은 일부 크림과 함께 경구로 제공됩니다. 가려움증은 항암제로 제어 할 수 있습니다.감염이있는 가족의 치료도 마찬가지로 중요합니다.더 많은 퀴리가 있으면 알려주십시오. 이것이 도움이되기를 바랍니다.",

"Patient": "나는 내부 허벅지에서 심한 피부 붉은 발진 문제로 고통 받고 있습니다.발진은 너무 가렵고 내 인생을 완전히 파괴했습니다.백선이나 농담 가려움증처럼 보이는 것처럼 보입니다.과거에도 나는 같은 일로 고통 받고 있었지만 그 당시 액체가 파울 냄새가 나오는 것처럼 비늘이있었습니다.그리고 나는 의사를 방문했고 내가 사용한 약이 저를 치료했습니다.나는 약 정제를 잊어버렸지만 Itraconazole Dusting Powder와 Fluconazole 로션을 사용했습니다.그 당시 어머니와 나

는 동시에 의사를 방문했습니다.이제 현재 상황은 매우 나쁩니다.너무 짜증나고 가려움증이 많이 듭니다.그러나 지금은 비늘 액체가 나오지 않습니다.이제 내 목과 얼굴에서 똑같은 것을 볼 수 있습니다.제발 피부과 전문의의 관심이 필요합니다.나는이 전염병과 잠금에 큰 고통을 겪고 있으므로 온라인으로 약을 찾고 있습니다.나는 최근에 3 주 동안 매주 한 번 Arzole Capsule을 복용했습니다.더 나은 처리를 나타내지 않는 딥 살릭 연고 및 클로 트리 마졸 크림을 사용했습니다.나는 너무 우울해서 Dermicom OC라는 스테로이드 크림을 사용하여 심각한 나쁜 붉은 발진을 보여 주므로 중단했습니다.나는 뜨겁고 습한 기후에 살고 있으며 과거에는 단단한 옷을 입었습니다.발진 영역은 항상 조금 더 온전합니다."

"Description": "나는 흰 물질로 포피를 뒤로 당기면 가려운 느낌이 듭니다.뭐가 될수 있었는지?",

"Doctor": "안녕하세요.당신은 당뇨병 또는 고혈압입니까?이것을 위해 구강 약을 시험해 본 적이 있습니까?그렇다면 어느 쪽?빈도, 긴급 성, 열악한 개울, 녹아리아, 드리블, 불타는 소변과 같은 요로 불만이 있습니까?최근에 새로운 파트너와 보호되지 않은 성관계의 역사가 있습니까?",

"Patient": "안녕하세요 의사, 나는 포피를 뒤로 물러서 3 개월에서 4 개월 동안이 문제를 겪었습니다.나는 의사에게 갔고 그들은 단지 나에게 pevisone을 주었고 그것은 효과가 없었습니다.음경 머리에는 작은 흰색 물질도 있습니다.나는 그것이 smegma인지 아닌지 모르겠지만 냄새가 나고 그것을 청소할 수없는 것 같습니다.내 포피가 건조 할 수 있습니까?또한 STD를 수행하고 소변 감염에 대한 검사를 받았습니다."

"Description": "빈번한 복통의 원인은 무엇입니까?",

"Doctor": "안녕하세요.나는 당신의 문제에 대해 당신을 도울 것입니다.복통의 여러 가지 이유가 있습니다. 여기에는 대부분의 일반적인 조건이 궤양과 소화 불량으로 모든 조사가 정상일 것입니다.당신은 고통이 와서 사라지는 소화 불량의 문제가있을 수 있습니다.그것으로부터 완화하려면 매일식이 습관을 바꿔야합니다.매운 맛과 지방이 많은식이 요법을 피하십시오.규칙적인 걷기와 운동은 필수입니다.물을 충분히 마셔 라.위의 궤양에 대해 알려줄 상부 GI 내시경 검사를 거치게 될 수 있습니다.내가 여기서 처방하고있는 의약품을 시작하십시오.그들은 당신을 소화하고 궤양을 치유하는 데 도움이 될 것입니다.간에서의 발견에 대한 의견을 보려면 USG 보고서를 보내주십시오.상부 GI 내시경 검사.시럽 gelusil 2 TSP TDS 5 일.태블릿 DROTIN 80 mg BD 3 일.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 지난 3 개월 이래로 복부 통증 문제가 발생하여 사라집니다.나도 내 몸에 아프고 고통을 겪고있어 사라집니다.나는 최근에 모든 의료 검사를 완료했지만 초음파와는

별로로 정상이어서 간에서 강한 가벼운 반점을 반영하여 초점이 석회화되었습니다.걱정할 것이 있습니까?"

"Description": "관 절제술 후 자연적으로 임신 할 수 있습니까?",

"Doctor": "안녕.Tubectecomy의 방법은 시저 섹션 동안 또는 개복성 소소를 통해서만 개방 한 후에 만 식별 할 수 있습니다.튜브 결찰이 완료되면 자연스럽게 임신 할 수 없으며, 이소성 임신 가능성이있다.당신은 다른 아기를 위해 IVF로 갈 수 있습니다.IVF와 자연 임신을 통한 임신 과정은 동일합니다.정상 전달이 배달되는 경우 튜브를 통과 할 필요가 없습니다.제 마이어 섹션으로 가면 이전 수술임을 확인할 수 있습니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 제 나이는 36 세이며 첫 번째 배달과 같은 제왕 절개 후 18 년 전에 튜브 액질 절제술을 받았습니다.난관 튜브가 묶여, 자르거나, 고정되는지 또는 밴드가 있는지 모르겠습니다.1. 나에게 수행 된 튜브 절제술 과정을 식별하는 스캔이나 다른 방법이 있습니까?2. 위에서 언급 한 방법에 의해 관 절제술 후 자연적으로 임신 할 가능성이 있습니까?3. 이제 아이를 갖기 위해 우리는 IVF를 위해 갈 수 있습니다. 그렇다면, 산부인과 전문의가 임신에 대한 IVF 과정을 받았다는 것을 알게 될까요?그녀는 다시 튜브 절제술을해야하기 때문에 배달 시간 에이 튜브를 겪을 것입니다."

"Description": "수술 후 치유 된 균열에서 발달 된 피부 태그가 가능합니까?",

"Doctor": "안녕하세요.귀하의 질문에 대해 확실히 도와 드리겠습니다.피부 태그는 긴 서있는 항문 균열로 형성됩니다.이것들은 균열로 인해 축적 된 피부 일뿐입니다.일반적으로 그렇게 할 일이 없지만 마음에 들지 않으면 수술을 선택할 수 있습니다.아주 작은 수술입니다.경험이 풍부한 손으로 제거한 후 부작용이나 문제가 없습니다.자체적으로 치유 될 생물이 형성 될 것입니다.항문 균열의 다른 형성이 있으면 다시 나타날 수 있습니다.따라서 다시 일으킬 조건을 피하십시오.따라서 원하지 않으면 수술을 걱정하지 마십시오.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 치유 된 균열에서 개발 된 두 개의 작은 항문 피부 태그가 있습니다.육체적으로 그들은 나를 많이 괴롭히지 않지만 정신적으로 나는 그들을 갖는 것을 좋아하지 않습니다.나는 의사와 상담했다. 그는 완전히 제거하면 괄약근 근육에 영향을 미치기 때문에 피부 태그의 90 % 만 제거 할 수 있다고 말했다.그는 또한 나이가 들어감에 따라 피부가 느슨해지면서 미래에 피부 태그가 다시 자랄 수 있다고 말했다.수술의 부작용이 있습니까? 아니면 수술을 계속 해야합니까?수술 후 피부 태그가 다시 나타 납니까?"



"Description": "내 빌리루빈 수치는 1입니다. 7 황달 증상이없는 7입니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕하세요.글쎄, 빌리루빈을 낮추는 특정 약물이 있지만 빌리루빈은 1.7이므로 정상 한계 내에 있습니다.치료가 필요하지 않습니다.무증상 소형 소기 빌리루빈의 가능한 원인은 완전히 무해한 길버트 증후군입니다.문제를 진단해야한다고 가정하면 간 기능 검사에 대한 전체 보고서를 공유하십시오.완전한 간 기능 검사로 후속 조치.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 빌리루빈 수치는 1.7이지만 황달 증상은 없습니다.빌리루빈 수준을 정상으로 가져올 수 있는 방법은 무엇입니까?"

"Description": "내 시대가 지연되었습니다.몇 달 전에 보호되지 않은 성관계 때문일 수 있습니까?",

"Doctor": "안녕하세요, icliniq.com에 오신 것을 환영합니다.당신도 체중을 늘 렸습니까?",

"Patient": "안녕하세요 의사, 저는 20 살입니다.나는 6 개월 전에 보호되지 않은 성관계를 가졌고 2 개월 동안 정기적 인 기간을 보냈고 다음 4 개월 동안 나는 4 일 기간을 얻었고 지금은 7 개월에 39 일 후에도 기간을 얻지 못합니다.이것에 대해 말씀해 주시겠습니까?"

"Description": "완전한 처리 후 HPV 바이러스의 존재를 일으키는 원인은 무엇입니까?",

"Doctor": "안녕.나는 당신의 불안을 이해합니다.재산은 작년에 HPV가 참석하더라도 치료가 자궁 적출술 형태로 수행되었다는 것입니다.실제로 그것은 과도하게 치료되었습니다.나는 그것이 걱정의 문제라고 생각하지 않습니다.질 HPV의 경우 낮은 위험 유형이 암에 대한 책임이 거의 없습니다.또한 성적으로 활동적이라면 HPV 감염은 계속오고 신체는 자체 면역으로이를 다룹니다.우리과 관련된 것은 질 도말의 지속적인 HPV 감염입니다.따라서 지금은 콘돔과 같은 장벽 피임법을 사용하고 6 개월에 질 도말을 반복하십시오.그게 다야.후속 조치는 매우 낮은 위험 사례이므로 필요한 것입니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 저는 HPV 16 AsitiveThree 몇 년 전이었습니다.1 년 후 후속 PAP는 HPV 16에 다시 긍정적 인 것을 보여 주었다.작년 PAP는 정상 이었지만 Gyno Doctor Notes는"PAP Normal이지만 HPV는 여전히 존재합니다"라고 말했습니다.나는 오늘 작년에 바이러스를 청소했다

고 들었지만 왜 HPV를 작성하면 여전히 HPV를 작성했을까요?자궁 경부와 자궁을 제거한 자궁 절제술은 작년에 이루어졌습니다.자궁 경부와 자궁의 병리학은 훌륭하고 정상이었습니다.마지막 PAP는 2 주 전이었습니다.그것은 질 컵과 HPV 양성에서 비정상적인 세포를 보여 주었지만 16 또는 18이 아닙니다. 간호사는 저 위험 유형이라고 말했습니다."

"Description": "이어 버드를 삽입하면 귀에 눈물이 생기고 울리는 소리가 들렸습니다.어떻게해야 하나요?",

"Doctor": "안녕!청소하는 동안 실수로 귀를 다치게했을 가능성이 높습니다.이것은 매우 흔한 일이며 너무 걱정하지 않습니다.이어 드럼의 결함은 중간 및 내부로 최적의 사운드 전송을 방해하여 연속 울리는 감각, 머플린 소리, 자신의 목소리에 반향 또는 큰 소리의 소리, 고주파 소리에 대한 편협함, 청각 감소와 같은 증상이 있습니다.등. 보통 4 ~ 6 주가 넘는 외상성 천공이 치유되면 완전히 괜찮을 것입니다.그러나 치유 과정을 방해 할 수 있기 때문에 감염되지 않아야하며 적절한 위생이 유지되지 않으면 천공이 닫히지 않을 수 있습니다.당신에 대한 나의 조언은 copius 퇴원량과 관련된 감염이 없다면 여기에 필요한 약물이 없을 것입니다.나는 당신의 질문에 자세히 답변했으면 좋겠다.문의하고 싶은 것이 있으면 알려 주시면 최대한 빨리 당신에게 되돌릴 것입니다.조심하고 멋진 하루 되세요!따뜻한 안부!",

"Patient": "왼쪽 귀에는 귀에 귀에 들어가는 귀에 들어가기 때문에 막에 얇은 구멍이 있습니다.귀에 울리는 소리가 들립니다.내 귀의 소리를 멈출까요"

"Description": "나는 심한 가려움증이있는 뒷면에 원형 검은 색 패치가 있습니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕.정확한 진단 및 치료 계획을 위해 병변 그림을 첨부 할 수 있습니까?사진을 첨부 하십시오.",

"Patient": "안녕하세요 닥터, 나는 거의 원형이며 끊임없이 가려워하는 검은 패치가 있습니다.지난 3-4 개월 동안 상당히 커졌습니다.그것이 무엇인지, 내가 무엇을 할 수 있는지 제안 해 주시겠습니까?뜨거운 물을 넣을 때 기분이 좋습니다.그리고 그것은 매우 건조 해집니다.가장자리에 작은 선이 있습니다.가려움증은 지속적으로 일어나고 있습니다.보습제를 적용하면 조금 가라 앉습니다.그러나 검은 패치는 어두워지는 것 같습니다."

"Description": "꿀벌에 자주 쫓린 경우 anaphylaxis를 얻을 수 있습니까?",

"Doctor": "안녕하세요.예, 맞습니다.당신이 꿀벌 쫓기기에 알레르기가있는 것 같습니다.알레르기 반응이 발달하기 위해서는 신체가 면역 반응을 만들려면 초기 노출이 발생해야 합니다.이것은 몇 달 전에 당신이 전에 쫓렸을 때 일어났을 것입니다.이미 노출되고 면역 반응이 확립되었으므로 후속 노출은 알레르기 반응을 초래할 수 있습니다.아나필락시스를 초래하는 심각한 알레르기 반응이 발생할 수 있지만 대부분의 시간 알레르기 반응은 경미하며 생명을 위협하지 않습니다.두드러기 및 가려움증 및 홍조 또는 창백한 피부, 저혈압, 저혈압,기도의 수축 및 부풀어 오른 혀 또는 목, 호흡 곤란, 약하고 빠른 맥박, 구토 또는 설사 및 현기증과 같은 과도한 피부 반응,기도 또는 혀 또는 목이 부어 오르거나 어리석은 증상 즉시 상담.나는 당신의 우려에 답할 수 있기를 바랍니다.내가 당신을 도울 수 있는 다른 것이 있습니까?",

"Patient": "안녕하세요 의사, 몇 달 전에 나는 벌에 꿀벌에 갇혔습니다.내가 꿀벌에 쫓린 것은 처음이 아니지만 이번에는 30 분 후에, 나는 눈 아래에 부어 오르고 뺨에 붓기가 있었고 시간이 지남에 따라 점점 커지고있었습니다.나는 응급실에 갔고 그들은 나에게 코르티코 스테로이드 IV를 주었다.자, 나는 이것이 내가 꿀벌 쫓기기에 알레르기가 있다는 것을 의미하는지 궁금해하고 앞으로 꿀벌에 갇히면 아나필라 틱 공격이 발달 할 수 있다는 것을 의미합니까?"

"Description": "눈의 발적 원인은 무엇입니까?",

"Doctor": "안녕하세요.추가 진단을 위해 눈의 이미지를 친절하게 부착하십시오.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 나는 눈을 3 일 동안 눈에 붉게 움직인 후 이미 3 일 동안 눈에 발적을 내딴었습니다.눈은 움직일 수 있습니다.그것이 무엇인지 말해주세요."

"Description": "어둡고 파울 냄새가 나는 소변은 무엇입니까?",

"Doctor": "안녕하세요.파울 냄새와 어두운 소변은 고도로 농축 소변이있는 방광염을 나타냅니다.혈액이나 혈뇨가 없다면 신장 병리학은 거의 없거나 미적분합니다.매일 3 ~ 4 리터의 물을 섭취해야 하며 파울 냄새는 종종 질이 아니며 소변이 아닙니다.박테리아 질염으로 고통 받으면 파울 냄새가 납니다.생식기 지역에서 비누를 사용하지 마십시오. 목욕하는 동안 질 알칼리성 세척을 사용하십시오.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 나는 사람과 신장 기능 테스트에 알려진 모든 STD 스크린을 가지고 있었고, 내 소변은 파울 냄새와 어두워졌습니다.이것은 1 년 동안 지속적인 문제였으며 내 인생에

영향을 미치기 시작했습니다.나는 모든 것을 시도했다.항생제, 수화, 주두증, 사과 사이다 식초, 아조 알약, 효모 감염 약물, UTI 약물."

"Description": "나는 무언가가 가슴에 갇힌 것처럼 느껴지고 산도가 있습니다.무엇을해야합니까?",

"Doctor": "안녕하세요.나는 당신을 Icliniq에 환영합니다.당신은 위식도 역류 Gerd를 가지고있는 것 같습니다.당신의 산 증상은 GERD의 존재에 의해 정의 될 수 있습니다.나는 이것이 당신이 더 이상 걱정하는지 논의하기 위해 돌아와서 지금 좋은 날에 GERD를 가지고 있는지에 대한 논의에 도움이되기를 바랍니다. 지금 운동성 장애가있는 erd gerd는 1 주일에 위의 후속 조치를 위해 당신이 치료에 어떻게 반응하는지 알려줍니다.",

"Patient": "지난 한 달 동안 나는 가슴이나 위에 어떤 것이 갇히고 목구멍에 산성 느낌이 더 끊임없이 공기가 내 입을 통과하지만 전혀 휴식을 취하지 않는다고 생각하면서 나는 신체적 문제를 겪고 있습니다.기간 동안 왼쪽에 흉통이 심했습니다.의자가 제대로 오지 않아서 내 소화 과정도 방해가됩니다."

"Description": "나는 허벅지에 가려운 발진이 있습니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕.허벅지의 발진과 가려움증은 아마도 피부의 곰팡이 감염 때문일 수 있습니다.이것은 특히 열대 국가에서 매우 일반적이며 뜨거운 습한 여름에는 더욱 일반적입니다.영향을받는 지역의 이미지, 발진의 총 지속 시간, 영향을받는 다른 영역, 손톱의 변색 등과 같은 추가 정보를 정확하게 진단하려면 필요합니다.그것이 실제로 곰팡이 감염이라면 다음을 명심 할 수 있습니다.곰팡이 감염의 치료에는 케토 코나 졸, 세르 타코나졸, 롤 리코나졸 등이 포함 된 응용이 포함됩니다. 테르 비나 핀 및 이트라코나졸과 같은 경구 항진균제는 종종 더 나은 간극과 재발을 줄이기 위해 사용됩니다.국소 위생은 매우 중요합니다.매일 목욕을하고, 목욕 후 피부를 건조시키고, 비누와 수건을 별도로 유지하고 햇빛에 옷을 건조시키고 착용하기 전에 다림질하면 곰팡이 포자를 죽이는 데 도움이됩니다.따라서 피부과 전문의의 평가를 추천하여 치료를 결정하는 것이 좋습니다.이게 도움이 되길 바랍니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 내 허벅지에 발진이 있습니다.그들은 가렵고 어두운 색의 감염된 부위를 가지고 있습니다.고름은없고 가려움증 만 있습니다."

"Description": "나는 질에 효모 감염이 있습니다.국소 혼자만으로도 충분합니까?",

"Doctor": "안녕.나는 당신의 역사를 겪고 당신의 관심을 이해했습니다.곰팡이 및 박테리아 감염으로 인한 질염으로 인한 것일 수 있습니다.질 정제와 크림의 국소 적용을 가져 가야합니다.평범한 솔직한 크림을 사용하고 항진균제와 항생제를 동일한 일을 할 수 있습니다.이 지역을 건조하고 깨끗하게 유지하고 따뜻한 물을 많이 마시고 야채와 과일을 많이 섭취하십시오.기름진 음식을 피하십시오.동일한 프로바이오틱스를 섭취하십시오.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 저는 현재 플루코나졸 150mg을 사용하고 있으며 두 번째 복용량을 앓고 있습니다.나는 어제 효모 감염을 위해 그것을 가져 갔다.나는 하루에 두 번 영향을받는 지역에 적용하기 위해 clotrimazole betamethasone 국소 크림을 받았다.그러나 신청 후 한 시간 안에 아프게하는 것 같습니다.나는 약 1 주일 반 전에 외음부 지역에서 짜증을 낸 후 미리 채워진 크림 어플리케이터와 함께 모니 스테 타 3을 시작했지만 며칠 후에는 반전되는 것처럼 보였다.그런 다음, 나는 diflucan을 받았고 배출이 덜 내부에있는 것처럼 보였지만, 외부는 빨간색과 짜증이 나고 여전히 가려운 것처럼 보입니다.내 질문은 질 효모 감염을 치료하기 위해서는 디 플루 칸과 함께 항진균 크림을 외부로 바르아야합니까?아니면 Diflucan만이 외부 및 내부 감염을 처리 할 것인가?"

"Description": "나는 새로운 화장품을 사용한 후 피부에 발적, 화상 및 가려움증이 있습니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕.시도한 새로운 피부 범위는 피부에 적합하지 않은 것 같습니다.사용중인 모든 제품 과이 준비의 성분을 아는 것이 중요합니다.그것이 희석되어 사용 된 농축 물이라면, 발적과 연소는 자극적 인 피부염 때문일 것입니다.이것은 누구에게나 일어날 수 있으며 피부의 자극은 매우 높은 농도의 성분 때문입니다.이러한 종류의 반응은 제조업체가 조언 한대로 준비를 희석하고 제품을 사용하는 경우에는 발생하지 않습니다.때로는 일부 구성 요소에 대한 알레르기로 인한 것일 수도 있으며 제품을 재사용 할 때마다 반복됩니다.피부가 정상으로 돌아 오면 귀 뒤에있는 피부 나 내부 팔뚝 피부에 소량의 희석 된 제품을 적용하여 제품을 테스트 할 수 있습니다.24 시간 동안 해당 지역을 관찰하십시오.가려움증, 자극 또는 발적이 발생하면 일부 성분에 대한 알레르기가 나타날 수 있습니다.그런 다음 추가 패치 테스트에 정확한 알레르겐을 알 수 있습니다.이 경우 제품을 피하는 것이 좋습니다.이게 도움이 되길 바랍니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 저는 Gopure와 American Company라는 새로운 스킨 케어 범위를 시도했습니다.30 분 후, 나는 발적, 타는, 가려움증 및 붓기를 개발했습니다.나는 사용을 중단하고 얼음과 냉수를 사용하여 증상을 완화했습니다.4 일 후, 내 피부는 덜 고통 스럽습니다.이 회사는 두 제품에 물을 뿌릴 것을 제안합니다.나는 그렇게하기를 꺼려합니다.무엇을 조언 하시겠습니까?"

'

"Description": "아버지는 크레아티닌 수치가 높은 당뇨병 환자입니다.그를 위해 다이어트 계획을 추천하십시오.",

"Doctor": "안녕.아버지의 현재 체중과 높이, 현재 나이, 혈당 수치 및 기타 실험실 보고서를 알려 주십시오.또한, 당신이 채식주의자인지 비 채식주의자인지, 그의 일일 식사 패턴이 타이밍이 있는지 알려주십시오.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 아버지는 최근에 높은 크레아티닌 수준과 함께 당뇨병 진단을 받았습니다.상태에 따라 일주일 동안 치료 다이어트 계획이 필요합니다."

'

"Description": "나는 내 파트너와 성관계 중에 당을 때 발기 할 수 없습니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕하세요.이화성은 남자가 정액을 배출 할 수없는 상태입니다.어떤 상황에서는 배출 할 수 없을 때 특정 상황에서는 배출 할 수 없지만 다른 조건에서는 배출 할 수있는 상황이 절대 적 일 수 있습니다.그가 자위로 사정 할 수는 있지만 성관계가 아니라면 심리적 문제입니다.그가 자위 행위 나 꿈에서도 사정 할 수 없다면 일부 테스트를 수행 해야하는 물리적 문제입니다.심리적 문제는 다른 사람이있을 때 사람이 사정 할 수없는 경우 억제로 인한 것입니다.점진적인 탈감 작으로 극복 할 수 있습니다.그는 엉덩이, 허벅지, 가슴, 배 등과 같은 여성의 어떤 신체 부위에도 그의 성기를 문지르고 사정을 시도 할 수 있습니다.여성은 또한 그를 자위 할 수 있습니다.그것은 오랫동안 그려진 과정이며 종종 실망 스럽지만 유용합니다.그는 또한 자기 자위를 할 수 있으며 사정 직전에 음경의 머리를 질에 넣습니다.또한 진동기를 사용할 수 있습니다.그러나 포르노 그라 피의 도움이 필요한 경우 이러한 모든 전회를 모두 수행하기 전에 완료해야 합니다.또한 IT와 관련 된 불안을 줄이고 사정을 촉진하는 약이 있습니다.신체적 문제의 경우 혈액 검사 및 초음파 검사를 수행 한 후 치료가 결정됩니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사님, 저는 지난 3 년간 발기 문제를 겪고 있습니다.나는 지난 1 년간 결혼했지만 아내와 만족과 자연스러운 섹스를 한 적이 없습니다.내 문제는 기름으로 많은 자위 행위를하는 데 많은 자위 행위를했기 때문에 잠시 동안 세워졌습니다.아내가 손잡이와 섹스를하면 내 성기가 세워 지거나 퇴원하지 않을 것입니다.나는 아내의 질에서 배출하려고 많은 노력을 기울이고 있지만 최종 운동에서는 느슨해지기 때문에 그렇게 할 수 없었습니다.음경을 세우려면 기름진 윤활제가 필요하기 때문에 마른 손으로 자위 할 수없는 한 가지 더 마른 손으로 자위 할 수 없습니다.결혼 후에도 자위를하고 있습니다.무거운 자위로 인해 내 성기가 줄어들고 때로는 물건을 잊어 버렸습니다.나는 아무것도 기억할 수 없다."

"Description": "음경 샤프트에 건조한 피부에 코코넛 오일을 바르면 요도의 발적과 연소가 발생합니다.발라염인가요?",

"Doctor": "안녕하세요.일반적으로 요도의 끝은 음경 머리에 비해 점막이 얇기 때문에 나머지 음경 머리에 비해 약간 더 붉은 색입니다.이전에 그것을 알아 차리지 않았거나주의를 기울이지 않았으며 이제 석유 적용으로 인해 더 많이 알게되었습니다.이제 오일이 들어간 후 더 빨간색이되었다고 확신한다면 다른 증상이 없으면 치료가 필요하지 않습니다.그러나 그것은 그 자체로 정착할 것이지만, 우리는 소변 감염 가능성을 배제하기 위해 소변 검사를 받고 싶습니다.그래서 나는 그것이 걱정스러운 문제가 아니며 기름이나 바셀린을 음경 샤프트에주의 깊게 바르고 계속 적용할 수 있습니다.다음 행동은 소변 검사와 감염을 발견하면 감염을 치료해야 합니다.또한, 당신은 며칠 동안 많은 양의 물이 있어야 합니다.가능하면 기계적 외상을 피하기 위해 며칠 동안 자위를 피하십시오.이게 도움이 되길 바란다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 나는 몇 년 동안 건조한 자위를했고 음경 샤프트에 건조하고 가려운 피부를 만들었습니다.나는 코코넛 오일이 아픈 피부에 진정 특성을 가진 곳을 읽었습니다.그래서 3 일 동안 4 ~ 5 번 시도했습니다.그것의 일부는 내 요도에 들어갔다.나는 5 일 전에 약간의 작은 발적을 발견했다. 그래서 나는 멈췄다.소변을 보면 불타고 있지 않습니다.퇴원이 없습니다.몇 달 안에 내가 가진 유일한 성관계는 구두였으며 그 사람은 3 월에 의사의 검사 당 std 무료입니다.나는 성병이 없었습니다.그러나 약간 불편합니다.나는 지금부터 일주일 동안 의사의 약속이 예정되어 있지만 내 치료 옵션이 무엇인지 궁금했습니다."

"Description": "내 약혼자는 긍정적입니다.어떻게 나 자신을 보호 할 수 있습니까?",

"Doctor": "안녕.나는 당신이 covid 감염에 대해 걱정하고 있다는 것을 알고 있습니다.Covid 검사 결과에 긍정적 인 것을 보여 주면 사람이 감염을 앓고 있음을 확실히 이해해야 하지만 결과에 부정적인 것으로 나타나서 그 사람에게 감염이 없다는 것을 증명하지 못한다는 것을 이해해야 합니다.그 사람은 여전히 코비드의 무증상 캐리어 일 수 있습니다.따라서 현재 인구가 많은 시나리오에 영향을 미치고 Covid 긍정적 인 환자와 가까이 다가 가면 증상이 발생하거나 증상이 발생하지 않으면 7 일 후에 검사를 반복하는 것이 좋습니다.그리고 남자 친구가 긍정적 인 테스트를 했으므로 Covid Close Contact의 기준을 만족시킵니다.집에서 2 주 동안 자신을 격리해야 합니다.또한 보건 담당자에게 이에 대해 알릴 필요가 있습니다.Covid Close Contact",

"Patient": "안녕하세요 의사님, 질문이 있습니다.화요일에 나는 아빠가 그의 직장에서 너무 많은

감염이 있었을 것이라고 생각했기 때문에 Covid에 대한 약혼자와 함께 시험을 보러 갔다.우리는 증상이 없었지만 안전하기 위해 우리는 갔다.그 후 나는 만일을 대비하여 그를 보지 못했습니다. 오늘 나는 내 결과를 얻었고 나는 부정적 이었지만 그는 긍정적이었다.그것은 바이러스가 여전히 나에게 도달 할 수 있다는 것을 의미합니까?나는 내일 일하러 돌아 가기로되어 있었고 증상이 없었습니다.다시 테스트해야합니까?그날부터 말했듯이 나는 그를 보지 못했습니다."

"Description": "내 코는 구부러지고 하나의 콧 구멍이 다른 콧 구멍보다 이상해 보입니다.수정하는 방법?",

"Doctor": "안녕.코의 일반적인 외관은 코를 변형시키기위한 외부 부상 공급원이 없을 때까지 처음부터 18 세까지의 변화가 발생합니다.코가 너무 이상하게 보이고 너무 귀찮게한다고 생각되면, 우리가 코 성형술이라고 부르는 교정 수술이 필요할 수 있습니다.이제 우려되는 영역을 줄이거나 증강 해야하는지 여부에 따라, 어떤 유형의 코 작업을 수행하고 싶은지에 따라 다르며 외과 의사는 그에 따라 작동합니다.코 성형술은 그들이 실제로 염두에두고 어떤 변화를 알고 있는지 알고 있는 환자들에게 보존되어 수술을 통해 거의 가까운 그림을 얻을 수 있다는 것을 이해합니다.요즘 대부분의 코 구직자에게는 비강 외관의 이상이 무엇인지, 원하는 변화 및 수술을 어떻게 볼 것인지 평가할 수있는 소프트웨어가 있습니다.위에서 언급 한 모든 이상은 수술 적 코 성형술을 통해 효과적으로 해결 될 수 있으며 보수적 인 기술은 실제로 장기적인 결과를 가져 오지 않습니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 정말 마음에 들지 않는 큰 코가 있습니다.그러나 나는 하나의 콧 구멍이 다른 콧 구멍보다 크고 코는 상단에서 구부러져 보입니다.15 세 이후 이렇게되었습니다.이게 원인이 될 수있는 이유는 무엇입니까?나는 코에 큰 낭종이나 반점이있는 것 외에 다른 외상을 기억할 수 없습니다."

"Description": "나는 귀와 사원 뒤에 벗겨지고 붉고 가려운 피부로 건선이 있습니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕.정보를 제공해 주셔서 감사합니다.1 분 동안 친절하게 잡고, 나는 당신의 쿼리에 대한 자세한 답변과 설명을 입력하고 있습니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 건선으로 고통 받고있을 수 있습니다.나는 벗겨지고 붉고 가려운 헤어 라인, 귀 뒤, 거의 사원에 있습니다.어떻게 처리 할 수 있습니까?처음에, 나는 그것이 비듬이라고 생각했지만, 헤어 라인을 향해 벗겨지는 피부가 벗겨지기 시작하면서 귀와 사원의 뒤쪽을 향해 점차적으로 나타납니다.나는 그것이 더 많은 것을 깨달았 기 때문에 그것을 검색했고 나는 그



것이 많은 지식이 없다는 건선이지만이 문제를 다루기 위해 전문적인 도움을 받고 싶습니다."

"Description": "나는 귀 운하 주위에 맑은 방전으로 단단한 피 각질의 물건을 가지고 있습니다. 뭐가 될 수 있었는지?",

"Doctor": "안녕. 아마도 당신은 아 임계 중이염 externa를 가지고 있을 것입니다. 이 상태에서는 귀 운하에 매우 미묘한 감염이 있어 가려움증이 강하게 됩니다. 이어 버드를 사용하면 생 부위가 노출되어 자극을 더욱 차단합니다. 영향을 받은 왁스는 또한 귀의 자극의 원천이 될 수 있습니다. 이것은 종종 충만과 고통과 관련이 있습니다. 아래에 언급 된 조언을 따를 수 있습니다. 1. 이어 버드 사용을 중단하십시오. 2. 정제 levocetirizine 10 mg 다음 10 일 동안 밤에 한 정제. 3. 다음 5 일 동안 왁스 용해 귀에 하루에 3 방울 3 방울. 4. 귀를 건조하게 유지하고 목욕하는 동안 샤워 모자를 착용하십시오. 5. 딱지는 마르고 자체적으로 떨어지므로 계속 만지지 않아도 됩니다. 6. 현재 문제와 관련이 없으므로 AMOX 항생제를 계속할 수 있습니다. 더 알고 싶은 것이 있다면 알려주세요.",

"Patient": "안녕하세요 의사님, 나는 내 귀 운하 주변 에이 단단한 피 각질의 물건을 가지고 있습니다. 가려움증이 생기면 긁으면 나오지 만 때로는 맑은 유체가 귀에서 배출됩니다. 귀에 물이 들어 가면 용해됩니다. 나는 현재 치아 감염을 위해 아목시실린에 있습니다."

"Description": "부비동염을 위해 Co altria를 복용 한 후, 나는 입 건조와 두통을 경험합니다. 왜?",

"Doctor": "안녕하세요. 입의 건조는 가벼운 항콜린 성 효과에 기인 할 수 있습니다. 그것은 때때로 졸음을 유발할 수 있으며 사람에게 사람에게 의존합니다. 조정하는 데 며칠이 걸립니다. 이 약을 매일 두 번 증기 흡입과 함께 계속할 수 있습니다.",

"Patient": "안녕 의사, 나는 부비동염에 문제가 있습니다. 내 의사는 취침 시간에 Co altria 10 mg을 복용하라고 명령했습니다. 나는 오후 9시에 그것을 가져 갔고 현재는 입의 건조와 두통을 경험하고 있습니다. 무엇을 해야 합니까? 이게 진지해? 나는 또한 Cefixime 200 mg을 매일 두 번, Sinupret Maily 및 Nasoflo 스프레이를 복용하고 있습니다."

"Description": "나는 성인기에 간헐적 인 외생 동물을 개발했습니다. 문제가 있습니까?",

"Doctor": "안녕하세요, icliniq.com에 오신 것을 환영합니다. 당신이 설명했듯이, 당신은 나중에 간

혈적 인 외국어를 시작했습니다.의료 용어에서 STRABISTUS라고 불리는 것은 일반적으로 출생에 따라 치료할 수 있습니다.그러나 귀하의 경우 상황은 다릅니다.따라서 외국어로 이어지는 신경 학적 문제가있을 수 있습니다.그래서 저의 조언은 당신이 외국어의 원인을 배제하기 위해 살 살구 망자뿐만 아니라 신경과 전문의에게 문의해야한다는 것입니다.먼저 스트라피즘 학자와 신경과 전문의와 상담해야합니다.그래서 우리는 그 이유를 벌금을 내고 치료를 계획 할 수 있다는 것에 따라.특발성 일 수 있습니다.신경 학적 일 수 있습니다.완전한 안과 평가.두개골 신경 마비.결눈질.위에서 설명한대로.1 주 후.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 나는 성인기에 간혈적 인 외생 동물을 개발했습니다.저는 29 살이고 이것은 약 2 년 동안 시작되었습니다.내가 그것에 대해 걱정해야합니까?"

"Description": "나는 음낭에 가려움증이 있고 딱딱한 여드름이있는 허벅지가 있습니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕.당신의 역사에 따르면, 당신은 음이나 곰팡이 감염이있는 두 가지 가능성이 있으며, 두 가지 치료는 다릅니다.치료를 결정하기 전에 영향을받는 지역의 사진을 보내라고 조언합니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사, 나는 내 음낭과 음경과 허벅지 측면을 따라 강렬한 가려움증을 느끼고 있으며, 내 음낭에는 약간의 여드름이 있습니다.도와주세요."

"Description": "나는 머리에 따끔 거림으로 신경에 마비와 압력이 있습니다.왜?",

"Doctor": "안녕.나는 당신의 문제를 이해하지만 제한된 정보로 결론에 도달하기가 어렵습니다.자세히 알려주세요.정확히 당신이 마비가있는 곳을 말해줘, 머리가 오른쪽, 왼쪽, 앞, 머리 등의 위치를 의미합니까?어떤 신경 경로가 압력을 느끼십니까?머리 전체 또는 측면에 있습니까?마찬가지로 따끔 거림은 정확히 어디에 있습니까?메스꺼움이나 구토 감각이 있습니까?빛이나 소리로 시력이 나 자극이 흐려지고 있습니까?과거에도 같은 약을 복용 했습니까?그렇다면 결과는 무엇입니까?당신의 수면은 어떻습니까?당신의 직업은 무엇입니까?",

"Patient": "안녕하세요 의사, 나는 마비, 신경 길을 따라 압력을 가졌으며, 더 집중하는 동안 머리에 따끔 거림이 있습니다.그것은 8 년 동안 거기에 있었고 지금까지 두 개의 MRI를 해왔고 그것은 부정적인 것으로 돌아 왔습니다."

"Description": "나는 요로 빈도와 불편 함을 가진 회음부에서 불타는 느낌을 느낍니다.도와주세요.",

"Doctor": "안녕하세요.전립선염 일 수 있습니다.증상이 시작되기 전에 새로운 파트너와 보호되지 않은 성관계의 역사가 있습니까?초음파 복부는 전에 완료 되었습니까?보고서를 친절하게 첨부하십시오.소변 문화에 대한 보고서가 있습니까?당신은 당신이 세 번 치료를 받았다고 언급했는데, 어떤 항생제가 당신에게 주어 졌습니까?사정 후에도 불타는 느낌이 있습니까?당신은 당뇨병 또는 고혈압입니까?",

"Patient": "안녕하세요 의사, 몇 달마다 오랫동안 다음과 같은 증상이있었습니다.배뇨 후 빈번한 배뇨, 회음도에서의 연소 및 배뇨 후 불편 함.나는 작년에 일반 요도염을 세 번 치료 받았다.테스트를받은 STD가 없습니다.이러한 증상은 명백한 원인이 없습니다.이것은 무엇이며 어떻게해야합니까?"

,

"Description": "나는 내 주변 지역에 고통스러운 부종이 있습니다.농양 일 수 있습니까?",

"Doctor": "안녕하세요.글쎄, 나는 당신의 사건의 세부 사항을 알지 못합니다. 마치 바르톨린의 낭종이라고하는 것처럼 들립니다.이것은 여성의 주변 지역에서 선 구조의 염증을 나타냅니다.일반적으로 양성이지만 매우 고통스럽고 불편할 수 있습니다.하루에 여러 번 따뜻한 물로 따뜻한 욕조에 앉아 약 15 분 동안 따뜻한 천과 같은 부위에 따뜻한 압축을 바르고 염증을 줄일 수 있습니다.그것이 효과가 없다면 항생제 사용을 포함하여 염증을 무너 뜨리는 다른 방법이있는 지역 의사를 볼 수 있습니다.",

"Patient": "안녕하세요 의사님, 오페리아 지역에 고통스러운 덩어리가 있습니다.나는 금요일에 면도했고 처음에는 그것이 단지 내장 머리라고 생각했지만 더 이상 확실하지 않습니다.지난 이틀 동안, 나는 몇 시간 동안 앉아 일을 해왔으며 매우 고통스럽고 부어 왔습니다.나는 그것이 농양인지 모른다.도와주세요."