

질문,답변

과탄산소다 섭취 후 복통이 심합니다. 설사약포타겔 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복통이 있으시면 포겔을 드셔도 됩니다. 증상이 조절되지 않거나 심해지면 진료를 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다

스트레스와 혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공복혈당이 126이 넘으면 당뇨로 진단할 수 있습니다. 당장 진료가 필요한것은 아니지만 주기적으로 당화혈색소 측정이 필요하고 체중을 싹프로 정도 감량 하셔야 합니다

손가락 저림이 생겼어요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전기자극으로 인해 저린증상이 일시적으로 나타난 것 같네요. 만약 저린증상이 회복되지 않고 지속된다면 신경과 진료를 받아보세요. 근이완제는 근육이 강직되거나 경련으로 인한 통증을 완화시키는 약물입니다. 저린증상 같은 신경계 통증과는 무관합니다.

소금 많이 먹기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의학적으로 권장되는 상황은 아닙니다. 지금 상태를 정확하게 파악하고 적절한 처방을 받아보시는 것이 필요하다고 생각됩니다

Hiv 항체 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부건선이 자가면역질환에 의한 것이 있을수 있지만.. 피부에만 영향을 주고.. 감염에 의한 항체생성을 억제시키지는 않습니다. 면역억제제는 항체반응을 감소시켜.. 항체가 안생기게 할수는 없겠지만 항체반응을 늦출수는 있겠네요. 항체가 늦게 검출된다면.. 건선보다는 면역억제제의 가능성이 더 높아보입니다.

오른쪽 아랫배에 통증이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 점점 심해지면 빠른 시간 안에 병원에서 진료를 받아보시는 것을 권합니다. 변비가 있다고 하면 출혈이 치핵이나 치열 때문일 수 있습니다.

착상혈 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. Yuzpe 방법은 전문 응급피임약에 비해 부작용 위험이 높고 효과도 다소 낮지만 응급상황에서 경구피임약만 있는 경우 임시방편으로 사용할 수 있습니다. Yuzpe 피임법의 성공률과 실패율은 다음과 같습니다 성공률 대략 5787의 성공률을 보입니다. 즉 Yuzpe 방법을 사용했을 때 5787명 중 1343명이 임신하지 않는 것으로 나타났습니다. 실패율임신률 1343의 실패율이 보고되고 있습니다. 즉 Yuzpe 방법을 사용한 100명 중 약 1343명이 임신할 수 있다는 의미입니다. 착상혈은 양이 작아서 알아차리기 어려운 경우가 많습니다. 부정출혈의 가능성이 높습니다. 임신가능성에 대하여서는 임태기 검사가 더 필요할 수 있습니다

얼굴 상처 흉터,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흉터라면 없어지지는 않을 것으로 생각됩니다. 열어질 수는 있지만 없어지지는 않아요. 색소 침착이라면 시간이 지나면서 점점 열어질 겁니다

몸이 차갑고 혈액순환이 안되는것같으며 산소포화도가 낮고 최근엔 발에서 땀이 잘 남,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체중이 키에 비하여 너무 조금 밖에 안나가네요. 식사는 규칙적으로 잘 하나요? 스트레스가 많거나 운동이 부족하면 수족냉증이 생길 수 있으니 운동을 열심히 하시면서 체중이랑 근육량을 좀 늘려보셔요

10개월 아기 분유수유량 질문있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아이가 잘 성장하고 있으면 양을 굳이 얼마에 맞추거나 할 필요는 없어보입니다. 모자라지 않게 또 과하지 않게 주시면 될것 같습니다

왼쪽 고환 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비뇨기과 진료가 필요할 수 있습니다. 가장흔한 원인은 정계정맥류라는 질환인데 진료를 통해서 확인해보시는 것이 필요합니다

장티푸스 비보티프 백신 투약 기간,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확하게 알기가 어렵네요 보

통일반 백신의 경우로 미루어 보면 처음부터 다시할 필요는 없어보이긴 한데요.... 접종해주시는 선생님과 상의 해보셔요

교차감염되나요???,안녕하세요. 요약 1. 네 교차감염 가능합니다. 2. 실제 둘다 동시에 양성 이 나오는 경우도 있습니다. 3. 2가 입으로 1이 성기로 가는 경우도 꽤 있습니다. 건승하세요.

몸이 차갑고 혈액순환이 안되는것같으며 산소포화도가 낮고 최근엔 발에서 땀이 잘 남,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체중이 키에 비하여 너무 조금 밖에 안나가네요. 식사는 규칙적으로 잘 하나요? 스트레스가 많거나 운동이 부족하면 수족냉증이 생길 수 있으니 운동을 열심히 하시면서 체중이랑 근육량을 좀 늘려보셔요

얼굴 상처 흉터,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흉터라면 없어지지는 않을 것으로 생각됩니다. 열어질 수는 있지만 없어지지는 않아요. 색소 침착이라면 시간이 지나면서 점점 열어질 겁니다

갑자기 검은 점이 생김 HPV의심?,안녕하세요 요약 1. 그냥 점입니다. 2. 혹시나 물사마귀인지 지켜 보세요 3. 정작 성기나 구강은 멀쩡한데 다른 부위에 저런 모양으로 생기진 않습니다. 건승하세요

Hpv 및 키스 임신에 관해 질문드립니다...안녕하세요 요약 1. HPV는 성접촉으로 감염이 되고 전염이 됩니다. 2. 키스만 한다고 임신하는 건 동화에서 나오는 얘기입니다. 3. 정액이 나오면 팬티만 젖게 됩니다. 성접촉을 통해 감염되는 인유두종 바이러스Human papiloma virus 즉 HPV는 여성에게 자궁경부암을 일으킬 뿐만 아니라 남성에게도 직접적으로 작용하여 생식기 사마귀 항문암 음경암 두경부암 구인두암을 일으키는 주요원인이 됩니다. 건승하세요

눈 광시증 정밀검사 질문입니다,안녕하세요 요약 1. 망막과 유리체 질환이 없다고 하면 괜찮은 겁니다. 2. 망막에 문제가 없다는 건 박리도 아니고 망막병증도 없다는 겁니다. 광시증은 생리학적으로 노화 고도근시 둔상으로 발생할 수 있고 병적으로 망막이나 유리체 질환이 원인이 될 수 있습니다. 망막박리 망막열공 유리체 출혈 포도막염 등에 의해 광시증이 동반될 수 있습니다. 광시증이 발생할 경우 매번 망막과 유리체 질환이 있는지 안과적 정밀 검사를 받아 보아야 합니다. 건승하세요

3세대 피임약 복용중 4세대로 갈아타도 괜찮을까요?,안녕하세요 약을 바꿀 경우에는 다음 생리 예정일까지 기다리지 않고 아무때나 새 경구피임약을 복용하되 바꾸는 시점이 월경시작일로부터 5일 이상 지났다면 7일 정도는 다른 피임법을 병행하는게 좋습니다. 건승하세요

10개월 아기 분유수유량 질문있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아이가 잘 성장하고 있으면 양을 굳이 얼마에 맞추거나 할 필요는 없어보입니다. 모자라지 않게 또 과하지 않게 주시면 될것 같습니다

생리중 어지러움증과 식욕떨어져도 괜찮은건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 양이 많으신편이거나 이런증상이 반복해서 일어난다고 하면 빈혈은 없는지 혈액검사를 해볼 필요가 있다고 판단됩니다

불알크기 질문,안녕하세요 한쪽 고환이 다른 쪽보다 약간 아래에 있는 것은 정상입니다. 보통은 왼쪽 고환이 더 낮게 매달려 있습니다. 그리고 한쪽 고환이 다른 쪽 고환보다 더 큰 경우가 많은데 대개 오른쪽 고환은 왼쪽보다 약간 큼니다. 이건 오른쪽 고환이 왼쪽 고환보다 더 빨리 발달하기 때문입니다. 건승하세요

생리중 어지러움증과 식욕떨어져도 괜찮은건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 양이 많

으신편이거나 이런증상이 반복해서 일어난다고 하면 빈혈은 없는지 혈액검사를 해볼 필요가 있다고 판단됩니다

혈당 질문좀 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주신 내용을 보았을 때 혈당스파이크 즉 혈당이 높고 낮음의 격차가 매우 심하게 오고 가는 듯합니다 저녁식사의 내용이 다르지 않다 해도 혈당이 높음은 하루 24시간동안 에너지 대사가 많이 다르고 인슐린만이 아닌 다른 호르몬들의 분비능이 서로 다르기에 같은 조건이라해도 하루 중 혈당 혈압등은 다 다를 수 있게 됩니다 당화혈색소는 정상이나 혈당의 높낮음의 폭이 크다면 최근 연속으로 혈당을 10일이나 15일을 지속체크하는 기기들이 나오고 있습니다. 비용은 대략 10만원에서 15만원 사이로 알고 있는데 만약 주치의 선생님이 계시다면 해당 기기를 가볍게 마치 파스처럼 팔에 붙여두면 연속해서 혈당을 체크하여 이를 본인과 주치의 핸드폰으로 정보가 가서 그 변화폭의 그래프를 볼 수 있게 될 것입니다 대표적으로 현재 추천해드릴 기기는 카카오에서 출시되고 있는 파스타라는 혈당관리 기기입니다 온라인상에서 주치의와 함께 볼 수 있기에 혈당관리에서 매우 중요한 데이터를 얻으실 수 있을 것입니다

주기적으로 걸리는 편도염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자주 아프셔서 많이 불편하시겠네요. 면역력을 기르기 위하여 규칙적인 운동을 권해드리고 비타민씨 메가도즈 요법도 고려해보셔요. 잠은 잘 주무시죠?

속 울렁거림 구토감 오심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소화불량과 구역감을 호소하시는게 위염의 증상일 수 있습니다. 약물이나 스트레스로 인해 위염이 악화될 수 있습니다. 위내시경 검사를 받아보고 위장질환위염 위궤양 역류성식도염 등등..에 대한 확인을 해보는게 좋겠습니다.

옴 진드기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 아직 피부가 가렵다고 하면 너무 따뜻하거나 뜨거운 것으로 하면 가려움증이 조금 심해질수 있으니 주의가 필요합니다.

생리중 질내사정,안녕하세요 요약 1. 생리중이라면 임신가능성은 없습니다. 2. 다만 생리가 아니라 부정출혈이라면 임신 가능성이 있습니다. 3. 생리주기가 규칙적이고 생리라고 확실한다면 임신 가능성 없습니다. 건승하세요

멀미와 같은 어지럼증이 발생합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이석증과 같은 말초성 현훈 가능성이 높아 신경과나 이비인후과 진료가 필요합니다. 일반 의약품으로는 호전을 기대하기 어렵습니다.

주기적으로 걸리는 편도염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자주 아프셔서 많이 불편하시겠네요. 면역력을 기르기 위하여 규칙적인 운동을 권해드리고 비타민씨 메가도즈 요법도 고려해보셔요. 잠은 잘 주무시죠?

임신 가능성,안녕하세요 요약 1. 임신가능성이 있습니다. 2. 사후피임약을 월요일날 처방받으면 효과는 더 떨어집니다. 관계 후 24시간 이내에 사후피임약응급피임약을 복용할 경우 피임 실패율은 5 정도 되며 48시간 이내에는 실패율이 15 72시간 이내에는 실패율 42로 복용 시간이 늦어질수록 피임 실패율은 급격하게 높아집니다. 건승하세요.

곤지름인가요 유두종인가요,안녕하세요 질전정유두종은 곤지름과 달리 한 줄로 대칭적으로 자라게 되며 소음순과 질 입구인 전정에 대칭적으로 분포됩니다. 그리고 만졌을 때 까끌하지 않고 부드럽다면 곤지름이 아닌 질전정유두종일 가능성이 높습니다. 건승하세요.

왼쪽 고환 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비뇨기와 진료가 필요할 수 있습니다. 가장흔한 원인은 정계정맥류라는 질환인데 진료를 통해서 확인해보시는 것이 필요합니다

이물육아종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피하 혹은 진피에 미세한 나무조각이 박혀 들어간 경

우 이물 육아종으로 발전할 가능성은 있습니다. 이물 육아종은 이물질이 박혀서 생긴 종양으로 크기가 커지거나 통증 등의 증상이 나타날 경우 수술적으로 제거해야 할 수도 있습니다. 박혀 들어간 나무조각의 크기 깊이 위치 등에 따라 이물 육아종의 발생 가능성과 수술적 제거 여부가 달라질 수 있습니다

소금 많이 먹기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의학적으로 권장되는 상황은 아닙니다. 지금 상태를 정확하게 파악하고 적절한 처방을 받아보시는 것이 필요하다고 생각합니다

남성 손가락 사마귀가 여성 생식기에 감염 등 영향 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 남성의 손가락에 있는 사마귀가 여성 생식기에 직접적인 감염을 일으키는 경우는 드물지만 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 사마귀는 인체유두종바이러스HPV에 의해 발생하는 질환입니다. 성기 주변에 발생한 사마귀는 성 접촉을 통해 전파될 수 있습니다. 그러나 손가락 사마귀는 대개 피부 접촉을 통해 전파되므로 직접적인 생식기 감염 가능성은 낮습니다. 그래도 조심하는 것이 좋을 것 같습니다

가다실 9가 3차를 맞고나서 약을 복용했어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가다실 3차 까지 접종하셨고 통풍으로 소염진통제 복용하시는 것이 항체 형성에는 큰 영향은 없을 것으로 생각하니 너무 걱정하지 마세요

발바닥 사진 주의 이거 무좀인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상으로는 뚜렷하지는 않은데 가능성도 있어보입니다. 확실하게 진료를 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다. 발가락 사이도 허물이 벗겨지나요?

멀미와 같은 어지럼증이 발생합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이석증과 같은 말초성 현훈 가능성이 높아 신경과나 이비인후과 진료가 필요합니다. 일반 의약품으로는 호전을 기대하기 어렵습니다.

잇몸 출혈,안녕하세요 요약 1. 잇몸 출혈의 원인이 확실하기 때문에 2. 당분간 안 건드리면 됩니다. 3. 내일 아침에도 육신거리거나 출혈이 지속되면 4. 그때는 치료가 필요합니다. 잇몸 출혈의 원인들입니다. 잘못된 칫솔질 이쑤시개 사용 양치질을 하고 닦더니 잇몸에서 피가 남 부적절한 치아 위생 치은염 치근막염 잇몸이 붓고 피가 남 비타민 결핍 잇몸에 출혈 증상과 함께 식욕이 줄어들고 치아가 흔들리는 듯한 느낌이 생김 건승하세요

에이즈 초기증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문의 내용상 에이즈의 가능성은 희박하므로 크게 걱정하지 마시고 병원 내원하셔서 정확한 진료를 한번 받도록 하십시오.

교차감염되나요???,안녕하세요. 요약 1. 네 교차감염 가능합니다. 2. 실제 둘다 동시에 양성 이 나오는 경우도 있습니다. 3. 2가 입으로 1이 성기로 가는 경우도 꽤 있습니다. 건승하세요.

손가락 통증,안녕하세요 요약 1. 인대파열이나 부분파열이 있으면 구부리기 힘들어 집니다. 2. 병원에서 과거 파열된 부위가 더 심해졌는지 평가해 보세요 3. 덜 나은 부위가 지속되면 관절염이 추가되기도 합니다. 건승하세요.

엑스레이 흉부 이상 소견,안녕하세요 검사로 흔히 발견되는 폐결절은 보통 3cm를 기준으로 이보다 크면 혹 또는 종양 작으면 결절이라고 부릅니다 대부분의 폐결절은 폐암이 아니니 안심하셔도 됩니다. 극히 일부를 제외한 대부분의 폐결절은 양성 결절로서 과거 알게 모르게 지나간 폐의 염증 흔적들이 흉터처럼 남아있는 경우가 많습니다. 건승하세요

뇌출혈 후 편마비가 왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌손상으로 인한 편마비는 대개 팔 다리 같이 오는데요. 뇌병변에 따라서 다리만 올 수도 있습니다. 그 외에도 혈액순환장애나 근육피로도에 의해서도 일시적으로 다리만 힘이 빠지는 증상이 나타날 수도 있습니다. 재활

운동 꾸준히 하시고 휴식도 잘하시고.. 주치의와 상담하여 적절한 치료를 받기를 바랍니다.

손톱 어떡하죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀 드리기 조심스럽지만 건선이 손톱에 생긴것이 아닌가 싶습니다. 피부과진료를 받아보시는 것이 필요해 보입니다. 다른 피부병변은 없나요?

메니에르라는데 매일 눈앞이 도는게 이상해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 눈이 돈다는 것이 혹시 어지럼증을 이야기 하시는 것인가요? 치료해도 호전되지않고 지속되면 신경과 진료 한번 받아보셔요.

대상포진? 삼차신경통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 대상포진후 신경통은 일반적으로 피부 병변이 나타났던 부위에 나타납니다. 목과 턱으로 위치가 변했다면 포진후 신경통이 아닐가능성이 있으니 일단 자팜 드셔보시면서 경과를 지켜보셔요

치루 수술 좌욕,안녕하세요 요약 좌욕을 한다고 오랜 시간 쪼그려 앉아 있을 경우 오히려 항문 혈관의 압력이 증가하거나 치열 부위 상처가 덧날 수 있습니다. 좌욕을 하면 항문 조임근이 이완돼 항문압이 낮아지고 괄약근 주변 혈액순환이 활발해져서 치질 증상 완화에 도움이 되지만 따뜻한 물을 받아 엉덩이를 오래 담그는 행위로는 치질 질환 예방에 전혀 도움이 되지 않습니다. 오랜 시간 쪼그려 앉아 있을 경우 항문 혈관의 압력이 증가하거나 치열 부위 상처가 덧날 수 있습니다. 일반 샤워기를 이용해 물살이 세지 않게 조정해 다음 체온과 비슷한 37.3도의 온도로 항문 주변을 마사지해주는 것이 좋으며 좌욕 후에는 물기가 남아있지 않도록 완벽하게 건조해야 항문소양증 같은 2차 항문질환을 예방할 수 있습니다. 건승하세요

임신 가능성,안녕하세요 요약 1. 임신가능성이 있습니다. 2. 사후피임약을 월요일날 처방받으면 효과는 더 떨어집니다. 관계 후 24시간 이내에 사후피임약응급피임약을 복용할 경우 피임 실패율은 5 정도 되며 48시간 이내에는 실패율이 15 72시간 이내에는 실패율 42로 복용 시간이 늦어질수록 피임 실패율은 급격하게 높아집니다. 건승하세요.

손가락 통증,안녕하세요 요약 1. 인대파열이나 부분파열이 있으면 구부리기 힘들어 집니다. 2. 병원에서 과거 파열된 부위가 더 심해졌는지 평가해 보세요 3. 덜 나은 부위가 지속되면 관절염이 추가되기도 합니다. 건승하세요.

곤지름인가요 유두종인가요,안녕하세요 질전정유두종은 곤지름과 달리 한 줄로 대칭적으로 자라게 되며 소음순과 질 입구인 전정에 대칭적으로 분포됩니다. 그리고 만졌을 때 까끌하지 않고 부드럽다면 곤지름이 아닌 질전정유두종일 가능성이 높습니다. 건승하세요.

혈당 질문좀 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주신 내용을 보았을 때 혈당스파이크 즉 혈당이 높고 낮음의 격차가 매우 심하게 오고 가는 듯합니다 저녁식사의 내용이 다르지 않더라도 혈당이 높음은 하루 24시간동안 에너지 대사율이 다르고 인슐린만이 아닌 다른 호르몬들의 분비능이 서로 다르기에 같은 조건이라해도 하루 중 혈당 혈압등은 다 다를 수 있게 됩니다 당화혈색소는 정상이나 혈당의 높낮음의 폭이 크다면 최근 연속으로 혈당을 10일이나 15일을 지속체크하는 기기들이 나오고 있습니다. 비용은 대략 10만원에서 15만원 사이로 알고 있는데 만약 주치의 선생님이 계시다면 해당 기기를 가볍게 마치 파스처럼 팔에 붙여두면 연속해서 혈당을 체크하여 이를 본인과 주치의 핸드폰으로 정보가 가서 그 변화폭의 그래프를 볼 수 있게 될 것입니다 대표적으로 현재 추천해드릴 기기는 카카오에서 출시되고 있는 파스타라는 혈당관리 기기입니다 온라인상에서 주치의와 함께 볼 수 있기에 혈당관리에서 매우 중요한 데이터를 얻으실 수 있을 것입니다

속 울렁거림 구토감 오심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소화불량과 구역감을 호소하시는게 위염의 증상일 수 있습니다. 약물이나 스트레스로 인해 위염이 악화될 수 있습니다. 위내시경

검사를 받아보고 위장질환위염 위궤양 역류성식도염 등등..에 대한 확인을 해보는게 좋겠습니다.

뇌출혈 후 편마비가 왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌손상으로인한 편마비는 대개 팔 다리 같이 오는데요. 뇌병변에 따라서 다리만 올 수도 있습니다. 그 외에도 혈액순환장애나 근육피로도에 의해서도 일시적으로 다리만 힘이 빠지는 증상이 나타날 수도 있습니다. 재활 운동 꾸준히 하시고 휴식도 잘하시고.. 주치의와 상담하여 적절한 치료를 받기를 바랍니다.

생리중 질내사정,안녕하세요 요약 1. 생리중이라면 임신가능성은 없습니다. 2. 다만 생리가 아니라 부정출혈이라면 임신 가능성이 있습니다. 3. 생리주기가 규칙적이고 생리라고 확신한다면 임신 가능성 없습니다. 건승하세요

뇌출혈 후 편마비가 왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌손상으로인한 편마비는 대개 팔 다리 같이 오는데요. 뇌병변에 따라서 다리만 올 수도 있습니다. 그 외에도 혈액순환장애나 근육피로도에 의해서도 일시적으로 다리만 힘이 빠지는 증상이 나타날 수도 있습니다. 재활 운동 꾸준히 하시고 휴식도 잘하시고.. 주치의와 상담하여 적절한 치료를 받기를 바랍니다.

속 울렁거림 구토감 오심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소화불량과 구역감을 호소하시는게 위염의 증상일 수 있습니다. 약물이나 스트레스로 인해 위염이 악화될 수 있습니다. 위내시경 검사를 받아보고 위장질환위염 위궤양 역류성식도염 등등..에 대한 확인을 해보는게 좋겠습니다.

혈당 질문좀 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주신 내용을 보았을 때 혈당스파이크 즉 혈당이 높고 낮음의 격차가 매우 심하게 오고 가는 듯합니다 저녁식사의 내용이 다르지 않더라도 혈당이 높음은 하루 24시간동안 에너지 대사가 다르고 인슐린만이 아닌 다른 호르몬들의 분비능이 서로 다르기에 같은 조건이라해도 하루 중 혈당 혈압등은 다 다를 수 있게 됩니다 당화혈색소는 정상이나 혈당의 높낮음의 폭이 크다면 최근 연속으로 혈당을 10일이나 15일을 지속체크하는 기기들이 나오고 있습니다. 비용은 대략 10만원에서 15만원 사이로 알고 있는데 만약 주치의 선생님이 계시다면 해당 기기를 가볍게 마치 파스처럼 팔에 붙여두면 연속해서 혈당을 체크하여 이를 본인과 주치의 핸드폰으로 정보가 가서 그 변화폭의 그래프를 볼 수 있게 될 것입니다 대표적으로 현재 추천해드릴 기기는 카카오에서 출시되고 있는 파스타라는 혈당관리 기기입니다 온라인상에서 주치의와 함께 볼 수 있기에 혈당관리에서 매우 중요한 데이터를 얻으실 수 있을 것입니다

옴 진드기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 아직 피부가 가렵다고 하면 너무 따뜻하거나 뜨거운 것으로 하면 가려움증이 조금 심해질수 있으니 주의가 필요합니다.

가다실 9가 3차를 맞고나서 약을 복용했어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가다실 3차 까지 접종하셨고 통풍으로 소염진통제 복용하시는 것이 항체 형성에는 큰 영향은 없을 것으로 생각하니 너무 걱정하지 마세요

발바닥 사진 주의 이거 무좀인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상으로는 뚜렷하지는 않은데 가능성도 있어보입니다. 확실하게 진료를 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다. 발가락 사이도 허물이 벗겨지나요?

엑스레이 흉부 이상 소견,안녕하세요 검사로 흔히 발견되는 폐결절은 보통 3cm를 기준으로 이보다 크면 혹 또는 종양 작으면 결절이라고 부릅니다 대부분의 폐결절은 폐암이 아니니 안심하셔도 됩니다. 극히 일부를 제외한 대부분의 폐결절은 양성 결절로서 과거 알게 모르게 지나간 폐의 염증 흔적들이 흉터처럼 남아있는 경우가 많습니다. 건승하세요

부비동염 후 점점 심해지는 기침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 호흡기 감염이후에 기침이 심해

졌다가 좋아졌다가 하면서 잘 좋아지지 않으면 기관지 알려지 가능성도 고려해 보양 합니다
퀴놀론시록신정과 이 영양제 함께 복용시 퀴놀론의 흡수 저하가 많이 될 수 있나요?,안녕하세요.
메디이즈입니다. 1시간 간격을 두시고 드시면됩니다 퀴놀론계 항생제는 다른 극성물질과
위장관에서 만나면 흡수율이 저해됩니다 영양제에 많이 들어있는 미네랄류는 전부 해당됩니다
결론은 위장관에서 미네랄과 퀴놀론이 안만나면됩니다 항생제를 1시간전에 드시고 1시간뒤에
영양제를 드시면됩니다 물론 반대도 동등합니다 많이 간격을 뒤 영양제를 점심때 드셔도 됩니
다 위 소화액이 공간이 좁은 소장으로 넘어가면 보통 상호작용을 일으킬 수 없기 때문입니다
건강하세요

급해요 여성 생식기 화상에 대해,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 네 12 3 도로 분류합니다 2.
생식기 화상의 주요 증상과 치료법은 다음과 같습니다 증상 심한 통증과 붓기 수포 형성 피
부 변색 붉은색 흰색 등 출혈 요도질 분비물 증가 배뇨 곤란 치료 응급 처치 노출된 피
부에 차가운 생리식염수나 물로 2030분간 식힘 멸균 거즈로 덮어 감염 예방 진통제 투여
전문 의료 치료 화상 정도 평가 및 분류 괴사 조직 제거 세정 수액 및 전해질 보충 항생제
투여 감염 예방 통증 관리 피부 이식술 심한 3도 화상인 경우 반흔 치료 및 재건술 3. 그래도
될것 같습니다

음주 후 액세라민비정 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 넵 음주후에 복용해도됩니다 속쓰림
이나 위장장애가 있을 순 있는데 평소에 액민 드셨을때 괜찮으셨으면 괜찮을겁니다 건강하세요

길 걷다가 이런 증상들이 나타났습니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럼에 의한 증상이
거나 과호흡 등에 의한 증상 가능성이 높을듯합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한
객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 병원 진료 권유합니다.

두피에 쥐 혹은 저림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잘 때 자세 문제로 두피가 저리고 먹먹할
수 있습니다. 두피는 얇고 두개골이 딱딱해서 압박에 취약합니다. 두피에서 온도 차이나 통각
을 잘 느끼고 다른 신경계통의 이상 증상이 없으면 안심하고 기다려보면 됩니다.

저번주 토요일에 집에서 어딘가에 좀 세게 발가락을 부딪쳐서 발톱에서 피가 나고 피멍이 들
었는데 밴드 꼬박꼬박 붙이고 다니니 피멍은 거의 다 빠지고 있는데 발가락 붓기가 아직도
안빠져서 걱정입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발가락을 다치셨군요. 발가락은 뼈가 약
해서 쉽게 부러집니다. 가까운 정형외과에서 방사선 촬영을 해보시기 바랍니다. 감사합니다.

손가락 마디가 달라요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 새끼손가락이 불편하시군요. 해당증상은
새끼손가락에서 흔히 나타납니다. 손가락을 굽히는 힘줄이 속에서 걸리는 현상이 있는 것 같
습니다. 가까운 정형외과를 방문하시기 바랍니다. 감사합니다.

한가지 더 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네. 목발은 아프지않는 방향으로 한쪽
만 사용하시다가 점점 사용하지않는 방향으로 가시는 것이 좋습니다. 그러다가 통증이 있으면
다시 사용하셔야 합니다. 다리에 체중이 부하되는 것이 골유합에 유리합니다. 감사합니다.

심근효소랑 미주신경성 실신이랑 관련이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경? 심
전도? 연령대로 보아 해당검사를 일상적으로 하지는 않을 듯한데 다른 이유나 임상소견 과거
력 병력이나 가족력이 있는건 아닌가를 체크해 보아야할 듯합니다 일시적으로 쓰러지거나 앓
았다 일어나면 어지럽고 눈앞이 깜깜해지는 등은 저혈압에 의한 경우가 대부분이고는 합니다.
미주신경자극도 저혈압을 초래할 수 있는 한 조건이 될 수 있습니다 평소 본인의 자세 체형
체중 운동 등을 체크해봐야할 것입니다

간질을 앓고 있는 성인 남성인데 6년 만에 발작이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수면이 가장

큰 원인이 아니었을까 싶네요 간질 환자들이 잘 조절되던 상태에서 다시 발작을 일으키는 원인은 다양할 수 있습니다. 주요 원인들은 다음과 같습니다. 약물 불순응Noncompliance 약물 복용을 제대로 하지 않거나 임의로 약물을 중단하는 경우 발작이 재발할 수 있습니다. 스트레스 스트레스는 뇌의 흥분성을 높여 발작 역치를 낮출 수 있습니다. 수면 부족 수면 부족 역시 뇌의 과다한 활성화를 불러와 발작을 유발할 수 있습니다. 호르몬 변화 여성의 경우 월경 주기 임신 출산 등 호르몬 변화로 인해 발작이 재발할 수 있습니다. 감염성 질환 열을 동반한 감염 시 뇌의 흥분성이 높아져 발작 위험이 증가합니다. 약물 상호작용 일부 약물들이 항경련제의 혈중 농도를 변화시켜 발작을 유발할 수 있습니다. 두부 외상 최근에 두부 외상을 입은 경우 발작 위험이 높아집니다.

편두통 후유증상 머리 숙일때 두통 질문 이차성 두통 질문.안녕하세요. 메디이즈입니다. 편두통은 머리를 숙이거나 몸의 위치 변화에 따라 발생할 수 있습니다. 편두통은 뇌의 신경전달물질인 세로토닌의 이상으로 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 세로토닌은 뇌의 신경세포를 흥분시키는 역할을 하는데 편두통이 발생하면 세로토닌의 농도가 증가하면서 뇌의 신경세포가 과도하게 흥분합니다. 이로 인해 두통 어지럼증 구토 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 머리를 숙이거나 몸의 위치 변화에 따라 편두통이 발생하는 이유는 세로토닌의 농도가 증가하면서 뇌의 신경세포가 과도하게 흥분하기 때문입니다. 편두통은 이차성 두통이 아닙니다. 이차성 두통은 뇌종양 뇌수막염 뇌출혈 등의 질환으로 인해 발생하는 두통을 말합니다. 편두통은 뇌의 신경전달물질인 세로토닌의 이상으로 발생하는 질환이기 때문에 이차성 두통이 아닙니다. 편두통은 난시가 주요 원인이 아닙니다. 편두통은 뇌의 신경전달물질인 세로토닌의 이상으로 발생하는 질환이기 때문에 난시가 주요 원인이 아닙니다. 편두통은 다양한 원인으로 발생할 수 있지만 가장 흔한 원인은 스트레스입니다. 편두통을 예방하기 위해서는 스트레스를 줄이고 충분한 수면을 취하며 규칙적인 운동을 하는 것이 좋습니다. 편두통이 발생하면 진통제를 복용하거나 냉찜질을 하는 것이 도움이 됩니다. 편두통이 자주 발생하거나 심한 경우에는 병원에서 치료를 받아야 합니다.

키스만 하면 임신 가능성있나요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 네 정상생리적 반응입니다 2. 임신가능성은 없습니다 3. 이런경우도 임신은 불가능합니다 임신은 정자와 난자가 만나야 가능합니다

경구피임약 피임 기간.안녕하세요. 메디이즈입니다. 꾸준히 약을 복용했다면 휴약기 동안도 피임 효과가 유지가 됩니다. 따라서 임신 가능성은 낮습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다. 구각염 키스.안녕하세요. 메디이즈입니다. 구각염이란 입술의 가장자리 양 끝 쪽에 발생하는 질환으로 다양한 원인이 있습니다. 환자분의 면역력과도 관련이 있고 침이 지속적으로 구각 입술 가장자리에 노출이 되어도 발생할 수 있습니다. 따라서 그러한 행동을 자제해주시는 부분이 구각염의 발생 빈도를 낮추는 해결 방법이 될 수 있을 것 같습니다. 좋은 하루 보내세요.

선생님 추가 질문이 있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 인공누액은 수시로 점안하시면 되고 레바케이 안약은 하루에 4번 점안하면 됩니다. 저는 편의상 아침먹고 점심먹고 저녁먹고 자기전에 점안하시라고 설명드리고 있습니다. 그리고 간혹 인공누액과 레바케이 안약의 점안 시간이 겹치는 경우에는 순서는 관계가 없고 하나 점안한 후 최소 3분 후에 점안하면 된다고 설명드리고 있습니다. 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

변의가 매우 약하고 잘 안 옵니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌출혈 이후 신경학적 변화로 변비가 생길수도 있습니다. 식이요법섬유질 수분섭취 및 규칙적인 운동으로 장운동을 촉진

시키게 중요하겠습니다. 마그밀과 폴락스산은 성분은 다르지만..둘다 삼투성완화제로 비슷한 약효과를 가지고 있는데요. 혹시라도 약효과가 적다면 비사코딜장운동 촉진을 단기간 사용해 보는 것도 생각해볼 수있겠네요.

귀 먹먹함과 두통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀 먹먹함과 두통은 감기나 비염 등의 호흡기 질환으로 인해 발생할 수 있습니다. 호흡기 질환은 코막힘 목의 통증 기침 발열 등의 증상을 동반할 수 있습니다. 호흡기 질환은 대부분 자연적으로 치료되지만 증상이 심하거나 오래 지속되는 경우에는 병원에서 치료를 받아야 합니다. 타이레놀은 두통을 치료하는 데 도움이 될 수 있지만 귀 먹먹함과 두통을 유발하는 원인을 치료하지는 않습니다. 따라서 귀 먹먹함과 두통이 심하거나 오래 지속되는 경우에는 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

신경이 다친건가요 아니면 근육이 다친건지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시간이 지나면 금방 회복될 가능성이 많습니다. 순간적인 과한 전기자극등에 의해 주변조직의 과긴장등인 경우가 많습니다. 며칠동안 증상 지속된다면 병원 방문하셔서 상담 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.

전기로 인해 생긴 통증 피부인지 근육문제인지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한 달 전 정전기 소리와 함께 손가락 통증이 생겼다면 피부 손상보다는 근육 손상이 더 확률이 높습니다. 정전기는 전기 충격을 일으키지만 피부 손상은 거의 없습니다. 하지만 정전기는 근육을 수축시킬 수 있고 이로 인해 통증이 발생할 수 있습니다. 따라서 손가락 통증이 가만히 있으면 안 아프고 날카로운 물체에 스칠 때만 아프다면 근육 손상이 더 확률이 높다고 볼 수 있습니다. 만약 통증이 심하거나 지속된다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

Hpv 바이러스에 대한 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. HPV 바이러스는 성관계를 통해서만 전염되는 바이러스입니다. 따라서 태어날 때부터 HPV 바이러스가 생길 수는 없습니다. 2. HPV 바이러스는 성관계를 통해서만 전염되는 바이러스입니다. 따라서 성관계를 하지 않았더라도 HPV 바이러스에 감염될 수 있습니다. 하지만 키스와 몽정은 성관계가 아니기 때문에 HPV 바이러스에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. HPV 바이러스는 성관계를 통해서만 전염되는 바이러스이지만 성관계를 하지 않았더라도 HPV 바이러스에 감염될 수 있습니다. 따라서 HPV 바이러스에 감염되지 않기 위해서는 성관계를 하지 않는 것이 가장 좋습니다. 하지만 성관계를 하는 경우에는 콘돔을 사용하는 것이 HPV 바이러스에 감염되는 것을 예방할 수 있습니다. HPV 바이러스에 감염되면 자궁경부암 생식기 사마귀 음경암 등을 유발할 수 있습니다. 따라서 HPV 바이러스에 감염되지 않도록 예방하는 것이 중요합니다.

청소년 카페인 적정량을 지키면 계속 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 찾아보니 청소년은 체중 1kg당 카페인 2.5mg 정도가 권장되고 있습니다. 체중 60kg라면 150mg이 적정 허용량으로 보입니다. 안정용량에서 큰 문제가 되지는 않겠지만 매일 약으로 복용하는 것은 장기적으로 의존성과 부작용을 초래할 수 있습니다. 카페인 중독이나 면역력저하과도한 섭취시에는 가능의 가능성도 있으니 장기복용은 하지 않고.. 다른 자연적인 방법으로 각성을 유지하는 것이 좋겠습니다.

내과와 정신과 중 어느 쪽을 가야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흉통은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 심장 질환 폐 질환 근골격계 질환 위장 질환 등이 흉통을 유발할 수 있습니다. 또한 심리적인 문제로 인해 흉통이 발생할 수도 있습니다. 따라서 흉통이 발생하면 먼저 내과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 내과에서 심장 폐 근골격계 위장 등의 질환을 확인하고 흉통의 원인을 파악할 수 있습니다. 만약 내과에서 흉통의 원인을 찾지 못하면 정신과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 정신과에서는 심리적인 문제로 인해 흉통이

발생했는지 확인하고 적절한 치료를 받을 수 있습니다. 흉통이 심하거나 흉통으로 인해 일상 생활에 지장을 받고 있다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

부비동염 후 점점 심해지는 기침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 호흡기 감염이후에 기침이 심해졌다가 좋아졌다가 하면서 잘 좋아지지 않으면 기관지 알려지 가능성도 고려해 보양 합니다
다낭성 피임약 복용 10개월중 중단 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다낭성 난소 증후군PCOS을 관리하기 위해 피임약을 복용 중인 상황에서 피임약을 끊거나 중단하는 것은 주의가 필요합니다. 특히 일정한 패턴으로 복용하는 것이 중요합니다. 현재 상황을 종합적으로 고려하여 다음과 같은 조언을 드릴 수 있습니다 1. 피임약 중단의 영향 피임약을 중단하면 호르몬 수치가 변동할 수 있고 생리 주기가 다시 불규칙해질 수 있습니다. PCOS 환자의 경우 피임약 중단은 증상 악화나 불규칙한 생리로 이어질 수 있습니다. 2. 생리 미루기와 추가 복용 피임약을 추가로 며칠 더 복용해서 생리를 미루는 것은 일반적인 방법입니다. 그러나 이번 달 마지막 피임약을 다 복용한 상태에서 며칠 동안 중단해야 하는 상황이라면 이는 호르몬 균형에 영향을 미칠 수 있습니다. 3. 다음 주 피임약 구매 화요일21일에 피임약을 구매할 수 있다면 지금 복용을 중단하지 않고 화요일까지 새로운 피임약을 구해 계속 복용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 호르몬 수치의 큰 변동을 막을 수 있습니다. 4. 의사의 조언 현지에서 의사 방문이 어려운 상황이라면 전화나 온라인 상담을 통해 의사의 조언을 받는 것도 고려해보세요. 의사는 현재 상황에 맞는 가장 적절한 조치를 안내할 수 있습니다. 요약하자면 이번 달 복용을 끊지 않고 화요일에 피임약을 구해 계속 복용하는 것이 좋습니다. 그래야 호르몬 균형이 유지되고 생리 주기가 안정적으로 유지될 수 있습니다.

심근효소랑 미주신경성 실신이랑 관련이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경? 심전도? 연령대로 보아 해당검사를 일상적으로 하지는 않을 듯한데 다른 이유나 임상소견 과거력 병력이나 가족력이 있는건 아닌가를 체크해 보아야할 듯합니다 일시적으로 쓰러지거나 앓았다 일어나면 어지럽고 눈앞이 깜깜해지는 등은 저혈압에 의한 경우가 대부분이고는 합니다. 미주신경자극도 저혈압을 초래할 수 있는 한 조건이 될 수 있습니다 평소 본인의 자세 체형 체중 운동 등을 체크해봐야할 것입니다

성기 곤지름인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 모낭 가능성이 높습니다 하지만 확인차 비뇨의학과를 방문하셔서 진료를 받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

미주신경성 실신 했으면 관리가 필요한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 심장과 뇌를 연결하는 미주신경의 이상으로 인해 발생하는 질환입니다. 미주신경은 심장의 박동수를 조절하는 역할을 하는데 미주신경이 과도하게 활성화되면 심장 박동수가 급격히 떨어지면서 실신할 수 있습니다. 미주신경성 실신은 심장 질환이 아니므로 심장초음파나 피검사를 해도 이상이 없을 수 있습니다. 하지만 미주신경성 실신은 심각한 부상을 입을 수 있는 질환이므로 반드시 심장쪽 검사를 받고 관리를 받아야 합니다. 미주신경성 실신은 심장 박동수가 급격히 떨어지면서 발생하기 때문에 심장 박동수를 안정적으로 유지하는 약물을 복용하거나 심장 박동수를 안정적으로 유지하는 생활습관을 가지는 것이 도움이 됩니다. 또한 미주신경성 실신은 스트레스를 받으면 발생할 가능성이 높기 때문에 스트레스를 관리하는 것도 도움이 됩니다.

미주신경성 실신 했으면 관리가 필요한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 심장과 뇌를 연결하는 미주신경의 이상으로 인해 발생하는 질환입니다. 미주신경은 심장의 박

동수를 조절하는 역할을 하는데 미주신경이 과도하게 활성화되면 심장 박동수가 급격히 떨어지면서 실신할 수 있습니다. 미주신경성 실신은 심장 질환이 아니므로 심장초음파나 피검사를 해도 이상이 없을 수 있습니다. 하지만 미주신경성 실신은 심각한 부상을 입을 수 있는 질환이므로 반드시 심장쪽 검사를 받고 관리를 받아야 합니다. 미주신경성 실신은 심장 박동수가 급격히 떨어지면서 발생하기 때문에 심장 박동수를 안정적으로 유지하는 약물을 복용하거나 심장 박동수를 안정적으로 유지하는 생활습관을 가지는 것이 도움이 됩니다. 또한 미주신경성 실신은 스트레스를 받으면 발생할 가능성이 높기 때문에 스트레스를 관리하는 것도 도움이 됩니다.

코수술 코안 흉살 연골 튀어나옴,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코수술을 한 후 코안에서 흉살이 생기고 연골이 튀어나오는 것은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 코수술 후 제대로 된 관리를 하지 않았기 때문입니다. 코수술 후에는 코를 세게 비비거나 굽어서는 안 됩니다. 또한 코를 만지거나 압박하는 것도 피해야 합니다. 만약 코를 만지거나 압박하면 코의 연골이 비틀어지거나 튀어나올 수 있습니다. 또한 코수술 후에는 흡연을 피해야 합니다. 흡연은 코의 혈관을 수축시켜 코의 흉살을 더 악화시킬 수 있습니다. 만약 코수술 후 코안에서 흉살이 생기고 연골이 튀어나온다면 병원을 방문하여 정확한 진단을 받고 치료를 받는 것이 좋습니다.

Hpv 바이러스에 대한 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. HPV 바이러스는 성관계를 통해서만 전염되는 바이러스입니다. 따라서 태어날 때부터 HPV 바이러스가 생길 수는 없습니다. 2. HPV 바이러스는 성관계를 통해서만 전염되는 바이러스입니다. 따라서 성관계를 하지 않았더라도 HPV 바이러스에 감염될 수 있습니다. 하지만 키스와 몽정은 성관계가 아니기 때문에 HPV 바이러스에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. HPV 바이러스는 성관계를 통해서만 전염되는 바이러스이지만 성관계를 하지 않았더라도 HPV 바이러스에 감염될 수 있습니다. 따라서 HPV 바이러스에 감염되지 않기 위해서는 성관계를 하지 않는 것이 가장 좋습니다. 하지만 성관계를 하는 경우에는 콘돔을 사용하는 것이 HPV 바이러스에 감염되는 것을 예방할 수 있습니다. HPV 바이러스에 감염되면 자궁경부암 생식기 사마귀 음경암 등을 유발할 수 있습니다. 따라서 HPV 바이러스에 감염되지 않도록 예방하는 것이 중요합니다.

미주신경성 실신 했으면 관리가 필요한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 심장과 뇌를 연결하는 미주신경의 이상으로 인해 발생하는 질환입니다. 미주신경은 심장의 박동수를 조절하는 역할을 하는데 미주신경이 과도하게 활성화되면 심장 박동수가 급격히 떨어지면서 실신할 수 있습니다. 미주신경성 실신은 심장 질환이 아니므로 심장초음파나 피검사를 해도 이상이 없을 수 있습니다. 하지만 미주신경성 실신은 심각한 부상을 입을 수 있는 질환이므로 반드시 심장쪽 검사를 받고 관리를 받아야 합니다. 미주신경성 실신은 심장 박동수가 급격히 떨어지면서 발생하기 때문에 심장 박동수를 안정적으로 유지하는 약물을 복용하거나 심장 박동수를 안정적으로 유지하는 생활습관을 가지는 것이 도움이 됩니다. 또한 미주신경성 실신은 스트레스를 받으면 발생할 가능성이 높기 때문에 스트레스를 관리하는 것도 도움이 됩니다.

심근효소랑 미주신경성 실신이랑 관련이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경? 심전도? 연령대로 보아 해당검사를 일상적으로 하지는 않을 듯한데 다른 이유나 임상소견 과거력 병력이나 가족력이 있는건 아닌가를 체크해 보아야할 듯합니다 일시적으로 쓰러지거나 앓았다 일어나면 어지럽고 눈앞이 깜깜해지는 등은 저혈압에 의한 경우가 대부분이고는 합니다. 미주신경자극도 저혈압을 초래할 수 있는 한 조건이 될 수 있습니다 평소 본인의 자세 체형

체중 운동 등을 체크해봐야할 것입니다

내과와 정신과 중 어느 쪽을 가야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흉통은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 심장 질환 폐 질환 근골격계 질환 위장 질환 등이 흉통을 유발할 수 있습니다. 또한 심리적인 문제로 인해 흉통이 발생할 수도 있습니다. 따라서 흉통이 발생하면 먼저 내과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 내과에서 심장 폐 근골격계 위장 등의 질환을 확인하고 흉통의 원인을 파악할 수 있습니다. 만약 내과에서 흉통의 원인을 찾지 못하면 정신과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 정신과에서는 심리적인 문제로 인해 흉통이 발생했는지 확인하고 적절한 치료를 받을 수 있습니다. 흉통이 심하거나 흉통으로 인해 일상 생활에 지장을 받고 있다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

임신인가요 생리인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신과 생리 증상은 비슷할 수 있지만 차이가 있습니다. 임신 증상은 생리 예정일보다 2주 이상 지난 후에 나타나며 생리 주기와 관계없이 나타납니다. 생리 증상은 생리 예정일 23일 전부터 나타나며 생리 주기에 따라 나타납니다. 따라서 생리 예정일보다 2주 이상 지난 후에 생리 증상이 나타난다면 임신 가능성이 있습니다. 하지만 임신 테스트를 하기 전에는 임신 여부를 확신할 수 없습니다. 따라서 임신 테스트를 해보거나 산부인과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

돌발성 난청에 대해,안녕하세요. 메디이즈입니다. 돌발성 난청은 갑자기 한쪽 귀의 청력이 떨어지는 질환입니다. 돌발성 난청은 치료가 늦을수록 회복이 어려워지므로 증상이 나타나면 즉시 치료를 시작하는 것이 좋습니다. 돌발성 난청의 치료에는 스테로이드 약물과 이뇨제 항혈소판제 등의 약물을 사용합니다. 또한 비타민과 미네랄 등을 보충하는 것도 도움이 됩니다. 돌발성 난청은 치료 후에도 약 10 정도에서 청력이 완전히 회복되지 않는 경우가 있습니다. 하지만 치료를 하면 대부분 청력이 어느 정도 회복되므로 치료를 시작하는 것이 좋습니다. 현재 5년 정도 지난 상태지만 지금이라도 치료를 시작하면 청력이 어느 정도 회복될 수 있습니다.

왼쪽 가슴에 통증이 있어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 가슴에 통증이 있는 경우 심장질환을 의심해볼 수 있습니다. 심장질환은 심장의 기능에 문제가 생겨 발생하는 질환으로 협심증 심근경색 심부전 등이 있습니다. 협심증은 심장의 혈관이 좁아져서 심장에 충분한 혈액이 공급되지 못하는 질환으로 가슴 통증 호흡곤란 어지럼증 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 심근경색은 심장의 혈관이 막혀서 심장 근육이 죽는 질환으로 가슴 통증 호흡곤란 어지럼증 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 심부전은 심장의 기능이 떨어져서 심장이 충분한 혈액을 공급하지 못하는 질환으로 호흡곤란 피로감 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 왼쪽 가슴에 통증이 있는 경우 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 증상을 확인하고 심전도 흉부 엑스레이 심장 초음파 등의 검사를 통해 심장질환 여부를 확인할 수 있습니다. 만약 심장질환이 있다면 적절한 치료를 통해 증상을 완화하고 합병증을 예방할 수 있습니다. 왼쪽 가슴에 통증이 있는 경우 심장질환 이외에도 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 예를 들어 늑간 신경통은 늑간 신경이 눌리거나 자극을 받아서 발생하는 질환으로 가슴 통증 팔다리 통증 흉부 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 늑간 신경통은 진통제를 복용하거나 물리치료 침 치료 등을 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 왼쪽 가슴에 통증이 있는 경우 심장질환 이외에도 다양한 원인이 있을 수 있으므로 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 증상을 확인하고 적절한 검사를 통해 원인을 확인한 후 적절한 치료를 통해 증상을 완화하고 합병증을 예방할 수 있습니다.

심근효소랑 미주신경성 실신이랑 관련이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경? 심

전도? 연령대로 보아 해당검사를 일상적으로 하지는 않을 듯한데 다른 이유나 임상소견 과거력 병력이나 가족력이 있는건 아닌가를 체크해 보아야할 듯합니다 일시적으로 쓰러지거나 앓았다 일어나면 어지럽고 눈앞이 깜깜해지는 등은 저혈압에 의한 경우가 대부분이고는 합니다. 미주신경자극도 저혈압을 초래할 수 있는 한 조건이 될 수 있습니다 평소 본인의 자세 체형 체중 운동 등을 체크해봐야할 것입니다

사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴집니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴지는 경우 림프절염이나 탈장 혹은 고환염 등이 있을 수 있습니다. 림프절염은 림프절이 붓고 통증이 생기는 질환으로 세균이나 바이러스 감염으로 인해 발생할 수 있습니다. 탈장은 복강 내의 장기가 복벽의 약한 부위를 통해 튀어나오는 질환으로 복압이 증가할 때 발생할 수 있습니다. 고환염은 고환에 염증이 생기는 질환으로 세균이나 바이러스 감염으로 인해 발생할 수 있습니다. 림프절염이나 탈장 고환염은 모두 병원에서 치료가 가능합니다. 림프절염은 항생제를 사용하고 탈장은 수술을 통해 치료하고 고환염은 항생제를 사용하거나 고환을 제거하는 수술을 통해 치료합니다. 따라서 사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴지는 경우 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

입술 헤르페스인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입술 헤르페스는 입술 주위에 물집이 생기는 질환입니다. 물집은 빨갛게 부어오르고 통증이 있으며 터지면 진물이 나옵니다. 입술 헤르페스는 바이러스에 의해 발생하며 한 번 감염되면 평생 재발할 수 있습니다. 입술 헤르페스의 증상은 바이러스가 입술에 침투한 후 23일 후에 나타납니다. 입술 헤르페스는 피부과에서 진단할 수 있으며 치료는 항바이러스제를 사용합니다. 입술 헤르페스를 예방하기 위해서는 손을 자주 씻고 입술에 상처가 생기지 않도록 조심해야 합니다. 또한 입술 헤르페스가 재발할 때는 빨리 치료하는 것이 좋습니다.

M자탈모 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안으로 확인했을때는 엠자탈모가 심하진 않습니다 . 탈모 가족력이 있는지 체크해보시고 예전보다 좀더 엠자가 깊어 진것 같으면 엠자탈모 초기라고 생각해볼수있겠습니다. 남성형 탈모에서는 먹는 탈모약이 예방하는데 가장 효과적이고 부수적으로 모낭주사바르는 미딜영양제 등도 도움이 될수있겠습니다. 현재 엠자가 심하진 않아서 모발이식으로 채울정도는 아닌것으로 보여집니다 감사합니다

탈모인지 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로만으로는 탈모인지 아닌지 정확하게 알 수 없습니다. 탈모는 두피를 직접 관찰하고 두피 검사와 모발 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 따라서 탈모가 의심된다면 피부과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 탈모는 원인에 따라 치료 방법이 다르기 때문에 정확한 진단을 통해 적절한 치료를 받아야 합니다. 탈모는 치료가 가능하지만 치료 시기를 놓치면 회복이 어려워질 수 있으므로 탈모가 의심된다면 빠른 시일 내에 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

종양표지자 수치 증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 종양표지자 수치가 증가했다고 해서 반드시 암이 있는 것은 아닙니다. 종양표지자는 암과 관련된 물질을 검출하는 검사로 암이 있는 경우 종양표지자 수치가 증가할 수 있지만 암이 없는 경우에도 종양표지자 수치가 증가할 수 있습니다. 따라서 종양표지자 수치가 증가했다고 해서 암을 의심할 수는 없지만 종양표지자 수치가 증가한 경우 암을 포함한 다른 질환을 의심해 볼 수 있습니다. 위 대장내시경 및 복부 초음파에서 이상이 없다면 암을 의심하기는 어렵지만 종양표지자 수치가 계속 증가하는 경우에는 정기적으로 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

아 선생님 전기로 인해 생긴 근육 문제라면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전기로 인해 근육 손상이 생겼다면 보통 몇 주에서 몇 달이 걸려서 회복됩니다. 하지만 손상이 심한 경우라면

회복에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 손상된 근육은 시간이 지나면서 점점 회복되지만 완전히 회복되지 않을 수도 있습니다. 따라서 전기로 근육 손상이 생겼다면 손상 부위를 보호하고 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 또한 통증이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

임신 초기 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 초기 증상으로는 생리 지연 가슴 통증 소화불량 두통 피로감 등이 있습니다. 임신 초기에는 호르몬 변화가 심하기 때문에 이런 증상들이 나타날 수 있습니다. 하지만 임신 초기 증상은 사람마다 다르고 임신하지 않은 사람도 이런 증상이 나타날 수 있기 때문에 임신 여부를 확인하려면 임신 테스트를 해보는 것이 가장 정확합니다. 사후피임약은 호르몬 변화를 유발할 수 있기 때문에 오렌지 주스로 토한 것은 약 부작용일 수도 있습니다. 하지만 임신 초기 증상이 나타날 수 있기 때문에 임신 여부를 확인해 보시는 것이 좋겠습니다.

눈에 번쩍하고 불을 빠르게 켜다 끈듯이 번쩍거렸습니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 광시증은 망막박리뿐만 아니라 다양한 질환에서 나타날 수 있습니다. 따라서 망막박리를 의심하기 위해서는 광시증과 함께 다른 증상이 동반되는지 확인해야 합니다. 망막박리의 다른 증상으로는 비문증 시야 결손 눈부심 등이 있습니다. 만약 광시증과 함께 다른 증상이 동반된다면 망막박리를 의심해 볼 수 있습니다. 하지만 망막박리는 매우 드문 질환이기 때문에 광시증만으로 망막박리를 의심하기는 어렵습니다. 따라서 망막박리를 의심한다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 망막박리는 조기에 발견하면 치료가 가능하기 때문에 증상이 있다면 빨리 병원에 방문하는 것이 좋습니다.

일반채용검진 매독,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독은 치료를 받으면 완치가 가능하지만 완치된 이후에도 매독 항체가 몸에 남아있을 수 있습니다. 따라서 매독 검사에서 매독 항체가 검출된다고 해서 반드시 매독이 재발한 것은 아닙니다. 만약 매독 검사에서 매독 항체가 검출된다면 매독이 재발했는지 확인하기 위해 추가 검사를 받아야 합니다. 일반채용검진에서 매독 검사를 할 때는 매독 항체 검사를 하는 것이 일반적입니다. 따라서 매독 검사에서 매독 항체가 검출된다면 매독이 재발했는지 확인하기 위해 추가 검사를 받아야 합니다. 만약 매독 검사에서 매독 항체가 검출되지 않는다면 매독이 재발하지 않은 것으로 볼 수 있습니다.

부비동염 후 점점 심해지는 기침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 호흡기 감염이후에 기침이 심해졌다가 좋아졌다가 하면서 잘 좋아지지 않으면 기관지 알려지 가능성도 고려해 보양 합니다

상복부 팽만감 설사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상복부 팽만감과 설사는 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 마라탕을 먹고 상복부 팽만감과 설사가 발생했다면 마라탕의 매운 성분이 위장관에 자극을 주어 발생했을 가능성이 있습니다. 또한 마라탕을 먹고 설사가 발생했다면 마라탕에 들어있는 식중독균에 감염되었을 가능성도 있습니다. 마라탕을 먹고 상복부 팽만감과 설사가 발생했다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 증상을 확인하고 원인을 파악한 후 적절한 치료를 처방할 수 있습니다. 네이버 검색을 통해 위암을 진단하는 것은 불가능합니다. 위암은 내시경 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 위암은 조기 발견하면 완치할 수 있는 질환입니다. 따라서 상복부 팽만감과 설사가 지속된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

다낭성 피임약 복용 10개월중 중단 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다낭성 난소 증후군PCOS을 관리하기 위해 피임약을 복용 중인 상황에서 피임약을 끊거나 중단하는 것은 주의가 필요합니다. 특히 일정한 패턴으로 복용하는 것이 중요합니다. 현재 상황을 종합적으로 고려하여 다음과 같은 조언을 드릴 수 있습니다 1. 피임약 중단의 영향 피임약을 중단하

면 호르몬 수치가 변동할 수 있고 생리 주기가 다시 불규칙해질 수 있습니다. PCOS 환자의 경우 피임약 중단은 증상 악화나 불규칙한 생리로 이어질 수 있습니다. 2. 생리 미루기와 추가 복용 피임약을 추가로 며칠 더 복용해서 생리를 미루는 것은 일반적인 방법입니다. 그러나 이번 달 마지막 피임약을 다 복용한 상태에서 며칠 동안 중단해야 하는 상황이라면 이는 호르몬 균형에 영향을 미칠 수 있습니다. 3. 다음 주 피임약 구매 화요일21일에 피임약을 구매할 수 있다면 지금 복용을 중단하지 않고 화요일까지 새로운 피임약을 구해 계속 복용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 호르몬 수치의 큰 변동을 막을 수 있습니다. 4. 의사의 조언 현지에서 의사 방문이 어려운 상황이라면 전화나 온라인 상담을 통해 의사의 조언을 받는 것도 고려해보세요. 의사는 현재 상황에 맞는 가장 적절한 조치를 안내할 수 있습니다. 요약하자면 이번 달 복용을 끝지 않고 화요일에 피임약을 구해 계속 복용하는 것이 좋습니다. 그래야 호르몬 균형이 유지되고 생리 주기가 안정적으로 유지될 수 있습니다.

손가락 사이 멍,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 사이에 멍이 생기는 것은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 손가락을 긁거나 찢어서 생기는 상처입니다. 또한 손가락을 째 쥐거나 압박을 가했을 때도 멍이 생길 수 있습니다. 손가락 사이에 멍이 생겼다면 멍이 생긴 부위를 냉찜질하고 멍이 빨리 흡수되도록 해주세요. 또한 손가락을 째 쥐거나 압박을 가하지 않도록 주의해주세요. 만약 손가락 사이에 멍이 생기고 통증이 심하거나 멍이 오랫동안 없어지지 않는다면 병원에서 진료를 받아보세요. 의사는 증상을 확인하고 원인을 파악한 후 적절한 치료를 처방할 수 있습니다.

상복부 팽만감 설사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상복부 팽만감과 설사는 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 마라탕을 먹고 상복부 팽만감과 설사가 발생했다면 마라탕의 매운 성분이 위장관에 자극을 주어 발생했을 가능성이 있습니다. 또한 마라탕을 먹고 설사가 발생했다면 마라탕에 들어있는 식중독균에 감염되었을 가능성도 있습니다. 마라탕을 먹고 상복부 팽만감과 설사가 발생했다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 증상을 확인하고 원인을 파악한 후 적절한 치료를 처방할 수 있습니다. 네이버 검색을 통해 위암을 진단하는 것은 불가능합니다. 위암은 내시경 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 위암은 조기 발견하면 완치할 수 있는 질환입니다. 따라서 상복부 팽만감과 설사가 지속된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

일반채용검진 매독,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독은 치료를 받으면 완치가 가능하지만 완치된 이후에도 매독 항체가 몸에 남아있을 수 있습니다. 따라서 매독 검사에서 매독 항체가 검출된다고 해서 반드시 매독이 재발한 것은 아닙니다. 만약 매독 검사에서 매독 항체가 검출된다면 매독이 재발했는지 확인하기 위해 추가 검사를 받아야 합니다. 일반채용검진에서 매독 검사를 할 때는 매독 항체 검사를 하는 것이 일반적입니다. 따라서 매독 검사에서 매독 항체가 검출된다면 매독이 재발했는지 확인하기 위해 추가 검사를 받아야 합니다. 만약 매독 검사에서 매독 항체가 검출되지 않는다면 매독이 재발하지 않은 것으로 볼 수 있습니다.

왼쪽 가슴에 통증이 있어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 가슴에 통증이 있는 경우 심장질환을 의심해볼 수 있습니다. 심장질환은 심장의 기능에 문제가 생겨 발생하는 질환으로 협심증 심근경색 심부전 등이 있습니다. 협심증은 심장의 혈관이 좁아져서 심장에 충분한 혈액이 공급되지 못하는 질환으로 가슴 통증 호흡곤란 어지럼증 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 심근경색은 심장의 혈관이 막혀서 심장 근육이 죽는 질환으로 가슴 통증 호흡곤란 어지럼증 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 심부전은 심장의 기능이 떨어져서 심장이 충분한 혈액을 공급하지 못하는 질환으로 호흡곤란 피로감 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 왼쪽 가슴

에 통증이 있는 경우 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 증상을 확인하고 심전도 흉부 엑스레이 심장 초음파 등의 검사를 통해 심장질환 여부를 확인할 수 있습니다. 만약 심장질환이 있다면 적절한 치료를 통해 증상을 완화하고 합병증을 예방할 수 있습니다. 왼쪽 가슴에 통증이 있는 경우 심장질환 이외에도 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 예를 들어 늑간 신경통은 늑간 신경이 눌리거나 자극을 받아서 발생하는 질환으로 가슴 통증 팔다리 통증 흉부 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 늑간 신경통은 진통제를 복용하거나 물리치료 침 치료 등을 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 왼쪽 가슴에 통증이 있는 경우 심장질환 이외에도 다양한 원인이 있을 수 있으므로 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 증상을 확인하고 적절한 검사를 통해 원인을 확인한 후 적절한 치료를 통해 증상을 완화하고 합병증을 예방할 수 있습니다.

M자탈모 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안으로 확인했을때는 엠자탈모가 심하진 않습니다. 탈모 가족력이 있는지 체크해보시고 예전보다 좀더 엠자가 깊어 진것 같으면 엠자탈모 초기라고 생각해볼수있겠습니다. 남성형 탈모에서는 먹는 탈모약이 예방하는데 가장 효과적이고 부수적으로 모낭주사바르는 미디영양제 등도 도움이 될수있겠습니다. 현재 엠자가 심하진 않아서 모발이식으로 채울정도는 아닌것으로 보여집니다 감사합니다

편두통 후유증상 머리 숙일때 두통 질문 이차성 두통 질문.안녕하세요. 메디이즈입니다. 편두통은 머리를 숙이거나 몸의 위치 변화에 따라 발생할 수 있습니다. 편두통은 뇌의 신경전달물질인 세로토닌의 이상으로 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 세로토닌은 뇌의 신경세포를 흥분시키는 역할을 하는데 편두통이 발생하면 세로토닌의 농도가 증가하면서 뇌의 신경세포가 과도하게 흥분합니다. 이로 인해 두통 어지럼증 구토 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 머리를 숙이거나 몸의 위치 변화에 따라 편두통이 발생하는 이유는 세로토닌의 농도가 증가하면서 뇌의 신경세포가 과도하게 흥분하기 때문입니다. 편두통은 이차성 두통이 아닙니다. 이차성 두통은 뇌종양 뇌수막염 뇌출혈 등의 질환으로 인해 발생하는 두통을 말합니다. 편두통은 뇌의 신경전달물질인 세로토닌의 이상으로 발생하는 질환이기 때문에 이차성 두통이 아닙니다. 편두통은 난시가 주요 원인이 아닙니다. 편두통은 뇌의 신경전달물질인 세로토닌의 이상으로 발생하는 질환이기 때문에 난시가 주요 원인이 아닙니다. 편두통은 다양한 원인으로 발생할 수 있지만 가장 흔한 원인은 스트레스입니다. 편두통을 예방하기 위해서는 스트레스를 줄이고 충분한 수면을 취하며 규칙적인 운동을 하는 것이 좋습니다. 편두통이 발생하면 진통제를 복용하거나 냉찜질을 하는 것이 도움이 됩니다. 편두통이 자주 발생하거나 심한 경우에는 병원에서 치료를 받아야 합니다.

20대 발기부전조루,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발기부전과 조루는 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 발기부전의 원인으로는 심혈관 질환 당뇨병 고혈압 고지혈증 뇌졸중 약물 부작용 스트레스 우울증 불안 등이 있습니다. 조루의 원인으로는 심리적 요인 생리적 요인 약물 부작용 등이 있습니다. 발기부전과 조루가 동시에 발생하는 경우 심리적 요인이나 약물 부작용이 원인일 가능성이 높습니다. 왼쪽 고환에 이상한 물체가 차올랐다면 고환염이나 고환 종양일 가능성이 있습니다. 고환염은 세균이나 바이러스 감염으로 인해 발생할 수 있으며 고환 종양은 유전적 요인이나 환경적 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 고환염은 항생제를 사용하면 치료할 수 있고 고환 종양은 수술을 통해 치료할 수 있습니다. 발기부전과 조루가 있다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 증상을 확인하고 원인을 파악한 후 적절한 치료를 처방할 수 있습니다.

신경이 다친건가요 아니면 근육이 다친검지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시간이 지나면 금방

회복될 가능성이 많습니다. 순간적인 과한 전기자극등에 의해 주변조직의 과긴장등인 경우가 많습니다. 며칠동안 증상 지속된다면 병원 방문하셔서 상담 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.

귀 먹먹함과 두통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀 먹먹함과 두통은 감기나 비염 등의 호흡기 질환으로 인해 발생할 수 있습니다. 호흡기 질환은 코막힘 목의 통증 기침 발열 등의 증상을 동반할 수 있습니다. 호흡기 질환은 대부분 자연적으로 치료되지만 증상이 심하거나 오래 지속되는 경우에는 병원에서 치료를 받아야 합니다. 타이레놀은 두통을 치료하는 데 도움이 될 수 있지만 귀 먹먹함과 두통을 유발하는 원인을 치료하지는 않습니다. 따라서 귀 먹먹함과 두통이 심하거나 오래 지속되는 경우에는 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴집니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴지는 경우 림프절염이나 탈장 혹은 고환염 등이 있을 수 있습니다. 림프절염은 림프절이 붓고 통증이 생기는 질환으로 세균이나 바이러스 감염으로 인해 발생할 수 있습니다. 탈장은 복강 내의 장기가 복벽의 약한 부위를 통해 튀어나오는 질환으로 복압이 증가할 때 발생할 수 있습니다. 고환염은 고환에 염증이 생기는 질환으로 세균이나 바이러스 감염으로 인해 발생할 수 있습니다. 림프절염이나 탈장 고환염은 모두 병원에서 치료가 가능합니다. 림프절염은 항생제를 사용하고 탈장은 수술을 통해 치료하고 고환염은 항생제를 사용하거나 고환을 제거하는 수술을 통해 치료합니다. 따라서 사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴지는 경우 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

척수혈관기형 콘서트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콘타는 뇌혈관질환이 있는 경우 복용하지 않는 것이 좋습니다. 척수혈관기형은 뇌혈관질환의 일종이기 때문에 콘타를 복용하기 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 콘타는 뇌혈관질환이 있는 경우 혈압을 상승시키고 혈관을 수축시킬 수 있기 때문에 위험할 수 있습니다. 따라서 척수혈관기형이 있는 경우 콘타를 복용하기 전에 의사와 상담하여 안전한지 확인하는 것이 좋습니다.

눈에 번쩍하고 불을 빠르게 켜다 끈듯이 번쩍거렸습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 광시증은 망막박리뿐만 아니라 다양한 질환에서 나타날 수 있습니다. 따라서 망막박리를 의심하기 위해서는 광시증과 함께 다른 증상이 동반되는지 확인해야 합니다. 망막박리의 다른 증상으로는 비문증 시야 결손 눈부심 등이 있습니다. 만약 광시증과 함께 다른 증상이 동반된다면 망막박리를 의심해 볼 수 있습니다. 하지만 망막박리는 매우 드문 질환이기 때문에 광시증만으로 망막박리를 의심하기는 어렵습니다. 따라서 망막박리를 의심한다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 망막박리는 초기에 발견하면 치료가 가능하기 때문에 증상이 있다면 빨리 병원에 방문하는 것이 좋습니다.

아 선생님 전기로 인해 생긴 근육 문제라면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전기로 인해 근육 손상이 생겼다면 보통 몇 주에서 몇 달이 걸려서 회복됩니다. 하지만 손상이 심한 경우라면 회복에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 손상된 근육은 시간이 지나면서 점점 회복되지만 완전히 회복되지 않을 수도 있습니다. 따라서 전기로 근육 손상이 생겼다면 손상 부위를 보호하고 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 또한 통증이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

상처있는 손으로 길고양이 만지면 안될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위를 한다고 해서 문제가 되는 질환이 감염되지는 않습니다. 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

락스냄새 영향,안녕하세요. 메디이즈입니다. 락스 성분을 이미 흡입했다면 시간이 지나야 증상

이 호전될 것으로 보입니다. 만약 기침이나 호흡기 증상이 심해진다면 진료가 필요합니다.

임신인가요 생리인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신과 생리 증상은 비슷할 수 있지만 차이가 있습니다. 임신 증상은 생리 예정일보다 2주 이상 지난 후에 나타나며 생리 주기와 관계없이 나타납니다. 생리 증상은 생리 예정일 23일 전부터 나타나며 생리 주기에 따라 나타납니다. 따라서 생리 예정일보다 2주 이상 지난 후에 생리 증상이 나타난다면 임신 가능성이 있습니다. 하지만 임신 테스트를 하기 전에는 임신 여부를 확신할 수 없습니다. 따라서 임신 테스트를 해보거나 산부인과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

입술 헤르페스인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입술 헤르페스는 입술 주위에 물집이 생기는 질환입니다. 물집은 빨갛게 부어오르고 통증이 있으며 터지면 진물이 나옵니다. 입술 헤르페스는 바이러스에 의해 발생하며 한 번 감염되면 평생 재발할 수 있습니다. 입술 헤르페스의 증상은 바이러스가 입술에 침투한 후 23일 후에 나타납니다. 입술 헤르페스는 피부과에서 진단할 수 있으며 치료는 항바이러스제를 사용합니다. 입술 헤르페스를 예방하기 위해서는 손을 자주 씻고 입술에 상처가 생기지 않도록 조심해야 합니다. 또한 입술 헤르페스가 재발할 때는 빨리 치료하는 것이 좋습니다.

돌발성 난청에 대해,안녕하세요. 메디이즈입니다. 돌발성 난청은 갑자기 한쪽 귀의 청력이 떨어지는 질환입니다. 돌발성 난청은 치료가 늦을수록 회복이 어려워지므로 증상이 나타나면 즉시 치료를 시작하는 것이 좋습니다. 돌발성 난청의 치료에는 스테로이드 약물과 이뇨제 항혈소판제 등의 약물을 사용합니다. 또한 비타민과 미네랄 등을 보충하는 것도 도움이 됩니다. 돌발성 난청은 치료 후에도 약 10 정도에서 청력이 완전히 회복되지 않는 경우가 있습니다. 하지만 치료를 하면 대부분 청력이 어느 정도 회복되므로 치료를 시작하는 것이 좋습니다. 현재 5년 정도 지난 상태지만 지금이라도 치료를 시작하면 청력이 어느 정도 회복될 수 있습니다.

전기로 인해 생긴 통증 피부인지 근육문제인지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한 달 전 정전기 소리와 함께 손가락 통증이 생겼다면 피부 손상보다는 근육 손상이 더 확률이 높습니다. 정전기는 전기 충격을 일으키지만 피부 손상은 거의 없습니다. 하지만 정전기는 근육을 수축시킬 수 있고 이로 인해 통증이 발생할 수 있습니다. 따라서 손가락 통증이 가만히 있으면 안 아프고 날카로운 물체에 스칠 때만 아프다면 근육 손상이 더 확률이 높다고 볼 수 있습니다. 만약 통증이 심하거나 지속된다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

탈모인지 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로만으로는 탈모인지 아닌지 정확하게 알 수 없습니다. 탈모는 두피를 직접 관찰하고 두피 검사와 모발 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 따라서 탈모가 의심된다면 피부과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 탈모는 원인에 따라 치료 방법이 다르기 때문에 정확한 진단을 통해 적절한 치료를 받아야 합니다. 탈모는 치료가 가능하지만 치료 시기를 놓치면 회복이 어려워질 수 있으므로 탈모가 의심된다면 빠른 시일 내에 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

종양표지자 수치 증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 종양표지자 수치가 증가했다고 해서 반드시 암이 있는 것은 아닙니다. 종양표지자는 암과 관련된 물질을 검출하는 검사로 암이 있는 경우 종양표지자 수치가 증가할 수 있지만 암이 없는 경우에도 종양표지자 수치가 증가할 수 있습니다. 따라서 종양표지자 수치가 증가했다고 해서 암을 의심할 수는 없지만 종양표지자 수치가 증가한 경우 암을 포함한 다른 질환을 의심해 볼 수 있습니다. 위 대장내시경 및 복부 초음파에서 이상이 없다면 암을 의심하기는 어렵지만 종양표지자 수치가 계속 증가하는 경우에는 정기적으로 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

임신 초기 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 초기 증상으로는 생리 지연 가슴 통증 소화불량 두통 피로감 등이 있습니다. 임신 초기에는 호르몬 변화가 심하기 때문에 이런 증상들이 나타날 수 있습니다. 하지만 임신 초기 증상은 사람마다 다르고 임신하지 않은 사람도 이런 증상이 나타날 수 있기 때문에 임신 여부를 확인하려면 임신 테스트를 해보는 것이 가장 정확합니다. 사후피임약은 호르몬 변화를 유발할 수 있기 때문에 오렌지 주스로 토한 것은 약 부작용일 수도 있습니다. 하지만 임신 초기 증상이 나타날 수 있기 때문에 임신 여부를 확인해 보시는 것이 좋겠습니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 수면은 렘수면과 비렘수면으로 나뉘는데 렘수면은 꿈을 꾸는 수면으로 기억력과 학습에 중요한 역할을 하고 비렘수면은 몸을 회복시키는 역할을 합니다. 새벽 늦게 자더라도 숙면을 하면 비렘수면을 충분히 취할 수 있고 이는 기억력과 학습에 도움이 됩니다. 또한 숙면을 하면 스트레스를 해소하고 면역력을 강화하는 효과가 있습니다. 따라서 새벽 늦게 자더라도 숙면을 하는 것이 수면의 질을 높이는 데 도움이 됩니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장내시경에서 관상성종이 발견되는 경우는 드물지만 건강한 30대라도 발견될 수 있습니다. 관상성종은 대장 점막의 염증으로 인해 발생하는 양성 종양으로 대부분 증상이 없기 때문에 대장내시경 검사를 통해 발견됩니다. 관상성종은 대부분 치료가 필요하지 않지만 크기가 커지거나 악성으로 변할 가능성이 있는 경우에는 수술적 제거가 필요할 수 있습니다. 따라서 대장내시경 검사를 통해 관상성종이 발견되면 주치의와 상의하여 치료 여부를 결정하는 것이 좋습니다.

일주일전 ct,안녕하세요. 메디이즈입니다. 설사 증상이 생긴 이후에 CT를 찍는 게 좋을 것 같습니다. 조영제를 넣고 찍는 게 좋을지 여부는 의사의 판단에 따라 다르겠지만 설사 증상이 있는 경우에는 조영제를 넣고 찍는 게 좋을 수도 있습니다. CT를 찍기 전에 의사와 상담해보시면 좋을 것 같습니다.

혀 입 아랫턱에 힘이 들어갑니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일반적으로 편안한 상태의 혀 위치가 존재합니다. 현재 올바른 혀의 위치를 잡지 못하시는 것으로 보이고 지속적으로 신경이 쓰이시다 보니 구강 주변 근육에 부적절한 힘이 가해지고 있는 것으로 보입니다. 보통적으로 1. 입술은 가볍게 다문 상태를 유지합니다. 2. 혀 끝은 위쪽 앞니의 뒷부분 입천장 앞쪽에 닿으면 됩니다. N을 발음하는 상태를 떠올리시면 됩니다. 3. 위쪽과 아래쪽의 작은 어금니 부분이 서로 살짝 찢어지도록 하면 됩니다. 이러한 상태를 유지하시도록 노력해보시고 그래도 힘드시다면 주변 치과 혹은 구강내과를 방문해보시는 것을 권유드립니다. 좋은 하루 보내세요.

구각염 키스,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구각염이란 입술의 가장자리 양 끝 쪽에 발생하는 질환으로 다양한 원인이 있습니다. 환자분의 면역력과도 관련이 있고 침이 지속적으로 구각 입술 가장자리에 노출이 되어도 발생할 수 있습니다. 따라서 그러한 행동을 자제해주시는 부분이 구각염의 발생 빈도를 낮추는 해결 방법이 될 수 있을 것 같습니다. 좋은 하루 보내세요.

치아 파노라마 입니다 잇몸상태가 안좋나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파노라마 사진을 통해 얻을 수 있는 방사선학적 진단과 치과에서 치과 의사의 검진시진촉진이 합쳐져야 가장 정확한 진단이 나올 수 있는 점을 미리 말씀드립니다. 현재 파노라마 사진상으로는 양측 위아래 모두 사랑니가 맹출된 부분이 보이고 위쪽 일부 치아의 우식이 살짝 보이는 듯 합니다만 파노라마 사진의 원본이 아니기 때문에 화질이 좋지 않아 정확한 진단은 아닌 점을 양해 부탁드립니다.

드립니다. 검진 받으셨던 치과에서 크게 이상이 없다고 말씀하신 것을 보면 아마도 위에 말씀드린 종합적인 검진 결과에서 현재는 치료가 필요한 부분이 없으시다고 판단 하신 것 같습니다. 좋은 하루 보내세요.

팔자주름 슈링크,안녕하세요. 메디이즈입니다. 슈링크는 보통 권장 주기가 13개월로 짧기 때문에 짧은 주기로 받으셔도 크게 문제가 없습니다. 다만 팔자주름은 슈링크로는 효과가 크지 않을 가능성이 있습니다.

신경이 다친건가요 아니면 근육이 다친건지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시간이 지나면 금방 회복될 가능성이 많습니다. 순간적인 과한 전기자극등에 의해 주변조직의 과긴장등인 경우가 많습니다. 며칠동안 증상 지속된다면 병원 방문하셔서 상담 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.

성기 곤지름인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 모낭 가능성이 높습니다 하지만 확인차 비뇨의학과를 방문하셔서 진료를 받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

아스파라거스와 해조류김미역다시마의 궁합을 알고 싶습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주로 아스파라거스는 아스파라긴산과 아스파르트산을 비롯한 각종 비타민 무기질이 풍부하며 열량이 낮아 육류와 섭취 시 영양적으로 균형 있는 식사가 가능합니다. 해조류의 경우 단백질이 풍부한 식품은 아니기에 궁합이 안 어울린다고 말씀드릴 순 없지만 균형 있는 식사를 위해서는 육류 및 어류와 섭취하는 것이 좋아보입니다. 또한 아스파라거스는 채소류에 속해 섬유소가 풍부한데 해조류 또한 섬유소가 풍부하여 고섬유소 식사가 필요한 경우에는 궁합이 좋을 수 있습니다. 식재료 사용은 자유로우며 식사 구성에 따라 함께 사용해도 되고 분리하여 사용하여도 될 것 같습니다. 참고 바랍니다.

고 2 학생,안녕하세요 요약 1. 가임기인지가 중요하고 2. 정액이 썩으면 결국 임신 가능성도 있습니다. 3. 생리 중에 사정하지 않는 이상 가능성은 있으니 4. 시기가 다가오면 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요

성기 곤지름인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 모낭 가능성이 높습니다 하지만 확인차 비뇨의학과를 방문하셔서 진료를 받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

병원에서 정계정맥류 진단받았는데 불편함이 있습니다.안녕하세요 요약 통증을 비롯한 증상이 반복되면 치료를 해야 합니다. 정계정맥류는 고환에서 체내 순환계로 빠져나가는 혈류가 원활하게 순환되지 못하고 저류되거나 울혈이 생기면 정맥혈관이 확장되어 발생하게 됩니다. 오래 서 있거나 장기간 금욕이나 소변을 오랫동안 참게 되면 고환에 묵직한 느낌과 함께 통증이 생길 수 있습니다. 건승하세요.

간질을 앓고 있는 성인 남성인데 6년 만에 발작이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수면이 가장 큰 원인이 아니었을까 싶네요 간질 환자들이 잘 조절되던 상태에서 다시 발작을 일으키는 원인은 다양할 수 있습니다. 주요 원인들은 다음과 같습니다. 약물 불순응Noncompliance 약물 복용을 제대로 하지 않거나 임의로 약물을 중단하는 경우 발작이 재발할 수 있습니다. 스트레스 스트레스는 뇌의 흥분성을 높여 발작 역치를 낮출 수 있습니다. 수면 부족 수면 부족 역시 뇌의 과다한 활성화를 불러와 발작을 유발할 수 있습니다. 호르몬 변화 여성의 경우 월경 주기 임신 출산 등 호르몬 변화로 인해 발작이 재발할 수 있습니다. 감염성 질환 열을 동반

반한 감염 시 뇌의 흥분성이 높아져 발작 위험이 증가합니다. 약물 상호작용 일부 약물들이 항경련제의 혈중 농도를 변화시켜 발작을 유발할 수 있습니다. 두부 외상 최근에 두부 외상을 입은 경우 발작 위험이 높아집니다.

눈에 힘이 들어가서 미간 눈썹두통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 추미근이 과도하게 수축을 하는 경우에 눈썹주위에 통증이 나타나는 경우도 있을 수 있습니다. 두통진료하는 병원에 가시면 되는데 필요하다면 그 부위에 주사치료를 할 수 있습니다

키스만 하면 임신 가능성있나요????,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 네 정상생리적 반응입니다 2. 임신가능성은 없습니다 3. 이런경우도 임신은 불가능합니다 임신은 정자와 난자가 만나야 가능합니다

가슴 전반적으로 통증이 있는데 대학병원을 가야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 상황으로는 대학병원진료가 필요하지는 않을 것으로 생각됩니다. 너무 예민하셔서 그러실 수 있습니다. 계속되면 가슴과 어깨 근육부위에 자세한 진찰이 필요할 수 있습니다

총콜레스테롤이 188217로 상승,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콜레스테롤 수치만 보면 조금 높은 수치입니다. 치료할지 말지를 결정하는 것은 저밀도 콜레스테롤 수치입니다 추가로 중성지방과 고밀도 콜레스테롤 검사가 필요합니다. 적정체중을 유지하고 규칙적인 운동과 식사요법이 필요합니다

혈압측정시 자세에 따른 혈압변동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 수시로 여러가지 상황에 따라 변화합니다. 어찌다가 한번 높이 나오는 수치는 무시하셔도 됩니다. 혈압수치를 적어서 주치의선생님과 상의 | 해보셔요

방금 근막통증후군 질문한 사람인데여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육을 움직이지 않고 지낼수가 있나요? 과사용이 원인이라면 덜 사용하면서 지내보셔요. 그래서 재발하지 않았으면 좋겠네요

허벅지 앞 무릎 저림 현상 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장시간 앉아있을 때 한 쪽으로 나타나는 다리의 저린 양상의 통증은 척추질환을 의심케합니다. 운동을 하고 계신다 말씀하시니 운동으로 인해 허리의 질환이 발병 혹은 악화되었을 여지도 있겠습니다. 정형외과나 신경외과를 방문해보시기 바랍니다.

파열된 근육에 보톡스를 놓으면 어케되나요?,안녕하세요 요약 근육 마비가 작용기전이니 파열된 근육의 불규칙한 수축을 막을 순 있습니다. 보툴리눔 독소보톡스의 작용기전은 콜린성 신경시냅스에서 아세틸콜린의 분비를 막아 신경근 접합부에 작용하여 근육을 마비시키는 것입니다 건승하세요

고 2 학생,안녕하세요 요약 1. 가임기인지가 중요하고 2. 정액이 섰으면 결국 임신 가능성도 있습니다. 3. 생리 중에 사정하지 않는 이상 가능성은 있으니 4. 시기가 다가오면 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요

심혈관 및 지질 관련 건강검진 결과 설명 들을 수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고지혈증은 그 수치보다 더 중요한 것은 고지혈증 즉 콜레스테롤이 이른 연령대에 높아져서 오래 지속이 되는 경우 심혈관질환 동맥경화 뇌졸중등의 위험도가 높아지는 것으로 보고되고 있습니다 수치로 보아 식습관을 체크해 보아야할 듯하고 고지혈증약의 복용을 권해드리고 싶군요

총콜레스테롤이 188217로 상승,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콜레스테롤 수치만 보면 조금 높은 수치입니다. 치료할지 말지를 결정하는 것은 저밀도 콜레스테롤 수치입니다 추가로 중성지방과 고밀도 콜레스테롤 검사가 필요합니다. 적정체중을 유지하고 규칙적인 운동과 식사요법

이 필요합니다

특정 운동후 가래에 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 숨을 헐떡일 정도로 강도높은 운동을 한 뒤 가래에 피가 섞여나오는데 막상 병원을 방문해 진찰받아보시면 특별한 문제가 없는 상황일 수 차례 반복되신 것 같습니다. 아마 격한 운동 중 호흡이 가빠지면서 상기도가 건조해지고 상처가 난 것이 아닌가 싶습니다. 이 경우엔 휴식만 취해주시면 회복하게 되어 증상은 사라질 것이라 예상할 수 있겠습니다. 이 역시 질문자님의 경과와 유사한 것 같습니다.

인대 늘어난지 2주,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발목을 다치셨고 MRI에서 인대 파열을 진단 받은 상황이지군요. 인대가 파열되는 수준의 손상은 오랜 회복기간을 요합니다. 2주로는 부족하고 재방문 시 MRI를 바로 촬영하지는 않습니다. 촬영이 필요하다 하더라도 최소 수 개월의 회복기간을 가진 뒤 재촬영을 하게 됩니다. 그러니 병원에서의 치료를 이어가시기 바랍니다.

비장주변 13.2cm병변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부초음파에서 비장 주변에 13.2cm 병변이 발견될 만한게 별로 없습니다. 신장 낭종이 비장 주변에 생길 수 있는데 신장 낭종은 초음파로 진단이 가능합니다. 낭종이 아닌 종양이 생기거라면 위나 장에서 생긴 종양이 비장 주변에서 보일 수 있습니다.

체중 감소 총 콜레스테롤은 감소했는데 중성지방이 늘어난 이유가 있을까요? 관리방법은요?,안녕하세요 요약 고중성지방혈증의 다른 원인도 있는지 확인해 보세요 고중성지방혈증은 체중증가 음주 탄수화물 섭취 과다 만성신장질환 당뇨병 갑상선저하증 임신 에스트로겐 타목시펜 스테로이드 등의 원인으로 생길 수 있습니다. 건승하세요

비골신경 마비,안녕하세요 요약 1. 비골신경 손상이 있는지도 확인해 보세요 2. 운동 기능은 괜찮은지 확인해 보세요 3. 비골 신경에 손상이 생기면 발목관절에서 발을 들어올리지 못합니다. 비골 신경 손상은 비골 신경에 직접적인 손상이 가해지는 경우나 비골 신경의 주변 조직이 비골 신경을 압박하면서 생길 수 있습니다. 손상이 가해지는 기전은 주변의 근골격계 구조물이 손상골절 인대 손상이나 비골 신경 단독으로 잡아당겨지는 손상으로 발생할 수 있습니다. 건승하세요

손가락 마디가 달라요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 새끼손가락이 불편하시군요. 해당증상은 새끼손가락에서 흔히 나타납니다. 손가락을 굽히는 힘줄이 속에서 걸리는 현상이 있는 것 같습니다. 가까운 정형외과를 방문하시기 바랍니다. 감사합니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장내시경에서 관상성종이 발견되는 경우는 드물지만 건강한 30대라도 발견될 수 있습니다. 관상성종은 대장 점막의 염증으로 인해 발생하는 양성 종양으로 대부분 증상이 없기 때문에 대장내시경 검사를 통해 발견됩니다. 관상성종은 대부분 치료가 필요하지 않지만 크기가 커지거나 악성으로 변할 가능성이 있는 경우에는 수술적 제거가 필요할 수 있습니다. 따라서 대장내시경 검사를 통해 관상성종이 발견되면 주치의와 상의하여 치료 여부를 결정하는 것이 좋습니다.

원형탈모 치료,안녕하세요 요약 1. 언급한 것처럼 심하지 않을때에는 바르는 연고만으로도 호전이 되기도 합니다. 2. 바르다가 반응이 시원찮으면 상급병원에서 다른 치료를 병행하면 됩니다. 원형탈모증은 다양한 크기의 원형 또는 타원형의 탈모가 발생하는 것으로 한두 군데 탈모가 발생한 경우에는 저절로 호전될 수도 있으며 탈모 범위가 넓지 않은 경우24주 간격으로 스테로이드제를 병변 내 주사하거나 국소 스테로이드제를 1일 2회 병변에 도포하면 대개 수개월내에 호전됩니다. 건승하세요

소변시 고향? 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배뇨시 고향통이 있다면 정계 정맥류나 고향염 등에 대한 검사가 반드시 필요합니다. 비뇨기와 내원하여 진료를 보시기 바랍니다.

포피에 참깨같은 검은점들이 보입니다 사진첨부,안녕하세요 요약 1. 단순 멜라닌 색소들이 침착된 겁니다. 2. 점으로 인식하면 되고 3. 점이니까 별다른 증상이 없는 겁니다. 4. 통증 진물 발적 등의 증상이 생기면 그때는 치료가 필요합니다. 건승하세요

피검사 수치 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고지혈증은 대사 이상에 의해 나타나므로 마른 체형이나 정상 체중에서도 발병할 수 있습니다. 약물 용량 조절이 필요하겠습니다. 병원에서 정계정맥류 진단받았는데 불편함이 있습니다,안녕하세요 요약 통증을 비롯한 증상이 반복되면 치료를 해야 합니다. 정계정맥류는 고환에서 체내 순환계로 빠져나가는 혈류가 원활하게 순환되지 못하고 저류되거나 울혈이 생기면 정맥혈관이 확장되어 발생하게 됩니다. 오래 서 있거나 장기간 금욕이나 소변을 오랫동안 참게 되면 고환에 묵직한 느낌과 함께 통증이 생길 수 있습니다. 건승하세요.

영양제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식사량이 충분하다면 괜찮을 것으로 보입니다 피로개선을 위해 비타민 B 복합 약을 추가하는 것도 추천드립니다 요새 뜨는 영양성분으로는 글루타치온과 콜라겐 등이 있습니다

비장주변 13.2cm병변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부초음파에서 비장 주변에 13.2cm 병변이 발견될 만한게 별로 없습니다. 신장 낭종이 비장 주변에 생길 수 있는데 신장 낭종은 초음파로 진단이 가능합니다. 낭종이 아닌 종양이 생기거라면 위나 장에서 생긴 종양이 비장 주변에서 보일 수 있습니다.

비장주변 13.2cm병변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부초음파에서 비장 주변에 13.2cm 병변이 발견될 만한게 별로 없습니다. 신장 낭종이 비장 주변에 생길 수 있는데 신장 낭종은 초음파로 진단이 가능합니다. 낭종이 아닌 종양이 생기거라면 위나 장에서 생긴 종양이 비장 주변에서 보일 수 있습니다.

특정 운동후 가래에 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 숨을 헐떡일 정도로 강도높은 운동을 한 뒤 가래에 피가 섞여나오는데 막상 병원을 방문해 진찰받아보시면 특별한 문제가 없는 상황일 수 차례 반복되신 것 같습니다. 아마 격한 운동 중 호흡이 가빠지면서 상기도가 건조해지고 상처가 난 것이 아닌가 싶습니다. 이 경우엔 휴식만 취해주시면 회복하게 되어 증상은 사라질 것이라 예상할 수 있겠습니다. 이 역시 질문자님의 경과와 유사한 것 같습니다.

협심증 가슴통증 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 통증일 수도 있지만 통증이 지속된다면 협심증이나 역류성 식도염과 같은 질환에 대한 평가가 필요하므로 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

피검사 수치 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고지혈증은 대사 이상에 의해 나타나므로 마른 체형이나 정상 체중에서도 발병할 수 있습니다. 약물 용량 조절이 필요하겠습니다. 원형탈모 치료,안녕하세요 요약 1. 언급한 것처럼 심하지 않을때에는 바르는 연고만으로도 호전이 되기도 합니다. 2. 바르다가 반응이 시원찮으면 상급병원에서 다른 치료를 병행하면 됩니다. 원형탈모증은 다양한 크기의 원형 또는 타원형의 탈모가 발생하는 것으로 한두 군데 탈모가 발생한 경우에는 저절로 호전될 수도 있으며 탈모 범위가 넓지 않은 경우24주 간격으로 스테로이드제를 병변 내 주사하거나 국소 스테로이드제를 1일 2회 병변에 도포하면 대개 수개월내에 호전됩니다. 건승하세요

소변시 고환? 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배뇨시 고환통이 있다면 정계 정맥류나 고환염 등에 대한 검사가 반드시 필요합니다. 비뇨기와 내원하여 진료를 보시기 바랍니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장내시경에서 관상성종이 발견되는 경우는 드물지만 건강한 30대라도 발견될 수 있습니다. 관상성종은 대장 점막의 염증으로 인해 발생하는 양

성 종양으로 대부분 증상이 없기 때문에 대장내시경 검사를 통해 발견됩니다. 관상성종은 대부분 치료가 필요하지 않지만 크기가 커지거나 악성으로 변할 가능성이 있는 경우에는 수술적 제거가 필요할 수 있습니다. 따라서 대장내시경 검사를 통해 관상성종이 발견되면 주치의와 상의하여 치료 여부를 결정하는 것이 좋습니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 수면은 렘수면과 비렘수면으로 나뉘는데 렘수면은 꿈을 꾸는 수면으로 기억력과 학습에 중요한 역할을 하고 비렘수면은 몸을 회복시키는 역할을 합니다. 새벽 늦게 자더라도 숙면을 하면 비렘수면을 충분히 취할 수 있고 이는 기억력과 학습에 도움이 됩니다. 또한 숙면을 하면 스트레스를 해소하고 면역력을 강화하는 효과가 있습니다. 따라서 새벽 늦게 자더라도 숙면을 하는 것이 수면의 질을 높이는 데 도움이 됩니다.

결막결석 관련 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 대부분 마취안약을 점안하고 합니다. 2. 세계 놀린 정도의 기준이 명확하지 않아서 정확히 설명 드리기 어렵습니다. 다만 보통의 결석제거시 안구에 가해지는 압력이 안구에 영향을 주는 경우는 거의 없습니다. 3. 결석제거 후 눈주변과 안구뒤쪽에 통증이 생기는 경우는 경험해보지 못 했습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

골반저근 보톡스,안녕하세요. 메디이즈입니다. 엉덩이 주사를 어떤 성분의 주사를 맞으셨는지 모르겠습니다. 저의 경우라고 생각하고 말씀드리겠습니다. 위장염의 경우 촉진과 청진하고 그에 맞추어 주사를 드리는데 보통은 위장관 운동의 이상이 많기 때문에 진경제 주사를 드립니다. 그리고 이는 질문자분의 증상과는 크게 관련은 없어 보입니다. 물론 부작용이라는 것이 개인적인 차이가 있기 때문에 맞은 약의 성분도 모르는 상황에서 말씀드리기 너무나 조심스럽습니다. 해당 내과에 가셔서 한번 더 문의해보시고 크게 이상이 없다고 하신다면 비뇨기와 진료를 이어가는 것이 맞을 것으로 생각합니다.

발목뻗조각,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무리가 됩니다. 물론 중간에 휴식시간이 있겠지만 기존에 발목 골절이 있던 경우는 요추의 틀어짐도 동반되는 경우가 많으며 6시간 서있는 일 자체가 발목 뿐 아니라 척추에 지속적인 악영향을 주게됩니다.

눈밑 코 당기는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상 부위의 순환장애로 봅니다. 치료는 뒷목의 근육 압박을 풀어서 척추간의 압력을 줄여서 머리와 안면눈을 담당하는 자율신경이 풀리면 호전되게 됩니다. 눈밑 필러는 증상 호전후에 하시기 바랍니다.

엘트롬보팩 질문드렸던 환자입니다 감사합니다 선생님,안녕하세요. 메디이즈입니다. 엘보팩은 ITP의 신약이다 보니까.. 여러 논문의 연구결과가 좀 상의하게 다른거 같네요. 대부분의 논문에서는 초기 치료에는 확실히 효과가 있다고 되어있고.. 2년이 지나서는 보통 2년이란 기간을 장기간으로 보는 것 같습니다. 반응이 감소하여 재발 가능성이 있다고 되어 있습니다. 질문자가 보여주신 EXTEND연구에서는 2년 후에는 50에서만 유의미한 반응을 유지한다고 되어있네요.. 연구결과는 논문마다 상의하게 다른 경우가 많기때문에 정확하게 수치화하기는 어려울 것 같습니다. 개인차도 분명히 있을테니까요.. 주치의와 상의하여 가장 좋은 치료 계획을 세우시기 바랍니다.

비장 혹은 비장 주변 병변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비장 주변의 13cm에 육박하는 큰 덩이가 존재하는 상황에서 고려되어야 할 진단명은 다음과 같은 것들이 있겠습니다. 비장 혈관종 비장에서 발생하는 가장 흔한 양성 종양으로 무증상이며 우연히 발견되는 편입니다. 비장 낭종 비장 내에 액체성분으로 이루어진 양성 종양이고 이 역시 우연히 발견되는 편입니다. 비장 림프종 비장에서 발생하는 림프계 암으로 덩이가 형성된 이유일 수 있습니다. 비장 원발성

육종 드문 암이나 확인이 필요합니다. 따라서 이러한 양성 악성 여부를 확인하기 위해 추가적인 검사가 필요한 것입니다.

감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 열도 없고 최근의 혈액검사 조영 CT 검사에서 특별한 문제가 없었다면 증상이 지속되더라도 추가적인 검사가 꼭 필요하다고 보기는 어렵습니다. 만성적인 증상으로 나타날 가능성이 높아보이므로 불편한 증상이 심해질 때 진료를 고려하시는 것이 안전하겠지만 때마다 검사를 시행할 필요까지는 없어보입니다.

혈관에 이상이 있는지확인하려면 무슨 검사들 하면되나요 ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 큰병원에서 검사를해도 25정도는 그 원인을 찾지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 지금 경동맥 검사는 별로 필요없을 것 같습니다. 심리적인 원인에서도 어지럼증이 올 수 있습니다. 암수핀에스 드시고는 두통은 부작용으로 나타날 수 있습니다

피부과에서 처방받은 약인데 성분 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큐겔이라는 연고는 약은 아닌것 같습니다. hydroxypropyl methylcellulose를 포함하는 보습제가 아닌가 싶습니다. 스테로이드없어요

피임목적으로 경구피임약 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약을 복용하고 일주일이 지나야 효과가 있다고 되어 있습니다. 피임약을 제대로 복용하고 있다는 전제하에는 일주일 지나서는 피임효과가 있다고 할 수 있겠네요. 그러나 알수없는 개인차와 변수가 많으니.. 되도록이면 안전한 방법으로 피임하는게 좋겠습니다.

어지러움,식은땀,복통,구토,손저림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지러움 식은땀 복통 구토 손저림은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 미주신경성 실신입니다. 미주신경성 실신은 미주신경의 이상으로 발생하는 실신입니다. 미주신경은 심장박동 호흡 혈압 등을 조절하는 신경입니다. 미주신경성 실신은 갑자기 심장박동이 느려지거나 혈압이 떨어지면서 발생합니다. 미주신경성 실신은 갑자기 일어나거나 긴장하거나 놀랐을 때 발생할 수 있습니다. 미주신경성 실신은 혈압약을 복용하고 있는 경우에도 발생할 수 있습니다. 미주신경성 실신은 특별한 치료가 필요하지 않습니다. 미주신경성 실신은 갑자기 일어나거나 긴장하거나 놀랐을 때 발생할 수 있으므로 갑자기 일어나거나 긴장하거나 놀랐을 때 앉거나 누워서 심장박동과 혈압을 회복해야 합니다. 미주신경성 실신은 혈압약을 복용하고 있는 경우에도 발생할 수 있으므로 혈압약을 복용하고 있는 경우에는 혈압약을 조절해야 합니다. 질문자님께서 말씀하신 증상은 미주신경성 실신일 가능성이 있습니다. 질문자님께서 혈압약을 복용하고 계신 경우에는 혈압약을 조절해야 합니다. 또한 갑자기 일어나거나 긴장하거나 놀랐을 때 앉거나 누워서 심장박동과 혈압을 회복해야 합니다. 만약 증상이 지속되거나 심해진다면 가까운 신경과로 내원하여 진료를 받아보시기 바랍니다.

전립샘염에 항생에 며칠 투여하면 호전되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 개인마다 다르지만 보통 4주정도는 사용합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

혈압측정시 자세에 따른 혈압변동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 수시로 여러가지 상황에 따라 변화합니다. 어찌다가 한번 높이 나오는 수치는 무시하셔도 됩니다. 혈압수치를 적어서 주치의선생님과 상의 | 해보셔요

고등학교 2학년 학생,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외 사정은 임신을 방지하는 방법 중 하나이지만 완전히 안전한 방법은 아닙니다. 질외 사정 후에도 정액이 질에 들어가면 임신할 수 있기 때문입니다. 질문자님은 질외 사정을 하셨지만 정액이 질에 들어가서 임신할 가능성이

있습니다. 따라서 사후 피임약을 복용하시는 것이 좋습니다. 사후 피임약은 임신 초기에 복용하면 임신을 예방할 수 있습니다. 사후 피임약은 약국에서 처방받을 수 있으며 처방받을 때 의사는 나이 임신 여부 최근 성관계 여부 등을 질문할 것입니다. 질문자님은 고등학교 2학년 학생이므로 의사는 임신 여부를 확인하기 위해 임신 테스트를 해보라고 할 수도 있습니다. 사후 피임약은 임신 초기에 복용해야 효과가 있으므로 가능한 한 빨리 복용하시는 것이 좋습니다. 사후 피임약은 부작용이 있을 수 있으므로 복용 전에 의사와 상담하시는 것이 좋습니다.

붉은 점?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 붉은색 반점은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 피부염입니다. 피부염은 피부의 염증을 말하며 다양한 증상을 나타낼 수 있습니다. 붉은색 반점은 피부염의 대표적인 증상 중 하나입니다. 피부염은 다양한 원인으로 발생할 수 있으며 원인에 따라 치료 방법이 다릅니다. 피부염이 의심되는 경우에는 피부과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 피부염은 적절한 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 질문자님의 경우 붉은색 반점이 팔과 다리에 생겼고 가려움증이 있었다고 합니다. 붉은색 반점은 피부염의 대표적인 증상 중 하나이며 피부염은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 따라서 피부염이 의심되는 경우에는 피부과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 피부염은 적절한 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다.

장유착 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선 적출술은 전립선암을 치료하기 위해 전립선을 제거하는 수술입니다. 전립선 적출술은 복강경 수술이나 로봇 수술로 진행할 수 있습니다. 전립선 적출술 후에는 복벽에 유착이 생길 수 있습니다. 복벽 유착은 복벽에 붙어 있는 장기들이 서로 붙는 것을 말합니다. 복벽 유착이 생기면 복통 복부 팽만 설사 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 전립선 적출술 후 복벽 유착이 의심되는 경우에는 복부 CT 검사를 시행할 수 있습니다. 복부 CT 검사에서 복벽 유착이 확인되면 복벽 유착을 치료하기 위한 수술을 시행할 수 있습니다. 질문자님의 경우 전립선 적출술 후 복벽 유착이 의심됩니다. 질문자님은 복부 CT 검사를 시행하여 복벽 유착이 있는지 확인하고 복벽 유착이 확인되면 복벽 유착을 치료하기 위한 수술을 시행하는 것이 좋습니다.

자연쌍꺼풀 만지면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쌍꺼풀 선을 손으로 조작하면 일시적으로 변할 수 있지만 영구적인 변화를 만들어내기는 어렵습니다. 그래서 형태의 영구적 변화를 원하는 경우에는 라인을 만들어주는 쌍꺼풀 수술이 필요한 것입니다.

근육통이 이런식으로도 오나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육통은 근육이 갑자기 과도한 힘을 쓰거나 사용하지 않던 근육을 사용했을 때 발생할 수 있습니다. 근육통은 통증이 시작되고 24시간 이내에 가장 심해지고 며칠 후에 사라집니다. 근육통은 일반적으로 치료가 필요하지 않지만 통증이 심한 경우 진통제를 복용하거나 냉찜질을 할 수 있습니다.

비장주변 13.2cm병변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부초음파에서 비장 주변에 13.2cm 병변이 발견될 만한게 별로 없습니다. 신장 낭종이 비장 주변에 생길 수 있는데 신장 낭종은 초음파로 진단이 가능합니다. 낭종이 아닌 종양이 생기거라면 위나 장에서 생긴 종양이 비장 주변에서 보일 수 있습니다.

특정 운동후 가래에 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 숨을 헐떡일 정도로 강도높은 운동을 한 뒤 가래에 피가 섞여나오는데 막상 병원을 방문해 진찰받아보시면 특별한 문제가 없는 상황일 수 차례 반복되신 것 같습니다. 아마 격한 운동 중 호흡이 가빠지면서 상기도가 건조해지고 상처가 난 것이 아닌가 싶습니다. 이 경우엔 휴식만 취해주시면 회복하게 되어 증상은 사라질 것이라 예상할 수 있겠습니다. 이 역시 질문자님의 경과와 유사한 것 같습니다.

허벅지 앞 무릎 저림 현상 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장시간 앉아있을 때 한 쪽으로

나타나는 다리의 저린 양상의 통증은 척추질환을 의심케합니다. 운동을 하고 계신다 말씀하시니 운동으로 인해 허리의 질환이 발병 혹은 악화되었을 여지도 있겠습니다. 정형외과나 신경외과를 방문해보시기 바랍니다.

허벅지 앞 무릎 저림 현상 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장시간 앉아있을 때 한 쪽으로 나타나는 다리의 저린 양상의 통증은 척추질환을 의심케합니다. 운동을 하고 계신다 말씀하시니 운동으로 인해 허리의 질환이 발병 혹은 악화되었을 여지도 있겠습니다. 정형외과나 신경외과를 방문해보시기 바랍니다.

저혈당 증상 맞나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 저혈당과는 관련이 없어 보입니다. 혈관미주신경실신이라는 병이 있는데 그다지 걱정할 병은 아니고요 그럴 가능성이 높아 보입니다. 치료는 특별히 필요할 것 같지는 않지만 가까운 병원을 방문해서 기본적인 검사를 해보는 것도 좋을 것 같습니다.

인대 늘어난지 2주,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발목을 다치셨고 MRI에서 인대 파열을 진단 받은 상황이시군요. 인대가 파열되는 수준의 손상은 오랜 회복기간을 요합니다. 2주로는 부족하고 재방문 시 MRI를 바로 촬영하지는 않습니다. 촬영이 필요하다 하더라도 최소 수 개월의 회복기간을 가진 뒤 재촬영을 하게 됩니다. 그러니 병원에서의 치료를 이어가시기 바랍니다.

대퇴골 몸통 폐쇄골절,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리를 다치셨군요. 대퇴골 몸통의 골절은 원래 가골이 늦게 나오고 유합도 늦습니다. 게다가 분쇄가 심하여 더더욱 그렇습니다. 몇 개월 더 관찰이 필요합니다. 가골은 방사선으로 보이지않을 수도 있습니다. 감사합니다.

유방 석회화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유방의 미세석회화가 관찰되는데 대부분 양성인 경우가 많지만 드물게 악성 종양이 발견되는 경우가 있어 초음파 등 추가 검사가 필요합니다.

심혈관 및 지질 관련 건강검진 결과 설명 들을 수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고지혈증은 그 수치보다 더 중요한 것은 고지혈증 즉 콜레스테롤이 이른 연령대에 높아져서 오래 지속이 되는 경우 심혈관질환 동맥경화 뇌졸중등의 위험도가 높아지는 것으로 보고되고 있습니다 수치로 보아 식습관을 체크해 보아야할 듯하고 고지혈증약의 복용을 권해드리고 싶군요

수면에대해 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수면시간을 확보해야 하는 이유는 인간의 생존에 필수적이기 때문인데 그렇다고 얕은 잠을 여러번 자는 것으로 한 번의 숙면을 대체할 수 있느냐 하면 그것은 또 아닙니다. 총 수면시간보다는 깊은 잠에 잘 진입하고 유지할 수 있는지가 피로 회복에 중요한 요소라고 볼 수 있겠습니다.

근육통이 이런식으로도 오나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육통은 근육이 갑자기 과도한 힘을 쓰거나 사용하지 않던 근육을 사용했을 때 발생할 수 있습니다. 근육통은 통증이 시작되고 24시간 이내에 가장 심해지고 며칠 후에 사라집니다. 근육통은 일반적으로 치료가 필요하지 않지만 통증이 심한 경우 진통제를 복용하거나 냉찜질을 할 수 있습니다.

변사진 더럽지만 너무걱정됩니다 답변부탁드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변의 색깔이나 굵기는 정상으로 보입니다. 또 대장 내시경 결과가 정상이라면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 감사합니다.

무대조명 눈에 맞았어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조명으로 사용하는 것은 눈에 큰 문제가 생길것으로 생각되지는 않습니다. 불편한 증상이 있으시니 진료를 받아보시는 것을 권합니다

휴지기 탈모치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 휴지기탈모증으로 헤어라인인 올라가는 형태로 오지 않습니다. 휴지기 탈모증은 일시적으로 휴지기 모발이 증가되어서 모발의 탈락량이 증가되는 상태이고 이 휴지기 모발은 바로 성장기로 이어지기 때문에 몇 달 지나지 않아서 다시

회복이 됩니다. 이마라인이 밀리고 있다면 남성형탈모증안드로겐 탈모증의 가능성이 높고 약을 복용하는데도 헤어라인이 밀리고 있다면 지금 사용 중인 약물만으로는 탈모진행을 막지 못하고 있다는 것이니 처방 받는 병원 의사께 말씀 드리고 약물을 추가 하든지 바꿔야 할 것으로 생각됩니다. 감사합니다.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위가 건강에 큰 문제를 일으키지는 않습니다. 따라서 너무 걱정을 하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

임신 가능성,안녕하세요 요약 1. 생리 중이거나 갓 생리가 끝난 시점이 아닌 이상 2. 가임기 뿐만 아니라 이후에도 임신 가능성은 다분히 있습니다. 3. 주기적인 임신테스트기로 가임 여부를 확인해 보세요 4. 가능성 제로가 아닌 이상은 염두해 뒵야 합니다. 건승하세요

척추 분리증 전방 전위증 경추,안녕하세요. 메디이즈입니다. 척추 분리증은 척추뼈의 두 뼈 사이가 떨어져 있는 것을 말합니다. 척추 분리증은 선천적으로 발생할 수도 있고 외부 충격으로 발생할 수도 있습니다. 척추 분리증은 통증 척추 불안정성 신경 손상 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 척추 분리증은 보통 도수치료 신경주사 운동 치료 등의 보존적 치료로 치료합니다. 하지만 증상이 심하거나 보존적 치료로 효과가 없을 경우에는 수술 치료를 시행할 수 있습니다. 질문자님께서서는 척추 분리증으로 인해 경추가 앞으로 틀어지고 안면과 어깨가 틀어지는 증상이 있다고 하셨습니다. 척추 분리증으로 인해 척추가 불안정해지면 척추가 앞으로 틀어질 수 있습니다. 또한 척추 분리증으로 인해 신경이 눌리면 안면과 어깨가 틀어지는 증상이 발생할 수 있습니다. 질문자님께서서는 척추 분리증으로 인해 통증 척추 불안정성 신경 손상 등의 증상이 발생하고 있습니다. 따라서 질문자님께서서는 척추 분리증을 치료하기 위해 병원에 방문하여 진료를 받아보시기 바랍니다.

성병pcr 음성인데 가끔 요도 찌릿 분비물 나와요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병은 성관계를 통해 전파되는 질환입니다. 성병은 균 바이러스 기생충 등의 원인으로 발생합니다. 성병은 성관계를 통해 전파되기 때문에 성관계를 하지 않았다면 성병에 걸릴 수 없습니다. 질문자님께서서는 성병 검사를 세 번 했는데 모두 음성이 나왔습니다. 따라서 질문자님께서서는 성병에 걸리지 않은 것으로 보입니다. 요로결석은 신장에서 만들어진 소변이 요관을 통해 방광으로 내려가다가 요관에 돌이 생기면서 발생하는 질환입니다. 요로결석은 통증 혈뇨 소변의 혼탁 등을 유발할 수 있습니다. 질문자님께서서는 요로결석을 앓고 계시다고 하셨습니다. 따라서 질문자님께서 느끼는 증상은 요로결석 때문일 가능성이 있습니다. 요로결석은 약물 치료나 수술 치료를 통해 치료할 수 있습니다. 따라서 질문자님께서서는 병원에 가서서 진료를 받아보시기 바랍니다.

보톡스 관련 질문있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보톡스 효과는 시간이 지나면서 점점 없어지게 됩니다. 움직이지 않는 다고 해서 계속 이완된상태로 남아있기는 힘들어요. 근육을 안 쓰면 근육이 위축되어 버려요

전립선염 의심에 대해 pcr 검사를 해봐야 하는지. 먹고 있는항생제는 어떻게 해야 하는지.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 검사 결과에 따라 치료하는 항생제가 달라질 수도 있습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

방금 근막통증후군 질문한 사람인데여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육을 움직이지 않고 지낼수가 있나요? 과사용이 원인이라면 덜 사용하면서 지내보셔요. 그래서 재발하지 않았으면 좋겠네요

어지러움.식은땀.복통.구토.손저림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지러움 식은땀 복통 구토

손저림은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 미주신경성 실신입니다. 미주신경성 실신은 미주신경의 이상으로 발생하는 실신입니다. 미주신경은 심장박동 호흡 혈압 등을 조절하는 신경입니다. 미주신경성 실신은 갑자기 심장박동이 느려지거나 혈압이 떨어지면서 발생합니다. 미주신경성 실신은 갑자기 일어나거나 긴장하거나 놀랐을 때 발생할 수 있습니다. 미주신경성 실신은 혈압약을 복용하고 있는 경우에도 발생할 수 있습니다. 미주신경성 실신은 특별한 치료가 필요하지 않습니다. 미주신경성 실신은 갑자기 일어나거나 긴장하거나 놀랐을 때 발생할 수 있으므로 갑자기 일어나거나 긴장하거나 놀랐을 때 앉거나 누워서 심장박동과 혈압을 회복해야 합니다. 미주신경성 실신은 혈압약을 복용하고 있는 경우에도 발생할 수 있으므로 혈압약을 복용하고 있는 경우에는 혈압약을 조절해야 합니다. 질문자님께서 말씀하신 증상은 미주신경성 실신일 가능성이 있습니다. 질문자님께서 혈압약을 복용하고 계신 경우에는 혈압약을 조절해야 합니다. 또한 갑자기 일어나거나 긴장하거나 놀랐을 때 앉거나 누워서 심장박동과 혈압을 회복해야 합니다. 만약 증상이 지속되거나 심해진다면 가까운 신경과로 내원하여 진료를 받아보시기 바랍니다.

전립샘염에 항생에 며칠 투여하면 호전되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 개인마다 다르지만 보통 4주정도는 사용합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

전립샘염에 항생에 며칠 투여하면 호전되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 개인마다 다르지만 보통 4주정도는 사용합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

전립선염 의심에 대해 pcr 검사를 해봐야 하는지. 먹고 있는항생제는 어떻게 해야 하는지..안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 검사 결과에 따라 치료하는 항생제가 달라질 수도 있습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

수면에대해 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수면시간을 확보해야 하는 이유는 인간의 생존에 필수적이기 때문인데 그렇다고 얕은 잠을 여러번 자는 것으로 한 번의 숙면을 대체할 수 있느냐 하면 그것은 또 아닙니다. 총 수면시간보다는 깊은 잠에 잘 진입하고 유지할 수 있는지가 피로 회복에 중요한 요소라고 볼 수 있겠습니다.

에이즈 검사 관련질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 95프로 정도 정확합니다 6주째 하시면 좋을 것 같습니다. 양전 가능성은 거의 없습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

귀두에 뭐가 났네요 에이즈일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 귀두포피염 으로 보입니다 자극을 피하시고 이차감염을 막기위해 항생제연고를 사용하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

고등학교 2학년 학생,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외 사정은 임신을 방지하는 방법 중 하나이지만 완전히 안전한 방법은 아닙니다. 질외 사정 후에도 정액이 질에 들어가면 임신할 수 있기 때문입니다. 질문자님은 질외 사정을 하셨지만 정액이 질에 들어가서 임신할 가능성이 있습니다. 따라서 사후 피임약을 복용하시는 것이 좋습니다. 사후 피임약은 임신 초기에 복용

하면 임신을 예방할 수 있습니다. 사후 피임약은 약국에서 처방받을 수 있으며 처방받을 때 의사는 나이 임신 여부 최근 성관계 여부 등을 질문할 것입니다. 질문자님은 고등학교 2학년 학생이므로 의사는 임신 여부를 확인하기 위해 임신 테스트를 해보라고 할 수도 있습니다. 사후 피임약은 임신 초기에 복용해야 효과가 있으므로 가능한 한 빨리 복용하시는 것이 좋습니다. 사후 피임약은 부작용이 있을 수 있으므로 복용 전에 의사와 상담하시는 것이 좋습니다.

붉은 점?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 붉은색 반점은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 피부염입니다. 피부염은 피부의 염증을 말하며 다양한 증상을 나타낼 수 있습니다. 붉은색 반점은 피부염의 대표적인 증상 중 하나입니다. 피부염은 다양한 원인으로 발생할 수 있으며 원인에 따라 치료 방법이 다릅니다. 피부염이 의심되는 경우에는 피부과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 피부염은 적절한 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 질문자님의 경우 붉은색 반점이 팔과 다리에 생겼고 가려움증이 있었다고 합니다. 붉은색 반점은 피부염의 대표적인 증상 중 하나이며 피부염은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 따라서 피부염이 의심되는 경우에는 피부과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 피부염은 적절한 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다.

혈압측정시 자세에 따른 혈압변동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 수시로 여러가지 상황에 따라 변화합니다. 어찌다가 한번 높ی 나오는 수치는 무시하셔도 됩니다. 혈압수치를 적어서 주치의선생님과 상의ㅣ해보셔요

장유착 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선 적출술은 전립선암을 치료하기 위해 전립선을 제거하는 수술입니다. 전립선 적출술은 복강경 수술이나 로봇 수술로 진행할 수 있습니다. 전립선 적출술 후에는 복벽에 유착이 생길 수 있습니다. 복벽 유착은 복벽에 붙어 있는 장기들이 서로 붙는 것을 말합니다. 복벽 유착이 생기면 복통 복부 팽만 설사 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 전립선 적출술 후 복벽 유착이 의심되는 경우에는 복부 CT 검사를 시행할 수 있습니다. 복부 CT 검사에서 복벽 유착이 확인되면 복벽 유착을 치료하기 위한 수술을 시행할 수 있습니다. 질문자님의 경우 전립선 적출술 후 복벽 유착이 의심됩니다. 질문자님은 복부 CT 검사를 시행하여 복벽 유착이 있는지 확인하고 복벽 유착이 확인되면 복벽 유착을 치료하기 위한 수술을 시행하는 것이 좋습니다.

에이즈 발진일 수 있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 에이즈 검사에서 음성이 나왔다면 에이즈일 가능성은 매우 낮습니다. 에이즈는 면역 체계가 파괴되는 질환으로 에이즈에 걸리면 면역력이 떨어져서 다양한 질환에 걸리기 쉽습니다. 에이즈에 걸리면 감기와 같은 질환에도 쉽게 걸리고 치료가 어려워 오래 지속될 수 있습니다. 또한 에이즈에 걸리면 피부에 발진이 생길 수 있습니다. 하지만 에이즈 발진은 흔하지 않으며 대부분의 경우 에이즈 검사에서 양성으로 나옵니다. 따라서 에이즈 검사에서 음성이 나왔다면 에이즈일 가능성이 매우 낮습니다. 질문자님의 경우 감기와 피부 발진이 에이즈와 관련이 있을 가능성이 매우 낮습니다. 따라서 걱정하지 않으셔도 됩니다.

원래 대음순 피부..??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대음순은 음핵을 감싸고 있는 피부입니다. 대음순은 피지선이 많아서 오돌토돌한 느낌이 있습니다. 대음순의 피부는 얇고 민감해서 자극을 받으면 붉게 변할 수 있습니다. 대음순에 오돌토돌한 느낌이 있고 붉게 변했다면 성병이 아닌 질염일 가능성이 있습니다. 질염은 여성의 질에 염증이 생기는 질환입니다. 질염은 세균이나 곰팡이 바이러스 등이 원인이 되어 발생합니다. 질염의 증상은 질 분비물 증가 질 가려움증 질 통증 성교통 배뇨통 등이 있습니다. 질염은 병원에서 진료를 받아 치료할 수 있습니다.

비관혈적 정보술 후 주의할 점에 관한 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비관혈적 정보술은 코뼈가 부러진 후 코뼈를 바로잡는 수술입니다. 비관혈적 정보술 후에는 다음과 같은 주의 사항을 지켜야 합니다. 콧속에 녹는 솜은 보통 23일 정도 지나면 사라집니다. 코뼈가 부러진 후 눈이 따갑고 눈물이 나는 것은 코뼈와 연관이 있을 수 있습니다. 코뼈가 부러지면 코뼈와 눈 사이에 있는 뼈가 손상되어 눈이 따갑고 눈물이 날 수 있습니다. 노래방에 가서 노래부르는 거나 좀 크게 웃는 것은 수술 후 2주 정도 지나면 가능합니다. 비관혈적 정보술 후에는 콧속에 녹는 솜이 녹아 없어질 때까지는 콧물을 풀지 말고 콧물을 닦을 때는 면봉을 사용해야 합니다. 또한 코를 세게 풀거나 비비지 말고 코를 풀 때는 콧구멍을 한쪽씩 풀어야 합니다. 노래방에 가서 노래부르는 거나 좀 크게 웃는 것은 수술 후 2주 정도 지나면 가능합니다. 하지만 콧물이 많이 나거나 코가 막히면 노래방에 가서 노래부르는 거나 좀 크게 웃는 것은 피해야 합니다.

궁금한것이 있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 대변이나 소변을 참으면 배에 가스가 차서 복통이 생기거나 변비가 생길 수 있습니다. 또한 소변을 참으면 방광에 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 대변이나 소변이 마려운 경우에는 참지 말고 바로 보시는 것이 좋습니다. 팬티에 대변이 묻었다면 흐르는 물에 씻어서 깨끗이 닦아내야 합니다. 흐르는 물에 씻지 않고 휴지로 닦는 경우에는 대변이 남아서 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 또한 대변이 묻은 팬티를 입고 있으면 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 대변이 묻은 팬티는 빨거나 버려야 합니다. 대변이나 소변을 참거나 팬티에 대변이 묻고 씻지 않고 그대로 입는 것은 건강에 좋지 않습니다. 따라서 대변이나 소변이 마려운 경우에는 참지 말고 바로 보시고 팬티에 대변이 묻었다면 흐르는 물에 씻어서 깨끗이 닦아내야 합니다.

비폐쇄성 무정자증 치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비폐쇄성 무정자증은 정자가 생성되지 않지만 정관이 막히지 않은 경우를 말합니다. 비폐쇄성 무정자증은 정자 생성 장애가 원인인 경우가 대부분인데 이는 유전적인 원인이나 환경적인 원인으로 발생할 수 있습니다. 비폐쇄성 무정자증은 자연치유가 되는 경우는 매우 드뭅니다. 비폐쇄성 무정자증이 의심된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 비폐쇄성 무정자증은 정자를 채취하여 체외수정술을 통해 임신을 할 수 있습니다.

근막통증증후군 보톡스로 완치될 수 있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보톡스로 근막통증증후군을 완치하기는 어렵습니다. 원인치료가 필요합니다. 근막통증증후군(Myofascial Pain Syndrome)의 주요 원인은 다음과 같습니다. 근육 과사용, 반복적인 동작이나 자세로 인한 근육의 과도한 긴장과 피로, 운동 부족으로 인한 근육 경직, 근육 외상, 근육 염좌, 근육 열상 등의 외상, 수술 후 근육 손상, 스트레스, 만성 스트레스로 인한 근육 긴장 상태, 지속 부적절한 자세, 앉은 자세나 서있는 자세 등 부적절한 자세로 인한 근육 긴장, 대사성 근통증, 비타민 D 결핍, 갑상선 기능 이상 등, 염증성 근육 질환, 류마티스 관절염, 전신홍반루푸스 등의 자가면역 질환. 근막통증증후군은 위와 같은 다양한 원인으로 인해 근육 경직, 과민성 통증이 나타나게 됩니다.

저혈당 증상 맞나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 저혈당과는 관련이 없어 보입니다. 혈관미주신경실신이라는 병이 있는데 그다지 걱정할 병은 아니고요. 그럴 가능성이 높아 보입니다. 치료는 특별히 필요할 것 같지는 않지만 가까운 병원을 방문해서 기본적인 검사를 해보는 것도 좋을 것 같습니다.

CPK 호모시스테인 추가질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정해진 것은 따로 없습니다. ckmb는 한번 정도 검사 더 해보시면되고 homocystein은 23개월에 한번정도 검사해보서

CPK 수치와 호모시스테인수치가 높습니다,안녕하세요 요약 1. CKMB가 괜찮으면 심장 문제는 아니라는 것이니 2. CK 증가는 크게 걱정 안해도 됩니다. 3. 다음에 검사해서 추이를 확인하면 됩니다. CK라는 효소는 심근에 존재하기도 하지만 골격근에도 많은 양이 존재하고 있기 때문에 단순히 CKCPK가 높다는 것만으로는 심근경색을 진단하기 어려우며 그렇기에 CKCPK 검사와 CKMB 검사를 함께 처방하여 근육 손상의 근본적인 원인을 파악할 수 있습니다. CK 수치가 증가했는데 CKMB의 수치 또한 증가했다면 심근손상을 의심할 수 있습니다. 정상 수치 범위는 남성 0.004.87ngmL 여성 0.003.61ngmL 인데 병원마다 기준치는 약간씩 다릅니다. 건승하세요

나딕사 연고 먹으면,안녕하세요 요약 1. 퀴놀론계 항생제는 실제 복용을 하기도 하며 2. 언급한 정도의 소량으로는 문제가 되지 않습니다. 나사크림의 성분함량은 Nadifloxacin 나딕록사신 10mgg 입니다. 건승하세요

발목뻗조각,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무리가 됩니다. 물론 중간에 휴식시간이 있겠지만 기존에 발목 골절이 있던 경우는 요추의 틀어짐도 동반되는 경우가 많으며 6시간 서있는 일 자체가 발목 뿐 아니라 척추에 지속적인 악영향을 주게됩니다.

임신 가능성,안녕하세요 요약 1. 생리 중이거나 갓 생리가 끝난 시점이 아닌 이상 2. 가임기 뿐만 아니라 이후에도 임신 가능성은 다분히 있습니다. 3. 주기적인 임신테스트기로 가임 여부를 확인해 보세요 4. 가능성 제로가 아닌 이상은 염두해 뒀야 합니다. 건승하세요

헤르페스 검사도 포함한 진단서인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스는 검사에서 음성으로 나오더라도 임상적으로 헤르페스 이면 헤르페스가 있다고 판단해야 하는 경우도 있습니다

보톡스 관련 질문있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보톡스 효과는 시간이 지나면서 점점 없어지게 됩니다. 움직이지 않는 다고 해서 계속 이완된상태로 남아있기는 힘들어요. 근육을 안 쓰면 근육이 위축되어 버려요

귀두에 염증이 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두 표피염으로 판단됩니다. 항생제 복용이 필요하므로 망설이지 말고 병원 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

잇몸 살짝 찢고 고름 났는데 비행기 타도될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 절개 배농을 했다면 잇몸 부위는 혈류량이 많아 금방 상처가 회복이 됩니다. 따라서 비행기를 타도 전혀 문제가 없습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

작은 닭뼈를 삼켰습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없다면 위강 내로 통과 되었을 가능성이 높습니다. 걱정이 되신다면 우선 흉부 엑스레이를 찍어보고 식도에 있다면 내시경으로 제거해야 합니다.

피지낭종 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부위가 제거는 쉽지는 않을 것 같습니다. 염증이 가라앉으면 그냥 지내셔도 되지만 이비인후과 진료를 받아보시고 상의해보셔요

Mmg후mag여부결정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 맘모그래피 MMG 일반적으로 시행되는 유방촬영술 시행 후 magnification view 특정한 병변을 확대하여 해상도 높게 촬영하는 기법 촬영을 추가로 검토하겠다는 의미입니다. 만약 유방촬영술에서 변화가 없었다면 확대 촬영이 필요없겠고 변화가 보이면 추가촬영이 필요할 수 있겠습니다.

해석 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유방 초음파상 결절이 C3category 3에 해당되어 6개월 후 추적검사를 하겠다는 의미입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

발목뻗조각,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무리가 됩니다. 물론 중간에 휴식시간이 있겠지만 기

존에 발목 골절이 있던 경우는 요추의 틀어짐도 동반되는 경우가 많으며 6시간 서있는 일 자체가 발목 뿐 아니라 척추에 지속적인 악영향을 주게됩니다.

조영제 복부ct 스캔 부위,안녕하세요. 요약 1. 복부 CT 시에 2. 골반부위까지 내려 찍으면 이상 유무도 확인 가능합니다. 3. 골반까지 포함되면 확인 가능합니다. pelvic CT 가 따로 있어서 포함되지 않을 수도 있습니다. 건승하세요.

혈관에 이상이 있는지확인하려면 무슨 검사들 하면되나요 ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 큰병원에서 검사를해도 25정도는 그 원인을 찾지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 지금 경동맥 검사는 별로 필요없을 것 같습니다. 심리적인 원인에서도 어지럼증이 올 수 있습니다. 암수판에스 드시고는 두통은 부작용으로 나타날 수 있습니다

저혈당 증상 맞나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 저혈당과는 관련이 없어 보입니다. 혈관 미주신경실신 이라는 병이 있는데 그다지 걱정할 병은 아니고요 그럴 가능성이 높아 보입니다. 치료는 특별히 필요할 것 같지는 않지만 가까운 병원을 방문해서 기본적인 검사를 해보는 것도 좋을 것 같습니다.

눈 옆. 머리쪽에 난 뿔루지 같이 생긴 건 무엇인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원으로 오세요 3. 뇌혈관이 시신경이 피부까지 나오진 않습니다. 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 저 정도면 항생연고 잘 발라 보시고 해결안되면 병원으로 내원하시면 됩니다. 건승하세요.

오른쪽 아랫배 누르면 소리가 납니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임상적으로는 큰 의미없는 증상으로 생각됩니다. 누르지 않으면 별다른 불편한 증상은 없는지요? 그냥 지켜보셔도 됩니다

발목뻗조각,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무리가 됩니다. 물론 중간에 휴식시간이 있겠지만 기존에 발목 골절이 있던 경우는 요추의 틀어짐도 동반되는 경우가 많으며 6시간 서있는 일 자체가 발목 뿐 아니라 척추에 지속적인 악영향을 주게됩니다.

임신 가능성,안녕하세요 요약 1. 생리 중이거나 갓 생리가 끝난 시점이 아닌 이상 2. 가임기 뿐만 아니라 이후에도 임신 가능성은 다분히 있습니다. 3. 주기적인 임신테스트기로 가임 여부를 확인해 보세요 4. 가능성 제로가 아닌 이상은 염두해 뒀야 합니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위가 건강에 큰 문제를 일으키지는 않습니다. 따라서 너무 걱정을 하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요 요약 1. 변을 지리는 건 유분증입니다. 2. 제때 배설하지 못하는 건 몸에 좋지 않습니다. 3. 먹고 자고 싸고 기본적인 사람의 본능이자 기본권리입니다. 4. 본인 스스로 제대로 누리게 해줘야 합니다. 그게 힘들면 적절히 대처할 수 있게 만들어야 합니다. 유분증은 대개 생리적인 요인과 심리적인 요인이 상호복합적으로 나타납니다. 장의 운동성이 낮아 대변이 정체되어 변비가 잘 생기는 체질인 경우 기질적으로 변의와 같은 생리적 신호에 둔감해 다른 것에 몰두하다가 실수하는 경우 경험상 변을 보다가 큰 통증이나 불편감을 경험한 이후 대변보기를 참다가 실수하는 경우 새로운 환경 등으로 심한 스트레스를 받는 경우 건승하세요

궁금한것이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 대변을 참지 못하실만큼 힘드셨던 상황입니다만 건강에 문제가 될만한 요소는 아닙니다. 변 잘 보셨으면 괜찮고 설사를 하셨다면 내과 진료를 받아보세요. 2. 피부에 염증반응이 유발되었을 수는 있습니다. 항문 주변이 가렵거

나 가까운지 확인해보세요. 3. 어쨌거나 큰 문제는 없습니다. 안심하고 주무세요.

궁금한것이 있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 대변이나 소변을 참으면 배에 가스가 차서 복통이 생기거나 변비가 생길 수 있습니다. 또한 소변을 참으면 방광에 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 대변이나 소변이 마려운 경우에는 참지 말고 바로 보시는 것이 좋습니다. 팬티에 대변이 묻었다면 흐르는 물에 씻어서 깨끗이 닦아내야 합니다. 흐르는 물에 씻지 않고 휴지로 닦는 경우에는 대변이 남아서 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 또한 대변이 묻은 팬티를 입고 있으면 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 대변이 묻은 팬티는 빨거나 버려야 합니다. 대변이나 소변을 참거나 팬티에 대변이 묻고 씻지 않고 그대로 입는 것은 건강에 좋지 않습니다. 따라서 대변이나 소변이 마려운 경우에는 참지 말고 바로 보시고 팬티에 대변이 묻었다면 흐르는 물에 씻어서 깨끗이 닦아내야 합니다.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 대변을 참지 못하실만큼 힘드셨던 상황 입니다만 건강에 문제가 될만한 요소는 아닙니다. 변 잘 보셨으면 괜찮고 설사를 하셨다면 내과 진료를 받아보세요. 2. 피부에 염증반응이 유발되었을 수는 있습니다. 항문 주변이 가렵거나 가까운지 확인해보세요. 3. 어쨌거나 큰 문제는 없습니다. 안심하고 주무세요.

팔꿈치 성장판 다치기 쉽나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 21세라고 하시면 성장이 어느정도 마무리 되었거나 끝난 상태여서 성장판 손상은 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것으로 생각됩니다

친구 사마귀 전염 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사마귀는 HPV사람유두종바이러스에 의한것으로 접촉으로 인해 전염될 수 있습니다. 치료를 받고 왔기때문에 전염 가능성은 줄어들지만.. 개인 위생과 침구류 관리를 철저히 하시는게 좋겠습니다.

잇몸 살짝 찢고 고름 났는데 비행기 타도될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 절개 배농을 했다면 잇몸 부위는 혈류량이 많아 금방 상처가 회복이 됩니다. 따라서 비행기를 타도 전혀 문제가 없습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

나딕사 연고 먹으면,안녕하세요 요약 1. 퀴놀론계 항생제는 실제 복용을 하기도 하며 2. 언급한 정도의 소량으로는 문제가 되지 않습니다. 나사크림의 성분함량은 Nadifloxacin 나디록사신 10mgg 입니다. 건승하세요

귀두에 염증이 생겼습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두 표피염으로 판단됩니다. 항생제 복용이 필요하므로 망설이지 말고 병원 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

임신 가능성,안녕하세요 요약 1. 생리 중이거나 갓 생리가 끝난 시점이 아닌 이상 2. 가임기 뿐만 아니라 이후에도 임신 가능성은 다분히 있습니다. 3. 주기적인 임신테스트기로 가임 여부를 확인해 보세요 4. 가능성 제로가 아닌 이상은 염두해 뒀야 할겁니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 대변이나 소변을 참으면 배에 가스가 차서 복통이 생기거나 변비가 생길 수 있습니다. 또한 소변을 참으면 방광에 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 대변이나 소변이 마려운 경우에는 참지 말고 바로 보시는 것이 좋습니다. 팬티에 대변이 묻었다면 흐르는 물에 씻어서 깨끗이 닦아내야 합니다. 흐르는 물에 씻지 않고 휴지로 닦는 경우에는 대변이 남아서 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 또한 대변이 묻은 팬티를 입고 있으면 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 대변이 묻은 팬티는 빨거나 버려야 합니다. 대변이나 소변을 참거나 팬티에 대변이 묻고 씻지 않고 그대로 입는 것은 건강에 좋지 않습니다. 따라서 대변이나 소변이 마려운 경우에는 참지 말고 바로 보시고 팬티에 대변이 묻었다면 흐르는 물에 씻어서 깨끗이 닦아내야 합니다.

궁금한것이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 대변을 참지 못하실만큼 힘드셨던 상황 입니다만 건강에 문제가 될만한 요소는 아닙니다. 변 잘 보셨으면 괜찮고 설사를 하셨다면 내과 진료를 받아보세요. 2. 피부에 염증반응이 유발되었을 수는 있습니다. 항문 주변이 가렵거나 따가운지 확인해보세요. 3. 어쨌거나 큰 문제는 없습니다. 안심하고 주무세요.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 대변을 참지 못하실만큼 힘드셨던 상황 입니다만 건강에 문제가 될만한 요소는 아닙니다. 변 잘 보셨으면 괜찮고 설사를 하셨다면 내과 진료를 받아보세요. 2. 피부에 염증반응이 유발되었을 수는 있습니다. 항문 주변이 가렵거나 따가운지 확인해보세요. 3. 어쨌거나 큰 문제는 없습니다. 안심하고 주무세요.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 요약 1. 변을 지리는 건 유분증입니다. 2. 제때 배설하지 못하는 건 몸에 좋지 않습니다. 3. 먹고 자고 싸고 기본적인 사람의 본능이자 기본권리입니다. 4. 본인 스스로 제대로 누리게 해줘야 합니다. 그게 힘들면 적절히 대처할 수 있게 만들어야 합니다. 유분증은 대개 생리적인 요인과 심리적인 요인이 상호복합적으로 나타납니다. 장의 운동성이 낮아 대변이 정체되어 변비가 잘 생기는 체질인 경우 기질적으로 변의와 같은 생리적 신호에 둔감해 다른 것에 몰두하다가 실수하는 경우 경험상 변을 보다가 큰 통증이나 불편감을 경험한 이후 대변보기를 참다가 실수하는 경우 새로운 환경 등으로 심한 스트레스를 받는 경우 건승하세요

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위가 건강에 큰 문제를 일으키지는 않습니다. 따라서 너무 걱정을 하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

오른쪽 아랫배 누르면 소리가 납니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임상적으로는 큰 의미없는 증상으로 생각됩니다. 누르지 않으면 별다른 불편한 증상은 없는지요? 그냥 지켜보셔도 됩니다

비폐쇄성 무정자증 치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비폐쇄성 무정자증은 정자가 생성되지 않지만 정관이 막히지 않은 경우를 말합니다. 비폐쇄성 무정자증은 정자 생성 장애가 원인인 경우가 대부분인데 이는 유전적인 원인이나 환경적인 원인으로 발생할 수 있습니다. 비폐쇄성 무정자증은 자연치유가 되는 경우는 매우 드뭅니다. 비폐쇄성 무정자증이 의심된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 비폐쇄성 무정자증은 정자를 채취하여 체외수정술을 통해 임신할 수 있습니다.

오른쪽 아랫배 누르면 소리가 납니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임상적으로는 큰 의미없는 증상으로 생각됩니다. 누르지 않으면 별다른 불편한 증상은 없는지요? 그냥 지켜보셔도 됩니다

작은 닭뼈를 삼켰습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없다면 위강 내로 통과 되었을 가능성이 높습니다. 걱정이 되신다면 우선 흉부 엑스레이를 찍어보고 식도에 있다면 내시경으로 제거해야 합니다.

피임목적으로 경구피임약 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약을 복용하고 일주일만 지나야 효과가 있다고 되어 있습니다. 피임약을 제대로 복용하고 있다는 전제하에는 일주일만 지나서는 피임효과가 있다고 할 수 있겠네요. 그러나 알수없는 개인차와 변수가 많으니.. 되도록이면 안전한 방법으로 피임하는게 좋겠습니다.

해석 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유방 초음파상 결절이 C3category 3에 해당되어 6개월 후 추적검사를 하겠다는 의미입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

피지낭종 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부위가 제거는 쉽지는 않을 것 같습니다. 염증이 가라앉으면 그냥 지내셔도 되지만 이비인후과 진료를 받아보시고 상의해보셔요

CPK 수치와 호모시스테인수치가 높습니다,안녕하세요 요약 1. CKMB가 괜찮으면 심장 문제는 아니라는 것이니 2. CK 증가는 크게 걱정 안해도 됩니다. 3. 다음에 검사해서 추이를 확인하면 됩니다. CK라는 효소는 심근에 존재하기도 하지만 골격근에도 많은 양이 존재하고 있기 때문에 단순히 CKCPK가 높다는 것만으로는 심근경색을 진단하기 어려우며 그렇기에 CKCPK 검사와 CKMB 검사를 함께 처방하여 근육 손상의 근본적인 원인을 파악할 수 있습니다. CK 수치가 증가했는데 CKMB의 수치 또한 증가했다면 심근손상을 의심할 수 있습니다. 정상 수치 범위는 남성 0.004.87ngmL 여성 0.003.61ngmL 인데 병원마다 기준치는 약간씩 다릅니다. 건승하세요

저혈당 증상 맞나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 저혈당과는 관련이 없어 보입니다. 혈관 미주신경실신 이라는 병이 있는데 그다지 걱정할 병은 아니고요 그럴 가능성이 높아 보입니다. 치료는 특별히 필요할 것 같지는 않지만 가까운 병원을 방문해서 기본적인 검사를 해보는 것도 좋을 것 같습니다.

조영제 복부ct 스캔 부위,안녕하세요. 요약 1. 복부 CT 시에 2. 골반부위까지 내려 찍으면 이상 유무도 확인 가능합니다. 3. 골반까지 포함되면 확인 가능합니다. pelvic CT 가 따로 있어서 포함되지 않을 수도 있습니다. 건승하세요.

눈 옆.머리쪽에 난 뿔루지 같이 생긴 건 무엇인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원으로 오세요 3. 뇌혈관이 시신경이 피부까지 나오진 않습니다. 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 저 정도면 항생연고 잘 발라 보시고 해결안되면 병원으로 내원하시면 됩니다. 건승하세요.

편도 종물질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 종물이라는 것은 덩어리를 의미합니다. 편도 종양이라는 뜻인데 크기가 크거나 모양이 전형적이지 않다면 조직검사가 필요합니다.

소변색에 대한 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주황색은 소변이 농축되어 진한 색을 띠는 거 같네요 보통 아침 첫 소변은 농축되어 있습니다. 또는 특정 음식이나 색소가 있는 음식을 먹으면 주황색으로 보일 수가 있습니다. 만약 질병에 의한것이라면 간 또는 담낭에 문제시 황달이 소변에 배출되면 노란색이나 주황색으로 나올수도 있겠죠? 하지만 소변에 보일 정도이면 피부로도 변화가 있을것이니 잘 살펴보세요 물을 많이 마시면 희석되어 소변이 투명하게 맑아집니다. 정상적인 생리현상이니 걱정안하셔도 됩니다. 아침 소변이 주황색이고 수분 섭취시 소변색이 만리아지는 것은 정상적인 현상이니 크게 걱정하지 마시고.. 다른 동반된 증상이 있는지 확인해보세요

피지낭종 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부위가 제거는 쉽지는 않을 것 같습니다. 염증이 가라앉으면 그냥 지내셔도 되지만 이비인후과 진료를 받아보시고 상의해보셔요

며칠전부터 가슴이 답답합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 심부전과 같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

모멘타 로션,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모타 로션을 보통 여드름의 경우에는 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 모타 로션의 효능은 코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화 입니다. 모타로션은 스테로이드 성분이 함유되어 있어서 여드름 치료에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

피임약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약 복용을 잊거나 시간이 바뀌거나 그러지는 않았나요? 원래 복용법을 잘 지키고 계셨다고 하면 지금 복용하고 있는 스케줄대로 남은 약을 다 드시고 새로운 팩을 드시는 것이 좋겠습니다. 피임효과는 유지될 것으로 생각됩니다. 진단과 증상이 안맞는지 전립샘마사지를 한 이후 소변검사는 100프로 전립샘액이 나오는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정낭염 전립선염 모두 동일한 범주의 질환으로 보아도 됩니다. 치료가 동일하고 정액이 배출되는 통로이기 때문입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

성병 근육통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련 없을 것 같습니다 다만 성관계가 있었기 때문에 증상과 상관없이 검사는 받는 것이 좋습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈의 크기라는 것이 사실 안구의 크기가 아니라 눈을 떼었을 때 상안검과 하안검 사이의 거리가 먼 것을 의미하기 때문에 생김새에 의해 결정된다고 보아야 하겠고 유전적 요인이 크게 작용하겠으며 쌍꺼풀이 없어도 큰 사람이 존재할 수 있겠습니다.

안녕하세요 선생님 저번 pcr 검사 문의 추가로 남겨 봅니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. PCR 검사는 첫 소변이 아니더라도 괜찮습니다. 첫 소변이 아닌 경우에도 검사 결과에 영향을 미치지 않습니다. 염증이 미약하게 있는 경우에도 항생제를 처방받을 수 있습니다. 항생제를 처방받아 먹으면 염증이 사라집니다. 결석이 신장입구에 있으면서 미세한 염증이 생겼을 수도 있습니다. 염증이 사라지면 성병이라는 포비아에서 벗어날 수 있습니다.

Itp 치료제 성공률엘트롬보팩,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둘다 만성 ITP치료에 높은 치료율을 보이는 비교적 신약인데요. 대부분은 장기적인 효과를 유지한다고 되어 있지만.. 찾아보니 연구결과에 따르면 2030의 환자에서 장기적 사용시 반응이 감소하거나 재발할 수 있다는 결과가 있었네요. Provan D. et al. 2019. Eltrombopag for the treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Lancet Haematology. Kuter D. J. et al. 2008. Longterm treatment with romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenia Final safety and efficacy results from a phase 3 study. Blood.

어금니에 통증 금이 짝 가있습니다 파절인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어금니에 통증이 있고 금이 간 거 같은데 치아 파절인가요? 자고 일어났을 때마다 통증이 있어서 보니까 금이 짝 가있는데 치아가 깨진 건가요? 어떤 치료를 받아야 하나요 심하게 깨진 건가요??? 사진만으로는 치아 파절 진단을 할 수는 없습니다. 가까운 치과에 가서서 검사를 받아보세요

피부과에서 후두근에도 보톡스 놔주나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 후두근에 대한 보톡스 시술은 두통이나 경추부근의 통증을 관리하기 위해 행해지는 편이라서 해당 피부과에 문의를 해보시는게 좋겠습니다. 보톡스는 신경과나 신경외과 정형외과 등의 진료과에서 시행하는 편입니다.

타세놀8시간이알서방정 타스멘정 동시 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동일한 성분은 맞지만 하나는 서방정 하나는 속효성 약제입니다. 따라서 빠른 해열을 유지하고자 처방 한 것으로 AAP는 하루 4000mg 까지 복용 가능합니다.

잇몸 살짝 찢고 고름 났는데 비행기 타도될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 절개 배농을 했다면 잇몸 부위는 혈류량이 많아 금방 상처가 회복이 됩니다. 따라서 비행기를 타도 전혀 문제가 없습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

콧대 늑연골 박리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시간이 지날수록 주변 조직과의 유착이 심해질

수 있습니다. 수술을 시행한 담당의와 상의하는 것이 좋겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

콧대 늑연골 제거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시간이 지날수록 주변 조직과의 유착이 심해질 수 있습니다. 수술을 시행한 담당의와 상의하는 것이 좋겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

발가락에 이상한 반점이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그냥 단순 점이 아닌가 싶은데요. 당장 피부과 진료가 필요해보이지는 않습니다. 진해지거나 커지면 진료가 필요합니다.

해석 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유방 초음파상 결절이 C3category 3에 해당되어 6개월 후 추적검사를 하겠다는 의미입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

편도 종물질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 종물이라는 것은 덩어리를 의미합니다. 편도 종양이라는 뜻인데 크기가 크거나 모양이 전형적이지 않다면 조직검사가 필요합니다.

피부과에서 처방받은 약인데 성분 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큐젤이라는 연고는 약은 아닌것 같습니다. hydroxypropyl methylcellulose를 포함하는 보습제가 아닌가 싶습니다. 스테로이드없어요

혈관에 이상이 있는지확인하려면 무슨 검사들 하면되나요 ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 큰병원에서 검사를해도 25정도는 그 원인을 찾지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 지금 경동맥 검사는 별로 필요없을 것 같습니다. 심리적인 원인에서도 어지럼증이 올 수 있습니다. 암수판에스 드시고는 두통은 부작용으로 나타날 수 있습니다

팔꿈치 성장판 다치기 쉽나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 21세라고 하시면 성장이 어느정도 마무리 되었거나 끝난 상태여서 성장판 손상은 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것으로 생각됩니다

에이즈 검사 관련질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 95프로 정도 정확합니다 6주째 하시면 좋을 것 같습니다. 양전 가능성은 거의 없습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

잇몸 살짝 찢고 고름 났는데 비행기 타도될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 절개 배농을 했다면 잇몸 부위는 혈류량이 많아 금방 상처가 회복이 됩니다. 따라서 비행기를 타도 전혀 문제가 없습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

귀두에 염증이 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두 표피염으로 판단됩니다. 항생제 복용이 필요하므로 망설이지 말고 병원 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

친구 사마귀 전염 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사마귀는 HPV사람유두종바이러스에 의한것으로 접촉으로 인해 전염될 수 있습니다. 치료를 받고 왔기때문에 전염 가능성은 줄어들지만.. 개인 위생과 침구류 관리를 철저히 하시는게 좋겠습니다.

친구 사마귀 전염 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사마귀는 HPV사람유두종바이러스에 의한것으로 접촉으로 인해 전염될 수 있습니다. 치료를 받고 왔기때문에 전염 가능성은 줄어들지만.. 개인 위생과 침구류 관리를 철저히 하시는게 좋겠습니다.

해석 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유방 초음파상 결절이 C3category 3에 해당되어 6개월 후 추적검사를 하겠다는 의미입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

피지낭종 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부위가 제거는 쉽지는 않을 것 같습니다. 염증이 가라앉으면 그냥 지내셔도 되지만 이비인후과 진료를 받아보시고 상의해보셔요

피임목적으로 경구피임약 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약을 복용하고 일주일이 지나야 효과가 있다고 되어 있습니다. 피임약을 제대로 복용하고 있다는 전제하에는 일주일이 지나서는 피임효과가 있다고 할 수 있겠네요. 그러나 알수없는 개인차와 변수가 많으니.. 되도록이면 안전한 방법으로 피임하는게 좋겠습니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 머리는 두개골로 보호되어 있기 때문에 악력이 아무리 강해도 손으로 혈관 손상을 유발할 수는 없습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

작은 닭뼈를 삼켰습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없다면 위강 내로 통과 되었을 가능성이 높습니다. 걱정이 되신다면 우선 흉부 엑스레이를 찍어보고 식도에 있다면 내시경으로 제거해야 합니다.

작은 닭뼈를 삼켰습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없다면 위강 내로 통과 되었을 가능성이 높습니다. 걱정이 되신다면 우선 흉부 엑스레이를 찍어보고 식도에 있다면 내시경으로 제거해야 합니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 머리는 두개골로 보호되어 있기 때문에 악력이 아무리 강해도 손으로 혈관 손상을 유발할 수는 없습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

피임목적으로 경구피임약 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약을 복용하고 일주일이 지나야 효과가 있다고 되어 있습니다. 피임약을 제대로 복용하고 있다는 전제하에는 일주일이 지나서는 피임효과가 있다고 할 수 있겠네요. 그러나 알수없는 개인차와 변수가 많으니.. 되도록이면 안전한 방법으로 피임하는게 좋겠습니다.

에이즈 검사 관련질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 95프로 정도 정확합니다 6주째 하시면 좋을 것 같습니다. 양전 가능성은 거의 없습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

발가락에 이상한 반점이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그냥 단순 점이 아닌가 싶은데요. 당장 피부과 진료가 필요해보이지는 않습니다. 진해지거나 커지면 진료가 필요합니다.

피임목적으로 경구피임약 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약을 복용하고 일주일이 지나야 효과가 있다고 되어 있습니다. 피임약을 제대로 복용하고 있다는 전제하에는 일주일이 지나서는 피임효과가 있다고 할 수 있겠네요. 그러나 알수없는 개인차와 변수가 많으니.. 되도록이면 안전한 방법으로 피임하는게 좋겠습니다.

친구 사마귀 전염 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사마귀는 HPV사람유두종바이러스에 의한것으로 접촉으로 인해 전염될 수 있습니다. 치료를 받고 왔기때문에 전염 가능성은 줄어 들지만.. 개인 위생과 침구류 관리를 철저히 하시는게 좋겠습니다.

위내시경 결과에 따른 질문이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로 암으로 진행할 가능성이 없는 위저선 용종일 경우 조직검사를 하지 않는 경우가 많습니다. 검사 결과에 대하여 담당의에게 문의를 하기 바랍니다.

제가 체중이 160kg이 나가는데 수면 내시경 불가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수면 내시경은 마취가 아니라.. 수면제로 재우는 겁니다. 수면제가 과용량 들어가거나.. 약물 상호작용으로 과하게 작용하면 호흡부전이 생길 수 있습니다. 비만으로 인해 체중에 따른 수면제 용량이 과량 필요하고 진정제로 인한 약물 상호작용 가능성이 높아 일반내시경을 권한 것 같습니다. 보통 대장내시경을 안하고 위내시경만 하면.. 검사시간이 짧아서 안전하게 일반내시경하는게 더 안전합니다.

점 빼고 듀오덤,안녕하세요. 메디이즈입니다. 점을 제거한 자리에 피부가 아직 다 재생되지 못

한 상태라 보인다면 노카나보다는 마카솔이 더 적합한 상태라고 보아야 합니다. 다 아물고 나면 그때부터 노카나를 사용하시는 것이 적절합니다.

무대조명 눈에 맞았어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조명으로 사용하는 것은 눈에 큰 문제가 생길것으로 생각되지는 않습니다. 불편한 증상이 있으시니 진료를 받아보시는 것을 권합니다
팔꿈치 성장판 다치기 쉽나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 21세라고 하시면 성장이 어느정도 마무리 되었거나 끝난 상태여서 성장판 손상은 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것으로 생각됩니다

혈관에 이상이 있는지확인하려면 무슨 검사들 하면되나요 ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 큰병원에서 검사를해도 25정도는 그 원인을 찾지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 지금 경동맥 검사는 별로 필요없을 것 같습니다. 심리적인 원인에서도 어지럼증이 올 수 있습니다. 암수핀에스 드시고는 두통은 부작용으로 나타날 수 있습니다

미주신경성실신때 심박수 널뛰기 기립성저혈압 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 자율신경계중 하나인 부교감신경이 과도하게 활성화되어 혈압과 심박수를 급격히 떨어트리면서 발생하는데요. 기립성저혈압도 마찬가지로 갑자기 일어설때 혈압이 급격히 떨어지면서 실신이 나타날 수 있습니다. 스트레스나 피로에 의해서도 유발될 수 있는데.. 어찌면 이로 인한 근육긴장일 가능성이 높아보입니다. 물론 미주신경성 실신시에 근육으로 가는 혈류가 줄어들어 근육이 빨리 피로해질수는 있습니다. 대체로 신체활동과 피로도에 의해 발생한 것으로 보이고요. 적절한 휴식과 스트레스관리가 지속적으로 해나가야 할 것 같습니다. 그래도 증상이 계속되거나 심해지면 꼭 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.

뇌졸중 의심증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잠에서 깬정도의 심한 두통과 말이 어눌해지고 균형감각이 이상이 생긴 것은 아주 전형적인 TIA일과성허혈발작증상 입니다. 빨리 신경과 진료를 보시고.. 뇌혈관에 대한 검사를 받아보시기 바랍니다.

피부과에서 처방받은 약인데 성분 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큐젤이라는 연고는 약은 아닌것 같습니다. hydroxypropyl methylcellulose를 포함하는 보습제가 아닌가 싶습니다. 스테로이드없어요

신생아 아이 입천자이 혈어 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잘먹고 잘자고 잘놀면 크게 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다. 왜 생기는 지는 정확하게 알려지지 않았습니다. 외상없이도 생길수는 있습니다

피부과약과 경구피임약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다. 피부약은 일시적으로 드시는 것이라서요 이상입니다

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신가능성이 가장 높은 날은 배란기 입니다. 배란일 앞으로 5일 뒤로 2일 해서 일주일 정도가 임신가능한 기간입니다.

근육통 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 복용하시는 약과 엉덩이 근육통 증상과는 서로 연관은 없어보입니다. 혹시 상기 약물 드신지는 얼마나 되셨나요?

모멘타 로션,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모타 로션을 보통 여드름의 경우에는 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 모타 로션의 효능은 코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화 입니다. 모타로션은 스테로이드 성분이 함유되어 있어서 여드름 치료에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

유니네콜절이랑 리스페달정이랑 같이 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 상관없습니다 다만 진료를 받고 처방받아 복용하십시오 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 댓글주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다

니다 감사합니다.

얼굴에 여드름이 났는데 검은색 같은게 됐어요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 면포성 여드름에 노폐물과 출혈이 동반된 것으로 보이며 피부과 내원하여 제거하는 것이 필요합니다. 치료하지 않을 경우 반흔이 나타날 수 있습니다.

치핵 자연치료 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신대로 변기에 오래 앉아있는 습관은 치핵을 유발하고 악화시킵니다. 이 습관을 교정하지 않는다면 질환은 더욱 심해질 것이고 결국에는 수술적 치료가 필요한 단계까지 이어질 수 있습니다. 그러므로 습관부터 고치시기 바랍니다.

자고 일어나면 눈 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기상 시 나타나는 안구의 통증이 지속되어 안과 진료도 받아보셨지만 안과적으로는 특별한 문제가 없었던 것으로 보입니다. 그렇다면 추가적으로 신경과 진료를 고민해보실만한 상황이라 보이므로 가까운 의원을 찾아보시기를 권해드립니다.

며칠전부터 가슴이 답답합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 심부전과 같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

생리 예정일보다 11일 지남,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 여부에 대한 검사를 먼저 해보아야 하며 임신이 아닐 경우 생리 지연에 대한 진료를 받아 보는 것을 권해드리겠습니다.

귀두에 뭐가 났네요 에이즈일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 귀두포피염 으로 보입니다 자극을 피하시고 이차감염을 막기위해 항생제연고를 사용하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

뇌졸중 의심증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잠에서 깬 정도의 심한 두통과 말이 어눌해지고 균형감각이 이상이 생긴 것은 아주 전형적인 TIA일과성허혈발작증상 입니다. 빨리 신경과 진료를 보시고.. 뇌혈관에 대한 검사를 받아보시기 바랍니다.

미주신경성실신때 심박수 널뛰기 기립성저혈압 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 자율신경계중 하나인 부교감신경이 과도하게 활성화되어 혈압과 심박수를 급격히 떨어뜨리면서 발생하는데요. 기립성저혈압도 마찬가지로 갑자기 일어설때 혈압이 급격히 떨어지면서 실신이 나타날 수 있습니다. 스트레스나 피로에 의해서도 유발될 수 있는데.. 어쨌든 이로 인한 근육긴장일 가능성이 높아보입니다. 물론 미주신경성 실신시에 근육으로 가는 혈류가 줄어들어 근육이 빨리 피로해질수는 있습니다. 대체로 신체활동과 피로도에 의해 발생한 것으로 보이고요. 적절한 휴식과 스트레스관리가 지속적으로 해나가야 할 것 같습니다. 그래도 증상이 계속되거나 심해지면 꼭 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.

혈압측정 어느 장단에 맞춰야할지 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 여러가지 요인에 영향을 받으며 수시로 변화합니다. 주기적인 측정으로 추세를 파악하는것이 중요합니다. 측정한 모든 혈압이 내혈압이라고 생각하시면됩니다

머리가 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럽고 토할 것 같은 증상이 잠시 나타났다면 이는 미주신경성 실신반응과 같은 신경계 증상이었을 가능성이 높습니다. 말씀하신 뇌출혈과 같은 문제를 의심할만한 증상으로 보이지는 않습니다.

치루수술 후 관리 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치루 수술을 받으셨군요. 1. 직장에서는 거즈만 새 것으로 교체해주셔도 됩니다. 삼출액을 흡수하는 것이 가장 큰 목적입니다. 환부는

어차피 변으로 오염될 것이므로 무리하게 닦는게 더 좋습니다. 2. 아마 피딱지나 수술 중 태워진 조직이 검게 묻어나오는 것 같은데 신경쓰시지 마시고 계속 좌욕하고 거즈 교체해주시면 됩니다 환부를 이틀 전 확인받으셨고 잘 아물고 있다고 평가받으셨으니 괜찮은 상황으로 볼 수 있습니다.

귀두에 뭐가 났네요 에이즈일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 귀두포피염 으로 보입니다 자극을 피하시고 이차감염을 막기위해 항생제연고를 사용하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

피부발진 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황에서 발진이 발생한다면 콜린성 두드러기 가능성이 있습니다. 가렵거나 발진이 악화된다면 피부과 진료를 권합니다.

턱끝전진술 턱 누름 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정되신다면 치료 받으신 병원에 가서서 검사를 받아보세요

미주신경성실신때 심박수 널뛰기 기립성저혈압 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 자율신경계중 하나인 부교감신경이 과도하게 활성화되어 혈압과 심박수를 급격히 떨어트리면서 발생하는데요. 기립성저혈압도 마찬가지로 갑자기 일어설때 혈압이 급격히 떨어지면서 실신이 나타날 수 있습니다. 스트레스나 피로에 의해서도 유발될 수 있는데.. 어찌면 이로 인한 근육긴장일 가능성이 높아보입니다. 물론 미주신경성 실신시에 근육으로 가는 혈류가 줄어들어 근육이 빨리 피로해질수는 있습니다. 대체로 신체활동과 피로도에 의해 발생한 것으로 보이고요. 적절한 휴식과 스트레스관리가 지속적으로 해나가야 할 것 같습니다. 그래도 증상이 계속되거나 심해지면 꼭 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.

생리 예정일보다 11일 지남,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 여부에 대한 검사를 먼저 해보아야 하며 임신이 아닐 경우 생리 지연에 대한 진료를 받아 보는 것을 권해드리겠습니다.

뇌졸중 의심증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잠에서 깬정도의 심한 두통과 말이 어눌해지고 균형감각이 이상이 생긴 것은 아주 전형적인 TIA일과성허혈발작증상 입니다. 빨리 신경과 진료를 보시고.. 뇌혈관에 대한 검사를 받아보시기 바랍니다.

미주신경성실신때 심박수 널뛰기 기립성저혈압 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 자율신경계중 하나인 부교감신경이 과도하게 활성화되어 혈압과 심박수를 급격히 떨어트리면서 발생하는데요. 기립성저혈압도 마찬가지로 갑자기 일어설때 혈압이 급격히 떨어지면서 실신이 나타날 수 있습니다. 스트레스나 피로에 의해서도 유발될 수 있는데.. 어찌면 이로 인한 근육긴장일 가능성이 높아보입니다. 물론 미주신경성 실신시에 근육으로 가는 혈류가 줄어들어 근육이 빨리 피로해질수는 있습니다. 대체로 신체활동과 피로도에 의해 발생한 것으로 보이고요. 적절한 휴식과 스트레스관리가 지속적으로 해나가야 할 것 같습니다. 그래도 증상이 계속되거나 심해지면 꼭 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.

미주신경성실신때 심박수 널뛰기 기립성저혈압 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 자율신경계중 하나인 부교감신경이 과도하게 활성화되어 혈압과 심박수를 급격히 떨어트리면서 발생하는데요. 기립성저혈압도 마찬가지로 갑자기 일어설때 혈압이 급격히 떨어지면서 실신이 나타날 수 있습니다. 스트레스나 피로에 의해서도 유발될 수 있는데.. 어찌면 이로 인한 근육긴장일 가능성이 높아보입니다. 물론 미주신경성 실신시에 근육으로 가는 혈류가 줄어들어 근육이 빨리 피로해질수는 있습니다. 대체로 신체활동과 피로도에 의해 발생한 것으로 보이고요. 적절한 휴식과 스트레스관리가 지속적으로 해나가야 할 것 같습니다. 그래도 증상이 계속되거나 심해지면 꼭 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.

뇌졸중 의심증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잠에서 깬 정도의 심한 두통과 말이 어눌해지고 균형감각이 이상이 생긴 것은 아주 전형적인 TIA일과성허혈발작증상 입니다. 빨리 신경과 진료를 보시고.. 뇌혈관에 대한 검사를 받아보시기 바랍니다.

소변색에 대한 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 주황색은 소변이 농축되어 진한 색을 띤거 같네요 보통 아침 첫 소변은 농축되어 있습니다. 또는 특정 음식이나 색소가 있는 음식을 먹으면 주황색으로 보일 수가 있습니다. 만약 질병에 의한것이라면 간 또는 담낭에 문제시 황달이 소변에 배출되면 노란색이나 주황색으로 나올수도 있겠죠? 하지만 소변에 보일 정도이면 피부로도 변화가 있을것이니 잘 살펴보세요 물을 많이 마시면 희석되어 소변이 투명하게 맑아집니다. 정상적인 생리현상이니 걱정안하셔도 됩니다. 아침 소변이 주황색이고 수분 섭취시 소변색이 만리아지는 것은 정상적인 현상이니 크게 걱정하지 마시고.. 다른 동반된 증상이 있는지 확인해보세요

제가 체중이 160kg이 나가는데 수면 내시경 불가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수면 내시경은 마취가 아니라.. 수면제로 재우는 겁니다. 수면제가 과용량 들어가거나.. 약물 상호작용으로 과하게 작용하면 호흡부전이 생길 수 있습니다. 비만으로 인해 체중에 따른 수면제 용량이 과량 필요하고 진정제로 인한 약물 상호작용 가능성이 높아 일반내시경을 권한 것 같습니다. 보통 대장내시경을 안하고 위내시경만 하면.. 검사시간이 짧아서 안전하게 일반내시경하는게 더 안전합니다.

제가 체중이 160kg이 나가는데 수면 내시경 불가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수면 내시경은 마취가 아니라.. 수면제로 재우는 겁니다. 수면제가 과용량 들어가거나.. 약물 상호작용으로 과하게 작용하면 호흡부전이 생길 수 있습니다. 비만으로 인해 체중에 따른 수면제 용량이 과량 필요하고 진정제로 인한 약물 상호작용 가능성이 높아 일반내시경을 권한 것 같습니다. 보통 대장내시경을 안하고 위내시경만 하면.. 검사시간이 짧아서 안전하게 일반내시경하는게 더 안전합니다.

턱끝전진술 턱 누름 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정되신다면 치료 받으신 병원에 가셔서 검사를 받아보세요

상악동 거상술 이후 광대뼈 통증이 지속됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상악동 거상술 뼈이식까지 받은 이후로 계속 광대뼈 쪽 통증이 있습니다 왜 그럴까요 뭐 코로 물이 나온다는지 그런 건 없는데 광대뼈 쪽 통증이 계속 지속됩니다 치료 받으셨던 치과에 가셔서 검사를 한번 다시 받아보시느네 좋을 듯 합니다.

어금니에 통증 금이 짝 가있습니다 파절인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어금니에 통증이 있고 금이 간 거 같은데 치아 파절인가요? 자고 일어났을 때마다 통증이 있어서 보니까 금이 짝 가있는데 치아가 깨진 건가요? 어떤 치료를 받아야 하나요 심하게 깨진 건가요??? 사진만으로는 치아 파절 진단을 할 수는 없습니다. 가까운 치과에 가셔서 검사를 받아보세요

피임약 중단,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 가능성이 높지는 않지만 2일 중단을 했다면 배란이 이루어졌을 가능성이 있어 임신 가능성을 배제할 수 없습니다. 추후 임신테스트기 검사를 해보기 바랍니다.

생리중 질내사정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 중이라면 수정이 되더라도 착상이 어려워 임신 가능성은 낮습니다. 하지만 완전히 없는 것은 아니므로 추후 임신테스트기 확인이 하기 바랍니다.

남자 성기에 뭐가 올라왔는데 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 모낭염으로 보입니다 다른 불편함이 없다면 지켜보셔도될 것

같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

소변검사에서 혈뇨,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리중인 상황에서는 소변검사가 지저분하게 나오기도 합니다. 그러니 질문자님께서 검사하실 때 부정출혈로 인한 혈액이 묻어들어갔을 가능성도 존재는 하겠지만 이것으로 혈뇨가 아니라고 판단한다는 것은 아닙니다. 경과를 살펴 피며 출혈의 원인을 알아가보셔야 합니다.

요로감염 자궁 부정출혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈뇨를 보시는 경우에 이것이 소변에 섞인 혈액인지 자궁에서부터 시작된 것인지를 구별해내야 하겠는데 소변검사에서 혈뇨가 보이지 않았다면 말씀하신대로 부정출혈을 소변 볼 때 함께 관찰한 상황이었을 가능성이 높아 보입니다. 우선은 각 과에서의 치료가 서로 방해되지 않는다면 병행해보시고 경과를 지켜보시기 바랍니다.

날개뼈 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 움직이면 아픈가요? 가만히 있어도 아픈가요? 근육통일 가능성이 큰데 자세한 진찰이 필요한 상황으로 생각됩니다.

목 코감기로 1주 정도 약을 복용했는데 이런 콧물이 나왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부비동염이 합병된 것으로 보입니다. 증상이 있다면 항생제 추가 처방이 필요하니 담당의와 상의하는 것을 권해드립니다.

식도 화상인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이후 불편감이나 통증이 없다면 식도 점막의 손상 가능성은 매우 희박합니다. 걱정하지 마시고 증상이 있다면 진료를 보시기 바랍니다.

이런 경우는 신경과와 심장내과중 어느 곳을 가야될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥 가능성이 있습니다. 부정맥은 증상의 유무와 지속되는 시간이 중요합니다. 두근거림의 빈도가 늘었다면 부정맥 가능성에 대해 홀터 검사 등이 필요하므로 심장내과 진료를 보는 것이 좋겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

소변검사에서 혈뇨,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리중인 상황에서는 소변검사가 지저분하게 나오기도 합니다. 그러니 질문자님께서 검사하실 때 부정출혈로 인한 혈액이 묻어들어갔을 가능성도 존재는 하겠지만 이것으로 혈뇨가 아니라고 판단한다는 것은 아닙니다. 경과를 살펴 피며 출혈의 원인을 알아가보셔야 합니다.

물혹 커짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 황체낭종은 난소에서 난자가 배란된 후 황체가 형성되지 못하고 남아서 생기는 낭종입니다. 황체낭종은 보통 생리 전후에 크기가 증가하고 생리가 시작되면 크기가 줄어듭니다. 황체낭종은 대부분 크기가 5cm 이하로 크지 않고 특별한 증상이 없기 때문에 자연적으로 사라집니다. 하지만 황체낭종이 5cm 이상으로 커지거나 통증이 있거나 생리주기가 불규칙해지면 수술을 통해 제거해야 합니다. 카일리나 시술은 자궁내막증을 치료하기 위해 자궁 내막을 파괴하는 시술입니다. 카일리나 시술은 황체낭종을 치료하는 시술이 아니기 때문에 황체낭종이 커졌다면 카일리나 시술을 제거해야 합니다. 카일리나 시술을 제거하면 황체낭종이 자연적으로 사라질 수 있습니다. 하지만 황체낭종이 계속 커지거나 통증이 있다면 수술을 통해 제거해야 합니다. 생리 전후에 황체낭종이 갑자기 커지는 것은 정상적인 현상입니다. 하지만 황체낭종이 5cm 이상으로 커지거나 통증이 있거나 생리주기가 불규칙해지면 수술을 통해 제거해야 합니다.

안녕하세요 선생님 저번 pcr 검사 문의 추가로 남겨 봅니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. PCR 검사는 첫 소변이 아니더라도 괜찮습니다. 첫 소변이 아닌 경우에도 검사 결과에 영향을 미치지 않습니다. 염증이 미약하게 있는 경우에도 항생제를 처방받을 수 있습니다. 항생제를 처방받아 먹으면 염증이 사라집니다. 결석이 신장입구에 있으면서 미세한 염증이 생겼을 수도

있습니다. 염증이 사라지면 성병이라는 포비아에서 벗어날 수 있습니다.

소변검사에서 혈뇨,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리중인 상황에서는 소변검사가 지저분하게 나오기도 합니다. 그러니 질문자님께서 검사하실 때 부정출혈로 인한 혈액이 묻어들어갔을 가능성도 존재는 하겠지만 이것으로 혈뇨가 아니라고 판단한다는 것은 아닙니다. 경과를 살펴피며 출혈의 원인을 알아가보셔야 합니다.

정신건강 관련 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알코올 의존증과 불안 장애가 함께 있는 것으로 보이며 자해를 한다면 응급 진료가 필요합니다. 정신건강의학과 진료를 반드시 보시기 바랍니다.

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신가능성이 가장 높은 날은 배란기 입니다. 배란일 앞으로 5일 뒤로 2일 해서 일주일 정도가 임신가능한 기간입니다.

치핵 자연치료 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신대로 변기에 오래 앉아있는 습관은 치핵을 유발하고 악화시킵니다. 이 습관을 교정하지 않는다면 질환은 더욱 심해질 것이고 결국에는 수술적 치료가 필요한 단계까지 이어질 수 있습니다. 그러므로 습관부터 고치시기 바랍니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈의 크기라는 것이 사실 안구의 크기가 아니라 눈을 떼을 때 상안검과 하안검 사이의 거리가 먼 것을 의미하기 때문에 생김새에 의해 결정된다고 보아야 하겠고 유전적 요인이 크게 작용하겠으며 쌍꺼풀이 없어도 큰 사람이 존재할 수 있겠습니다.

점 빼고 듀오덤,안녕하세요. 메디이즈입니다. 점을 제거한 자리에 피부가 아직 다 재생되지 못한 상태라 보인다면 노카나보다는 마카솔이 더 적합한 상태라고 보아야 합니다. 다 아물고 나면 그때부터 노카나를 사용하시는 것이 적절합니다.

피부과에서 후두근에도 보톡스 놔주나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 후두근에 대한 보톡스 시술은 두통이나 경추부근의 통증을 관리하기 위해 행해지는 편이라서 해당 피부과에 문의를 해보시는게 좋겠습니다. 보톡스는 신경과나 신경외과 정형외과 등의 진료과에서 시행하는 편입니다.

엉덩이 종기 붓기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 남아 있다면 추가 배농이 필요할 수 있어 진료를 다시 보고 결정하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

혈압측정 어느 장단에 맞춰야할지 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 여러가지 요인에 영향을 받으며 수시로 변화합니다. 주기적인 측정으로 추세를 파악하는것이 중요합니다. 측정한 모든 혈압이 내혈압이라고 생각하시면됩니다

치루수술 후 관리 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치루 수술을 받으셨군요. 1. 직장에서는 거즈만 새 것으로 교체해주셔도 됩니다. 삼출액을 흡수하는 것이 가장 큰 목적입니다. 환부는 어차피 변으로 오염될 것이므로 무리하게 닦는게 더 안좋습니다. 2. 아마 피딱지나 수술 중 태워진 조직이 검게 물어나오는 것 같은데 신경쓰시지 마시고 계속 좌욕하고 거즈 교체해주시면 됩니다 환부를 이틀 전 확인받으셨고 잘 아물고 있다고 평가받으셨으니 괜찮은 상황으로 볼 수 있습니다.

머리가 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럽고 토할 것 같은 증상이 잠시 나타났다면 이는 미주신경성 실신반응과 같은 신경계 증상이었을 가능성이 높습니다. 말씀하신 뇌출혈과 같은 문제를 의심할만한 증상으로 보이지는 않습니다.

자고 일어나면 눈 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기상 시 나타나는 안구의 통증이 지속되어 안과 진료도 받아보셨지만 안과적으로는 특별한 문제가 없었던 것으로 보입니다. 그렇다면

추가적으로 신경과 진료를 고민해보실만한 상황이라 보이므로 가까운 의원을 찾아보시기를 권해드립니다.

요로감염 자궁 부정출혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈뇨를 보시는 경우에 이것이 소변에 섞인 혈액인지 자궁에서부터 시작된 것인지를 구별해내야 하겠는데 소변검사서 혈뇨가 보이지 않았다면 말씀하신대로 부정출혈을 소변 볼 때 함께 관찰한 상황이었을 가능성이 높아 보입니다. 우선은 각 과에서의 치료가 서로 방해되지 않는다면 병행해보시고 경과를 지켜보시기 바랍니다.

영당이 증기 붓기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 남아 있다면 추가 배농이 필요할 수 있어 진료를 다시 보고 결정하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

고지혈증 약과 피부과 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고지혈 약의 성분이 페노피브레이트입니다. 피부과 약에서 피 정이 스테로이드 호르몬 전구체 라서 영향이 있습니다. 미노사이클린 성분의 항생제도 있기에 술과 기름진 음식을 안 먹어야 합니다. 혹시 드신다면 최악의 경우에는 황달이나 급성으로 간염이 올 수 있습니다. 피부과 약이 며칠을 받으셨는지 모르겠으나 제 개인적인 의견으로는 피부과약 먹는 동안은 고지혈 약을 안 드시는 것이 좋습니다.

남자 성기에 뭐가 올라왔는데 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 모낭염으로 보입니다. 다른 불편함이 없다면 지켜보셔도 될 것 같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

피임약 중단,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 가능성이 높지는 않지만 2일 중단을 했다면 배란이 이루어졌을 가능성이 있어 임신 가능성을 배제할 수 있습니다. 추후 임신테스트기 검사를 해보기 바랍니다.

피임약 중단,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 가능성이 높지는 않지만 2일 중단을 했다면 배란이 이루어졌을 가능성이 있어 임신 가능성을 배제할 수 있습니다. 추후 임신테스트기 검사를 해보기 바랍니다.

골반저근 보톡스,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보톡스 주사와 내과에서 맞으신 영당이 주사 둘 다 가능성이 있습니다. 비뇨기과에서 진료를 보셔서 괜찮았다고 들으셨다면 우선 경과관찰 하면서 조금 지켜보셔도 될 것 같습니다. 답변이 도움이 됐으면 좋겠습니다.

혈압측정 어느 장단에 맞춰야할지 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 여러가지 요인에 영향을 받으며 수시로 변화합니다. 주기적인 측정으로 추세를 파악하는것이 중요합니다. 측정한 모든 혈압이 내혈압이라고 생각하시면됩니다.

근육통 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 복용하시는 약과 영당이 근육통 증상과는 서로 연관은 없어보입니다. 혹시 상기 약물 드신지는 얼마나 되셨나요?

백내장 도수,안녕하세요. 메디이즈입니다. 백내장 도수가 높다는 말은 무슨 의미인지 잘 모르겠습니다. 백내장의 정도가 심하다는 의미시라면 수술밖에는 방법이 없습니다. 백내장 수술이라는 것이 백내장화된 자기 수정체를 제거하고 그 위치에 인공수정체를 삽입하는 것입니다. 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

adhd 약 복용 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문 내용 잘 보았습니다. 많이 힘드실 것 같아 무거운 마음입니다. 답변드리겠습니다. 대학병원의사선생님 말씀처럼 ADHD치료제는 심혈관계에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.100는 아닙니다. 그러므로 보수적인 관점에서는 ADHD치료제 처방에 부정적일 수 있습니다. 또한 심혈관계질환과 ADHD이 동시에 있는 경우 일반적인 개인의원에서 진료하는 것보다 기존의 대학병원 정신과

에서 진료받는 것이 심혈과내과의 협진이 편리하고 보다 자세한 심리검사를 시행할 수 있는 장점이 있습니다. 결론적으로 현재 다니고 있는 대학병원의 정신과에서 진료받는 것을 추천드립니다. 아무쪼록 도움이 되셨길 바라며 몸도 마음도 쾌유하시길 기원하겠습니다.

디오퍼 측정 오차 가능성 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 디오퍼 값은 기계안을 들여다볼 때 농가나 기구를 들여다볼 때 측정하는 거고 글자를 보는 것은 시력을 측정하는 거라 환자분 말씀과 상관 없이 디오퍼 값 근시 난시 등의 굴절오차 는 측정됩니다. 2. 1번과 같은 내용일 거 같습니다. 3. 건조증 등의 안구표면질환의 영향으로 덜 보일 수 있습니다. 4. 안저 검사까지 받으셨어도 그런다면 그럴 거 같습니다. 혹시 망막 검사를 받으셨는 지 안받으셨는 지 애매하다면 해당 부분은 안과에 전화해서 물어보시면 될 거 같습니다. 감사합니다.

배란이 되고나면 난포가 쭈글쭈글한 흔적으로 남는다는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리가 시작된 후 곧 사라집니다. 쭈글쭈글한 흔적이라기 보다 배란 된 난포가 황체로 변화하면서 보이는 소견입니다.

뭐가 문제인지 무슨 병인지 모르겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한마디로 설명하기는 어렵지만 장에 문제가 있어보입니다. 장내 세균불균형으로 인하여 두통 가려움증 발한 복통 종기 이런증상이 생기는 것이 아닌가 싶습니다. 불면증도 해결해야 합니다 밀가루 우유 계란 인스턴트 음식을 끊고 채식위주의 식사를 해보셔요

성병 근육통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련 없을 것 같습니다 다만 성관계가 있었기 때문에 증상과 상관없이 검사는 받는 것이 좋습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

유니네콜절이랑 리스페달정이랑 같이 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 상관없습니다 다만 진료를 받고 처방받아 복용하십시오 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 댓글주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

상대 여성이 고위험군 39번 보균자인 경우 제가 전염 되었는지 어떻게 확인하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 지금이라도 소변검사와 브러쉬를 이용한 유전자 검사를 받는 것입니다 검사에서 이상이 없다면 걱정안하셔도 될 것 같습니다 보통 감염이 되도 이년정도면 자연소멸되는 경우가 많습니다 백신을 접종하는 것도 효과적입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

전거비인대 파열 비수술 21일 째 차도가 있는걸까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠습니다. 인대 손상의 경우 흔히 이야기하는 통깁스를 하기도 하나 반깁스를 잘하는 것 이랑 크게 차이를 느끼지는 못하실 겁니다. 날씨도 더워지니 불편함은 가중이 될테구요. 인대 손상의 정도에 따라 개개인이 다 다르나 3주나 지난 시점이라면 적절한 관절운동은 시작하면서 치료를 병행하는 것이 좋을 것 같습니다. 피가 솔리는 듯한 것은 아직 하중에 제대로 덜 실려서 나타나는 증상이니 너무 걱정 마시구요. 보통 골절이 있으면 많이 다친 것이고 인대는 쉽게 생각하는데 재활 과정에서 만족도가 떨어지는 것은 오히려 후자쪽입니다. 병원을 옮겨서 진료를 한번 보시는 것도 나쁘지 않을 듯 하며 현시점에서는 적극적인 치료가 필요해 보여집니다. 쾌유를 바라겠습니다.

반월상 연골 파열 제거봉합술 이후 2년 뒤 통증,안녕하세요. 하이닥 정형외과 상담의 허성우입니다 우선은 현 상태에 대한 정확한 평가가 필요할 듯 하니 재수술을 먼저 고민할 것이

아니라 진찰과 MRI를 통하여 문제의 여부를 확인하는 것이 우선일 듯 합니다. 쾌유바라겠습니다.

난소파열로 인한 복강내 출혈과 질초음파 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 출혈양에 따라 다를 수 있습니다. 이전 검사결과가 있다고 하면 이전검사와 비교가 가능하니 어느정도 확인이 용이 할것 같습니다

무대조명 눈에 맞았어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조명으로 사용하는 것은 눈에 큰 문제가 생길것으로 생각되지는 않습니다. 불편한 증상이 있으시니 진료를 받아보시는 것을 권합니다
성병 근육통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련없을 것 같습니다 다만 성관계가 있었기 때문에 증상과 상관없이 검사는 받는 것이 좋습니다
답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

다리에 갑자기 큰 멍,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 충격이 없이 멍이 든다면 혈액 응고 인자 장애나 혈소판 감소증에 대한 혈액검사가 검사가 필요합니다. 상급병원이 아니더라도 검사가 가능하니 연고지 병의원 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

목 코감기로 1주 정도 약을 복용했는데 이런 콧물이 나왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부비동염이 합병된 것으로 보입니다. 증상이 있다면 항생제 추가 처방이 필요하니 담당의와 상의하는 것을 권해드립니다.

요로결석 합병증 신우신염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요로결석으로 인해 요관 폐쇄가 발생하면 세균이 증식하면서 신우신염이 합병될 수 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

피임약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약 복용을 잊거나 시간이 바뀌거나 그러지는 않았나요? 원래 복용법을 잘 지키고 계셨다고 하면 지금 복용하고 있는 스케줄대로 남은 약을 다 드시고 새로운 팩을 드시는 것이 좋겠습니다. 피임효과는 유지될 것으로 생각됩니다

목 코감기로 1주 정도 약을 복용했는데 이런 콧물이 나왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부비동염이 합병된 것으로 보입니다. 증상이 있다면 항생제 추가 처방이 필요하니 담당의와 상의하는 것을 권해드립니다.

귀 뒤의 염증 정체가 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 함께 농양이 합병된 것으로 보입니다. 항생제 복용 및 배농이 필요하므로 진료를 보시는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

임신 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

비뇨기과약이랑 정신과약이랑 같이 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약의 성분을 알 수 없으나 대부분 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

생리중 질내사정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 중이라면 수정이 되더라도 착상이 어려워 임신 가능성은 낮습니다. 하지만 완전히 없는 것은 아니므로 추후 임신테스트기 확인이 하기 바랍니다.

식도 화상인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이후 불편감이나 통증이 없다면 식도 점막의 손상 가능성은 매우 희박합니다. 걱정하지 마시고 증상이 있다면 진료를 보시기 바랍니다.

날개뼈 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 움직이면 아픈가요? 가만히 있어도 아픈가요? 근육통일 가능성이 큰데 자세한 진찰이 필요한 상황으로 생각됩니다.

발이랑 발목에 난 것좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 접촉성 피부염이 있고 긁으면서 일부 상처가 발생한 후 호전되는 과정으로 보입니다. 별도의 치료는 필요하지 않을 것으로 보입니다.

임신 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이런 경우는 신경과와 심장내과중 어느 곳을 가야될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥 가능성이 있습니다. 부정맥은 증상의 유무와 지속되는 시간이 중요합니다. 두근거림의 빈도가 늘었다면 부정맥 가능성에 대해 홀터 검사 등이 필요하므로 심장내과 진료를 보는 것이 좋겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정자는 자궁내에서 5일 내외로 생존 가능하며 상기 행위로 인한 임신 가능성은 없다고 보아도 무방합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

정신건강 관련 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알코올 의존증과 불안 장애가 함께 있는 것으로 보이며 자해를 한다면 응급 진료가 필요합니다. 정신건강의학과 진료를 반드시 보시기 바랍니다.

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신가능성이 가장 높은 날은 배란기 입니다. 배란일 앞으로 5일 뒤로 2일 해서 일주일 정도가 임신가능한 기간입니다.

이런 경우는 신경과와 심장내과중 어느 곳을 가야될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥 가능성이 있습니다. 부정맥은 증상의 유무와 지속되는 시간이 중요합니다. 두근거림의 빈도가 늘었다면 부정맥 가능성에 대해 홀터 검사 등이 필요하므로 심장내과 진료를 보는 것이 좋겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

정신건강 관련 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알코올 의존증과 불안 장애가 함께 있는 것으로 보이며 자해를 한다면 응급 진료가 필요합니다. 정신건강의학과 진료를 반드시 보시기 바랍니다.

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정자는 자궁내에서 5일 내외로 생존 가능하며 상기 행위로 인한 임신 가능성은 없다고 보아도 무방합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

얼리임신테스트기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리 임신테스트기는 관계 후 8일 정도면 사용해도 됩니다. 하지만 임신 초기에는 임신 호르몬인 hCG 수치가 낮기 때문에 임신 결과가 정확하지 않을 수 있습니다. 따라서 임신테스트기를 사용한 후에는 2주 정도 후에 다시 한 번 검사하는 것이 좋습니다. 임신테스트기는 임신 호르몬인 hCG가 소변에 섞여 나오면 임신 양성 반응을 나타냅니다. hCG는 임신 67주부터 소변에 나오기 시작합니다. 따라서 임신테스트기는 임신 67주 이후에 사용하면 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 임신 초기에는 hCG 수치가 낮기 때문에 임신테스트기를 사용한 후에는 2주 정도 후에 다시 한 번 검사하는 것이 좋습니다. 임신테스트기를 사용하기 전에 소변을 충분히 보고 임신테스트기를 소변에 1015초 정도 담근 후 결과를 확인합니다. 임신테스트기의 선이 두 개 나오면 임신 양성 반응이고 선이 한 개만 나오면 임신 음성 반응입니다. 임신테스트기의 결과가 양성인 경우 산부인과에서 임신 초기 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 임신 초기 검사에서는 임신 주수와 임신 상태를 확인하고 임신 중 필요한 영양소와 비타민을 처방받을 수 있습니다. 임신테스트기의 결과가 음성인 경우에도 생리 예정일이 지나도 생리가 오지 않으면 임신 가능성을 염두에 두고 산부인과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

습진약 복용 관련해서 궁금증이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 병변이 어느정도 좋

아지는지 경과를 보고 약을 더 먹을지 로션만 바를지 결정 해야 할것 같습니다 2. 정상피부에 가까워 질때까지는 바르는 게 좋겠죠? 3. 기본두번 심하면 세번 바르셔요.

신경통이 가슴에서 얼굴로 올라와요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이상감각이 전신을 돌아다니면서 발생한다면 단순 약물 치료보다는 이에 대한 원인을 찾는 것이 필요하니 상급병원 신경과 진료를 권해드립니다.

정신건강 관련 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알코올 의존증과 불안 장애가 함께 있는 것으로 보이며 자해를 한다면 응급 진료가 필요합니다. 정신건강의학과 진료를 반드시 보시기 바랍니다.

무지개 빛번짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상만으로는 녹내장이라고 단정짓기는 어렵습니다. 하지만 빛번짐이 심하다면 안과적 질환에 대한 감별을 위해 진료를 권합니다.

공황은 자의로 이겨낼 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공황장애는 자의로 이겨낼 수 있는 질환이 아닙니다. 공황장애는 불안을 조절하는 신경전달물질의 불균형으로 인해 발생하는 질환으로 약물치료와 인지행동치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 약물치료는 불안을 조절하는 신경전달물질의 균형을 회복시켜 공황장애 증상을 완화시키는 데 도움이 됩니다. 인지행동치료는 공황장애에 대한 잘못된 생각과 행동을 교정하고 불안을 조절하는 방법을 배우는 데 도움이 됩니다. 공황장애는 완치가 가능한 질환이지만 치료를 중단하면 증상이 다시 나타날 수 있으므로 꾸준한 치료가 필요합니다. 따라서 공황장애가 의심된다면 신경정신과 전문의의 진료를 받아보시기 바랍니다.

성기 근처에 빨간 뾰루지 같은게 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

요로결석 합병증 신우신염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요로결석으로 인해 요관 폐쇄가 발생하면 세균이 증식하면서 신우신염이 합병될 수 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

윤곽 주사 후 전자담배 질문있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 윤곽 주사 효과와 전자담배는 크게 상관 있지는 않습니다. 다만 시술 당일에는 흡연시 감염 및 염증의 가능성을 높이기 때문에 24시간은 금연하는 것을 권해드립니다.

귀 뒤의 염증 정체가 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 함께 농양이 합병된 것으로 보입니다. 항생제 복용 및 배농이 필요하므로 진료를 보시는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

잘 때 심장 빠르게 두근거리고 한쪽 귀 열감 열감있는 쪽 안면 이마 광대 쪽 통증이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥 가능성이 있습니다. 부정맥은 증상의 유무와 지속되는 시간이 중요합니다. 두근거림의 빈도가 늘었다면 부정맥 가능성에 대해 홀터 검사 등이 필요하므로 심장내과 진료를 보는 것이 좋겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

발이랑 발목에 난 것좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 접촉성 피부염이 있고 긁으면서 일부 상처가 발생한 후 호전되는 과정으로 보입니다. 별도의 치료는 필요하지 않을 것으로 보입니다.

비뇨기과약이랑 정신과약이랑 같이 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약의 성분을 알 수 없으나 대부분 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

식도 화상인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이후 불편감이나 통증이 없다면 식도 점막의 손상 가능성은 매우 희박합니다. 걱정하지 마시고 증상이 있다면 진료를 보시기 바랍니다.

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정자는 자궁내에서 5일 내외로 생존 가능하며 상기 행위로 인한 임신 가능성은 없다고 보아도 무방합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

생리중 질내사정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 중이라면 수정이 되더라도 착상이 어려워 임신 가능성은 낮습니다. 하지만 완전히 없는 것은 아니므로 추후 임신테스트기 확인이 하기 바랍니다.

이런 경우는 신경과와 심장내과중 어느 곳을 가야될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥 가능성이 있습니다. 부정맥은 증상의 유무와 지속되는 시간이 중요합니다. 두근거림의 빈도가 늘었다면 부정맥 가능성에 대해 홀터 검사 등이 필요하므로 심장내과 진료를 보는 것이 좋겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

목 코감기로 1주 정도 약을 복용했는데 이런 콧물이 나왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부비동염이 합병된 것으로 보입니다. 증상이 있다면 항생제 추가 처방이 필요하니 담당의와 상의하는 것을 권해드립니다.

임신 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

방금 임신 관련 질문 드렸었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다래끼 약은 임신 여부를 확인 하는 검사에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 결과를 신뢰해도 되며 걱정이 된다면 재검을 해 보기 바랍니다.

비뇨기과 질의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에서는 12종검사 음성이구 전립선염 인것 같다고해서 처음1주일약먹고 다시 2주 약지어와서 먹고 있는데 효과는 없고 사진 부분이 불편하군요. 치료 받으시는 병원 원장님과 대학병원급 진료에 필요성에 대한 상의를 해 보도록 하십시오.

성기 근처에 빨간 뾰루지 같은게 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

사타구니 발진이 있는데요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

다리에 갑자기 큰 멍,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 충격이 없이 멍이 든다면 혈액 응고 인자 장애나 혈소판 감소증에 대한 혈액검사가 검사가 필요합니다. 상급병원이 아니더라도 검사가 가능하니 연고지 병의원 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

피임약 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두가지 모두 예전에 나온 약들입니다 2세대 피임약이라고 부르는데요 약이 본인에게 안 맞는 경향이라면 산부인과에 가서서 여러검사를 통해 호르몬 수치 변화를 정확히 보시고 전문약으로 처방전 약으로 받아서 드시는 것이 더 안전하고 몸에도 좋습니다 자궁벽을 두껍게 만들어주는 호르몬의 수치가 낮은 경우 부정출혈이 생길수도 있지만 복용하고 있는 여성분의 체력이 너무 떨어져 있을때도 약을 100 흡수하지 못하여 약효가 적게 나타날 수 있습니다 단순히 예를 들어서 동그랗고 예쁘게 만두를 만든다고 가정해볼게요 그러면 만두피를 얇고 일정한 두께로 만들어주는게 첫번째 만두 속 내용물을 고르게 다지는 것이 두번째 적당한 시간과 온도로 잘 찌내는 것이 세번째 정도로 설명할 수 있을 거 같은데요 여성호르몬은 갑상선과 혈중 철분량 그리고 체내 단백질 식사를 잘하는가에 따라 달라집니다 그리고 수면시간도 일정하고 변비 거의 없이 잘 배출하고 몸이 잘 붓지

않게 림프의 순환도 좋아야 합니다 그리고 적당한 운동도 사실 필요합니다 결론 약이 나에게 안 맞는지 아니면 내가 약에 안 맞는건지 잘 판단하시기 위해서는 산부인과 전문의와 상의하시는 것이 가장 현명합니다 건강하세요

눈에 대해 질문했었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최악의 시나리오에서는 감염이 조절이 안되면 그런 증상이 생길 수 있습니다. 일상적인 상황에서는 고려되는 부분은 아닙니다

약부작용 두통 설사 졸림 추위,안녕하세요. 메디이즈입니다. 처방받은 항생제와 가래약으로 위장장애 일으킬수 가 있고 항히스타민제로 졸음을 유발할수 있습니다. 약에 의한 부작용으로 생각되신다면 약을 중단하시거나 제산제와 같은 위벽보호제를 처방 받으시기 바랍니다.

덩어리혈이 심해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 불순은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 약 복용도 생리 불순의 원인이 될 수 있습니다. 특히 호르몬 분비계 이상을 조절하는 약을 복용하면 생리 불순이 발생할 수 있습니다. 따라서 생리 불순이 발생했다면 복용 중인 약을 확인해보고 약이 생리 불순의 원인이 될 수 있는지 의사와 상담해 보시기 바랍니다.

경구 당부하 검사후 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 뇌하수체 선종은 뇌하수체의 종양으로 성장호르몬 갑상선자극호르몬 프로락틴 등의 호르몬을 과도하게 분비할 수 있습니다. 경구 당부하 검사는 뇌하수체 선종으로 인해 성장호르몬이 과도하게 분비되는지를 확인하기 위한 검사입니다. 경구 당부하 검사에서 수치가 14 중 1.8이 나왔다면 성장호르몬이 정상보다 높게 분비되고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 뇌하수체 선종의 크기가 6.5mm이고 현재 심장이나 관절 외모 등에는 문제가 없다면 당장 주사나 수술이 필요한 것은 아닙니다. 하지만 성장호르몬이 과도하게 분비되면 관절과 뼈의 이상 심장 질환 당뇨 고혈압 등의 합병증이 발생할 수 있으므로 주기적으로 경구 당부하 검사를 시행하여 성장호르몬 수치를 확인하고 합병증이 발생하지 않도록 관리해야 합니다. 2. IGF1은 성장호르몬의 효과로 인해 간에서 생성되는 단백질입니다. IGF1 피검시에는 식사 후 2시간이 지난 상태에서 피를 채취합니다. 성장호르몬은 당을 먹으면 수치가 떨어지므로 식사 후 2시간이 지난 상태에서 피를 채취하면 성장호르몬의 수치를 정확하게 측정할 수 있습니다.

Tfcc수술후 손목 힘빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 3년 전에 오른손 수술을 받았고 현재 악력이 48 정도 나오지만 가끔 오른손 힘이 풀어지는 느낌을 받고 있다면 손목 힘이 완전히 회복되지 않은 것으로 보입니다. 손목 힘을 회복하기 위해서는 악력기를 꾸준히 하는 것이 좋지만 손목에 무리가 가지 않도록 적당한 강도로 운동해야 합니다. 또한 손목을 과도하게 사용하지 않도록 주의하고 손목을 따뜻하게 유지하는 것도 도움이 됩니다. 만약 손목 힘이 계속 떨어지거나 통증이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보시기 바랍니다.

빨간색으로 되어 있는 부분 상태가 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

다리와 오른쪽 사타구니 쪽에 붉은 반점이 올라왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 점상출혈은 모세혈관의 출혈로 인해 피부와 점막에 나타나는 직경 3mm 이하의 붉은색 또는 보라색의 반점을 말합니다. 일반적으로 심각한 상태를 나타내는 증상이 아니지만 다른 질환의 증상일 수도 있으므로 의사의 진찰을 받는 것이 중요합니다. 원인은 다양합니다. 외상 점상출혈의 가장 흔한 원인 중 하나입니다. 교통사고 운동 중 부상 타박상 낙상 충돌 마찰등의 직접적인 충격이 가해지는 외상으로 인해 모세혈관이 터지면 발병을 유발할 수 있습니다. 약물 부작용 일부 약물 특히 항혈소판제나 항응고제 등의 약물 부작용으로 인해 점상출혈이 발생할 수 있습니다. 자가면역 질환 루푸스 혈소판 감소성 자반증 등의 자가면역 질환에서도 점상출

혈이 나타날 수 있습니다. 혈액 질환 혈소판 감소증 백혈병 등의 혈액 질환에서도 점상출혈이 나타날 수 있습니다. 기타 스트레스 피로 알레르기 등도 점상출혈의 원인이 될 수 있습니다. 지속적이거나 반복되면 진료를 받아보셔야

임신일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신테스트기에서 음성으로 확인되었으므로 임신 가능성은 사실상 없다고 봐도 됩니다. 부정 출혈로 보이는데 지속된다면 진료를 보시기 바랍니다.

전기로 인해 생긴 통증 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전류에 의한 조직 손상일 경우 감전 후 바로 증상이 나타나는 경우가 많습니다. 현재 경미한 통증만 있다면 큰 문제는 되지 않습니다.

3일 전에 전류로 생긴 통증 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전류에 의한 조직 손상일 경우 감전 후 바로 증상이 나타나는 경우가 많습니다. 현재 경미한 통증만 있다면 큰 문제는 되지 않습니다.

마찰화상인거 같은데 흉터 남을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시간이 지나면서 호전될 가능성이 높습니다. 반흔의 유무는 6개월 후에 판단하게 되므로 현재는 명확하게 이야기 하기 어렵습니다.

마찰화상인거 같은데 흉터 남을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 회복은 당연히 되겠지만 상처가 조금 깊어 보이네요. 흉은 조금 남을 것으로 생각됩니다. 상처가 아물고 흉터제품도 사용하시는 것이 좋겠습니다

배에 작은 화상을 입고 일주일 정도 넘었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1도 화상이라면 시간이 지나면서 호전될 가능성이 높습니다. 6개월 후에도 변화가 없다면 피부과 내원하여 레이저 등의 치료가 필요합니다.

다리에 갑자기 큰 멍,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 충격이 없이 멍이 든다면 혈액 응고 인자 장애나 혈소판 감소증에 대한 혈액검사가 검사가 필요합니다. 상급병원이 아니더라도 검사가 가능하니 연고지 병원 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

팔목쪽에 빨간 반점같은게 생겨요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 팔목에 빨간 반점이 생기는 원인은 다양합니다. 가장 흔한 원인은 모낭염입니다. 모낭염은 모낭에 세균이 감염되어 생기는 질환으로 붉은색의 뾰루지가 생기고 통증이 있습니다. 모낭염은 항생제 연고를 바르면 치료할 수 있습니다. 또한 팔목에 빨간 반점이 생기는 원인으로는 습진 알레르기 반응 피부암 등이 있습니다. 습진은 피부의 염증으로 가려움증과 홍반이 나타납니다. 알레르기 반응은 알레르기 물질에 노출되었을 때 나타나는 증상으로 가려움증과 홍반이 나타납니다. 피부암은 피부 세포의 악성화로 발생하는 질환으로 붉은색의 혹이 생기고 통증이 있습니다. 팔목에 빨간 반점이 생겼다면 병원에 방문하여 정확한 진단을 받아보는 것이 좋습니다.

다리와 오른쪽 사타구니 쪽에 붉은 반점이 올라왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 점상출혈은 모세혈관의 출혈로 인해 피부와 점막에 나타나는 직경 3mm 이하의 붉은색 또는 보라색의 반점을 말합니다. 일반적으로 심각한 상태를 나타내는 증상이 아니지만 다른 질환의 증상일 수도 있으므로 의사의 진찰을 받는 것이 중요합니다. 원인은 다양합니다. 외상 점상출혈의 가장 흔한 원인 중 하나입니다. 교통사고 운동 중 부상 타박상 낙상 충돌 마찰등의 직접적인 충격이 가해지는 외상으로 인해 모세혈관이 터지면 발병을 유발할 수 있습니다. 약물 부작용 일부 약물 특히 항혈소판제나 항응고제 등의 약물 부작용으로 인해 점상출혈이 발생할 수 있습니다. 자가면역 질환 루푸스 혈소판 감소성 자반증 등의 자가면역 질환에서도 점상출혈이 나타날 수 있습니다. 혈액 질환 혈소판 감소증 백혈병 등의 혈액 질환에서도 점상출혈

이 나타날 수 있습니다. 기타 스트레스 피로 알레르기 등도 점상출혈의 원인이 될 수 있습니다. 지속적이거나 반복되면 진료를 받아보श्य.

마찰화상인거 같은데 흉터 남을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 회복은 당연히 되겠지만 상처가 조금 깊어 보이네요. 흉은 조금 남을 것으로 생각합니다. 상처가 아물고 흉터제품도 사용하시는 것이 좋겠습니다

골반 장골전면 순간따끔한 증상이 지속됩니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 장골 앞쪽 주변의 순간따끔한 증상은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 장골 부위의 근육이나 인대의 통증입니다. 장골 부위에 있는 근육이나 인대가 과도하게 긴장하거나 염증이 생기면 순간적으로 따끔한 통증이 발생할 수 있습니다. 또한 장골 부위에 있는 신경이 압박을 받으면 순간적으로 따끔한 통증이 발생할 수 있습니다. 장골 부위의 통증이 심하거나 오래 지속된다면 병원을 방문하여 진료를 받아보시기 바랍니다. 의사는 환자의 증상을 자세히 듣고 신체 검사를 실시한 후 필요한 검사를 시행하여 정확한 진단을 내리고 적절한 치료를 처방해 줄 것입니다.

아토목세틴이랑 타이레놀 같이 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아세틴은 노르에피네프린 재흡수 억제제norepinephrine reuptake inhibitor NRI입니다. 타놀은 진통제입니다. 두 약은 서로 다른 작용을 하므로 같이 먹어도 문제가 없습니다. 다만 두 약 모두 간에서 대사되므로 간 기능이 저하된 경우에는 주의해야 합니다. 또한 아세틴은 졸음이 올 수 있으므로 운전이나 기계 조작을 할 때는 주의해야 합니다.

췌장에 침착된 단순 지방조직도 관찰이 필요할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 췌장머리에 지방이 침착되어 있고 간에 물혹이 있는 경우 당장 치료가 필요하지는 않지만 추적 관찰이 필요합니다. 췌장머리에 지방이 침착되어 있는 경우 췌장암으로 진행할 수 있기 때문에 23년마다 CT 검사를 통해 크기가 커지는지 확인해야 합니다. 또한 간에 물혹이 있는 경우 크기가 커지거나 다른 증상이 나타나면 치료가 필요할 수 있기 때문에 12년마다 CT 검사를 통해 크기를 관찰해야 합니다. 가족력이 있는 경우 췌장암이나 간암에 대한 위험이 높기 때문에 정기적으로 검사를 받는 것이 좋습니다.

Hpv바이러스에 대해 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 에이즈는 혈액이나 체액을 통해 전염되는 질환입니다. 따라서 비보균자끼리 키스를 한다고 해서 에이즈에 감염될 가능성은 없습니다. HPV는 성관계를 통해 전염되는 질환입니다. 따라서 비보균자끼리 키스를 한다고 해서 HPV에 감염될 가능성은 없습니다. 딥키스는 침이 많이 섞이므로 감염성이 높은 편입니다. 하지만 비보균자끼리 딥키스를 한다고 해서 에이즈나 HPV에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 입안에 상처가 있다고 해서 에이즈나 HPV에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 하지만 만약 상대방이 에이즈나 HPV에 감염되어 있다면 키스를 통해 감염될 가능성은 있습니다. HPV는 대부분 무증상이며 대부분의 경우 자연적으로 치유됩니다. 하지만 일부 HPV 바이러스는 자궁경부암을 유발할 수 있습니다. 따라서 HPV에 감염되었더라도 꾸준히 검진을 받아야 합니다.

Hpv 및 에이즈에 관해 다시 수정해서 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 에이즈는 체액을 통해 전염되기 때문에 키스를 통해 에이즈에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 하지만 키스를 통해 에이즈에 감염될 가능성이 완전히 없다고는 할 수 없습니다. 따라서 에이즈에 감염될 위험이 있는 사람과 키스하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 2. HPV는 피부와 피부 접촉을 통해 전염될 수 있습니다. 따라서 키스를 통해 HPV에 감염될 가능성은 있습니다. 하지만 키스를 통해 HPV에 감염될 가능성이 완전히 없다고는 할 수 없습니다. 따라서 HPV에 감

염될 위험이 있는 사람과 키스하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 3. HPV는 성기나 입술에 사마귀를 일으키는 바이러스입니다. HPV에 걸리면 사망하지 않습니다. 하지만 HPV에 걸리면 사마귀가 생기거나 자궁경부암에 걸릴 수 있습니다. 따라서 HPV에 걸리지 않도록 예방하는 것이 중요합니다. 4. 딥키스는 침을 많이 주고받기 때문에 HPV에 감염될 가능성이 더 높습니다. 하지만 딥키스를 하지 않더라도 HPV에 감염될 가능성은 있습니다. 따라서 HPV에 감염될 위험이 있는 사람과 키스하는 것은 피하는 것이 좋습니다.

염증 및 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과나 비뇨기과에서 추가 진료후 꾸준한 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

요로결석 이 걸리고 일주일 후 자위를 해도될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요로결석은 요로에 결석이 생기는 질환입니다. 요로결석은 통증 혈뇨 소변량 감소 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 요로결석은 보통 자연적으로 배출되기도 하지만 크기가 크거나 통증이 심한 경우에는 수술로 제거해야 합니다. 요로결석이 걸리면 자위를 해도 됩니다. 자위는 요로결석에 영향을 미치지 않습니다. 하지만 요로결석이 걸리면 통증이 심할 수 있으므로 자위를 할 때는 주의해야 합니다. 요로결석이 걸리면 충분한 수분을 섭취하고 물을 많이 마셔서 결석을 배출하는 것이 좋습니다. 또한 칼슘과 옥살산이 많이 함유된 음식은 피하는 것이 좋습니다.

이런식으로 목스트레칭하면 혹시 치아나 턱변형 일어날수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위를 자주 한다고 해서 턱이나 치아의 영구적인 변형이 나타나지는 않습니다. 하지만 과신전은 경추에 좋지 않아 권하지 않습니다.

혹시 이렇게 목스트레칭 많이하면 턱치아변형이 일어날 가능성이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위를 자주 한다고 해서 턱이나 치아의 영구적인 변형이 나타나지는 않습니다. 하지만 과신전은 경추에 좋지 않아 권하지 않습니다.

Hpv및 에이즈레 관해 다시 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위로 인해 성병이 감염되는 경우는 없다고 보아도 무방합니다. 따라서 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이거 대상포진 신경통 증상이라 보면 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진 후 신경통의 전형적인 양상은 아니지만 대상포진 후 이상 감각이 나타날 수는 있습니다. 좀 더 경과를 보시기 바랍니다.

사타구니 발진이 있는데요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

미골 함몰 변형 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 충격으로 실제 손상이나 위치 변화가 발생하는 구조적인 이상은 발생하지 않습니다. 따라서 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다.

유방 석회화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미세석회화가 있을 경우에는 악성 종양 감별을 위해 확대 유방 촬영이나 유방 초음파와 같은 추가검사가 필요하게 됩니다.

핸드폰이 귀에 직접 닿은 상태로 강한 진동이 울리면 고막을 다칠 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적으로 이명 등이 발생할 수는 있지만 실제 고막의 손상이 발생할 것으로 생각되지는 않습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

한쪽 신장기능이 떨어져있다는데 음식영양제 혹은 복용약이 원인이 될수있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약이 신기능을 저하시킬 수는 있지만 한쪽 신장만 기능이 떨어졌다고 하는 것으로 보아 좌측 신장의 위축이 있는 것으로 보입니다. 이는 상기 약물로 인한 가능성은

낮습니다.

일자목 판정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의사들이 놓는 주사는 비슷하게 신경과 근육을 자극해서 이완시키는 효과가 있으며 주변에 신경이 있는 경우 신경주사라고 할 수 있습니다. 신경 치료는 주사를 신경에 놓는 것은 아닙니다. 치료 부작용일 가능성이 적으니 진통소염제를 추가로 드시면 좋겠습니다.

손톱 옆이 누르면 아픕니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 영상으로는 아무런 이상소견은 없습니다. 기본적으로 소염제를 드시는 것이 보통이며 피하조직의 염증 소견등이 보이면 병원을 가보셔도 될 것 같습니다.

두통과 아랫배 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장염에 의한 몸살반응의 일부일 가능성이 많습니다. 우선은 신경과보다는 내과를 가보시고 수분섭취는 나쁘지 않습니다.

허리디스크 반대쪽 다리 저림 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상 악화로 단정할 수 없지만 좋은 신호는 아닙니다. 디스크에 의한 증상은 아닐 수 있으며 의사마다 설명이 매우 다를 수 있는 증상으로 좌측 등 척추 주변의 교감신경 압박에 의한 순환장애로 나타나는 증상이 겹친 것 같습니다.

요로결석 이 걸리고 일주일 후 자위를 해도될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요로결석은 요로에 결석이 생기는 질환입니다. 요로결석은 통증 혈뇨 소변량 감소 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 요로결석은 보통 자연적으로 배출되기도 하지만 크기가 크거나 통증이 심한 경우에는 수술로 제거해야 합니다. 요로결석이 걸리면 자위를 해도 됩니다. 자위는 요로결석에 영향을 미치지 않습니다. 하지만 요로결석이 걸리면 통증이 심할 수 있으므로 자위를 할 때는 주의해야 합니다. 요로결석이 걸리면 충분한 수분을 섭취하고 물을 많이 마셔서 결석을 배출하는 것이 좋습니다. 또한 칼슘과 옥살산이 많이 함유된 음식은 피하는 것이 좋습니다.

요로결석 이 걸리고 일주일 후 자위를 해도될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요로결석은 요로에 결석이 생기는 질환입니다. 요로결석은 통증 혈뇨 소변량 감소 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 요로결석은 보통 자연적으로 배출되기도 하지만 크기가 크거나 통증이 심한 경우에는 수술로 제거해야 합니다. 요로결석이 걸리면 자위를 해도 됩니다. 자위는 요로결석에 영향을 미치지 않습니다. 하지만 요로결석이 걸리면 통증이 심할 수 있으므로 자위를 할 때는 주의해야 합니다. 요로결석이 걸리면 충분한 수분을 섭취하고 물을 많이 마셔서 결석을 배출하는 것이 좋습니다. 또한 칼슘과 옥살산이 많이 함유된 음식은 피하는 것이 좋습니다.

비장혹은 주위 병변ca199 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담낭용종은 크기가 작을수록 악성 가능성은 낮습니다. 0.4cm이면 모양이 나쁘지 않다면 추적관찰하면 됩니다. 비장 주위 병변은 크기가 큰데 이상 소견이면 복부CT를 확인하는 것이 좋겠습니다.

안구건조증 빛번짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안구건조증은 눈물막의 양이나 질이 떨어져 눈이 건조해지는 질환입니다. 안구건조증이 있으면 눈이 쉽게 피로해지고 시력이 떨어질 수 있으며 심한 경우 눈에 통증이 생기거나 빛번짐이 나타날 수 있습니다. 빛번짐은 안구건조증의 대표적인 증상 중 하나입니다. 빛번짐은 눈이 건조해져서 눈물막이 얇아지고 눈물막을 통과하는 빛이 산란되어 나타납니다. 빛번짐은 눈을 깜빡일 때마다 증상이 심해지고 실눈을 뜨거나 눈을 밑으로 내리면 증상이 더 심해집니다. 빛번짐은 안구건조증의 대표적인 증상이지만 다른 질환에서도 나타날 수 있습니다. 따라서 빛번짐이 나타난다면 안과에서 진료를 받아 정확한 원인을 확인해야 합니다. 안구건조증은 눈물막의 양이나 질을 개선하는 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 눈물막의 양을 늘리기 위해서는 충분한 수분을 섭취하고 눈물막의 질을 개선하기 위해서는 눈에 영양분을 공급하는 안약을 사용하면 됩니다. 안구건조증은

꾸준한 관리가 필요한 질환입니다. 평소에 눈을 자주 깜빡여서 눈물막을 유지하고 눈에 자극을 주는 행동을 피하는 것이 좋습니다. 또한 안구건조증이 심한 경우에는 안과에서 치료를 받아야 합니다.

얼리임신테스트기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리 임신테스트기는 관계 후 8일 정도면 사용해도 됩니다. 하지만 임신 초기에는 임신 호르몬인 hCG 수치가 낮기 때문에 임신 결과가 정확하지 않을 수 있습니다. 따라서 임신테스트기를 사용한 후에는 2주 정도 후에 다시 한 번 검사하는 것이 좋습니다. 임신테스트기는 임신 호르몬인 hCG가 소변에 섞여 나오면 임신 양성 반응을 나타냅니다. hCG는 임신 67주부터 소변에 나오기 시작합니다. 따라서 임신테스트기는 임신 67주 이후에 사용하면 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 임신 초기에는 hCG 수치가 낮기 때문에 임신테스트기를 사용한 후에는 2주 정도 후에 다시 한 번 검사하는 것이 좋습니다. 임신테스트기를 사용하기 전에 소변을 충분히 보고 임신테스트기를 소변에 1015초 정도 담근 후 결과를 확인합니다. 임신테스트기의 선이 두 개 나오면 임신 양성 반응이고 선이 한 개만 나오면 임신 음성 반응입니다. 임신테스트기의 결과가 양성인 경우 산부인과에서 임신 초기 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 임신 초기 검사에서는 임신 주수와 임신 상태를 확인하고 임신 중 필요한 영양소와 비타민을 처방받을 수 있습니다. 임신테스트기의 결과가 음성인 경우에도 생리 예정일이 지나도 생리가 오지 않으면 임신 가능성을 염두에 두고 산부인과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

농양 재발인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 직접 보지 않고서 말씀 드리기는 조심스런 부분이 있으나 일단 염증이 생긴 것으로 의심됩니다. 농양의 재발이나 치루 발생 가능성 혹은 이전 수술 부위 외에 또다른 곳에 염증이 발생되었을 가능성 등 여러가지 생각해 볼 수 있습니다. 염증이려면 가급적 빨리 치료를 받으시는 것이 좋습니다. 하루라도 빨리 진료를 받아보시는 것이 최선이라고 생각합니다. 감사합니다.

염증 및 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과나 비뇨기과에서 추가 진료후 꾸준한 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

빨간색으로 되어 있는 부분 상태가 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

피임약 복용 중단 했는데 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약은 생리통을 완화하는 효과가 있습니다. 피임약을 복용하면 호르몬의 균형이 맞춰지고 자궁 내막이 얇아지면서 생리통이 완화됩니다. 하지만 피임약을 복용하면 혈전이 생길 위험이 있습니다. 따라서 장기간 피임약을 복용해야 한다면 혈전 검사를 정기적으로 받아야 합니다. 피임약을 복용하다가 중단하면 생리통이 다시 악화될 수 있습니다. 하지만 피임약을 복용하다가 중단해도 생리통이 악화되지 않는 경우도 있습니다. 따라서 피임약을 복용하다가 중단한 후 생리통이 악화되면 병원에 가서 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 피임약을 복용하다가 중단하면 생리주기가 불규칙해질 수 있습니다. 따라서 피임약을 복용하다가 중단한 후에는 생리주기를 관찰하는 것이 좋습니다. 피임약을 복용하다가 중단한 후에는 생리통이 다시 악화되거나 생리주기가 불규칙해지면 병원에 가서 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

엉덩이 뻘루지 농양인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문주위농양일 수도 있고 피부에 있는 땀샘 피지선 모낭 등의 분비선이 감염되어 발생한 염증일 수도 있습니다. 고름이 생기기 시작한 시점이라면 배농을 해야 되고 아직 고름이 생기지 않는 상태라면 항생제가 어느정도

효과적으로 작용할 수도 있습니다. 가까운 항문외과에 가셔서 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

귀 뒤 뼈 부음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀 뒤 뼈가 부었다면 귀 뒤에 있는 림프절이 부은 것일 수 있습니다. 림프절은 면역 체계의 일부로 바이러스나 세균과 같은 외부 물질을 걸러내는 역할을 합니다. 림프절이 부으면 붓거나 통증이 있을 수 있습니다. 림프절이 부은 경우 림프절이 있는 부위를 따뜻하게 찜질하거나 얼음찜질을 하면 도움이 될 수 있습니다. 또한 림프절이 부은 원인이 되는 질환을 치료하면 림프절이 부은 증상이 완화될 수 있습니다. 귀 뒤 뼈가 부었을 때 병원에 가야 하는 경우는 다음과 같습니다. 림프절이 빨갛게 변하거나 통증이 심해지는 경우 림프절이 2주 이상 부은 경우 림프절과 함께 열이 나거나 기침 가래 호흡곤란 등의 증상이 있는 경우 귀 뒤 뼈가 부었을 때 병원에 가면 의사가 림프절을 검사하고 림프절이 부은 원인을 진단합니다. 림프절이 부은 원인이 되는 질환을 치료하면 림프절이 부은 증상이 완화될 수 있습니다.

일자목 판정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의사들이 놓는 주사는 비슷하게 신경과 근육을 자극해서 이완시키는 효과가 있으며 주변에 신경이 있는 경우 신경주사라고 할 수 있습니다. 신경 치료는 주사를 신경에 놓는 것은 아닙니다. 치료 부작용일 가능성이 적으니 진통소염제를 추가로 드시면 좋겠습니다.

뇌출혈 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌출혈은 뇌에 있는 혈관이 파열되어 뇌 조직에 피가 고이는 질환입니다. 뇌출혈은 뇌에 급격한 손상을 주기 때문에 증상이 나타나면 즉시 치료를 받아야 합니다. 뇌출혈의 증상으로는 두통 구토 어지럼증 마비 언어장애 등이 있습니다. 뇌출혈이 발생하면 뇌 조직에 손상을 입기 때문에 치료를 받지 않으면 사망에 이를 수 있습니다. 뇌출혈은 출혈이 아주 조금씩 되는 경우도 있습니다. 하지만 아주 조금씩 출혈이 되는 경우에도 뇌에 손상을 입을 수 있기 때문에 치료를 받아야 합니다. 뇌출혈이 발생한 후 출혈이 멈추고 피가 굳는 경우는 뇌출혈의 종류에 따라 다릅니다. 뇌출혈의 종류에는 지주막하 출혈 뇌실 내 출혈 뇌실 밖 출혈 등이 있습니다. 지주막하 출혈은 뇌의 지주막하 공간에 혈액이 고이는 질환입니다. 지주막하 출혈은 출혈이 멈추고 피가 굳는 경우가 많습니다. 뇌실 내 출혈은 뇌의 뇌실에 혈액이 고이는 질환입니다. 뇌실 내 출혈은 출혈이 멈추고 피가 굳는 경우가 적습니다. 뇌실 밖 출혈은 뇌의 뇌실 밖 공간에 혈액이 고이는 질환입니다. 뇌실 밖 출혈은 출혈이 멈추고 피가 굳는 경우가 적습니다. 뇌출혈이 발생한 후 출혈이 멈추고 피가 굳는 경우 약물치료를 하지 않으면 뇌 조직에 손상이 생길 수 있습니다. 뇌 조직에 손상이 생기면 뇌 기능에 장애가 생길 수 있습니다. 뇌 기능에 장애가 생기면 기억력 언어 운동 능력 등이 떨어질 수 있습니다. 뇌출혈이 의심되는 경우 즉시 병원에 가서 검사를 받아야 합니다. 뇌출혈이 의심되는 경우 뇌 CT나 뇌 MRI 검사를 받습니다. 뇌 CT나 뇌 MRI 검사를 통해 뇌출혈이 있는지 확인할 수 있습니다. 뇌출혈이 있는 경우 즉시 치료를 받아야 합니다. 뇌출혈은 매우 위험한 질환입니다. 뇌출혈이 의심되는 경우 즉시 병원에 가서 검사를 받아야 합니다.

Hpv 및 에이즈에 관해 다시 수정해서 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 에이즈는 체액을 통해 전염되기 때문에 키스를 통해 에이즈에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 하지만 키스를 통해 에이즈에 감염될 가능성이 완전히 없다고는 할 수 없습니다. 따라서 에이즈에 감염될 위험이 있는 사람과 키스하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 2. HPV는 피부와 피부 접촉을 통해 전염될 수 있습니다. 따라서 키스를 통해 HPV에 감염될 가능성은 있습니다. 하지만 키스를 통해 HPV에 감염될 가능성이 완전히 없다고는 할 수 없습니다. 따라서 HPV에 감

염될 위험이 있는 사람과 키스하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 3. HPV는 성기나 입술에 사마귀를 일으키는 바이러스입니다. HPV에 걸리면 사망하지 않습니다. 하지만 HPV에 걸리면 사마귀가 생기거나 자궁경부암에 걸릴 수 있습니다. 따라서 HPV에 걸리지 않도록 예방하는 것이 중요합니다. 4. 딥키스는 침을 많이 주고받기 때문에 HPV에 감염될 가능성이 더 높습니다. 하지만 딥키스를 하지 않더라도 HPV에 감염될 가능성은 있습니다. 따라서 HPV에 감염될 위험이 있는 사람과 키스하는 것은 피하는 것이 좋습니다.

뭐가 문제인지 무슨 병인지 모르겠습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 한마디로 설명하기는 어렵지만 장에 문제가 있어보입니다. 장내 세균불균형으로 인하여 두통 가려움증 발한 복통 등 이런증상이 생기는 것이 아닌가 싶습니다. 불면증도 해결해야 합니다 밀가루 우유 계란 인스턴트 음식을 끊고 채식위주의 식사를 해보श्य

속옷위로 사정후 비벼진경우 임신 가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 그런 경우 임신이 되지는 않습니다. 너무 걱정하지 마시고 일단은 경과를 지켜 보셔도 무방 하실 것으로 판단되어 집니다. 감사합니다.

눈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증이 눈에 발생하면 눈이 붓고 통증이 생기고 시력이 떨어질 수 있습니다. 염증이 심해지면 실명에까지 이를 수 있습니다. 하지만 염증이 아무런 증상 없이 발생해서 실명하는 경우는 거의 없습니다. 염증이 발생하면 눈에 통증이 생기거나 시력이 떨어지는 등의 증상이 나타나므로 증상이 나타나면 바로 병원에 가서 치료를 받아야 합니다.

Tfcc수술후 운동관련 질문입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 척골단축수술은 손목의 척골을 짧게 절제하는 수술입니다. 이 수술은 손목의 통증을 줄이고 손목의 움직임을 개선하기 위해 시행됩니다. 척골단축수술을 받은 후에는 손목을 과도하게 사용하지 않는 것이 좋습니다. 따라서 헬스와 같은 고중량 운동은 삼가야 합니다. 하지만 저중량의 운동은 손목에 무리가 가지 않으므로 운동을 시작해도 됩니다. 하지만 운동을 시작하기 전에 반드시 의사와 상담을 하고 의사의 지시에 따라 운동을 해야 합니다.

편도염이 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로는 편도에 큰 염증은 없어보입니다. 기침은 편도염 이후에 급성 기관지염이 동반되었을 수 있어서 일단은 기침약을 드셔 보세요

골반 장골전면 순간따끔한 증상이 지속됩니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 장골 앞쪽 주변의 순간따끔한 증상은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 장골 부위의 근육이나 인대의 통증입니다. 장골 부위에 있는 근육이나 인대가 과도하게 긴장하거나 염증이 생기면 순간적으로 따끔한 통증이 발생할 수 있습니다. 또한 장골 부위에 있는 신경이 압박을 받으면 순간적으로 따끔한 통증이 발생할 수 있습니다. 장골 부위의 통증이 심하거나 오래 지속된다면 병원을 방문하여 진료를 받아보시기 바랍니다. 의사는 환자의 증상을 자세히 듣고 신체 검사를 실시한 후 필요한 검사를 시행하여 정확한 진단을 내리고 적절한 치료를 처방해 줄 것입니다.

염증 및 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과나 비뇨기과에서 추가 진료후 꾸준한 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

Hpv바이러스에 대해 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 에이즈는 혈액이나 체액을 통해 전염되는 질환입니다. 따라서 비보균자끼리 키스를 한다고 해서 에이즈에 감염될 가능성은 없습니다. HPV는 성관계를 통해 전염되는 질환입니다. 따라서 비보균자끼리 키스를 한다

고 해서 HPV에 감염될 가능성은 없습니다. 딥키스는 침이 많이 섞이므로 감염성이 높은 편입니다. 하지만 비보균자끼리 딥키스를 한다고 해서 에이즈나 HPV에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 입안에 상처가 있다고 해서 에이즈나 HPV에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 하지만 만약 상대방이 에이즈나 HPV에 감염되어 있다면 키스를 통해 감염될 가능성은 있습니다. HPV는 대부분 무증상이며 대부분의 경우 자연적으로 치유됩니다. 하지만 일부 HPV 바이러스는 자궁경부암을 유발할 수 있습니다. 따라서 HPV에 감염되었더라도 꾸준히 검진을 받아야 합니다.

정액검사 통을 화장실에서 열어두기만 해도 장내균에 오염이 되는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정액검사 통을 화장실에서 열어두기만 해도 장내균에 오염이 될 수 있습니다. 장내균은 공기 중에 떠다니기도 하고 화장실 바닥에 묻어 있기도 합니다. 따라서 정액검사 통을 화장실에서 열어두면 장내균이 통 안으로 들어갈 수 있습니다. 또한 정액검사 통을 화장실 바닥에 두면 통이 화장실 바닥의 세균에 오염될 수 있습니다. 따라서 정액검사 통을 화장실에서 열어두거나 화장실 바닥에 두는 것은 좋지 않습니다. 정액검사 통을 화장실에서 열어두거나 화장실 바닥에 두는 경우 정액검사 결과가 정확하지 않을 수 있습니다. 따라서 정액검사 통을 사용한 후에는 뚜껑을 닫고 화장실에서 멀리 떨어진 곳에 두는 것이 좋습니다.

20개월아기 피부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그렇다면 모공각화증일 가능성이 높다고 생각됩니다. 리맥스는 그만 바르시고 피부과 진료 상담 받아보시는 것을 권합니다. 특별한 치료법은 없을 가능성이 높는데 부모님중에 닭살 피부를 가진분 계신가요?

방광염 질출혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질출혈이 요도 주위에 묻어 나오면 소변검사에서 혈뇨로 나올 수 있습니다. 혈뇨는 생리대에 묻어나오지 않습니다 검사로 확인해보श्य. 양이 많으면 생리대에 묻을 수도 있습니다

턱관절 귀먹먹,안녕하세요. 메디이즈입니다. 턱관절 귀먹먹함 증상은 턱관절의 이상으로 인해 발생할 수 있습니다. 턱관절은 아래턱뼈와 두개골을 연결하는 관절로 음식을 씹거나 말을 할 때 사용합니다. 턱관절이 이상하면 턱관절이 움직일 때마다 통증이 발생할 수 있고 귀에 먹먹함 증상이 나타날 수 있습니다. 턱관절 귀먹먹함 증상을 치료하기 위해서는 턱관절을 전문으로 진료하는 치과에 방문하여 진료를 받아야 합니다. 치과에서 턱관절의 이상 여부를 진단하고 턱관절을 정상적으로 움직일 수 있도록 치료를 받으면 귀먹먹함 증상을 완화할 수 있습니다. 턱관절 귀먹먹함 증상을 예방하기 위해서는 턱관절에 무리를 주지 않는 것이 중요합니다. 턱을 괴거나 턱을 꼭 깨무는 등의 행동은 턱관절에 무리를 줄 수 있으므로 피해야 합니다. 또한 턱관절이 굳어지지 않도록 규칙적으로 턱관절 운동을 하는 것이 좋습니다.

ACTH 3개월 전보다 50증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항암제치료를 시작하고 나서 ACTH수치가 높아지는 추세로 보여지네요 항암제가 어떤건지 모르겠지만.. 부신기능저하증이 생긴게 아닌가 싶습니다. ACTH와 cortisol수치도 같이 검사해보고 내분비적으로 이상여부를 확인해보시는게 좋겠습니다.

눈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시라도 균의 감염된 손으로 비비면서 눈에 손상을 입히면 각막이나 결막에 염증이 생기면서 고생하실수 있습니다. 실명까지는 아니더라도요

눈에 대해 질문했었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최악의 시나리오에서는 감염이 조절이 안되면 그런 증상이 생길 수 있습니다. 일상적인 상황에서는 고려되는 부분은 아닙니다

눈에 대해 질문했었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최악의 시나리오에서는 감염이 조절이 안되면 그런 증상이 생길 수 있습니다. 일상적인 상황에서는 고려되는 부분은 아닙니다

enterococcus faecalis와 전립선염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 이해하기로는 정상적으

로 전립선염이 없는 사람에서는 이런균이 발견이 안된다는 것이고 이런균이 발견된다는 것은 전립선염의 가능성도 고려해볼 수 있을 것으로 생각합니다. 이전에 요로감염으로 치료받아본 적이 있나요? 정액채취과정에서 오염으로 인해서 검사에서 나올수도 있을 것 같기도 합니다
신생아 다리 경련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신생아의 다리 경련은 흔한 증상입니다. 신생아의 신경계는 아직 미숙하기 때문에 가벼운 자극에도 경련을 일으킬 수 있습니다. 신생아의 다리 경련은 대개 몇 초 이내에 사라지고 특별한 치료가 필요하지 않습니다. 하지만 다리 경련이 심하거나 자주 발생한다면 병원에 방문하여 진료를 받아보시기 바랍니다.

핸드폰이 귀에 직접 닿은 상태로 강한 진동이 울리면 고막을 다칠 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적으로 이명 등이 발생할 수는 있지만 실제 고막의 손상이 발생할 것으로 생각되지는 않습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

췌장에 침착된 단순 지방조직도 관찰이 필요할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 췌장머리에 지방이 침착되어 있고 간에 물혹이 있는 경우 당장 치료가 필요하지는 않지만 추적 관찰이 필요합니다. 췌장머리에 지방이 침착되어 있는 경우 췌장암으로 진행할 수 있기 때문에 23년마다 CT 검사를 통해 크기가 커지는지 확인해야 합니다. 또한 간에 물혹이 있는 경우 크기가 커지거나 다른 증상이 나타나면 치료가 필요할 수 있기 때문에 12년마다 CT 검사를 통해 크기를 관찰해야 합니다. 가족력이 있는 경우 췌장암이나 간암에 대한 위험이 높기 때문에 정기적으로 검사를 받는 것이 좋습니다.

약부작용 두통 설사 졸림 추위,안녕하세요. 메디이즈입니다. 처방받은 항생제와 가래약으로 위장장애 일으킬수 가 있고 항히스타민제로 졸음을 유발할수 있습니다. 약에 의한 부작용으로 생각되신다면 약을 중단하시거나 제산제와 같은 위벽보호제를 처방 받으시기 바랍니다.

한쪽 신장기능이 떨어져있다는데 음식영양제 혹은 복용약이 원인이 될수있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약이 신기능을 저하시킬 수는 있지만 한쪽 신장만 기능이 떨어졌다고 하는 것으로 보아 좌측 신장의 위축이 있는 것으로 보입니다. 이는 상기 약물로 인한 가능성은 낮습니다.

덩어리혈이 심해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 불순은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 약 복용도 생리 불순의 원인이 될 수 있습니다. 특히 호르몬 분비계 이상을 조절하는 약을 복용하면 생리 불순이 발생할 수 있습니다. 따라서 생리 불순이 발생했다면 복용 중인 약을 확인해보고 약이 생리 불순의 원인이 될 수 있는지 의사와 상담해 보시기 바랍니다.

콜라겐 복용문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 콜라겐은 단백질로 만들어져 있지만 지방수치나 LDL을 올리지 않습니다. 오히려 콜라겐은 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추고 항산화 작용을 하여 심혈관 질환을 예방하는 데 도움이 됩니다. 2. 비트 파우더와 양파 껍질 차는 모두 칼륨이 풍부한 식품입니다. 하지만 칼륨은 체내에서 필요량 이상 섭취해도 대부분 소변으로 배출되기 때문에 칼륨 과다로 인한 부작용은 거의 없습니다. 다만 신장이나 심장 질환이 있는 경우에는 칼륨 섭취량을 제한해야 합니다.

Tfccc수술후 손목 힘빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 3년 전에 오른손 수술을 받았고 현재 악력이 48 정도 나오지만 가끔 오른손 힘이 풀어지는 느낌을 받고 있다면 손목 힘이 완전히 회복되지 않은 것으로 보입니다. 손목 힘을 회복하기 위해서는 악력기를 꾸준히 하는 것이 좋지만 손목에 무리가 가지 않도록 적당한 강도로 운동해야 합니다. 또한 손목을 과도하게 사용하지 않도록 주의하고 손목을 따뜻하게 유지하는 것도 도움이 됩니다. 만약 손목 힘이 계속 떨어지거나 통증이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보시기 바랍니다.

경구 당부하 검사후 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 뇌하수체 선종은 뇌하수체의 종양

으로 성장호르몬 갑상선자극호르몬 프로락틴 등의 호르몬을 과도하게 분비할 수 있습니다. 경구 당부하 검사는 뇌하수체 선종으로 인해 성장호르몬이 과도하게 분비되는지를 확인하기 위한 검사입니다. 경구 당부하 검사에서 수치가 14 중 1.8이 나왔다면 성장호르몬이 정상보다 높게 분비되고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 뇌하수체 선종의 크기가 6.5mm이고 현재 심장이나 관절 외모 등에는 문제가 없다면 당장 주사나 수술이 필요한 것은 아닙니다. 하지만 성장호르몬이 과도하게 분비되면 관절과 뼈의 이상 심장 질환 당뇨 고혈압 등의 합병증이 발생할 수 있으므로 주기적으로 경구 당부하 검사를 시행하여 성장호르몬 수치를 확인하고 합병증이 발생하지 않도록 관리해야 합니다. 2. IGF1은 성장호르몬의 효과로 인해 간에서 생성되는 단백질입니다. IGF1 피검시에는 식사 후 2시간이 지난 상태에서 피를 채취합니다. 성장호르몬은 당을 먹으면 수치가 떨어지므로 식사 후 2시간이 지난 상태에서 피를 채취하면 성장호르몬의 수치를 정확하게 측정할 수 있습니다.

공황은 자의로 이겨낼 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공황장애는 자의로 이겨낼 수 있는 질환이 아닙니다. 공황장애는 불안을 조절하는 신경전달물질의 불균형으로 인해 발생하는 질환으로 약물치료와 인지행동치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 약물치료는 불안을 조절하는 신경전달물질의 균형을 회복시켜 공황장애 증상을 완화시키는 데 도움이 됩니다. 인지행동치료는 공황장애에 대한 잘못된 생각과 행동을 교정하고 불안을 조절하는 방법을 배우는 데 도움이 됩니다. 공황장애는 완치가 가능한 질환이지만 치료를 중단하면 증상이 다시 나타날 수 있으므로 꾸준한 치료가 필요합니다. 따라서 공황장애가 의심된다면 신경정신과 전문의의 진료를 받아보시기 바랍니다.

모소낭?모소동? 재발,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모소동은 겨드랑이 서혜부 엉덩이 등에서 발생하는 피부 질환으로 털이 나는 부위의 모낭이 염증을 일으켜 생기는 낭종입니다. 모소동은 대부분 수술로 치료하며 재발률은 10 미만입니다. 따라서 2년 전에 모소동 수술을 받았는데 비슷한 위치에 종기 같은 것이 만져진다면 모소동의 재발일 가능성이 있습니다. 만약 통증이 없다면 일단 지켜보면서 증상이 악화되는지 관찰해 보시기 바랍니다. 만약 통증이 있거나 종기가 커지거나 주변으로 퍼지는 등의 증상이 있다면 병원에 방문하여 진료를 받아보시기 바랍니다.

아토목세틴이랑 타이레놀 같이 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아세틴은 노르에피네프린 재흡수 억제제norepinephrine reuptake inhibitor NRI입니다. 타이레놀은 진통제입니다. 두 약은 서로 다른 작용을 하므로 같이 먹어도 문제가 없습니다. 다만 두 약 모두 간에서 대사되므로 간 기능이 저하된 경우에는 주의해야 합니다. 또한 아세틴은 졸음이 올 수 있으므로 운전이나 기계 조작을 할 때는 주의해야 합니다.

약부작용 두통 설사 졸림 추위,안녕하세요. 메디이즈입니다. 처방받은 항생제와 가래약으로 위장장애 일으킬수 가 있고 항히스타민제로 졸음을 유발할수 있습니다. 약에 의한 부작용으로 생각된다면 약을 중단하시거나 제산제와 같은 위벽보호제를 처방 받으시기 바랍니다.

ACTH 3개월 전보다 50증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항암제치료를 시작하고 나서 ACTH수치가 높아지는 추세로 보여지네요 항암제가 어떤건지 모르겠지만.. 부신기능저하증이 생긴게 아닌가 싶습니다. ACTH와 cortisol수치도 같이 검사해보고 내분비적으로 이상여부를 확인해보시는게 좋겠습니다.

사시 수술 후 수술 부위 반대편에 안내 빛? 그림자?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 망막이 자극을 받아서 그럴 수 있습니다. 걱정이 많이 되신다면 그 전이라도 근처 안과에서 산동하여 안저검사를 받아보시면 좋을 거 같습니다. 감사합니다.

눈에 대해 질문했었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최악의 시나리오에서는 감염이 조절이 안되면 그런 증상이 생길 수 있습니다. 일상적인 상황에서는 고려되는 부분은 아닙니다
제가 말한거 같이 화장실에 열어두기만해도 그렇게되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 균이 어디서 어떻게 왔는지는 정확하게는 알수는 없지만 열어 두기만해도 생길 가능성은 비교적 낮다고 생각합니다.

enterococcus faecalis와 전립선염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 이해하기로는 정상적으로 전립선염이 없는 사람에서는 이런균이 발견이 안된다는 것이고 이런균이 발견된다는 것은 전립선염의 가능성도 고려해볼 수 있을 것으로 생각합니다. 이전에 요로감염으로 치료받아본 적이 있나요? 정액채취과정에서 오염으로 인해서 검사에서 나올수도 있을 것 같기도 합니다
핸드폰이 귀에 직접 닿은 상태로 강한 진동이 울리면 고막을 다칠 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적으로 이명 등이 발생할 수는 있지만 실제 고막의 손상이 발생할 것으로 생각되지는 않습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

뭐가 문제인지 무슨 병인지 모르겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한마디로 설명하기는 어렵지만 장에 문제가 있어보입니다. 장내 세균불균형으로 인하여 두통 가렘증 발한 복통 증기 이런증상이 생기는 것이 아닌가 싶습니다. 불면증도 해결해야 합니다 밀가루 우유 계란 인스턴트 음식을 끊고 채식위주의 식사를 해보श्य

엉덩이 뻘루지 농양인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문주위농양일 수도 있고 피부에 있는 땀샘 피지선 모낭 등의 분비선이 감염되어 발생한 염증일 수도 있습니다. 고름이 생기기 시작한 시점이라면 배농을 해야 되고 아직 고름이 생기지 않는 상태라면 항생제가 어느정도 효과적으로 작용할 수도 있습니다. 가까운 항문외과에 가셔서 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

농양 재발인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 직접 보지 않고서 말씀 드리기는 조심스런 부분이 있으나 일단 염증이 생긴 것으로 의심됩니다. 농양의 재발이나 치루 발생 가능성 혹은 이전 수술 부위 외에 또다른 곳에 염증이 발생되었을 가능성 등 여러가지 생각해 볼 수 있습니다. 염증이라면 가급적 빨리 치료를 받으시는 것이 좋습니다. 하루라도 빨리 진료를 받아 보시는 것이 최선이라고 생각합니다. 감사합니다.

속옷위로 사정후 비비진경우 임신 가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 그런 경우 임신이 되지는 않습니다. 너무 걱정하지 마시고 일단은 경과를 지켜 보셔도 무방 하실 것으로 판단되어 집니다. 감사합니다.

눈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시라도 균의 감염된 손으로 비비면서 눈에 손상을 입히면 각막이나 결막에 염증이 생기면서 고생하실수 있습니다. 실명까지는 아니더라도요

편도염이 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로는 편도에 큰 염증은 없어보입니다. 기침은 편도염 이후에 급성 기관지염이 동반되었을 수 있어서 일단은 기침약을 드셔 보세요

Hpv에 관한 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황상 HIV 또는 HPV 감염이 발생할 가능성은 높지 않습니다. 예를 들어 실제 콘돔 없이 성관계를 하였을 경우에도 감염 확률은 0.1 정도 이기 때문입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

정액검사 통을 화장실에서 열어두기만 해도 장내균에 오염이 되는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정액검사 통을 화장실에서 열어두기만 해도 장내균에 오염이 될 수 있습니다. 장내균은 공기 중에 떠다니기도 하고 화장실 바닥에 묻어 있기도 합니다. 따라서 정액검사 통을 화장실에서 열어두면 장내균이 통 안으로 들어갈 수 있습니다. 또한 정액검사 통을 화장실 바닥

에 두면 통이 화장실 바닥의 세균에 오염될 수 있습니다. 따라서 정액검사 통을 화장실에서 열어두거나 화장실 바닥에 두는 것은 좋지 않습니다. 정액검사 통을 화장실에서 열어두거나 화장실 바닥에 두는 경우 정액검사 결과가 정확하지 않을 수 있습니다. 따라서 정액검사 통을 사용한 후에는 뚜껑을 닫고 화장실에서 멀리 떨어진 곳에 두는 것이 좋습니다.

방광염 질출혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질출혈이 요도 주위에 묻어 나오면 소변검사에서 혈뇨로 나올 수 있습니다. 혈뇨는 생리대에 묻어나오지 않습니다 검사로 확인해보셔요. 양이 많으면 생리대에 묻을 수도 있습니다

20개월아기 피부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그렇다면 모공각화증일 가능성이 높다고 생각됩니다. 리맥스는 그만 바르시고 피부과 진료 상담 받아보시는 것을 권합니다. 특별한 치료법은 없을 가능성이 높는데 부모님중에 닭살 피부를 가진분 계신가요?

편도염이 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로는 편도에 큰 염증은 없어보입니다. 기침은 편도염 이후에 급성 기관지염이 동반되었을 수 있어서 일단은 기침약을 드셔 보세요

코로나 축농증 문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 항생제를 드셨는데도 효과가 없는 경우 ct 나 부비동 내시경으로 구조적인 이상이 있는지 확인이 필요할 수도 있습니다. 감사합니다.

췌장암 질문합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. CT상 췌장암이 의심된다고 이야기를 들었다면 MRI에서도 췌장암 가능성이 높게 나올 것으로 생각됩니다. 하지만 검사 결과를 보아야 정확한 판단이 가능합니다.

ADHD 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 우선 직접 진료하신 전문의 소견이 가장 신뢰성 있다는 것을 알려드립니다. 아래 내용은 참고만 하시는 것이 좋습니다. 말씀하신 것처럼 어린시절 12세 이전에 해당 증상이 없었다면 ADHD 가능성은 떨어집니다. 주의집중력 문제는 다른 증상우울 불안 불면 등에도 많은 영향을 받기 때문에 그러한 증상을 먼저 확인하고 교정하는 것이 중요합니다. 특히 현재 자녀가 스트레스를 많이 받을 수 있는 고3이고 우울 불안 증상이 동반되고 있다면 이 부분을 먼저 치료하는 것이 중요할 것으로 보입니다. ADHD 진단시 주의점에 대해서 포스팅한 블로그 글 공유드리겠습니다. <https://blog.naver.com/kongjung223223063695>

숨 불편함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검사를 해서 이상이 없다고 하면 심리적인 원인으로 인하여 숨이 끝까지 안쉬어지는 느낌이 나타날 수 있습니다. 큰병은 아닐 가능성이 높습니다. 살이있고 자세가 안좋은 것도 원인일 수 있습니다. 규칙적인 운동을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다

속옷위로 사정후 비벼진경우 임신 가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 그런 경우 임신이 되지는 않습니다. 너무 걱정하지 마시고 일단은 경과를 지켜 보셔도 무방 하실 것으로 판단되어 집니다. 감사합니다.

귀두에 좁쌀여드름 같은게 생겼습니다. 혹시 성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

음경에 각질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가려움증과 각질이 지속되시는군요. 피부과에서 정확한 진단과 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

enterococcus faecalis 균에 의한 정낭 감염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 빈뇨와 잔뇨감 때

매 고생하다가 균검사 결과 나왔군요. 크게 걱정하지 마시고 비뇨기와 꾸준한 치료 받으시면 치료 될 것입니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?vVHWSjiLQNIIE>

std12종 소변검사 결과 양성이면 거의 확정일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변검사로 헤르페스 확정 진단은 불가합니다. 검사 받으신 병원 주치의와 우선 상담을 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?vAQJxjzRW88>

피검사 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 천식 뿐만 아니라 폐렴이 합병된 것으로 보입니다. 천식 악화만으로는 CRP가 5 이상 상승하는 경우는 흔하지 않습니다.

질 유산균에 대해 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질 유산균이 도움이 된다는 몇몇 연구가 있지만 의학적으로 충분한 근거가 있는 것은 아닙니다. 이 점 참고하시기 바랍니다.

20개월아기 팔피부에 뭐가났어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 아토피 같은 증상이 있다고 하면 모공각화증닭살의 가능성이 있어보입니다. 혹시 가려워서 긁거나 그런가요?

안녕하세요. 메디이즈입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 악관절 염좌 가능성이 높는데 시간이 지나면 호전될 가능성이 높습니다. 담당의의 지시대로 하면 될 것으로 생각됩니다.

번아웃과 같은 무기력증이 한 달 짜 지속되고 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정신과 상담만 받았다면 항우울증 약물과 같은 치료가 도움이 될 수 있습니다. 일상 생활에 지장이 있을 정도라면 약물 치료를 고려하기 바랍니다.

생리 중 관계 임신가능성,안녕하세요 요약 1. 그 시절이 생리가 확실했고 2. 생리가 진행중이었으면 3. 임신 가능성은 없습니다. 4. 다만 생리가 아닌 부정출혈이었다면 임신가능성이 있습니다. 5. 본인의 생리주기가 정확하고 확실한지가 중요합니다. 6. 임신테스트기로 확인해보세요. 그게 제일 정확합니다. 건승하세요

코뼈를 다쳤는데 미세골절은 CT상으로는 알수 없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아주 초기의 골절은 골절선이 명확하게 보이지 않는 경우도 있지만 CT에서 이상이 없다면 골절 가능성은 매우 낮다고 보아야 합니다.

손가락이 검게 변합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액 순환 장애나 멜라닌 색소 침착 가능성이 있어 피부과 진료를 먼저 보시고 피부 질환이 아니라면 검사가 가능한 종합 병원 진료를 권합니다.

ADHD 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 우선 직접 진료하신 전문의 소견이 가장 신뢰성 있다는 것을 알려드립니다. 아래 내용은 참고만 하시는 것이 좋습니다. 말씀하신 것처럼 어린시절 12세 이전에 해당 증상이 없었다면 ADHD 가능성은 떨어집니다. 주의집중력 문제는 다른 증상우울 불안 불면 등에도 많은 영향을 받기 때문에 그러한 증상을 먼저 확인하고 교정하는 것이 중요합니다. 특히 현재 자녀가 스트레스를 많이 받을 수 있는 고3이고 우울 불안 증상이 동반되고 있다면 이 부분을 먼저 치료하는 것이 중요할 것으로 보입니다. ADHD 진단시 주의점에 대해서 포스팅한 블로그 글 공유드리겠습니다.

<https://blog.naver.com/kongjung223223063695>

음경에 각질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가려움증과 각질이 지속되시는군요. 피부과에서 정확한 진단과 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

얼리 임신테스트기,안녕하세요 테스트 방법에 따른 임신 확인 가능 시기입니다. 임신 여부 확인 가능 시기 병원 혈액검사 성관계 810일 후 얼리 임신테스트기 성관계 10일 후 일반 임신테스트기 성관계 14일 후 입니다. 건승하세요

저녁밥 대신에 삶은계란3개 매일 먹으면 건강 지장 있는거 아니죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 계란에 알레르기가 없으시다고 하면 큰 문제는 없을 것 같은데 그렇게 드시는 특별한 이유가 있으신지가 궁금합니다.

숨 불편함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검사를 해서 이상이 없다고 하면 심리적인 원인으로 인하여 숨이 끝까지 안쉬어지는 느낌이 나타날 수 있습니다. 큰병은 아닐 가능성이 높습니다. 살이있고 자세가 안좋은 것도 원인일 수 있습니다. 규칙적인 운동을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다

경골비골 수술 후 사진 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심하게 다치신것 같습니다. 아직 엑스레이에서 가골이 형성되는 소견이 보이지 않는 것 같습니다. 빨리 회복하세요.

배뇨장애 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 요속도 검사도 받아보셨을까요? 그 검사도 정상이었다고 한다면 심리적인 이유에서 나타나는 방광과민 증상이 아닌가 싶습니다 사진의 부위가 아픕니다.,안녕하세요 요약 1. 사타구니 통증의 원인을 찾아 치료 해야 합니다 2. 아래 질환들을 감별해 봐야 합니다. 고관절충돌증후군 고관절 주위염 무혈성 괴사 사타구니 통증의 원인으로 고관절을 잇는 골반 뼈인 비구와 대퇴골의 경부가 부딪히면서 충돌이 발생해 연골이 찢어지거나 손상으로 인해 염증이 생기면서 통증이 유발될 수 있는데 사타구니가 아프면서 고관절을 움직일 때 소리가 난다면 고관절 충돌증후군이 있는지 확인해 봐야 합니다. 퇴행성고관절염 류마티스 고관절염 감염성 고관절염 고관절활액낭염 등이 있는지도 감별해야 합니다. 건승하세요

약 복용 후 생리불순,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약복용 이전에는 생리가 아주 규칙적이었나요? 만약에 드시는 약이 생리 불순의 원인이라고 한다면 소도 정이 가장 영향이 있을 것 같습니다.

심박수 낮추는 효과적인 방법 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 불편한 증상이 있나요? 최대한 마음을 편히 가지고 즐거운 상상을 하면서 복식 호흡을 해보시는 것을 권합니다.

귀두에 좁쌀여드름 같은게 생겼습니다. 혹시 성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

매독 치료 중 성관계 평풍감염 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상대방이 매독으로 확진되었나요? 만약에 확진자라면 다시 재감염의 가능성도 있다고 봅니다. 다시 맞게되면 한번 만 맞아도 될것 같습니다 다시 주사 맞는 것은 혈액검사 결과를 보고 결정하여야 할것 같습니다

습진약 복용 관련해서 궁금증이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 병변이 어느정도 좋아지는지 경과를 보고 약을 더 먹을지 로션만 바를지 결정 해야 할것 같습니다 2. 정상피부에 가까워 질때까지는 바르는 게 좋겠죠? 3. 기본두번 심하면 세번 바르세요.

손톱 옆이 누르면 아픕니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 영상으로는 아무런 이상소견은 없습니다. 기본적으로 소염제를 드시는 것이 보통이며 피하조직의 염증 소견등이 보이면 병원을 가보셔도 될 것 같습니다.

손톱 옆이 누르면 아픕니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 영상으로는 아무런 이상소견은 없습니다

니다. 기본적으로 소염제를 드시는 것이 보통이며 피하조직의 염증 소견등이 보이면 병원을 가보셔도 될 것 같습니다.

팔안쪽 닭살두드러기?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 올라온지 얼마 안되고 가렵다고 하면 모공 각화증은 아닌것 같고 만성두드러기로 인한 증상이 아닌가 판단됩니다.

혀 위에 점??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 생긴지는 얼마나 되었나요? 혀에 점은 비교적 드물게 나타납니다. 원래 있던것이 아니고 새로 생긴것이라고 하면 이비인후과 진료 받아보셔요
피검사 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 천식 뿐만 아니라 폐렴이 합병된 것으로 보입니다. 천식 악화만으로는 CRP가 5 이상 상승하는 경우는 흔하지 않습니다.

생리 중 관계 임신가능성,안녕하세요 요약 1. 그 시절이 생리가 확실했고 2. 생리가 진행중 이였으면 3. 임신 가능성은 없습니다. 4. 다만 생리가 아닌 부정출혈이였다면 임신가능성이 있습니다. 5. 본인의 생리주기가 정확하고 확실한지가 중요합니다. 6. 임신테스트기로 확인해 보세요. 그게 제일 정확합니다. 건승하세요

안녕하세요. 메디이즈입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 악관절 염좌 가능성이 높은데 시간이 지나면 호전될 가능성이 높습니다. 담당의의 지시대로 하면 될 것으로 생각됩니다.

번아웃과 같은 무기력증이 한 달 쯤 지속되고 있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 정신과 상담만 받았다면 항우울증 약물과 같은 치료가 도움이 될 수 있습니다. 일상 생활에 지장이 있을 정도라면 약물 치료를 고려하기 바랍니다.

코뼈를 다쳤는데 미세골절은 CT상으로는 알수 없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아주 초기의 골절은 골절선이 명확하게 보이지 않는 경우도 있지만 CT에서 이상이 없다면 골절 가능성은 매우 낮다고 보아야 합니다.

손가락이 검게 변합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액 순환 장애나 멜라닌 색소 침착 가능성이 있어 피부과 진료를 먼저 보시고 피부 질환이 아니라면 검사가 가능한 종합 병원 진료를 권합니다.

사신의 부위가 아픕니다..안녕하세요 요약 1. 사타구니 통증의 원인을 찾아 치료 해야 합니다. 2. 아래 질환들을 감별해 봐야 합니다. 고관절충돌증후군 고관절 주위염 무혈성 괴사 사타구니 통증의 원인으로 고관절을 잇는 골반 뼈인 비구와 대퇴골의 경부가 부딪히면서 충돌이 발생해 연골이 찢어지거나 손상으로 인해 염증이 생기면서 통증이 유발될 수 있는데 사타구니가 아프면서 고관절을 움직일 때 소리가 난다면 고관절 충돌증후군이 있는지 확인해 봐야 합니다. 퇴행성고관절염 류마티스 고관절염 감염성 고관절염 고관절활액낭염 등이 있는지도 감별해야 합니다. 건승하세요

음경에 각질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가려움증과 각질이 지속되시는군요. 피부과에서 정확한 진단과 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

얼리 임신테스트기,안녕하세요 테스트 방법에 따른 임신 확인 가능 시기입니다. 임신 여부 확인 가능 시기 병원 혈액검사 성관계 810일 후 얼리 임신테스트기 성관계 10일 후 일반 임신테스트기 성관계 14일 후 입니다. 건승하세요

피나스테리드 복용 중인데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈모약 복용 중인데 탈모가 진행되는 것 같아 고민스러우시군요. 우선은 정말로 약물치료에 효과가 없거나 부족한지를 확인해야 하겠습니다. 약을 처방받으시는 병원을 방문해 확인해보시기 바라며 만약 피테리드에 효과가 부족한 상황이라면 두타스테리드계열의 약으로 변경해보는 것도 가능합니다.

한번만 더 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 출혈되어 나온 혈액이 지혈제를 만나면 검게 덩이지면서 출혈부위를 압박할 수 있는 역할을 할 수 있는데 이 덩이가 시간이 지나며 배출될 수는 있습니다만 선홍빛의 액체가 보이는 상황이라면 주의해야 한다고 볼 수는 있겠습니다. 분비된 정도가 적고 일시적이었다면 우선은 기다려보시고 지속적으로 묻어나온다면 재방문을 해보시는게 좋겠습니다.

건강검진 통보서가 왔습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 건강검진 결과를 받아보시고 당혹스러우셨겠습니다. 우선 간수치에 대해서는 다니시는 내과를 방문하여 추가적인 진료를 받아보시는게 좋겠습니다. 간수치가 정말로 상승한 상황이 맞을지에 대해서도 고민이 필요합니다. 정황상 수치가 유지되거나 감소되었을 것이라 추정되면 재검도 필요할 수 있습니다. 빈혈수치의 경우 그리 낮지 않으니 너무 신경쓰지 않으셔도 될 수준입니다.

우루사300이랑 로와콜 같이 먹어도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

췌장암 질문합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. CT상 췌장암이 의심된다고 이야기를 들었다면 MRI에서도 췌장암 가능성이 높게 나올 것으로 생각됩니다. 하지만 검사 결과를 보아야 정확한 판단이 가능합니다.

두통과 아랫배 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장염에 의한 몸살반응의 일부일 가능성이 있습니다. 우선은 신경과보다는 내과를 가보시고 수분섭취는 나쁘지 않습니다.

유방 석회화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유방의 미세석회화가 관찰되는데 대부분 양성인 경우가 많지만 드물게 악성 종양이 발견되는 경우가 있어 초음파 등 추가 검사가 필요합니다.

질 유산균에 대해 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질 유산균이 도움이 된다는 몇몇 연구가 있지만 의학적으로 충분한 근거가 있는 것은 아닙니다. 이 점 참고하시기 바랍니다.

피검사 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 천식 뿐만 아니라 폐렴이 합병된 것으로 보입니다. 천식 악화만으로는 CRP가 5 이상 상승하는 경우는 흔하지 않습니다.

피검사 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 천식 뿐만 아니라 폐렴이 합병된 것으로 보입니다. 천식 악화만으로는 CRP가 5 이상 상승하는 경우는 흔하지 않습니다.

번아웃과 같은 무기력증이 한 달 쯤 지속되고 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정신과 상담만 받았다면 항우울증 약물과 같은 치료가 도움이 될 수 있습니다. 일상 생활에 지장이 있을 정도라면 약물 치료를 고려하기 바랍니다.

안녕하세요. 메디이즈입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 악관절 염좌 가능성이 높는데 시간이 지나면 호전될 가능성이 높습니다. 담당의의 지시대로 하면 될 것으로 생각합니다.

코뼈를 다쳤는데 미세골절은 CT상으로는 알수 없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아주 초기의 골절은 골절선이 명확하게 보이지 않는 경우도 있지만 CT에서 이상이 없다면 골절 가능성은 매우 낮다고 보아야 합니다.

손가락이 검게 변합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액 순환 장애나 멜라닌 색소 침착 가능성이 있어 피부과 진료를 먼저 보시고 피부 질환이 아니라면 검사가 가능한 종합 병원 진료를 권합니다.

셀레비카정 520 복용후 음주 가능 여부 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 와인 1잔은 당연히 가능합니다 걱정마십시오 선생님의 병력을 보니 간과 위가 힘들어 하고 있네요 다이어트가

필요해보입니다 몸에 독소가 많아서 배출해야 합니다 다이어트에 성공하신다면 혈압도 많이 낮아지고 간도 좋아질 것으로 보입니다 더욱 건강하세요

허벅지 엉덩이 허리 에 이런 뾰루지가 올라와요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 모낭염으로 추정되는 병변이며 둔부 근처에 이러한 병변이 다수 발견되고 불편하시다면 항생제 치료를 시도해보실 수 있습니다. 가까운 피부과를 방문하여 진료받아보시기를 권해드립니다.

비타민디 결핍 주사와 영양제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비타민디 수치에 따른 권장량은 없고 목표를 어느정도로 할거냐에 따라 용량이 정해집니다. 삼천 iu 정도 드시면 될것 같습니다. 그냥 이어서 드시면 됩니다 주사로 할지 아니면 먹는 비타민디로 할지 결정하세요.

std12종 소변검사 결과 양성이면 거의 확정일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변검사로 헤르페스 확정 진단은 불가합니다. 검사 받으신 병원 주치의와 우선 상담을 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=AJxjzRW88>

20대에도 심전도 검사 받아야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장의 문제로 인한 협심증이라고 하면.. 가만히 누워있을때보다 운동할때 발생합니다. 역류성식도염에 의한 가슴답답함일 가능성이 있습니다. 비만이 심해도 폐의 확장이 제한되어 숨찬증상이 나타날 수도 있습니다. 그래도 숨차고 가슴답답한 증상에 대해서 호흡기 순환기 등등.. 종합적인 검사를 받아보시길 권해드립니다.

귀 밑 표피낭종인것 같은데 조언 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만성 염증으로 인한 착색 가능성이 있고 피지 낭종이라면 수술적으로 제거가 필요합니다. 이비인후과나 피부과 내원하여 진료보기 바랍니다.

변색,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 색깔은 큰 문제는 없는것으로 생각됩니다. 일반적으로 자장면 처럼 검은 색의 변 또는 혈변이 나오지 않으면 큰 문제는 없습니다

착상혈인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인신테스트기 음성이라면 착상혈 가능성보다는 부정 출혈 가능성이 더 높습니다. 산부인과 진료가 필요한 상황으로 판단됩니다.

부정맥 시술경험자가 고혈압도 있을경우 어떤 종류의 약을 처방받나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요즘도 맥박이 빠르면 부정맥에대한 검사는 한번 해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 체중감량해도 효과가 없다면 방법에 문제가 있거나 노력을 많이 안하셔서 그럴 가능성이 높습니다. 일반적인 혈압약 을 사용합니다

부정맥 시술경험자가 고혈압도 있을경우 어떤 종류의 약을 처방받나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요즘도 맥박이 빠르면 부정맥에대한 검사는 한번 해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 체중감량해도 효과가 없다면 방법에 문제가 있거나 노력을 많이 안하셔서 그럴 가능성이 높습니다. 일반적인 혈압약 을 사용합니다

비타민디 결핍 주사와 영양제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비타민디 수치에 따른 권장량은 없고 목표를 어느정도로 할거냐에 따라 용량이 정해집니다. 삼천 iu 정도 드시면 될것 같습니다. 그냥 이어서 드시면 됩니다 주사로 할지 아니면 먹는 비타민디로 할지 결정하세요.

부정맥 시술경험자가 고혈압도 있을경우 어떤 종류의 약을 처방받나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요즘도 맥박이 빠르면 부정맥에대한 검사는 한번 해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 체중감량해도 효과가 없다면 방법에 문제가 있거나 노력을 많이 안하셔서 그럴 가능성이 높습니다. 일반적인 혈압약 을 사용합니다

20대에도 심전도 검사 받아야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장의 문제로 인한 협심증이라고 하면.. 가만히 누워있을때보다 운동할때 발생합니다. 역류성식도염에 의한 가슴답답

함일 가능성이 있습니다. 비만이 심해도 폐의 확장이 제한되어 숨찬증상이 나타날 수도 있습니다. 그래도 숨차고 가슴답답한 증상에 대해서 호흡기 순환기 등등.. 종합적인 검사를 받아 보시길 권해드립니다.

배우자가 청각장애인일 경우 아이에게 유전 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 대학병원 가야 됩니다. 2. 네 달라질 겁니다 검사기술 발달함 3. 드뭅니다. 4. 말씀하신거 전부 다 가능한 합니다.

교정 중 큰어금니가 잇몸에 파고들 현상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 교정전의 사진과 정보가 전혀 없어서 정확히 말씀드리기는 어려우나 교정전에 바깥으로 빠드러져 있거나 살짝 튀어나온 치아를 교정력으로 제위치할 경우 안으로 함입되면서 잇몸살은 그대로 유지될 때 이렇게 잇몸에 덮이는 듯한 느낌을 받으실 수 있을 것 같습니다. 병적인 변화는 아닌것으로 보이며 불편감이 심하시다면 주치의 선생님과 상의하셔서 치은절제술등을 통해 해소하실 수 있을 듯 하네요

허벅지 엉덩이 허리 에 이런 뽀루지가 올라와요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 모낭염으로 추정되는 병변이며 둔부 근처에 이러한 병변이 다수 발견되고 불편하시다면 항생제 치료를 시도해보실 수 있습니다. 가까운 피부과를 방문하여 진료받아보시기를 권해드립니다.

비타민디 결핍 주사와 영양제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비타민디 수치에 따른 권장량은 없고 목표를 어느정도로 할거냐에 따라 용량이 정해집니다. 삼천 iu 정도 드시면 될것 같습니다. 그냥 이어서 드시면 됩니다 주사로 할지 아니면 먹는 비타민디로 할지 결정하세요.

수술 공포증 원인을 알면 해소할수있을까요?,안녕하세요 요약 정신의학과에서 불안장애에 대한 조언을 얻으세요 불안장애는 다양한 형태의 비정상적 병적인 불안과 공포로 인하여 일상 생활에 장애를 일으키는 질환입니다. 불안장애에 해당하는 질환으로는 공황 장애광장공포증을 동반하거나 하지 않는 특정 공포증고소 공포증 혈액 공포증 뱀 공포증 등 사회 공포증 강박 장애 외상 후 스트레스 장애 범불안장애 급성 스트레스 장애 등이 있습니다. 건승하세요 피부가 너무나도 갑작스럽게 이상해져서 질문을 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체리혈관종의 정확한 원인은 밝혀진 바 없습니다. 하지만 자외선에 노출 임신 등의 이유로 모세혈관이 정상적이지 않게 확장되면 발생할 가능성이 높고 30대 이후 주로 생기는 것으로 볼때 노화현상과 관련이 있을 것으로 생각됩니다. 체리혈관종은 유전 경향이 있는데 부모님이 체리혈관종이 많다면 자녀들도 많을 가능성이 높은 것이지요.

관계 후 임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 가임기가 아니어서 임신가능성은 없는시기로 생각되고 또 피임에도 문제는 없었던것으로 생각되니 임신가능성은 희박할 것 같습니다

임신 증상이 이렇게 빨리 나타날 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 관련 증상은 보통 임신 3주 이후에 나타나므로 상기 증상이 임신 관련 증상이라고 하기는 어렵습니다. 하지만 증상만으로는 알 수 없어 임신테스트기 검사가 필요합니다.

목을 돌릴때 승모근과 어깨가 연결된 부분이 바늘찌르는 고통이 생깁니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 목을 돌릴때 사용하는 근육에 손상이 있었던 것으로 생각됩니다. 진찰검사를 통해 문제증상을 일으키는 곳을 치료 받아보셔요

소변 볼 때 혈뇨 통증 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요관결석 위치에 따라서 증상이 다양하게 나타납니다. 결석이 배출 안되고 방광 근처에 걸려있으면 지속적인 배뇨증상이 나타날 수 있습니다. 고환 통증도 나타날 수 있고 요도 통증 빈뇨 급박뇨 대변 마려운 느낌 등등의 자극증상이 나타날 수 있습니다. 결석에 의한 급격한 옆구리 통증과 혈뇨가 반복될 수 있으니

자연 배출을 위해 물 많이 마시고 열심히 뛰어다니십시오.

목 막히는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성식도염이 진단되었어도 약물PPI제제?에도 효과가 없어서 고민이시군요. 위내시경을 통해 어느정도 심한지 여부를 확인해보시고요. PPI 제제ex. 란스톤 효과 없으면 보통 먼저 약용량을 2배로 올려서 처방을 합니다. 그리고 다른 위산제나 위보호제를 추가로 처방하기도 하는데요. 물론 평소에 식이조절이나 복압이 올라가지 않도록 주의해야 하겠죠. 그래도 효과가 없다면 24시간 PH보행식도검사를 통해 정말 GERD인지 여부를 정확하게 확인해보실수 있습니다. 정 안되면 식도하부괄약근 수술을 할 수도 있는데.. 자세한 것은 소화기내과 선생님과 상담하고 결정하는게 좋겠습니다.

피임약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약은 안먹은 것이 먹은 것보다 안 좋기에 2정 먹은거는 크게 건강에 문제 되지 않습니다 복용 후에 핸드폰 카톡으로 메모하시는 기록이 제일 좋을 듯 합니다

결막결석 진료 과정에 대해 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 많이 불편하셨군요. 어느정도로 눌렀는지는 알수 없지만 그로 인하여 문제가 생길것 같지는 않네요. 2. 보통은 마취점안액을 사용하는데 그 효과가 짧고 크지는 않은 것 같습니다 3. 큰 문제는 없을 것 같습니다

머리가 땡한거질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 괜찮습니다. 뒷목과 등부분의 긴장과 심리적 흥분에 의해 촉발된 교감신경 압박 또는 과흥분으로 해석합니다. 어쩌면 만성적인 뒷목긴장이거나 무리하지 않아도 지속되는 피로감 등이 있을 수 있습니다.

16개월 아기 항생제 관련 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹는 항생제로 질환이 조절되는지가 가장 중요한 판단이 됩니다. 상기 사항에 대하여 담당의에게 이야기하고 상의를 하기 바랍니다.

임신 가능성이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

임신 가능성이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

임신 가능성이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

항생제와 게보린 혹은 그날엔 같이 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항생제와 진통제는 함께 복용하실 수 있는 성분입니다. 동시에 복용하셔도 괜찮고 각각의 약물 복용 간격만 지키시면 됩니다. 타이레놀이나 게보린 중 어느 것을 복용하셔도 상관없습니다. 효과가 좋던 약으로 골라서 복용하시면 됩니다.

남자는 소변을 앉아서보면안되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 남성이 소변을 보는 자세에 대해 일반적으로 권장되는 것은 서서 보는 것입니다. 하지만 반드시 서서만 봐야 하는 것은 아닙니다. 앉아서 소변을 보는 것이 문제가 되는 경우는 거의 없습니다.

항문 습진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문습진이나 항문소양증이 있다면 먼저 항문주의를 깨끗하고 건조하게 유지시켜 주세요 그래도 가려움증이 심하다면 티베같은 약한 스테로이드 연고도 도움이 될수 있습니다.

한번만 더 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 출혈되어 나온 혈액이 지혈제를 만

나면 검게 덩이지면서 출혈부위를 압박할 수 있는 역할을 할 수 있는데 이 덩이가 시간이 지나며 배출될 수는 있습니다만 선홍빛의 액체가 보이는 상황이라면 주의해야 한다고 볼 수는 있겠습니다. 분비된 정도가 적고 일시적이었다면 우선은 기다려보시고 지속적으로 묻어나온다면 재방문을 해보시는게 좋겠습니다.

선생님 답변감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 말씀하신대로 가족력 없고 1년 전의 대장내시경의 결과도 아주 깨끗한 상태이므로 지금 대장내시경을 추가로 검사할만한 심각한 증상이 없다면 당장 검사를 추가로 진행하실 필요는 없다고 판단됩니다.

임신 혈액검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이 시기는 다음 생리에정일 이후이므로 생리에정일 이후에 테스트하는 것을 추천합니다. 건승하세요.

헤르페스 결막염 가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 결막염은 주로 다음과 같은 경로로 감염됩니다. 직접 접촉 환자의 눈물 분비물 등과 직접 접촉해 바이러스가 전파 감염된 사람과 키스하거나 신체 접촉 시 전파 가능 간접 접촉 환자가 사용한 수건 화장품 렌즈 케이스 등 개인 용품 공유로 전파 오염된 물체나 표면에 있는 바이러스가 눈에 접촉해 감염 자가 감염 입술 또는 피부 주변의 단순 헤르페스 병변에서 바이러스가 손으로 옮겨 눈에 접촉 신생아 감염 분만 시 산모의 활성 질환으로부터 신생아가 감염

반년 전 새끼손가락 골절 이후 관절 부품 현상을 치료할 수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 6개월 전 다친 손가락을 제대로 치료받지 못하셨고 이후 부풀어오른 변형이 나타난 상황이라 보입니다. 당시 어느정도의 손상이 발생했는지를 알기는 어렵지만 이미 변형이 나타난 상황이므로 수술적 방법 없이는 원래의 상태로 되돌리기는 어려울 것이라 예상되어 가까운 정형외과를 방문해 진료받아보시기를 권해드립니다.

자궁 부정출혈 거즈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 출혈이 지속되어 지혈제를 이용한 지혈을 시도중이시군요. 거즈와 같이 녹지 않는 재질에 지혈제를 묻힌 상태라면 덩이째 배출될 것이고 녹는 형태의 지혈제라면 핏덩이같은 양상으로 배출될 수 있겠습니다. 다만 출혈이 다시 시작하는 양상을 보이는 상황이니 재진료가 필요할 것이라 보입니다.

운동중 운동후 가슴통증 및 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 협심증에 대해 걱정스러우시군요. 협심증은 운동 시 나타나는 흉통이 특징적이며 주로 가슴 중앙부나 왼쪽으로 치우치는 통증을 보이게 됩니다. 쥐어짜는 듯한 통증이나 묵직한 느낌의 통증을 유발하는 편입니다. 질문자님의 통증 양상이나 위치 통증이 나타난 시기로 볼 때 협심증으로 인한 통증일 가능성은 낮아보입니다. 운동과 관련된 근골격계 통증일 가능성이 가장 높아보이므로 휴식을 취해보시고 반복된 통증이 나타나면 내과를 방문해보시기 바랍니다.

피나스테리드 복용 중인데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈모약 복용 중인데 탈모가 진행되는 것 같아 고민스러우시군요. 우선은 정말로 약물치료에 효과가 없거나 부족한지를 확인해야 하겠습니다. 약을 처방받으시는 병원을 방문해 확인해보시기 바라며 만약 피테리드에 효과가 부족한 상황이라면 두타스테리드계열의 약으로 변경해보는 것도 가능합니다.

건강검진 통보서가 왔습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 건강검진 결과를 받아보시고 당혹스러우셨겠습니다. 우선 간수치에 대해서는 다니시는 내과를 방문하여 추가적인 진료를 받아보시는게 좋겠습니다. 간수치가 정말로 상승한 상황이 맞을지에 대해서도 고민이 필요합니다. 정황상 수치가 유지되거나 감소되었을 것이라 추정되면 재검도 필요할 수 있습니다. 빈혈수치의 경우 그리 낮지 않으니 너무 신경쓰지 않으셔도 될 수준입니다.

피부에 빨간게 올라오는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 사진을 보기에는 모낭염으로 생각이됩니다. 어떤증상이있나요? 연고 바른다면 항생제 연고를 발라보시고 효과없거나 퍼지면

진료 받아보셔요

치루 수술 후 육신거림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 다 낫지 않았기 때문에 통증은 있을 수 있습니다. 많이 붓거나 출혈이 심하면 진료가 필요합니다. 보다 더 자세한 내용은 수술 받으셨던 병원에 전화 하셔서 문의 하시는 것이 보다 정확한 답변을 들으실 수 있을 것입니다. 감사합니다.

얼굴과 몸에 자꾸 조금씩 두드러기가나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자외선 차단제에 의해 피부가 붉어지고 화끈거리는 등의 자극증상이 나타나지 않는다면 자외선 차단제는 잘 사용하시는 것이 지금의 상황에 도움이 된다고 볼 수 있습니다. 자외선으로 인한 자극이 피부질환을 악화시킬 여지가 있어보입니다. 화장품에 의한 접촉성 피부염은 오랜 관리가 필요한 편이니 피부과를 꾸준히 다니며 치료받아보시기 바랍니다.

대상포진신경통 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진 급성기에는 신경통약을 드실 필요 없이 진통제와 항바이러스제로 조절 하시면됩니다. 초기에 치료하시면 곧 좋아지실 겁니다

버스 창문 햇빛,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일상 생활에서 햇빛에 눈부심을 느껴도 대부분 눈의 손상은 주지 않습니다. 햇빛에 의한 눈의 손상은 일광망막병증의 형태로 나타나는데 햇빛을 정면으로 수 분간 쳐다봐야 생길 수 있습니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

왼쪽 입술 옆에 침 흐르는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 증상으로만 보면 뇌졸중을 의심하기는 좀 어려울것 같습니다. 다만 증상에 대한 관심이 많으신것이 아닌가 싶습니다

유두에서 붉은 피가 조금 나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유두에서 피가 나오는 경우는 대부분이 유방의 유두종이지만 유방암의 경우도 있습니다. 일단 혈성 유두분비물이 나오면 유방초음파 검사와 유방촬영을 시행해보는 것이 좋습니다. 의심되는 병변이 있을 때 유방의 총생검 등 조직검사를 시행합니다. 유두종이 의심되는 경우에도 조직검사를 시행해서 비정형이 있는지 확인하게 됩니다. 물론 유방암도 조직검사를 통해서 진단이 됩니다. 감사합니다.

공복혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경과를 지켜보는 수 밖에없는데 탄수화물 섭취를 줄이고 채식위주의 식사를 해주셔요. 근육운동 열심히하시구요 평생관리가 필요할 수 있을 것 같습니다

다리 무릎쪽 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오금근이 통증은 치료하지 않으면 뛰기가 많이 곤란하며 쭈그려 앉기도 불편해 집니다. 오금근이 아닐 수도 있으나 가까운 병원에서 물리치료와약 복용 정도는 해보시기를 권합니다.

대변에 붉은 실 같은게 나오는데 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 궤양성 대장염을 앓고 계신 상황인데 대변에서 선홍빛 실이 23cm 정도 관찰되는 상황이라 걱정스러우시군요. 말씀하신대로 혈변이 보인 경우에 주의해야 하므로 신경쓰이실만한 상황이라 보입니다. 다만 색만 선홍빛이고 출혈이 아닌 것 같은 특징들이 보이며 복통이나 배변양상의 변화와 같은 다른 증상이 동반되지 않았다면 우선은 지속적으로 이러한 변이 나오는지를 기다려보실 수 있겠습니다. 조금이라도 의심스럽다면 병원을 방문하시기 바랍니다.

유관확장미세석회증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 촬영 영상과 초음파 영상을 봐야 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 미세석회화 유관확장된 부위를 바늘 총조직검사를 우선 해 보고 총조직검사에서 문제가 없다면 좀 지켜보는 방법도 있습니다. 유관확장만 있고 확장된 관 내에 결절이 뚜렷하지 않다면 유관확장 분비성 변화로 인한 미세석회화 가능성이 더 높긴 합니다. 맘모토를 하면 좀 더 정확히 진단할 수는 있는데 비용이 많이 들어서요. 병원을 옮겨서 진료를 한 번 다시 받아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 감사합니다.

미세석회 유관확장 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미세석회 군집 병변에 대해 8년 전 조직 검사를 하였고 양성판정을 받은 부위라고 하더라도 해당 병변이 변화를 보이는 경우 추가적인 조직검사가 필요한 경우도 있습니다. 구체적인 영상검사 결과에 따라 판단이 달라질 수 있으므로 유방외과 진료를 추가로 받아보시기 바랍니다.

회음부 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경미한 열상이라면 시간이 지나면서 저절로 호전 되는 경우가 많지만 열상이 크다면 산부인과 내원하여 진료를 보는 것을 권합니다.

질입구쪽 아프타성 궤양,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질염과 외음부염이 동반된 것으로 보입니다. 통증이 있고 냉이 나온다면 약물 치료를 하는 것이 필요하므로 진료를 보시기 바랍니다.

왼쪽 눈 머리 이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸살기운과 두통은 관련이 많습니다. 몸살에 의한 자율신경 변화가 동반되어 두통은 편두통 양상과 비슷하게 잘 나타나며 약은 일반적인 진통제를 드시면 되는데 약효가 개인차가 있는 것 뿐이니 효과가 없으면 종류를 바꾸어 보시면 됩니다.

왼쪽 눈 머리 이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 편두통 가능성이 높습니다. 따라서 상기 증상이 반복된다면 신경과에서 진료를 보는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

얼굴과 몸에 자꾸 조금씩 두드러기가나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자외선 차단제에 의해 피부가 붉어지고 화끈거리는 등의 자극증상이 나타나지 않는다면 자외선 차단제는 잘 사용하시는 것이 지금의 상황에 도움이 된다고 볼 수 있습니다. 자외선으로 인한 자극이 피부질환을 악화시킬 여지가 있어보입니다. 화장품에 의한 접촉성 피부염은 오랜 관리가 필요한 편이니 피부과를 꾸준히 다니며 치료받아보시기 바랍니다.

치루 수술 후 욕신거림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 다 낫지 않았기 때문에 통증은 있을 수 있습니다. 많이 붓거나 출혈이 심하면 진료가 필요합니다. 보다 더 자세한 내용은 수술 받으셨던 병원에 전화 하셔서 문의 하시는 것이 보다 정확한 답변을 들으실 수 있을 것입니다. 감사합니다.

버스 창문 햇빛,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일상 생활에서 햇빛에 눈부심을 느껴도 대부분 눈의 손상은 주지 않습니다. 햇빛에 의한 눈의 손상은 일광망막병증의 형태로 나타나는데 햇빛을 정면으로 수 분간 쳐다보야 생길 수 있습니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

피부에 빨간게 올라오는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 사진을 보기에는 모낭염으로 생각됩니다. 어떤증상이있나요? 연고 바른다면 항생제 연고를 발라보시고 효과없거나 퍼지면 진료 받아보셔요

습윤밴드 제거 후 항생제 연고 발랐는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 상태로 보면 괜찮을 것 같긴한데 흉이 생기고 안생기고는 처음 다칠때 상처 깊이에 의하여 결정되고 상처를 얼마나 잘 치료하느냐에따라서 흉 크기가 영향을 받을 수 있습니다.

밴드를 붙이는 것이 파상풍 예방에 관련이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안타깝게도 파상풍은 밴드로 예방이 안됩니다. 상처관리와 예방접종으로 통해서 예방이 가능한 것으로 알고 있습니다.

손가락 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 가지고 있는 연고는 자극성 피부염의 간지럼증에 도움이 될수 있으니 발라보시고 차도가 없거나 심해지면 진료 받아보셔요

식후 커피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 나쁘지는 않지만 위염이라던지 역류성 식도염이

있는 경우라면 위에 좋지는 않습니다. 가능하면 적절한 카페인 섭취가 도움이 됩니다. 감사합니다.

목에 핏줄 같은 게 있는데 원래 이런건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문자님께서 촬영하신 부분은 인두이고 이 부분에는 원래도 혈관이 잘 관찰됩니다. 구강 점막은 혈관 분포가 많은 것이 특징입니다. 불편한 증상이 있다면 이비인후과 진료를 받으시면 되고 불편하지 않다면 신경쓰실만한 부분은 없어보입니다.

머리가 핑 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 환자분의 증상은 급속한 체위변경에 의한 미주신경성 실신이 의심됩니다. 대부분 빠른 체위 변경에 의해 일어나므로 천천히 몸을 일어나 보도록 해 보세요. 감사합니다.

어제 파라핀 치료를 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기본적으로 참을 수 있는 정도까지 뜨겁게 합니다. 나이가 젊으시니 열에 의한 손상의 가능성은 적습니다. 치료는 반복해 보시고 효과가 없으면 중단한다 라고 생각하시면 됩니다.

뼈 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뼈가 골절되는 수준의 강한 충격이 가해지거나 24시간 내내 압박감을 가하는 어떠한 자극이 있는 수준이 아니라면 일시적인 자극으로 뼈가 변형되기는 어렵습니다. 질문자님의 말씀과 같은 상황으로는 문제가 되지는 않겠습니다.

성관계 자위 시 방귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성대장증후군은 스트레스나 감정적변화에 따라 대장이 과민반응을 보여 가스가 많이 발생할 수 있습니다. 평소 식이섬유를 많이 섭취하시고.. 가스가 많이 발생할 수 있는 음식들콩 탄산 기름진 음식을 멀리하시는게 좋겠습니다.

응급처치 늦었나여???파라핀 치료 부작용 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파라핀치료 받은후에 화상을 입는 경우는 거의 없습니다. 많이 불편하면 다시 병원에서 진료 한 번 받아보시는것이 어떨까요?

선생님추가질문이요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 불편한 증상으로 대학병원을 방문하셨고 1년 전의 대장내시경 결과가 정상이라는 점 진찰한 의사의 의견이 올해의 검사는 필요치 않은 과한 검사라는 점을 고려하면 경과를 지켜보시는 것이 더 합당해보입니다.

알레르기성 비염으로 인한 증상 중에,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알레르기 비염과 급성 인후두염이 동반된 것으로 보입니다. 증상이 있다면 병원 내원하여 진료를 보는 것을 권해드리겠습니다.

선생님 추가질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1년전 검사가 제대로 이루어졌다면 일반적으로 추가로 검사를 권하지는 않습니다. 하지만 걱정이 된다면 근처 병원에서 검사를 다시 하는 것도 문제는 되지 않습니다.

골다공증 초고위험군 치료와 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골다공증이 심하시군요. 골다공증 치료는 골절의 위험을 낮추는 것이 가장 중요합니다. 척추는 골절 위험이 높으니 당분간 넘어지거나 추락하는 손상을 입지않도록 주의하셔야 합니다. 그래서 이베네티 주사를 1년 사용하고 해를 쪼이면서 체중이 실리는 걷기운동을 하시고 칼슘 비타민D를 계속 투여하고 뼈에 필요한 단백질이나 미네랄을 식사에서 충분히 보충하고 1년후 검사해서 수치를 보고 다른 약으로 바뀌어야 합니다. 병원은 처음 방문한 곳에 계속 다니시는 것이 좋습니다. 감사합니다.

추가적인 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이두근에 근육통이 생긴거 같네요. 평소보다 근육을 많이 써서 근육손상이나 근육통이 발생한게 아닌가 싶습니다. 근육통이 심하시면 근육이 회복될수있게.. 통증이 없을때까지 아픈 근육은 쓰지 마시기 바랍니다. 현재 통증이 심하면 진통소염제같은 진통제를 복용해보세요. 도움이 되셨기를 바라며.. 궁금한 사항있으면

언제든 물어보세요

협심증 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동하고 무관하게 통증이 있다면.. 협심증이 아닐 가능성이 높습니다. 통증지점을 겹으로 알 수있는 부위가 있다면.. 근육통일 가능성이 높습니다. 과도한 운동을 하고 있다면.. 근육이 회복될 수 있게 휴식을 취하시고요. 통증이 심하면 진통소염제를 복용하는게 좋겠네요.

머리가 주기적으로 아프고 뒷목이 빠근합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 박동성으로 느껴지는 두통으로 보아 편두통일 가능성이 높습니다. 두통은 여러종류가 있어서.. 신경과 진료를 보시어 정밀한 진찰이 필요해 보입니다. 두통을 유발하는 요인을 피하고 휴식으로 좋아질수는 있는데요. 그보다 먼저 검사를 통해 두통의 원인을 찾고 필요시 약물치료를 같이 하는게 좋겠습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다.

눈 밑 근육 떨림이 너무 심합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈아래 근육떨림이 나타나는건.. 눈아래 근육에서 경련이 발생한거 같네요. 보통 스트레스나 수면부족으로 인한 피로에 의해서 나타나게 되는데요. 카페인이나 알콜같은 것에 의해서도 나타나고.. 전해질마그네슘 칼슘..의 불균형에도 나타날 수 있습니다. 충분한 수면과 휴식에도 증상이 지속된다면 신경과 진료를 받아서.. 정확한 원인과 적절한 치료를 받는데 좋겠습니다. 도움이 되시길 바랍니다. 이게 무슨 증상인지 궁금합니다. 구글링해도 안나와요장갑끼면 손등불편감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장갑을 끼지 않으면 손등 불편한 증상이 어떤가요? 전혀 없는지 아니면 똑같이 나타나는지요? 하지 불안증후군이 있으신가요? 일단 진료는 한번 받아보셔요

갤럭시워치 심전도 측정인데 확인해주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 갤럭시 워치 심전도 측정리듬은 문제는 없어보이는데요. 혹시 측정하는 이유와 걱정되는 부분은 무엇인지요? 손등통증 관련 문의입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지 불안 증후군에 대한 치료를 받아보시면서 경과를 지켜볼 수 있습니다. 손으로 만지만 장갑끼고 있을때처럼 증상이 나타나나요? 가정의학과나 신경과 진료 받아보셔요

빵에서 바퀴벌레 더듬이가 나왔는데 병원 가봐야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 놀라셨겠네요. 일단 증상이 없으면 억지로 토하려 하지말고 그냥 지켜보실 수 있어요. 그게 무엇인지 알 수 있으면 좋을 것 같네요

왼쪽 눈이 아프다가 갑자기 관자놀이가 아픕니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 눈 부근이 아프다가 지금은 관자놀이로 통증부위가 옮겨간 양상입니다. 이러한 통증의 양상만으로 두통의 구체적인 원인을 진단하기는 어렵지만 편두통이 보통 편측으로 나타난다는 점을 고려하면 가능성은 있습니다. 추가적인 진찰이 필요하므로 증상이 나아지지 않으면 가까운 신경과를 방문해보시기 바랍니다.

아까 너무급해요 글쓴 사람인데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 청소년기임을 감안한다고 해도 마스크 착용이 얼굴 골격의 발달에 미치는 영향은 제한적입니다. 마스크의 장시간 착용이 얼굴의 형태를 변형시킨다는 직접적인 증거도 없습니다. 그러니 과도한 우려라고 볼 수 있겠고 코막힘 등의 질환이 구조적 변화로 이어질 가능성은 있으니 불편한 증상이 있는지를 먼저 살펴보시기 바랍니다.

손가락 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 가지고 있는 연고는 자극성 피부염의 간지럼증에 도움이 될수 있으니 발라보시고 차도가 없거나 심해지면 진료 받아보셔요

식후 커피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 나쁘지는 않지만 위염이라던지 역류성 식도염이 있는 경우라면 위에 좋지는 않습니다. 가능하면 적절한 카페인 섭취가 도움이 됩니다. 감사합니다.

피부에 빨간게 올라오는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 사진을 보기에는 모낭염으로 생각이됩니다. 어떤증상이있나요? 연고 바른다면 항생제 연고를 발라보시고 효과없거나 퍼지면 진료 받아보셔요

밴드를 붙이는 것이 파상풍 예방에 관련이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안타깝게도 파상풍은 밴드로 예방이 안됩니다. 상처관리와 예방접종으로 통해서 예방이 가능한 것으로 알고 있습니다.

빵에서 바퀴벌레 더듬이가 나왔는데 병원 가봐야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 놀라셨겠네요. 일단 증상이 없으면 억지로 토하려 하지말고 그냥 지켜보실 수 있어요. 그게 무엇인지 알 수 있으면 좋을 것 같네요

손등통증 관련 문의입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지 불안 증후군에 대한 치료를 받아보시면서 경과를 지켜볼 수 있습니다. 손으로 만지만 장갑끼고 있을때처럼 증상이 나타나나요? 가정의학과나 신경과 진료 받아보셔요

이러한 이유들 때문에 탈모나 두피염이 생길수 있나요? 글이 좀 깁니다 다 읽어주신후 진심으로 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 날파리가 두피에 들어가고 콘돔 만진 손으로 두피나 모발을 만졌다고 두피염이나 탈모가 생길 가능성은 거의 없으니 걱정하지 않아도 됩니다. 두피염은 손으로 만지거나 접촉한 것 보다 전체적인 몸의 컨디션수면 패턴 스트레스 정도...이나 환경이나 계절의 변화 같은 요소의 영향을 받을 수 있습니다. 공부하면서 스트레스 받고 수면이 부족하면 두피염이 생길 수 있으나 가벼운 두피염이 탈모의 원인이 되지는 않습니다. 질문하신 내용은 모두 아무 신경 쓰지 않아도 되는 것들이니 서로 연관 지어서 인과 관계를 생각하지 말고 두피에 염증이나 트러블이 있으면 피부과에 가서 진료 보시고 모발이 많이 빠지거나 어느 부위가 비어 보이면 탈모가 있는지 진료 보시면 됩니다. 감사합니다.

탈모약 중단후 고환통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 약에 의한증상이면 중단하면 저절로 좋아집니다 약을 중단했는데도 계속 증상이 있다면 다른 원인이 같이 있었을가능성이 더 높습니다 병원을방문하셔서 상담을 받아보시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

무릎 살짝 구부렸을때 찌릿,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 손상으로 통증이 나타난다고 하더라도 이것이 관절염과 같은 질환으로 곧바로 이행하지는 않습니다. 질문자님의 나이키와 체중을 고려하면 이러한 위험성은 낮습니다. 불편한 증상이 사라질때까진 휴식을 취해보시고 12주 쉬어도 통증이 지속되면 정형외과 진료를 받아보시기 바랍니다.

지속적으로 반사되어 들어온 햇빛 망막 건강 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 강한 빛이 계속 조사되면 눈 건강에 안 좋을 수는 있겠지만 이런 게 녹내장의 진단에 영향을 준다는 보고는 아직까진 없으니 너무 걱정하진 않으셔도 됩니다. 다만 강한 햇빛이 눈에 계속 들어오는 것은 황반변성이나 백내장 등의 발생 및 진행에 영향을 줄 수 있으니 가림막을 설치하신 것은 좋은 대응 같습니다. 감사합니다.

광시증이 핸드폰이나 컴퓨터를보면 더심해지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 망막에 이상이 없다고 해서 보통 광시증이 없어지지는 않습니다. 보통 유리체 부유물이 망막을 건들거나 기타 여러가지 이유로 망막에 자극이 있을 때 그렇게 번쩍 할 수 있습니다. 망막박리나 망막변성 열공 등 병변이 없다면 너무 걱정하진 마시되 광시증 비문증의 양이 갑자기 증가하거나 한 눈씩 감고 봤을 때 시야의 한쪽이 가려보이면 안과 진료를 얼른 받으시는 게 좋고 그러지 않더라도 정기 검진 하시는 게 좋겠습니다.

목디스크 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 디스크로 인한 신경 증상일 수도 있으나 대부분 많은 경우에 있어서 근육자체의 문제가 우선시 됩니다. 이를 유발하는 것이 말씀하신 거북목 일자목과 같은 정상적인 굴곡의 변형일 수 있습니다. 약물 치료를 동반한 단순 물리치료 부터 주사치료 등 해볼 수 있는 것은 다양하며 평소에 습관적인 자세가 문제 일 수 있으니 다니던 병원에서 호전이 없다면 다른 기관을 방문해 보는 것도 좋을 듯 합니다. 감사합니다.

냉찜질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 냉찜질을 하여도 다리쪽 혈관이 커지거나 하지는 않을 것으로 생각됩니다. 관절염에는 따뜻한 찜질이 도움이 될것 같습니다

혀 냄새입,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치과 의사 한 사람의 소견으로 혀클리너의 장기적인 사용을 권장드리지는 않고 싶습니다. 저도 한동안 써보니 혀 위의 타액까지 너무 다 긁어내고 혀에 자극이 많이되어 그리 개운하지 않으면서 혀의 느낌도 좋지 않았습니다. 제 경험상 그렇습니다. 냄새가 난다고 입을 자꾸 물로 헹구고 이를 자꾸 닦으시면 냄새가 더 나고 입이 굉장히 텅텅하게 느끼실수 있습니다. 우리 입안의 냄새를 막고 항상성을 유지시켜주는데 가장 큰 역할을 하는 것은 침타액입니다. 물은 넉넉히 드시되 너무 자주 가글하시고 이를 닦으시면 입속의 타액코팅이 다 벗겨져서 오히려 더 입이 바싹 마르고 냄새가 더 나기 쉽습니다. 칫솔질하실때 혀는 충분히 닦아주시고 입안에 치약 맛이 전혀 남지 않도록 최소 8회 이상 헹궈서 칫솔질 후에 입안의 느낌이 치약맛달고 화한 느낌이 전혀 남지 않게 해주세요. 그리고 물은 필요할때만 충분히 드시고 입을 건조하지 않게 유지시켜주시면 조금 도움이 될수 있을 것 같습니다. 만약 스케일링을 받으신지가 오래됐다면 그것도 빨리 받아보시구요 혀가 깨끗해도 치아사이에 치석이 많으면 바로 세균으로 찬답니다.

탈모약 중단후 고환통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 약에 의한증상이면 중단하면 저절로 좋아집니다 약을 중단했는데도 계속 증상이 있다면 다른 원인이 같이 있었을가능성이 더 높습니다 병원을방문하셔서 상담을 받아보시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

자위행위후 사정을 아예 안하고 있습니다. 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 사정이 시작되었는데 억지로 압력을주어 막지만 않으면 큰 문제는 없을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

소변에서 참치 냄새?가 납니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 검사에서 이상이 없었기 때문에 일시적인 것으로 충분한수분섭취를하시면 저절로 좋아질것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

척추종양? MRI 판독 요청드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 척추에서 자체적으로 생긴 종양의 가능성도 있겠으나 전이에 의한 병변일 가능성이 더 높은 것이 사실입니다. 다만 MRI 만으로 어떤 종양이다 라고 확정짓기는 어렵고 조직검사 등을 통해 확진을 받는 것이 좋을 것으로 판단됩니다.

스테로이드 성분을 뺀 기관지 확장제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 스테로이드가 없는 기관지확장제도 있습니다. 베타2 작용제LABA 제품 세레벤트 항콜린제LAMA제품 스피리바 보통 저용량 스테로이드 흡입제와 같이 사용하는게 염증해소에 더 좋기는 하지만.. 스테로이드 부작용으로 사용을 꺼리신다면 담당의사와 상의해서 스테로이드가 없는 제품사용을 고려해 보시기 바랍니다.

잘못된 마사지로 인한 체형 변화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어깨가 불편하시군요. 견갑부의 반복된 통증은 목디스크의 증상입니다. 견갑부의 마사지로 해당연령에서는 큰 합병증은 없습니다. 만약 마사지로 불편함이 해소되지 않으면 경추신경 주변의 염증이 의심됩니다. 가까운 정형외과나 신경외과를 방문하시기 바랍니다. 감사합니다.

체중을 실어 손등을 압박하는 정도로 눌린 손의 힘줄이나 핏줄을 다칠수 있나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 순간의 동작으로 조직 손상이 있을 수도 있지만 질문 하신 부분들이 흔히 나타나지는 않을 것 같아 보이는데요 우선은 가까운 정형외과를 방문하시어 큰 문제가 있는지를 먼저 확인해 볼 필요가 있어 보입니다. 감사합니다.

전방경사? 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정형외과를 방문하시어 척추 전장을 촬영해 보시면 기본적인 것은 확인이 될 듯합니다. 다양한 이유로 걱정하시는 현상이 보일 수 있으니 미리 걱정하실 필요는 없을 듯 합니다. 감사합니다.

전완근이 쉽게 피로해집니다tfcc,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흔히 이야기 하는 테니스 엘보에 대해서 더 찾아 보시면 도움이 되지 않을까 합니다. 불편한 증상은 손의 사용량으로 인한 것으로 TFCC 병변과는 크게 상관은 없어 보이나 같은 원인 제공이 TFCC를 불편하게 할 수는 있을 듯 합니다. 감사합니다.

질문 엘러스 단로스,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보신 것과 같이 일종의 유전성 질환으로 유전자 검사를 해보면 알 수 있는 질환으로 사료되며 보여주신 그림은 전신 이완이 있는 사람의 경우 흔히 보이는 현상입니다. 감사합니다.

로라타딘과 씨콜드노즈정코감기약 함께 복용가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 로라타딘은 항히스타민제 이고 씨콜드노즈정에도 항히스타민성분이 포함되어 있습니다. 콧물이 심하거나 알러지가 심할 때는 항히스타민제를 2가지 정도 까지도 복용을 할 수 있습니다만 항히스타민 복용에 따른 부작용이 있을 수 있습니다. 구갈 졸림 등

양치하다가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코피가 목 뒤로 넘어가서 목에서 피가 뱉어 진 것으로 보여 집니다. 출혈이 계속 되는 것이 아니면 큰 문제는 없을 것으로 여겨집니다. 지속적인 출혈이 있을 시에는 병원진료를 받으세요.

항우울제 부작용일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 약을 많이 복용하시는 편 같습니다. 약을 점점 줄여 나가는게 가장 바람직 하겠구요 운동을 좀 하시는지요??? 한달만 달리기 진행해보시는거 추천드립니다. 정말 좋습니다. 1달만 해보세요 일단 약 부작용일 가능성도 있구요 마그네슘제제 같이 드셔보세요. 마그네슘 오메가3가 우울증에 도움이 됩니다. 오메가3도 인터넷 제품 말고 약국에서 학회에서 나온 오메가3를 드시는 걸 추천 드리겠습니다. 쾌유하시길 바랍니다.

귀 아래 몽우리가 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귓볼에 피지선 같은 게 많은데 표피낭종 피지낭종 같은 물혹이 종종 생깁니다. 그리고 임파선이 붓거나 침샘에 종양 가능성도 있습니다. 붓거나 빨갱게 염증 소견이 있을 때는 병원 진료를 바로 받으시고 작고 통증이 없을 때는 자극을 주지 마시고 병원 진료를 받으세요.

코 뒤쪽 안쪽?이 답답하고 불편합니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코하고 목사이를 비인두라고 하는데 그 부위에 염증이 생긴 것으로 보여집니다. 일단 따뜻한 물을 마시고 가글을 하시고 습도 조절해 주시는 게 그나마 도움이 될 것이고 병원 진료를 받고 약처방을 받으시는게 좋겠습니다.

귀두 아래 좁쌀처럼 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두 아래 좁쌀처럼 생겨져 있군요. 타이슨샘 등의 가능성으로 치료 없이 지내셔도 되는 소견입니다. 링크된 동영상에서 추

가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=Q30OuOu2B0w>

정계정맥류 수술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 정계정맥류 서혜하부 수술을 받으신지 4일차인데 궁금한 점이 많으시군요. 수술 받으신 병원 원장님이 가장 정확하게 답변해 주실 것입니다. 크게 걱정하지 마시고 주치의와 상담을 받으도록 하십시오.

증상 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계후 이틀뒤 약간 왼쪽 사타구니 치골쪽 불편감 엉덩이쪽 불편감이 있는데 왼쪽만 그렇군요. 하루종일 약간 졸린느낌있고 식욕 약간 떨어지는 등의 소견은 성병일 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 비뇨기과 검진을 받으도록 하십시오.

음경 내부 가려움증?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음경 속이 가려운 느낌이 들어 잠들기도 힘들고 해서 비뇨기과에서 초음파 피검사 소변검사 다 해봤는데 문제없음으로 나오고 결석인가 싶어 결석검사도 해봤는데 이상없음으로 나와는데 너무 힘드는군요. 우선 대학병원급 비뇨기과에서 전립선 검사 등의 정확한 검사를 시행 받으시고 스트레스 조절과 온탕 반신욕 등의 관리를 꾸준히 병행해 보십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=VHWSjiLQNIIE>

교대근무자 불편함 호소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 정확한 상태는 정신건강의학과 진료 상담이 필요할 수 있습니다. 교대근무를 하면서 밤낮이 바뀌고 스트레스를 많이 받아서 나타나는 것으로 생각합니다. 과거에 트라우마로 인해 불안장애 스트레스장애를 진단받은 것도 흔적이 남아서 증상유발에 일조를 했을 수 있습니다

아버지 잠꼬대 관련질문입니다본문내용자세히보고답해주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. REM 수면 행동 장애에서 보이는 증상들인 것 같습니다. REM 수면 행동 장애는 종종 폭력적인 행동을 보일때가 있습니다. 노인에서 더 많고 최근에 뇌경색이 있었던 경우에 더 잘 발병하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 파킨슨병의 초기에도 보일 수 있습니다. 뇌 MRI 뇌 CT에서 이상이 없었고 파킨슨 증상도 없어 담당 교수님이 심각한 상태가 아니라고 판단하신 것 같습니다. 리보트릴 클로나제팜 사용시 호전되는 경우가 있으니 교수님과 상의해보시길 바랍니다.

2016년도에 신경섬유종 검사했는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부 위축증으로 보이는 병변 모양입니다. 신경섬유종과는 관련이 없는 질환으로 신경섬유종으로 바뀔 가능성은 없습니다. 해당 부위에다 콜라겐 생성을 촉진하는 주사collagen booster나 진피절제술을 반복적으로 오랫동안 시행하면 호전될 가능성은 있습니다. 치료가 쉽지는 않은 편입니다. 문의에 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

달걀은 닭을 먹은거같애요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 100 장담하기는 어렵지만 40분정도 끓는물에 삶은 달걀기 때문에 식중독이나 기생충문제는 없을것으로 판단됩니다.

다이어트 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순계산으로 닭가슴살 100g 106칼로리 단백질 22g 양배추 200g 66칼로리 단백질 3g 팽이버섯 150g 33칼로리 단백질 3g 백미밥 210g 306칼로리 단백질 5g 한끼x3 511칼로리 단백질 35g 1533칼로리 단백질 105g 몸무게 100kg 성인 1시간 걷기면 약 400칼로리 소모 20분 뛰기면 약 300칼로리 소모 20대 남성 평균 기초대사량 1700~2100칼로리 사이 중간치라고 하면 1900칼로리로 잡으면 평소 기본적인 활동량도 300칼로리정도 소모된다고 잡으면 기초대사량보다 1400칼로리정도 적게 섭취하는 형태입니다. 몸에 무리가 가지 않는 다이어트는 주당 0.5kg 감량이 좋지만 질문자분은 한주 1kg 정도 감량을 목표로 하고 있습니다. 현재 식단과 운동으로 단기간에 좋은 효과를 보겠지만 1개월만 지나면 체내에 지방축적 호르몬 분비가 증가돼 감소량이 크게 줄 수 있습니다. 또한 체

중감소가 근육량으로 빠질 수 있기때문에 섭취 칼로리를 올려서 하루 약 400칼로리 정도 줄이는것이 좋다고 봅니다. 운동을 그대로 유지한다면 드시는 식단에 한끼는 정상적인 식사와 아몬드 과일류를 사이에 섭취하고 기초대사량보다 500칼로리정도 적게 유지하는걸 권유드리며 목표가 단순 체중감소가 아닌 체지방량 감소 근육량 유지를 목표로 잡는것을 추천드립니다. 운동 사이클에는 철봉매달리기 팔굽혀펴기 스쿼드 레그리프트 같은 근력운동을 추가하고 평소에 걷기를 원래 하셨거나 달리기 부담이 안된다면 유지하셔도 좋지만 현재 체중에 달리기 익숙하지 않다면 무릎에 무리를 줘 운동을 꾸준히 못하게 될 수 있습니다. 1. 한끼 정상적인 식사 및 무기질 섭취 권장 2. 근력운동 추가 3. 단순 체중감소 보다 체지방량 감소 및 근력 유지 또는 향상 권장 4. 달리는는 조금씩 늘려가는 방식 또는 체지방 일부 감소 후 달리기 권장

음식의 아는 맛보다 가벼웠던 기억이 더 맛있을겁니다. 다이어트 화이팅

모낭염인가요 ? 그냥 두드러기인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가려움에 의해 긁다보니 피부가 자극을 받아 지속적으로 증상이 나타나는듯합니다. 힘들어도 몇일 참고 건드리지 않으면 대개 좋아집니다

허리아래 골반뒤쪽 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 해당 정보만으로 심각한 병인지 여부 확인은 어렵지만 요로결석 등의 가능성 있을듯합니다. 참기 힘들다면 응급실 진료 권유합니다

오랜만에 항문 자위를 하다가 피가 났습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 더이상 출혈이 없다면 경과관찰해도 될듯하나 그로 인해 염증 등이 발생할 수 있으며 위험할 수 있어 절대 추천하지 않습니다

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콘돔이 관계 중 터질 수는 있습니다. 단 정액 가능성 보다는 여성분의 질 분비물의 가능성이 높을듯합니다. 너무 걱정하지 않아도 될듯합니다

부정교합,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요 부정교합인지 봐주시면 감사하겠습니다. 그리고 제가 악궁이 좁은편인가요? 양 송곳니 사이의 거리는 혼자 자로 잰했을 때 약 4.5cm 정도이고 혀바닥 너비는 대략 4.85cm입니다 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다 악궁이 좁아보이지진 않구요 총생뿔뿔함 이 있는 부정교합 입니다

윗 사랑니 발치 부위가 시꺼멓게 되어 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대략 1년 넘게 완전히 맹출해 있던 왼쪽 위 사랑니를 지난 수요일 발치했습니다. 현재 발치 후 4일째인데 발치한 부위가 전체적으로 응고된 피 내지는 익힌 쇠고기와 비슷한 검은색이 되어 있습니다. 해당 부위에 별다르게 심한 통증이나 출혈은 없고 물로 가글을 하여도 사라지지는 않았습니

다. 이에 본 현상이 자연스러운 과정인지 아니면 병원 방문을 요하는 일인지 질문을 드리려 합니다. 사랑니 뺀 곳에 피가 굳어 그렇게 보이는 듯 합니다 통증이나 불편감이 없다면 괜찮으실듯 해요

어금니 신경치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니

다만 신경치료 후 크라운 으로 가능할 듯 하네요 가까운 치과에—가셔서 검사를 한번 받아보세요

눈 위쪽에 노란 물질이 보입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안과에서 살짝 터트리시면 될 것 같습니다. 항생제 연고 바르고 면봉으로 살짝문질러도 물질이 터지면서 치료가되기도합니다

야즈 경구피임약 복용 도중 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약을 비교적 꾸준히 드신것으로 미루어임신으로 인한 착상혈이라기 보다는 부정출혈일 가능성이 높아보입니다. 너무 불안해하지 않으셔도 될것 같습니다

표피낭종수술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 표피낭종은 보통 국소마취로 수술하게 됩니다. 수술후에 운전하시는데는 문제는 없을 것으로 생각합니다. 혼자가셔도 됩니다

흑색조갑증 진료 후 문의 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정 많으시지요? 제가 보기에는 악성 흑색종을 의심할 만한 소견은 보이지 않으니 안심하시고 추적검사 잘 받으시면 될 것으로 보입니다

어지러워응급실갔는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 혈관이 포함된 CT가 아닐 가능성이 높지 않을까 싶지만 현재 정보만으로는 확인이 불가능합니다. 해당 병원에 문의하셔야 할듯합니다

덜익은 닭을 먹은거같애요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 100 장담하기는 어렵지만 40분정도 끓는물에 삶은 닭이기 때문에 식중독이나 기생충문제는 없을것으로 판단됩니다.

임신 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임에는 문제가 없었던것은 아닌가싶은데요. 가임기이고 임신을 원하지 않는다면 사후 피임에 대한 대비를 하시는 것으 좋을 것 같습니다

저를 타격한 공,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그정도라면 생각했던것 보다 큰 충격은 아닌것으로 생각되고 뇌출혈과는 연관은 없어보이지만 걱정되거나 불편한 증상이 있으면 사진찍어보세요

당뇨와 고지혈약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 처음 당뇨와 이상지혈증을 진단 받으신 후 조절이 잘 되고 있는 상태이군요. 이렇게 조절이 잘 되는 이유는 의사가 약을 잘 처방한 것도 이유이지만 환자가 많은 노력을 했기 때문에 가능합니다. 참 잘하셨습니다. 1. 먼저 당뇨에 관하여 말씀을 드립니다. 현재 복용하는 당뇨약인 자누비아와 글루코파지는 저혈당을 유발하지 않으면서 혈당을 잘 잡아주므로 계속 복용해도 좋을 듯 합니다. 특히 글루코파지는 장점이 많고 좋은 약입니다. 계속 현재처럼 복용하다가 나중에 어떤 이유로 인해 혈당이 상승하기 시작하면 글루코파지 용량을 늘려서 혈당을 조절하는 것이 좋습니다. 2. 이상지혈증에 관하여 말씀을 드립니다. 현재 복용하는 아트로바스타틴은 좋은 약입니다. 질문자의 이상지혈증 상태도 비교적 좋은 편입니다. 그러나 당뇨 환자는 일반 환자보다 이상지혈증을 엄격하게 관리해야 합병증 발생을 예방하는데 유리합니다. 현재 아트로바스타틴 10mg을 복용하면서 LDL이 91 혹은 84로 떨어지긴 했지만 당뇨환자에게는 이 수치도 높은 수치입니다. 그러기 때문에 아트로바스타틴을 20mg으로 증량하는 것이 좋을 듯 합니다. 당뇨 환자는 되도록 LDL을 70을 넘기지 않는 것이 좋습니다. 그러기 위해서는 아트로바스타틴을 증량하거나 혹은 에제티미브 복합제를 사용하는 것이 좋습니다. 요즘 유튜브 등에 보면 의사나 약사 혹은 일반 유튜브들이 스타틴이 몸에 해롭다는 등 중단해야 한다는 등의 근거 없는 이야기를 많이 하는 것 같습니다. 그러나 스타틴의 부작용은 생각보다 거의 없으며 잇점이 무척 많은 약입니다. 나이가 많은 사람이면 대강 치료해도 되겠지만 질문자처럼 젊고 앞으로 40년50년 이상을 건강하게 사시려면 혈당조절 콜레스테롤 조절 혈압 조절이 잘 되어야 할 것으로 사료되는군요. 스타틴을 절대로 중단하지 마시고 오히려 증량하셔서 충분히 콜레스테롤이 더 감소되게 하셔야 할것임을 다시 강조드립니다. 답변이 도움이 되었길 바라며...

답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 바이러스 검사에서 음성으로 나왔어도 지금 있는 돌기가 곤지름이라고 하면 전염력이 있다고 볼 수 있습니다. 진료하신 선생님이 조직검사를 권하면 하시는 것이 좋을 것 같습니다

치루 절개술 후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술한 집도의 선생님이 별다른 말씀이없었다고 하면 점점 좋아질 것으로 생각됩니다.살을 붙이는 시술 수술은 따로 없는것 같습니다

헤르페스 피검사 정확도,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상도 없고 피검사 음성이라고 하면 일단 걱정하지말고 지내시면 될것 같습니다. 언제든 주위에서 노출될수 있으니 주의가 필요합니다

중3인데 키가 안큽니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최종키를 정확하게 예측하기는 어렵습니다. 부모님 두분다 키가 큰편인가요? 최근들어 성장이 안되고 있으니 어느정도 성장이 마무리되어가고 있는것은 아닌가 하는 생각되 습니다. 일찍 자고 운동하고 비타민디도 잘 챙겨 드세요

심장 관련 건강검진 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 타다필이 문제가 있다고하면 다른약으로 바꾸어 보는것도 시도해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 너무 많은 ct 촬영은 방사능 노출로 인한 건강문제도 걱정하셔야 합니다. 또 조영제 알려지도 있으시니 신중하게 접근하시는 것이 좋겠습니다

선생님..안녕하세요. 메디이즈입니다. 줄여서 조절이 계속 잘되면 몸에 이익이라고 볼수 있고 줄여서 당이나 고지혈증이 심해지면 손해라고 볼수 있지요. 약때문에 신장이 나빠지는 것은 아니고 병때문에 나빠지는 것으로 생각하는 것이 합리적인것 같습니다 최소한의 약물로 최대한의 효과를 볼수있으면 그게 제일 좋겠지요

당뇨 고지혈 약 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 조절이 아주 잘되고 있습니다. 약을 줄이면 지금 보다 더 노력을 하셔야 합니다. 약줄이는 것은 주치의 선생님과 상의가 필요합니다. 고지혈증약을 끊으면 다시 LDL이 오르는 경우가 흔합니다. 당뇨약 줄이는것보다 고지혈증약을 중단하는 것이 더 어렵습니다

가끔 배가 찢릿해요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적으로 잠깐 있다가 없어지는 증상의 원인을 밝히기는 어렵습니다. 점점심해지거나 자주 나타나면 진료를 받아보श्य. 역류성 식도염은 아닌것 같습니다.

왼쪽 엄지손톱 점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 걱정하지마세요. 이것은 흑색종과는 연관 없는 없어보입니다. 손톱밑 선상출혈가시출혈소견으로 생각됩니다.
<https://m.blog.naver.com/j26662223000739518>

상처가 아물어서 생기는 딱지가 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 상처로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

증상 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련은 없을 것 같습니다 너무 걱정 안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

메니에르 증후군 약 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시죠? 먹먹한 증상이 약 복용후에 생겼다고 하시지만 먹먹한 증상이 메니에르병의 증상중 하나 일 수 있으니 주치의 선생님과 상의해보श्य.

새끼손가락 골절 핀삽입 후 재활가능성이 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료를 위해서 고정을 오래 하는 것인데 오래 고정할 수록 재활이 힘들어지는 것은 사실이지만 절대로 돌아오지 못한다 이렇게 단정짓기는 어려우나 주치의 선생님과 상의가 필요합니다

정계정맥류 수술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 정계정맥류 서해하부 수술을 받으신지 4일차인데 궁금한 점이 많으시군요. 수술 받으신 병원 원장님이 가장 정확하게 답변해 주실 것입니다. 크게 걱정하지 마시고 주치의와 상담을 받도록 하십시오.

머리 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀 하시는 것으로 추정해보면 기립성 저혈압이 있으신것으로 생각됩니다. 뇌출혈을 의심할 만한 증상은 아닌것 같습니다

이거 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에 없었던 병변이 갑자기 생긴것이라고 하

면 헤르페스의 가능성도 있으니 진료 받아보시는 것을 권해드립니다.

발목이 부었어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 상처를 통한 감염으로 염증이 발목과 발로 번지고 있는 봉와직염 증상으로 생각되니 빨리 진료 받아보시는 것이 좋겠습니다

윗 사랑니 발치 부위가 시꺼멓게 되어 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대략 1년 넘게 완전히 맹출해 있던 왼쪽 위 사랑니를 지난 수요일 발치했습니다. 현재 발치 후 4일째인데 발치한 부위가 전체적으로 응고된 피 내지는 익힌 쇠고기와 비슷한 검은색이 되어 있습니다. 해당 부위에 별다르게 심한 통증이나 출혈은 없고 물로 가글을 하여도 사라지지는 않았습니다. 이에 본 현상이 자연스러운 과정인지 아니면 병원 방문을 요하는 일인지 질문을 드리려 합니다. 사랑니 뺀 곳에 피가 굳어 그렇게 보이는 듯 합니다 통증이나 불편감이 없다면 괜찮으실듯 해요

음경에 줄이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 상황은 알기 어렵지만 큰문제는 없을 것으로 생각합니다. 내일도 계속 이상이 느껴지면 진료 받아보시는 것을 권합니다

영덩이 피부좀 봐주세요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에도 이런적이 있나요? 한쪽만 생겼다고 하면 단순포진이 아닌가 했는데 양쪽으로 생겼다고 하니 접촉성 피부염이 아닌가 싶습니다. 내일 진료 받아보श्य

더위먹음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기초체력이 부족하고 탈수가 있는상태에서 돌아다녔다고 하면 더위먹은 증상이 나타날 수도 있기는 합니다. 지금 느끼는 것은 온열질환 증상은 아닌것 같습니다.

청소년 삼킴장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경과에서 진찰에서 이상이없다고 하는 것은 진찰로 뇌나 척수문제는 아닌것을 확인했다는 것입니다. 추가 검사가 필요한지 다시 진료 받아보श्य

마리트롤주 모유수유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수유부에서는 가급적 트라마돌 성분의 마리트롤주를 사용하지 않는 것이 바람직 합니다 일반적으로 트라마돌을 투여받은 후 수유를 재개하는 안전한 시간에 대한 명확한 기준은 없지만 약물의 반감기를 고려할 때 최소 24시간 정도는 수유를 피하는 것이 좋습니다. 트라마돌의 반감기는 성인에서 약 67시간이지만 대사산물의 반감기까지 고려하면 약물의 완전한 배출을 위해 24시간 정도는 필요할 수 있습니다

상처가 아물어서 생기는 딱지가 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 상처로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

장유착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 지금정도의 증상이라고 한다면 별다른 조치없이 많이 걸으면서 경과를 관찰하셔도 좋을 것 같습니다.

사랑니 옆 이빨이 누르거나 이를 앙다물면 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아래쪽 매복 사랑니가 잇몸을 뚫고 나오는 중인데 갑자기 방금전부터 이를 앙다물거나 매복사랑니 바로옆 이빨을 손으로 누르면 아파요.. 이거 사랑니 빼야한다는 신호인가요..? 아님 이빨이 나면서 아플수도 있는건가요? 사랑니 주변 잇몸에 염증이 생겨 부은 듯 합니다 치과에 가서서 약 처방 받으시고 붓기 좀 가라앉으면 발치 하시는게 좋을 듯 하네요

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 여러가지 이유로 수시로 변화합니다. 130/133 정도면 우려할 만큼 높지않아서 걱정안하셔도 됩니다. 잠못자고 스트레스영향이 있을 수 있습니다

유통기한 지난 곱창김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 속이편해지고 설사가 멈추고 식욕이 돌아올때까지는 수분섭취를 하면서 금식을 유지하시는 것이 빠른회복에 도움이됩니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 관계는 없을것 같은데 자세한것은 안성형을 같이하는 안과 선생님과 상담해보시는게 좋을것 같습니다. 감사합니다

증세 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나중에 수포가 돌아나는지 아닌지 확인이 필요합니다. 특징적인 수포 없이는 헤르페스 2형이라고 이야기하기 어렵습니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 관계는 없을것 같은데 자세한것은 안성형을 같이하는 안과 선생님과 상담해보시는게 좋을것 같습니다. 감사합니다

코로나 재채기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간혹 코로나 음식물이 나오는 경우도 있지만 대부분 큰 문제는 없습니다. 지금 불편하신 다른 증상이 나타나는것 있나요?

코 골절될수도있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 되면 부기가 심해지고 통증 멎이 나타날 수 있는데 그렇지 않다면 콧대가 낮아지거나 변형되지는 않을 겁니다

귀통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 증상일 수 있지만 통증이 24시간 이상 지속된다면 통증의 원인에 대한 감별이 필요하므로 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

사타구니 붉은띠,안녕하세요. 메디이즈입니다.단순 상처 입니다. 피부과병원에가 서 서 바르는약과 먹는약을 처방받아서사용하면호전됩니다.....

타다라필 10mg 복용하는데 몸에 문제가 될수 있나요?,안녕하세요 요약 1. 용량으로서는 문제가 되지 않지만 2. 술이랑 같이 먹는 건 권유하진 않습니다. 성인 남성에서의 사용 이 약의 권장 용량은 10mg이며 예상되는 성 행위 전에 식사에 상관없이 복용한다. 타라필 tadalafil 10mg이 충분한 효과를 나타내지 않는 환자들에게는 20 mg을 시도하여도 좋다. 이 약은 적어도 성 행위 30 분 전부터 투여할 수 있다. 최대 권장 복용 빈도는 1일 1회이다. 라고 명시되어 있습니다. 건승하세요

교대근무자 불편함 호소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 정확한 상태는 정신건강의학과 진료 상담이 필요할 수 있습니다. 교대근무를 하면서 밤낮이 바뀌고 스트레스를 많이 받아서 나타나는 것으로 생각합니다. 과거에 트라우마로 인해 불안장애 스트레스장애를 진단받은 것도 흔적이 남아서 증상유발에 일조를 했을 수있습니다

이건 딱지가 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름은 아닌것 같고 혹시 이전에도 이러한 증상이 있었다고 하면 헤르페스 2형 의 가능성도 생각해볼 수 있습니다.

발이 뜨거워서 잠을 못잡니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 정확한 이유를 찾기는 힘들어요 발이 뜨거워서 잠을 못 자는 이유는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 아래에 몇 가지 주요 원인과 관련된 정보를 제공하겠습니다. 1. 말초 신경병증 Peripheral Neuropathy 말초 신경병증은 신경 손상으로 인해 발에 따끔거림 작열감 무감각 또는 통증을 일으킬 수 있습니다. 당뇨병 알코올 남용 비타민 결핍 등이 말초 신경병증의 일반적인 원인입니다. 2. 휴식기 하지 불안 증후군 Restless Legs Syndrome RLS 휴식기 하지 불안 증후군은 다리를 움직이고 싶은 충동과 함께 불편한 감각을 일으키며 밤에 더 심해질 수 있습니다. 이는 발이 뜨거워지는 느낌과도 관련이 있을 수 있습니다. 3. 체온 조절 문제 발이 뜨거워지는 것은 체온 조절의 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 이는 발을 통해 열을 발산하려는 몸의 자연스러운 반응일 수 있습니다. 체온 조절이 잘 안 되는 사람들은 더위를 더 많이 느낄 수 있습니다. 4. 호르몬 변화 호르몬 변화 특히 여성의 경우 폐경기 동안 발생할 수 있는 호르몬 변화는 발이 뜨거워지는 원인이 될 수 있습니다. 이는 일시적이거나 장기적인 문제로 나타날 수 있습니다. 5. 환경 요인 밤에 발이 뜨거워지는 것은 방 온도가 너무 높거나 침구가 너

무 두꺼운 경우에도 발생할 수 있습니다. 발을 시원하게 유지하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 6. 부적절한 신발 및 양말 불편한 신발이나 통풍이 잘 안 되는 양말을 착용하는 것도 발이 뜨거워지는 원인이 될 수 있습니다. 통기성이 좋은 신발과 양말을 착용하는 것이 도움이 됩니다. 7. 혈액순환 문제 혈액순환이 원활하지 않으면 발이 뜨거워질 수 있습니다. 이는 장시간 서있거나 앉아있는 직업에서 자주 발생할 수 있으며 운동이나 다리를 올려서 쉬는 것이 도움이 될 수 있습니다.

증상 질문입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계후 이틀뒤 약간 왼쪽 사타구니 치골쪽 불편감 엉덩이쪽 불편감이 있는데 왼쪽만 그렇군요. 하루종일 약간 졸린느낌있고 식욕 약간 떨어지는 등의 소견은 성병일 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 비뇨기와 검진을 받으록 하십시오.

운동 시 소음으로 이명이 발생할 수 있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동시 큰 음악소리가 원인이었을 수도 있지만 오래간만에 힘들게 운동하신 것 때문일 수도 있으니 운동을 잠시 쉬어보시는것도 고려해보셔요

두경부 CT,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두경부 CT 촬영 부위는 다음과 같습니다. 비강과 부비동 인두와 후두 구강과 턱 목 머리 두경부 CT는 두경부에 발생하는 다양한 질환을 진단하는 데 유용합니다.

각막상처 눈모양 변형?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각막상처로 인해서 눈의 모양이나 크기 등 외형에 직접적인 변형을 일으키거나 일으킬 확률어떤 각막 상처인지요? 그보다는 눈꺼풀 상처가 있다면 영향이 있을것 같지만 괜찮으시다면 경과를 두고 보는것이 맞을것 같습니다.

방광염이랑 당뇨병성 케톤산증?의 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병성 케톤산증은 제 2형 당뇨병 환자에게도 발생할 수 있습니다. 당뇨병성 케톤산증으로 병원에 오는 환자 중 일부는 당뇨병이 있는지 모르고 지내다가 이 질환으로 인해 당뇨병을 진단받습니다. 당뇨병성 케톤산증의 증상으로는 메스꺼움 구토 복통 호흡 시 과일 냄새 등이 있습니다. 당뇨병성 케톤산증의 증상은 입 마름thirst 다뇨polyuria부터 의식 변화까지 다양하다. 피로 구토 복통 호흡 시 과일 향 냄새 빈맥 저혈압이 나타나기도 합니다. 당뇨병성 케톤산증은 높은 포도당 케톤 산 수치를 보여주는 혈액 검사에 의해 진단됩니다. 내과 병원에 가서 피검사소변검사 하시기바랍니다.

자기 상처 정맥,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문자님이 성병에 걸려 있다고 하더라도 상처를 통해서 성병에 걸리거나 하지는 않을 것 같습니다. 상처를 통해서 감염은 언제든지 나타날 수 있습니다

이거 성병 증상인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

포경 실밥 터짐? 벌어짐? 모르겠습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 놀라셨겠네요. 지금 수술한지 벌써 열흘이 넘어서 상처가 조금 벌어졌어도 회복에는 문제는 없을 것으로 생각합니다. 다시 꿰매거나 그럴 필요는 없어 보입니다

의사 선생님 이거 미열인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 그정도는 증상이 없다고 하면 그냥 무시하셔도 될 것 같습니다. 대신 열이 더 오르는지 가끔 체온측정은 필요합니다

등 어깨 마사지 받으면 어깨 골격의 변형,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마사지 후에 개운함보다는 불편함이 있다고하면 하지 않으시는 것이 좋을것 같습니다. 이로 인해 근육손상이나 신경손상이 일어날 것으로 보지는 않습니다

심장질환 전조증상인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검색으로 내가 불편하게 느끼는 증상
에 대한 정확한 원인을 찾기는 어렵습니다. 검색을 많이 하시면 불필요한 걱정만 커질수 있으
니 주의가 필요합니다. 목고 어깨 흉부 근육에 뭉침이 있어서 그런가능성이 높습니다
경추가 이상합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다.교정하면 호전됩니다. 신경외과 병원에게서 물
리치료도수치료 받으시기 바랍니다.....

엄지발가락 무좀인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 엄지발톱 무좀은 맞는 것 같습니다. 가려
움증은 무좀이 퍼진것 과는 별로 상관이 없는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

입술밑에 턱쪽에 멍을 이생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가정의학과나 피부과 진료
받아보셔요. 턱부위에 종기가 자리를 잡으려고 하는 상황이 아닌가 생각됩니다. 자꾸손대면
커질수 있으니 건들지 마세요

임신 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 삽입만 있었고 남자친구 또한 사정은 하지않고
쿠퍼액만 있었고 콘돔을 끼고 관계를 맺었 으므로 임신 가능성 없습니다. 스트레스 우울증
만성질환 과도한 운동 다이어트 저체중이 원인이 되어 생기는 호르몬 균형도 생리주기를 불규
칙하게 만듭니다.

멍 흉터인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 멍이 대부분 사라졌다면 좀 더 지켜보도록 하고
이후에도 발적이 남아 있다면 손상 이외 다른 원인을 감별해야 할 것으로 보입니다.

암 가능성 있을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인을 찾아보는 검사가 필수가 아닌가 싶습
니다. 암일 가능성도 있고 당뇨일 가능성도 있습니다. 다른 가능성도 있으니 미리 걱정하지는
마세요

대상포진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진의 주된 원인은 면역력이 떨어지는 것입니다.
면역력이 떨어지면 vzv 바이러스가 증식하여 신경을 따라 피부로 다시 나오면서 대상포진이
발생합니다. 면역저하가 주원인이기 때문에 심한 스트레스도 면역저하의 원인인 수 있습니
다. 물론 심한 과로자체가 신체에 극심한 스트레스이고 따라서 면역저하를 초래합니다. 바르
는 항바이러스제먹는약 처방받아서 사용 하면 호전됩니다.

표피낭종 제거 후,안녕하세요 요약 1. 낭종을 제거하고 빈 공간에 섬유질로 채워질텐데 2.
이것들이 주변 부위를 구축 연속 시킬 수 있습니다. 3. 아무는 과정 중간중간 병원에서 체크
해 보세요 건승하세요

질외사정 임신확률,안녕하세요 요약 1. 쿠퍼액이라도 썼으면 가능성은 있으니 2. 시기가 되
면 임신테스트기로 확인해 보세요 3. 사후피임약 먹었으면 5 이하의 확률이 생길 수 있습니
다. 건승하세요.

암에 대한 공포 때문에 너무 힘든데 상담 가능할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드
시겠네요. 주변에 친인척이 암으로 돌아가시고 진단 받고 하시니 걱정을 하지 않을 수가 없네
요 정신건강의학과 진료 상담 받아보셔요. 눈에 있는 점을 지우기는 쉽지는 않은데 점의 모양
과 깊이에 따라 다르니 진료를 받아보셔야 합니다

허리통증 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리 진찰을 해봐야 하는데 허리
주위 근육의 문제일 가능성이 높습니다 . 장요근 광배근 대둔근 다열근 ...의 단축이 있을 수
있습니다

패혈증은 세균 하나만 들어가도 발병되나요?,안녕하세요. 요약 1. 면역력이 떨어진 상태에서
는 2. 균이 들어가 증식을 해서 문제가 됩니다. 3. 대부분 한종류만 검출이 됩니다. 4. 면역력
이 빵빵하면 별거 아닌 세균들은 체내에서 적절히 제거가 됩니다. 건승하세요

생수에 아메바 사나요,안녕하세요 요약 1. 생수에 아메바가 살면 2. 시판되지도 않습니다. 물

이 코에 들어가면 다시 뿔어져 나오거나 목으로 다 넘어갑니다. 3. 완제품으로 누가 뚜껑 뚫
흔적도 없으면 안심하고 잡수시면 됩니다. 건승하세요.

성병 불안하다고 한 사람입니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 편도염이 생긴것이 아
닌가 생각합니다. 지나친 스트레스로 편도염이 생긴것이 아닌가 싶은데 진료 한번 받아보셔
요. 검사로 확인도 해보시구요

귀뒤 낭종이 계속 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀뒤에 피지낭종은 흔히 잘 생깁니
다. 염증이 생기면서 커지고 아프고 해서 절개 배농을 하면서 고름이 나왔던것 같습니다. 암
은 아니니 안심하세요

이거 성병 증상인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징
적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바
랍니다.

방광염이랑 당뇨병성 케톤산증?의 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병성 케톤산증은 제
2형 당뇨병 환자에게도 발생할 수 있습니다. 당뇨병성 케톤산증으로 병원에 오는 환자 중 일
부는 당뇨병이 있는지 모르고 지내다가 이 질환으로 인해 당뇨병을 진단받습니다. 당뇨병성
케톤산증의 증상으로는 메스꺼움 구토 복통 호흡 시 과일 냄새 등이 있습니다. 당뇨병성 케톤
산증의 증상은 입 마름thirst 다뇨polyuria부터 의식 변화까지 다양하다. 피로 구토 복통 호
흡 시 과일 향 냄새 빈맥 저혈압이 나타나기도 합니다. 당뇨병성 케톤산증은 높은 포도당 케
톤 산 수치를 보여주는 혈액 검사에 의해 진단됩니다. 내과 병원에 가서 피검사소변검사 하
시기바랍니다.

임신 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 삽입만 있었고 남자친구 또한 사정은 하지않고
쿠퍼액만 있었고 콘돔을 끼고 관계를 맺었 으므로 임신 가능성 없습니다. 스트레스 우울증
만성질환 과도한 운동 다이어트 저체중이 원인이 되어 생기는 호르몬 균형도 생리주기를 불규
칙하게 만듭니다.

멍 흉터인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 멍이 대부분 사라졌다면 좀 더 지켜보도록 하고
이후에도 발적이 남아 있다면 손상 이외 다른 원인을 감별해야 할 것으로 보입니다.

감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파편이 식도나 장기 점막에 붙어있다고 하더라도 정
상적으로 새로운 세포가 자라고 이전 세포가 탈락되면서 몸밖으로 배출될 겁니다

감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파편이 식도나 장기 점막에 붙어있다고 하더라도 정
상적으로 새로운 세포가 자라고 이전 세포가 탈락되면서 몸밖으로 배출될 겁니다

경추가 이상합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다.교정하면 호전됩니다. 신경외과 병원에게서 물
리치료도수치료 받으시기 바랍니다.....

방광염이랑 당뇨병성 케톤산증?의 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병성 케톤산증은 제
2형 당뇨병 환자에게도 발생할 수 있습니다. 당뇨병성 케톤산증으로 병원에 오는 환자 중 일
부는 당뇨병이 있는지 모르고 지내다가 이 질환으로 인해 당뇨병을 진단받습니다. 당뇨병성
케톤산증의 증상으로는 메스꺼움 구토 복통 호흡 시 과일 냄새 등이 있습니다. 당뇨병성 케톤
산증의 증상은 입 마름thirst 다뇨polyuria부터 의식 변화까지 다양하다. 피로 구토 복통 호
흡 시 과일 향 냄새 빈맥 저혈압이 나타나기도 합니다. 당뇨병성 케톤산증은 높은 포도당 케
톤 산 수치를 보여주는 혈액 검사에 의해 진단됩니다. 내과 병원에 가서 피검사소변검사 하
시기바랍니다.

임신 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 삽입만 있었고 남자친구 또한 사정은 하지않고
쿠퍼액만 있었고 콘돔을 끼고 관계를 맺었 으므로 임신 가능성 없습니다. 스트레스 우울증

만성질환 과도한 운동 다이어트 저체중이 원인이 되어 생기는 호르몬 균형도 생리주기를 불규칙하게 만듭니다.

허벅지 뒤 당김 다리근육통 64헤르페스 검사 추가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 검사에서 이상이 없었다면 아닐 가능성이 높아 보입니다 검사 받으신 병원에서 잘 관리 받으시면 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

수면시간을 줄이는것도 적응이될까요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일반적으로 삼십분정도의 수면시간을 줄이는 것은 크게 문제가 되지는 않을 것으로 생각합니다. 기초체력을 길러주면 좀더 쉽게 적응 하실 것으로 생각합니다

암에 대한 공포 때문에 너무 힘든데 상담 가능할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 주변에 친인척이 암으로 돌아가시고 진단 받고 하시니 걱정을 하지 않을 수가 없네요 정신건강의학과 진료 상담 받아보셔요. 눈에 있는 점을 지우기는 쉽지는 않은데 점의 모양과 깊이에 따라 다르니 진료를 받아보셔야 합니다

플루옥세틴과 설프랄린 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물의 반응에는 개인차이가 있을 수 있습니다 주요 차이점 반감기 플루옥세틴은 반감기가 길어 약물의 체내 농도가 안정적으로 유지되며 복용을 중단할 경우에도 체내에서 오랫동안 지속됩니다. 설프랄린은 반감기가 비교적 짧아 체내에서 빠르게 배출됩니다. 부작용 프로파일 플루옥세틴은 불면증과 식욕 감소 체중 감소를 일으킬 가능성이 더 높습니다. 설프랄린은 소화기 계통 부작용에 설사 소화 불량 이 더 흔합니다. 약물 상호작용 플루옥세틴은 긴 반감기로 인해 다른 약물과의 상호작용 위험이 증가할 수 있습니다. 설프랄린은 비교적 짧은 반감기로 상호작용 위험이 낮습니다. 특정 적응증 플루옥세틴은 신경성 폭식증 치료에 사용되기도 합니다. 설프랄린은 PTSD와 사회 불안 장애 치료에 더 자주 사용됩니다.

복통으로 약 복용중입니다. 건강검진시 영향 미칠까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복통으로 드시는 약제가 건강검진 결과에 영향을 줄 가능성은 없어보입니다. 너무 걱정하지 않아도 될듯합니다

귀뒤 낭종이 계속 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀뒤에 피지낭종은 흔히 잘 생깁니다. 염증이 생기면서 커지고 아프고 해서 절개 배농을 하면서 고름이 나왔던것 같습니다. 암은 아니니 안심하세요

사랑니 옆 이빨이 누르거나 이를 앙다물면 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아래쪽 매복 사랑니가 잇몸을 뚫고 나오는 중인데 갑자기 방금전부터 이를 앙다물거나 매복사랑니 바로옆 이빨을 손으로 누르면 아파요.. 이거 사랑니 빼야한다는 신호인가요..? 아님 이빨이 나면서 아플수도 있는건가요? 사랑니 주변 잇몸에 염증이 생겨 부은 듯 합니다 치과에 가서서 약 처방 받으시고 붓기 좀 가라앉으면 발치 하시는게 좋을 듯 하네요

대상포진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진의 주된 원인은 면역력이 떨어지는 것입니다. 면역력이 떨어지면 vzv 바이러스가 증식하여 신경을 따라 피부로 다시 나오면서 대상포진이 발생합니다. 면역저하가 주원인이기 때문에 심한 스트레스도 면역저하의 원인인 수 있습니다. 물론 심한 과로자체가 신체에 극심한 스트레스이고 따라서 면역저하를 초래합니다. 바르는 항바이러스제먹는약 처방받아서 사용 하면 호전됩니다.

표피낭종 제거 후,안녕하세요 요약 1. 낭종을 제거하고 빈 공간에 섬유질로 채워질텐데 2. 이것들이 주변 부위를 구축 연속 시킬 수 있습니다. 3. 아무는 과정 중간중간 병원에서 체크해 보세요 건승하세요

패혈증은 세균 하나만 들어가도 발병되나요?,안녕하세요. 요약 1. 면역력이 떨어진 상태에서는 2. 균이 들어가 증식을 해서 문제가 됩니다. 3. 대부분 한종류만 검출이 됩니다. 4. 면역력이 빵빵하면 별거 아닌 세균들은 체내에서 적절히 제거가 됩니다. 건승하세요

전자레인지 증기로 호흡기관 화상?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 놀라셨겠네요. 뜨거운 증기를 흡입하여 호흡기 화상을 입은 경우 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 호흡 곤란 기침 쉼썩거리는 숨소리 인후통 가슴 통증 화상은 뜨거운 물 스팀 불 태양 등으로 인해 발생할 수 있으며 화상을 입었을 때 즉각적이고 올바른 응급처리가 중요합니다.

수면시간을 줄이는것도 적응이될까요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일반적으로 삼십분정도의 수면시간을 줄이는 것은 크게 문제가 되지 않는 것으로 생각됩니다. 기초체력을 길러주면 좀더 쉽게 적응 하실 것으로 생각됩니다

감기 코로나 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잘 아시다시피 증상만으로 코로나인지 감기인지 구분은 어렵습니다. 검사를 하지 않으신것 같은데 면역저하자가 아니면 코로나 감염으로 확인되어도 코로나 약을 처방 받을 수는없습니다

각막상처 눈모양 변형?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각막상처로 인해서 눈의 모양이나 크기 등 외형에 직접적인 변형을 일으키거나 일으킬 확률어떤 각막 상처인지요? 그보다는 눈꺼풀 상처가 있다면 영향이 있을것 같지만 괜찮으시다면 경과를 두고 보는것이 맞을것 같습니다.

질외사정 임신확률,안녕하세요 요약 1. 쿠퍼액이라도 썼으면 가능성은 있으니 2. 시기가 되면 임신테스트기로 확인해 보세요 3. 사후피임약 먹었으면 5 이하의 확률이 생길 수 있습니다. 건승하세요.

이거 미열인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그정도면 열이 있다고 판단하지는 않습니다. 지금 몸에서 느껴지는 증상은 어떤것이 있을 까요? 걱정안하셔도 될것 같습니다

성병 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 2형생식기 헤르페스의 잠복기는 대개 다음과 같습니다 초회 감염 시 잠복기 212일 평균 47일 감염 후 처음으로 증상이 나타나기 까지 걸리는 기간 재활성화 시 잠복기 없음 또는 수 시간에서 수일 기존 감염인 경우 바이러스가 활성화되어 증상이 나타날 때까지의 기간 잠복기 동안에는 특별한 증상이 없지만 바이러스가 신체 내에 존재하고 있는 상태입니다. 초회 감염 후 잠복기가 지나면 통증 작은 수포 출혈 등의 전형적인 증상이 나타납니다. 기존 감염자의 경우 바이러스가 재활성화될 때 수 시간에서 수일 내에 증상이 재발하게 됩니다

성병 불안하다고 한 사람입니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 편도염이 생긴것이 아닌가 생각됩니다. 지나친 스트레스로 편도염이 생긴것이 아닌가 싶은데 진료 한번 받아보셔야. 검사로 확인도 해보시구요

귀뒤 낭종이 계속 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀뒤에 피지낭종은 흔히 잘 생깁니다. 염증이 생기면서 커지고 아프고 해서 절개 배농을 하면서 고름이 나왔던것 같습니다. 암은 아니니 안심하세요

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈의 크기라는 것이 사실 안구의 크기가 아니라 눈을 떼었을 때 상안검과 하안검 사이의 거리가 먼 것을 의미하기 때문에 생김새에 의해 결정된다고 보아야 하겠고 유전적 요인이 크게 작용하겠으며 쌍꺼풀이 없어도 큰 사람이 존재할 수 있겠습니다.

쌍꺼풀 높이와 눈 크기의 관계 질문사항,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술하신 선생님과 자세한 상담하시는게 좋을것 같습니다. 다만 라인두께 5mm 눈매 교정이라면 더 낮추는 것은 의미가 없을것 같습니다. 너무 라인이 낮아지면 속눈썹이 들릴 가능성 등도 있습니다. 감사합니

다.

쌍꺼풀 폴립 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 걱정되고 불안할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

혈변 문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치열이 있는데 치료가 안되고 있으니 출혈이 지속되고 있는 것으로 생각됩니다.항문외과에서 치료를 받아보시는 것이 좋겠습니다.

완전히 녹은 비닐 섭취,안녕하세요. 요약 1. 응급실 가봤자 할건 없을겁니다. 2. 비닐은 녹은 건지 타서 기화된건지 3. 머가 되었던 간에 비닐 좀 먹었다고 당장 큰일 나지도 않고 4. 내시경을 해서 빨것도 아니고 하니 위장증상이 있는지 경과 관찰을 하세요 건승하세요

완전히 녹은 비닐 섭취,안녕하세요. 메디이즈입니다. 특별한 증상은 없 으므로 응급 실에 안가도됩니다. 비닐 때문에 장이 막히지 만 않는다면 대변으로 나오게될겁니다....

뇌출혈 재질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 머리에 어떤공을 맞았나요? 머리에 공 맞은다음에 없던 증상이 나타났으니 머리에 이상은 없는지 ct 정도는 찍어보시는 것이 좋겠습니다.

노곤 노사정 걱정되네요,안녕하세요 요약 1. 사정은 꼭 눈으로 보는데 진실은 아닐 수도 있으니 2. 14일날 생리하는지 잘 지켜 보시고 3. 안하면 남들 하는 것처럼 이후 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요.

완전히 녹은 비닐 섭취,안녕하세요. 메디이즈입니다. 특별한 증상은 없 으므로 응급 실에 안가도됩니다. 비닐 때문에 장이 막히지 만 않는다면 대변으로 나오게될겁니다....

피검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 루게릭이나 다발성 근염은 비교적 드문 질환입니다. 진단은 혈액검사만으로는 어렵습니다. 하지만 가능성은 별로 없다고 생각합니다

표피낭종 제거 후,안녕하세요 요약 1. 낭종을 제거하고 빈 공간에 섬유질로 채워질텐데 2. 이것들이 주변 부위를 구축 연속 시킬 수 있습니다. 3. 아무는 과정 중간중간 병원에서 체크해 보세요 건승하세요

사타구니 붉은띠,안녕하세요. 메디이즈입니다.단순 상처 입니다. 피부과병원에가 서 서 바르는약과 먹는약을 처방받아서사용하면호전됩니다.....

항문에 이물질을 넣었는데 안 빠져요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당장 응급실 진료를 받아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이물질이 들어가서 혹시 염증을 유발 할 수 도 있기 때문입니다.

대상포진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진의 주된 원인은 면역력이 떨어지는 것입니다. 면역력이 떨어지면 vzv 바이러스가 증식하여 신경을 따라 피부로 다시 나오면서 대상포진이 발생합니다. 면역저하가 주원인이기 때문에 심한 스트레스도 면역저하의 원인인 수 있습니다. 물론 심한 과로자체가 신체에 극심한 스트레스이고 따라서 면역저하를 초래합니다. 바르는 항바이러스제먹는약 처방받아서 사용 하면 호전됩니다.

암 가능성 있을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인을 찾아보는 검사가 필수가 아닌가 싶습니다. 암일 가능성도 있고 당뇨일 가능성도 있습니다. 다른 가능성도 있으니 미리 걱정하지는 마세요

귀통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 증상일 수 있지만 통증이 24시간 이상 지속된다면 통증의 원인에 대한 감별이 필요하므로 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

사타구니 붉은띠,안녕하세요. 메디이즈입니다.단순 상처 입니다. 피부과병원에가 서 서 바르는약과 먹는약을 처방받아서사용하면호전됩니다.....

질외사정 임신확률,안녕하세요 요약 1. 쿠퍼액이라도 샀으면 가능성은 있으니 2. 시기가 되

면 임신테스트기로 확인해 보세요 3. 사후피임약 먹었으면 5 이하의 확률이 생길 수 있습니다. 건승하세요.

타다라필 10mg 복용하는데 몸에 문제가 될수 있나요?,안녕하세요 요약 1. 용량으로서는 문제가 되지 않지만 2. 술이랑 같이 먹는 건 권유하진 않습니다. 성인 남성에서의 사용 이 약의 권장 용량은 10mg이며 예상되는 성 행위 전에 식사에 상관없이 복용한다. 타라필 tadalafil 10mg이 충분한 효과를 나타내지 않는 환자들에게는 20 mg을 시도하여도 좋다. 이 약은 적어도 성 행위 30 분 전부터 투여할 수 있다. 최대 권장 복용 빈도는 1일 1회이다. 라고 명시되어 있습니다. 건승하세요

생수에 아메바 사나요,안녕하세요 요약 1. 생수에 아메바가 살면 2. 시판되지도 않습니다. 물이 코에 들어가면 다시 뱉어져 나오거나 목으로 다 넘어갑니다. 3. 완제품으로 누가 뚜껑 딱 흔적도 없으면 안심하고 잡수시면 됩니다. 건승하세요.

허리통증 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리 진찰을 해봐야 하는데 허리 주위 근육의 문제일 가능성이 높습니다 . 장요근 광배근 대둔근 다열근 ...의 단축이 있을 수 있습니다

성병 불안하다고 한 사람입니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 편도염이 생긴것이 아닌가 생각됩니다. 지나친 스트레스로 편도염이 생긴것이 아닌가 싶은데 진료 한번 받아보셔요. 검사로 확인도 해보시구요

생수에 아메바 사나요,안녕하세요 요약 1. 생수에 아메바가 살면 2. 시판되지도 않습니다. 물이 코에 들어가면 다시 뱉어져 나오거나 목으로 다 넘어갑니다. 3. 완제품으로 누가 뚜껑 딱 흔적도 없으면 안심하고 잡수시면 됩니다. 건승하세요.

살려주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠습니다. 내시경검사후 처방받은 약이 큰 도움이 안된다고 하면 심리적으로 과도한 긴장 걱정 불안같은것이 있다면 그것이 원인일 수 있습니다

타다라필 10mg 복용하는데 몸에 문제가 될수 있나요?,안녕하세요 요약 1. 용량으로서는 문제가 되지 않지만 2. 술이랑 같이 먹는 건 권유하진 않습니다. 성인 남성에서의 사용 이 약의 권장 용량은 10mg이며 예상되는 성 행위 전에 식사에 상관없이 복용한다. 타라필 tadalafil 10mg이 충분한 효과를 나타내지 않는 환자들에게는 20 mg을 시도하여도 좋다. 이 약은 적어도 성 행위 30 분 전부터 투여할 수 있다. 최대 권장 복용 빈도는 1일 1회이다. 라고 명시되어 있습니다. 건승하세요

감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잇몸이나 입안에 불편한 증상이없으면 일단 괜찮다고 생각할 수 있습니다. 불편함이 생기면 치과나 이비인후과 진료 받아보셔요

기름변을 본거 같습니다 의사 선생님 한번 봐주세요,안녕하세요 요약 1. 거품변이나 기름기가 많은 경우에는 지방변인지 확인이 필요합니다. 2. 점액변인지도 감별이 필요합니다. 3. 치질 치루가 있으면 점액변을 싸기도 합니다. 거품이 섞이거나 기름기 많은 밝은 노란색의 대변이 다량으로 나오고 지독한 냄새가 나면 지방 흡수불량이 있는지 확인해 봐야 합니다. 정상상태에서는 섭취한 지방의 90%가 흡수되는데 지방흡수에 문제가 생기면 지방이 20 이상 포함된 지방변이 나오게 됩니다. 지방 소화흡수와 관련된 기관인 췌장췌액 분비이나 간지단백 형성 담낭지방을 유화시키는 담즙산에 문제가 있는지 확인이 필요합니다. 건승하세요

버x깁 햄버거 포장지를 조금먹었는데 괜찮나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 놀라셨지요. 저도 가끔 그럴 때가 있습니다. 소량이고 일회성이라고 한다면 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 앞으로는 좀더 주의가 필요합니다

생수에 아메바 사나요,안녕하세요 요약 1. 생수에 아메바가 살면 2. 시판되지도 않습니다. 물이 코에 들어가면 다시 뿜어져 나오거나 목으로 다 넘어갑니다. 3. 완제품으로 누가 뚜껑 뜬 흔적도 없으면 안심하고 잡수시면 됩니다. 건승하세요.

성병 불안하다고 한 사람입니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 편도염이 생긴것이 아닌가 생각됩니다. 지나친 스트레스로 편도염이 생긴것이 아닌가 싶은데 진료 한번 받아보셔요. 검사로 확인도 해보시구요

스테로이드 연고 손에바르고 비닐장갑벗어요,안녕하세요 요약 1. 2주 정도든 권장되는 치료기간이기 때문에 2. 그리고 성인이라 큰 문제가 되진 않습니다. 3. 이후 다 바르고 끊었으면 체내에 흡수된 것들도 다 빠졌을겁니다. 건승하세요.

패혈증은 세균 하나만 들어가도 발병되나요?,안녕하세요. 요약 1. 면역력이 떨어진 상태에서는 2. 균이 들어가 증식을 해서 문제가 됩니다. 3. 대부분 한종류만 검출이 됩니다. 4. 면역력이 빵빵하면 별거 아닌 세균들은 체내에서 적절히 제거가 됩니다. 건승하세요

사타구니 작열감,안녕하세요 요약 1. 작열감은 신경이나 혈관이 눌리면서 생길 수 있습니다. 2. 언급한 디스크 때문에 사타구니로 가는 신경이 눌려서 생기는 증상인지 확인해 보세요 3. 신경외과에서 진료를 봐보세요 건승하세요.

선생님혹시 이게 주사바늘에 찔린 자국이 아닌지요?,안녕하세요 요약 1. 주사바늘이 찔리기 힘든 위치입니다. 2. 주사 바늘을 찌르기 힘든 각도이기도 합니다. 3. 물리거나 쓸려서 생긴 염증 초기 반응이니 4. 항생제 연고 발라보고 심해지면 병원으로 가면 됩니다. 건승하세요.

미칠거같아요 가슴답답함 갈비뼈여러곳 쿡쿡 통증 손발화끈거림저림 근육통 소화기문제 설사 어지럼증 만성피로 젖은귀지 복부불편함숨 뱃때 살짝 쥐는느낌 목 아픔불편함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 불편하시니까 원인은 차지고라도 증상조절을 위한 치료를 시도해보시면 어떨까요? 증상조절되면 그것이 원인이라고 생각할 수 있지 않을까요?

귀통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 증상일 수 있지만 통증이 24시간 이상 지속된다면 통증의 원인에 대한 감별이 필요하므로 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

질외사정 임신확률,안녕하세요 요약 1. 쿠퍼액이라도 썼으면 가능성은 있으니 2. 시기가 되면 임신테스트기로 확인해 보세요 3. 사후피임약 먹었으면 5 이하의 확률이 생길 수 있습니다. 건승하세요.

암 가능성 있을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인을 찾아보는 검사가 필수가 아닌가 싶습니다. 암일 가능성도 있고 당뇨일 가능성도 있습니다. 다른 가능성도 있으니 미리 걱정하지는 마세요

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 알수는 없지만 aids라는 질환의 잠복기를 고려하더라도 증상이 너무 일찍나타나서 지금증상은 aids와는 연관은 없는 것같고 심리적인 불안증상이 아닌가 생각합니다

암에 대한 공포 때문에 너무 힘든데 상담 가능할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 주변에 친인척이 암으로 돌아가시고 진단 받고 하시니 걱정을 하지 않을 수가 없네요 정신건강의학과 진료 상담 받아보셔요. 눈에 있는 점을 지우기는 쉽지는 않은데 점의 모양과 깊이에 따라 다르니 진료를 받아보셔야 합니다

패혈증은 세균 하나만 들어가도 발병되나요?,안녕하세요. 요약 1. 면역력이 떨어진 상태에서는 2. 균이 들어가 증식을 해서 문제가 됩니다. 3. 대부분 한종류만 검출이 됩니다. 4. 면역력이 빵빵하면 별거 아닌 세균들은 체내에서 적절히 제거가 됩니다. 건승하세요

허리통증 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리 진찰을 해봐야 하는데 허리

주위 근육의 문제일 가능성이 높습니다 . 장요근 광배근 대둔근 다열근 ...의 단축이 있을 수 있습니다

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 알수는 없지만 aids라는 질환의 잠복기를 고려하더라도 증상이 너무 일찍나타나서 지금증상은 aids와는 연관은 없는 것같고 심리적인 불안증상이 아닌가 생각됩니다

표피낭종 제거 후,안녕하세요 요약 1. 낭종을 제거하고 빈 공간에 섬유질로 채워질텐데 2. 이것들이 주변 부위를 구축 연속 시킬 수 있습니다. 3. 아무는 과정 중간중간 병원에서 체크해 보세요 건승하세요

암에 대한 공포 때문에 너무 힘든데 상담 가능할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 주변에 친인척이 암으로 돌아가시고 진단 받고 하시니 걱정을 하지 않을 수가 없네요 정신건강의학과 진료 상담 받아보셔요. 눈에 있는 점을 지우기는 쉽지는 않은데 점의 모양과 깊이에 따라 다르니 진료를 받아보셔야 합니다

허리통증 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리 진찰을 해봐야 하는데 허리 주위 근육의 문제일 가능성이 높습니다 . 장요근 광배근 대둔근 다열근 ...의 단축이 있을 수 있습니다

암 가능성 있을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인을 찾아보는 검사가 필수가 아닌가 싶습니다. 암일 가능성도 있고 당뇨일 가능성도 있습니다. 다른 가능성도 있으니 미리 걱정하지는 마세요

미칠거같아요 가슴답답함 갈비뼈?여러곳 쿡쿡 통증 손발화끈거림저림 근육통 소화기문제 설사 어지럼증 만성피로 젖은귀지 복부불편함숨 뱉을때 살짝 쥐는느낌 목 아픔불편함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 불편하시니까 원인은 차지고라도 증상조절을 위한 치료를 시도해보시면 어떨까요? 증상조절되면 그것이 원인이라고 생각할 수 있지 않을까요?

귀통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 증상일 수 있지만 통증이 24시간 이상 지속된다면 통증의 원인에 대한 감별이 필요하므로 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 충분히 세척을 했고 통증이나 눈에 보이는 이상이 없다면 저절로 빠지거나 제거되었을 것으로 생각합니다. 걱정하지 않아도 되겠습니다.

복부 통증?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 더 이상의 검사는 필요없을 것으로 생각합니다. 다만 불편한 증상에 대한 치료를 받아보시면 어떨까요? 증상에 예민하시거나 걱정이 많은 편은 아니신가요?

버x킹 햄버거 포장지를 조금먹었는데 괜찮나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 놀라셨지요. 저도 가끔 그럴 때가 있습니다. 소량이고 일회성이라고 한다면 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 앞으로는 좀더 주의가 필요합니다

미칠거같아요 가슴답답함 갈비뼈?여러곳 쿡쿡 통증 손발화끈거림저림 근육통 소화기문제 설사 어지럼증 만성피로 젖은귀지 복부불편함숨 뱉을때 살짝 쥐는느낌 목 아픔불편함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 불편하시니까 원인은 차지고라도 증상조절을 위한 치료를 시도해보시면 어떨까요? 증상조절되면 그것이 원인이라고 생각할 수 있지 않을까요?

노콘 노사정 걱정되네요,안녕하세요 요약 1. 사정은 꼭 눈으로 보는게 진실은 아닐 수도 있으니 2. 14일날 생리하는지 잘 지켜 보시고 3. 안하면 남들 하는 것처럼 이후 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요.

헤르페스 혈액검사,안녕하세요 요약 1. 4주면 이제 막 항체가 형성될 즈음이고 2. 더 정확한 건 1216주 이후이긴 합니다. 헤르페스 바이러스 감염을 확인하기 위한 혈액검사는 특정 항

체가 형성되는 시기를 고려해 볼 때 감염 후 일정 시간이 지난 후에 실시하는 것이 정확도를 높일 수 있으며 일반적으로 헤르페스 감염 후 약 4주 이후에 특정 항체IgG가 형성되며 이 항체는 장기간 체내에 남아 있게 됩니다. For the most accurate test result it is recommended to wait 1216 weeks from the last possible date of exposure before getting an accurate typespecific blood test in order to allow enough time for antibodies to reach detectable levels. 건승하세요.

복부 통증?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 더 이상의 검사는 필요없을 것으로 생각됩니다. 다만 불편한 증상에 대한 치료를 받아보시면 어떨까요? 증상에 예민하시거나 걱정이 많은 편은 아니신가요?

감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잇몸이나 입안에 불편한 증상이없으면 일단 괜찮다고 생각할 수 있습니다. 불편함이 생기면 치과나 이비인후과 진료 받아보셔요

사랑니 발치 전 통증 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진찰을 받아보셔야 사랑니의 상태를 정확하게 알 수 있습니다. 염증이 있는지 썩었는지? 통증이 심하면 진통제 일단 복용해보실 수 있습니다

난소위축,안녕하세요. 메디이즈입니다. 난소위축과 난소암의 관계에 대해서는 아직 명확히 밝혀진 바가 없습니다. 그러나 일반적으로 난소위축 자체가 난소암 발병 위험을 높인다고 보기는 어렵습니다. 난소위축은 난소 기능이 감소하거나 정상적인 난자 형성이 되지 않는 상태를 말합니다. 자연 폐경 유전적 요인 자가면역 질환 화학요법 등 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다.

콘돔끼고 사정후 삽입,안녕하세요. 요약 1. 콘돔이 새면 임신 가능성은 당연히 있습니다. 2. 정액이 안 나오고 쿠퍼액도 안 나왔으면 가능성 떨어지고 3. 가임기에는 머든 약간이라도 가능성은 있으니 4. 적당한 시점에 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요.

주사 피부나 근육괴사일수있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사 부위에 단순 혈종 즉 멍이 든 것으로 보이면 피부 괴사와 같은 소견은 관찰되지 않습니다. 멍이 노란색으로 변하고 있어 시간이 지나면 호전될 것으로 보입니다.

접촉성 피부염이 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부염의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

등통증있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 책장이 문제가 있을 가능성은 낮지만 검사를 하지 않고서는 알기는 어렵스비다. 이런경우는 등쪽에 snepi주사를 맞는것이 도움이 될 지 진찰이 필요합니다. 심리적인 것도 원인이 될 수 있습니다

항생제복용후 초콜릿 먹어도 되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제균치료시 사용하는 항생제와 초콜릿은 서로 상호 작용이 없으므로 복용해도 상관 없습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

비뇨기와 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 이전에 전립선염으로 치료 받으신적이있나요?지금도 불편한 증상이 있으신가요? 계속 불편하시면 다시한번 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 추가 검사를 해주실 수 도 있습니다

스마트폰 액장가루,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구강 내 접촉이 되었더라도 소량이고 세척을 했다면 이로 인해 문제가 발생하지는 않습니다. 너무 걱정하지 않아도 됩니다.

자존감 하락으로 인한 스트레스,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정신건강의학과에서 치료 받으시면 자존감 하락으로 인한 스트레스에 대하여 도움을 받으실 수 있을 것으로 생각합니다 질문

자님의 장점을 극대화하여 발전시키면서 다른 사람과 비교하지 마시고 자신을 사랑하시면 치유되실 것입니다.

살려주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠습니다. 내시경검사후 처방받은 약이 큰 도움이 안된다고 하면 심리적으로 과도한 긴장 걱정 불안같은것이 있다면 그것이 원인일 수 있습니다

RE 임질임균성요도염비임균성요도염 감염 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통 비임균성요도염균은 소변유전자 증폭검사PCR검사를 통해서 진단하는 것이 일반적입니다. 그램염색으로는 어렵습니다 소변검사에서 큰이상이없고 증상이없다면 성병이 없다고 추측할 수 있습니다
항문 주름 쪽에 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 모공각화증 증상으로 외과 오셔서 검사 치료하세요. 내시경 상담 하세요. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

이거 곤지름인가요 단순 점인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

제가 여성호르몬제를 조금,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여성호르몬제를 어떤목적으로 얼마나 오랫동안 사용했었나요? 팔뚝 혈관에는 혈전이 잘 생기는 부위는 아니지만 지속되거나 심해지면 진료 받아보셔요

임산부 피검사 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증수치가 높게 나와서 원인을 찾기위해 산부인과에 빨리 내원하여 추가적인 검사를 하시는게 좋겠습니다. 가장 흔한 원인은 요로감염같은 감염성 질환일 가능성이 높고 항생제를 처방받으시면 금방 좋아지고 아기한테도 큰 영향을 주지는 않습니다. 그래도 원인을 파악하기 위해 산부인과를 빨리 방문하시는게 좋겠습니다.

팽창성 하제와 차전자피 를 먹고 있는데 변을 못 봐요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 이전에 팽창성 하제와 차전자피를 드시고는 화장실을 정상적으로 갔었나요?식사량이 줄거나 활동량이 많이 줄거나 그러지는 않았나요? 많이 불편하시면 변비에 사용하는 좌약 같은것을 한번 사용해보셔요

손가락이 제멋대로 움직입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 불수의적인 손가락의 움직임이 있고 손상이 없다면 이에 대하여 신경과 진료를 보는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

플루옥세틴과 설프랄린 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물의 반응에는 개인차이가 있을 수 있습니다 주요 차이점 반감기 플루옥세틴은 반감기가 길어 약물의 체내 농도가 안정적으로 유지되며 복용을 중단할 경우에도 체내에서 오랫동안 지속됩니다. 설프랄린은 반감기가 비교적 짧아 체내에서 빠르게 배출됩니다. 부작용 프로파일 플루옥세틴은 불면증과 식욕 감소 체중 감소를 일으킬 가능성이 더 높습니다. 설프랄린은 소화기 계통 부작용에 설사 소화 불량 이 더 흔합니다. 약물 상호작용 플루옥세틴은 긴 반감기로 인해 다른 약물과의 상호작용 위험이 증가할 수 있습니다. 설프랄린은 비교적 짧은 반감기로 상호작용 위험이 낮습니다. 특정 적응증 플루옥세틴은 신경성 폭식증 치료에 사용되기도 합니다. 설프랄린은 PTSD와 사회 불안 장애 치료에 더 자주 사용됩니다.

자고 일어나면 얼굴,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스도 하나의 원인이 될 수 있다고 생각합니다. 여드름으로 생각이되는데 자꾸 올라오면 약물치료도 필요합니다 여드름을 악화시킬수 있는 음식을 피해주시는 것이 도움이 될 수 있습니다

노래 부를때 턱에 힘줬는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 노래부르는데 왜 턱에 힘이 많이 들어갈까요? 두시간정도 노래부르는 것으로 얼굴변형이 올것 같지는 않은데 노래부르는 법을 다시 잘 배워보시는 것이 좋겠습니다

모낭염이랑 여드름 구분법이있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 여드름은 둘 다 피부에 발생하는 염증성 질환이지만 다음과 같은 차이점이 있습니다. 주사피부염에 구진 농포형도 있습니다 실제로는 구별이 어렵습니다 발생 원인 여드름은 피지가 과다하게 분비되어 발생하는 반면 모낭염은 세균이나 곰팡이 등의 감염으로 인해 발생합니다. 증상 여드름은 주로 얼굴에 발생하며 면포피지 덩어리와 염증이 동반됩니다. 반면 모낭염은 두피 얼굴 가슴 등 다양한 부위에 발생하며 염증이 동반되지만 면포는 없습니다. 압출 시 여드름은 노란 피지 덩어리가 나오는 반면 모낭염의 경우에는 압출을 해도 면포가 나오지 않습니다.

항문에 이물질이 넣었는데 안 빠져요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당장 응급실 진료를 받아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이물질이 들어가서 혹시 염증을 유발 할 수 도 있기 때문입니다.

항문 수술 후 찢어짐 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 항문외과에서 치료중이신가요? 지금 치료후에 회복중이라고 하시니 조금더 기다려보셔야 할것 같습니다.

혈변 문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치열이 있는데 치료가 안되고 있으니 출혈이 지속되고 있는 것으로 생각됩니다.항문외과에서 치료를 받아보시는 것이 좋겠습니다.

뇌출혈 재질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 머리에 어떤공을 맞았나요? 머리에 공 맞은다음에 없던 증상이 나타났으니 머리에 이상은 없는지 ct 정도는 찍어보시는 것이 좋겠습니다.

피검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 루게릭이나 다발성 근염은 비교적 드문 질환입니다. 진단은 혈액검사만으로는 어렵습니다. 하지만 가능성은 별로 없다고 생각됩니다

복통으로 약 복용중입니다. 건강검진시 영향 미칠까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복통으로 드시는 약제가 건강검진 결과에 영향을 줄 가능성은 없어보입니다. 너무 걱정하지 않아도 될듯합니다

경구피임약 부정출혈과 피임효과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약 복용에는 문제가 없다고 생각되고 따라서 피임효과가 떨어지거나 하지는 않을 것으로 생각됩니다. 항생제도 큰 영향은 없을 것으로 생각되니 안심하셔도 될거 같습니다

발이 커졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순히 체중이 늘어서 발사이즈가 커진것으로 보기는 어렵습니다. 손도 커지고하면 성장호르몬 검사도 받아보시는 것이 좋겠습니다

갑작스런 손저림 온몸에 두드러기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두드러기가 난것 같습니다. 많이가렵지는 않나요? 긴급한것은 아니지만 가급적 빠른진료후에 치료받으시는 것을 권합니다.

접촉성 피부염이 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부염의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

음낭 습진이 있는데 음낭이 좀 부은 것 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음낭 습진이 있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

음모 모낭염인가요이거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염의 가능성으로 크게 걱정하지 마

시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

성기에 점이 생겼습니다. 흑색종?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다양한 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

요도쪽 피부염이 자주 재발 하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받으시면서 재발 가능성에 대한 상담도 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

임신 10주차 새집증후군 영향,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신부에서 포름알데하이드 노출은 태아에게 좋지않은 영향을 줄 수 있지만 어느정도 노출이 어느정도 영향을 주는지는 아직 명확하게 알려진 바는 없는것으로 알고 있습니다 장시간의 지속적인 노출은 아니어서 큰 영향은 없을것으로 생각합니다

혈뇨가 있다고해요,안녕하세요. 요약 1. 혈뇨는 대학병원 소아청소년과 소아신장분과에서 2. 정밀검사를 진행해 보세요 3. 언급한 과거 상황은 현재 혈뇨에는 영향이 없습니다. 건승하세요.

두피에 오돌토돌하게 뭐가 돌아났습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 사진에서 보이는 소견은 지루성 피부염에서 보이는 병변모양으로 생각됩니다. 치료 받으시면 곧 회복하실 겁니다

선생님 신장 수치 결과 좀 봐주세요,안녕하세요 요약 아래 사이트에서도 확인해 보세요 정상 콩팥은 1분에 혈액 90120mL를 걸러내므로 사구체여과율의 정상 범위는 90120mL/min 1.73m 입니다. 사구체여과율은 나이와 체격 근육 량에 따라 차이가 있습니다. 제1기 90 제2기 60 89 제3기 30 59 제4기 15 29 제5기 15 입니다.
httpsm.ksn.or.kr/generalaboutcheck.php 건승하세요

음모 모낭염인가요이거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

거품뇨 이거 심각한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 거품뇨가 있으면 단백뇨나 당뇨가 있을 수 있지만 거품뇨 자체가 아무 이상없이도 나타날 수 있습니다. 소변검사로 확인해보셔야

하지정맥류 일까요 혈관 전문 선생님들께 여쭙고 싶습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 직접 진료없이 사진 및 증상에 대한 설명만으로 확진은 불가능합니다만 일단 하지정맥류와는 거리가 있어 보이며 주사제로 인해 특정 질병이 발생했을 가능성도 낮아 보입니다. 또한 첨부하신 사진에서도 큰 이상 소견은 없을 것으로 판단되으나 치료 후로 불편함이 있다 하신 만큼 해당 병원을 방문하시어 자세한 진찰을 받아 보시길 권합니다. 문의에 도움이 되셨길 바랍니다.

하지정맥류 일까요 혈관 전문 선생님들께 여쭙고 싶습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 직접 진료없이 사진 및 증상에 대한 설명만으로 확진은 불가능합니다만 일단 하지정맥류와는 거리가 있어 보이며 주사제로 인해 특정 질병이 발생했을 가능성도 낮아 보입니다. 또한 첨부하신 사진에서도 큰 이상 소견은 없을 것으로 판단되으나 치료 후로 불편함이 있다 하신 만큼 해당 병원을 방문하시어 자세한 진찰을 받아 보시길 권합니다. 문의에 도움이 되셨길 바랍니다.

폐암 객혈량 질문,안녕하세요. 요약 1. 객혈양으로 폐암을 의심할 수는 없습니다. 2. 아래 처

럼 적게 나오기도 하고 많이 나오기도 합니다. 기침과 함께 혈액이 섞인 가래가 나오는 것을 객혈 이라고 합니다. 적은 양의 객혈이 반복된다면 폐암 기관지확장증 승모관협착증 반복성 폐경색증 등의 가능성이 있습니다. 고름 성분이 많은 객담이 객혈과 함께 나오는 경우 폐렴 기관지확장증 폐농양 등의 가능성이 높습니다. 객혈의 양이 많은 경우 폐결핵 괴사성 폐렴 기관지확장증 폐암 등을 의심해 볼 수 있습니다. 건승하세요.

습진이 생긴 건 1년 정도 된 것 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 간혹 습진이라고 생각했지만 무좀인경우도 종종 있을 수 있기 때문입니다. 치료가 달라지거든요

콘돔끼고 사정후 삽입,안녕하세요. 요약 1. 콘돔이 새면 임신 가능성은 당연히 있습니다. 2. 정액이 안 나오고 쿠퍼액도 안 나왔으면 가능성 떨어지고 3. 가임기에는 머든 약간이라도 가능성은 있으니 4. 적당한 시점에 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요.

콘돔끼고 사정후 삽입,안녕하세요. 요약 1. 콘돔이 새면 임신 가능성은 당연히 있습니다. 2. 정액이 안 나오고 쿠퍼액도 안 나왔으면 가능성 떨어지고 3. 가임기에는 머든 약간이라도 가능성은 있으니 4. 적당한 시점에 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요.

이거 곤지름인가요 단순 점인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손가락이 제멋대로 움직입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 불수의적인 손가락의 움직임이 있고 손상이 없다면 이에 대하여 신경과 진료를 보는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

항생제복용후 초콜릿 먹어도 되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제균치료시 사용하는 항생제와 초콜릿은 서로 상호 작용이 없으므로 복용해도 상관 없습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

주사 피부나 근육괴사일수있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사 부위에 단순 혈종 즉 멍이 든 것으로 보이면 피부 괴사와 같은 소견은 관찰되지 않습니다. 멍이 노란색으로 변하고 있어 시간이 지나면 호전될 것으로 보입니다.

삼킴장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 삼킴 장애는 실제 고형이나 액상 음식을 삼키지 못하는 경우로 상기 증상으로 연하곤란을 판단하기는 어렵습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

제가 만성간염이 있는데 향진균제를 먹어도 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 향진균제도 간기능 이상을 유발할 수 있어 간기능의 이상 여부에 대한 확인 후 복용하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

안녕하세요 선생님 주사바늘에 찔린 자국인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 피부염으로 보입니다. 주사 바늘에 찔린 상처 등으로 보기는 어렵습니다. 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

스마트폰 액장가루,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구강 내 접촉이 되었더라도 소량이고 세척을 했다면 이로 인해 문제가 발생하지는 않습니다. 너무 걱정하지 않아도 됩니다.

몸 두드러기,안녕하세요. 요약 1. 모낭염이 에이즈 증상이 아닙니다. 2. 18일째에는 너무 이릅니다. 3. 12주는 지나서 검사를 해서 음성인지 확인해 보세요 4. 에이즈는 걸린 사람이라야 걸릴 확률이 그나마 생깁니다. 건승하세요.

항문 주름 쪽에 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 모공각화증 증

상으로 외과 오셔서 검사 치료하세요. 내시경 상담 하세요. 꽤유하시길 기원드립니다. 한 없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

습진이 생긴 건 1년 정도 된 것 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 간혹 습진이라고 생각했지만 무좀인경우도 종종 있을 수 있기 때문입니다. 치료가 달라지거든요

갈비뼈 등 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사 치료후 잠시 호전 반응이 있었다면 해당주사가 스테로이드를 혼합하지 않은 경우 반복해서 같은 치료를 하면 호전될 것으로 생각됩니다. 가장 기본이 되는 좋은 치료법입니다.

경추와척추,안녕하세요. 메디이즈입니다. 척추 중에 경추가 있습니다. 경추 흉추 요추 천추 미추의 순서로 배열됩니다. 경추가 척추에 속한다고 할 수 있습니다.

그냥 일시적인 어지럼증이였을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 안구주변이나 후두엽 또는 전정기관 등의 순환장애로 비슷한 증상이 나타날 수 있다고 봅니다. 일회성의 증상은 진단과 치료가 어려우므로 병원을 가보실 필요는 별로 없습니다.

늑골하부 엑스레이 판단 부탁드립니다 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 정상적인 소견입니다. 남들도 늑연골은 비슷한 양상으로 보입니다. 그래서 늑연골의 문제는 판독이 어렵습니다.

임산부 피검사 수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증수치가 높게 나와서 원인을 찾기위해 산부인과에 빨리 내원하여 추가적인 검사를 하시는게 좋겠습니다. 가장 흔한 원인은 요로감염같은 감염성 질환일 가능성이 높고 항생제를 처방받으시면 금방 좋아지고 아기한테도 큰 영향을 주지는 않습니다. 그래도 원인을 파악하기 위해 산부인과를 빨리 방문하시는게 좋겠습니다.

이 약들 중에 반응속도를 느리게 하는 약이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반응속도를 느리게 하는 약이 혹시 천천히 퍼지는 약서방정을 말씀하시는 것인지요. 리스페달은 서방정이 없고 세켈은 서방정이 있습니다.

혈뇨가 있다고해요,안녕하세요. 요약 1. 혈뇨는 대학병원 소아청소년과 소아신장분과에서 2. 정밀검사를 진행해 보세요 3. 언급한 과거 상황은 현재 혈뇨에는 영향이 없습니다. 건승하세요.

선생님 신장 수치 결과 좀 봐주세요,안녕하세요 요약 아래 사이트에서도 확인해 보세요 정상 콩팥은 1분에 혈액 90120mL를 걸러내므로 사구체여과율의 정상 범위는 90120mL/min 1.73m 입니다. 사구체여과율은 나이와 체격 근육 량에 따라 차이가 있습니다. 제1기 90 제2기 60 89 제3기 30 59 제4기 15 29 제5기 15 입니다. <https://m.ksn.or.kr/generalaboutcheck.php> 건승하세요

몸 두드러기,안녕하세요. 요약 1. 모낭염이 에이즈 증상이 아닙니다. 2. 18일째에는 너무 이릅니다. 3. 12주는 지나서 검사를 해서 음성인지 확인해 보세요 4. 에이즈는 걸린 사람이라야 걸릴 확률이 그나마 생깁니다. 건승하세요.

음낭 습진이 있는데 음낭이 좀 부은 것 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음낭 습진이 있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

잦은 자위로 인한 피부염일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 예 크게 걱정하지 마시고 우선

피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

입술 주변 열상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에서 직접 상태를 보고 다시 조언을 얻으세요. 건승하세요.

삼킴장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 삼킴 장애는 실제 고형이나 액상 음식을 삼키지 못하는 경우로 상기 증상으로 연하곤란을 판단하기는 어렵습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다. 늑골하부 엑스레이 판단 부탁드립니다. ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 정상적인 소견입니다. 남들도 늑연골은 비슷한 양상으로 보입니다. 그래서 늑연골의 문제는 판독이 어렵습니다.

단순 점인지...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

다리가 가려워요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생긴지 얼마나 되었나요? 알레르기성 자극성 피부염이 생긴것으로 생각됩니다. 긁지말고 냉찜질 하면서 스테로이드 연고 발라주세요

이 두드러기 왜난걸까요??,안녕하세요. 요약 1. 두드러기 맞습니다. 2. 원인은 본인도 모르면 병원에서도 모를 겁니다. 두드러기는 피부나 점막에 존재하는 혈관의 투과성이 증가되면서 일시적으로 혈장 성분이 조직 내에 축적되어 피부가 붉거나 흰색으로 부풀어 오르고 심한 가려움증이 동반되는 피부질환인데 곤충 자상 음식물 알레르기 약물 감염 기계적물리적 자극 등의 여러 가지 원인과 기전에 의해 발생하는데 대부분 원인을 모르는 경우가 더 많을겁니다. 안녕하세요

이게 혹시 뭔가요 곤지름인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

멜로토닌 나오는 등?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아침에 밝은 빛을 쬐어주면 멜라토닌의 분비를 촉진시켜서 불면증과 우울증에 도움이되는 빛치료를 하는 제품입니다. 사용법을 준수하면 우려할 만한 일은 일어나지 않습니다

장이 안좋으면 두뇌도 안좋아지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요즘은 장과 뇌 사이에 밀접한 관계가 있다는 사실이 알려지고 있습니다. 장이 안좋으면 뇌에도 안좋은 영향이 있을 수 있습니다

전신 근육떨림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 이유는 알기 어렵지만 마그네슘섭취를 좀 더 충분히 해주시고 수분섭취도 늘려주세요. 지속된다고 하면 양성 근육연축증후군일 가능성이 높습니다

항체,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 감염이 되었다면 생기지 않는 경우는 없습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

임질임균성요도염비염균성요도염비임균성요도염 감염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 항목에는 빠진 것 같습니다 소변 피시알 검사를 받아야 알 수 있을 것 같습니다 2. 비임균성요도염이라는 말을 씁니다 비염균성은 잘 쓰지 않는 말 같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

같은 자리에 구내염이 재발하면 위험한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 구내염의 재발

은 흔하게 있어 크게 문제가 되지 않으며 구강 궤양의 형태로 반복된다면 이에 대한 평가가 필요합니다.

생식기음낭 주위 좁쌀처럼 생긴것들 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 정상 모낭으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

몸 두드러기,안녕하세요. 요약 1. 모낭염이 에이즈 증상이 아닙니다. 2. 18일째에는 너무 이릅니다. 3. 12주는 지나서 검사를 해서 음성인지 확인해 보세요 4. 에이즈는 걸린 사람이라 해야 걸릴 확률이 그나마 생깁니다. 건승하세요.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 문제가 없었을 가능성이 높습니다 하지만 당분간은 자극은 피하시고 확인차 비뇨의학과를 방문하십시오 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

콘돔끼고 사정후 삽입,안녕하세요. 요약 1. 콘돔이 새면 임신 가능성은 당연히 있습니다. 2. 정액이 안 나오고 쿠퍼액도 안 나왔으면 가능성 떨어지고 3. 가임기에는 머든 약간이라도 가능성은 있으니 4. 적당한 시점에 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요.

콘돔끼고 사정후 삽입,안녕하세요. 요약 1. 콘돔이 새면 임신 가능성은 당연히 있습니다. 2. 정액이 안 나오고 쿠퍼액도 안 나왔으면 가능성 떨어지고 3. 가임기에는 머든 약간이라도 가능성은 있으니 4. 적당한 시점에 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요.

하지정맥류 일까요 혈관 전문 선생님들께 여쭙고 싶습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 직접 진료없이 사진 및 증상에 대한 설명만으로 확진은 불가능합니다만 일단 하지정맥류와는 거리가 있어 보이며 주사제로 인해 특정 질병이 발생했을 가능성도 낮아 보입니다. 또한 첨부하신 사진에서도 큰 이상 소견은 없을 것으로 판단되으나 치료 후로 불편함이 있다 하신 만큼 해당 병원을 방문하시어 자세한 진찰을 받아 보시길 권합니다. 문의에 도움이 되셨길 바랍니다.

오줌줄기가 많이 약해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 많지 않아 전립선 질환 가능성은 높지 않고 방광 기능의 문제일 수 있어 불편감이 있다면 비뇨의학과 진료를 권해드립니다.

눈 처짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈처짐에 대하여 걱정이 많으신것 같습니다. 일상적으로 눈꺼풀을 만지거나 문지르는 것으로 우려할 많아 일은 일어나지 않을 것으로 생각됩니다

항문 성교,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 치열 치질 증상으로 외과 오셔서 검사 치료하세요. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

명치에서 두두두두 떨림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위장약 진경제를 먹어도 진전이 없다면 부정맥에 의한 증상일 수 있습니다. 스트레스나 긴장에 의한 신경과민으로도 나타날 수가 있는데요. 부정맥 병력특발성 심실빈맥도 있으니 순환기내과 진료를 받아보시는게 좋겠습니다.

안녕하세요 증상 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈장은 일반반적을 잘 생기는 부위가 정해져 있습니다 지금 복부가 튀어나오는 부분은 아마도 탈장은 아닐 것 같습니다. 진료 한번 받아보셔요

이거 매독인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한포진 등 단순 피부 병변으로 판단되며 성병으로 인해 발생하는 전형적인 피부 병변은 아닌 것으로 판단됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

삼각섬유유연골 파손 우측,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정 많으시겠네요. mri에서 손상이 확인되고 통증이 지속되고 있다면 수술을 피하기는 어렵지 않을까 생각합니다.

감기 걸렸는데 위쪽 어금니에 통증이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감기와 위쪽 어금니 통증은 서로 연관성이 없을 수 있지만 다음과 같은 경우에는 연관성이 있을 수 있습니다. 상악동염 상악동은 위턱뼈 속에 있는 공간으로 코와 연결되어 있습니다. 상악동에 염증이 생기면 코막힘 콧물 재채기 등의 감기 증상과 함께 위쪽 어금니 통증이 나타날 수 있습니다. 치아 질환 충치나 잇몸 질환 등 치아에 문제가 있는 경우에도 감기 증상과 함께 위쪽 어금니 통증이 나타날 수 있습니다. 감기 증상과 함께 위쪽 어금니 통증이 지속된다면 치과를 방문하여 치아와 잇몸 상태를 확인하고 필요한 경우에는 치료를 받는 것이 좋습니다.

난소위축,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 난소위축이 난소암으로 이어지거나 하지는 않습니다 2. 난소에 있는 물혹은 시간이 지나면서 저절로 없어지기도 하니 경과관찰이 필요합니다

감기 걸렸는데 위쪽 어금니에 통증이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감기와 위쪽 어금니 통증은 서로 연관성이 없을 수 있지만 다음과 같은 경우에는 연관성이 있을 수 있습니다. 상악동염 상악동은 위턱뼈 속에 있는 공간으로 코와 연결되어 있습니다. 상악동에 염증이 생기면 코막힘 콧물 재채기 등의 감기 증상과 함께 위쪽 어금니 통증이 나타날 수 있습니다. 치아 질환 충치나 잇몸 질환 등 치아에 문제가 있는 경우에도 감기 증상과 함께 위쪽 어금니 통증이 나타날 수 있습니다. 감기 증상과 함께 위쪽 어금니 통증이 지속된다면 치과를 방문하여 치아와 잇몸 상태를 확인하고 필요한 경우에는 치료를 받는 것이 좋습니다.

임질임균성요도염비염균성요도염비임균성요도염 감염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 항목에는 빠진 것 같습니다 소변 피시알 검사를 받아야 알 수 있을 것 같습니다 2. 비임균성요도염이라는 말을 씁니다 비염균성은 잘 쓰지 않는 말 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

난소위축,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 난소위축이 난소암으로 이어지거나 하지는 않습니다 2. 난소에 있는 물혹은 시간이 지나면서 저절로 없어지기도 하니 경과관찰이 필요합니다

발가락에 무좀이 있는데 발가락 옆면이 변색됐는데 이거 괜찮은거 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각질의 상태로 보아 족부 무좀 즉 백선에 대한 적극적인 치료를 고려해야 하며 연고제재로 호전이 더디다면 경구 항진균제 복용을 고려해야 합니다.

뇌출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌진탕시 후유증으로 몇달 지속될 수 있습니다. 두통 어지럼증 기억력저하 집중력 저하 등등.. 하지만 말이 어눌해지거나 힘이 빠지는 증상이 있다면 신경과 방문하여 뇌영상검사를 받아보시는게 좋겠습니다.

임질임균성요도염비염균성요도염비임균성요도염 감염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 항목에는 빠진 것 같습니다 소변 피시알 검사를 받아야 알 수 있을 것 같습니다 2. 비임균성요도염이라는 말을 씁니다 비염균성은 잘 쓰지 않는 말 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

코피가 아주 조금 나는데 문제가 있진 않을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잦은 코피 멈추지 않는 코피가 아니라면 코점막의 건조화로 인한 것으로 보입니다. 심각한 정도는 아니나

질문자분의 나이와 비교한 건강상태로 보아 혈압 관리가 필요할 것으로 보입니다. 일상생활 속의 건강한 습관들이 적당히 나는 정도의 운동 신선한 채소 비중을 높힌 식사를 익히시길 바랍니다.

오줌줄기가 많이 약해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 많지 않아 전립선 질환 가능성은 높지 않고 방광 기능의 문제일 수 있어 불편감이 있다면 비뇨의학과 진료를 권해드립니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 없고 음경에 부종이나 발적이 없다면 손상이 발생하였을 가능성은 없다고 보아도 됩니다. 크게 걱정하지 않아도 되겠습니다.

눈 처짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈처짐에 대하여 걱정이 많으신것 같습니다. 일상적으로 눈꺼풀을 만지거나 문지르는 것으로 우려할 많아 일은 일어나지 않을 것으로 생각됩니다

항문 성교,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 치열 치질 증상으로 외과 오셔서 검사 치료하세요. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

생식기음낭 주위 좁쌀처럼 생긴것들 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 정상 모낭으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

예전부터 손바닥에 존재했는데 사마귀인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상으로 사마귀인지 구분하기는 어렵습니다. 모양으로만 보면 사마귀는 아닌것으로 생각됩니다 손바닥에도 사마귀 납니다

발목정강이 과긴장성 통증 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 이전에 혹시 심하게 발목을 다친적이 있나요? 그렇다면 근육손상의 가능성이 있습니다. 자세한 진찰후에 주사치료하시면 도움이 되실 수 있을 것으로 생각됩니다

귀에서 소리가 납니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 턱관절의 인대가 부딪히면서 나는 잡음일 수도 있고 이명일 수도 있습니다. 목과 턱관절을 움직일때혹은 하품할때 소리가 난다면 인대 마찰음의 가능성이 많고 가만히 있는데 소리가 나는 것이라면 이명의 일종으로 보입니다. 두 경우 모두 시간이 걸리기는 하지만 치료는 가능합니다. 가까운 한의원에 내원하셔서 상담받아보시길 바랍니다.

요도쪽 피부염이 자주 재발 하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받으시면서 재발 가능성에 대한 상담도 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

제가 만성간염이 있는데 향진균제를 먹어도 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항진균제도 간기능 이상을 유발할 수 있어 간기능의 이상 여부에 대한 확인 후 복용하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

급해요 프로베라정10mg 복용후 술 마셔도될까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약을 드시면서 술을 드시는 것은 피하셔야 하는 일이라면 술을 드시게 되더라도 가능한 최소한을 드셔야 합니다. 약은 계속 드시는 것이 좋겠습니다. 시간변경은 큰 도움은 알될 것 같습니다

갑자기 눈이 놀리는 듯한 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 장시간동안 전자기기에 노출되고 난후에 나타나는 건성안 증후군 안구 피로 증상이아닌가 싶습니다. 더이상 전자기기 노

출을 피하고 인공눈물을 사용할 수 있으면 휴식을 취해주세요

손가락 종합 후 병원 치료 기간,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처에 대한 판단은 담당 선생님이 가장 정확하게 하실 겁니다. 일단 봉합한 실밥을 뽑았으니 한고비는 넘으신것 같습니다. 진물이 없으면 물에 하루정도 지나고 넣어도 될것으로 생각됩니다.

성기에 점이 생겼습니다. 흑색종?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다양한 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

악성 후 피부 늘어짐?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 악성과는 큰 연관은 없어보이고 아마도 이전부터 그랬었을 것으로 생각되니 너무 걱정마시고 경과를 지켜보세요.

단순치루 절개 6주 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 상태를 알기 어렵기지만 이제 그만 내원해도 된다고 하셨으니 시간이 지나면서 점점 회복하실 것으로 생각도비니다

그냥 일시적인 어지럼증이였을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 안구주변이나 후두엽 또는 전정기관 등의 순환장애로 비슷한 증상이 나타날 수 있다고 봅니다. 일회성의 증상은 진단과 치료가 어려우므로 병원을 가보실 필요는 별로 없습니다.

병원에 가니 항문 모낭염 같다고하는데...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 평소 하던대로 하면 되고 더 튀어 나오거나 발적 종창 등이 있으면 모낭염으로 진행할 수 있습니다. 모공성 각화증은 오래된 피부세포가 정상적으로 탈락하지 못하고 표피 내로 들어가 모공의 출구를 막음으로써 모공이 커져서 오돌도돌 닭살처럼 보이는 질환입니다. 비만한 사람 아토피 피부염이 있는 사람 피부가 건조한 사람에게 많이 생기는데 가려움증이 생기며 심하게 긁으면 모공이 도드라지고 오돌도돌해지면서 더 올라오게 됩니다. 건승하세요

경추와척추,안녕하세요. 메디이즈입니다. 척추 중에 경추가 있습니다. 경추 흉추 요추 천추 미추의 순서로 배열됩니다. 경추가 척추에 속한다고 할 수 있습니다.

안녕하세요 선생님 주사바늘에 찔린 자국인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 피부염으로 보입니다. 주사 바늘에 찔린 상처 등으로 보기는 어렵습니다. 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

갈비뼈 등 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사 치료후 잠시 호전 반응이 있었다면 해당주사가 스테로이드를 혼합하지 않은 경우 반복해서 같은 치료를 하면 호전될 것으로 생각됩니다. 가장 기본이 되는 좋은 치료법입니다.

안녕하세요,안녕하세요. 요약 1. 여자던 남자던 자위한다고 치매 걸릴 확률이 높아지지 않습니다. 2. 치매는 유전력이 있습니다. 3. 가족력을 살펴 보세요 부모 중 한 명이라도 치매 병력 있을 경우 치매 발병 위험 47 알츠하이머병 위험 72 증가 부모 자식 간에는 유전자 뿐만 아니라 생활방식과 환경을 공유하기 때문에 부모 치매가 자녀 치매 발병 위험을 높일 수 있습니다. 건승하세요.

모르고 오래된 생리대 사용했는데 병원 가봐야 하나요?,안녕하세요. 요약 1. 아무 증상 없으면 안 가도 됩니다. 2. 다른 13년된 남은 생리대를 확인해 보세요 3. 13년 되어도 성분이나 구조물들이 고스란히 그대로 있기도 합니다. 4. 질 자극 증상이나 냉이 나오면서 냄새가 나면 그때 고민해 보세요 건승하세요.

두피에 오돌토돌하게 뭐가 돌아났습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 사진에서 보이는 소견은 지루성 피부염에서 보이는 병변모양으로 생각됩니다. 치료 받으시면 곧 회복하실 겁니다

폐암 객혈량 질문,안녕하세요. 요약 1. 객혈양으로 폐암을 의심할 수는 없습니다. 2. 아래 처

럼 적게 나오기도 하고 많이 나오기도 합니다. 기침과 함께 혈액이 섞인 가래가 나오는 것을 객혈 이라고 합니다. 적은 양의 객혈이 반복된다면 폐암 기관지확장증 승모관협착증 반복성 폐경색증 등의 가능성이 있습니다. 고름 성분이 많은 객담이 객혈과 함께 나오는 경우 폐렴 기관지확장증 폐농양 등의 가능성이 높습니다. 객혈의 양이 많은 경우 폐결핵 괴사성 폐렴 기관지확장증 폐암 등을 의심해 볼 수 있습니다. 건승하세요.

눈꺼풀 수포,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진은 선명하지 않아서 눈꺼풀에 돋아난것이 수포 인지 확인은 어렵습니다. 만성 눈꺼풀염증소견이 아닌가 싶습니다

하지정맥류 일까요 혈관 전문 선생님들께 여쭙고 싶습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 직접 진료없이 사진 및 증상에 대한 설명만으로 확진은 불가능합니다만 일단 하지정맥류와는 거리가 있어 보이며 주사제로 인해 특정 질병이 발생했을 가능성도 낮아 보입니다. 또한 첨부하신 사진에서도 큰 이상 소견은 없을 것으로 판단되으나 치료 후로 불편함이 있다 하신 만큼 해당 병원을 방문하시어 자세한 진찰을 받아 보시길 권합니다. 문의에 도움이 되셨길 바랍니다.

녹내장 확률이 클까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주신정보만으로 정확한 답변은 어렵습니다. 직접 결과를 확인하신 안과 선생님께 문의해보셔요. 안압은 좀 어떠신가요? 검사가 불충분 했을 가능성이 높습니다

경추와척추,안녕하세요. 메디이즈입니다. 척추 중에 경추가 있습니다. 경추 흉추 요추 천추 미추의 순서로 배열됩니다. 경추가 척추에 속한다고 할 수 있습니다.

족배동맥 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사람마다 동맥의 모양이 조금 다를 수 있습니다. 일단 동맥경화도 검사에서 이상이 없으셨다고 하니 안심하셔도 됩니다

조울증 성인 adhd가 충돌해 비급여로,안녕하세요. 메디이즈입니다. 4. 다른 병원에서도 확인해 보세요 건승하세요.

안녕하세요,안녕하세요. 요약 1. 여자던 남자던 자위한다고 치매 걸릴 확률이 높아지지 않습니다. 2. 치매는 유전력이 있습니다. 3. 가족력을 살펴 보세요 부모 중 한 명이라도 치매 병력 있을 경우 치매 발병 위험 47 알츠하이머병 위험 72 증가 부모 자식 간에는 유전자 뿐만 아니라 생활방식과 환경을 공유하기 때문에 부모 치매가 자녀 치매 발병 위험을 높일 수 있습니다. 건승하세요.

모르고 오래된 생리대 사용했는데 병원 가봐야 하나요?,안녕하세요. 요약 1. 아무 증상 없으면 안 가도 됩니다. 2. 다른 13년된 남은 생리대를 확인해 보세요 3. 13년 되어도 성분이나 구조물들이 고스란히 그대로 있기도 합니다. 4. 질 자극 증상이나 냉이 나오면서 냄새가 나면 그때 고민해 보세요 건승하세요.

폐암 객혈량 질문,안녕하세요. 요약 1. 객혈양으로 폐암을 의심할 수는 없습니다. 2. 아래 처럼 적게 나오기도 하고 많이 나오기도 합니다. 기침과 함께 혈액이 섞인 가래가 나오는 것을 객혈 이라고 합니다. 적은 양의 객혈이 반복된다면 폐암 기관지확장증 승모관협착증 반복성 폐경색증 등의 가능성이 있습니다. 고름 성분이 많은 객담이 객혈과 함께 나오는 경우 폐렴 기관지확장증 폐농양 등의 가능성이 높습니다. 객혈의 양이 많은 경우 폐결핵 괴사성 폐렴 기관지확장증 폐암 등을 의심해 볼 수 있습니다. 건승하세요.

거품뇨 이거 심각한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 거품뇨가 있으면 단백뇨나 당뇨가 있을 수 있지만 거품뇨 자체가 아무 이상없이도 나타날 수 있습니다. 소변검사로 확인해보셔요

족배동맥 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사람마다 동맥의 모양이 조금 다를 수 있습니다. 일단 동맥경화도 검사에서 이상이 없으셨다고 하니 안심하셔도 됩니다

생식기음낭 주위 좁쌀처럼 생긴것들 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 정상 모낭으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

보톡스가 1년넘게 안풀리면 받는 주사약물은 무슨 약물인가요?,안녕하세요 요약 1. 보톡스는 해독주사는 따로 없습니다. 2. 각 부위별 부작용이 생기면 그에 맞는 다른 시술을 해 줄수는 있습니다. 이마나 미간 보톡스후 눈꺼풀이 처짐이 생기면 수개월을 기다려야 회복이 될 수 있는데 실리프팅을 이용한 킥눈썹리프팅을 이용해 눈꺼풀 처짐을 개선시키고 눈이 무거운 증상이나 눈썹이 떨어지는 증상을 바로 개선시킬 수 있습니다. 건승하세요

명치에서 두두두두 떨림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위장약 진경제를 먹어도 진전이 없다면 부정맥에 의한 증상일 수 있습니다. 스트레스나 긴장에 의한 신경과민으로도 나타날 수가 있는데요. 부정맥 병력특발성 심실빈맥도 있으니 순환기내과 진료를 받아보시는게 좋겠습니다.

귀에서 소리가 납니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 턱관절의 인대가 부딪히면서 나는 잡음 일 수도 있고 이명일 수도 있습니다. 목과 턱관절을 움직일때혹은 하품할때 소리가 난다면 인대 마찰음의 가능성이 많고 가만히 있는데 소리가 나는 것이라면 이명의 일종으로 보입니다. 두 경우 모두 시간이 걸리기는 하지만 치료는 가능합니다. 가까운 한의원에 내원하셔서 상담받아보시길 바랍니다.

뇌출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌진탕시 후유증으로 몇달 지속될 수 있습니다. 두통 어지럼증 기억력저하 집중력 저하 등등.. 하지만 말이 어눌해지거나 힘이 빠지는 증상이 있다면 신경과 방문하여 뇌영상검사를 받아보시는게 좋겠습니다.

선생님,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 hiv감염에 대한 경험이 많지 않아서 특이한 경우까지는 알지 못합니다. 초기에는 나타나지 않기도해서 추적검사를 하는것으로 알고 있습니다

기관제 확장제 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 렐100엘립타는 스테로이드 성분과 beta agonist라는 기관지확장약물이 섞여있는 제제입니다. 천식으로 사용 중이시라면.. 증상이 경미할때 스테로이드 성분을 뺀 기관지확장제로 변경 가능합니다.

발가락에 무좀이 있는데 발가락 옆면이 변색됐는데 이거 괜찮은거 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각질의 상태로 보아 족부 무좀 즉 백선에 대한 적극적인 치료를 고려해야 하며 연고제재로 호전이 더디다면 경구 항진균제 복용을 고려해야 합니다.

20대 여자 AMH검사 결과 1.12ngml,안녕하세요. 메디이즈입니다. AMH수치가 13사이이면 난소기능이 양호한편에 속하는데 1.12이면 그중에서 하단에 위치하고 있네요. 난소 하나가 부족함에도 40대 정도의 난소기능을 가지고 있다고 할 수 있겠네요. AMH수치는 낮은편이지만.. 난소 하나만 있는 것을 고려할때 비교적 양호하신 편인 것 같습니다.

단순 점인지...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이게 혹시 뭔가요 곤지름인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이 두드러기 왜난걸까요???,안녕하세요. 요약 1. 두드러기 맞습니다. 2. 원인은 본인도 모르면 병원에서도 모를 겁니다. 두드러기는 피부나 점막에 존재하는 혈관의 투과성이 증가되면서 일시적으로 혈장 성분이 조직 내에 축적되어 피부가 붉거나 흰색으로 부풀어 오르고 심한

가려움증이 동반되는 피부질환인데 곤충 자상 음식물 알레르기 약물 감염 기계적물리적 자극 등의 여러 가지 원인과 기전에 의해 발생하는데 대부분 원인을 모르는 경우가 더 많을겁니다. 안녕하세요

이거 매독인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한포진 등 단순 피부 병변으로 판단되며 성병으로 인해 발생하는 전형적인 피부 병변은 아닌 것으로 판단됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이거 매독인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한포진 등 단순 피부 병변으로 판단되며 성병으로 인해 발생하는 전형적인 피부 병변은 아닌 것으로 판단됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

단순 점인지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

이거 피부염인가요? 아니면 매독인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한포진과 같은 피부 질환으로 보이면 매독 등이 성병으로 인해 발생하는 특징적인 발진의 양상을 보이지 않습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

항체,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 감염이 되었다면 생기지 않는 경우는 없습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

흑변 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 섭취한 음식물에 의해 검은색 변을 보았을 수도 있지만 흑색변이 지속된다면 위장관 출혈에 대한 평가가 필요합니다. 따라서 상부 위장관 내시경 검사가 가능한 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다.

과식 후 심박수 90100이 나오는데 괜찮은 건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식하시면 심박수가 오를 수 있습니다. 지금 심박수는 크게 문제는 없는 것으로 생각됩니다. 적정체중을 유지하시면 좋을것 같습니다

잡은 자위로 인한 피부염일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 예 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

그냥 일시적인 어지럼증이였을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 안구주변이나 후두엽 또는 전정기관 등의 순환장애로 비슷한 증상이 나타날 수 있다고 봅니다. 일회성의 증상은 진단과 치료가 어려우므로 병원을 가보실 필요는 별로 없습니다.

병원에 가니 항문 모낭염 같다고하는데...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 평소 하던대로 하면 되고 더 튀어 나오거나 발적 종창 등이 있으면 모낭염으로 진행할 수 있습니다. 모공성 각화증은 오래된 피부세포가 정상적으로 탈락하지 못하고 표피 내로 들어가 모공의 출구를 막음으로써 모공이 커져서 오돌도돌 닭살처럼 보이는 질환입니다. 비만한 사람 아토피 피부염이 있는 사람 피부가 건조한 사람에게 많이 생기는데 가려움증이 생기며 심하게 긁으면 모공이 도드라지고 오돌도돌해지면서 더 올라오게 됩니다. 건승하세요

안녕하세요 선생님 주사바늘에 찔린 자국인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 피부염으로 보입니다. 주사 바늘에 찔린 상처 등으로 보기는 어렵습니다. 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

거품뇨 이거 심각한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 거품뇨가 있으면 단백뇨나 당뇨가 있을 수 있지만 거품뇨 자체가 아무 이상없이도 나타날 수 있습니다. 소변검사로 확인해보셔요

선생님 신장 수치 결과 좀 봐주세요,안녕하세요 요약 아래 사이트에서도 확인해 보세요 정상 콩팥은 1분에 혈액 90120mL를 걸러내므로 사구체여과율의 정상 범위는 90120mL/min 1.73m 입니다. 사구체여과율은 나이와 체격 근육 량에 따라 차이가 있습니다. 제1기 90 제2기 60 89 제3기 30 59 제4기 15 29 제5기 15 입니다.
<https://m.ksn.or.kr/general/aboutcheck.php> 건승하세요

혈뇨가 있다고해요,안녕하세요. 요약 1. 혈뇨는 대학병원 소아청소년과와 소아신장분과에서 2. 정밀검사를 진행해 보세요 3. 언급한 과거 상황은 현재 혈뇨에는 영향이 없습니다. 건승하세요.

입술 주변 열상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에서 직접 상태를 보고 다시 조언을 얻으세요 건승하세요.

음모 모낭염인가요이거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

안녕하세요,안녕하세요 요약 1. 구강성교 하다가 서로 입을 물고 빨고 하면 2. 성기에 묻어 있던 침이나 질 분비물들이 입에서도 섞일 수 있습니다. 3. 입술을 안대고 보호한다면 질이나 성기에 묻어 있는 균이 들어갈 확률은 없을 겁니다. 건승하세요

소아 대장암이 흔하진 않죠..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소아 대장암은 성인 대장암에 비해 매우 드문 질환입니다. 발생 빈도는 전체 대장암의 약 1 미만으로 알려져 있습니다. 경과를 지켜보셔도 될것으로 생각됩니다

팔에 뭐가 자꾸 납니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 접촉성 피부염과 같은 알레르기 피부 질환 가능성이 높습니다. 병변의 호전이 없다면 피부과 내원하여 국소 스테로이드제제 사용을 고려해야 합니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 문제가 없었을 가능성이 높습니다 하지만 당분간은 자극은 피하시고 확인차 비뇨의학과를 방문하십시오 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 없고 음경에 부종이나 발적이 없다면 손상이 발생하였을 가능성은 없다고 보아도 됩니다. 크게 걱정하지 않아도 되겠습니다.

발가락에 무좀이 있는데 발가락 옆면이 변색됐는데 이거 괜찮은거 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각질의 상태로 보아 족부 무좀 즉 백선에 대한 적극적인 치료를 고려해야 하며 연고제재로 호전이 더디다면 경구 항진균제 복용을 고려해야 합니다.

같은 자리에 구내염이 재발하면 위험한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 구내염의 재발은 흔하게 있어 크게 문제가 되지 않으며 구강 궤양의 형태로 반복된다면 이에 대한 평가가 필요합니다.

이거 매독인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한포진 등 단순 피부 병변으로 판단되며 성병으로 인해 발생하는 전형적인 피부 병변은 아닌 것으로 판단됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

기관제 확장제 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 렐100엘립타는 스테로이드 성분과 beta agonist라는 기관지확장약물이 섞여있는 제제입니다. 천식으로 사용 중이시라면.. 증상이 경미할때 스테로이드 성분을 뺀 기관지확장제로 변경 가능합니다.

단순 점인지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료

를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

단순 점인지...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

흑변 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 섭취한 음식물에 의해 검은색 변을 보았을 수도 있지만 흑색변이 지속된다면 위장관 출혈에 대한 평가가 필요합니다. 따라서 상부 위장관 내시경 검사가 가능한 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다.

이거 매독인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한포진 등 단순 피부 병변으로 판단되며 성병으로 인해 발생하는 전형적인 피부 병변은 아닌 것으로 판단됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이게 혹시 뭔가요 곤지름인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

항생제 관련 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 노믹스가 원래 충분한 효과를 보려면 최소 두알 세번정도는 드셔야 하는데 우리나라는 보험에서 용량을 정해놔서 그렇게 복용은 어렵습니다. 걱정안하셔도 됩니다

안녕하세요 증상 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈장은 일반반적을 잘 생기는 부위가 정해져 있습니다 지금 복부가 튀어나오는 부분은 아마도 탈장은 아닐 것 같습니다. 진료 한번 받아보셔요

잡은 자위로 인한 피부염일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 예 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

단순 점인지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

곤지름일까요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진 소견상 곤지름의 가능성으로 비뇨기과나 피부과에서 정확한 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?vijQSnZDkic>

곤지름,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성으로 비뇨기과나 피부과에서 정확한 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?vijQSnZDkic>

곤지름일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 산부인과나 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?vQvj63ROgFyw>

이거 피부염인가요? 아니면 매독인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한포진과 같은 피부 질환으로 보이면 매독 등이 성병으로 인해 발생하는 특징적인 발진의 양상을 보이지 않습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

과식 후 심박수 90100이 나오는데 괜찮은 건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식하시면 심박수가 오를 수 있습니다. 지금 심박수는 크게 문제는 없는 것으로 생각됩니다. 적정체중을 유지하시면 좋을것 같습니다

항체,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 감염이 되었다면 생기지 않는 경우는 없습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

찾은 자위로 인한 피부염일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 예 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

항문 성교,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 치열 치질 증상으로 외과 오셔서 검사 치료하세요. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

오줌줄기가 많이 약해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 많지 않아 전립선 질환 가능성은 높지 않고 방광 기능의 문제일 수 있어 불편감이 있다면 비뇨의학과 진료를 권해드립니다.

곤지름일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 산부인과나 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?vQvj63ROgFyw>

과식 후 심박수 90100이 나오는데 괜찮은 건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식하시면 심박수가 오를 수 있습니다. 지금 심박수는 크게 문제는 없는 것으로 생각됩니다. 적정체중을 유지하시면 좋을것 같습니다

선생님,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 hiv감염에 대한 경험이 많지 않아서 특이한 경우까지는 알지 못합니다. 초기에는 나타나지 않기도해서 추적검사를 하는것으로 알고 있습니다
소아 대장암이 흔하진 않죠..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소아 대장암은 성인 대장암에 비해 매우 드문 질환입니다. 발생 빈도는 전체 대장암의 약 1 미만으로 알려져 있습니다. 경과를 지켜보셔도 될것으로 생각됩니다

20대 여자 AMH검사 결과 1.12ng/ml,안녕하세요. 메디이즈입니다. AMH수치가 13사이이면 난소기능이 양호한편에 속하는데 1.12이면 그중에서 하단에 위치하고 있네요. 난소 하나가 부족함에도 40대 정도의 난소기능을 가지고 있다고 할 수 있겠네요. AMH수치는 낮은편이지만.. 난소 하나만 있는 것을 고려할때 비교적 양호하신 편인 것 같습니다.

명치에서 두두두두 떨림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위장약 진경제를 먹어도 진전이 없다면 부정맥에 의한 증상일 수 있습니다. 스트레스나 긴장에 의한 신경과민으로도 나타날 수가 있는데요. 부정맥 병력특발성 심실빈맥도 있으니 순환기내과 진료를 받아보시는게 좋겠습니다.

두통과 어지러움 설사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약국에서 약 사서 드시는 것보다 비대면 진료라도 받아보셔요. 속이 편해지고설사가 멈출때까지는 식사는 하지말고 물 1L 소금 찻수저로 1 설탕 찻수저로 8 오렌지쥬스 1잔 이렇게 타서 드셔보셔요. 두통은 아세트아미노펜 드시면 됩니다

뇌출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌진탕시 후유증으로 몇달 지속될 수 있습니다. 두통 어지럼증 기억력저하 집중력 저하 등등.. 하지만 말이 어눌해지거나 힘이 빠지는 증상이 있다면 신경과 방문하여 뇌영상검사를 받아보시는게 좋겠습니다.

항문 곤지름콘딜로마 수술 후 사진입니다 확인해주시면 감사하겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름 전문 진료를 하고 있는 의사입니다. 사진을 올려주셨는데요. 사진 상에 보

이는 병변이 치료 후 남은 탈락을 앞둔 조직인지 미처 제거하지 않은 곤지름인지는 확실치 않습니다. 2주 이상 지나서 아물고 난 후 다시 진료를 받아보시기 바랍니다. 그때 항문안쪽까지 꼭 확인받으시기 바랍니다. 건강하세요.

기관제 확장제 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 렐100엘립타는 스테로이드 성분과 beta agonist라는 기관지확장약물이 섞여있는 제제입니다. 천식으로 사용 중이시라면.. 증상이 경미할에 스테로이드 성분을 뺀 기관지확장제로 변경 가능합니다.

대장내시경 치질 관련해서질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장내시경시 항문을 관찰하지만 이미 진정제 등에 의해 괄약근이 이완되어 있는 상태로 경미한 치핵이나 치열은 관찰되지 않는 경우도 있습니다.

안과 정기검진,안녕하세요 요약 황반변성이 있는지 확인해 보세요 황반변성 진단은 안저망막 검사 형광안저촬영 빛간섭단층촬영 등을 통해 이루어집니다. 황반변성의 주 증상은 글자가 뭉개져 보이거나 직선이 휘어 보이는 변시증이 생깁니다. 황반변성 초기에는 컨디션이 좋지 않은 날에 시력이 떨어졌다가 컨디션이 좋으면 시력이 회복되며 건성 황반변성은 별다른 증상이 없거나 있더라도 중심 시야가 약간 흐릿하지 않은 정도이며 좀 더 진행되면 욱실 타일이나 건물 등의 선이 휘어 보이게 됩니다. 더 진행하면 글자에 공백이 생기거나 중심 부분이 지워진 것처럼 보이지 않게 됩니다. 건승하세요

곤지름,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성으로 비뇨기과나 피부과에서 정확한 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=yijQSnZDkic>

곤지름 있으면 브라질리언 왁싱 하면 안되나요?,안녕하세요 요약 1. 곤지름이 남아 있으면 2. 언급한 것처럼 긁고 비비고 하다 주변 부위로 변질 수는 있습니다. 3. 건드려서 터트리면 문제가 됩니다. 4. 제대로 제거 한 후 하는게 좋습니다. 건승하세요.

조영제가 인지기능에 영향을 줄수 있나요?,안녕하세요 요약 1. 조영제가 인지기능에 영향을 주지 않습니다. 2. 인지기능이 떨어졌다면 3. 신경과에서 원인 질환이 생겼는지 4. 인지 기능에 정말 문제가 있는지 부터 확인해 보세요 건승하세요

항문 곤지름 성관계 전염성,안녕하세요. 요약 1. 곤지름의 바이러스는 전염이 됩니다. 2. 항문을 완전 밀봉한 상황이 아니라면 3. 피부 접촉이나 체액들이 섞이면서 전염이 될 수는 있습니다. 건승하세요

귀밑에 튀어나온거 멍울인가요?,안녕하세요 요약 1. 멍울은 좀 더 깊은 피하지방 아래 있습니다. 2. 저 사진은 그냥 피부와 피하지방입니다. 3. 특별한 증상이 없으면 그냥 놔두면 되고 4. 발적 종창 통증이 생기면 재평가가 필요합니다. 건승하세요

췌장암일 가능성이 있을까요?,안녕하세요 요약 1. 아래 증상이 있는지 비교해 보세요 2. 작년 7월이랑 증상이 비슷하면 괜찮은데 3. 없던 증상이 생겼으면 추적 검사를 해 보세요 췌장암에서 가장 흔히 나타나는 증상은 복통이며 황달 식욕 감소 체중 감소 등의 증상도 있습니다. 췌두부암인 경우에는 대부분 황달이 나타나며 췌장의 체부와 미부에 발생하는 췌장암은 초기에 거의 증상이 나타나지 않아 시간이 지나서 발견되는 경우가 많습니다. 이외에 지방의 불완전한 소화로 인해 기름진 변의 양상을 보이는 지방변 또는 회색변 식후 통증 구토 오심 등의 증상이 있을 수 있습니다. 건승하세요

항문 뭉가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 우선 항문 피부꼬리 즉 철퍼로 보입니다. 이런 철퍼는 따로 불편한 증상이 없다면 굳이 치료는 필요없는 상황이지만.. 철퍼의 원인이 치열이나 기존의 심했던 치질로 인해 발생하고 불편 증상이 지속된다면 철퍼 치료뿐 아니라 원인

이 되는 치열 치질에 대한 치료도 같이 병행을 해야 합니다. 현재 주변 피부 상태도 태선이 동반된 건조한 피부가 보이는 것으로 보아 가려움증이 있지 않을까 싶은데.. 이런 가려움증도 철퍼치질이 그 원인이 될 수 있기에 가려움증이 많다면 대장항문외과에 가서서 직접 상담 및 이에 대한 치료 상담을 한번 받아보시는 것도 좋겠습니다. 감사합니다.

성기를 세게 잡으면 문제가될까요?,안녕하세요 요약 1. 세게 잡았어도 2. 발기 잘되고 3. 발기 잘될때 통증이 없으면 괜찮습니다. 4. 보통 본인이 스스로 세게 잡는 건 아파서 한계가 있습니다. 건승하세요

항문 안쪽위 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 좀 모호하기는 하지만 항문주위농양이 있을 때 발생할 수 있는 증상으로 확인이 필요하겠습니다. 농양이 피부 가까이에 있으면 통증이 심하지만 안쪽 깊이 위치한 경우엔 오히려 통증이 덜 해서 진단이 늦어지는 경우가 있습니다. 감기 몸살처럼 근육통이나 오한 발열이 동반되는 경우도 있습니다. 가까운 항문외과에 가서서 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

안과 검사 질문,안녕하세요 요약 광각안저촬영입니다 광각안저촬영은 망막전체를 찍는 과정이며 동공을 확대하지 않은 상태에서 망막주변부까지 촬영이 가능하여 망막의 중심부인 황반부 뿐 아니라 망막주변부까지 하나의 화면에 담을 수 있습니다. 빛을 사용하여 찍는 카메라 타입이 아닌 레이저로 조사하여 스캔하는 방식이라 촬영시 눈부심이 거의 없습니다. 망막질환 진단 경과관찰 등을 위해 진행합니다. 망막 상황을 체크한 겁니다. 건승하세요

항문사진 주의 이 정도면 치질 몇기 정도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 튀어나와서 밀어넣지 않아도 들어가면 2도 밀어넣어야 들어가면 3도 입니다 밀어넣어도 안들어가면 4도 입니다. 약물치료도 고려할 수 있습니다

Hpv바이러스와 두드러기에 대해서 질문드립니다.,안녕하세요 요약 1. 그냥 벌레에 물렸거나 긁어서 만든 접촉성피부염입니다. 2. HPV 인유두종바이러스와는 관련이 없습니다. 3. 지금상태에서 안 건드리고 놔둬도 좋아질 수 있습니다. 건승하세요

항문 옆 종기?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 치루나 농양은 아닌듯 한데요. 종기같은 것이 의심됩니다. 손대지 말고 경과를 지켜보시다가 커지거나 하면 진료 받아보셔요

치질 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문에 돌출된 부분이 들랑 달랑 하면서 출혈이 있는 것으로 미루어보면 내치질이 아닌가 생각됩니다. 좌욕을 열심히 하시고 진료 받아보셔요

항문 주위에 뭐가 낫는데...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 선명하지 않아서 정확한 답변은 어렵습니다. 갑자기 생기고 통증이 있는 것으로 미루어 외치질에 혈전이 생긴것이 아닌가 싶습니다

항문 곤지름,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문 곤지름 재발할 때마다 입원하지 않고 부분 마취 후에 레이저 소작술로 제거하는 경우도 많습니다.. 항문 내시경은 안해도 됩니다.

안심해도 되는 것인지 다시 검사를 받아야되는 것인지 알려주세요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 안심하시고 피부과 진료만 받으심이 좋을 듯 합니다. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

치질과 항문거근증의 차이가 뭔가요? 제가 어떤상황인지 알고싶어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 항 외과 오셔서 대장내시경 검사 부터 차근 차근 받아보심이

좋을 듯 합니다. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

치루 세톤수술 받고 3일 지났습니다 질문..안녕하세요. 메디이즈입니다. 세톤을 느슨하게 묶어 두면 빙빙 돌아 갈 수 있습니다. 매듭때문에 아프다고 말씀 드리면 조치를 취해 주실 것으로 생각됩니다. 큰 문제가 되지는 않으니 걱정은 하지 않으셔도 되겠습니다. 감사합니다.

에이즈 포비아,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 감염내과 진료를 받아 보심이 좋을 듯 합니다. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

가슴 두드러기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부병변만 가지고 aids를 알기는 어렵습니다. 의심되는 관계가 있었다고 하면 검사를 통해서 확인 해보시는 것이 좋겠습니다.

항문 상태와 대변의 형태 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 수술을 받은 기왕력이 있으신다면 항문 관의 모양이 변형될 수 있습니다. 2. 그 이후 치질이 재발했다면 항문관 모양에 영향을 줄 수 있습니다. 항외과 오셔서 상담 해보세요.

항문 상태와 대변의 형태 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 항문관을 다각도로 관찰 할 수 있는 직장 항문 초음파 권해드립니다. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

몸 가려움과 항문쪽 에 이상한거 보이는데 기생충인가요?,안녕하세요. 요약 1. 곤지름은 아니고 2. 병원에서 기생충 알인지 검사를 해 보세요 3. 기생충 자체가 아니라 알을 까면서 기생충이 피부를 뚫기 때문에 가려울 수 있습니다. 건승하세요

변비가 치료됐다고 판단하는 기준이 뭔가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 쾌변을 보시면 변비 증상이 완전히 좋아졌다고 볼 수 있습니다. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

외치핵수술후 둥근 붓기덩어리? 생겼어요,안녕하세요 요약 1. 수술하거나 치핵이 있으면 2. 항문 주위에 임파선이 둥글게 부을 수 있고 3. 덩어리가 항문 주변으로 왔다 갔다 할 수 있습니다. 4. 일부러 막 건드리진 마세요. 수술 부위가 회복되면 같이 회복됩니다. 건승하세요

항문 성교,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 치열 치질 증상으로 외과 오셔서 검사 치료하세요. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

항생제 관련 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 노믹스가 원래 충분한 효과를 보려면 최소 두알 세번정도는 드셔야 하는데 우리나라는 보험에서 용량을 정해놔서 그렇게 복용은 어렵

습니다. 걱정안하셔도 됩니다

발치와 건강상태빠른답변감사합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아래 어금니 발치를 해야 하는데 건강상태및 컨디션이 아주좋지는 않습니다. 이럴경우는 나중에 발치를 해야하나요? 당뇨약도 복용합니다. 크라운이벗겨져서 안에 이가 보이는상태로 신경치로는 했습니다. 예전에 당뇨약 복용 중이시라면 감염 등에 취약할 수 있습니다. 내과 원장님과 미리 상담을 한번 받아보시구요 조절이 되신다면 발치는 큰 문제는 없으실 듯 합니다.

소아 대장암이 흔하진 않죠..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소아 대장암은 성인 대장암에 비해 매우 드문 질환입니다. 발생 빈도는 전체 대장암의 약 1 미만으로 알려져 있습니다. 경과를 지켜보셔도 될것으로 생각됩니다

곤지름일까요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진 소견상 곤지름의 가능성으로 비뇨기과나 피부과에서 정확한 치료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=ijQSnZDkic>

외치핵수술후 둥근 붓기덩어리? 생겼어요,안녕하세요 요약 1. 수술하거나 치핵이 있으면 2. 항문 주위에 임파선이 둥글게 부을 수 있고 3. 덩어리가 항문 주변으로 왔다 갔다 할 수 있습니다. 4. 일부러 막 건드리진 마세요. 수술 부위가 회복되면 같이 회복됩니다. 건승하세요

변비가 치료됐다고 판단하는 기준이 뭔가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리기는 100 어렵습니다. 궤변을 보시면 변비 증상이 완전히 좋아졌다고 볼 수 있습니다. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

흑변?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 섭취한 음식물에 의해 검은색 변을 보았을 수도 있지만 흑색변이 지속된다면 위장관 출혈에 대한 평가가 필요합니다. 따라서 상부 위장관 내시경 검사가 가능한 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다.

1cm2cm 정도 상처난 곳에 혈액형이 다른 타인의 피가 들어온다면 어떻게 되나요??,안녕하세요 요약 1. 응고 됩니다. 2. 다만 상처난 곳에 응고되어 본들 내 몸에 지장은 없습니다. 3. 피가 응고 되니 더 들어가지도 않습니다. 4. 문제가 되는 건 혈관 내에서의 조우입니다. 건승하세요

대상포진인가요?,안녕하세요 요약 1. 대상포진 아닙니다. 2. 긁어서 만든 부스럼입니다. 접촉성피부염에서 연조직염으로 진행되는 단계이니 3. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원에서 치료하면 이번주 내에 다 나을 겁니다. 건승하세요

한쪽 편도가 커진지 2년이 지났습니다,안녕하세요 요약 1. 커졌는데 단순 비대면 걱정할 필요 없습니다. 2. 다른 부위에서 전이된 암의 일부이거나 임파선염이 아닌 다른 질환인지 감별해 보시고 3. 단순 비대면 그냥 지켜 봐도 됩니다. 4. 내 면역조직이 같은 부위를 외부 바이러스나 세균에 의해 계속 때려 맞다 보면 적응하느라 커지기도 합니다. 건승하세요

이거 빈대나 옴 증상인가요??,안녕하세요 요약 1. 빈대 옴 아니고 2. 긁어서 만든 부스럼입니다. 접촉성피부염에서 연조직염으로 진행되는 단계이니 3. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원에서 치료하면 이번주 내에 다 나을 겁니다. 건승하세요

탄뚱가글 후 항생제 약 복용가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가글의 유무와 약 복용은 서로 영향을 미치지 않습니다. 가글을 했더라도 항생제를 복용하는 데는 아무런 문제가 되지 않습니다.

생식기음낭 주위 좁쌀처럼 생긴것들 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 정상 모낭으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

귀에서 소리가 납니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 턱관절의 인대가 부딪히면서 나는 잡음 일 수도 있고 이명일 수도 있습니다. 목과 턱관절을 움직일때혹은 하품할때 소리가 난다면 인대 마찰음의 가능성이 많고 가만히 있는데 소리가 나는 것이라면 이명의 일종으로 보입니다. 두 경우 모두 시간이 걸리기는 하지만 치료는 가능합니다. 가까운 한의원에 내원하셔서 상담받아보시길 바랍니다.

코피가 아주 조금 나는데 문제가 있진 않을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잦은 코피 멈추지 않는 코피가 아니라면 코점막의 건조화로 인한 것으로 보입니다. 심각한 정도는 아니나 질문자분의 나이와 비교한 건강상태로 보아 혈압 관리가 필요할 것으로 보입니다. 일상생활 속의 건강한 습관들이 적당히 나는 정도의 운동 신선한 채소 비중을 높힌 식사를 익히시길 바랍니다.

귀에서 소리가 납니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 턱관절의 인대가 부딪히면서 나는 잡음 일 수도 있고 이명일 수도 있습니다. 목과 턱관절을 움직일때혹은 하품할때 소리가 난다면 인대 마찰음의 가능성이 많고 가만히 있는데 소리가 나는 것이라면 이명의 일종으로 보입니다. 두 경우 모두 시간이 걸리기는 하지만 치료는 가능합니다. 가까운 한의원에 내원하셔서 상담받아보시길 바랍니다.

이러한 이유들 때문에 탈모나 두피염이 생길수 있나요? 글이 좀 깁니다 다 읽어주신후 진심어린답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 날파리가 두피에 들어가고 콘돔 만진 손으로 두피나 모발을 만졌다고 두피염이나 탈모가 생길 가능성은 거의 없으니 걱정하지 않아도 됩니다. 두피염은 손으로 만지거나 접촉한 것 보다 전체적인 몸의 컨디션수면 패턴 스트레스 정도...이나 환경이나 계절의 변화 같은 요소의 영향을 받을 수 있습니다. 공부하면서 스트레스 받고 수면이 부족하면 두피염이 생길 수 있으나 가벼운 두피염이 탈모의 원인이 되지는 않습니다. 질문하신 내용은 모두 아무 신경 쓰지 않아도 되는 것들이니 서로 연관 지어서 인과 관계를 생각하지 말고 두피에 염증이나 트러블이 있으면 피부과에 가서 진료 보시고 모발이 많이 빠지거나 어느 부위가 비어 보이면 탈모가 있는지 진료 보시면 됩니다. 감사합니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 상관없습니다 2. 관련없습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

손가락 신경이나 인대 등의 문제가 있는 상황인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떻게 다치신것인가요? 지금 상처부위만 본다고 하면 손가락을 펴는데 문제가 되는 인대나 신경의 손상이 의심되지는 않습니다

이게 뭡까요?,안녕하세요 요약 1. 점액낭종입니다. 2. 물론 사진처럼 낭종에 피가 고일수도 있습니다. 3. 큰병은 아니고 계속 그대로거나 점점더 커지면 병원에서 제거를 해야 합니다. 4. 매독 아닙니다. 점액낭종은 침 같은 점액이 고인 물혹입니다. 침샘에서 침이 만들어지면 입안으로 분비되어 나와야 하는데 침이 나오는 구멍이나 관이 막히면 침이 제대로 나오지 못하고 점막 아래에 물혹 모양으로 고이게 됩니다. 침이 나오는 길이 막히는 이유는 염증이나 작은 상처 때문이며 입이 건조할 경우 더 잘 생길 수 있습니다. 대부분의 작은 점액낭종은 간단한 수술로 제거가 가능합니다. 건승하세요

구내염인가요?수족구수포인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 곳에 병변이 없다고 하면 사진 속의 소견은 수족구 수포보다는 구내염으로 인한 입술궤양 소견으로 판단됩니다.

제균치료 약 복용후 뭐 먹어도 상관없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헬리코박터 파일로리 제균치료 약 복용 중에는 다음과 같은 점에 유의하는 것이 좋습니다 의사 지시에 따른 식사 특별한 제한 식단이 필요한 경우 의사의 지시를 따르는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 정상적인 식사를 해도 무방합니다. 자극적인 음식 피하기 매운 음식 카페인 알코올 등 자극적인 음식과 음료는 위장을 자극할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다. 유제품 섭취 주의 항생제 복용 시 유제품과 함께 섭취하면 약물 흡수에 영향을 줄 수 있습니다. 약 복용 전후 2시간 정도는 유제품 섭취를 피하는 것이 좋습니다. 충분한 수분 섭취 약물 복용 시 충분한 물을 마시는 것이 좋습니다. 수분 섭취는 약물의 흡수와 배설을 도와줍니다. 프로바이오틱스 고려 항생제 복용으로 인해 장내 유익균이 감소할 수 있습니다. 프로바이오틱스 섭취는 장내 균형을 돕는 데 도움이 될 수 있습니다.

1cm2cm 정도 상처난 곳에 혈액형이 다른 타인의 피가 들어온다면 어떻게 되나요??.안녕하세요 요 약 1. 응고 됩니다. 2. 다만 상처난 곳에 응고되어 본들 내 몸에 지장은 없습니다. 3. 피가 응고 되니 더 들어가지도 않습니다. 4. 문제가 되는 건 혈관 내에서의 조우입니다. 건승하세요

변비가 치료됐다고 판단하는 기준이 뭔가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 현재 환부의 병소나 병변을 관찰을 할 수 가 없어 정확하고 좋은 답변을 드리는는 100 어렵습니다. 궤변을 보시면 변비 증상이 완전히 좋아졌다고 볼 수 있습니다. 쾌유하시길 기원드립니다. 한없이 부족한 답변이지만 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.환절기에 감기 조심하시고 오늘도 좋은 하루 되세요

골다공증 문의드립니다,안녕하세요 요약 1. 골다공증 치료 중이라면 10001500mg 정도의 칼슘섭취가 필요합니다. 2. 예방적 차원에서 먹는 것이기 때문에 현재 수치가 병적으로 낮으면 용량을 더 올릴 수 있는 겁니다. 3. 칼슘제와 비타민제를 권장량 수준으로 잡으시면 됩니다. 4. 일부러 따로 이상한 영양제만 추가 안 하면 됩니다. 칼슘의 섭취는 정상성인의 경우 하루 700mg이상 청소년은 800900mg정도를 권장하며 임신부나 수유부는 10001100mg 골다공증이 있거나 폐경전후에는 10001500mg정도를 권장합니다. 건승하세요

안과 검사 질문,안녕하세요 요약 광각안저촬영입니다 광각안저촬영은 망막전체를 찍는 과정이며 동공을 확대하지 않은 상태에서 망막주변부까지 촬영이 가능하여 망막의 중심부인 황반부 뿐 아니라 망막주변부까지 하나의 화면에 담을 수 있습니다. 빛을 사용하여 찍는 카메라 타입이 아닌 레이저로 조사하여 스캔하는 방식이라 촬영시 눈부심이 거의 없습니다. 망막질환 진단 경과관찰 등을 위해 진행합니다. 망막 상황을 체크한 겁니다. 건승하세요

대상포진인가요?,안녕하세요 요약 1. 대상포진 아닙니다. 2. 긁어서 만든 부스럼입니다. 접촉성피부염에서 연조직염으로 진행되는 단계이니 3. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원에서 치료하면 이번주 내에 다 나을 겁니다. 건승하세요

이거 빈대나 옴 증상인가요??.안녕하세요 요약 1. 빈대 옴 아니고 2. 긁어서 만든 부스럼입니다. 접촉성피부염에서 연조직염으로 진행되는 단계이니 3. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원에서 치료하면 이번주 내에 다 나을 겁니다. 건승하세요

한쪽 편도가 커진지 2년이 지났습니다,안녕하세요 요약 1. 커졌는데 단순 비대면 걱정할 필요 없습니다. 2. 다른 부위에서 전이된 암의 일부이거나 임파선염이 아닌 다른 질환인지 감별

해 보시고 3. 단순 비대면 그냥 지켜 봐도 됩니다. 4. 내 면역조직이 같은 부위를 외부 바이러스나 세균에 의해 계속 때려 맞다 보면 적응하느라 커지기도 합니다. 건승하세요

외치핵수술후 둥근 붓기덩어리? 생겼어요,안녕하세요 요약 1. 수술하거나 치핵이 있으면 2. 항문 주위에 임파선이 둥글게 부을 수 있고 3. 덩어리가 항문 주변으로 왔다 갔다 할 수 있습니다. 4. 일부러 막 건드리진 마세요. 수술 부위가 회복되면 같이 회복됩니다. 건승하세요
항생제 관련 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 노믹스가 원래 충분한 효과를 보려면 최소 두알 세번정도는 드셔야 하는데 우리나라는 보험에서 용량을 정해놔서 그렇게 복용은 어렵습니다. 걱정안하셔도 됩니다

성기를 세게 잡으면 문제가될까요?,안녕하세요 요약 1. 세게 잡았어도 2. 발기 잘되고 3. 발기 잘될때 통증이 없으면 괜찮습니다. 4. 보통 본인이 스스로 세게 잡는 건 아파서 한계가 있습니다. 건승하세요

Hpv바이러스와 두드러기에 대해서 질문드립니다.,안녕하세요 요약 1. 그냥 별레에 물렸거나 긁어서 만든 접촉성피부염입니다. 2. HPV 인유두종바이러스와는 관련이 없습니다. 3. 지금상태에서 안 건드리고 놔둬도 좋아질 수 있습니다. 건승하세요

공복에 아지로맥스정 복용한 것 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아맥스정은 음식물과 같이 복용하면 생체 이용률이 37 감소하는 것으로 알려져 있어 공복에 드시는 것이 유리합니다. 보통으로 많이 힘드셨겠네요. 위장보호하는 약이 있으면 추가로 드셔보셔요 위장출혈이 일어나거나 하지는 않을겁니다

양 팔에 투명하고 작은 수포같은게 생겼는데 뭔가요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모공성 각화증은 오래된 피부세포가 정상적으로 탈락하지 못하고 표피 내로 들어가 모공의 출구를 막음으로써 모공이 커져서 오토도톨 닭살처럼 보이는 질환입니다. 비만한 사람 아토피 피부염이 있는 사람 피부가 건조한 사람에게 많이 생기게 됩니다. 건승하세요

곤지름 재발 여부 판단 부탁드립니다.,안녕하세요 요약 1. 곤지름처럼 보이는 병변이 있으니 2. 치료가 제대로 된 것인지 남은 조직이 다시 자라고 있는 것인지 3. 치료 후 손상된 조직이 곤지름처럼 보이는지 4. 다시 기존 병원에서 확인해 보세요 건승하세요

샤워기 수압 눈꺼풀 질문입니다.,안녕하세요 요약 1. 눈꺼풀피부 탄력은 유전적 요인이 강하며 2. 병적 문제가 있지 않은 이상 3. 일시적인 자극으로는 눈꺼풀 근육과 인대에 영향을 주진 않습니다. 건승하세요

혈액검사 혈소판 수치가 증가되어 있는데 심각한 상황일까요?,안녕하세요 요약 1. 아주 높은 수치가 아니라서 2. 수주후 재검하여 변화 추이를 확인해 보세요 3. 아래와 같은 원인으로 수치가 증가할 수 있습니다. 혈소판 수치가 증가하는 경우는 감염 수술 염증 약물 등 여러 신체에 대한 자극에 의해 반응성으로 증가하는 2차성 혈소판 증가증이 있고 철결핍 용혈빈혈 무비증비장절제 암 만성 염증감염 결합조직병 측두동맥염 염증성장질환 결핵 약물 반응 이러한 원인 없이 골수 내에서 혈소판 생성이 자발적으로 증가하는 특발성 혈소판 증가증이 있습니다. 건승하세요

설염으로 인한...,안녕하세요 설염은 혀가 붓거나 표면에 하얀 막이 생길 수 있고 식사 시 통증이 느껴질 수 있으며 궤양이 생기면 통증은 더 심해집니다. 만약 궤양이 지속되고 잘 낫지 않는다면 설암인지 감별하기 위해 생검하여 조직검사를 해야 할 필요가 있습니다. 건승하세요

전형적인 공황증상이 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공황발작panic attack 이란 극심한 공포나 불편감이 갑자기 급증하여 몇 분 안에 정점에 도달하는 것을 말하며 이 기간 동

안 13개의 신체적 인지적 증상 중 4개 이상의 증상이 발생합니다. 1. 심계항진 가슴 두근거림 또는 가속된 심장 박동수 2. 발한 3. 떨리거나 후들거림 4. 숨이 차거나 답답한 느낌 5. 질식하는 느낌 6. 가슴의 통증이나 불편함 7. 메스꺼움 또는 복통 8. 어지럽거나 불안정하거나 현기증 또는 기절하는 느낌 9. 오한이나 열감 10. 감각이상 마비 또는 따끔거리는 느낌 11. 비현실감 현실이 아닌 것 같은 느낌 또는 이인증 자신과 동떨어져 있는 느낌 12. 통제력을 잃거나 미쳐가는 것에 대한 두려움 13. 죽음의 공포 이 중 4가지 이상 증상이 나타나고 있으니 공황발작으로 볼 수 있을 것 같습니다. 1회 발작 이후에 추가적인 공황발작 및 그에 대한 걱정이 지속되고 있는 것으로 보아 공황장애로 진단할 수 있을 것 같습니다. 갑상선기능항진이나 심폐장애 증상 등 내과적인 문제가 없다면 정신과 치료가 필요할 것으로 생각됩니다.

구내염설염 2주이상 지속되네요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 통증이 있는 구강 궤양이라고 하면 구내염의 가능성이 높으니 경과를 지켜보아도 괜찮을 것으로 판단 됩니다.

햇빛 눈부심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자외선 노출에 의한 눈에 안좋은 효과는 일반적으로 장기간의 노출이 축적되어 영향을 나타냅니다. 일회성의 노출로는 가시적인 영향은 없습니다 오늘 사랑니 뽑았는데 설신경 손상인가요?,안녕하세요 요약 1. 마취 다 풀리고 나서도 증상이 지속되는지 확인해 보세요 2. 대부분 반감기가 있으니 수일 이내에 정상화 될겁니다. 3. 정상화 안되면 미각 검사 가능한 병원에서 미각 테스트를 진행해 보세요 건승하세요

성기 귀두쪽 변색이됐어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 귀두쪽 좌우가 노란빛으로 변하고 갈색 반점이 생겼군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

생리 중 컨디션 난조,안녕하세요 요약 1. 생리전증후군인지 확인이 필요합니다. 2. 생리전이나 생리기간 동안 호르몬 검사도 진행해 보세요 생리전증후군 증상들은 월경 시작 전 12주 정도의 기간 동안 나타날 수 있으며 월경이 시작하면 일반적으로 사라집니다. 생리전증후군의 증상은 신체적 증상 가슴의 부종과 민감함 복부 부기 복통 두통 또는 기타 신경통 근육통 오심 또는 구토 변비 또는 설사 정서적 증상 감정적 불안 우울감 불만족감 쉽게 기분이 상하거나 기분 변화가 큼 자극적이고 초조함 감정적으로 민감하거나 눈물이 나기 쉬움 등의 증상이 나타납니다. 건승하세요

항생제 관련 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 리팍민의 경우 2정씩 처방되는 경우도 있습니다 용량에 대해서는 너무 염려하지 않으셔도 됩니다 그리고 항생제 내성은 복용하는 환자가 아니라 세균이 가지는 내성입니다 적은 양을 복용하거나 임의대로 일수를 적게 복용했을 때 나타날 수 있는 위험성이니 내성에 대해서는 걱정하지 않으셔도 됩니다 부작용에 대해 말씀하셨는데 항생제다 보니 과량으로 먹으면 장내 세균총이 더 망가질 수 있고 위장장애가 생길 수 는 있습니다 하지만 체내에 흡수되는 양이 극히 적은 약물이기때 걱정하지 않으셔도 됩니다. 감사합니다

이증상 모낭염인가요 헤르페스인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 털이 나는 곳에만 염증이 생겼군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 한번 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

귀두가 변색됐어요... 왜이러죠?.,안녕하세요. 요약 1. 그냥 점이 생긴겁니다. 2. 멜라닌 색소가 침착된 것으로 3. 나이 들면서 축적되기도 하고 4. 잦은 마찰과 잦은 작은 염증 이후에 멜라닌 색소가 침착되기도 합니다. 5. 부어 오르거나 종양같은게 생기면 그때는 재판정이 필요 합니다. 건승하세요

자낙스정? 에 대해 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약 복용지도서에 알콜이 나오

는 이유는 자스정이 진정작용을 하기 때문입니다 알코올과 같이 복용시에 더욱 심한 진정효과 수면 어지러움등을 나타낼 수 있습니다 그렇기에 알콜이 언급되어있다고 생각하시면 됩니다 위의 약물은 복용한다고 해서 혈당이 오르지 않습니다. 다만 현재 불안감이나 우울감으로 식욕이 저하되어있었다면 우울감이 해소되면서 식욕이 돌아오고 장기적으로 체중이 늘어날 수는 있습니다 감사합니다

성병 걸릴 수 있는 상황인가요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 걱정이 많으신것으로 생각됩니다. 성병의 가능성은 거의 없다고 생각합니다. 걱정되시면 검사를 통해서 확인해 보세요

겨드랑이 아래 모세혈관이 선명하게 보입니다,안녕하세요. 요약 1. 증상이 없으면 2. 미용상의 목적으로 레이저 치료를 할 수는 있습니다. 3. 증상이 없고 특별히 동반된 병변도 없으면 병원 가서도 할건 없습니다. 건승하세요

햇빛 눈부심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 기준이 마련된것은 없습니다. 자외선 노출이 신경쓰이시면 선글래스를 쓰고 눈을 보호해주시고 걱정되는 행위를 하지마세요

몸 가려움과 항문쪽 에 이상한거 보이는데 기생충인가요?,안녕하세요. 요약 1. 곤지름은 아니고 2. 병원에서 기생충 알인지 검사를 해 보세요 3. 기생충 자체가 아니라 알을 까면서 기생충이 피부를 뚫기 때문에 가려울 수 있습니다. 건승하세요

요도염이나 전립선염 치료후 콘돔 없이 성관계 해도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도염이나 전립선염 치료후 치료 받으신 병원에서 균이 없는 상태이고 상대방에게 전염되지 않는 상태라는 주치의 판정을 받게 되면 콘돔 없이 성관계 해도 괜찮습니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=AJxjzRW88>

배란기가 끝나도 유두가 아픕니다.,안녕하세요. 요약 1. 가임기에 피임약을 제대로 복용 안했으면 2. 현재 증상이랑 상관없이 3. 적당한 시기가 되면 임신테스트기나 얼리 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요

이거 혹시 성병일까요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모공성 각화증은 오래된 피부세포가 정상적으로 탈락하지 못하고 표피 내로 들어가 모공의 출구를 막음으로써 모공이 커져서 오토도톨 닭살처럼 보이는 질환입니다. 비만한 사람 아토피 피부염이 있는 사람 피부가 건조한 사람에게 많이 생깁니다. 건승하세요

이거 혹시 성병인가요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모공성 각화증은 오래된 피부세포가 정상적으로 탈락하지 못하고 표피 내로 들어가 모공의 출구를 막음으로써 모공이 커져서 오토도톨 닭살처럼 보이는 질환입니다. 비만한 사람 아토피 피부염이 있는 사람 피부가 건조한 사람에게 많이 생깁니다. 건승하세요

이 점 그냥 지워도 상관없을까요?,안녕하세요 흑색종은 검은 점이 새로 생긴다거나 이미 있던 점의 모양 색조 크기가 변하거나 따가움 가려움 통증이 나타나면 의심할 수 있으며 색깔이 짙거나 경계 부분이 명확하지 않고 모양도 일정하지 않습니다. 그냥 피부과 가서 점을 제거하세요. 조직검사도 해보고. 건승하세요

IGF1은 금식여부와 채혈시간이 중요하지 않나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. IGF1검사는 금식과는 큰 연관이 없으며 MRI상 선종이고 그 크기가 크지 않다면 너무 크게 걱정할 내용은 아니지 않을까 싶습니다 본인의 어떤 임상소견이 있어 걱정을 하는지는 모르겠으나 체형을 보면서 걱정의 방향을 다른 곳으로 보아야하지 않을까 생각합니다

어제 피부과에서 허벅지에 레이저압출 치료를 받았는데요,안녕하세요 요약 1. 처치 후에 항생제 등을 처방받아 복용하면 감염의 문제가 안 생깁니다. 2. 행여나 발적 종창 통증 등이 생

기면 3. 그리고 처방받은 약이 없으면 그때서라도 잡수시면 됩니다. 건승하세요

갑자기 자고 있어났더니 검지 손가락이 부어있는데 왜 그럴까요?,안녕하세요 요약 1. 연조직염입니다. 2. 거기에 염증이 생긴건데 안 아플수는 있겠지만 발적 종창 기능이상이 있어서 염증이 생긴겁니다. 3. 발적 발열 부종을 특징으로하는 연조직염이라는 병이 있습니다. 4. 항생연고 발라보고 해결안되면 병원에서 치료하면 금새 해결됩니다. 연조직염은 피부표면의 작은 상처를 통해 세균 침투로 진피와 피하조직에 일어나는 세균 감염증이며 봉소염 봉과직염 봉와직염이라고도 합니다. 연조직염의 증상은 발생한 부위에 홍반 열감 부종 압통을 동반하며 질병이 진행되면 물집과 고름이 생기기도 합니다. 건승하세요

자궁경부 폴립으로 인한 생리전 갈색냉은 임신성공여부와 상관이 없나요,안녕하세요 요약 1. 자궁경부 폴립 자체에 분비샘이 있다면 2. 피와 함께 분비물에 섞여 나올 수 있습니다. 3. 경부 폴립 자체가 쏠리면서 피도 나오고 호르몬 영향으로 분비도 한다면 갈색냉이 나올 수 있습니다. 4. 갈색냉의 다른 원인이 있는지 검사한 산부인과에서 검사결과를 토대로 알려달라고 해보세요 건승하세요

피임약 입에서 녹여 먹음,안녕하세요 요약 1. 어쨌든 몸안에 들어가면 되는겁니다. 2. 매번 그럴 건 아니니 3. 안 먹는 거 보다는 낫다는 생각으로 4. 담부터는 제때 원래 먹던대로 잡수시면 됩니다. 건승하세요

스테로이드 연고 사용 중단 후 증상 재발현,안녕하세요 요약 1. 습진 치료는 스테로이드가 메인입니다. 2. 병원에서 안전하게 사용할 수 있는 스테로이드 용법을 3. 개인에 맞게 배우시면 됩니다. 4. 안 쓰면 안되니 현명하게 쓰는 방법을 개인에 맞게 익히면 됩니다. 건승하세요

류마티스내과에 내원하면 되는걸까요?,안녕하세요 요약 1. 루푸스를 진단받고 싶으면 류마티스 내과로 가면 됩니다. 2. 아래 증상들이 있는지 확인하고 가서 잘 상담받아 보세요 전신성 홍반성 낭창루푸스는 발열 체중 감소 피로감 관절염 근육통 안면의 나비 모양의 홍조 입안의 궤양 탈모 호흡곤란 등이 나타날 수 있습니다. 주로 2040대의 젊은 여자에게서 발병하며 사춘기 이전에 발생하는 경우는 적습니다. 건승하세요

에이즈감염,안녕하세요 요약 가능성이 없습니다. HIV 감염의 주된 경로는 성접촉감염인과의 안전하지 않은 성접촉 감염된 혈액의 수혈에이즈에 감염된 혈액이나 혈액제제를 수혈 받았을 때 오염된 주사기의 공동사용감염인이 사용한 주사기를 사용했을 때 수직감염감염된 여성의 임신 출산 모유 수유를 통해 감염됩니다. 건승하세요

안녕하세요,안녕하세요 요약 1. 구강성교 하다가 서로 입을 물고 빨고 하면 2. 성기에 묻어 있던 침이나 질 분비물들이 입에서도 섞일 수 있습니다. 3. 입술을 안대고 보호한다면 질이나 성기에 묻어 있는 균이 들어갈 확률은 없을 겁니다. 건승하세요

안과 정기검진,안녕하세요 요약 황반변성이 있는지 확인해 보세요 황반변성 진단은 안저망막 검사 형광안저촬영 빛간섭단층촬영 등을 통해 이루어집니다. 황반변성의 주 증상은 글자가 뭉개져 보이거나 직선이 휘어 보이는 변시증이 생깁니다. 황반변성 초기에는 컨디션이 좋지 않은 날에 시력이 떨어졌다가 컨디션이 좋으면 시력이 회복되며 건성 황반변성은 별다른 증상이 없거나 있더라도 중심 시야가 약간 또렷하지 않은 정도이며 좀 더 진행되면 욱실 타일이나 건물 등의 선이 휘어 보이게 됩니다. 더 진행하면 글자에 공백이 생기거나 중심 부분이 지워진 것처럼 보이지 않게 됩니다. 건승하세요

소아 대장암이 흔하진 않죠...?,안녕하세요. 매디아즈입니다. 소아 대장암은 성인 대장암에 비해 매우 드문 질환입니다. 발생 빈도는 전체 대장암의 약 1 미만으로 알려져 있습니다. 경과

를 지켜보셔도 될것으로 생각합니다

췌장암일 가능성이 있을까요?,안녕하세요 요약 1. 아래 증상이 있는지 비교해 보세요 2. 작년 7월이랑 증상이 비슷하면 괜찮은데 3. 없던 증상이 생겼으면 추적 검사를 해 보세요 췌장암에서 가장 흔히 나타나는 증상은 복통이며 황달 식욕 감소 체중 감소 등의 증상도 있습니다. 췌두부암인 경우에는 대부분 황달이 나타나며 췌장의 체부와 미부에 발생하는 췌장암은 초기에 거의 증상이 나타나지 않아 시간이 지나서 발견되는 경우가 많습니다. 이외에 지방의 불완전한 소화로 인해 기름진 변의 양상을 보이는 지방변 또는 회색변 식후 통증 구토 오심 등의 증상이 있을 수 있습니다. 건승하세요

조영제가 인지기능에 영향을 줄수 있나요?,안녕하세요 요약 1. 조영제가 인지기능에 영향을 주지 않습니다. 2. 인지기능이 떨어졌다면 3. 신경과에서 원인 질환이 생겼는지 4. 인지 기능에 정말 문제가 있는지 부터 확인해 보세요 건승하세요

귀밑에 튀어나온거 멍울인가요?,안녕하세요 요약 1. 멍울은 좀 더 깊은 피하지방 아래 있습니다. 2. 저 사진은 그냥 피부와 피하지방입니다. 3. 특별한 증상이 없으면 그냥 놔두면 되고 4. 발적 종창 통증이 생기면 재평가가 필요합니다. 건승하세요

편두통 질문,안녕하세요. 요약 1. 카페인이 편두통 악화요인으로 작용할 수 있습니다 2. 가끔 있는 편두통의 강도나 빈도가 증기할 수 있을겁니다 3. 카페인이 들어 있는 다른 음식도 비슷합니다 건승하세요

에이즈 걱정 안해도 될까요?,안녕하세요 요약 1. 지금 검사 시기에는 오차가 있는 시점입니다. 2. 12주 이후에 다시 해 보세요 3. 보건소에서 하면 무료입니다. HIV 검사시기는 의심되는 성관계나 접촉에 노출 후 최소 4주6주에 보통 12주14주에 검사를 해보시는게 좋습니다. 다만 항체 형성 시기도 사람마다 모두 다르기 때문에 12주까지를 항체미검출기로 잡고 적정 검사시기를 12주 이후로 권장합니다. 12주 이후에 받은 에이즈 자가 검사 결과는 신뢰해도 좋습니다. 건승하세요

사후피임약 복용관계 후 15일 저녁소변 얼리임테기,안녕하세요 요약 1. 그 정도 시간이 지나서 검사해서 음성이면 비임신입니다. 2. 그래도 걱정되면 일주일 있다 임신테스트기로 한번더 확인해 보세요 3. 15일이면 충분한 호르몬이 형성될 시점입니다. 건승하세요.

갑자기 운동 후 심장통증,안녕하세요 요약 1. 심장건강은 안녕한지 확인이 필요합니다. 2. 협심증 초기에도 운동하면서 통증이 생깁니다. 협심증의 가슴 통증의 가장 중요한 특징은 안정시에는 통증이 없다가 심장 근육에 많은 산소가 필요한 상황 운동을 하거나 무거운 물건을 드는 경우 차가운 날씨에 노출되는 경우 흥분한 경우에 통증이 발생합니다. 지속 시간은 심근경색증과 달리 대개 510분 미만이며 안정을 취하면 없어집니다. 건승하세요.

화를 내거나 스트레스를 받으면 손바닥이 저려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소에 불안하거나 스트레스가 많은 분이 화가 나거나 스트레스 더 받으면 혈압이 일시적으로 떨어지기도 하고 과호흡으로 손이 저릴 수 있습니다.

발기에 관하여 문의드립니다.,안녕하세요 요약 1. 방광염도 발기부전에 영향을 줄 수 있습니다. 2. 전립선비대도 발기부전에 영향을 줄 수 있습니다. In some cases frequent urination urinary incontinence and other lower urinary tract symptoms can affect your sexual health and may lead to erectile dysfunction. Bladder obstruction including due to benign prostate enlargement BPH will trigger its anatomy and physiological function changes. Men with BPH have a 6 times higher risk of erectile dysfunction than those without BPH. 건승하세요.

이거 족저근막염 맞나요?,안녕하세요 요약 1. 족저근막염 초기 증상일 수 있습니다. 2. 족저근막염은 발 뒤꿈치부터 발 중앙까지에 통증이 오고 주로 아침에 통증이 심합니다. 족저근막염 8090는 수술을 하지 않는 보존적 치료만으로 충분히 호전됩니다. 보통 68주의 시간이 필요하며 많이 걷지 않고 집에서도 슬리퍼를 신는 등 발에 가해지는 손상을 최소한으로 줄이며 치유할 때까지 기다리면 호전되기도 합니다. 건승하세요.

성병 걸릴 수 있는 상황인가요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 걱정이 많으신것으로 생각됩니다. 성병의 가능성은 거의 없다고 생각합니다. 걱정되시면 검사를 통해서 확인해 보세요

요도염이나 전립선염 치료후 콘돔 없이 성관계 해도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도염이나 전립선염 치료후 치료 받으신 병원에서 균이 없는 상태이고 상대방에게 전염되지 않는 상태라는 주치의 판정을 받게 되면 콘돔 없이 성관계 해도 괜찮습니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?vAQJxjzRW88>

피검사 결과,안녕하세요 요약 무증상 고요산혈증 환자에게서 요산저하치료요산강하제를 시행하지 않습니다. 고요산혈증이 있는 사람에서 통풍이 발병할 확률은 5 미만입니다. 7.0 mgdL 이상의 무증상 고요산혈증이 우연히 발견되면 우선 요산이 증가된 원인을 찾고 생활습관개선을 통해 혈청 요산농도를 낮추는게 더 중요합니다. 건승하세요

화를 내거나 스트레스를 받으면 손바닥이 저려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소에 불안하거나 스트레스가 많은 분이 화가 나거나 스트레스 더 받으면 혈압이 일시적으로 떨어지기도 하고 과호흡으로 손이 저릴 수 있습니다.

헬리코박터 제균치료동안 입냄새 나나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구취 입냄새나 입이 쓴 느낌 혀에 하얀 백태가 끼는 증상과 잔기침 가래 목이물감이 생길 수 있습니다. 이것은 부작용이기보다는 헬리코박터균이 제균치료약과 전쟁을 치르면서 생기는 자연스러운 부산물들이며 이것들이 추후 가스팽만이나 묽은변 설사로 배출될 수도 있습니다.

눈썹압박하면 생길 수 있는 부작용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈썹을 당기는 것 자체로는 크게 눈썹 처짐이나 안륜근에 문제가 생기지는 않습니다. 눈매교정과 쌍꺼풀 수술 하신지 2년 정도 지나서 큰 문제는 없을 것으로 생각되나 보시기에 이상이 있을때는 수술 받은 병원에 내원하여 검사를 받아보시는것을 권유드립니다.

IGF1은 금식여부와 채혈시간이 중요하지 않나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. IGF1검사는 금식과는 큰 연관이 없으며 MRI상 선종이고 그 크기가 크지 않다면 너무 크게 걱정할 내용은 아니지 않을까 싶습니다 본인의 어떤 임상소견이 있어 걱정을 하는지는 모르겠으나 체형을 보면서 걱정의 방향을 다른 곳으로 보아야하지 않을까 생각됩니다

어떤 병원을 가서 정밀 검사를 받아야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 환자의 증상은 두통의 일종입니다. 그 증상이 있을때 혈압을 먼저 재보고 160/100이상이면 혈압약 조절을 먼저하시고 혈압이 괜찮으시면 수면무호흡증이 있는지 수면 다원검사를 받아보시기를 추천드립니다. 이비인후과 신경과에서 하고 있으며 두통에 대해 자세한 진료를 원하시면 가까운 신경과를 추천드립니다. 감사합니다.

수면중 손에 쥐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통 주무시다가 손에 쥐가 나는 것은 잘때 자세의 영향으로 목의 신경이 일시적으로 눌려서 증상이 생겼을 가능성이 높습니다. 일시적이면 지켜보고 일자목이 더 심해지지 않게 근육스트레칭 및 자세 교정 운동을 먼저 하시면 좋을 거 같습니다. 감사합니다.

항문 안쪽위 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 좀 모호하기는 하지만 항문주위농양이

있을 때 발생할 수 있는 증상으로 확인이 필요하겠습니다. 농양이 피부 가까이 있으면 통증이 심하지만 안쪽 깊이 위치한 경우엔 오히려 통증이 덜 해서 진단이 늦어지는 경우가 있습니다. 감기 몸살처럼 근육통이나 오한 발열이 동반되는 경우도 있습니다. 가까운 항문외과에 가서 진료 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

햇빛 눈부심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 기준이 마련된것은 없습니다. 자외선 노출이 신경쓰이시면 선글래스를 쓰고 눈을 보호해주시고 걱정되는 행위를 하지마세요

사랑니 발치 전 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사랑니가 잇몸을 뚫고 나오는 상태에서는 사랑니 발치 전에도 약간의 출혈이 있을 수 있습니다. 이런 경우 다음과 같은 내용을 말씀드릴 수 있습니다 사랑니가 잇몸을 뚫고 나오는 상태에서는 잇몸 주변이 염증이 생기기 쉽습니다. 이로 인해 약간의 출혈이 지속될 수 있습니다. 출혈이 지속되더라도 대부분 소량이며 금방 멎는 경우가 많습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 하지만 출혈이 지속되거나 증가한다면 감염 등의 징조일 수 있으므로 치과 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 사랑니 발치 전 출혈이 걱정된다면 발치 직전에 의사와 상담하여 출혈 관리 방법에 대해 문의하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 전반적으로 사랑니가 잇몸을 뚫고 나오는 상태에서 약간의 출혈은 정상적인 현상이지만 출혈이 지속되거나 증가한다면 치과 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 상관없습니다 2. 관련없습니다 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

요도염이나 전립선염 치료후 콘돔 없이 성관계 해도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도염이나 전립선염 치료후 치료 받으신 병원에서 균이 없는 상태이고 상대방에게 전염되지 않는 상태라는 주치의 판정을 받게 되면 콘돔 없이 성관계 해도 괜찮습니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?vAQJxjzRW88>

이증상 모낭염인가요 헤르페스인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 털이 나는 곳에만 염증이 생겼군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 한번 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

성기 귀두쪽 변색이됐어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 귀두쪽 좌우가 노란빛으로 변하고 갈색 반점이 생겼군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

일명 변태라고 하는 사람 치료가능한건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀하가 설명하신 증상들은 성 일탈 행동 성 중독 등의 문제로 볼 수 있습니다. 이런 행동들은 정신 건강 및 대인관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 문제는 치료가 가능한 경우가 많습니다. 전문적인 상담과 치료를 통해 증상을 개선할 수 있습니다. 주요 치료 방법으로는 다음과 같은 것들이 있습니다 정신과 상담 및 심리치료 성 중독의 원인을 파악하고 건강한 행동 습관을 형성하도록 도와줍니다. 인지행동치료 왜곡된 사고 패턴을 교정하고 건전한 성 관념을 형성하도록 합니다. 약물치료 성 중독과 관련된 우울증 불안 등의 증상을 완화시키기 위한 약물 처방이 도움될 수 있습니다. 성중독 치료 프로그램 전문 치료 센터에서 진행하는 집중적인 치료 프로그램에 참여할 수 있습니다. 또한 귀하가 언급하신 알코올 중독과 성 문제는 서로 밀접한 관련이 있을 수 있습니다. 따라서 알코올 중독 치료도 병행해야 할 것 같습니다. 전문가의 도움을 받아 체계적인 치료를 받는다면 증상 개선과 건강한 생활을 회복할 수 있을 것입니다. 혼자서 힘들어하지 마시고 적극적으로 도움을 요청하시기 바랍니다.

전형적인 공황증상이 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공황발작panic attack 이란 극

심한 공포나 불편감이 갑자기 급증하여 몇 분 안에 정점에 도달하는 것을 말하며 이 기간 동안 13개의 신체적 인지적 증상 중 4개 이상의 증상이 발생합니다. 1. 심계항진 가슴 두근거림 또는 가속된 심장 박동수 2. 발한 3. 떨리거나 후들거림 4. 숨이 차거나 답답한 느낌 5. 질식하는 느낌 6. 가슴의 통증이나 불편함 7. 메스꺼움 또는 복통 8. 어지럽거나 불안정하거나 현기증 또는 기절하는 느낌 9. 오한이나 열감 10. 감각이상 마비 또는 따끔거리는 느낌 11. 비현실감 현실이 아닌 것 같은 느낌 또는 이인증 자신과 동떨어져 있는 느낌 12. 통제력을 잃거나 미쳐가는 것에 대한 두려움 13. 죽음의 공포 이 중 4가지 이상 증상이 나타나고 있으니 공황발작으로 볼 수 있을 것 같습니다. 1회 발작 이후에 추가적인 공황발작 및 그에 대한 걱정이 지속되고 있는 것으로 보아 공황장애로 진단할 수 있을 것 같습니다. 갑상선기능항진이나 심폐장애 증상 등 내과적인 문제가 없다면 정신과 치료가 필요할 것으로 생각됩니다.

이소티논 추가 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹는 약이 많네요 신경계 약물과의 상호작용을 조심해야겠습니다 이소티논 계열의 여드름 치료 약은 지용성이기에 식전 복용도 가능합니다 신경계 약과 최소 3시간 간격만 띄울 수 있다면 됩니다 기립성 저혈압의 경우에는 심장 위쪽 혈관머리부터 가슴까지를 주로 관장하는데 이 약물을 복용할 경우 약물이 혈액내에서 빠르게 흡수될 가능성이 있기에 전체적으로 약물의 농도들을 줄여주어야 합니다 제가 아는 선에서는 이정도입니다

렉사프로 알파gpc 후퍼진a 병용가능여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알파 gc와 후진a 는 정식으로 치료효과가 입증된 ADHD 약물이 아닙니다. 메틸페니데이트콘타 제제가 효과가 떨어진다면 그 원인을 찾아야 합니다. 아토목세틴스트테라처럼 기전이 다른 약제로 변경해보거나 혹은 다른 정신과 질환이 겹쳐있을 가능성이 있어 그 부분에 대해 담당 정신과 선생님과 충분히 상의하시는 것이 좋겠습니다.

손가락 신경이나 인대 등의 문제가 있는 상황인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떻게 다치신것인가요? 지금 상처부위만 본다고 하면 손가락을 펴는데 문제가 되는 인대나 신경의 손상이 의심되지는 않습니다

곤지름인가요 헤르페스인가요..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정 많으시지요? 이전에 곤지름 치료를 하셨다고 하시니 지금 병변은 사진이 선명하지는 않지만 헤르페스보다는 곤지름에 가까워보입니다

얼굴에 열이 오르고 가슴 답답함이 느껴집니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요즘 많이 힘들시겠네요. 항 불안제 약을 복용하면서 술을 드시게 되면 지금과 같이 불편함이 나타날 수 있으니 드시지 말아야 합니다

제균치료 약 복용후 뭐 먹어도 상관없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헬리코박터 파일로리 제균치료 약 복용 중에는 다음과 같은 점에 유의하는 것이 좋습니다 의사 지시에 따른 식사 특별한 제한 식단이 필요한 경우 의사의 지시를 따르는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 정상적인 식사를 해도 무방합니다. 자극적인 음식 피하기 매운 음식 카페인 알코올 등 자극적인 음식과 음료는 위장을 자극할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다. 유제품 섭취 주의 항생제 복용 시 유제품과 함께 섭취하면 약물 흡수에 영향을 줄 수 있습니다. 약 복용 전후 2시간 정도는 유제품 섭취를 피하는 것이 좋습니다. 충분한 수분 섭취 약물 복용 시 충분한 물을 마시는 것이 좋습니다. 수분 섭취는 약물의 흡수와 배설을 도와줍니다. 프로바이오틱스 고려 항생제 복용으로 인해 장내 유익균이 감소할 수 있습니다. 프로바이오틱스 섭취는 장내 균형을 돕는 데 도움이 될 수 있습니다.

손가락 실밥 제거 후 치유 기간 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처에 따라 다를 수 있지만

일반적으로 껌맨상처에서 봉합사를 뺐다고 하면 하루정도 지난후에는 샤워도 가능할 것으로 생각됩니다.

공복에 아지로맥스정 복용한 것 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아맥스정은 음식물과 같이 복용하면 생체 이용률이 37 감소하는 것으로 알려져 있어 공복에 드시는 것이 유리합니다. 보통으로 많이 힘드셨겠네요. 위장보호하는 약이 있으면 추가로 드셔보셔요 위장출혈이 일어나거나 하지는 않을겁니다

올레이저 라섹 수술 전 금주 기간,안녕하세요. 메디이즈입니다. 34일 정도는 금주 해주시는게 나을 듯 합니다. 수술 후에도 12주 정도는 금주 해주시는 게 상처 회복에 도움이 될 듯 합니다. 감사합니다.

남자 아랫배 좌측 y존 쪽 통증에 관해,안녕하세요. 메디이즈입니다. 좌하측 복통과 좌측 사타구니 쪽 통증은 내과 쪽 문제일 수도 있고 비뇨기와 쪽 문제일 수도 있습니다. 프로바이오틱스는 용량을 두배로 먹는다고 복통이 생기지는 않습니다. 현재 염증성 장질환으로 내과에서 치료 중이면 우선 내과를 방문해서 진료를 받으시고 소변검사 등을 해서 비뇨기와 문제인지 소화기내과 쪽 문제인지 확인하는 것이 좋겠습니다.

곤봉지 폐암의심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 곤봉지가 생기는 것은 산소포화도가 낮을 때 나타나는 증후는 맞습니다. 하지만 잇몸 염증이 있다고 해서 폐암이 있다고는 할 수 없습니다. 기관지 때문에 내과 진료를 받고 있다면 정기적으로 흉부방사선과 폐기능검사를 받고 있을 것이기 때문에 폐암에 대해 너무 걱정하지는 않아도 됩니다. 우선은 기관지 문제를 잘 진료 받는 것이 중요합니다.

구내염인가요?수족구수포인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 곳에 병변이 없다고 하면 사진 속의 소견은 수족구 수포보다는 구내염으로 인한 입술궤양 소견으로 판단됩니다.

햇빛 눈부심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자외선 노출에 의한 눈에 안좋은 효과는 일반적으로 장기간의 노출이 축적되어 영향을 나타냅니다. 일회성의 노출로는 가시적인 영향은 없습니다

질문 스텐트 시술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스텐트를 삽입하면 스텐트를 삽입한 곳에 혈전이 생겨 다시 혈관이 막힐 수 있습니다. 이를 예방하기 위해 요즘 스텐트는 혈전이 생기지 않도록 약품으로 코팅 처리한 스텐트를 삽입하기 때문에 재협착될 가능성이 매우 낮습니다. 따라서 흉통이나 가슴이 답답한 증상이 있으면 운동부하심전도검사나 심장CT를 통해 재협착 여부를 확인하고 협심증 증상이 없으면 약물 복용하며 심장내과 진료를 보시면 됩니다.

전형적인 공황증상이 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공황발작panic attack 이란 극심한 공포나 불편감이 갑자기 급증하여 몇 분 안에 정점에 도달하는 것을 말하며 이 기간 동안 13개의 신체적 인지적 증상 중 4개 이상의 증상이 발생합니다. 1. 심계항진 가슴 두근거림 또는 가속된 심장 박동수 2. 발한 3. 떨리거나 후들거림 4. 숨이 차거나 답답한 느낌 5. 질식하는 느낌 6. 가슴의 통증이나 불편함 7. 메스꺼움 또는 복통 8. 어지럽거나 불안정하거나 현기증 또는 기절하는 느낌 9. 오한이나 열감 10. 감각이상 마비 또는 따끔거리는 느낌 11. 비현실감 현실이 아닌 것 같은 느낌 또는 이인증 자신과 동떨어져 있는 느낌 12. 통제력을 잃거나 미쳐가는 것에 대한 두려움 13. 죽음의 공포 이 중 4가지 이상 증상이 나타나고 있으니 공황발작으로 볼 수 있을 것 같습니다. 1회 발작 이후에 추가적인 공황발작 및 그에 대한 걱정이 지속되고 있는 것으로 보아 공황장애로 진단할 수 있을 것 같습니다. 갑상선기능항진이나 심폐장애 증상 등 내과적인 문제가 없다면 정신과 치료가 필요할 것으로 생각됩니다.

구내염설염 2주이상 지속되네요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 통증이 있는 구강 궤양이라고 하면 구내염의 가능성이 높으니 경과를 지켜보아도 괜찮을 것으로 판단 됩니다.

냉찜질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 냉찜질을 하여도 다리쪽 혈관이 커지거나 하지는 않을 것으로 생각됩니다. 관절염에는 따뜻한 찜질이 도움이 될것 같습니다

힘빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 원인일 수도 있지만 신경과나 재활의학과 진찰은 보시면 좋겠습니다. 진찰상 의심소견이 있으면 바로 대학병원에서 근전도검사를 할 수 있도록 의뢰해 달라고하시면 됩니다.

제가 고혈압 약을 먹어야하는 수준인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 측정한 혈압이 140/100 정도가 평균이라고 한다면 약물 복용이 필요할 수 있습니다 24시간 혈압을 측정해보시는 것도 한가지 방법입니다

왼쪽눈 충혈빠른답변바랍니다.감사합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 눈 흰자위에 핏빛 줄이 충혈되었다고 하더라도 뇌의 이상을 의심하기는 무리가 있습니다. 일단 안과 진료 받아보श्य. 뇌병변이 있으면 눈 동공의 크기가 변하거나 시력이 떨어지거나 눈동자의 움직임에 이상이오거나 시력이 떨어지기도 합니다

피부 착색관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 살쥘때 나타나는 흑색가시세포증이라기 보다는 사진에서 보이는 병변은 어루러기에 가깝다고 생각합니다. KOH 검사 받아보श्य 발바닥에 이상한 게 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부 병변의 정확한 진단을 위해서는 손대지 않은 원형그대로의 병변이 좋습니다. 손으로 뜯은것 같은데 사마귀가 아닌가 싶습니다

얼굴 피부에 여드름같은게 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주로 수염 제모 부위에 여드름처럼 올라오시나요? 깨끗한 면도날을 사용하더라도 제모 시에 수염이 나는 모낭 주변으로 상처가 생길 경우 여드름 균 등이 감염되어 여드름처럼 모낭염이 생길 수 있습니다. 또한 민감한 피부의 경우 샤워용 타월로 얼굴이나 몸을 많이 문지를 경우에도 생길 수 있으므로 최대한 부드러운 재질의 타월을 이용하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 지속적으로 재발하고 악화될 경우 근처 피부과 방문하여 진료 및 약을 처방 받으시기 바랍니다. 빠른 쾌유하시기 바랍니다.

한쪽으로만 씹으면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정말 한쪽으로만 음식을 씹는지는 모르겠지만.. 이론적으로는 한쪽만 근육이 발달하면 얼굴이 비대칭이 될 수는 있습니다. 성장기이니 음식을 양쪽으로 골고루 씹는 습관을 들이는게 좋겠습니다.

소변검사에서 첫소변이 아닐시 정확도가 떨어지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 컨디션이 너무 안좋을때 소변검사를 받았는데 현미경적 혈뇨가 조금 검출되었고 3일뒤에 잔뇨감이 심해 늦은시간 열린 병원에서 다시 소변검사를 받게되었는데 정상소견 나왔고 또 4일뒤에 원래 예약했던 비뇨기과에서 의도치 않게 또 소변검사를 했는데 정상나왔군요. 미세혈뇨가 다시 나오나 싶어 살짝 꺼림직하군요. 크게 걱정하지 마시고 검사 받으신 병원 주치의와 정확한 상담을 받도록 하십시오.

렐바 기관지 확장제 스테로이드,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 렐바를 사용하게 되면 증상이 좋아져도 기본 3개월정도 사용을 권합니다. 부작용이 전혀 없지는 않지만 우려하는 일은 일어나지 않으니 너무 걱정하지마세요. 상용을 중단한다고 해서 바로 효과가 없어지는 않습니다

귀두 끝부터 전립선이 따끔거립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선염 등에 의한 증상 가능성이 있습니다. 한달 가까이 증상이 지속된다면 일시적이지 않기에 가까운 비뇨기과 진료 권유합니다

발기부전 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심인성 발기부전 가능성이 높을듯하나 기

저질환이 있을 가능성에 대해서도 확인이 필요하기에 가까운 비뇨기와 진료 권유합니다.

아랫니 2개 벌어진거는 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아랫니 가운데 2개 전치? 라고하나요? 예전에는 안그랬던거 같은데 그거 2개가 벌어져서 치아 2개 사이에 공간이 있어서 좀 보기 흉한데 이런거는 무슨방법으로 해야할까요? 충치가 있거나 이런게 아니라서 그냥 이대로 두는게 맞을까요? 치아에 틈이 생기신 거라면 치아교정 상담을 받아보세요 방지하시면 더 나빠질 수 있습니다. 잇몸 상태도 체크해 보시구요

진성포경과 자라고추를 지냈습니다. 어떻게 해결할 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진성포경과 자라고추를 지닌 20살 남자이군요. 진성포경과 자라고추를 치료하기 위해서 포경수술과 자라고추 교정수술이 동시에 필요합니다. 비뇨기와 내원하셔서 정확한 상담을 우선 받으도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=USeOIZHPsJM>

발바닥 사마귀 레이저 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발바닥 사마귀의 크기나 위치에 따라 달라질수 있습니다. 일주일후에 수영은 어려울것 같습니다. 시술해주시는 선생님과 상의하세요

야즈 복용 중 생리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 야즈 복용하신지 얼마 되지 않으셔서 약물로 인한 출혈이 있을 수 있습니다. 지금 6월초 출혈은 시기적으로 미루어 보아 생리일것 같습니다. 일단 조금 더 드셔보시는 것이 좋겠습니다

손목 아래? 사진에 표시한부분 통증 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인은 정확하게 알기는 어렵지만 잠시 있다가 없어지는 찌르는 듯한 통증은 임상적으로 큰 문제는 아닐것으로 생각됩니다.

HPV와 사마귀 관련하여 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. HPV 타입에 따라 생기는 사마귀의 위치가 다르다고 알려져 있습니다. 손사마귀는 걱정하시는 것과 연관은 없어보입니다

목 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 목에 이물감은 역류성 후두염의 한 증상이기도 하지만 스트레스와 연관된 증상이기도 합니다. 둘다 때문일수도 있습니다

이건 후두신경통인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두통의 원인은 다양합니다. 성관계나 사정과 연관된 두통도 있구요 머리와 목주위에 근육이 뭉쳐서 나타나는 두통도있습니다. 계속 되면 진료 받아보श्य

초고도비만인데 수면내시경약 덜 사용해서 내시경 받아도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 걱정되고 불안할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

팔에 난 종기 피부암 가능성이 높을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로 보기에는 악성의 가능성은 없어보입니다. 자꾸 신경 많이 쓰이시거나 걱정되면 제거하시는것이 어떨까요?

소변스틱검사 잠혈부분 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변 스틱 검사요 스틱 검사 Urine Dipstick Test는 소변에 존재하는 다양한 물질을 간편하게 확인할 수 있는 검사법입니다. 검사 판독 시간은 제품마다 조금씩 차이가 있지만 일반적으로 다음과 같습니다. 대부분의 항목 pH 비중 백혈구 아질산염 단백질 포도당 케톤체 빌리루빈 요로빌리노겐 60초 이내 잠혈반응 60초 비타민 C 30초 검사 방법은 다음과 같습니다 소변을 채취합니다. 스틱의 시험지 부분을 소변에 12초 정도 담급니다. 스틱을 꺼내 과량의 소변을 제거합니다스틱 끝을 화장지 등에 대고 눌러줍니다. 스틱을 수평으로 하여 시간을 잽니다. 정해진 시간이 지난 후

각 항목의 색 변화를 제품에 포함된 색상표와 비교하여 판독합니다. 주의사항 검사 시간을 정확히 지켜야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 판독 시간이 지나면 결과가 부정확해질 수 있습니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 저번주 목요일에 사랑니 발치를 했습니다 오늘이 수요일이니까 6일정도가 되었는데 이제 발치한쪽으로 밥먹기 발치부분살살양치 키스 성관계 모두 해도 전혀 문제없을지 여쭙고 싶습니다 저중에 하면 안 되는 게 있을까요? 문제없습니다. 과도한 것만 아니면요

육안상 콘딜로마 vs 정상돌기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 확실한것은 조직검사를 받아보시는 것이 필요합니다. 보기에는 질전정 유두종일 가능성이 높다고 판단되기는 합니다.

이같이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이를 장기간 갈면 아프고 시려지는데 문제가 되는데 그게 원인이 이를 갈아서 크랙이 나서 아픈경우도 있지만 이를 갈면 잇몸이 살짝 드러나면서 아픈경우도 있더라구요 그럼 이거를 잇몸질환으로 엮을 수 있는걸까요?? 보험사에서 잇몸질환은 크라운보장이 된다고하고 이같이로 인한크라운은 보장이 안된다는데 그럼 결국 이같이로 인해서 잇몸이 드러나서 시리고 아픈 것은 잇몸질환으로 볼 수도 있을까요?? 좋은 질문입니다. 이같이를 하면 이가 갈리는 것도 있지만 이가 부딪히면서 뒤틀리는 힘을 받아서 잇몸과 치아 경계면쪽 치아 표면이 깨져서 떨어져 나가게 되고 잇몸쪽 치아가 패이게 됩니다. 이렇게 되면 찬물이나 찬바람에 시림 증상이 나타나구요 엄밀히 말하면 잇몸 질환은 아닙니다.

일명 변태라고 하는 사람 치료가능한건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀하가 설명하신 증상들은 성 일탈 행동 성 중독 등의 문제로 볼 수 있습니다. 이런 행동들은 정신 건강 및 대인관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 문제는 치료가 가능한 경우가 많습니다. 전문적인 상담과 치료를 통해 증상을 개선할 수 있습니다. 주요 치료 방법으로는 다음과 같은 것들이 있습니다 정신과 상담 및 심리치료 성 중독의 원인을 파악하고 건강한 행동 습관을 형성하도록 도와줍니다. 인지행동치료 왜곡된 사고 패턴을 교정하고 건전한 성 관념을 형성하도록 합니다. 약물치료 성 중독과 관련된 우울증 불안 등의 증상을 완화시키기 위한 약물 처방이 도움될 수 있습니다. 성중독 치료 프로그램 전문 치료 센터에서 진행되는 집중적인 치료 프로그램에 참여할 수 있습니다. 또한 귀하가 언급하신 알코올 중독과 성 문제는 서로 밀접한 관련이 있을 수 있습니다. 따라서 알코올 중독 치료도 병행해야 할 것 같습니다. 전문가의 도움을 받아 체계적인 치료를 받는다면 증상 개선과 건강한 생활을 회복할 수 있을 것입니다. 혼자서 힘들어하지 마시고 적극적으로 도움을 요청하시기 바랍니다.

폐렴이 더 심해진건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 비교가 불가능한 사진입니다만 영상만으로는 호전된듯합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

힘빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 원인일 수도 있지만 신경과나 재활의학과 진찰은 보시면 좋겠습니다. 진찰상 의심소견이 있으면 바로 대학병원에서 근전도검사를 할 수 있도록 의뢰해 달라고하시면 됩니다.

위염과 두통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원래 편두통이 있으셨다고 하지 지금 증상은 편두통 증상도 의심되니 소화기 약만 드시고 있다면 편두통약의 추가 복용이 필요할 수 있습니다

고혈압병원 가야하는 수치일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 집에서 측정한 안정시 혈압이 이정도라고 하면 혈압약 복용을 고려해야 할것으로 생각됩니다. 진료 받아보시는 것을 권합니다

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정도의 차이가 있을 수 있지만 양안 시야 범위가 다를 수 있습니다 시야차이가 녹내장의 위험성을 모두 결정하는 것은 아니고 개인차이가 있을 것 같습니다

혀에 검붉은 반점과 통증이있는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 생긴것이라고 하면 구내염의 한 증상일 가능성이 있습니다 24주 지나도 없어지지 않으면 진료 받아보श्य.

갈색 생리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리 임신 테스트기의 판독 시간은 제품에 따라 다르지만 일반적으로 5분 이내에 결과를 확인하는 것이 좋습니다. 좀더 경과를 지켜보श्य

복강경 수술시 사용하는 가스가 눈에 들어갔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시력이 떨어지거나 충혈이심해지거나 통증이 심해지는 증상이 나타나면 안과 진료를 받아보시는 것을 권합니다.

냉찜질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 냉찜질을 하여도 다리쪽 혈관이 커지거나 하지는 않을 것으로 생각됩니다. 관절염에는 따뜻한 찜질이 도움이 될것 같습니다

혹시 위암인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 위염 식도염 위궤양과 같은 위장관 질환과 담낭 질환에 대한 평가가 필요하므로 위내시경과 복부 초음파 검사가 도움이 되니 소화기 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

cre 환자 접촉,안녕하세요. 메디이즈입니다. CRE균은 카바페넴계열 내성균을 말하는 균으로 가래 소변 대변을 통해 전파될 수 있습니다. 하지만 대부분의 정상 면역을 가진 사람에게는 그다지 위험이 되지 않습니다. 주로 병원내 면역이 약한 환자에게 전염시 위험하기에 격리시켜 놓는거예요. 이불만 만지고 바로 손씻고 소독했다면 전염될 가능성은 없어보이네요. 병원내 항상 손씻기가 중요한 것은.. 본인에게 감염 되는 것보다 다른 환자에게 전파시키는걸 예방하는 목적이 더 크다고 할 수 있습니다.

비골건 파열 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비골건 파열의 증상은 다음과 같습니다. 발목 바깥쪽에 통증이 발생합니다. 발목을 움직일 때 소리가 나거나 걸리는 느낌이 듭니다. 발목을 움직이는 데 제한이 생깁니다. 발뒤꿈치를 드는 동작이 어려워집니다. 비골건 파열은 대부분 외상에 의해 발생하며 발목을 빼거나 과도하게 사용하는 경우에 발생할 수 있으며 증상이 심한 경우에는 수술이 필요할 수도 있습니다.

이건 후두신경통인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두통의 원인은 다양합니다. 성관계나 사정과 연관된 두통도 있구요 머리와 목주위에 근육이 뭉쳐서 나타나는 두통도있습니다. 계속 되면 진료 받아보श्य

손목 아래? 사진에 표시한부분 통증 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인은 정확하게 알기는 어렵지만 잠시 있다가 없어지는 찌르는 듯한 통증은 임상적으로 큰 문제는 아닐것으로 생각됩니다.

폐렴이 더 심해진건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 비교가 불가능한 사진입니다만 영상만으로는 호전된듯합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

초고도비만인데 수면내시경약 덜 사용해서 내시경 받아도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 걱정되고 불안할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하답니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

7번 갈비뼈 골절 5주 경과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 네 그렇습니다 2. 일상생활은 문제 없는데 주짓스하는것이 걱정되어 하시는 말씀일 겹니다 3. 시간이 좀더 필요합니다

관절약 부작용이 심한데 단약해도 될까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 퇴행성 관절염이 아니고 외상성에 의해 발생하고 경미하다면 진통소염제와 스테로이드 약물을 끊어도 자연 치유가 가능할 것 같습니다. 약부작용이 명확하고 일상생활에 지장을 줄 정도라면 당연히 약을 끊으셔야 합니다. 대신에 무릎에 부담을 주지 않고 충분한 휴식을 취하시는게 좋겠네요.

야즈 복용 중 생리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 야즈 복용하신지 얼마 되지 않으셔서 약물로 인한 출혈이 있을 수 있습니다. 지금 6월초 출혈은 시기적으로 미루어 보아 생리일것 같습니다. 일단 조금 더 지켜보시는 것이 좋겠습니다

신경치료 중인데 타병원에서 이어서 가능할까요 ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 취업하고 시간이 아예 안맞아서 받으려 못 가는 중인데 치료 중간에 술 마셔서 씹을때마다 통증이 느껴지고 아픈데 갈 시간이 없어서 못갑니다 야간진료 하는데로 옮길 수 있겠지요 ? 추가 비용이 들긴 하겠지만 가능한 할 듯 합니다.

HPV와 사마귀 관련하여 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. HPV 타입에 따라 생기는 사마귀의 위치가 다르다고 알려져 있습니다. 손사마귀는 걱정하시는 것과 연관은 없어보입니다

위염과 두통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원래 편두통이 있으셨다고 하지 지금 증상은 편두통 증상도 의심되니 소화기 약만 드시고 있다면 편두통약의 추가 복용이 필요할 수 있습니다

목 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 목에 이물감은 역류성 후두염의 한 증상이기도 하지만 스트레스와 연관된 증상이기도 합니다. 둘다 때문일수도 있습니다

발바닥 사마귀 레이저 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발바닥 사마귀의 크기나 위치에 따라 달라질수 있습니다. 일주일후에 수영은 어려울것 같습니다. 시술해주시는 선생님과 상의하세요

팔에 난 종기 피부암 가능성이 높을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로 보기에는 악성의 가능성은 없어보입니다. 자꾸 신경 많이 쓰이시거나 걱정되면 제거하시는것이 어떨까요?

초고도비만인데 수면내시경약 덜 사용해서 내시경 받아도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 걱정되고 불안할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

폐렴이 더 심해진건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 비교가 불가능한 사진입니다만 영상만으로는 호전된듯합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

갈색 생리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리 임신 테스트기의 판독 시간은 제품에 따라 다르지만 일반적으로 5분 이내에 결과를 확인하는 것이 좋습니다. 좀더 경과를 지켜보श्य

복강경 수술시 사용하는 가스가 눈에 들어갔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시력이 떨어지거나 충혈이심해지거나 통증이 심해지는 증상이 나타나면 안과 진료를 받아보시는 것을 권합니다.

힘빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 원인일 수도 있지만 신경과나 재활의학과 진찰은 보시면 좋겠습니다. 진찰상 의심소견이 있으면 바로 대학병원에서 근전도검사를 할 수 있도록 의뢰해 달라고하시면 됩니다.

고혈압병원 가야하는 수치일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 집에서 측정한 안정시 혈압이 이정도라고 하면 혈압약 복용을 고려해야 할것으로 생각됩니다. 진료 받아보시는 것을 권합니다

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정도의 차이가 있을 수 있지만 양안 시야 범위가 다를 수 있습니다 시야차이가 녹내장의 위험성을 모두 결정하는 것은 아니고 개인차이가 있을 것 같습니다

혀에 검붉은 반점과 통증이있는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 생긴것이라고 하면 구내염의 한 증상일 가능성이 있습니다 24주 지나도 없어지지 않으면 진료 받아보셔요.

소변스틱검사 잠혈부분 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변 스틱 검사요 스틱 검사 Urine Dipstick Test는 소변에 존재하는 다양한 물질을 간편하게 확인할 수 있는 검사법입니다. 검사 판독 시간은 제품마다 조금씩 차이가 있지만 일반적으로 다음과 같습니다. 대부분의 항목 pH 비중 백혈구 아질산염 단백질 포도당 케톤체 빌리루빈 요로빌리노겐 60초 이내 잠혈반응 60초 비타민 C 30초 검사 방법은 다음과 같습니다 소변을 채취합니다. 스틱의 시험지 부분을 소변에 12초 정도 담급니다. 스틱을 꺼내 과량의 소변을 제거합니다스틱 끝을 화장지 등에 대고 눌러줍니다. 스틱을 수평으로 하여 시간을 잽니다. 정해진 시간이 지난 후 각 항목의 색 변화를 제품에 포함된 색상표와 비교하여 판독합니다. 주의사항 검사 시간을 정확히 지켜야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 판독 시간이 지나면 결과가 부정확해질 수 있습니다.

갈색혈과 잔뇨감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 5월에 예정일보다 3주 늦게 생리했었고 계속 혈이 조금씩 묻어나오니 걱정되는군요. 산부인과 바로 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오.

진성포경과 자라고추를 지냈습니다. 어떻게 해결할 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진성포경과 자라고추를 지닌 20살 남자이군요. 진성포경과 자라고추를 치료하기 위해서 포경수술과 자라고추 교정수술이 동시에 필요합니다. 비뇨기와 내원하셔서 정확한 상담을 우선 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=USeOIZHPsJM>

피부과 정형외과 약 동시에 먹어도 되는 약인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 넵 위에서부터 비타민 A 피부 대사조율 여드름약 장운동 조절 위장약 진통제 같이드셔도됩니다 서로 상충되는 성분이 없습니다 건강하세요

이건 무슨 약인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 리릴클로나제팜입니다 신경 조율하는약으로 다양한 적응증에 씁니다 외자사 로고가 있는약구포장 없는약 지금포장 두가지가 있습니다 건강하세요

발기 시 bc근육? pc근육? 수축 문제 자동으로 힘이 들어감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 케겔 운동이라는 것을 알게 되어서 12년쯤 했는데.다가 중간에 그만뒀는데 그만두고 어느 순간 부터 발기시에 pc근육에 힘이 들어가고 힘이 한번 세게 들어가서 수축되고 금방 다시 힘이 빠지군요. 전립선염을 의심해보고 동네 비뇨기와 서울에 있는 전문 비뇨기와 둘 다 가봤는데 각종 검사를 다 해봤지만 전립선 정상이라고 하고 동네 비뇨기과에서 처방 받은 약 먹어도 그 대로이군요. 대학병원급 비뇨기와 내원하셔서 불편함에 대한 정확한 상담 받으시고 정확한 검사를 받도록 하십시오.

소변검사에서 첫소변이 아닐시 정확도가 떨어지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 컨디션이 너무 안좋을때 소변검사를 받았는데 현미경적 혈뇨가 조금 검출되었고 3일뒤에 잔뇨감이 심해 늦은시간 열린 병원에서 다시 소변검사를 받게되었는데 정상소견 나왔고 또 4일뒤에 원래 예약했던 비뇨기과에서 의도치 않게 또 소변검사를 했는데 정상나왔군요. 미세혈뇨가 다시 나오나 싶어 살짝 꺼림직하군요. 크게 걱정하지 마시고 검사 받으신 병원 주치의와 정확한 상담

을 받도록 하십시오.

성기의 성장은 언제 이루어지는 건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기의 성장은 사춘기 때 가장 크게 이루어지면 20대 초반까지도 성장이 가능합니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=UsEOIZHPsJM>

성기 아랫쪽 부분에 하얗게 오돌토돌한 무언가 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 아랫쪽 부분에 하얗게 오돌토돌한 무언가 피부에 생겼군요. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

일명 변태라고 하는 사람 치료가능한건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀하가 설명하신 증상들은 성 일탈 행동 성 중독 등의 문제로 볼 수 있습니다. 이런 행동들은 정신 건강 및 대인관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 문제는 치료가 가능한 경우가 많습니다. 전문적인 상담과 치료를 통해 증상을 개선할 수 있습니다. 주요 치료 방법으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 정신과 상담 및 심리치료 성 중독의 원인을 파악하고 건강한 행동 습관을 형성하도록 도와줍니다. 인지행동치료 왜곡된 사고 패턴을 교정하고 건전한 성 관념을 형성하도록 합니다. 약물치료 성 중독과 관련된 우울증 불안 등의 증상을 완화시키기 위한 약물 처방이 도움될 수 있습니다. 성중독 치료 프로그램 전문 치료 센터에서 진행되는 집중적인 치료 프로그램에 참여할 수 있습니다. 또한 귀하가 언급하신 알코올 중독과 성 문제는 서로 밀접한 관련이 있을 수 있습니다. 따라서 알코올 중독 치료도 병행해야 할 것 같습니다. 전문가의 도움을 받아 체계적인 치료를 받는다면 증상 개선과 건강한 생활을 회복할 수 있을 것입니다. 혼자서 힘들어하지 마시고 적극적으로 도움을 요청하시기 바랍니다.

힘빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 원인일 수도 있지만 신경과나 재활의학과 진찰은 보시면 좋겠습니다. 진찰상 의심소견이 있으면 바로 대학병원에서 근전도검사를 할 수 있도록 의뢰해 달라고하시면 됩니다.

발바닥 갈색 점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 별로 나빠보이지는 않습니다. 이전에 인지하지 못했던 점이라고 한다면 피부과 진료 한번 받아보시는 것이 좋겠습니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 저번주 목요일에 사랑니 발치를 했습니다 오늘이 수요일이니까 6일정도가 되었는데 이제 발치한쪽으로 밥먹기 발치부분살살양치 키스 성관계 모두 해도 전혀 문제없을지 여쭙고 싶습니다 저중에 하면 안 되는 게 있을까요? 문제없습니다. 과도한 것만 아니면요

이갈이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이를 장기간 갈면 아프고 시려지는데 문제가 되는게 그게 원인이 이를 갈아서 크랙이 나서 아픈경우도 있지만 이를 갈면 잇몸이 살짝 드러나면서 아픈경우도 있더라구요 그럼 이거를 잇몸질환으로 엮을 수 있는걸까요?? 보험사에서 잇몸질환은 크라운보장이 된다고하고 이갈이로 인한크라운은 보장이 안된다는데 그럼 결국 이갈이로 인해서 잇몸이 드러나서 시리고 아픈 것은 잇몸질환으로 볼 수도 있을까요?? 좋은 질문입니다. 이갈이를 하면 이가 갈리는 것도 있지만 이가 부딪히면서 뒤틀리는 힘을 받아서 잇몸 과 치가 경계면쪽 치아 표면이 깨져서 떨어져 나가게 되고 잇몸쪽 치아가 패이게 됩니다. 이렇게 되면 찬물이나 찬바람에 시림 증상이 나타나구요 엄밀히 말하면 잇몸 질환은 아닙니다.

센스데이와 페니실린계 항생제 함께 복용해도 괜찮나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 크게 상관 없습니다 걱정말고 드셔도 됩니다.

알리오 올리오 다이어트중 먹어도 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 14kg 감량하시

느라 정말 고생많으셨습니다. 파스타는 듀럼밀을 사용해 상대적으로 단백질이 높고 느리게 흡수돼 혈당을 천천히 높인다고 알려져 있습니다. 평소에 어떤 식단을 드시며 다이어트를 하는지 몰라 정확한 답변은 어려우나 잡곡밥단백질 식단 정도로 한 끼를 구성하셨다면 한 끼정도 파스타로 대체해도 무리 없어보입니다.

팔과 손 등 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 너무 무리한 신체활동으로 나타나는 증상이 의심됩니다. 따뜻한 목욕이나 반신욕 하시고 진통제를 드셔보시면 좋겠습니다. 찜질은 냉찜질이 좋을 것 같습니다

다이어트 식단 중 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다이어트 목적이라면 운동도 중요하지만 평소 식단도 중요합니다. 저녁식단의 경우 크게 문제가 없지만 삼계탕의 경우 칼로리가 높기 때문에 식단으로서는 추천드리지 않습니다

스트레칭만 하면 왼쪽 무릎만 시큰거립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에서 영상의학적인 문제가 없으셨다면 신경학적인 문제이거나 기능적인 문제를 의심할 수 있습니다. 말씀하신 내용만으로는 정확한 원인을 찾을수 없기때문에 재활운동센터나 병원내 재활센터에서 상담을 받아보시는걸 추천드립니다.

슬랩병변 재활,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어깨가 불편하시군요. 어깨의 슬랩병변은 수술을 해도 견갑골이 불안하면 결과가 좋지않은 경우가 많습니다. 그래서 미리 견갑골 주변근육 강화운동을 하는 것이 좋습니다. 고무줄이나 쉼라밴드를 이용해서 양팔 벌리기 운동플라이어나 당기기운동로잉을 하시는 것을 추천합니다. 푸시업은 견갑골이 안정되면 좋은데 잘못하면 스랩이 나빠질 수 있습니다. 감사합니다.

골반통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 통증이 없지만 누웠을때만 통증이 있는것으로 보아 척추 질환 혹은 신경 압박 가능성이 있어보입니다. 신경외과 진료 권유합니다

얼굴 피부에 여드름같은게 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주로 수염 제모 부위에 여드름처럼 올라오시나요? 깨끗한 면도날을 사용하더라도 제모 시에 수염이 나는 모낭 주변으로 상처가 생길 경우 여드름 균 등이 감염되어 여드름처럼 모낭염이 생길 수 있습니다. 또한 민감한 피부의 경우 샤워용 타월로 얼굴이나 몸을 많이 문지를 경우에도 생길 수 있으므로 최대한 부드러운 재질의 타월을 이용하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 지속적으로 재발하고 악화될 경우 근처 피부과 방문하여 진료 및 약을 처방 받으시기 바랍니다. 빠른 쾌유하시기 바랍니다.

어지러움 어떤 병원을 가야하는지 알고 싶습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심하지 않으면 가정의학과 심하면 이비인후과나 신경과 진료를 받아보시면 됩니다. 가벼운 이성증이 의심됩니다.

단안 간혈성 외사시,안녕하세요. 메디이즈입니다. 15프리즘 정도의 사시라면 수술 치료 없이 경과관찰을 하셔도 됩니다. 가까운 지인이나 가족 정도만이 알아차릴 정도의 사시라고 생각됩니다. 이마나 눈의 외상 때문에 사시가 생겼을 가능성은 적어 보입니다. 시력이 얼마인지 알 수 없어약시가 있는지 파악하기 어려우나 대개의 경우에는 근시가 심한 눈이 밖으로 돌아나가는 경향이 많으나 항상 그런 것은 아닙니다. 굴절상태에 맞게 안경을 쓰는 것이 눈이 나가는 빈도를 줄일 수 있습니다. 정확한 진단은 주변 안과에 방문하시어 사시검사를 받아 보시기 바랍니다

침고임 후비루,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직은 이비인후과 약을 더 드시면서 기다리셔야 합니다. 약 일주정도는 더 지난 후의 남은 증상을 가지고 평가를 하는게 좋습니다. 근육이 뒤틀고 다리가 무겁다면 주의깊게 경과를 보게됩니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 완전실명이 되면 사시가 발생할 수도 있고 안할 수도 있습니다. 본인이 느끼기에 시야가 확실히 차이가 난다면 뭔가 정상적인 상태가 아닐 수 있습니다. 검사가 필요합니다. 수술로 인해서 시신경에 손상을 줘서 시신경이 모양이 변했다면 아예 실명에 가까운 결과를 초래했을 가능성이 큼니다. 따라서 지금의 상태가 이전의 수술로 인한 것인지에 대해서는 가능성이 별로 없어보입니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 에이즈 매독 감염 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 감염경로가 아니니걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

헤르페스 검사시기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 3일차이면 큰 의미는없을 것 같습니다 물론 수치나 여러가지 정황을고려하셔야 하긴 합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

어지러움 어떤 병원을 가야하는지 알고 싶습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심하지 않으면 가정의학과 심하면 이비인후과나 신경과 진료를 받아보시면 됩니다. 가벼운 이성증이 의심됩니다.

관절약 부작용이 심한데 단약해도 될까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 퇴행성 관절염이 아니고 외상성에 의해 발생하고 경미하다면 진통소염제와 스테로이드 약물을 끊어도 자연 치유가 가능할 것 같습니다. 약부작용이 명확하고 일상생활에 지장을 줄 정도라면 당연히 약을 끊으셔야 합니다. 대신에 무릎에 부담을 주지 않고 충분한 휴식을 취하시는게 좋겠네요.

아랫니 2개 벌어진거는 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아랫니 가운데 2개 전치? 라고하나요? 예전에는 안그랬던거 같은데 그거 2개가 벌어져서 치아 2개 사이에 공간이 있어서 좀 보기 흉한데 이런거는 무슨방법으로 해야할까요? 충치가 있거나 이렇게 아니라서 그냥 이대로 두는게 맞을까요? 치아에 틈이 생기신 거라면 치아교정 상담을 받아보세요 방치하시면 더 나빠질 수 있습니다. 잇몸 상태도 체크해 보시구요

신경치료 중인데 타병원에서 이어서 가능할까요 ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 취업하고 시간이 아예 안맞아서 받으러 못 가는 중인데 치료 중간에 술 마셔서 씹을때마다 통증이 느껴지고 아픈데 갈 시간이 없어서 못갑니다 야간진료 하도록로 옮길 수 있겠지요 ? 추가 비용이 들긴 하겠지만 가능한 할 듯 합니다.

매독주사페니실린주사와 독시라마이신캡슐100mg 동시처방편찬을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 괜찮을 것같습니다 물론정확한 것은 진료보신 병원에서 상담받는 것 이 좋습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

피검사 수치 확인 한번 해주세요류마티스 인자 수치 항 ccp항체,안녕하세요. 메디이즈입니다. 류마티스 내과로 방문해서 지금 증상과 관련이 있는지 향후 어떤 식으로 추적관찰하는 것이 좋은지 상담을 받아보는 것이 도움이 될 것 같습니다.

아큐텍 혈당 체크 감염 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 채혈침은 한 사람에게 사용한 것을 다른 사람에게 사용해서는 안됩니다. 다른 사람의 질환이 채혈침으로 전달될 수 있습니다. 한 사람에게 사용한 채혈침을 같은 사람에게 사용했다면 별다른 문제가 없을 것으로 생각되나 일정시간 실온에 방치되어 재사용할 경우 알 수 없는 오염으로 인해 채혈 부위에 염증이 생길 수도 있습니다. 대개는 큰 문제가 없을 것이라 그다지 걱정은 안해도 되는 부분입니다.

신경주사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 상태에 따라 달라지겠습니다. 신경주사도 간격

이 보통 있습니다. 어떤 신경주사를 맞으셨는지는 모르겠지만 치료 간격에 관해서는 해당병원에 문의하시는게 좋을것 같습니다. 꾸준히 스트레칭 병행해주시면 증상 완화에 더 도움 되실겁니다. 감사합니다.

목 근육이 너무 뭉칩니다조입니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료도 중요하겠지만 평소 생활 습관 및 긴장된 근육을 풀어주는 스트레칭등을 얼마만큼 하는가가 더 중요합니다. 아침 . 점심. 저녁 시간내어서 스트레칭하시는것도 좋은 방법이지만 중간중간 시간날때마나 긴장된 근육 풀어주시는 스트레칭을 병행해주시는게 훨 좋을것 같습니다. 먼저 자기의 생활습관을 고쳐보는 연습을 하시는게 좋을것 같습니다. 감사합니다.

한쪽으로만 씹으면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정말 한쪽으로만 음식을 씹는지는 모르겠지만.. 이론적으로는 한쪽만 근육이 발달하면 얼굴이 비대칭이 될 수는 있습니다. 성장기이니 음식을 양쪽으로 골고루 씹는 습관을 들이는게 좋겠습니다.

cre 환자 접촉,안녕하세요. 메디이즈입니다. CRE균은 카바페넴계열 내성균을 말하는 균으로 가래 소변 대변을 통해 전파될 수 있습니다. 하지만 대부분의 정상 면역을 가진 사람에게는 그다지 위험이 되지 않습니다. 주로 병원내 면역이 약한 환자에게 전염시 위험하기에 격리시켜 놓는거예요. 이불만 만지고 바로 손씻고 소독했다면 전염될 가능성은 없어보이네요. 병원내 항상 손씻기가 중요한 것은.. 본인에게 감염 되는 것보다 다른 환자에게 전파시키는걸 예방하는 목적이 더 크다고 할 수 있습니다.

오메크린 2차 치료시,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옴치료제에 따라 사용방법이 다른데요. 오 크린퍼메트린 같은 경우는 한번만 사용하셔도 되고 증상이 남아있다면 12주 뒤에 한번 더 사용하는게 좋다고 되어있습니다. 완전히 다 나았다고 생각하면 1번만 하셔도 되고요. 옷은 한번만 격리시켜놔도 되는데.. 재감염을 확실히 방지하고 싶으면 2차때도 같이 봉인해두는 것도 좋겠습니다.

점액변인가요.. ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진을 보고 판단하자면 노란 빛이 띠고 끈적 거리는 점액이 섞여 있어보여서 점액변이 있는 거 같네요. 증상이 있는지는 모르겠지만.. 일시적인 장염일 가능성이 높으니 경과를 지켜보시고 혈변이나 복통이 동반된다면 소화기내과를 진료보시거나 대장내시경 검사를 받는게 좋겠습니다.

아랫배와 왼쪽 옆구리 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만 들어서는 딱 어떤 질환이라고 말하기는 어렵습니다. 우선 소변검사를 해서 혈뇨나 단백뇨 염증이 있는지 확인하는게 중요합니다. 소변검사 결과에 따라 요로결석이나 요로감염이 있는지 확인하고 이상이 없다면 비뇨기계 이상보다는 심인성 요인이나 소화기계통 이상을 확인하는게 필요합니다. 내과나 비뇨기과에서 소변검사를 먼저 받아보세요.

눈과 귀 먹먹함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경과적으로 뇌신경 이상이나 이비인후과적으로 전정신경 혹은 이석증 관련한 증상일 가능성이 있는데 해당검사를 다 진행했던 상황이라 신경이 많이 쓰이고 더 걱정이 되실 것 같습니다. 내과적으로보았을때는 말씀주신 숨겨져있는 헤르페스 혹은 대상포진 관련 증상일 가능성도 생각해보아야하고 몸에 존재하는 면역의 80 정도를 담당하는 유산균 중에서 유익균에 비해 몸에 해로운 유해균의 비율이 늘어나있을 가능성도 있을 것 같습니다. 말씀주신 증상들은 직접 진찰과 시진청진 등 진찰이 반드시 필요한 증상으로 보여 가까운 꼼꼼하게 진료가 가능한 내과를 방문한다면 도움이 될 것 같습니다.

문제 있는거 맞겠죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 미열은 없어지고 근육통만 지속되는거 같으신데요...먼저 병원에서 피검사 할때 류마티스 관련 검사도 했는지 모르겠네요....그거 한

번 확인해보시구요 일단 증상이 지속되면 다시 의사를 만나보시는게 좋을거 같습니다. 혹시 요즘 새로 시작한 운동 있으신지요? 아니면 일상에 어떤 변화는 있으신지? 아니면 안먹다가 먹기 시작한 건강기능식품등이 없는지 확인부탁드립니다. 모두 해당사항 없으면 다시 의사를 만나 추가적인 문진과 검사가 필요하다고 판단됩니다.

옴진드기 2차,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사용설명서에 나온 그대로 올려드린것입니다. 반드시 이차 치료를 해야하는 것으로 되어있지는 않으니 참고 하세요

렐바 기관지 확장제 스테로이드,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 렐바를 사용하게 되면 증상이 좋아져도 기본 3개월정도 사용을 권합니다. 부작용이 전혀 없지는 않지만 우려하는 일은 일어나지 않으니 너무 걱정하지마세요. 상용을 중단한다고 해서 바로 효과가 없어지지는 않습니다

목 근육이 너무 뭉칩니다조입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료도 중요하겠지만 평소 생활 습관 및 긴장된 근육을 풀어주는 스트레칭등을 얼마만큼 하는가가 더 중요합니다. 아침 . 점심. 저녁 시간내어서 스트레칭하시는것도 좋은 방법이지만 중간중간 시간날때마다 긴장된 근육 풀어주시는 스트레칭을 병행해주시는게 훨 좋을것 같습니다. 먼저 자기의 생활습관을 고쳐보는 연습을 하시는게 좋을것 같습니다. 감사합니다.

갈색혈과 잔노감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 5월에 예정일보다 3주 늦게 생리했었고 계속 혈이 조금씩 묻어나오니 걱정되는군요. 산부인과 바로 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오.

정형외과 선생님들은 세부전문 아니면 모르는 경우가 많나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 개인차이가 있을 수 있습니다. 상급 종합병원에서는 자기가 담당하는 부분만 진료를 하고 그외 부위는 자신이 할수 있어도 보통 해당 전문의한테 의뢰합니다

부정출혈이 심한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약 3주간 부정출혈이 지속된다면 단순 경과관찰하시기보다는 가까운 산부인과 방문하여 진료를 받아보시는게 좋을듯합니다.

발기부전 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심인성 발기부전 가능성이 높을듯하나 기저질환이 있을 가능성에 대해서도 확인이 필요하기에 가까운 비뇨기와 진료 권유합니다.

헤르페스 25일차 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 병변이 나타나지 않으면 혈액검사로 진단은 제한적일수 있습니다. 혈액검사 양성이 감염에서 회복된것인지 감염된 상태인지 구분은 어려울 수 있습니다

헤르페스 25일차 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 병변이 나타나지 않으면 혈액검사로 진단은 제한적일수 있습니다. 혈액검사 양성이 감염에서 회복된것인지 감염된 상태인지 구분은 어려울 수 있습니다

귀밑 멍울인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없이 볼록 튀어나오기만 했다면 단순 멍울 가능성이 높지만 통증이나 열감 등이 동반된다면 국소염증 가능성도 있습니다

두드러기 인가요... 알려주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 간지러우시겠네요. 냉찜질을 하시면 도움이됩니다. 제가 보기에두드러기가 맞는 것 같습니다.빨리회복하세요.

백막파열이 될 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손상이 갈정도로 심하게 돌렸다고 하면 비뇨기와 진료를 받아보시는 것이 필요하지만 증상이 없으니 괜찮으실것 같습니다

오메크린 2차 치료시,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이 약을 머리부분을 제외한 몸 전체에 마사지하듯이 펴 바르고 1214시간 후에 물로 씻어낸다. 이 약을 바를 때 손가락과 발가락 사이 손목 겨드랑이 외부 생식기와 엉덩이 사이에 특별히 주의를 기울여 바른다. 이 약을 적용한 후 8시간 이내에 손을 씻은 경우에는 손에 다시 바른다. 보통 1회 적용으로 치료된다. 치료

후에도 가려움이 있을 수 있으나 이것은 치료되지 않은 것이 아니며 살아있는 옴벌레가 보이거나 새로운 병변이 나타나는 경우에만 다시 치료한다. 재치료 할 필요가 있는 경우에는 첫 번째 적용 후 710일 후에 이 용법을 1회 더 반복한다. 2차치료를 반드시해야 하는 것은 아닙니다

목과 골반에 멍울이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이비인후과 중에서 초음파를 하는 곳에서 초음파 검사를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 계속커지고그러면 조직검사를 하기도 합니다

부정출혈이 심한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약 3주간 부정출혈이 지속된다면 단순 경과관찰하시기보다는 가까운 산부인과 방문하여 진료를 받아보시는게 좋을듯합니다.

발기부전 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심인성 발기부전 가능성이 높을듯하나 기저질환이 있을 가능성에 대해서도 확인이 필요하기에 가까운 비뇨기와 진료 권유합니다.

귀두 끝부터 전립선이 따끔거립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선염 등에 의한 증상 가능성이 있습니다. 한달 가까이 증상이 지속된다면 일시적이지 않기에 가까운 비뇨기와 진료 권유합니다

침고임 후비루,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직은 이비인후과 약을 더 드시면서 기다리셔야 합니다. 약 일주일 정도는 더 지난 후의 남은 증상을 가지고 평가를 하는게 좋습니다. 근육이 튀고 다리가 무겁다면 주의깊게 경과를 보게됩니다.

아랫니 2개 벌어진거는 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아랫니 가운데 2개 전치? 라고하나요? 예전에는 안그랬던거 같은데 그거 2개가 벌어져서 치아 2개 사이에 공간이 있어서 좀 보기 흉한데 이런거는 무슨방법으로 해야할까요? 충치가 있거나 이런게 아니라서 그냥 이대로 두는게 맞을까요? 치아에 틈이 생기신 거라면 치아교정 상담을 받아보세요 방치하시면 더 나빠질 수 있습니다. 잇몸 상태도 체크해 보시구요

귀밑 멍울인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없이 볼록 튀어나오기만 했다면 단순 멍울 가능성이 높지만 통증이나 열감 등이 동반된다면 국소염증 가능성도 있습니다

갈색혈과 잔노감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 5월에 예정일보다 3주 늦게 생리했었고 계속혈이 조금씩 묻어나오니 걱정되는군요. 산부인과 바로 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오.

정신과 약물과 피임약 같이 먹어도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

정신과 약물과 피임약 같이 먹어도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

re불안장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 환자분마다 불안장애도 다 다릅니다. 환경도 다르고 원인도 다르고 심한정도도 다 다르지만 약물치료로 도움을 많이 받으실수 있을 것으로 생각됩니다

불안장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다양한 원인이 존재하며 개개인에 따라 다르게 발병할 수 있습니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 정신과 진료 권유합니다.

온몸에 힘이 자주 없어지고 손다리가 떨리는데요...안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용 중인 약으로 볼때 ADHD 양극성장애 에 대해 치료받고 계신 듯하며 콘서트나 데파코트 복용시 흔히

나타나는 부작용은 아닌 것으로 생각됩니다. 현재 다니시는 정신과에서 이 문제에 대해서 상의해보시고 뇌전증간질 일 수 있으니 뇌파 검사를 받아보시는 것이 좋겠습니다.

화장실에서 볼일 볼 때 두근거림 120BPM,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장 관련 문제가 아니라면 자율신경계 이상증상일 수도 있습니다. 자율신경계 이상 증상은 심한 스트레스나 호르몬 변화 등에 의해서도 발생할 수 있습니다. 화장실에서만 그러한 증상이 나타난다면 폐소공포증 claustrophobia 즉 탈출하기 어려운 공간에 혼자 갇혀 있다는 생각에 불안해지는 것은 아닌지 살펴보심이 좋겠습니다.

임플란트 치료 후 항생제 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일반적으로 임플란트 시술 하면서 항생제를 복용하는 경우가 많지만 담당선생님이 항생제는 필요없다고 하시니 믿고 따르시면 될 것 같습니다

흑색종에 관하여 궁금한것이 몇개 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크기만으로 흑색종을 판단하지 않습니다. 흑색종이 의심될 경우 피부과에서 점을 제거하기 전에 조직검사를 권고할 테니 진료 보시면 됩니다.

담석증인데 오메가3 복용해도 되나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 오메가3는 담석증에 영향을 미치지 않아 필요하다면 복용해도 되겠습니다. 따라서 복용해도 문제가 되지 않습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

가슴 두드러기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부병변만 가지고 aids를 알기는 어렵습니다. 의심되는 관계가 있었다고 하면 검사를 통해서 확인해보시는 것이 좋겠습니다.

뒤통수 임파선 관련 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임파선이 크기가 커지는 경우도 있습니다. 그래도 지금당장 제거를 해야하는 상태는 아닌것 같으니 경과를 지켜보셔도 될 것 같습니다

입술필러 후 멍? 색,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 사진만으로는 명확하게 말씀드리기는 어렵습니다. 멍이 좀더 드는지 필러 자국이 있다가 없어지는 경과를 지켜보셔요

헤르페스 검사시기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스의 진단은 임상적으로 특정병변이 나타났을때 비로소 가능합니다. 증상이 없고 피검사에서 의심이되면 감염되고 회복된 상태인지 감염되어 나중에 증상이 나타날지 알 수 없습니다

피검사 수치 확인 한번 해주세요류마티스 인자 수치 항 ccp항체,안녕하세요. 메디이즈입니다. 류마티스 내과로 방문해서 지금 증상과 관련이 있는지 향후 어떤 식으로 추적관찰하는 것이 좋은지 상담을 받아보는 것이 도움이 될 것 같습니다.

손목 고름 찢 상처,안녕하세요. 메디이즈입니다. 봉합이 필요했던 상처이지만 이미 시간이 지난듯하네요. 씻어내면 다시 소독 하시고 연고 바르시는게 좋을듯합니다

가슴 통증 및 압박감 등 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이를 고려하면 심질환이 있을 가능성은 매우 드물지만 심장혈관계 호흡기계 문제가 없는 지 확인이 필요하고 이상이없다면 불안 과도한 긴장 같은 것을 의심해 볼 수 있습니다

제가 고혈압 약을 먹어야하는 수준인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 측정한 혈압이 140/100 정도가 평균이라고 한다면 약물 복용이 필요할 수 있습니다 24시간 혈압을 측정해보시는 것도 한가지 방법입니다

16개월아기 께맨부위 관리 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 다 아물었다고 하면 메디터치 같은 것 보다는 주치의 선생님과 상의를 하여 실리콘 성분의 겔이나 패치를 붙여주시는 것이 좋을 것으로 생각됩니다

손목 고름 찢 상처,안녕하세요. 메디이즈입니다. 봉합이 필요했던 상처이지만 이미 시간이 지

난듯하네요. 씻어내면 다시 소독 하시고 연고 바르시는게 좋을듯합니다

기립성저혈압 두통 진료과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두가지 모두 신경과 진료가 가능할 수 있지만 기립성 저혈압은 순환기 내과에서 진료를 받아보실 수 있을 것 같습니다.

비타민b 먹고 운동하면 안압이 덜 올라가나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비타민 B와 운동은 안압에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 하지만 건강한 생활습관을 통해 녹내장 위험 인자를 관리하는 데는 도움이 될 수 있습니다.

왼쪽눈 충혈빠른답변바랍니다.감사합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 눈 흰자위에 핏빛 줄이 충혈되었다고 하더라도 뇌의 이상을 의심하기는 무리가 있습니다. 일단 안과 진료 받아 보세요. 뇌병변이 있으면 눈 동공의 크기가 변하거나 시력이 떨어지거나 눈동자의 움직짐에 이상이오거나 시력이 떨어지기도 합니다

손바닥에 뭐가 올라왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에도 가끔 이런증상이 있었나요? 만약 그랬다고 하면 손에 물집이 잡히는 한포진 증상이 아닌가 의심스럽습니다.

피부 착색관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 살쥔때 나타나는 흑색가시세포종이라기 보다는 사진에서 보이는 병변은 어루러기에 가깝다고 생각합니다. KOH 검사 받아보श्यo 턱관절 장애 하악골? 마모 상태,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 보내주신 파노라마 사진만으로는 정확한 진단이 어렵습니다. 말씀하신 내용들을 알기 위해서는 턱관절 엑스레이 혹은 CT 나아가 디스크까지 구조물을 보려면 조영제를 정맥주사후 CT를 촬영하거나 MRI 가 필요합니다. 파노라마만 봤을때는 양쪽 턱관절 과두부위가 다른사람에 비해 얇고 좁은걸로 보아 기능적으로 불리할수 있어보이나 병적인 문제가 있다고 까지는 알 수 없습니다. 얼굴의 비대칭의 변화가 생기려면 과두가 많이 흡수되어 높이의 차이가 생겨야 할텐데 그정도는 아니걸로 보여집니다. 1차적으로 턱관절의 불편감이 느껴지면 약물치료 물리치료 스플린트 치료의 비 침습적인 치료 혹은 보톡스 턱관절 세정술등의 최소침습치료가 시행됩니다. 안좋은 습관개선 스트레스 줄이는등의 일도 중요합니다.

발바닥에 이상한 게 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부 병변의 정확한 진단을 위해서는 손대지 않은 원형그대로의 병변이 좋습니다. 손으로 뜯은것 같은데 사마귀가 아닌가 싶습니다

눈을 감고 한번더 감으려고 질끈하면 빛이보입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정상적으로도 눈에 압력이 가해지면 그런 현상이 있을 수 있습니다. 너무 걱정은 하지 마시되 계속 걱정되시면 한번 더 산동 검사를 받아보시거나 광각안저촬영을 통해서 이상 유무를 확인하시면 어떨까 싶습니다. 감사합니다.

아벨리노 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 사용하셔도 크게 상관은 없습니다. 다만 아이봉을 자주 사용하면 눈물의 보호 성분도 같이 빠져나갈 우려가 있으니 자주 사용하시는 것은 지양하시는 게 좋을 듯 합니다. 2. 딱히 피해야 할 인공눈물 성분은 없습니다. 감사합니다.

기립성저혈압 두통 진료과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두가지 모두 신경과 진료가 가능할 수 있지만 기립성 저혈압은 순환기 내과에서 진료를 받아보실 수 있을 것 같습니다.

제가 고혈압 약을 먹어야하는 수준인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 측정한 혈압이 140/100 정도가 평균이라고 한다면 약물 복용이 필요할 수 있습니다 24시간 혈압을 측정해보시는 것도 한가지 방법입니다

성인수족구인가요 땀띠인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수족구는 특징적으로 손 발 입에 병변이 생깁니다. 다른 부위에 병변이없고 엉덩이만 나타나고 다른 동반 증상이없으면 모낭염

이 아닌가 의심스럽습니다

가슴 통증 및 압박감 등 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이를 고려하면 심질환이 있을 가능성은 매우 드물지만 심장혈관계 호흡기계 문제가 없는 지 확인이 필요하고 이상이없다면 불안 과도한 긴장 같은 것을 의심해 볼 수 있습니다

신장질환병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 거품뇨가 있어서 신질환이 의심된다면 소변검사와 신장기능검사로 확인해보시는 것이 좋겠습니다. 거품뇨가 아무런 이상없는 상태에서도 나올 수 있습니다

손가락 찢림..안녕하세요. 메디이즈입니다. 파상풍은 비교적 드물게 발생하지만 최근 10년안에 접종을 하지 않으셨다고 하면 Tdap으로 접종하시는 것을 권합니다

신장질환병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 거품뇨가 있어서 신질환이 의심된다면 소변검사와 신장기능검사로 확인해보시는 것이 좋겠습니다. 거품뇨가 아무런 이상없는 상태에서도 나올 수 있습니다

게임할 때 손이 차가워집니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선 항진증에 의한 증상 가능성은 적을듯하나 한의원의 한약과 침에 대한 객관적인 자료가 없어 그로인한 증상 가능성도 확인이 필요할듯합니다.

낙상 후 뇌진탕 의심 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당시 뇌진탕은 있었겠지만 그로 인해 뇌하수체 성장호르몬 분비에 영향을 줬을 가능성은 없을듯합니다. 경과관찰하시면 될듯합니다.

양악 수술 후 불편한 증상이 있어 병원에 방문했는데 MRI로 검사를 했어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 양악 수술 후 턱 아래 부분이 통증이 조금 느껴지고 만져보면 뭔가 튀어나와 있어서 병원에 가서 CT확인 요청을 했습니다. 선생님께서는 CT촬영을 진행해서 확인해보자 하셨는데 사진찍는곳에서 착각했는지 CT가 아닌 MRI촬영을 진행했습니다. 선생님께서는 MRI 사진을 주욱 보시더니 뼈도 문제없이 잘 붙고있고 고정핀도 잘 위치해있는 것 같다. 이상이 없어보인다고 하셨는데 MRI로 이상없는지 정확한 확인이 가능한가요..? 같이 옆에서 봤는데 단층만 보여서 전 봐도 잘 모르겠던데 아직 통증도 남아있고 뭔가 찝찝한 마음에 질문드립니다. CT를 찍어보자 했으면 CT를 찍는게 맞습니다. 뼈를 보는 거라면 CT를 찍는게 맞구요.

헛바닥 이상한 물질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지난주에 구내염이 나서 알보칠을 발라 호전시켰습니다. 완전히 사라진 건 아니고 헛바닥이 맨들맨들 해지고 더 아프지 않아 뱉었는데 오늘 오후 34시쯤부터 혀에 살짝 위화감이 있었고 저녁으로 돈까스를 먹는 중부터 혀가 부어가다 이물감이 너무 심해 헛바닥을 보니 사진처럼 까만 물질이 올라왔습니다. 사진으로 봐서는 혈종Hematoma로 보입니다. 그 부위를 찢거나 상처가 나서 그 부분에 피가 차서 생기게 되구요. 며칠 경과를 보시고 줄어들지 않으면 구강내과에 한번 가보시는게 좋을 듯 합니다.

선천성 갑상선저하증 약 용량에 대해 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 제가 제대로 이해했는지 모르겠습니다만 환아는 출생 후 준임상적 갑상선기능저하증이 있었고 이를 지켜보다가 쉰록신 50mcg을 복용하기 시작한 상태인 듯 싶습니다. 준임상적 갑상선기능저하증이라는 것은 갑상선 호르몬은 정상인 상태인데 뇌에서는 갑상선 기능이 떨어진다고 생각하여 갑상선을 일하게 하는 호르몬TSH를 분비해서 높은 상태를 보통 이야기합니다. 갑상선에서 나오는 호르몬도 아닌 TSH를 갑상선 상태를 보는데 사용하는 이유는 갑상선 상태 및 전신상태에 민감하기 때문입니다. 간단하게 말하자면 갑상선 호르몬의 필요도가 높을 경우에는 TSH가 높고 별로 필요가 없을때에는 낮을 수 있습니다. 따라서 수치의 변동은 전체적으로 정상을

향해가는 일련의 과정 중에 있는 것일 수 있습니다. 결과적으로 지면으로 받은 결과값을 근거로 판단하는 저보다는 지속적으로 환자의 상태를 직접 확인하면서 판단하시는 선생님의 의견을 먼저 따르는 것이 좋을 것 같습니다. 혹시 너무 걱정이 되신다면 소아내분비과 선생님께 진료를 받으시는 것도 추천드립니다.

명상태가 어떤가요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 부딪히거나 다치지 않고 원인 없이 피부에 멍이 생길 수 있는데 혈소판 수치 괜찮았으면 큰 문제는 없습니다. 시간이 지나서 없어지는지 확인해 보세요.

달팽이 모르고 먹었어요...안녕하세요. 메디이즈입니다. 상추에 붙어있는 달팽이 먹어도 크게 지장은 없습니다. 복통이나 설사 증상 없으면 지켜보셔도 됩니다. 혹시 장염 증상이 있으면 내과 진료를 보세요.

간 기능 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쓸개즙담즙은 지방의 소화에 도움을주는 것으로 간에 붙어있는 담낭이 있고 담관을 통해 십이지장으로 흐르게 됩니다. 담낭이나 담관에 염증이 생기거나 이상이 생기면 우상복부쪽에 통증이 생기게 됩니다. 담관확장이 보인다는 것은 다양한 원인에 의해서 발생할 수 있습니다. 담석이 있거나 담관염이 있어서도 가능하고.. 담관의 운동이 저하되어도 가능합니다.

간 기능 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쓸개즙담즙은 지방의 소화에 도움을주는 것으로 간에 붙어있는 담낭이 있고 담관을 통해 십이지장으로 흐르게 됩니다. 담낭이나 담관에 염증이 생기거나 이상이 생기면 우상복부쪽에 통증이 생기게 됩니다. 담관확장이 보인다는 것은 다양한 원인에 의해서 발생할 수 있습니다. 담석이 있거나 담관염이 있어서도 가능하고.. 담관의 운동이 저하되어도 가능합니다.

B형간염 검사 결과 해석부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. HBsAg가 음성이면 항원이 없으므로 B형 간염 바이러스 감염되지 않았다는 의미 AntiHBs 양성이면 B형 간염에 대한 항체가 있다. 즉 B형 간염에 대한 면역력이 있다는 의미 입니다. 그러므로 B형 간염 백신 접종후 면역이 형성되어 있다는 뜻으로 건강한 상태입니다.

정신과 약물과 피임약 같이 먹어도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

게임할 때 손이 차가워집니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선 항진증에 의한 증상 가능성은 적을듯하나 한의원의 한약과 침에 대한 객관적인 자료가 없어 그로인한 증상 가능성도 확인이 필요할듯합니다.

흑색종에 관하여 궁금한것이 몇개 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크기만으로 흑색종을 판단하지 않습니다. 흑색종이 의심될 경우 피부과에서 점을 제거하기 전에 조직검사를 권고할 테니 진료 보시면 됩니다.

담석증인데 오메가3 복용해도 되나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 오메가3는 담석증에 영향을 미치지 않아 필요하다면 복용해도 되겠습니다. 따라서 복용해도 문제가 되지 않습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

콘돔만진손으로 두피만지면 탈모나 두피염 생기나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위를 한다고 하여 탈모나 두피염이 발생하지는 않습니다. 따라서 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

콘돔만진손으로 두피만지면 탈모나 두피염 생기나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위를 한다고 하여 탈모나 두피염이 발생하지는 않습니다. 따라서 걱정하지 않아도 되겠습니다.

답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

말초신경병증 근력 약화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말초신경병증이라고 말씀하신 진단명 자체가 환자 본인의 진정한 진단명인지 알수는 없지만 환자분을 직접 대면하지 않았다고 하더라도 척추 전반의 균형이나 콘트롤 능력등이 상당 부분 저하되어진 상태로 보이며 이러한 본인 몸의 인지 기능의 상실은 척추를 포함한 신체 전반의 과긴장 상태가 지속될 수 밖에 없고 만성화가 되면서 호흡 패턴 부전 소화 장애 과긴장 근육의 피로 축진과 경련등을 유발하고 근육근막의 만성적 문제는 근육근막과 연계를된 신경 기능 혈관 기능의 저하를 만들게 됩니다. 당연히 뇌기능 저하와 유사하게 이러한 만성적 신체 상태는 근소실로 이어질 수 밖에 없습니다. 일단은 원인적인 부분의 접근이 시간이 걸리더라도 필요하겠지만 충분한 저작 시간을 확보한 식사 습관 충분한 수분섭취 체력이 허락하는 범위내에서 척추 정렬을 유지한 상태에서의 하체 지지력의 균형을 확인하는 보행연습 수면 시간 확보등이 중요할 겁니다. 약은 약일 뿐입니다. 증상개선에 일부 도움이 될수도 있지만 치료는 아니니까요.

렉사스타정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알코올 이 약과 알코올은 어떠한 약물동태학적 또는 약물동력학적 상호작용이 예상되지는 않는다. 그러나 다른 정신작용성 약물들과 마찬가지로 이 약은 알코올과는 병용하지 않는 것이 좋다. 라고 설명서에 적힌 그대로 가져왔으니 금주 부탁드립니다

이 약들 동시 복용하려는데 가능한 약들인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위보호제와 감기약 같이 복용하면 감기약의 효능이 조금 떨어질 수 있기에 30분 정도 간격을 유지하는 것이 좋겠습니다 현재 복용중인 전문약이 조합이 괜찮으니까 처방약을 식전에 드시고 감기약은 식후에 복용하면 시간조절이 될 것입니다

영양제 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무슨 목적으로 드시는지가 궁금합니다 그리고 인터넷으로 구매하신 것이라면 그 원료가 제대로 된 것인지도 확인 잘 해주세요 3가지 같이 복용해도 크게 문제는 없습니다만 밤 늦게 복용시 잠이 안 올 수 있으니 그것만 주의해주세요

착상혈엔 찌꺼기가 안나오나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질 분비물이 배란혈인지 착상혈인지를 육안으로 구분하기는 어렵습니다. 그래서 임신 여부를 증상으로 확인하기 어려운 것입니다. 임신이 의심되는 경우 추후 임신테스트기를 통해 확인해보시는 것이 더 정확합니다.

혀에 검은점 다시 질문 드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 글썄요 그다지 악성으로는 보이지 않습니다 가까운 이비인후과에 가서 촉진까지 같이 해보는게 더 도움이 될 듯 합니다. 너무 걱정하지 마세요

혀 밑 붉은점들,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아닙니다 침샘 부위에 있는 혈관들이 커지거나 하면 그렇게 보일 수 있습니다 너무 불안해도 됩니다. 통증이 없으면 더더욱 걱정마세요

경구피임약 효과시기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약을 처음 복용하기 시작하였다고 하면 적어도 복용시작후에 일주일의 지나야 하는것으로 알려져 있습니다.

혓바닥 검은색 점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진과 같은데 왜그런걸까요? 흡연하지 않습니다. 사진만으로 정확한 판단이 어렵지만 정상적인 상태로 보입니다.

혓바닥 검은점?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증은 없고 오늘 우연히 보았는데 이게 무서워요? 병원에 가봐야하나요? 흡연하지 않습니다. 정상적인 상태로 보입니다.

사구체여과율 egfr gfr,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사구체 여과율을 구하는 공식은 여러가지가 있습니다. 어떤 계산식을 사용했는지에 따라 조금씩 차이가 있을 수 있지만 80 이상이라면 걱정하지 않아도 됩니다.

혓바닥 검은색 점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진과 같은데 왜그런걸까요? 흡연하지 않습니다.

니다. 사진만으로 정확한 판단이 어렵지만 정상적인 상태로 보입니다.

햇바닥 검은점?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증은 없고 오늘 우연히 보았는데 이게 무슨 까요? 병원에 가봐야하나요? 흡연하지 않습니다. 정상적인 상태로 보입니다.

혈액검사 신장기능 검사하려면 공복에 해야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지질검사나 혈당검사가 아니고 신장기능 검사만 하신다면 반드시 공복에 할 필요는 없습니다. 공복상태 여도 물을 마시는 것은 대부분 상관 없습니다.

머리카락을 먹으면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 머리카락과 같은 유기물은 작고 날카로우도 문제를 일으킬 가능성이 낮습니다. 소화되지 않겠지만 점막은 점액으로 보호받고 있기 때문에 장에 쏘일 가능성이 거의 없고 변으로 배설됩니다. 다량의 머리카락을 지속적으로 삼킨다면 문제가 되지만 일시적인 경우 걱정하실 필요는 없습니다.

햇바닥 검은색 점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진과 같은데 왜그런걸까요? 흡연하지 않습니다. 사진만으로 정확한 판단이 어렵지만 정상적인 상태로 보입니다.

B형간염 검사 결과 해석부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. HBsAg가 음성이면 항원이 없으므로 B형 간염 바이러스 감염되지 않았다는 의미 AntiHBs 양성이면 B형 간염에 대한 항체가 있다. 즉 B형 간염에 대한 면역력이 있다는 의미 입니다. 그러므로 B형 간염 백신 접종후 면역이 형성되어 있다는 뜻으로 건강한 상태입니다.

가슴 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가정의학과나 내과 진료 받아보시면 될것 같습니다 30대 여성에서 흉통의 원인은 다양할 수 있습니다. 가능한 원인들은 다음과 같습니다 근골격계 문제 근육통 특히 흉벽의 근육 늑연골염 갈비뼈와 흉골을 연결하는 연골의 염증 척추 질환 경추 또는 흉추 질환 소화기계 문제 위식도역류질환 GERD 식도염 소화성 궤양 담낭 질환 심혈관계 문제 관상동맥 질환 심근경색 협심증 심낭염 심장 주위 막의 염증 대동맥 박리 폐색전증 호흡기계 문제 폐렴 기흉 폐 허탈 기관지염 정신적 요인 공황 발작 불안 장애 기타 원인 대상포진 유방 질환 빈혈 30대 여성에서는 심혈관계 문제보다는 근골격계나 소화기계 문제가 흉통의 더 흔한 원인이지만 심각한 원인을 놓치지 않기 위해 주의 깊은 평가가 필요합니다.

엉덩이 쭈심 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사가 정확하지 않던지 다른문제가 동반되어 있던지입니다. 처음에는 이상근에 식염수를 위주로 한 주사를 하고 호전이 없으면 스테로이드를 혼합하여 주사를 하기도 합니다

박종원 선생님...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 빈혈에 의한 증상은 나타나지 않을 수치입니다. 질문 내용이 정확히 기억나지는 않지만 아마도 어지러움의 원인은 다른것을 찾으셔야 합니다.

혀 밑 붉은점들,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아닙니다 침샘 부위에 있는 혈관들이 커지거나 하면 그렇게 보일 수 있습니다 너무 걱정안해도 됩니다. 통증이 없으면 더더욱 걱정마세요

비문증 증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 폰을 오랫동안 보는 것이 비문증 갯수증가의 직접적인 원인이라고 말하기는 어렵습니다. 하지만 과도하게 오랜시간동안 눈을 사용하여 눈을 혹사하는 수준이라면 영향을 줄 수는 있습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

경구피임약 효과시기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약을 처음 복용하기 시작하였다고 하면 적어도 복용시작후에 일주일의 지나야 하는것으로 알려져 있습니다.

햇빛 시력 망막 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 건물 유리자체가 빛의 투과를 어느 정도 막아주기 때문에 눈에 큰 문제가 생겼을 가능성은 낮아보입니다. 시력저하나 눈불편감이 있다면 안과진료를 한번 보시기 바랍니다. 감사합니다.

썬지로이드 졸로푸트 프로베라 같이 복용해도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물에 대

한 이상반응은 개인차이가 커서 다양하게 나타날수 있어 예상이 어려우나 큰문제없이 같이 복용하실 수 있을것으로 생각합니다

영당이 쭉심 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사가 정확하지 않던지 다른문제가 동반되어 있던지입니다. 처음에는 이상근에 식염수를 위주로 한 주사를 하고 호전이 없으면 스테로이드를 혼합하여 주사를 하기도 합니다

페노피브레이트 문의 약국에서도 잘 몰라요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파이브레이트를 드시면 담석이 생길 가능성이 높아집니다. 다른 방법으로 중성지방이 떨어지지 않으면 이약을 사용해야 할것 같습니다

얼리 임신테스트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신테스트기는 관계 후 1014일 정도 후부터 결과를 얻을 수 있습니다. 11일 후에 검사를 시행하셨고 바르게 확인하셨다면 음성이라고 보아도 됩니다. 불안하시면 추가로 임신테스트기를 확인해보시면 됩니다. 또 우울증도 생리지연의 원인이 될 수 있습니다.

임파선염 종기 방치해도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 턱에서 만져지는 종괴에 대해 여러 진료를 받으셨고 결론적으로 과거 임파선염을 앓았던 흔적이 만져지는 상황이라면 추가적인 처치는 필요치 않습니다. 위험한 병변도 아니고 대개 증상을 유발하지도 않기 때문입니다. 물론 통증이 지속된다거나 불편한 증상이 반복되면 수술로 제거를 고려할수도 있습니다.

울트라셋이알세미서방정 부작용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 넵 올라셋 류는 울렁거림 어지럼증 유발이 흔한약입니다 다만 세미는 원래 초기용량보다 절반약이고 처음에 쓸 수 있는약입니다 부작용이 심하면 중단하셔도되고 보통은 다음날되면 괜찮아집니다 건강하세요

검사결과 알려주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 좌측 발목 관절에 약간의 관절염이 보인다. 2. 좌측 발꿈치뼈에 표지자의 증가된 흡수가 보인다. 외상에 의한 변화로 추정된다. 3. 좌측 발목뼈들에 약간의 반응성 변화가 보인다. 약간의 염증이 추정된다는 정도의 해석이 가능합니다. 4. 이외에 뼈에 두드러진 병변은 없다.

경구피임약 효과성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 5일차에는 배란가능성이 거의 없어 임신가능성은 적습니다 피임약의 효과는 최근 7일이상 약효농도 유지를 통한 여포성숙배란과정의 억제라 그렇게 설명하는것이고 너무 걱정하지 않으셔도됩니다 2주뒤에 임테기만 해보시면됩니다 건강하세요

정맥주사 맞은 곳이 땀땀하고 아파요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정맥주사 맞은 부위가 단단하게 만져지는 부위에 혈관염이 발생했던 것으로 추정됩니다. 반복된 주사로 유발되었을 수 있겠고 말씀하신대로 해당 혈관이 막혔을수도 있습니다. 하지만 표재정맥은 거미줄처럼 얇혀 있어서 정맥이 일부 막힌 것이 문제를 일으키지는 않습니다. 또 막힌 정맥을 굳이 해결하겠다고 노력하는 것이 오히려 위험한 일이 될 수 있어서 처치를 하지 않는편입니다. 정맥주사는 사진에서 관찰되는 남아있는 다른 혈관으로 투약할 수 있을테니 너무 염려하지 않으셔도 괜찮습니다.

장염 치료 중 혈변이 나왔어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장염이 심해서 출혈도 있으신것으로 생각합니다. 출혈이 계속되면 검사가 좀더 필요할 수 있습니다. 빨리회복하세요

설사가 심해서 급속 수액주사 맞았는데 신장기능이 걱정입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈수에 의해서 급성신손상이 올 수 있습니다. 갈색뇨는 탈수에 의해서도 나타날 수있고 그 외 근손상으로 인해서도 나타날 수 있습니다. 둘 다 급성신손상을 일으킬 수 있습니다. 혈액검사를 통해 신장기능상태를 확인 할 수 있으니 신장내과 진료를 보시고.. 혈액검사를 통해 신

장기능과 전해질 수치를 확인받으시는게 좋겠습니다.

장염인데 스카이정이란 약을 받았어요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 해당약은 약한 장염에 쓸 수 있습니다 부스판 플러스 카피약으로 위장관운동을 진정시켜 덜아프게 하는약과 타이레놀이 복합으로 들어있는약입니다 다만 열이 있거나 변들거리는 설사가 있으면 병원처방을 받으시는게 좋습니다 약국장염약이 안전한대신에 약합니다 건강하세요

동시에 약도 먹는다고 효과가떨어지는건아닌거죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두 약의 기전이 달라서.. 커버할 수 있는 병원균의 스펙트럼은 넓어지게 됩니다. 약효과도 어느정도 서로 영향을 줄 수 있어서.. 개인차가 있겠지만.. 약효과가 증가하기도 감소하기도 합니다. 보통은 매독치료에 페니실린 치료가 우선이고 단독으로 치료한다고 알고 있는데요. 최근경향이 어떻게 변화가 되었는지는.. 감염내과 전문의를 만나 상담받으시는게 좋겠네요. 개인적으로는 페니실린만 치료 받는게 좋을 것 같습니다.

매독주사페니실린주사와 독시라마이신캡슐100mg 동시처방괜찬을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잠복매독이시라면 페니실린 주사 주 1회로 3주간 총 3번을 맞으면 되는데요. 독시이신독시사이클린은 페니실린 계열은 아니지만 보통 페니실린 알러지가 있을때.. 페니실린 대신에 처방하게 됩니다. 페니실린 단독으로 해도 충분할 것 같습니다. 동시에 처방된 것에 대해서는 담당 선생님과 상담을 해보시는게 좋겠습니다.

매독주사페니실린주사와 독시라마이신캡슐100mg 동시처방괜찬을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 독시라마이신캡슐은 페니실린계열의 항생제가 아닙니다. 테트라사이클린계 항생제로 분류되며 페니실린과는 다릅니다. 다만 독시라신과 같은 약은 페니실린을 사용하기 어려운 경우에 대체제로 선택되는 편이라서 두 항생제가 동시에 사용되는 데에는 무언가 이유가 있을 것 같고 이 부분 처방하신 주치의에게 문의를 해보시는게 좋겠습니다.

매독주사페니실린주사와 독시라마이신캡슐100mg 동시처방괜찬을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 독시라마이신캡슐은 페니실린계열의 항생제가 아닙니다. 테트라사이클린계 항생제로 분류되며 페니실린과는 다릅니다. 다만 독시라신과 같은 약은 페니실린을 사용하기 어려운 경우에 대체제로 선택되는 편이라서 두 항생제가 동시에 사용되는 데에는 무언가 이유가 있을 것 같고 이 부분 처방하신 주치의에게 문의를 해보시는게 좋겠습니다.

매독주사페니실린주사와 독시라마이신캡슐100mg 동시처방괜찬을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 괜찮을 것 같습니다 물론정확한 것은 진료보신 병원에서 상담받는 것 이 좋습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

비문증 증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 폰을 오랫동안 보는 것이 비문증 갯수증가의 직접적인 원인이라고 말하기는 어렵습니다. 하지만 과도하게 오랜시간동안 눈을 사용하여 눈을 혹사하는 수준이라면 영향을 줄 수는 있습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

헤르페스 검사시기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 3일차이면 큰 의미는없을 것 같습니다 물론 수치나 여러가지 정황을고려하셔야 하긴 합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

통풍 음식 관련 질문있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 통풍으로 인한 통증시 진통소염제를 복용하셔도 됩니다. 퓨린이 많은 음식인 고기나 생선같은 해산물도 피하셔야 합니다. 목살이나 육류는 최소한으로 드시거나 피하는 것이 좋겠네요. 술알콜도 요산 수치를 증가시키고 통풍을 악화시키니 조심하시는게 좋겠습니다. 수분 섭취를 많이하셔서 요산 배출하여 통

풍 발작을 예방하는데 도움이 될 수 있습니다.

혈액검사 신장기능 검사하려면 공복에 해야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지질검사나 혈당검사가 아니고 신장기능 검사만 하신다면 반드시 공복에 할 필요는 없습니다. 공복상태 여도 물을 마시는 것은 대부분 상관 없습니다.

통풍 음식 관련 질문있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통풍으로 인한 통증시 진통소염제를 복용하셔도 됩니다. 퓨린이 많은 음식인 고기나 생선같은 해산물도 피하셔야 합니다. 목살이나 육류는 최소한으로 드시거나 피하는 것이 좋겠네요. 술알콜도 요산 수치를 증가시키고 통풍을 악화시키니 조심하시는게 좋겠습니다. 수분 섭취를 많이하셔서 요산 배출하여 통풍 발작을 예방하는데 도움이 될 수 있습니다.

신경주사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 상태에 따라 달라지겠습니다. 신경주사도 간격이 보통 있습니다. 어떤 신경주사를 맞으셨는지는 모르겠지만 치료 간격에 관해서는 해당병원에서 문의하시는게 좋을것 같습니다. 꾸준히 스트레칭 병행해주시면 증상 완화에 더 도움 되실겁니다. 감사합니다.

간 기능 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쓸개즙담즙은 지방의 소화에 도움을주는 것으로 간에 붙어있는 담낭이 있고 담관을 통해 십이지장으로 흐르게 됩니다. 담낭이나 담관에 염증이 생기거나 이상이 생기면 우상복부쪽에 통증이 생기게 됩니다. 담관확장이 보인다는 것은 다양한 원인에 의해서 발생할 수 있습니다. 담석이 있거나 담관염이 있어서도 가능하고.. 담관의 운동이 저하되어도 가능합니다.

B형간염 검사 결과 해석부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. HBsAg가 음성이면 항원이 없으므로 B형 간염 바이러스 감염되지 않았다는 의미 AntiHBs 양성이면 B형 간염에 대한 항체가 있다. 즉 B형 간염에 대한 면역력이 있다는 의미 입니다. 그러므로 B형 간염 백신 접종후 면역이 형성되어 있다는 뜻으로 건강한 상태입니다.

사구체여과율 egfr gfr,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사구체 여과율을 구하는 공식은 여러가지가 있습니다. 어떤 계산식을 사용했는지에 따라 조금씩 차이가 있을 수 있지만 80 이상이라면 걱정하지 않아도 됩니다.

사구체여과율 egfr gfr,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사구체 여과율을 구하는 공식은 여러가지가 있습니다. 어떤 계산식을 사용했는지에 따라 조금씩 차이가 있을 수 있지만 80 이상이라면 걱정하지 않아도 됩니다.

머리카락을 먹으면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 머리카락과 같은 유기물은 작고 날카로워도 문제를 일으킬 가능성이 낮습니다. 소화되지 않겠지만 점막은 점액으로 보호받고 있기 때문에 장에 꽃힐 가능성이 거의 없고 변으로 배설됩니다. 다량의 머리카락을 지속적으로 삼킨다면 문제가 되지만 일시적인 경우 걱정하실 필요는 없습니다.

장염 치료 중 혈변이 나왔어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장염이 심해서 출혈도 있으신것으로 생각됩니다. 출혈이 계속되면 검사가 좀더 필요할 수 있습니다. 빨리회복하세요

체중이 자꾸 빠집니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 별다른 이유없이 체중이 계속줄면 혹시 다른 원인이 있는지 찾기위한 추가 검사가 필요할 수 있습니다. 주치의 선생님과 상의해보셔요 체중이 자꾸 빠집니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 별다른 이유없이 체중이 계속줄면 혹시 다른 원인이 있는지 찾기위한 추가 검사가 필요할 수 있습니다. 주치의 선생님과 상의해보셔요

혈액검사 신장기능 검사하려면 공복에 해야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지질검사나 혈당검사가 아니고 신장기능 검사만 하신다면 반드시 공복에 할 필요는 없습니다. 공복상태 여도 물을 마시는 것은 대부분 상관 없습니다.

스텐트 시술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 관상동맥 스텐트 시술을 한 뒤에 혈관 내벽에 세포가 증식하거나 혈전에 의해 재협착이 생길 수 있습니다. 특히 스텐트 처음 삽입하고 1년 이내에 재협착이 생기는 경우가 많아서 보통은 1년 뒤에 관상동맥조영술로 다시 확인을 해봅니다. 협심증이 다시 심해지면 언제든지 다시 검사를 받아보셔야 합니다.

간 기능 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쓸개즙담즙은 지방의 소화에 도움을주는 것으로 간에 붙어있는 담낭이 있고 담관을 통해 십이지장으로 흐르게 됩니다. 담낭이나 담관에 염증이 생기거나 이상이 생기면 우상복부쪽에 통증이 생기게 됩니다. 담관확장이 보인다는 것은 다양한 원인에 의해서 발생할 수 있습니다. 담석이 있거나 담관염이 있어서도 가능하고.. 담관의 운동이 저하되어도 가능합니다.

B형간염 검사 결과 해석부탁드립니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. HBsAg가 음성이면 항원이 없으므로 B형 간염 바이러스 감염되지 않았다는 의미 AntiHBs 양성이면 B형 간염에 대한 항체가 있다. 즉 B형 간염에 대한 면역력이 있다는 의미 입니다. 그러므로 B형 간염 백신 접종후 면역이 형성되어 있다는 뜻으로 건강한 상태입니다.

인공눈물은 증상이 없으면 안넣어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 없으면 안넣으셔도 됩니다. 안구건조증으로 실명이 되는 경우는 거의 없다고 알고 계시면 되고 설령 실명의 원인이 안구건조증이라고 해도 본인이 모르게 진행하거나 하지는 않습니다. 시리거나 뻑뻑하거나 하는 증상이 없을 때도 넣어야 하는 경우는 안구건조증 때문에 시야가 흐려지거나 지속적으로 침침하고 잘 안보이는 증상이 있을 때 정도 입니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다.

지속적으로 옆에서 들어온 햇빛 망막 건강 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실내에서 반사된 햇빛이 눈에 해가 되거나 하지는 않습니다. 눈이 피로해질 수는 있어도 장기적으로 신경이나 망막 쪽에 손상을 주지 않습니다. 녹내장에도 영향이 없구요. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

샤워기 수압 눈꺼풀 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 샤워기 수압이 아무리 강하더라도 눈꺼풀을 쳐지게 할 정도의 손상을 일으키지는 않습니다. 눈을 뜨게하는 눈꺼풀의 근육이 눈꺼풀 올림근인데요 오랫동안 눈을 강하게 비비면 손상이 있을 수도 있지만 외부의 단순 자극에 의해서는 거의 손상되지 않습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

동시에 약도 먹는다고 효과가떨어지는건아닌거죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두 약의 기전이 달라서.. 커버할 수 있는 병원균의 스펙트럼은 넓어지게 됩니다. 약효과도 어느정도 서로 영향을 줄 수 있어서.. 개인차가 있겠지만.. 약효과가 증가하기도 감소하기도 합니다. 보통은 매독치료에 페니실린 치료가 우선이고 단독으로 치료한다고 알고 있는데요. 최근경향이 어떻게 변화가 되었는지는.. 감염내과 전문의를 만나 상담받으시는게 좋겠네요. 개인적으로는 페니실린만 치료 받는게 좋을 것 같습니다.

이상지질혈증 의심이 나와 병원에 가려고 하는데 피검사를 또 하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네. 이상지질혈증이 의심되어 병원에 가신다면 추가적인 검사를 하면 더 도움일 될 것 같네요. 공복상태로 병원에 가시는게 좋겠습니다.

설사가 심해서 급속 수액주사 맞았는데 신장기능이 걱정입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈수에 의해서 급성신손상이 올 수 있습니다. 갈색뇨는 탈수에 의해서도 나타날 수있고 그 외 근손상으로 인해서도 나타날 수 있습니다. 둘 다 급성신손상을 일으킬 수 있습니다. 혈액검사를 통해 신장기능상태를 확인 할 수 있으니 신장내과 진료를 보시고.. 혈액검사를 통해 신장기능과 전해질 수치를 확인받으시는게 좋겠습니다.

매독주사페니실린주사와 독시라마이신캡슐100mg 동시처방편찬을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잠복매독이시라면 페니실린 주사 주 1회로 3주간 총 3번을 맞으면 되는데요. 독시이신독시사이클린은 페니실린 계열은 아니지만 보통 페니실린 알려지가 있을때.. 페니실린 대신에 처방하게 됩니다. 페니실린 단독으로 해도 충분할 것 같습니다. 동시에 처방된 것에 대해서는 담당 선생님과 상담을 해보시는게 좋겠습니다.

철분제를 계속 먹어야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 빈혈의 혈색소 수치가 얼마인지 궁금합니다. 하지불안 증후군은 진단이 어렵지는 않으며 검사가 아니라 진찰과 치료반응으로 대부분 진단이 가능하니 가까운 신경계통 병원을 가보시고 디오민이 증상이 도움이 될 것 같지는 않습니다.

숨 쉬기가 불편해요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시라도 심리적으로 긴장을 많이하거나 걱정이 많거나 불안하면 그러실수 있습니다. 그렇지 않다면 snepi주사를 맞아보실수 있을 것 같습니다

어렸을 때 물린 개 광견병,안녕하세요. 메디이즈입니다. 광견병의 잠복기는 보통 몇 주에서 몇 개월까지 다양합니다. 드물게는 몇 년에 이를 수 있습니다. 하지만 10년 이상 잠복하는 경우는 매우 드뭅니다. 초기 증상으로는 발열 두통 피로 근육통 등 비특이적인 양상을 보이고 진행하게 되면 신경계 증상까지 나타나게 됩니다. 전혀 증상이 없으므로 발병하지 않은 상황이라 볼 수 있겠습니다.

크론병일 확률이 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크론병같은 염증성 장질환도 만성 설사를 일으킬 수 있지만 그 외에도 다양한 원인에 의해서 설사가 발생할 수 있습니다. 그중 과민성대장증후군이 가장 가능성이 높아 보이네요. 과민성대장증후군도 원인은 다양하기에.. 일단 섬유질이 많이 포함한 음식과 장에 좋은 유산균을 섭취해보는게 좋겠습니다. 그래도 크론병같은 염증성장질환여부를 알고싶다면 대장내시경 검사를 해봐야 알 수 있습니다.

식사시 에이즈나 매독 감염 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 감염 가능성은 없으니 걱정안하셔도 될것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

철분제를 계속 먹어야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 빈혈의 혈색소 수치가 얼마인지 궁금합니다. 하지불안 증후군은 진단이 어렵지는 않으며 검사가 아니라 진찰과 치료반응으로 대부분 진단이 가능하니 가까운 신경계통 병원을 가보시고 디오민이 증상이 도움이 될 것 같지는 않습니다.

구강 관련 답변주신것 감사합니다. 2차,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구강암보다는 단순 구내염 가능성이 더 높습니다. 병변이 커지지 않는다면 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

구강암일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구강암보다는 단순 구내염 가능성이 더 높습니다. 병변이 커지지 않는다면 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

30대 사구체여과율 저하,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구토 설사를 했다면 탈수로 인해 사구체 여과율이 저하되어 나타날 수 있는데 60 이상일 경우 기능에는 문제가 없어 추후 재검해 보시기 바랍니다.

방금 설소대 손상 답변받은 사람입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 불편함이 없다면 지켜 보아도 됩니다. 미관상 문제가 있거나 식사시 불편감이 있다면 제거를 하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

발기부전 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인은 종합적인 것 같네요 탈모약과 남성호르몬 하락 성기 내 혈류저하 등등.. 발기부전의 가장 흔한 원인은 성기 내로 혈류가 원활하지 않을때 발생합니다. 도플러 초음파가 가능한 비뇨기과 방문하여 검사를 받아보시는게 좋겠네요. 비그라도 효과가 좋지만.. 그 외에도 호르몬 치료나 다른 약물도 있으니 비뇨기과 선생님과 잘 상담받으시기 바랍니다.

식사시 에이즈나 매독 감염 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 감염 가능성은 없으니 걱정안하셔도 될것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

옴진드기 가족,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옴진드기는 피부를 긁어낸 샘플을 보고 진단을 하는데.. 여러번 검사해도 발견이 안되는 경우도 많습니다. 연고를 바르고 가려움이 좋아졌다면 옴일 가능성이 매우 높습니다. 가족분들이 지금 무증상이어도 치료를 하지 않으면 재감염률이 높으므로 꼭 가족들도 같이 치료를 하시는게 좋겠네요.

골반통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 통증이 없지만 누웠을때만 통증이 있는것으로 보아 척추 질환 혹은 신경 압박 가능성이 있어보입니다. 신경외과 진료 권유합니다

크론병일 확률이 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크론병같은 염증성 장질환도 만성 설사를 일으킬 수 있지만 그 외에도 다양한 원인에 의해서 설사가 발생할 수 있습니다. 그중 과민성대장증후군이 가장 가능성이 높아 보이네요. 과민성대장증후군도 원인은 다양하기에.. 일단 섬유질이 많이 포함한 음식과 장에 좋은 유산균을 섭취해보는게 좋겠습니다. 그래도 크론병같은 염증성장질환여부를 알고싶다면 대장내시경 검사를 해봐야 알 수 있습니다.

갑자기 다리가 붓고 피곤해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리가 붓고 혈액순환이 안되신다면 다리에 혈액순환이 잘되는지 다리혈관초음파도플러 초음파 검사를 해보시는게 좋겠습니다. 수면부족으로 피로감이 있을때 일시적으로도 나타날 수 있으니 먼저 휴식을 취하시면서 증상이 개선되는지 확인해보시기 바랍니다.

명치 통증?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 명치부위의 불편감은 위염 식도염에 의한 것일 가능성이 높으니 위장약을 복용해보고 며칠 경과를 보셔도 될 것 같습니다. 평소 예민한 성격이라지만 맥박이 자주 빠르고 혈압의 변동이 심하시다면 정신과에 상담하여 항불안제를 처방받는게 좋을 것 같네요.

동맥경화도 검사정상인데 협심증 걸리나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동맥경화와 협심증은 비슷한듯하지만 다른 질환이라고 보시면 됩니다. 혈관경화가 아닌 막힌것이 협심증이라 생각하시는게 좋습니다.

심장 부정맥 조기수축질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥에는 여러가지 원인에 의해 발생하였다가 없어지기도 하는데요. 심장초음파상 이상이 없다는 것은 심장에 구조적으로 이상이 없어서 심장의 구조적이상에 의해 유발된 부정맥이 아니니 안심하셔도 될 것 같습니다. 알콜이나 스트레스에 의해서도 일시적으로 부정맥 증상이 나타날 수 있는데요. 대개 시간이 지나면 저절로 회복되는 경우가 많습니다. 하지만 자주 발생하거나 증상이 심한 경우에는 순환기내과 진료를 보시고.. 필요시 24시간 심전도검사를 해보시면 정확하게 진단 받을 수 있습니다.

재질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파나정 솔젠정 락오캡슐 제이알스로신정과 소티논 동시복용은 가능할 것으로 생각되나 여러가지 약을 동시에 복용해야 하는 경우아니면 시급한 문제에 관한 치료를 먼저하시는 것을 권합니다

샤워기 수압 눈꺼풀 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 샤워기 수압이 아무리 강하더라도

도 눈꺼풀을 쳐지게 할 정도의 손상을 일으키지는 않습니다. 눈을 뜨게하는 눈꺼풀의 근육이 눈꺼풀 올림근인데요 오랫동안 눈을 강하게 비비면 손상이 있을 수도 있지만 외부의 단순 자극에 의해서는 거의 손상되지 않습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

테리손 크림 사용 기간 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 많이 좋아지셨고 약도 드시고 있으니 연고는 하루 한번정도 바르시다가 서서히 줄여 나가시는 것을 권해드립니다.

왼쪽손에 힘을 주면 손이 떨립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 해당 정보만으로 파킨슨을 의심하기에는 무리가 있어보입니다만현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 신경과 진료 권유합니다.

감기약 40알 및 정신과약 과다복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용한 약제에 따라 다를 수 있으나 급하게 치료할 것은 없어도 대증요법은 가능하기에 많이 힘들다면 응급실 진료는 가능합니다. 정신과 치료도 필요할듯합니다

내일 모레 병원가도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상으로는 어떤상태인지 확실히 구분이 되지 않습니다. 염증이 심한거 같은데 병원에 방문하셔서 항생제 치료 받으시기 바랍니다.

감기약 40알 및 정신과약 과다복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 응급실에서 현재 상황에 제대로 치료라는게 있지는 않을듯하지만 최소한의 혈액검사 정도는 해 보시는게 좋을듯합니다.

헤르페스 아니면..전립선염 비특이증상에 관해서 질문 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. IgG 검사가 음성이므로 처음부터 헤르페스 감염은 없었습니다. 만약 신경절 문제가 의심된다면 대상포진과 증상이 유사합니다. 단순포진 바이러스는 국소적 증상이 있지 말씀하신 것처럼 하지 전체에 증상이 나타나지 않습니다. 그리고 말씀하시는 증상은 전립선염과는 어느정도 겹치기는 하지만 허리 디스크 증상과 거의 일치합니다. 손끝이 저린증상은 신경성 또는 목디스크 동반도 의심됩니다. 신경과에 방문하셔서 근전도 검사와 정형외과나 신경외과에서 허리 디스크 검사 받아보시기 바랍니다. 항문주위에 발생하는 발진은 모낭염일 가능성이 높고 스왑검사는 의미가 없습니다. 모든 증상을 성병으로 몰아가실 필요 없습니다.

애크논 크림 코 점막에 묻으면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 애크논 크림이 코 안쪽으로 들어가서 점막에 노출되었다고 하더라도 말씀하신 발열 두통 인후통과 같은 증상의 원인이 된다고 보긴 어렵습니다. 다른 이유로 나타난 증상이라 보이고 호흡기 바이러스 감염증이 의심되니 내과나 이비인후과를 방문하시면 됩니다.

감기약 40알 및 정신과약 과다복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 약제들인지 몰라도 일부 약제에 의해서는 간손상 등이 야기될 수도 있어 최소한의 검사는 받아보시는게 좋을듯합니다.

숨 쉬기가 불편해요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시라도 심리적으로 긴장을 많이하거나 걱정이 많거나 불안하면 그러실수 있습니다. 그렇지 않다면 snepi주사를 맞아보실수 있을 것 같습니다

감기약 40알 및 정신과약 과다복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 응급실에서는 응급처치만 하는 곳 입니다. 지금 몸이 안좋으면 응급실 방문을 고려하시는 것을 권합니다. 정신건강의학과에서 입원치료가 필요할 것으로 생각됩니다

스트레칭을 하면 왼쪽 무릎만 시큰거립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반복적으로 동일한 위치에 비슷한 양상이 나타나고 있고 1년 이상 지속되는 상황입니다. 진료 당시 별다른 문제가 보이지 않았더라도 추가 진료가 필요한 상황입니다. 따라서 정형외과를 한번 더 방문하시기 바랍니다.

착상혈엔 찌꺼기가 안나오나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질 분비물이 배란혈인지 착상혈 인지를 육안으로 구분하기는 어렵습니다. 그래서 임신 여부를 증상으로 확인하기 어려운 것입니다. 임신이 의심되는 경우 추후 임신테스트기를 통해 확인해보시는 것이 더 정확합니다.

미열 질문이요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신대로 열이 조금씩 나는 상황이라 보입니다. 구체적으로 측정하는 시간에 따라 조금 달라질 수 있지만 오전체온 기준 37.2도 오후체온 기준 37.7도를 넘어서면 열이 난다고 볼 수 있습니다. 따라서 류마티스내과를 다시 방문해보시는게 좋겠습니다.

임태기 2일 후에 확인 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신테스트기는 소변을 점적한 직후에 해석해야만 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 1015분 이상 경과하여 나타난 변화는 의미가 없습니다. 따라서 2일 후 확인했을 때 보인 변화는 아무런 의미를 갖지 못합니다.

뺨에 알갱이? 덩어리? 만져져요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입술 근처의 뺨에서 덩이가 만져지는 상황이라 이해됩니다. 제가 만져지는 부위를 제대로 이해했다면 해당하는 부위에는 침샘이 존재하지 않기 때문에 덩이는 피부의 종괴이거나 림프절일 가능성이 있습니다. 가까운 이비인후과나 피부과를 방문해 진료받아보시기 바랍니다.

치루 세톤수술 받고 3일 지났습니다 질문.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 세톤을 느슨하게 묶어 두면 빙빙 돌아 갈 수 있습니다. 매듭때문에 아프다고 말씀 드리면 조치를 취해 주실 것으로 생각합니다. 큰 문제가 되지는 않으니 걱정은 하지 않으셔도 되겠습니다. 감사합니다.

어렸을 때 물린 개 광견병,안녕하세요. 메디이즈입니다. 광견병의 잠복기는 보통 몇 주에서 몇 개월까지 다양합니다. 드물게는 몇 년에 이를 수 있습니다. 하지만 10년 이상 잠복하는 경우는 매우 드뭅니다. 초기 증상으로는 발열 두통 피로 근육통 등 비특이적인 양상을 보이고 진행하게 되면 신경계 증상까지 나타나게 됩니다. 전혀 증상이 없으므로 발병하지 않은 상황이라 볼 수 있습니다.

항문 뭉가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 우선 항문 피부꼬리 즉 철퍼로 보입니다. 이런 철퍼는 따로 불편한 증상이 없다면 굳이 치료는 필요없는 상황이지만.. 철퍼의 원인이 치열이나 기존의 심했던 치질로 인해 발생하고 불편 증상이 지속된다면 철퍼 치료뿐 아니라 원인이 되는 치열 치질에 대한 치료도 같이 병행을 해야 합니다. 현재 주변 피부 상태도 태선이 동반된 건조한 피부가 보이는 것으로 보아 가려움증이 있지 않을까 싶은데.. 이런 가려움증도 철퍼치질이 그 원인이 될 수 있기에 가려움증이 많다면 대장항문외과에 가서서 직접 상담 및 이에 대한 치료 상담을 한번 받아보시는 것도 좋겠습니다. 감사합니다.

소뇌 뇌종양의식,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 경험하고 있는 증상들은 뇌종양과 같은 심각한 문제로 나타나는 증상일 가능성이 존재하므로 말씀하신대로 빠른 시일 내에 신경외과를 방문하는 것이 안전해보입니다. 악성 뇌종양이라 하더라도 조기 발견과 적절한 치료를 통해 좋은 예후를 기대할 수 있습니다. 가급적 병원을 빨리 방문하시기 바랍니다.

항문사진 주의 이 정도면 치질 몇기 정도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 튀어나와서 밀어넣지 않아도 들어가면 2도 밀어넣어야 들어가면 3도 입니다 밀어넣어도 안들어가면 4도 입니다. 약물치료도 고려할 수 있습니다

식사시 에이즈나 매독 감염 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 감염 가능성은 없으니 걱정안하셔도 될것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

측두근 압박,안녕하세요. 메디이즈입니다. 머리를 말릴 때 머리의 옆부분 측두부를 압박하는 행위가 있었다고 하더라도 광대가 더 커지는 일이 발생하지 않습니다. 말씀하신 부분은 불가

능한 일이므로 걱정하지 않아도 됩니다. 과도한 불안입니다.

대장내시경 치질 관련해서질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장내시경시 항문을 관찰하지만 이미 진정제 등에 의해 괄약근이 이완되어 있는 상태로 경미한 치핵이나 치열은 관찰되지 않는 경우도 있습니다.

잘때 코파기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장갑으로 인해 물리적으로 코 안에 손가락이 들어가기 어려운 수준이라면 주무시는 와중 무의식적으로 코를 파려 시도한다 하더라도 콧구멍으로 손가락이 들어가기 어려울 것이라 예상할 수 있겠네요.

잘때 코파기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장갑으로 인해 물리적으로 코 안에 손가락이 들어가기 어려운 수준이라면 주무시는 와중 무의식적으로 코를 파려 시도한다 하더라도 콧구멍으로 손가락이 들어가기 어려울 것이라 예상할 수 있겠네요.

코딱지 알아서 배출,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주무시는 도중 코딱지가 자연히 빠져나올수 있는지가 궁금하시군요. 코딱지는 공기 중의 먼지와 같은 이물질이 코 점막의 콧물과 만나서 만들어집니다. 시간이 지나면 점점 수분이 마르면서 딱딱한 형태를 갖게 되고 이 경우 숨쉬는 과정에 자연히 빠져나올수도 있습니다.

과음후 과다 구토시 신장기능에는 영향을 미치나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과음 후 구토를 과도하게 하는 경우 탈수로 인해 일시적인 신기능 저하가 발생할 수 있습니다. 다만 회복여부는 사람마다 다릅니다. 대개는 잘 회복하나 급성 신손상으로 진행할지 곧 회복될지는 경우에 따라 다르다는 의미입니다.

구강 관련 답변주셔서 감사합니다. 혹시 구강암일수도 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비흡연자라면 상기 병변이 구강암일 가능성은 매우 낮습니다. 따라서 너무 걱정하지 않아도 되겠고 진료를 한 번 보시면 되겠습니다.

성기에 병변..사마귀인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성으로 비뇨기과나 피부과 내원하셔서 치료 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=Qvj63ROgFyw>

눈 주위 피부가 터요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의하신 내용과 사진으로 보아 자극성피부염이 의심됩니다. 혹시 아토피 병력이 있다면 그것 때문일 수도 있습니다. 눈 주위의 피부는 건조하고 예민해서 자극성피부염이 잘 생기고 아토피 또한 잘 옵니다. 참고로 눈 주위에 피부염이 반복되고 비염이 있다면 아토피 가능성은 더욱 올라가며 다른 부위코 밑 입술 목 팔 다리 등에도 만성적인 피부염이 있다면 아토피가 거의 확실시됩니다. 대개 바르는 연고로 치료하지만 부종이 심하거나 뚜렷한 호전이 없으면 약을 복용하기도 합니다. 병원으로 내원하시어 피부과 전문의에게 보다 자세한 진료를 받고 치료를 받는 것이 가장 좋을 것 같습니다. 문의에 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

테리손 크림 사용 기간 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 많이 좋아지셨고 약도 드시고 있으니 연고는 하루 한번정도 바르시다가 서서히 줄여 나가시는 것을 권해드립니다.

테리손 크림 사용 기간 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 많이 좋아지셨고 약도 드시고 있으니 연고는 하루 한번정도 바르시다가 서서히 줄여 나가시는 것을 권해드립니다.

자꾸 소변에서 염증반응이 나옵니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 전립선쪽 문제일 수도 있습니다 이부분에 대해서 검사를 받고 치료 하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

고환 뽀루지 소작 했는데요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기

어려우나 헤르페스는 아닌 것 같습니다 다니시는 병원에서 잘 관리받으시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

목에 가래가깁니다. 다시 수정해서 올려드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 콧물 가래가 있다고 하면 알레르기 비염이거나 기관지 염증일 가능성이 높습니다. 가래뱉어서 안나오면 심리적인 원인도 고려할 수 있습니다

감기약 40알 및 정신과약 과다복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 약제들인지 몰라도 일부 약제에 의해서는 간손상 등이 야기될 수도 있어 최소한의 검사는 받아보시는게 좋을듯합니다.

쌍꺼풀 풀림 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 걱정되고 불안할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

30대 사구체여과율 저하,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구토 설사를 했다면 탈수로 인해 사구체 여과율이 저하되어 나타날 수 있는데 60 이상일 경우 기능에는 문제가 없어 추후 재검해 보시기 바랍니다.

명치 통증?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 명치부위의 불편감은 위염 식도염에 의한 것일 가능성이 높으니 위장약을 복용해보고 며칠 경과를 보셔도 될 것 같습니다. 평소 예민한 성격이라지만 맥박이 자주 빠르고 혈압의 변동이 심하시다면 정신과에 상담하여 항불안제를 처방받는게 좋을 것 같네요.

코 점막은 수술 후 어느 정도 있어야 아무나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자극이 없어도 봉합사가 풀리는 경우는 드물지 않게 일어납니다. 보통은 1주일 내외로 상처부위는 아무는 경우가 많습니다.

재질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기존 질문을 확인할 수 없는 없는 상황이라 정확히 답을 드리기는 어렵지만 술젠정의 경우 큰 부작용 등은 없는 약제라 처방받은 약이라면 복용해도 문제가 될 가능성은 적어보입니다

왼쪽손에 힘을 주면 손이 떨립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 해당 정보만으로 파킨슨을 의심하기에는 무리가 있어보입니다만현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 신경과 진료 권유합니다.

동맥경화도 검사정상인데 협심증 걸리나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동맥경화와 협심증은 비슷한듯하지만 다른 질환이라고 보시면 됩니다. 혈관경화가 아닌 막힌것이 협심증이라 생각하시는게 좋습니다.

숨 쉬기가 불편해요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시라도 심리적으로 긴장을 많이하거나 걱정이 많거나 불안하면 그러실수 있습니다. 그렇지 않다면 snepi주사를 맞아보실수 있을 것 같습니다

근육 틱 풀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근전도검사를 하여 나쁜 질환 일부를 감별할 수 있습니다. 흔하게 하는 검사이며 확진을 위한 검사는 아닙니다. 병원을 안가보신 상태라면 갑상선기능검사 전해질검사 간기능검사 등 기본적인 혈액검사가 필요하고 검사 결과가 정상이라면 신경과에 방문해 보시는 것이 도움이 되고 직접 치료를 받아보시길 바랍니다.

매독 수치 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독 항체수치가 감소하는 것은 치료가 잘 되고 있는중인 것 같습니다. 앞으로도 지속적인 검사를 하면서 경과를 지켜보면 될 것같아요.

아이가 비열성경련비유발성경련을 했습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 경련성 질환 이력 아이가 과거에 영아연축을 겪고 완치 판정을 받은 것과 열경기 이력이 있는 것은 현재 증상과 관련이 있을 수 있습니다. 하지만 뇌파검사에서 이상이 없다는 결과는 긍정적입니다. 2. 재발 가능성 과거 영아연축이나 열경기를 겪은 아이들은 이후에도 경련성 질환의 재발 가능성이 있을 수 있지만 정확한 확률은 개개인의 상태와 치료 후의 경과에 따라 다릅니다. 일반적으로 영아연축은 조기에 적절히 치료될 경우 재발률이 낮아질 수 있습니다. 3. 현재 상태 최근 뇌파검사 결과가 정상이라면 이는 현재로서는 경련성 질환의 활동이 없다 혹은 발견되지 않았다는 것을 의미합니다. 그러니 지속적인 관찰이 필요합니다. 많이 걱정스러우시겠지만 혹시 모를 경련에 대비할 필요가 있습니다. 또 경련을 하게된다면 아이를 안전한 위치에 두고 머리를 보호하며 구급차를 부르거나 병원으로 바로 이동하실 필요가 있습니다.

근육 틱 꿀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발 다리를 시작으로 전신 근육 틱과 꿀렁거림이 지속되며 숙면을 방해하는 증상이 있다면 근전도EMG 검사를 받는 것이 도움이 될 수 있습니다. 근전도 검사는 근육과 신경의 기능을 평가하여 근육 경련 근육 틱 등의 원인을 파악하는 데 유용합니다. 다만 이러한 검사는 진료보는 의사의 권고에 따라 필요한 경우에만 시행되어야 합니다.

근육 틱 꿀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발 다리를 시작으로 전신 근육 틱과 꿀렁거림이 지속되며 숙면을 방해하는 증상이 있다면 근전도EMG 검사를 받는 것이 도움이 될 수 있습니다. 근전도 검사는 근육과 신경의 기능을 평가하여 근육 경련 근육 틱 등의 원인을 파악하는 데 유용합니다. 다만 이러한 검사는 진료보는 의사의 권고에 따라 필요한 경우에만 시행되어야 합니다.

근육 틱 꿀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근전도검사를 하여 나쁜 질환 일부를 감별할 수 있습니다. 흔하게 하는 검사이며 확진을 위한 검사는 아닙니다. 병원을 안가보신 상태라면 갑상선기능검사 전해질검사 간기능검사 등 기본적인 혈액검사가 필요하고 검사 결과가 정상이라면 신경과에 방문해 보시는 것이 도움이 되고 직접 치료를 받아보시길 바랍니다.

근육 틱 꿀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발 다리를 시작으로 전신 근육 틱과 꿀렁거림이 지속되며 숙면을 방해하는 증상이 있다면 근전도EMG 검사를 받는 것이 도움이 될 수 있습니다. 근전도 검사는 근육과 신경의 기능을 평가하여 근육 경련 근육 틱 등의 원인을 파악하는 데 유용합니다. 다만 이러한 검사는 진료보는 의사의 권고에 따라 필요한 경우에만 시행되어야 합니다.

혈액검사 알수 있는거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사하면서 비타민D와 calcium이 궁금하다고 검사에 포함 시켜달라고 요청하시는 것이 확실합니다. 기본검사에 포함이 되지 않을 수도 있습니다

성기 부분 점 흑색종 의심 질문 입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

정신과약과 술 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 특별한 불편감을 느끼지 못하고 있다면 지금은 괜찮으실 것이라 예상을 할 수 있습니다. 비가역적인 간손상이 발생하는 경우 간기능이 저하되어 여러 증상을 유발하기 때문입니다. 다만 당시 간손상이 어느정도였는지를 알 방법이 없으므로 걱정되시면 가까운 내과에서 혈액검사를 받아보시면 되겠습니다.

혈액검사 알수 있는거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사하면서 비타민D와 calcium이 궁

급하다고 검사에 포함 시켜달라고 요청하시는 것이 확실합니다. 기본검사에 포함이 되지 않을 수도 있습니다

갑상선암에 대해 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 12월에 갑상선 검사에서 이상이 없었다면 5개월 내에 갑상선암이 발생할 확률은 매우 낮습니다. 갑상선암은 대부분 천천히 자라는 특성이 있어 단기간 내에 급격히 발생하는 경우는 드뭅니다. 말씀하신 증상원목소리 없음 삼킬 때 이물감 없음 가래와 콧물만으로는 갑상선암의 징후로 보기 어렵습니다. 이러한 증상은 주로 상기도 감염이나 알레르기과 관련이 있을 가능성이 높습니다.

근육 틱 꿀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발 다리를 시작으로 전신 근육 틱과 꿀렁거림이 지속되며 숙면을 방해하는 증상이 있다면 근전도EMG 검사를 받는 것이 도움이 될 수 있습니다. 근전도 검사는 근육과 신경의 기능을 평가하여 근육 경련 근육 틱 등의 원인을 파악하는 데 유용합니다. 다만 이러한 검사는 진료보는 의사의 권고에 따라 필요한 경우에만 시행되어야 합니다.

근육 틱 꿀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발 다리를 시작으로 전신 근육 틱과 꿀렁거림이 지속되며 숙면을 방해하는 증상이 있다면 근전도EMG 검사를 받는 것이 도움이 될 수 있습니다. 근전도 검사는 근육과 신경의 기능을 평가하여 근육 경련 근육 틱 등의 원인을 파악하는 데 유용합니다. 다만 이러한 검사는 진료보는 의사의 권고에 따라 필요한 경우에만 시행되어야 합니다.

근육 틱 꿀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근전도검사를 하여 나쁜 질환 일부를 감별할 수 있습니다. 흔하게 하는 검사이며 확진을 위한 검사는 아닙니다. 병원을 안가보신 상태라면 갑상선기능검사 전해질검사 간기능검사 등 기본적인 혈액검사가 필요하고 검사 결과가 정상이라면 신경과에 방문해 보시는 것이 도움이 되고 직접 치료를 받아보시길 바랍니다.

근육 틱 꿀렁거림으로 인한 수면 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발 다리를 시작으로 전신 근육 틱과 꿀렁거림이 지속되며 숙면을 방해하는 증상이 있다면 근전도EMG 검사를 받는 것이 도움이 될 수 있습니다. 근전도 검사는 근육과 신경의 기능을 평가하여 근육 경련 근육 틱 등의 원인을 파악하는 데 유용합니다. 다만 이러한 검사는 진료보는 의사의 권고에 따라 필요한 경우에만 시행되어야 합니다.

고등학생인데 탈모 온건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사춘기에는 급격한 호르몬의 변화를 겪는 시기라서 남성형 탈모가 시작되기도 합니다. 다만 사진만으로 탈모 여부를 판단하기는 어렵습니다. 가까운 피부과에서 진찰을 받아보셔야 하겠습니다. 혹은 앞머리나 정수리 부근의 머리카락이 옆머리나 뒷머리의 머리카락에 비해 얇은지 확인해보실수도 있겠습니다.

눈을 깜빡일때 순간 빛번짐이 보이는건 왜그러는 건가요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈을 깜빡일 때 순간 빛 번짐이 보이는 것은 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 계속되면 진료를 받아보셔야 안구 건조증 눈이 건조하면 각막 표면이 매끄럽지 않아 빛이 번지게 보일 수 있습니다. 난시 각막이나 수정체의 굴절 이상으로 인해 초점이 한 곳에 모이지 않아 빛이 번지는 것처럼 보일 수 있습니다. 백내장 수정체가 혼탁해져 빛이 산란되어 빛 번짐이 나타날 수 있습니다. 망막 질환 망막에 이상이 생기면 빛 번짐이 생길 수 있습니다. 시력 저하 시력이 저하되면 빛 번짐이 나타날 수 있습니다. 스트레스 스트레스는 눈의 피로를 유발하여 빛 번짐을 일으킬 수 있습니다. 스마트폰 컴퓨터 등의 사용 과도한 사용으로 인해 눈의 피로가 쌓여 빛 번짐이 생길 수 있습니다.

입술 안이 찢어졌어요 꼬매야될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 선명하지않거나 아

니면 어둡게 찍혀서 정확한 답변은 어렵습니다만 일반적으로 구강내 상처는 꺾매지 않아도 잘 회복됩니다

기침가래가 한달이 넘게 가고 있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 기관지가 조금 예민한 분이 아닌가 싶습니다. 증상이 지속되면 기관지 알러지에 대한 약을 복용하시는것이 도움이 될것 같습니다

부신피질호르몬제 상처 악화....안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 어떤상처가 생겼고 아물지 않는 것인가요? 상처와 습진중에 더 심한쪽으로 치료를 집중하시는 것이 필요해 보입니다. 지금 약드신지 얼마 되지않아서 상처에 지장이 있을 정도로고 약이 영향을 줄것 같지는 않습니다

혈액검사 알수 있는거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사하면서 비타민D와 calcium이 궁금하다고 검사에 포함 시켜달라고 요청하시는 것이 확실합니다. 기본검사에 포함이 되지 않을 수도 있습니다

36개월 아기 소변 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 거품뇨의 기준이 따로 있는 것은 아닙니다. 거품뇨라고 하기는 어려울것 같습니다. 유전의 영향은 극히 제한적일 것으로 생각됩니다

임플란트 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 외국인 학교 재학중인 학생입니다. 미래 진로 관련 프로젝트를 진행함에 있어 몇가지 질문들 올려봅니다. 1. 임플란트 abutment 들은 대부분 지르코니아나 티타늄을 쓴다고 조사했는데 각각의 장단점들이 궁금합니다. 그 재료들이 생체 친화성이나 심미성이 우수하기 때문입니다. 2. 임플란트를 screw abutment crown 세부분으로 나누는 이유가 궁금합니다. Abutment 부분은 생략 될 수 있을것 같은데 말입니다. 상부 크라운 구조가 사람마다 다 달라질 수 밖에 없기 때문에 어버트먼트라는 구조물을 사용합니다. 3. 어금니와 앞니의 screw와 abutment들은 단순 크기 차이인지 아니면 다른 종류를 쓰는 것인지 궁금합니다. 크기나 모양 차이가 있을 수 있습니다. 4. 몇몇분들이 임플란트를 대신하여 틀니를 쓰고는 하시는 이유가 궁금합니다. 환자분의 요구도 있고 하부 골 구조 문제도 있고 여러가지 변수가 있어 그렇습니다. 추가적으로 프로젝트 규정상 질문에 대한 1대1 이메일 교환이 필요한데 혹시나 괜찮으시다면 gmail로 추가 질문을 드리고 싶습니다.

충치 치료 깊은곳,안녕하세요. 메디이즈입니다. 충치가 깊었던 경우 치료 후 시림증상이나 불편감이 2주 정도 이상 오래 갈 수도 있습니다. 지금은 괜찮아지셨다고 하니 경과를 지켜보시는게 좋을 듯 하네요

관절경 수술 이후 관절낭 손상 회복되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무릎에 관한 질문이군요. 본인의 이야기인지 일반적인 질문인지 분명치않아 답변드리기가 어렵습니다. 추벽증후군은 무릎 통증의 원인인지 결과인지 분명하지 않습니다. 그래서 가능하면 수술하지않는데 단지 너무 단단한 추벽이 연골손상을 가속시키면 제거수술을 합니다. 하지만 수술로 추벽을 제거한다고 증상이 좋아진다고는 단정할 수 없습니다. 수술의 목적은 더 이상의 연골손상을 막는다고 보는 것이 정확합니다. 관절경 수술에 의한 활액막손상은 수술후 24주면 회복합니다. 수술후에 통증이 계속된다면 기존 연골질환의 증상일 가능성이 높습니다. 감사합니다.

중성지방 2000이 넘었네요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 중성지방 수치가 2000이면은 너무 높네요. 술이나 기름진 음식으로도 중성지방수치는 올라가게 되는데.. 그래도 수치가 너무 높은거 같네요. 가능한 빨리 병원에 방문하여 간이나 췌장에 이상이 없는지 검사를 받아보는데 좋겠습니다.

장상피화생에 마 가 안좋은건가요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마는 점성이 높고 섬유질이 풍부하여 정상적인 위장에는 도움이 되지만.. 장상피화생이 있는 경우에는 오히려 위점막을 자극하거나 불편함을 줄 수 있습니다. 이와 마찬가지로 섬유질이 많은 음식들 현미 보리를 너무 많이 드시면 위에 부담을 줄 수 있어 적당량을 섭취하는게 좋습니다.

매독 수치 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독 항체수치가 감소하는 것은 치료가 잘 되고 있는중인 것 같습니다. 앞으로도 지속적인 검사를 하면서 경과를 지켜보면 될 것 같아요. 눈을 깜빡일때 순간 빛번짐이 보이는건 왜그러는 건가요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈을 깜빡일 때 순간 빛 번짐이 보이는 것은 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 계속되면 진료를 받아보셔요 안구 건조증 눈이 건조하면 각막 표면이 매끄럽지 않아 빛이 번지게 보일 수 있습니다. 난시 각막이나 수정체의 굴절 이상으로 인해 초점이 한 곳에 모이지 않아 빛이 번지는 것처럼 보일 수 있습니다. 백내장 수정체가 혼탁해져 빛이 산란되어 빛 번짐이 나타날 수 있습니다. 망막 질환 망막에 이상이 생기면 빛 번짐이 생길 수 있습니다. 시력 저하 시력이 저하되면 빛 번짐이 나타날 수 있습니다. 스트레스 스트레스는 눈의 피로를 유발하여 빛 번짐을 일으킬 수 있습니다. 스마트폰 컴퓨터 등의 사용 과도한 사용으로 인해 눈의 피로가 쌓여 빛 번짐이 생길 수 있습니다.

성병관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 잠복기 없이 검사를 받으시면 알 수 있습니다 잠복기에도 감염이 가능하지만 삽입이 없이 걸리기는 어렵습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

심장이 쿵,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장이 쿵 하며 떨어지는 느낌이 잠시 나타나 걱정스러우시군요. 일시적이라곤 하지만 갑상선 기능 항진증은 두근거림을 유발할 수 있습니다. 기존에 부정맥과 같은 문제가 있었을 경우 악화시키는 요인이 될 가능성이 있다는 의미가 됩니다. 내과를 방문해보시기 바랍니다.

성기 표피 두드러기질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 표피에 두드러기가 났군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

입술 아래 턱 통증 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하악수술을 하셨다고 기재해주셨는데 혹시 하악수술을 언제 어떤방식으로 받으셨는지요? 하악에는 큰 신경 다발들이 많이 지나가고 있습니다. 그로 인해 하악에 외과적인 수술을 진행하셨다면 일시적으로 감각이상이 발생할 수 있습니다. 이러한 감각이상은 짧게는 수개월 길게는 12년가량 이어질 수 있습니다. 현재 환자분의 상태를 확인할 수 없어 정확하게 판단하기 어려우나 하악수술을 진행하셨던 병원에 방문하시어 통증이 지속된다 말씀하시면 구체적인 안내를 들어보실 수 있을 것 같습니다. 직접 보고 진단을 내리는게 아니므로 구체적인 진단을 하지 못하는 점 양해부탁드립니다. 감사합니다.

부신피질호르몬제 상처 악화....안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 어떤상처가 생겼고 아물지 않는 것인가요? 상처와 습진중에 더 심한쪽으로 치료를 집중하시는 것이 필요해 보입니다. 지금 약드신지 얼마 되지않아서 상처에 지장이 있을 정도로고 약이 영향을 줄것 같지는 않습니다

알 수 없는 멍,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알 수 없는 멍은 여러 가지 원인으로 생길 수 있습니다. 술을 많이 마시면 혈액 순환이 잘 되지 않아 멍이 생길 수 있습니다. 또한 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는 경우에도 멍이 생길 수 있습니다. 스트레스를 많이 받으면 혈액 순환

이 잘 되지 않아 멍이 생길 수 있습니다. 따라서 알 수 없는 멍이 생겼다면 술을 줄이고 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는지 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 또한 스트레스를 줄이고 규칙적인 운동을 하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 만약 멍이 생겼을 때 통증이 심하거나 멍이 점점 커지거나 멍이 생긴 곳에 열이 나거나 멍이 생긴 부위가 붓는 등의 증상이 있다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 알 수 없는 멍이 생겼다면 술을 줄이고 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는지 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 또한 스트레스를 줄이고 규칙적인 운동을 하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

성기 표피 두드러기질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 표피에 두드러기가 났군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <httpswww.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

성기에 여드름 같은게 났는데 병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진주종성 구진 등의 소견으로 치료 없이 그냥 지내셔도 되는 소견입니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <httpswww.youtube.com/watch?vLAZ8hRuelg>

천식은 진료과가 어디인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통은 알레르기 내과에서 천식진료를 많이 하는 편이지만 병원에 따라서는 호흡기 내과에서도 진료 하기도 하니 예약전에 미리 확인해보셔요

격투기 스팅 없이 샌드백만 치면 눈 안전한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그정도 충격으로는 망막열공이나 박리의 위험이 증가하지 않을 듯 합니다. 너무 걱정하지 않으셔도 될 거 같습니다. 감사합니다.

요도 불편감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기본 소변검사에서 염증소견이 보여 std12종성병검사를 한달 새 수차례 하였고 결과적으로 이상 없었군요. 처방해준 독시사이클린 1주 씩 몇번 복용하였고 복용시에는 한동안 이상없다가 복용이 끝나고 12주 후 증상 재발하고 요도소양감 및 요도를 짜면 분비물이 나오고 은은한 불쾌감이 평상시 공존하는 느낌 등이 있군요. 치료 받으신 병원 다시 내원하셔서 상담후 전립선 검사 등의 필요한 검사후 치료를 받도록 하십시오.

밤을 새우면 흉통 두근거림,안녕하세요. 요약 1. 부정맥이 있는지 확인해 보세요 2. 정상 심박동수에 엇박자로 뛰기도 합니다. 3. 엇박자일때 잠깐 몸에서는 이상기운을 느낄 수도 있습니다. 4. 심장내과에서 부정맥의 원인과 정도를 확인해 보세요 심장두근거림이 일시적인 현상으로 끝나지 않고 지속적으로 나타나고 가슴이 쿵하고 내려앉는 느낌이나 심장이 갑자기 멈추는 듯한 느낌 심장이 빠르거나 느린 느낌이 든다면 부정맥의 여부를 확인해보아야합니다. 건승하세요

음낭의 점 뭔가요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 점으로 보입니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

입술안이 찢어졌어요 꼬매야되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 꽤나 벌어진 상황입니다. 입술의 상처는 이비인후과에서 진료받아보실 수 있겠고 봉합도 받으실 수 있을테니 가까운 의원을 찾아가보시기 바랍니다. 그때까지 상처는 건들지 않는게 안전하겠습니다.

입술 안이 찢어졌어요 꼬매야될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 선명하지않거나 아니면 어둡게 찍혀서 정확한 답변은 어렵습니다만 일반적으로 구강내 상처는 꿰매지 않아도 잘 회복됩니다

부딪혔는데 입술안에 찢어져서 꼬매야되는상황일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 꽤

나 벌어진 상황입니다. 입술의 상처는 이비인후과에서 진료받아보실 수 있겠고 봉합도 받으실 수 있을테니 가까운 의원을 찾아가보시기 바랍니다. 그때까지 상처는 건들지 않는게 안전하겠습니다.

성관계 후 임신 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정은 피임 방법으로 신뢰도가 낮습니다. 첫 번째 관계 후 7시간 후에 다시 관계를 했고 소변을 봤는지 불확실한 상태라면 전립선액에 남아 있는 정자가 두 번째 관계 때 방출될 가능성이 있습니다. 여자친구의 생리 주기가 불규칙적이라면 가임기를 예측하기 어렵기 때문에 임신 가능성을 배제할 수 없습니다. 현재로서는 사후 피임약 복용을 고려하는 것이 좋습니다. 관계 후 3일이 지났다면 사후 피임약의 효과가 적지만 아직 기대할 수 있습니다.

피지낭종 시술 대신 외과의에게 손으로 짜여도 되는건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종에 농양이 합병되었을 경우 이를 바로 제거하면 반흔이 발생할 수 있어 우선 농양을 배농하고 추후 제거하는 경우도 있습니다. 담당의에게 문의를 해 보시기 바랍니다.

상체쪽 뼈가 뒤틀린거 같고 통증이 느껴집니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 저희는 하지 않지만 체형을 교정하는 도수치료를 하는 병원에서 비교적 흔하게 하는 검사입니다. 전화 해보고 가시면 됩니다.

원형탈모 두피함몰,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 정확하게 두피 함몰이 확인되지 않은상태이니 직접 진료받고 확인이 필요합니다. 주사 맞지 않고 함몰이 나타날 것 같지는 않습니다 피나스테리드 복용량과 DHT 혈중농도의 상관관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈모약을 복용하여 DHT 농도를 일반인과 같은 수준으로 맞추면 탈모 치료효과는 없을 것으로 생각됩니다. 피스테리드가 뇌에 부정적인 영향을 줄것 같지는 않으나 만약 그렇다면 중단을 고려하시는 것이 좋겠습니다

위험한 상황인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크기나 형태로 보아 굵힌 상처에 생긴 딱지일 가능성이 있습니다. 항생제연고를 발라주면서 지켜보셔도 될 것 같습니다. 문의에 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

관계 중 하얀액체,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질에서 나오는 하얀 액체는 질 분비물과 혼합된 결과일 가능성이 큼니다. 콘돔이 찢어지지 않고 올바르게 사용되었다면 임신 확률은 매우 낮습니다. 성기끼리의 접촉만으로는 임신 확률이 극히 낮습니다. 가임기라면 불안할 수 있지만 피임이 잘 되었다면 걱정할 필요는 적습니다. 그래도 불안하면 사후 피임약을 고려해보세요.

난소에서 발견된 mass 양성 악성가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오른쪽 난소에 발견된 3.8cm 크기의 종양mass이 양성일 확률이 더 높은지에 대해 궁금하실 텐데 종양의 양성 여부는 다양한 요인에 따라 달라집니다. 일반적으로 난소 종양의 대부분은 양성인 경우가 많습니다. 추가로 다음의 요소들이 양성 종양일 가능성을 높일 수 있습니다 1. 크기와 모양 3.8cm 크기의 종양은 비교적 작은 편이며 모양이 단순하고 경계가 명확할수록 양성일 가능성이 높습니다. 2. 증상 현재 겪고 있는 증상들은 난소 종양 외에도 여러 다른 원인들에 의해 발생할 수 있습니다. 종양 자체만으로는 특정 증상을 단정짓기 어렵습니다. 3. 영상 소견 CT와 같은 영상 검사에서 종양의 구조와 특징이 양성 종양과 일치하는지 여부도 중요합니다. 4. 혈액 검사 결과 난소 종양 마커에 CA125 수치가 높지 않으면 양성일 가능성이 더 큼니다. 따라서 추가 검사 및 검토가 필요하므로 우선은 안심하시고 진료를 이어가시기 바랍니다.

고등학생인데 탈모 온건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사춘기에는 급격한 호르몬의 변화를 겪는 시기라서 남성형 탈모가 시작되기도 합니다. 다만 사진만으로 탈모 여부를 판단하기

는 어렵습니다. 가까운 피부과에서 진찰을 받아보셔야 하겠습니다. 혹은 앞머리나 정수리 부근의 머리카락이 옆머리나 뒷머리의 머리카락에 비해 얇은지 확인해보실수도 있겠습니다.

여드름 상담,안녕하세요. 메디이즈입니다. 응괴성 여드름이 보이고 있습니다. 여드름의 가장 심한 형태이며 적극적인 치료가 필요합니다. 경구 약 복용 및 피부관리가 병행되어야 하겠으니 가까운 피부과를 방문하여 진료받아보시기 바랍니다.

항문에서 피가 나고 불편감이 있는데 혹시 심각한 증상일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의심되는 질환은 모두 항문질환이나 구체적으로는 조금씩 다릅니다. 1. 치열 항문의 상처는 치열을 의심케 합니다. 찢어지면 피도 나고 통증도 보이지만 좌욕하면서 연고 바르면 나아지기도 합니다. 2. 치핵 항문의 콩알만한 덩이 출혈은 치핵이 의심스럽습니다. 3. 치루 반복적으로 부어올랐다가 가라앉는 반응이 동일한 위치에서 보이고 있습니다. 이는 치루에 대한 확인도 요합니다. 결론적으로는 항문 진찰 없이 정확한 원인을 알기는 어렵습니다. 말씀드린 내용 중 치루의 경우 적극적인 치료를 하지 않으면 더 큰 문제로 이어질 수 있으니 가급적 빠른 진료를 권해드립니다.

고관절 MRI에서 천장관절도 보이나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고관절 MRI로 천장관절염을 진단할 수 있지만 최적의 결과를 얻기 위해서는 천장관절을 포함하도록 특별히 설정된 MRI가 더 효과적입니다. 천장관절염의 진단에는 천장관절 전용 MRI가 더 명확하고 자세한 영상을 제공합니다. 고관절 MRI로도 일부 천장관절을 볼 수 있지만 진단 정확도는 떨어질 수 있습니다. 천장관절염이 의심될 경우 천장관절에 초점을 맞춘 MRI를 요청하는 것이 좋습니다. 이비인후과 역류성식도염 처방 되지않아요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 같은 종류의 약을 중복된 시기에 처방받게 되는 경우엔 문제가 될 수 있습니다만 이비인후과에서도 역류성식도염에 대한 진료를 볼 수 있고 처방도 할 수 있습니다. 말씀대로 두 진료과는 해당 질환에 대한 처치가 다르지 않습니다.

안녕하세요 선생님 심근경색으로 시술을 한지 3년이 지났습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심근경색으로 굉장히 힘든 시기를 보내셨을 것이라 예상됩니다. 질문자님께선 한 잔 정도는 괜찮지 않을까 하는 생각을 하실 수 있지만 한 잔도 괜찮지 않습니다. 완전한 금주만이 심혈관 질환의 재발을 막는 방법입니다. 금주하는 생활을 이어가시는 것을 권해드립니다.

사타구니에 멍을 진료과 문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 주변의 피부병변이라 보입니다. 모낭염과 같은 염증성 질환이 반복되는 것 같다는 생각도 들고 그것이 아니더라도 반복적인 피부의 문제가 유발되는 상태라 보입니다. 외과보다는 피부과나 비뇨의학과가 적합한 진료과로 보입니다.

알 수 없는 멍,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알 수 없는 멍은 여러 가지 원인으로 생길 수 있습니다. 술을 많이 마시면 혈액 순환이 잘 되지 않아 멍이 생길 수 있습니다. 또한 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는 경우에도 멍이 생길 수 있습니다. 스트레스를 많이 받으면 혈액 순환이 잘 되지 않아 멍이 생길 수 있습니다. 따라서 알 수 없는 멍이 생겼다면 술을 줄이고 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는지 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 또한 스트레스를 줄이고 규칙적인 운동을 하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 만약 멍이 생겼을 때 통증이 심하거나 멍이 점점 커지거나 멍이 생긴 곳에 열이 나거나 멍이 생긴 부위가 붓는 등의 증상이 있다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 알 수 없는 멍이 생겼다면 술을 줄이고 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는지 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 또한 스트레스를 줄이고 규칙적인 운동을 하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

기침가래가 한달이 넘게 가고 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기관지가 조금 예민한

분이 아닌가 싶습니다. 증상이 지속되면 기관지 알러지에 대한 약을 복용하시는것이 도움이 될것 같습니다

고등학생인데 탈모 온건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사춘기에는 급격한 호르몬의 변화를 겪는 시기라서 남성형 탈모가 시작되기도 합니다. 다만 사진만으로 탈모 여부를 판단하기는 어렵습니다. 가까운 피부과에서 진찰을 받아보셔야 하겠습니다. 혹은 앞머리나 정수리 부근의 머리카락이 옆머리나 뒷머리의 머리카락에 비해 얇은지 확인해보실수도 있겠습니다.

이틀전부터 피부가 가렵고 붉게 부어오릅니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 두드러기로 판단되며 병변이 넓어지고 있다면 경구 약물 치료 및 국소 스테로이드 연고 치료가 필요합니다. 피부과 진료를 권해드립니다.

데드 스쿼트 차이와 내게 맞는 자세???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 데드리프트의 타겟근육과 스쿼트의 타겟근육에 있어 공통되는 근육도 있지만 크게 작용하는 근육은 다릅니다. 데드리프트는 고관절Pelvic Joint를 축으로 둔근Glutes 척주세움근erector spinae 등으로 쓰며 스쿼트는 슬관절Knee Joint를 축으로 대퇴사두근Quadriceps을 주로 발달시킵니다. 무거운 것을 들때는 스쿼트 자세로 허리를 꼴꼴이 세운 체로 무릎을 구부려 앉아 드는 것이 좋습니다.

광배근과 상부승모의 관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문자 님의 키와 체중으로 고려하여 추정해보면 근육량이 많아 근육이 수축되지 않은 neutral position에서도 어깨가 내려가고 올라가는 등의 제한은 없을 것으로 사료됩니다. 근육의 사이즈가 매우 비대하여 기본 자세에서 제한이 일어나는 정도의 레벨에서 개별 타겟팅을 하여 근육을 발달시킬 수 있습니다만 일반적인 사이즈에서는 전체적으로 골고루 발달시키는 것이 중요합니다. 분할법을 적절히 조합하여 건강한 운동생활하시기 바랍니다.

건강염려증 같은데 어떻게 해야 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 어머니가 아프시다니 어쩌면 당연한 일이겠지만 정도를 넘어서면 일상생활에 큰 지장을 줄 수 있습니다. 검사에 이상이없고 증상이 지속되면 정신건강의학과 진료 받아보셔요

천식은 진료과가 어디인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통은 알레르기 내과에서 천식진료를 많이 하는 편이지만 병원에 따라서는 호흡기 내과에서도 진료 하기도 하니 예약전에 미리 확인해보셔요

생리 전 증상 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콘돔을 착용하고 찢어짐이나 구멍이 없는 경우 임신 가능성은 매우 낮습니다. 현재 갈색혈이 나오는 것은 부정출혈일 가능성이 높습니다. 착상혈과 생리 전 부정출혈은 구분이 어려울 수 있습니다. 임신 테스트기의 정확도는 관계 후 2주가 지나야 높아집니다. 지금 테스트하면 어느 정도 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 생리 예정일이 다가왔으니 테스트를 해보는 것이 좋습니다.

남자 턱수염 안남,안녕하세요 요약 1. 턱에 모낭이 없으면 안 납니다. 2. 유전적으로 결정되는 부분이기 때문에 3. 병적문제가 있는게 아니고 남성호르몬 중 털 나는 호르몬이 부족하면 4. 다른 부위에서도 털이 안 납니다. 5. 그냥 거기 모낭이 없어서 그럴 수 있습니다. 건승하세요

항문 내부에 하얀색 멍울들이 잔뜩 올라왔어요,안녕하세요 요약 1. 치핵인지 확인해 보세요 2. 치핵과 임파선이 같이 있을 수 있는데 언급한 행위가 악화요인이 됩니다. 3. 항문외과로 가보세요 치질은 항문에 생기는 모든 질환을 말하는데 이중 80가 치핵입니다. 치핵은 항문 안쪽 점막 내 혈액이 뭉치면서 혹 같은 덩어리가 생기는 것이며 증상의 경중에 따라 네 단계로 나뉘는데 단계에 따라 치료법이 다릅니다. 건승하세요

성병관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 잠복기 없이 검사를 받으시면 알 수 있습니다 잠복기에도 감염이 가능하지만 삽입이 없이 걸리기는 어렵습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

숨이 답답하고 냄새가 납니다.,안녕하세요 요약 1. 역류검사도 진행해 보세요 2. 언급된 검사 말고 역류성 식도염이나 역류성 후두염의 검사로 산도 검사하는 게 있습니다. 3. 그리고 축농증은 후비루가 있어서 언급한 숨이 답답하고 기침을 자주 하는 증상이 생기니 4. 것도 감별이 필요합니다. 건승하세요

밤을 새우면 흉통 두근거림,안녕하세요. 요약 1. 부정맥이 있는지 확인해 보세요 2. 정상 심박동수에 엇박자로 뛰기도 합니다. 3. 엇박자일때 잠깐 몸에서는 이상기운을 느낄 수도 있습니다. 4. 심장내과에서 부정맥의 원인과 정도를 확인해 보세요 심장두근거림이 일시적인 현상으로 끝나지 않고 지속적으로 나타나고 가슴이 쿵하고 내려앉는 느낌이나 심장이 갑자기 멈추는 듯한 느낌 심장이 빠르거나 느린 느낌이 든다면 부정맥의 여부를 확인해보아야합니다. 건승하세요

눈을 깜빡일때 순간 빛번짐이 보이는건 왜그러는 건가요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈을 깜빡일 때 순간 빛 번짐이 보이는 것은 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 계속되면 진료를 받아보셔요 안구 건조증 눈이 건조하면 각막 표면이 매끄럽지 않아 빛이 번지게 보일 수 있습니다. 난시 각막이나 수정체의 굴절 이상으로 인해 초점이 한 곳에 모이지 않아 빛이 번지는 것처럼 보일 수 있습니다. 백내장 수정체가 혼탁해져 빛이 산란되어 빛 번짐이 나타날 수 있습니다. 망막 질환 망막에 이상이 생기면 빛 번짐이 생길 수 있습니다. 시력 저하 시력이 저하되면 빛 번짐이 나타날 수 있습니다. 스트레스 스트레스는 눈의 피로를 유발하여 빛 번짐을 일으킬 수 있습니다. 스마트폰 컴퓨터 등의 사용 과도한 사용으로 인해 눈의 피로가 쌓여 빛 번짐이 생길 수 있습니다.

금요일에 넘어지고 토요일에 물리치료 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파 치료는 고온에 의한 손상이 있을 수는 있지만 짧게 진행하기 때문에 치료에 의한 증상악화 가능성이 많지는 않습니다. 가보셨던 병원을 그냥 다시 가보셔도 됩니다.

금요일에 넘어지고 토요일에 물리치료 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파 치료는 고온에 의한 손상이 있을 수는 있지만 짧게 진행하기 때문에 치료에 의한 증상악화 가능성이 많지는 않습니다. 가보셨던 병원을 그냥 다시 가보셔도 됩니다.

상체쪽 뼈가 뒤틀린거 같고 통증이 느껴집니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 저희는 하지 않지만 체형을 교정하는 도수치료를 하는 병원에서 비교적 흔하게 하는 검사입니다. 전화 해보고 가시면 됩니다.

36개월 아기 소변 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 거품뇨의 기준이 따로 있는 것은 아닙니다. 거품뇨라고 하기는 어려울것 같습니다. 유전의 영향은 극히 제한적일 것으로 생각합니다

의자에 잠깐 앉아있어도 머리뒤쪽이 당기면서 피곤해지고 말하기 연습할때 5분이상 말하면 목이 뻣뻣해지고 뒷골이 땡기면서 말이 안나옵니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경추만의 문제는 아니지만 경추 주변 근긴장이 주된 원인으로 작용합니다. 말이 안나온다면 혀 근육 또는 후두 등의 순환장애가 심하게 온다는 의미로 생각합니다. 치료는 주사를 통한 신경치료가 가장 효과적일 것 같습니다.

힘듭네요,안녕하세요. 요약 1. 사람은 고쳐쓰지 못하니 2. 환경을 바꿀 수 있으면 바꿔 보세요

요 3. 같이 안 살면 만나는 빈도를 줄이거나 4. 굳이 내가하는 일을 언급할 이유가 없으면 안 하면 시비걸릴 일도 없을테니 5. 정신의학과에서는 상담은 받아 보세요. 건승하세요

정수리 부근에 찌릿찌릿한 두통이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뒷목 근육의 경직에 의하여 근육 밑을 주행하는 후두신경이 압박되어 정수리까지 두통이 발생하고 이 경우 뒷목의 근육을 풀어주는 치료를 하게 됩니다. 보통은 약 복용을 기반으로 주사치료를 포함해서 물리 치료도수치료 등을 흔하게 합니다. 엑스레이를 찍어보면 대부분 경추직선화일자목 또는 경추 배열의 부정렬소견이 관찰됩니다. 다리 저림은 별개의 문제일 가능성이 많습니다.

교정장치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순히 혀를 움직이고 턱에 힘을 주는 행동으로 광대가 커지거나 변형되는 것은 드문 일입니다. 다만 턱과 광대에 지속적인 스트레스를 주면 통증과 피로를 유발할 수 있습니다. 불편감이 심하다면 치과를 다시 방문해보시기 바랍니다.

심장이 쿵,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장이 쿵 하며 떨어지는 느낌이 잠시 나타나 걱정스러우시군요. 일시적이라곤 하지만 갑상선 기능 항진증은 두근거림을 유발할 수 있습니다. 기존에 부정맥과 같은 문제가 있었을 경우 악화시키는 요인이 될 가능성이 있다는 의미가 됩니다. 내과를 방문해보시기 바랍니다.

혈액검사 시기 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 보통은 4주 정도 지나서 받는 것이 정확할 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

입술안이 찢어졌어요 꼬매야되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 꽤나 벌어진 상황입니다. 입술의 상처는 이비인후과에서 진료받아보실 수 있겠고 봉합도 받으실 수 있을테니 가까운 의원을 찾아가보시기 바랍니다. 그때까지 상처는 건들지 않는게 안전하겠습니다.

입술 안이 찢어졌어요 꼬매야될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 선명하지않거나 아니면 어둡게 찍혀서 정확한 답변은 어렵습니다만 일반적으로 구강내 상처는 꿰매지 않아도 잘 회복됩니다

부딪혔는데 입술안에 찢어져서 꼬매야되는상황일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 꽤나 벌어진 상황입니다. 입술의 상처는 이비인후과에서 진료받아보실 수 있겠고 봉합도 받으실 수 있을테니 가까운 의원을 찾아가보시기 바랍니다. 그때까지 상처는 건들지 않는게 안전하겠습니다.

성관계 후 임신 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정은 피임 방법으로 신뢰도가 낮습니다. 첫 번째 관계 후 7시간 후에 다시 관계를 했고 소변을 봤는지 불확실한 상태라면 전립선액에 남아 있는 정자가 두 번째 관계 때 방출될 가능성이 있습니다. 여자친구의 생리 주기가 불규칙적이라면 가임기를 예측하기 어렵기 때문에 임신 가능성을 배제할 수 없습니다. 현재로서는 사후 피임약 복용을 고려하는 것이 좋습니다. 관계 후 3일이 지났다면 사후 피임약의 효과가 적지만 아직 기대할 수 있습니다.

고등학생인데 탈모 온건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사춘기에는 급격한 호르몬의 변화를 겪는 시기라서 남성형 탈모가 시작되기도 합니다. 다만 사진만으로 탈모 여부를 판단하기는 어렵습니다. 가까운 피부과에서 진찰을 받아보셔야 하겠습니다. 혹은 앞머리나 정수리 부근의 머리카락이 옆머리나 뒷머리의 머리카락에 비해 얇은지 확인해보실수도 있겠습니다.

항문에서 피가 나고 불편감이 있는데 혹시 심각한 증상일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의심되는 질환은 모두 항문질환이나 구체적으로는 조금씩 다릅니다. 1. 치열 항문의 상처는 치열을 의심케 합니다. 찢어지면 피도 나고 통증도 보이지만 좌욕하면서 연고 바르면 나아지기도 합니다. 2. 치핵 항문의 콩알만한 덩이 출혈은 치핵이 의심스럽습니다. 3. 치루 반복적으

로 부어올랐다가 가라앉는 반응이 동일한 위치에서 보이고 있습니다. 이는 치루에 대한 확인도 요합니다. 결론적으로는 항문 진찰 없이 정확한 원인을 알기는 어렵습니다. 말씀드린 내용 중 치루의 경우 적극적인 치료를 하지 않으면 더 큰 문제로 이어질 수 있으니 가급적 빠른 진료를 권해드립니다.

관계 중 하얀액체,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질에서 나오는 하얀 액체는 질 분비물과 혼합된 결과일 가능성이 큼니다. 콘돔이 찢어지지 않고 올바르게 사용되었다면 임신 확률은 매우 낮습니다. 성기끼리의 접촉만으로는 임신 확률이 극히 낮습니다. 가임기라면 불안할 수 있지만 피임이 잘 되었다면 걱정할 필요는 적습니다. 그래도 불안하면 사후 피임약을 고려해보세요.

난소에서 발견된 mass 양성 악성 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오른쪽 난소에 발견된 3.8cm 크기의 종양mass이 양성일 확률이 더 높은지에 대해 궁금하실 텐데 종양의 양성 여부는 다양한 요인에 따라 달라집니다. 일반적으로 난소 종양의 대부분은 양성인 경우가 많습니다. 추가로 다음의 요소들이 양성 종양일 가능성을 높일 수 있습니다 1. 크기와 모양 3.8cm 크기의 종양은 비교적 작은 편이며 모양이 단순하고 경계가 명확할수록 양성일 가능성이 높습니다. 2. 증상 현재 겪고 있는 증상들은 난소 종양 외에도 여러 다른 원인들에 의해 발생할 수 있습니다. 종양 자체만으로는 특정 증상을 단정짓기 어렵습니다. 3. 영상 소견 CT와 같은 영상 검사에서 종양의 구조와 특징이 양성 종양과 일치하는지 여부도 중요합니다. 4. 혈액 검사 결과 난소 종양 마커에 CA125 수치가 높지 않으면 양성일 가능성이 더 큼니다. 따라서 추가 검사 및 검토가 필요하므로 우선은 안심하시고 진료를 이어가시기 바랍니다.

여드름 상담,안녕하세요. 메디이즈입니다. 응괴성 여드름이 보이고 있습니다. 여드름의 가장 심한 형태이며 적극적인 치료가 필요합니다. 경구 약 복용 및 피부관리가 병행되어야 하겠으니 가까운 피부과를 방문하여 진료받아보시기 바랍니다.

안녕하세요 선생님 심근경색으로 시술을 한지 3년이 지났습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심근경색으로 굉장히 힘든 시기를 보내셨을 것이라 예상됩니다. 질문자님께선 한 잔 정도는 괜찮지 않을까 하는 생각을 하실 수 있지만 한 잔도 괜찮지 않습니다. 완전한 금주만이 심혈관 질환의 재발을 막는 방법입니다. 금주하는 생활을 이어가시는 것을 권해드립니다.

입에 이상한 느낌이 들어서 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로 관찰되는 인두 편도에서는 특별한 문제가 보이지는 않습니다. 다만 불편감을 느끼고 계시기 때문에 이비인후과를 방문해 진료를 받아보시기를 권해드립니다. 당장 구강 내 암을 의심할 병변은 없습니다.

고관절 MRI에서 천장관절도 보이나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고관절 MRI로 천장관절염을 진단할 수 있지만 최적의 결과를 얻기 위해서는 천장관절을 포함하도록 특별히 설정된 MRI가 더 효과적입니다. 천장관절염의 진단에는 천장관절 전용 MRI가 더 명확하고 자세한 영상을 제공합니다. 고관절 MRI로도 일부 천장관절을 볼 수 있지만 진단 정확도는 떨어질 수 있습니다. 천장관절염이 의심될 경우 천장관절에 초점을 맞춘 MRI를 요청하는 것이 좋습니다. 기침가래가 한달이 넘게 가고 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기관지가 조금 예민한 분이 아닌가 싶습니다. 증상이 지속되면 기관지 알려지에 대한 약을 복용하시는것이 도움이 될것 같습니다

알 수 없는 멍,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알 수 없는 멍은 여러 가지 원인으로 생길 수 있습니다. 술을 많이 마시면 혈액 순환이 잘 되지 않아 멍이 생길 수 있습니다. 또한 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는 경우에도 멍이 생길 수 있습니다. 스트레스를 많이 받으면 혈액 순환

이 잘 되지 않아 멍이 생길 수 있습니다. 따라서 알 수 없는 멍이 생겼다면 술을 줄이고 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는지 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 또한 스트레스를 줄이고 규칙적인 운동을 하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 만약 멍이 생겼을 때 통증이 심하거나 멍이 점점 커지거나 멍이 생긴 곳에 열이 나거나 멍이 생긴 부위가 붓는 등의 증상이 있다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 알 수 없는 멍이 생겼다면 술을 줄이고 혈액 질환이나 혈관 질환이 있는지 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 또한 스트레스를 줄이고 규칙적인 운동을 하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

이비인후과 역류성식도염 처방 되지않아요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 같은 종류의 약을 중복된 시기에 처방받게 되는 경우엔 문제가 될 수 있습니다만 이비인후과에서도 역류성식도염에 대한 진료를 볼 수 있고 처방도 할 수 있습니다. 말씀대로 두 진료과는 해당 질환에 대한 처치가 다르지 않습니다.

사타구니에 멍을 진료과 문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기 주변의 피부병변이라 보입니다. 모낭염과 같은 염증성 질환이 반복되는 것 같다는 생각도 들고 그것이 아니더라도 반복적인 피부의 문제가 유발되는 상태라 보입니다. 외과보다는 피부과나 비뇨의학과가 적합한 진료과로 보입니다.

헤르페스 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1형은 주로 입술에 발생하는 헤르페스고 2형이 성기에 발생하는 성병입니다. 요즘에는 상 하 구분이 크게 의미는 없습니다. IgM 은 현재 감염되어서 체내에서 생성되는 항체이고 IgG는 과거에 감염되어 생성되는 항체입니다. 1형 IgG만 양성으로 보아 과거에 여자친구한테 옮았을 가능성이 있고 최근 성관계는 무관해 보입니다. 신경 안쓰셔도 될것 같습니다.

서해부 탈장밴드 장기적으로 착용하고 다녀도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고환이 서해부에 오랜시간 있으면 고환 위축이 발생해서 불임을 유발할 수 있고 더 큰 문제는 고환암을 일으킬 수 있습니다. 탈장 수술할때 고환 고정술도 같이 했으면 좋았을 텐데 무슨 이유가 있었을 것 같습니다. 대학병원 비뇨의학과 방문하셔서 고환 고정술 수술 받으시기 바랍니다. 위의 밴드는 도움이 안됩니다.

척추 기형,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경학적 결손 여부 확인이 우선일 것으로 생각됩니다. 대학병원 척추 전공 교수님에게 내원하여 MRI 검사 시행을 먼저해보시는 것이 좋을 것으로 사료됩니다.

음낭의 점 뭔가요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 점으로 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

혈액검사 시기 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 보통은 4주 정도 지나서 받는 것이 정확할 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

요도 불편감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 전립선쪽 문제의 가능성이 높습니다 이 부분에 대해서 잘 관리받으시면 좋아질 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

성병관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 잠복기 없이 검사를 받으시면 알 수 있습니다 잠복기에도 감염이 가능하지만 삽입이 없이 걸리기는 어렵습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요

성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

매독,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변 검사로 매독 여부를 알 수 없으며 필요하다면 혈액검사를 받아 보시는 것이 좋습니다. 혈액검사도 조기에 실시하면 위음성이 나올 수 있으며 최대 의심되는 성관계로부터 12주 이후에 검사에서 발견이 될 수 있습니다. 그보다 구강내 병변은 일단은 진료과가 이비인후과이기에 그 쪽과로 방문하셔서 한번 진료를 받아 보시기 바랍니다.

당뇨환자 약질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨약 처방이 어떻게 되었는지가 완벽히 적혀있지 않아서 자세히 답변이 어렵습니다 우루사의 경우에는 추가복용해도 괜찮습니다 다이나백스의 경우에는 병원에 문의를 해주시길 바랍니다 건강하세요

이 비뇨기과약들이랑 이정신과약이랑 같이 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경정신계통은 신장과 간에서 해독되는 경우가 많습니다 복용 시간이 최대한 겹치지 않아야 합니다 비뇨기과 약에 현재 항생제도 포함이 되어 있는 것으로 보이기에 더더욱 시간 간격을 1시간 이상 띄어서 먹을 것을 권하드립니다

파마 가바 영양제 장기복용 해도 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스와 안정효과를 위해 복용하는 보조제 로 알고 있습니다 6개월 정도 후에 1개월 휴식이 제일 안전하다고 봅니다 장기복용은 감태와 홍경천과 같은 생약성분이 조금더 오래 복용이 가능합니다

Advil이부프로펜과 네오펜틴가바펜틴 타세놀아세트아미노펜 동시 복용 가능,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼굴과 귀 그리고 뒤통수까지 신경통이 있으시다니 심히 통증이 있으실 듯 합니다 게다가 잠도 잘 못 주무실 것 같은데요 겹치는 성분이 아니기에 애빌은 추가 복용 가능합니다 통증이 가라앉는다면 얼른 숙면을 취하시길 바랍니다

간염 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 현재 먹고 있는 약이 위와 장 운동제 위산억제제 그리고 간해독제 소화효소제 입니다 1번만 먹을거라면 간에 영향은 없습니다 부작용도 없다고 생각되고 다만 면접 끝나고 음주를 피해야 합니다 자판이 신경안정효과가 있기에 소량의 음주에도 금방 취할 수 있습니다 건강하시길 바랍니다

사진꼭 봐주세요 혀아래에 돌기 살점 같은게 덜렁거려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혀가 어제부터 따끔거리서 봤는데 혀아래에 이런게 있네요 손으로 췌게 땡기면 뜰어질거같이 걸렁거려요 이거 뭐가요? 병원가야되나요 쉬면 낫는건가요 돌기같은 살점은 정상인데 거기에 상처가 난 거 같습니다 며칠 놔두시면 자연적으로 나을거예요

힘듭네요,안녕하세요. 요약 1. 사람은 고쳐쓰지 못하니 2. 환경을 바꿀 수 있으면 바꿔 보세요 3. 같이 안 살면 만나는 빈도를 줄이거나 4. 굳이 내가하는 일을 언급할 이유가 없으면 안 하면 시비걸릴 일도 없을테니 5. 정신의학과에서는 상담은 받아 보세요. 건승하세요

밤을 새우면 흉통 두근거림,안녕하세요. 요약 1. 부정맥이 있는지 확인해 보세요 2. 정상 심박동수에 엇박자로 뛰기도 합니다. 3. 엇박자일때 잠깐 몸에서는 이상기운을 느낄 수도 있습니다. 4. 심장내과에서 부정맥의 원인과 정도를 확인해 보세요 심장두근거림이 일시적인 현상으로 끝나지 않고 지속적으로 나타나고 가슴이 쿵하고 내려앉는 느낌이나 심장이 갑자기 멈추는 듯한 느낌 심장이 빠르거나 느린 느낌이 든다면 부정맥의 여부를 확인해보아야합니다. 건승하세요

36개월 아기 소변 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 거품뇨의 기준이 따로 있는 것은 아닙니다. 거품뇨라고 하기는 어려울것 같습니다. 유전의 영향은 극히 제한적일 것으로 생각됩니다

손에 붉은점이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독에서 보이는 특징적인 궤양성 병

변이 없었다면 피부에 나타난 변화를 매독이라 추정할 근거는 빈약합니다. 아마 의심스러운 성관계가 있었다는 말씀으로 이해되나 정체를 알기 위해서는 우선 피부과를 방문해 진료를 받아보시기 바랍니다.

코 빨개짐 및 블랙헤드 흉터,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마 심하게 짠 부위가 붉게 발적이 있는 부위가 아닌가 싶습니다. 좋아지려면 시간이 좀 필요하고 오래가면 레이저 치료가 필요할 수 있어요 노카나 발라주세요. 이것으로 다 해결되지 않기도 합니다

비브리오,안녕하세요 요약 1. 유행하는 시절에는 그냥 피하는게 좋습니다. 2. 걸렸을때 군 감염이기 때문에 빠른 병원 치료가 필요합니다. 3. 대응은 병원에서 해 줍니다. 비브리오 패혈증은 비브리오균에 오염된 어패류를 생식하거나 피부 상처를 통해 비브리오균에 감염되었을 때 발생하는 질환입니다 비브리오 패혈증을 일으키는 비브리오균은 바다에 사는 그람음성 세균으로 주로 69월에 해안 지역에서 발생합니다. 어패류를 생식하거나 균에 오염된 해수에 피부 상처가 노출되면 비브리오 패혈증에 걸릴 수 있습니다. 건승하세요

곤지름피부 낭종피지샘 과다분비증 무엇일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기로는 곤지름이나 피부낭종 피지샘 과다분비증은 아니고 정성적으로 존재하는 모낭이 두드러지게 보이는 것이 아닌가 싶습니다

허리의 원인으로 발등만 불편할 수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요추 질환이 있다면 하지의 방사통이 있을 수 있지만 발등 일부만 불편감이 있는 경우는 흔하지 않습니다. 다른 원인을 찾아 보아야 합니다.

약효과질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 세잘정 Cetirizine 항히스타민제로 알레르기 증상을 완화하며 효과는 24시간 가량 지속됩니다. 베솔론정 Prednisolone 스테로이드제로 염증과 알레르기 반응을 억제하며 약효는 복용 후 12시간 내에 시작되어 36시간 정도 지속될 수 있습니다. 케이캡정 Tegoprazan 위산 분비 억제제로 위염과 위궤양 치료에 사용되며 약효는 복용 후 30분 내에 시작되어 약 24시간 지속됩니다.

곤지름피부 낭종피지샘 과다분비증 무엇일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기로는 곤지름이나 피부낭종 피지샘 과다분비증은 아니고 정성적으로 존재하는 모낭이 두드러지게 보이는 것이 아닌가 싶습니다

조영제 주사시 감염여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제에 대한 알레르기 반응을 평가하기 위해 피내주사를 맞았고 그 부위에 표시한 상황이라 이해됩니다. 말씀하신 패혈증과 같은 심각한 감염증이 발생할 가능성은 거의 없습니다. 안심하셔도 됩니다.

무릎 불안함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. MRI를 찍지는 않습니다. 허리를 위주로 엑스레이를 확인하고 대퇴사두근 근력의 대칭성 등을 확인하여 사두근의 순환을 위한 대퇴신경이 완치료를 받으시면 가장 좋겠습니다.

이게 혹시 뭐가요?~,안녕하세요. 메디이즈입니다. 닭살처럼 보이는 피부병변이 걱정스러우시군요. 모공각화증일 가능성이 높아보입니다. 불편감을 유발하지 않는다면 그냥 두셔도 괜찮은 병변입니다. 만약 변화가 느껴진다면 악화되는 것 같다면 비뇨의학과를 방문하시기 바랍니다.

화농성 종기 연속 재발,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반복적인 화농성 종기는 면역 체계의 약화나 특정 세균의 지속적인 감염으로 인한 것일 수 있습니다. 세균이나 바이러스가 혈관을 타고 퍼질 가능성은 굉장히 낮고 주로 피부 표면에서의 감염이 반복되는 경우가 많습니다. 한선염보다는 여러 부위에서 반복적으로 발생하는 점에서 특정 균주에 의한 피부 감염증이 더 의심됩니다. 지속적인 문제라면 꾸준한 항생제 치료나 면역력 검사가 필요할 수 있겠습니다.

화농성 종기 연속 재발,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반복적인 화농성 종기는 면역 체계의 약화나 특정 세균의 지속적인 감염으로 인한 것일 수 있습니다. 세균이나 바이러스가 혈관을 타고 퍼질 가능성은 굉장히 낮고 주로 피부 표면에서의 감염이 반복되는 경우가 많습니다. 한선염보다는 여러 부위에서 반복적으로 발생하는 점에서 특정 균주에 의한 피부 감염증이 더 의심됩니다. 지속적인 문제라면 꾸준한 항생제 치료나 면역력 검사가 필요할 수 있습니다.

요산수치 금식과 상관있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요산 수치 8.0은 다소 높은 편이지만 검사 전 식사불고기로 인해 일시적으로 상승했을 가능성이 있습니다. 금식 없이 검사한 결과는 식사의 영향을 받을 수 있으므로 요산 수치가 정확히 평가되지 않을 수 있습니다. 따라서 통풍약을 복용할 필요가 있는지 여부는 추가적인 검사가 필요할 수 있겠으니 내과를 다시 방문해보시는게 좋겠습니다.

성기 기둥쪽에 뭔가 낮어요사진 포함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어느날부터 기둥쪽에 덩어리 같은게 생겼는데 만지면 아프진 않은데 여드름 짜는거처럼 세게 누르면 아프군요. 피부염 등의 가능성으로 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

눈을 옆으로 돌릴때마다 번쩍거리는 작은알갱이가보입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 망막에 문제가 없다고 진단받았다면 큰 문제는 아닐 가능성이 큼니다. 갑자기 생기는 알갱이 같은 빛은 광시증의 일종으로 눈의 피로나 스트레스 항불안제의 부작용 등으로 나타날 수 있습니다. 그러나 증상이 지속되거나 악화된다면 추가적인 검사를 받는 것이 좋습니다. 특히 다른 이상 증상시야 장애 시력 저하 등이 동반된다면 즉시 안과를 방문하시기 바랍니다.

감기 후 부비동염과 기침 감기 한달째 기침2주째 계속해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아급성 기침에 해당되며 대부분은 감염 이후에 생기는 기침으로 시간이 지나면 호전이 되는 경우가 많습니다. 힘드시겠지만 경과를 지켜보시고 지속시는 호흡기내과를 방문해 보세요

문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 레이저치료에 의해 피부자극으로 인해 발생한 주사rosacea일 가능성이 있어보입니다. 정확한것은 피부과 진료를 받으시고 적절한 치료를 받는게 좋겠습니다.

이거 진주양구진일까요 곤지름일까요 헤르페스일까요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으며 피부 구진 등의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

지능에 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과거의 후두부 부상도 영향을 미쳤을 수 있지만 현재 증상은 최근의 문제와 더 관련이 깊을 것입니다. 고등학생이므로 학업 스트레스도 기억력에 영향을 주었을 수는 있습니다. 정확한 원인을 파악하기 위해 신경과나 정신건강의학과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋겠습니다.

식후 양치시간 질문합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아포가토를 먹은 후에는 커피와 단 음식이 함께 들어있으므로 양치 시점에 대한 권장 사항을 조합할 필요가 있습니다. 커피는 산성 음료로 바로 양치하면 치아 에나멜이 약해질 수 있어 30분 후에 양치하는 것이 좋습니다. 단 음식을 먹은 후에는 즉시 양치하는 것이 좋지만 커피의 산성 효과를 고려해 30분을 기다리는 것이 더 나을 것이라 판단됩니다. 따라서 아포가토를 먹은 후에는 30분 정도 기다렸다가 양치하는 것이 좋겠습니다.

가끔씩 감정을 조절하기 힘든데 약을 복용하면 가시적인 효과가 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 분노조절장애도 여러가지 유형과 복합적인 정신과질환과 연관이 있습니다. 간헐적

폭발성장애의 한 형태로 보여집니다. 꼭 반드시 정신과진료를 보시고 상담과 적절한 약을 처방받기를 권합니다. 보험 문제보다는 건강이 우선이니.. 지금 상황에서는 건강이 우선일 것으로 보이네요.

빠가뛰어나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양측의 대칭이 중요합니다. 발목은 사진만으로는 정상으로 보이며 손목 척골측의 융기부분은 반대측과 같이 찍어서 올려주시면 좋겠습니다. 귀 돌발성난청과 허벅지 감각 이상함이 관련 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 관련이 없을 것 같습니다 돌발성난청과 이상지각성대퇴신경통이 같이 생긴 상태인데 각각 따로 치료 받으시면 됩니다.

장유착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마그밀을 복용하지 않으면 변이 잘 나오지 않는 상황이지군요. 다행히 가스는 잘 배출되는 것 같습니다. 그렇다면 장이 완전히 막힌 상황 장폐색은 아니라는 의미이고 최소한 수술까지 갈만한 문제는 아니라고 예상됩니다. 다만 변비가 만성적으로 존재하는 것 같으니 약으로 우선 증상 조절해보시고 내과에서 꾸준히 관리받아보시는 것이 좋겠습니다.

담석증 문의드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담석이 1.7cm 정도이고 통증이 있다면 경우에 따라서 담낭절제술 수술까지도 고려해봐야 할 사항인거 같습니다. 소화기내과 진료를 보시고 적절한 치료를 받으시기 바랍니다.

손목 반점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부발진은 성병외에도 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 정확한 진단을 위해 피부과 전문의의 상담을 받는 것이 좋겠습니다.

왼쪽눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속된다면 안과에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 눈의 상태를 검사하고 충혈의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다. 충혈의 원인은 다양할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 결막염입니다. 결막염은 눈의 흰자위와 눈꺼풀 안쪽을 덮고 있는 결막에 염증이 생기는 질환입니다. 결막염은 세균이나 바이러스에 감염되거나 알레르기 반응으로 인해 발생할 수 있습니다. 결막염은 안약을 사용하거나 항생제 등을 복용하면 치료할 수 있습니다. 다른 원인으로는 눈의 피로 건조증 과민성 반응 등이 있습니다. 눈의 피로나 건조증은 충분한 휴식을 취하거나 눈에 수분을 공급하면 증상이 완화될 수 있습니다. 과민성 반응은 특정 물질에 대한 알레르기 반응으로 인해 발생합니다. 과민성 반응은 알레르기 물질을 피하면 증상이 완화될 수 있습니다. 왼쪽 눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속된다면 안과에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 눈의 상태를 검사하고 충혈의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다.

요도 상태 어떨까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도 곤지름이나 성사마귀는 성관계를 통해서 전염되는 질환입니다. 따라서 성관계를 한 적이 없다면 요도 곤지름이나 성사마귀가 있을 가능성은 매우 낮습니다. 요도 아래의 보라색 물집은 혈관일 가능성이 높습니다. 혈관은 피부 표면 아래에 위치해 있기 때문에 혈관이 튀어나와 보일 수 있습니다. 혈관은 특별한 질환이 아니므로 치료가 필요하지 않습니다. 만약 혈관이 튀어나와서 불편하다면 병원에서 제거할 수 있습니다. 요도 곤지름이나 성사마귀가 의심된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 진료를 통해 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받을 수 있습니다.

신속검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 애보트 바이오라인 HIV 12 3.0 신속키트의 경우 제조사 설명서에 따르면 HIV 감염 후 12주 이후 실시 시 99.6%의 민감도를 보이는 것으로 알려져 있습니다. 이는 매우 높은 수준의 정확도입니다. 하지만 이 키트의 특이도음성 판정의 정확도는 99.5로 다소 낮습니다. 즉 위양성 결과의 가능성이 약간 있다는 뜻입니다.

무릎 불안함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. MRI를 찍지는 않습니다. 허리를 위주로 엑스레이를 확인하고 대퇴사두근 근력의 대칭성 등을 확인하여 사두근의 순환을 위한 대퇴신경이 완치료를 받으시면 가장 좋겠습니다.

팔팔정 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 몸이 피곤하거나 하면 그럴 수 있습니다. 2. 비아라는 식사와 함께 복용해도 큰 문제는 없지만 고지방 식사를 한 후 비그라를 복용하면 비그라의 흡수가 지연될 수 있습니다. 나이가 젊으시니 꼭 필요한 경우에만 복용을 고려하시기 바랍니다

비브리오,안녕하세요 요약 1. 유행하는 시절에는 그냥 피하는게 좋습니다. 2. 걸렸을때 군 감염이기 때문에 빠른 병원 치료가 필요합니다. 3. 대응은 병원에서 해 줍니다. 비브리오 패혈증은 비브리오균에 오염된 어패류를 생식하거나 피부 상처를 통해 비브리오균에 감염되었을 때 발생하는 질환입니다 비브리오 패혈증을 일으키는 비브리오균은 바다에 사는 그람음성 세균으로 주로 69월에 해안 지역에서 발생합니다. 어패류를 생식하거나 균에 오염된 해수에 피부 상처가 노출되면 비브리오 패혈증에 걸릴 수 있습니다. 건승하세요

수두 환자 샤워나 화장품 연고,안녕하세요 요약 1. 세안해도 되고 샤워해도 되는데 막 비비진 마세요 2. 자극을 줘서 가려움증을 유발할 정도는 피해야 합니다. 3. 스킨 로션도 발랐을 때 병변을 악화시킬 수 있으니 병변은 피해서 바르거나 잠시 쉬는게 좋습니다. 4. 안건드리는 게 최선입니다. 5. 소독하지 마세요. 조직 다 죽어 나갑니다. 건승하세요

한쪽 발 저림 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발저림의 원인중 애매한 느낌은 순환장애에 의한 증상일 수 있습니다. 이상근증후군 치료를 조금더 해보고 호전이 없으면 의사선생님께 순환에 대한 문제를 다시 물어보시면 됩니다.

명동 바닥에 있는 콘센트 밟은 후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전기에 대한 손상을 걱정하실 필요는 없습니다. 콘센트가 아니라 비슷한 다른 물건을 밟았어도 증상은 똑같았을테니 느껴지는 증상에 대한 치료만 받으시면 됩니다.

MRI CT 기록 안 가져가도 고주파 열응고술 받을 수 있나요?,안녕하세요 요약 1. 기록 없이도 진료후에 질환이 의심되면 시행할 수 있습니다. 2. 법적으로 제약 없습니다. 다만 의료진의 판단에 따릅니다. 고주파열응고술은 열과 자기장으로 운동신경 응고는 피하면서 통증을 전달하는 감각 신경만을 선택적으로 응고시키는 방법 입니다. 신경차단술 시행 후 수술로 가기 전단계에서 고주파 열응고술로 치료로 주로 하게 됩니다. 건승하세요

숨이 답답하고 냄새가 납니다.,안녕하세요 요약 1. 역류검사도 진행해 보세요 2. 언급된 검사 말고 역류성 식도염이나 역류성 후두염의 검사로 산도 검사하는 게 있습니다. 3. 그리고 축농증은 후비루가 있어서 언급한 숨이 답답하고 기침을 자주 하는 증상이 생기니 4. 것도 감별이 필요합니다. 건승하세요

곤지름 조직검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 의증으로 보입니다 하지만 가능성이 있기때문에 재발이나 비슷한 증상 이 생긴다면 다시 진료를 보셔야 합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

허리디스크 mri,안녕하세요 요약 1. 척추병원에서 확인이 되었고 2. 영상의학과에서 정식판독까지 되었으면 3. 언급한 병변 이상의 질환을 찾기 힘들겁니다. 4. 신체화장애가 있는지도 확인해 보세요 신체화장애는 신체적인 원인으로 충분히 설명되지 않는 신체 증상들이 여러 신체 기관에 걸쳐 다양 하고 반복적으로 나타나는 장애입니다. 건승하세요

마른비만 운동법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마른체형의 경우 운동과 영양의 비중이 37 정

도로 보시면 됩니다. 운동은 단시간 고강도를 권장합니다. 예를 들면 벤치프레스를 통해 가슴의 근육을 강화시키면 최소 3일간은 해당 부위의 휴식과 충분한 영양공급이 필요합니다. 그 사이 다른 부위의 운동을 통해 휴식과 영양공급을 반복하는데 이를 분할법이라고 합니다. 만약 첫째날 가슴운동을 하고 다음날 근육통을 감수하고 동일 부위를 반복한다면 근육이 충분히 성장하기 어려우며 오히려 근피로에 의해 운동을 중단할 수 밖에 없게 됩니다. 그러므로 분할법을 검색하시어 운동부위별 스케줄대로 실시하시고 특히 영양공급이 매우 중요하다는 점을 명심하시기 바랍니다.

가끔씩 보는 점액변 질문있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 그럴수 있습니다 점액변이 나오는 주된 이유는 다음과 같습니다. 염증성 장질환 궤양성 대장염 크론병 등의 염증성 장질환에서 점액이 과다 분비될 수 있습니다. 장벽이 손상되면서 점막에서 과도한 점액이 생깁니다. 감염 세균성이나 바이러스성 장염 등의 감염 시 염증 반응으로 점액 분비가 증가합니다. 과민성 대장 증후군 장운동 이상으로 인해 점액 분비가 많아지는 경우가 있습니다. 방사선 치료 방사선 치료로 인한 장 점막 손상 때문에 점액이 많이 섞일 수 있습니다. 장 폐색 장의 일부가 막혔을 때 그 부위 아래에서 점액변이 생길 수 있습니다. 약물 부작용 일부 약물 복용으로 인한 부작용으로 점액변이 관찰되기도 합니다.

남자 턱수염 안남,안녕하세요 요약 1. 턱에 모낭이 없으면 안 납니다. 2. 유전적으로 결정되는 부분이기 때문에 3. 병적문제가 있는게 아니고 남성호르몬 중 털 나는 호르몬이 부족하면 4. 다른 부위에서도 털이 안 납니다. 5. 그냥 거기 모낭이 없어서 그럴 수 있습니다. 건승하세요

매독 보건소 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 개인정보는 본인의 동의 없이는 열람이 불가능합니다. 그리고 자동으로 병원 차트에 뜨거나 하지는 않으니 안심하세요

요도 불편감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기본 소변검사에서 염증소견이 보여 std12종성병검사를 한달 새 수차례 하였고 결과적으로 이상 없었군요. 처방해준 독시사이클린 1주 씩 몇번 복용하였고 복용시에는 한동안 이상없다가 복용이 끝나고 12주 후 증상 재발하고 요도소양감 및 요도를 짜면 분비물이 나오고 은은한 불쾌감이 평상시 공존하는 느낌 등이 있군요. 치료 받으신 병원 다시 내원하셔서 상담후 전립선 검사 등의 필요한 검사후 치료를 받도록 하십시오.

요도 불편감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 전립선쪽 문제의 가능성이 높습니다 이 부분에 대해서 잘 관리받으시면 좋아질 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

헤르페스 2형 증상질문,안녕하세요 요약 1. 다리저림과 허리통증이 있으면 2. 허리염좌나 디스크를 먼저 감별해 보세요 3. 언급한 증상으로 먼저 헤르페스를 의심하진 않습니다. 건승하세요.

팔에 좁쌀 두드러기? 피부질환,안녕하세요 요약 1. 두드러기는 아니고 2. 편평사마귀인지 확인해 보세요 오돌토돌 몸에 돌아나는 작은 돌기같은 편평사마귀는 편평한 모양으로 튀어나와 있으면서 다발성으로 발생합니다. 5mm미만의 작은 크기와 다발성으로 번지면서 가슴과 배 쪽으로 내려오기도 하고 등이나 어깨 팔 다리로 번질 수도 있습니다. 건승하세요

성기에 여드름 같은게 낫는데 병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진주종성 구진 등의 소견으로 치료 없이 그냥 지내셔도 되는 소견입니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?vLAZ8hRuelg>

요로결석 신장결석이 자주 생겼다 빠졌다 할수있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 결석이 자주 재발할 수 있습니다. 씨티 촬영해보셨나요? 체중이 많아나가면 재발을 잘하지 적정체중을 유지하도록 애써보세요

병원에서 처방 받은 변비약 복용중 인데 이게 정상적인 반응입니까?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변비가 심하신것 같습니다. 약을 조절할 필요가 있어 보입니다. 채소 섭취를 충분히 늘려주시는 것도 고려해보श्य

팔팔정 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 몸이 피곤하거나 하면 그럴 수 있습니다. 2. 비아라는 식사와 함께 복용해도 큰 문제는 없지만 고지방 식사를 한 후 비그라를 복용하면 비그라의 흡수가 지연될 수 있습니다. 나이가 젊으시니 꼭 필요한 경우에만 복용을 고려하시기 바랍니다

항문 내부에 하얀색 멍울들이 잔뜩 올라왔어요,안녕하세요 요약 1. 치핵인지 확인해 보세요 2. 치핵과 임파선이 같이 있을 수 있는데 언급한 행위가 악화요인이 됩니다. 3. 항문외과로 가보세요 치질은 항문에 생기는 모든 질환을 말하는데 이중 80가 치핵입니다. 치핵은 항문 안쪽 점막 내 혈액이 뭉치면서 혹 같은 덩어리가 생기는 것이며 증상의 경중에 따라 네 단계로 나뉘는데 단계에 따라 치료법이 다릅니다. 건승하세요

눈을 자주 만지면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만지거나 비비는 습관이 지속되면 피부와 조직에 자극을 주어 염증이 반복될 수 있습니다. 그러나 눈꺼풀이 처지는 것은 주로 나이 피부 탄력 저하 유전적 요인 등으로 발생합니다. 자주 만지는 습관이 장기적으로 눈 주위 피부에 손상을 줄 수 있지만 즉각적으로 눈꺼풀 처짐을 유발하는 주요 원인은 아닙니다. 현재 다래끼가 발생한 상황으로 보이므로 안과를 방문하시기 바랍니다.

나무가시 이물,안녕하세요 요약 1. 초음파를 해서 이물이 남아 있는지 확인해 보세요 2. 그게 정신 건강에도 좋을 겁니다. 3. 초음파 가능한 병원에서 간단하게 초음파를 대면 바로 감별될겁니다. 건승하세요

배란통과 갈색냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이번 배란기 동안 지속되는 갈색 냉과 배란통 울렁거림 등의 증상은 호르몬 변화나 일시적인 신체 상태의 변화로 인한 것일 수 있습니다. 그러나 갈색 냉이 오래 지속되고 다른 증상들도 함께 나타난다면 자궁내막증이나 다른 여성 질환을 의심해볼 필요가 있습니다. 혼자 해결하기보다는 증상이 심해질 경우 가능한 빨리 산부인과 진료를 받는 것이 좋습니다.

건강염려증 같은데 어떻게 해야 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 어머니가 아프시다니 어찌면 당연한 일이겠지만 정도를 넘어서면 일상생활에 큰 지장을 줄 수 있습니다. 검사에 이상이없고 증상이 지속되면 정신건강의학과 진료 받아보श्य

임태기 확인,안녕하세요 요약 1. 아래 생리 주리를 벗어나면 생리불순의 원인을 찾아 봐야 합니다. 2. 임신 관련 스트레스도 원인이 됩니다. 정상적인 생리 주기는 2138일 기간은 38일 하루 생리량은 2080ml입니다. 이 범위를 벗어나면 생리 불순이라고 합니다. 스트레스 갑작스러운 체중 증가감소 고강도의 과한 운동 신경성 식욕 부진 같은 섭식장애는 호르몬 분비에 영향을 줘 생리 주기를 변화시킬수 있는데 무배란자궁근종자궁내막암과 자궁경부암 같은 질환 갑상샘 기능 이상 같은 내분비계 장애가 원인이 될 수도 있습니다. 건승하세요

감기 후 부비동염과 기침 감기 한달째 기침2주째 계속해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아급성 기침에 해당되며 대부분은 감염 이후에 생기는 기침으로 시간이 지나면 호전이 되는 경우가 많습니다. 힘드시겠지만 경과를 지켜보시고 지속시는 호흡기내과를 방문해 보세요

천식은 진료과가 어디인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통은 알레르기 내과에서 천식진료

를 많이 하는 편이지만 병원에 따라서는 호흡기 내과에서도 진료 하기도 하니 예약전에 미리 확인해보셔요

문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 레이저치료에 의해 피부자극으로 인해 발생한 주사rosacea일 가능성이 있어보입니다. 정확한것은 피부과 진료를 받으시고 적절한 치료를 받는게 좋겠습니다.

가끔씩 감정을 조절하기 힘든데 약을 복용하면 가시적인 효과가 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 분노조절장애도 여러가지 유형과 복합적인 정신과질환과 연관이 있습니다. 간헐적 폭발성장애의 한 형태로 보여집니다. 꼭 반드시 정신과진료를 보시고 상담과 적절한 약을 처방받기를 권합니다. 보험 문제보다는 건강이 우선이니.. 지금 상황에서는 건강이 우선일 것으로 보이네요.

빠가뛰어나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양측의 대칭이 중요합니다. 발목은 사진만으로는 정상으로 보이며 손목 척골측의 융기부분은 반대측과 같이 찍어서 올려주시면 좋겠습니다. 천식은 진료과가 어디인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통은 알레르기 내과에서 천식진료를 많이 하는 편이지만 병원에 따라서는 호흡기 내과에서도 진료 하기도 하니 예약전에 미리 확인해보셔요

이거 진주양구진일까요 곤지름일까요 헤르페스일까요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으며 피부 구진 등의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

귀 돌발성난청과 허벅지 감각 이상함이 관련 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 관련이 없을 것 같습니다 돌발성난청과 이상지각성대퇴신경통이 같이 생긴 상태인데 각각 따로 치료 받으시면 됩니다.

손목 반점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부발진은 성병외에도 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 정확한 진단을 위해 피부과 전문의의 상담을 받는 것이 좋겠습니다.

지능에 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과거의 후두부 부상도 영향을 미쳤을 수 있지만 현재 증상은 최근의 문제와 더 관련이 깊을 것입니다. 고등학생이므로 학업 스트레스도 기억력에 영향을 주었을 수는 있습니다. 정확한 원인을 파악하기 위해 신경과나 정신건강의학과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋겠습니다.

장유착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마그밀을 복용하지 않으면 변이 잘 나오지 않는 상황이지군요. 다행히 가스는 잘 배출되는 것 같습니다. 그렇다면 장이 완전히 막힌 상황 장폐색은 아니라는 의미이고 최소한 수술까지 갈만한 문제는 아니라고 예상됩니다. 다만 변비가 만성적으로 존재하는 것 같으니 약으로 우선 증상 조절해보시고 내과에서 꾸준히 관리받아보시는 것이 좋겠습니다.

병원에서 처방 받은 변비약 복용중 인데 이게 정상적인 반응입니까?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변비가 심하신것 같습니다. 약을 조절할 필요가 있어 보입니다. 채소 섭취를 충분히 늘려주시는 것도 고려해보셔요

요로결석 신장결석이 자주 생겼다 빠졌다 할수있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 결석이 자주 재발할 수 있습니다. 씨티 촬영해보셨나요? 체중이 많이나가면 재발을 잘하지 적정체중을 유지하도록 애써보세요

건강염려증 같은데 어떻게 해야 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 어머니가 아프시다니 어쩌면 당연한 일이겠지만 정도를 넘어서면 일상생활에 큰 지장을 줄 수

있습니다. 검사에 이상이없고 증상이 지속되면 정신건강의학과 진료 받아보셔요

매독 보건소 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 개인정보는 본인의 동의 없이는 열람이 불가능합니다. 그리고 자동으로 병원 차트에 뜨거나 하지는 않으니 안심하세요

가끔씩 보는 점액변 질문있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그럴수 있습니다 점액변이 나오는 주된 이유는 다음과 같습니다 염증성 장질환 궤양성 대장염 크론병 등의 염증성 장질환에서 점액이 과다 분비될 수 있습니다. 장벽이 손상되면서 점막에서 과도한 점액이 생깁니다. 감염 세균성이나 바이러스성 장염 등의 감염 시 염증 반응으로 점액 분비가 증가합니다. 과민성 대장 증후군 장운동 이상으로 인해 점액 분비가 많아지는 경우가 있습니다. 방사선 치료 방사선 치료로 인한 장 점막 손상 때문에 점액이 많이 섞일 수 있습니다. 장 폐색 장의 일부가 막혔을 때 그 부위 아래에서 점액변이 생길 수 있습니다. 약물 부작용 일부 약물 복용으로 인한 부작용으로 점액변이 관찰되기도 합니다.

외발서기 운동 궁금한게 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 외발서기는 발목의 수용성기능촉진운동으로서 매우 좋습니다. 외발서기 등의 밸런스 운동을 권하는 대표적인 사례는 발목염좌 후 재활과정입니다. 점프하여 착지할 때 발바닥이 바닥면을 향해야 하는데 잦은 외회전에 의해 발바닥면이 내측을 향해 있다면 이는 발목의 매우 큰 손상을 일으키게 됩니다. 방법을 설명드리자면 발바닥을 바닥에 둔 채 발가락들로 바닥을 움켜쥐는 방식으로 버티시는 것이 좋습니다. 처음에는 딱딱한 바닥에서 하다가 말랑말랑한 폼보드나 베개같은 것을 활용하시는 난이도를 올리실 수도 있으니 참고바랍니다.

마른비만 운동법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마른체형의 경우 운동과 영양의 비중이 37 정도로 보시면 됩니다. 운동은 단시간 고강도를 권장합니다. 예를 들면 벤치프레스를 통해 가슴의 근육을 강화시키면 최소 3일간은 해당 부위의 휴식과 충분한 영양공급이 필요합니다. 그사이 다른 부위의 운동을 통해 휴식과 영양공급을 반복하는데 이를 분할법이라고 합니다. 만약 첫째날 가슴운동을 하고 다음날 근육통을 감수하고 동일 부위를 반복한다면 근육이 충분히 성장하기 어려우며 오히려 근피로에 의해 운동을 중단할 수 밖에 없게 됩니다. 그러므로 분할법을 검색하시어 운동부위별 스케줄대로 실시하시고 특히 영양공급이 매우 중요하다는 점을 명심하시기 바랍니다.

무릎 불안함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. MRI를 찍지는 않습니다. 허리를 위주로 엑스레이를 확인하고 대퇴사두근 근력의 대칭성 등을 확인하여 사두근의 순환을 위한 대퇴신경이 완치료를 받으시면 가장 좋겠습니다.

곤지름 조직검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 의증으로 보입니다 하지만 가능성이 있기때문에 재발이나 비슷한 증상 이 생긴다면 다시 진료를 보셔야 합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

명동 바닥에 있는 콘센트 밟은 후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전기에 대한 손상을 걱정하실 필요는 없습니다. 콘센트가 아니라 비슷한 다른 물건을 밟았어도 증상은 똑같았을테니 느껴지는 증상에 대한 치료만 받으시면 됩니다.

한쪽 발 저림 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발저림의 원인중 애매한 느낌은 순환장애에 의한 증상일 수 있습니다. 이상근증후군 치료를 조금더 해보고 호전이 없으면 의사선생님께 순환에 대한 문제를 다시 물어보시면 됩니다.

무릎 불안함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. MRI를 찍지는 않습니다. 허리를 위주로 엑스레이를 확인하고 대퇴사두근 근력의 대칭성 등을 확인하여 사두근의 순환을 위한 대퇴신경이

완치료를 받으시면 가장 좋겠습니다.

귀 돌발성난청과 허벅지 감각 이상함이 관련 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 관련이 없을 것 같습니다 돌발성난청과 이상지각성대퇴신경통이 같이 생긴 상태인데 각각 따로 치료 받으시면 됩니다.

빠가뛰어나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양측의 대칭이 중요합니다. 발목은 사진만으로는 정상으로 보이며 손목 척골측의 용기부분은 반대측과 같이 찍어서 올려주시면 좋겠습니다. 수두 환자 샤워나 화장품 연고,안녕하세요 요약 1. 세안해도 되고 샤워해도 되는데 막 비비진 마세요 2. 자극을 줘서 가려움증을 유발할 정도는 피해야 합니다. 3. 스킨 로션도 발랐을 때 병변을 악화시킬 수 있으니 병변은 피해서 바르거나 잠시 쉬는게 좋습니다. 4. 안건드리는 게 최선입니다. 5. 소독하지 마세요. 조직 다 죽어 나갑니다. 건승하세요

허리의 원인으로 발등만 불편할 수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요추 질환이 있다면 하지의 방사통이 있을 수 있지만 발등 일부만 불편감이 있는 경우는 흔하지 않습니다. 다른 원인을 찾아 보아야 합니다.

성기에 발진이 생겼는데 성병인지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 비뇨의학과 진료를 받아보시면 좋을 것 같습니다 자극을 받아서 생긴것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

눈을 자주 만지면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만지거나 비비는 습관이 지속되면 피부와 조직에 자극을 주어 염증이 반복될 수 있습니다. 그러나 눈꺼풀이 처지는 것은 주로 나이 피부 탄력 저하 유전적 요인 등으로 발생합니다. 자주 만지는 습관이 장기적으로 눈 주위 피부에 손상을 줄 수 있지만 즉각적으로 눈꺼풀 처짐을 유발하는 주요 원인은 아닙니다. 현재 다래끼가 발생한 상황으로 보이므로 안과를 방문하시기 바랍니다.

배란통과 갈색냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이번 배란기 동안 지속되는 갈색 냉과 배란통 울렁거림 등의 증상은 호르몬 변화나 일시적인 신체 상태의 변화로 인한 것일 수 있습니다. 그러나 갈색 냉이 오래 지속되고 다른 증상들도 함께 나타난다면 자궁내막증이나 다른 여성 질환을 의심해볼 필요가 있습니다. 혼자 해결하기보다는 증상이 심해질 경우 가능한 빨리 산부인과 진료를 받는 것이 좋습니다.

공복혈당 및 혈압수치가 차이나는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공복혈당이 그렇다고 하면 이전보다 공복혈당이 오른것으로 판단됩니다. 혈압은 측정할때마다 혈당도 마찬가지로 조금 차이가 있을 수 있는데 약물복용이 필요한 정도가 아니면 경과관찰 합니다

붉은 냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아피임약을 복용하는 초기 몇 주 동안 부정출혈이 발생할 수 있습니다. 이는 약물에 대한 몸의 적응 과정 중에 흔히 나타나는 부작용입니다. 10알째 까지 복용했어도 아직 몸이 완전히 적응하지 않았을 수 있습니다. 부정출혈이 계속되거나 심해지면 산부인과 의사와 상의하는 것이 좋습니다. 자궁 조직검사와 다른 검사가 정상이라면 야 복용 초기의 일시적인 현상일 가능성이 큼니다.

숨쉬기 답답,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 검사에서 별다른 이상이 없는 데 숨쉬기 답답한 증상이 나타나면 과도한 긴장이나 걱정 불안같은 심리적 이유때문일 수 있습니다. 그렇다면 이것들을 치료 해야지요

식후 양치시간 질문합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아포가토를 먹은 후에는 커피와 단 음식이 함께 들어있으므로 양치 시점에 대한 권장 사항을 조합할 필요가 있습니다. 커피는 산성 음료로 바로 양치하면 치아 에나멜이 약해질 수 있어 30분 후에 양치하는 것이 좋습니다. 단

음식을 먹은 후에는 즉시 양치하는 것이 좋지만 커피의 산성 효과를 고려해 30분을 기다리는 것이 더 나을 것이라 판단됩니다. 따라서 아포가토를 먹은 후에는 30분 정도 기다렸다가 양치하는 것이 좋겠습니다.

손에 붉은점이 생겼습니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독에서 보이는 특징적인 궤양성 병변이 없었다면 피부에 나타난 변화를 매독이라 추정할 근거는 빈약합니다. 아마 의심스러운 성관계가 있었다는 말씀으로 이해되나 정체를 알기 위해서는 우선 피부과를 방문해 진료를 받아보시기 바랍니다.

흰색변 나오는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통은 다음과 같은 이유에서 흰색변이 나오는데 검사에서 이상이 없다고 하면 주치의 선생님과 상의가 필요합니다 흰색변이 나오는 이유는 주로 다음과 같은 원인 때문입니다. 담즙 분비 장애 담즙은 지방 소화를 돕고 변에 색깔을 주는 역할을 합니다. 간이나 담낭 등에 문제가 생겨 담즙 분비가 제대로 이루어지지 않으면 변색이 일어납니다. 췌장 기능 장애 췌장에서 분비하는 소화 효소가 부족하면 지방 소화가 원활하지 않아 흰색변이 날 수 있습니다. 장 폐쇄 또는 협착 장이 부분적으로 막혀 있으면 대변이 제대로 통과하지 못해 탈색된 변이 배출됩니다. 기타 질환 셀리악병 크론병 결핵 등의 질병도 흰색변을 유발할 수 있습니다. 약물 부작용 일부 항생제 제산제 등의 약물을 복용하면 부작용으로 변색이 생길 수 있습니다.

콜레스테롤 수치 공복혈당 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공복혈당이 약간 높으시고 LDL수치도 정상에 비해 약간 높으시네요. 나이도 젊고 이정도 수치이면 식단관리와 규칙적인 운동으로도 개선될 수 있는 수치입니다. 군것질과 술을 아예 끊는것도 좋겠지만 그보다도 평소 에 꾸준히 식단관리와 운동을 하셔도 충분히 좋아질 수 있습니다.

13일차부터 증상이 호전된 어지럼증이 중추성일 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은 나이에 중추성 어지럼증이 있을 가능성은 매우 낮습니다. 아마도 스트레스를 조절해주는 약을 드시면서 경과 지켜보시면 좋아지지 않을까 싶습니다

13일차부터 증상이 호전된 어지럼증이 중추성일 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은 나이에 중추성 어지럼증이 있을 가능성은 매우 낮습니다. 아마도 스트레스를 조절해주는 약을 드시면서 경과 지켜보시면 좋아지지 않을까 싶습니다

이정도 상처로 흉지지는 않겠죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료 중 상처가 발생한 상황이 시균요. 다행히 상처가 깊어보이지는 않습니다. 후시딘이나 마데카솔같은 연고를 꾸준히 발라주시고 일상생활 중에는 습윤 밴드를 붙이며 관리해보시면 되겠습니다.

신우신염 후유증으로 힘들어요.. 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 신우신염은 휴유증을 유발하는 경우는 흔하지 않아 다른 우너인에 대한 감별이 필요하겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

요산수치 금식과 상관있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요산 수치 8.0은 다소 높은 편이지만 검사 전 식사불고기로 인해 일시적으로 상승했을 가능성이 있습니다. 금식 없이 검사한 결과는 식사의 영향을 받을 수 있으므로 요산 수치가 정확히 평가되지 않을 수 있습니다. 따라서 통풍약을 복용할 필요가 있는지 여부는 추가적인 검사가 필요할 수 있겠으니 내과를 다시 방문해보시는게 좋겠습니다.

13일차부터 증상이 호전된 어지럼증이 중추성일 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은 나이에 중추성 어지럼증이 있을 가능성은 매우 낮습니다. 아마도 스트레스를 조절해주는 약을 드시면서 경과 지켜보시면 좋아지지 않을까 싶습니다

치과 골내마취 질문입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀해주신 골내 마취 골수강 마취

가 아마도 신경 내에 직접 마취하는 것으로 생각합니다. 마취 공포 때문이라면 수면치료도 한번 고려해보세요

정신과선생님 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘든 상황이지겠네요. 형님 상태를 정확하게 알기 위해서는 진료를 받아보시는 것이 필요한데 진료를 거부한다고 하면 너무 힘든 상황이 될것 같습니다

신우신염 후유증으로 힘들어요.. 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 신우신염은 후유증을 유발하는 경우는 흔하지 않아 다른 우너인에 대한 감별이 필요하겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

신우신염 장기 후유증으로 힘들어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 지금 보기에 신우신염은 좋아지신것이 아닌가 싶는데 옆구리가 옥식거리는 다른 원인이있는것은 아닌가 의심스럽습니다

달리기 500m 이상시 오른쪽 가슴 찢르는 통증 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동 중에 일어나는 가슴통증이지만.. 협심증과는 거리가 먼 것 같습니다. 협심증의 통증위치는 보통 정중앙 또는 심장이 있는 좌측에서 발생하고 찢르는 통증보다는 묵직하고 짓누르는듯한 양상입니다. 근골격계근육 인대에 의한 통증이나 운동시 신경압박으로 인한 신경성 통증으로 보입니다. 달리기 자세를 한번 바꿔보시고 과도하지 않은 범위에서 운동을 조절해보시기 바랍니다.

손에 붉은점이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독에서 보이는 특징적인 궤양성 병변이 없었다면 피부에 나타난 변화를 매독이라 추정할 근거는 빈약합니다. 아마 의심스러운 성관계가 있었다는 말씀으로 이해되나 정체를 알기 위해서는 우선 피부과를 방문해 진료를 받아보시기 바랍니다.

식후 양치시간 질문합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아포가토를 먹은 후에는 커피와 단 음식이 함께 들어있으므로 양치 시점에 대한 권장 사항을 조합할 필요가 있습니다. 커피는 산성 음료로 바로 양치하면 치아 에나멜이 약해질 수 있어 30분 후에 양치하는 것이 좋습니다. 단 음식을 먹은 후에는 즉시 양치하는 것이 좋지만 커피의 산성 효과를 고려해 30분을 기다리는 것이 더 나을 것이라 판단됩니다. 따라서 아포가토를 먹은 후에는 30분 정도 기다렸다가 양치하는 것이 좋겠습니다.

요산수치 금식과 상관있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요산 수치 8.0은 다소 높은 편이지만 검사 전 식사불고기로 인해 일시적으로 상승했을 가능성이 있습니다. 금식 없이 검사한 결과는 식사의 영향을 받을 수 있으므로 요산 수치가 정확히 평가되지 않을 수 있습니다. 따라서 통풍약을 복용할 필요가 있는지 여부는 추가적인 검사가 필요할 수 있겠으니 내과를 다시 방문해보시는게 좋겠습니다.

정신과선생님 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘든 상황이지겠네요. 형님 상태를 정확하게 알기 위해서는 진료를 받아보시는 것이 필요한데 진료를 거부한다고 하면 너무 힘든 상황이 될것 같습니다

무의식중에 이빨 부딪힘,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입을 다물고있을때 가끔씩 제가의의도하지 않았는데도 앞니랑 아랫니가 갑자기 내려가면서 부딪힙니다. 이빨 치열이 고른편인데 이 개같은 증상 때문에 치열이 틀어질까 걱정입니다. 원인과 해결방법을 알려주세요 앞니랑 아랫니가 내려가면서 부딪힌다는게 앞니끼리 닿는다는 말씀이신가요? 제가 현 상황을 정확하게 이해하기가 어렵네요.

신우신염 장기 후유증으로 힘들어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 지금 보

기에 신우신염은 좋아지신것이 아닌가 싶은데 옆구리가 옥식거리는 다른 원인이있는것은 아닌가 의심스럽습니다

정신과선생님 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘든 상황이지겠네요. 형님 상태를 정확하게 알기 위해서는 진료를 받아보시는 것이 필요한데 진료를 거부한다고 하면 너무 힘든 상황이 될것 같습니다

입안 천장에 하얀 알갱이 났습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 작은 구내염으로 보이며 가글을 충분히 해주고 통증이 있다면 소염제를 복용하면 됩니다. 시간이 지나면 저절로 호전될 가능성이 높습니다.

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 4주째 하시면 되는데 가능성은 없어 보입니다 콘돔을 착용하고 하셨다면 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

신우신염 장기 후유증으로 힘들어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 지금 보기에 신우신염은 좋아지신것이 아닌가 싶은데 옆구리가 옥식거리는 다른 원인이있는것은 아닌가 의심스럽습니다

갑상선 항진증에 페퍼민트차가 안 좋나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 페퍼민트 차가 갑상선호르몬에 영향을 준다는 연구자료가 없는거 같네요. 페퍼민트는 진정효과가 있어 불안증세가 있을시에는 도움이 될 수있겠네요. 차를 마시고 몸의 이상여부가 없다면.. 특별하게 문제가 되지 않을거 같습니다.

무의식중에 이빨 부딪힘,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입을 다물고있을때 가끔씩 제가의도하지 않았는데도 앞니랑 아랫니가 갑자기 내려가면서 부딪힙니다. 이빨 치열이 고른편인데 이 개같은 증상 때문에 치열이 틀어질까 걱정입니다. 원인과 해결방법을 알려주세요 앞니랑 아랫니가 내려가면서 부딪힌다는게 앞니끼리 닿는다는 말씀이신가요? 제가 현 상황을 정확하게 이해하기가 어렵네요.

입안 천장에 하얀 알갱이 났습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 작은 구내염으로 보이며 가글을 충분히 해주고 통증이 있다면 소염제를 복용하면 됩니다. 시간이 지나면 저절로 호전될 가능성이 높습니다.

흉통 관련 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 폐질환에 의해 흉통이 있으려면 다른 호흡기증상기침 가래가 동반되는 경우가 많고 협심증은 운동에 의해 심장에 무리가 갔을때 목직한 양상으로 통증이 나타납니다. 숨을 들이 마실때 특정한 행위에 통증이 있는 경우는 근육통이거나 숨쉴때마다 갈비뼈 사이의 신경압박으로 인한 통증으로 보입니다. 진통소염제를 복용해보시고 호전없이 지속된다면 병원 방문하여 진찰을 받아보시기 바랍니다.

사마귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이론적으로는 사마귀는 어디든지 생길 수 있지만 일반사마귀가 고환이나 사타구니에 생기는 경우는 별로 없는것으로 알고 있습니다

사진상 성병 가능성이 있는지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 자극에 의한 증상의 가능성이 높습니다 하지만 정확한 것은 비뇨의학과를 방문하셔서 검사를받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

스트레스와 키의 상관관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 키에 영향을 주는 요인은 다음과 같습니다. 여러 요인이 작용하니 정확한 영향을 알기가 어렵습니다. 최종키를 예측하기도어렵습니다 유전적 요인 부모의 키가 자녀의 키에 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 영양 상태

단백질 칼슘 비타민 등의 영양소가 뼈와 근육의 성장을 촉진시키는 역할을 합니다. 운동 스트레칭 요가 수영 등의 운동은 척추를 늘리고 근육을 강화시켜 키 성장을 촉진시킵니다. 수면 충분한 수면은 키 성장에 필수적입니다. 성장 호르몬이 밤에 분비되기 때문입니다. 스트레스 스트레스는 키 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 자세 자세와 자세 교정이 키를 키우는 데 중요한 역할을 합니다. 기타 질병 비만 등도 키 성장에 영향을 줄 수 있습니다

무의식중에 이빨 부딪힘,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입을 다물고있을때 가끔씩 제가의도하지 않았는데도 앞니랑 아랫니가 갑자기 내려가면서 부딪힙니다. 이빨 치열이 고른편인데 이개같은 증상 때문에 치열이 틀어질까 걱정입니다. 원인과 해결방법을 알려주세요 앞니랑 아랫니가 내려가면서 부딪힌다는게 앞니끼리 닿는다는 말씀이신가요? 제가 현 상황을 정확하게 이해하기가 어렵네요.

제 요도 상태가 어떤가요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 정상으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

스트레스와 키의 상관관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 키에 영향을 주는 요인은 다음과 같습니다. 여러 요인이 작용하니 정확한 영향을 알기가 어렵습니다. 최종키를 예측하기도어렵습니다 유전적 요인 부모의 키가 자녀의 키에 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 영양 상태 단백질 칼슘 비타민 등의 영양소가 뼈와 근육의 성장을 촉진시키는 역할을 합니다. 운동 스트레칭 요가 수영 등의 운동은 척추를 늘리고 근육을 강화시켜 키 성장을 촉진시킵니다. 수면 충분한 수면은 키 성장에 필수적입니다. 성장 호르몬이 밤에 분비되기 때문입니다. 스트레스 스트레스는 키 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 자세 자세와 자세 교정이 키를 키우는 데 중요한 역할을 합니다. 기타 질병 비만 등도 키 성장에 영향을 줄 수 있습니다

사마귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이론적으로는 사마귀는 어디든지 생길 수 있지만 일반사마귀가 고환이나 사타구니에 생기는 경우는 별로 없는것으로 알고 있습니다

스트레스와 키의 상관관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 키에 영향을 주는 요인은 다음과 같습니다. 여러 요인이 작용하니 정확한 영향을 알기가 어렵습니다. 최종키를 예측하기도어렵습니다 유전적 요인 부모의 키가 자녀의 키에 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 영양 상태 단백질 칼슘 비타민 등의 영양소가 뼈와 근육의 성장을 촉진시키는 역할을 합니다. 운동 스트레칭 요가 수영 등의 운동은 척추를 늘리고 근육을 강화시켜 키 성장을 촉진시킵니다. 수면 충분한 수면은 키 성장에 필수적입니다. 성장 호르몬이 밤에 분비되기 때문입니다. 스트레스 스트레스는 키 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 자세 자세와 자세 교정이 키를 키우는 데 중요한 역할을 합니다. 기타 질병 비만 등도 키 성장에 영향을 줄 수 있습니다

제 요도 상태가 어떤가요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 정상으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

사마귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이론적으로는 사마귀는 어디든지 생길 수 있지만 일반사마귀가 고환이나 사타구니에 생기는 경우는 별로 없는것으로 알고 있습니다

흰색변 나오는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통은 다음과 같은 이유에서 흰색변이 나오는데 검사에서 이상이 없다고 하면 주치의 선생님과 상의가 필요합니다 흰색변이 나오는 이유는 주로 다음과 같은 원인 때문입니다. 담즙 분비 장애 담즙은 지방 소화를 돕고 변에 색깔을 주는 역할을 합니다. 간이나 담낭 등에 문제가 생겨 담즙 분비가 제대로 이루어지지 않으면 변색이 일어납니다. 췌장 기능 장애 췌장에서 분비하는 소화 효소가 부족하면 지방 소화가

원활하지 않아 흰색변이 날 수 있습니다. 장 폐쇄 또는 협착 장이 부분적으로 막혀 있으면 대변이 제대로 통과하지 못해 탈색된 변이 배출됩니다. 기타 질환 셀리악병 크론병 결핵 등의 질병도 흰색변을 유발할 수 있습니다. 약물 부작용 일부 항생제 제산제 등의 약물을 복용하면 부작용으로 변색이 생길 수 있습니다.

공복혈당 및 혈압수치가 차이나는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공복혈당이 그렇다고 하면 이전보다 공복혈당이 오른것으로 판단됩니다. 혈압은 측정할때마다 혈당도 마찬가지로 조금 차이가 있을 수 있는데 약물복용이 필요한 정도가 아니면 경과관찰 합니다

제 요도 상태가 어떤가요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 정상으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

제 요도 상태가 어떤가요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 정상으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

숨쉬기 답답,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 검사에서 별다른 이상이 없는 데 숨쉬기 답답한 증상이 나타나면 과도한 긴장이나 걱정 불안같은 심리적 이유때문일 수 있습니다. 그렇다면 이것들을 치료 해야지요

이정도 상처로 흉지지는 않겠죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료 중 상처가 발생한 상황이 시균요. 다행히 상처가 깊어보이지는 않습니다. 후시딘이나 마데카솔같은 연고를 꾸준히 발라 주시고 일상생활 중에는 습윤 밴드를 붙이며 관리해보시면 되겠습니다.

담석증 문의드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담석이 1.7cm 정도이고 통증이 있다면 경우에 따라서 담낭절제술 수술까지도 고려해봐야 할 사항인거 같습니다. 소화기내과 진료를 보시고 적절한 치료를 받으시기 바랍니다.

콜레스테롤 수치 공복혈당 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공복혈당이 약간 높으시고 LDL수치도 정상에 비해 약간 높으시네요. 나이도 젊고 이정도 수치이면 식단관리와 규칙적인 운동으로도 개선될 수 있는 수치입니다. 군것질과 술을 아예 끊는것도 좋겠지만 그보다도 평소 에 꾸준히 식단관리와 운동을 하셔도 충분히 좋아질 수 있습니다.

달리기 500m 이상시 오른쪽 가슴 찢르는 통증 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동 중에 일어나는 가슴통증이지만.. 협심증과는 거리가 먼 것 같습니다. 협심증의 통증위치는 보통 정중앙 또는 심장이 있는 좌측에서 발생하고 찢르는 통증보다는 묵직하고 짓누르는듯한 양상입니다. 근골격계근육 인대에 의한 통증이나 운동시 신경압박으로 인한 신경성 통증으로 보입니다. 달리기 자세를 한번 바꿔보시고 과도하지 않은 범위에서 운동을 조절해보시기 바랍니다.

갑상선 항진증에 페퍼민트차가 안 좋나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 페퍼민트 차가 갑상선호르몬에 영향을 준다는 연구자료가 없는거 같네요. 페퍼민트는 진정효과가 있어 불안증세가 있을시에는 도움이 될 수있겠네요. 차를 마시고 몸의 이상여부가 없다면.. 특별하게 문제가 되지 않을거 같습니다.

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 4주째 하시면 되는데 가능성은 없어 보입니다 콘돔을 착용하고 하셨다면 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

사진상 성병 가능성이 있는지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을

드리기 어려우나 단순 자극에 의한 증상의 가능성이 높습니다 하지만 정확한 것은 비뇨의학과를 방문하셔서 검사를받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

흉통 관련 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 폐질환에 의해 흉통이 있으려면 다른 호흡기증상기침 가래가 동반되는 경우가 많고 협심증은 운동에 의해 심장에 무리가 갔을때 묵직한 양상으로 통증이 나타납니다. 숨을 들이 마실때 특정한 행위에 통증이 있는 경우는 근육통이거나 숨쉴때마다 갈비뼈 사이의 신경압박으로 인한 통증으로 보입니다. 진통소염제를 복용해보시고 호전없이 지속된다면 병원 방문하여 진찰을 받아보시기 바랍니다.

아무런 외상없이 Crps가 올 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 호전되었다면 CRPS 가능성은 매우 낮으며 외상 없이도 CRPS가 발생하는 경우도 있습니다. 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

숨이 잘 안 쉬어집니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 스트레스나 과도한 걱정이나 불안 증상 같은 것은 없나요? 만약 그렇다면 하면 심리적인 이유 때문에 나타나는 증상이 아닌가 의심해볼 수 있습니다

가는변 관련해서 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장 내시경상 이상 소견이 없다면 구조적인 문제가 아니라 단순 변비로 인해 가는변이 나오는 것으로 변비에 대한 약물 치료가 필요합니다.

소변스틱 검사 아질산염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 없다고 하면 일단은 약물복용 같은 치료 없이 증상이 어떻게 변하는지 경과를 지켜보시는 것을 권합니다. 질염약 먹은것과는 연관은 적어보입니다

이럴때는 혈당을 어느 시점에서 측정해야 하는지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식후 혈당 체크의 의미는 식사후 인슐린 분비능 혈당조절력을 보고자 함인 것이기에 언제 몇시가 중요한 것이 아니라 식사 음식의 섭취 하나하나를 다 그 기준으로 보아야만 합니다

이 약들을 먹고 지능저하가 일어날수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련없을 것 같습니다 진료 받으신 병원에 방문하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

갑상선암 수술 후 기능저하증으로 인한 합병증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선 암으로 갑상선 전절제 수술을 받으셨다고 하면 갑상선을 모두 제거 하였으니 갑상선 기능 저하증이 오는것은 당연합니다. 그래서 수술후에 갑상선 호르몬을 보충합니다

생리혈 착상혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 착상혈은 비교적 소량이고 나타나기도 하고 그렇지 않기도 해서 임상적인 의미를 두지 않습니다. 임신여부든 임태기나 직접진료를 통해서 확인해보시는 것을 권합니다

금연약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문제 없이 처방 및 복용 가능할 가능성이 높지만 환자 개개인에 따른 차이가 있을 수 있어 담당선생님과 먼저 상의하시기를 권유합니다 갑상선 항진증에 페퍼민트차가 안 좋나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 페퍼민트 차가 갑상선호르몬에 영향을 준다는 연구자료가 없는거 같네요. 페퍼민트는 진정효과가 있어 불안증세가 있을시에는 도움이 될 수있겠네요. 차를 마시고 몸의 이상여부가 없다면.. 특별하게 문제가 되지 않을거 같습니다.

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 4주째 하시면 되는데 가능성은 없어 보입니다 콘돔을 착용하고 하셨습니다

면 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

무의식중에 이빨 부딪힘,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입을 다물고있을때 가끔씩 제가의의도하지 않았는데도 앞니랑 아랫니가 갑자기 내려가면서 부딪힙니다. 이빨 치열이 고른편인데 이 개같은 증상 때문에 치열이 틀어질까 걱정입니다. 원인과 해결방법을 알려주세요 앞니랑 아랫니가 내려가면서 부딪힌다는게 앞니끼리 닿는다는 말씀이신가요? 제가 현 상황을 정확하게 이해하기가 어렵네요.

흉통 관련 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 폐질환에 의해 흉통이 있으려면 다른 호흡기증상기침 가래가 동반되는 경우가 많고 협심증은 운동에 의해 심장에 무리가 갔을때 목직한 양상으로 통증이 나타납니다. 숨을 들이 마실때 특정한 행위에 통증이 있는 경우는 근육통이거나 숨쉴때마다 갈비뼈 사이의 신경압박으로 인한 통증으로 보입니다. 진통소염제를 복용해보시고 호전없이 지속된다면 병원 방문하여 진찰을 받아보시기 바랍니다.

이거 진주양구진일까요 곤지름일까요 헤르페스일까요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으며 피부 구진 등의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

성기 기둥쪽에 뭔가 낫어요사진 포함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어느날부터 기둥쪽에 덩어리 같은게 생겼는데 만지면 아프진 않은데 여드름 짜는거처럼 세게 누르면 아프군요. 피부염 등의 가능성으로 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

아데노이드 비대증이였을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아데노이드 비대는 이비인후과 검사를 통해 쉽게 진단할 수 있습니다. 이비인후과 내원하여 검사를 해보도록하고 수면 무호흡증이 있다면 수술적 치료를 고려해 볼 수 있습니다.

콜레스테롤 수치 공복혈당 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공복혈당이 약간 높으시고 LDL수치도 정상에 비해 약간 높으시네요. 나이도 젊고 이정도 수치이면 식단관리와 규칙적인 운동으로도 개선될 수 있는 수치입니다. 군것질과 술을 아예 끊는것도 좋겠지만 그보다도 평소에 꾸준히 식단관리와 운동을 하셔도 충분히 좋아질 수 있습니다.

사진상 성병 가능성이 있는지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 자극에 의한 증상의 가능성이 높습니다 하지만 정확한 것은 비뇨의학과를 방문하셔서 검사를받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 4주째 하시면 되는데 가능성은 없어 보입니다 콘돔을 착용하고 하셨다면 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

갑상선 항진증에 페퍼민트차가 안 좋나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 페퍼민트 차가 갑상선호르몬에 영향을 준다는 연구자료가 없는거 같네요. 페퍼민트는 진정효과가 있어 불안증세가 있을시에는 도움이 될 수있겠네요. 차를 마시고 몸의 이상여부가 없다면.. 특별하게 문제가 되지 않을거 같습니다.

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 4주째 하시면 되는데 가능성은 없어 보입니다 콘돔을 착용하고 하셨다

면 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

달리기 500m 이상시 오른쪽 가슴 찢는 통증 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동 중에 일어나는 가슴통증이지만.. 협심증과는 거리가 먼 것 같습니다. 협심증의 통증위치는 보통 정중앙 또는 심장이 있는 좌측에서 발생하고 찢는 통증보다는 묵직하고 짓누르는 듯한 양상입니다. 근골격계근육 인대에 의한 통증이나 운동시 신경압박으로 인한 신경성 통증으로 보입니다. 달리기 자세를 한번 바꿔보시고 과도하지 않은 범위에서 운동을 조절해보시기 바랍니다.

요산수치 금식과 상관있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요산 수치 8.0은 다소 높은 편이지만 검사 전 식사불고기로 인해 일시적으로 상승했을 가능성이 있습니다. 금식 없이 검사한 결과는 식사의 영향을 받을 수 있으므로 요산 수치가 정확히 평가되지 않을 수 있습니다. 따라서 통풍약을 복용할 필요가 있는지 여부는 추가적인 검사가 필요할 수 있겠으니 내과를 다시 방문해보시는게 좋겠습니다.

성기에 발진이 생겼는데 성병인지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 비뇨의학과 진료를 받아보시면 좋을 것 같습니다 자극을 받아서 생긴 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

성기 기둥쪽에 뭔가 낮어요소진 포함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어느날부터 기둥쪽에 덩어리 같은게 생겼는데 만지면 아프진 않은데 여드름 짜는거처럼 세게 누르면 아프군요. 피부염 등의 가능성으로 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

손목 반점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부발진은 성병외에도 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 정확한 진단을 위해 피부과 전문의의 상담을 받는 것이 좋겠습니다.

손에 붉은점이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독에서 보이는 특징적인 궤양성 병변이 없었다면 피부에 나타난 변화를 매독이라 추정할 근거는 빈약합니다. 아마 의심스러운 성관계가 있었다는 말씀으로 이해되나 정체를 알기 위해서는 우선 피부과를 방문해 진료를 받아보시기 바랍니다.

식후 양치시간 질문합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아포가토를 먹은 후에는 커피와 단 음식이 함께 들어있으므로 양치 시점에 대한 권장 사항을 조합할 필요가 있습니다. 커피는 산성 음료로 바로 양치하면 치아 에나멜이 약해질 수 있어 30분 후에 양치하는 것이 좋습니다. 단 음식을 먹은 후에는 즉시 양치하는 것이 좋지만 커피의 산성 효과를 고려해 30분을 기다리는 것이 더 나을 것이라 판단됩니다. 따라서 아포가토를 먹은 후에는 30분 정도 기다렸다가 양치하는 것이 좋겠습니다.

요산수치 금식과 상관있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요산 수치 8.0은 다소 높은 편이지만 검사 전 식사불고기로 인해 일시적으로 상승했을 가능성이 있습니다. 금식 없이 검사한 결과는 식사의 영향을 받을 수 있으므로 요산 수치가 정확히 평가되지 않을 수 있습니다. 따라서 통풍약을 복용할 필요가 있는지 여부는 추가적인 검사가 필요할 수 있겠으니 내과를 다시 방문해보시는게 좋겠습니다.

이정도 상처로 흉지지는 않겠지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료 중 상처가 발생한 상황이시군요. 다행히 상처가 깊어보이지는 않습니다. 후시딘이나 마데카솔같은 연고를 꾸준히 발라주시고 일상생활 중에는 습윤 밴드를 붙이며 관리해보시면 되겠습니다.

치과 골내마취 질문입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀해주신 골내 마취 골수강 마취가 아마도 신경 내에 직접 마취하는 것으로 생각됩니다. 마취 공포 때문이라면 수면치료도 한번 고려해보세요

요도 상태 어떨까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도 곤지름이나 성사마귀는 성관계를 통해서 전염되는 질환입니다. 따라서 성관계를 한 적이 없다면 요도 곤지름이나 성사마귀가 있을 가능성은 매우 낮습니다. 요도 아래의 보라색 물집은 혈관일 가능성이 높습니다. 혈관은 피부 표면 아래에 위치해 있기 때문에 혈관이 튀어나와 보일 수 있습니다. 혈관은 특별한 질환이 아니므로 치료가 필요하지 않습니다. 만약 혈관이 튀어나와서 불편하다면 병원에서 제거할 수 있습니다. 요도 곤지름이나 성사마귀가 의심된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 진료를 통해 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받을 수 있습니다.

왼쪽눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속된다면 안과에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 눈의 상태를 검사하고 충혈의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다. 충혈의 원인은 다양할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 결막염입니다. 결막염은 눈의 흰자위와 눈꺼풀 안쪽을 덮고 있는 결막에 염증이 생기는 질환입니다. 결막염은 세균이나 바이러스에 감염되거나 알레르기 반응으로 인해 발생할 수 있습니다. 결막염은 안약을 사용하거나 항생제 등을 복용하면 치료할 수 있습니다. 다른 원인으로는 눈의 피로 건조증 과민성 반응 등이 있습니다. 눈의 피로나 건조증은 충분한 휴식을 취하거나 눈에 수분을 공급하면 증상이 완화될 수 있습니다. 과민성 반응은 특정 물질에 대한 알레르기 반응으로 인해 발생합니다. 과민성 반응은 알레르기 물질을 피하면 증상이 완화될 수 있습니다. 왼쪽 눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속된다면 안과에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 눈의 상태를 검사하고 충혈의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다.

붉은 냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 야피임약을 복용하는 초기 몇 주 동안 부정출혈이 발생할 수 있습니다. 이는 약물에 대한 몸의 적응 과정 중에 흔히 나타나는 부작용입니다. 10알째까지 복용했어도 아직 몸이 완전히 적응하지 않았을 수 있습니다. 부정출혈이 계속되거나 심해지면 산부인과 의사와 상의하는 것이 좋습니다. 자궁 조직검사와 다른 검사가 정상이라면 야 복용 초기의 일시적인 현상일 가능성이 큼니다.

배란통과 갈색냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이번 배란기 동안 지속되는 갈색 냉과 배란통 울렁거림 등의 증상은 호르몬 변화나 일시적인 신체 상태의 변화로 인한 것일 수 있습니다. 그러나 갈색 냉이 오래 지속되고 다른 증상들도 함께 나타난다면 자궁내막증이나 다른 여성 질환을 의심해볼 필요가 있습니다. 혼자 해결하기보다는 증상이 심해질 경우 가능한 빨리 산부인과 진료를 받는 것이 좋습니다.

성기에 발진이 생겼는데 성병인지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 비뇨의학과 진료를 받아보시면 좋을 것 같습니다 자극을 받아서 생긴것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

숨쉬기 답답,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 검사에서 별다른 이상이 없는데 숨쉬기 답답한 증상이 나타나면 과도한 긴장이나 걱정 불안같은 심리적 이유때문일 수 있습니다. 그렇다면 이것들을 치료 해야지요

지능에 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과거의 후두부 부상도 영향을 미쳤을 수 있지만 현재 증상은 최근의 문제와 더 관련이 깊을 것입니다. 고등학생이므로 학업 스트레스도 기억력

에 영향을 주었을 수는 있습니다. 정확한 원인을 파악하기 위해 신경과나 정신건강의학과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋겠습니다.

곤지름피부 낭종피지샘 과다분비증 무엇일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기로는 곤지름이나 피부낭종 피지샘 과다분비증은 아니고 정성적으로 존재하는 모낭이 두드러지게 보이는 것이 아닌가 싶습니다

신속검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 애보트 바이오라인 HIV 12 3.0 신속키트의 경우 제조사 설명서에 따르면 HIV 감염 후 12주 이후 실시 시 99.6%의 민감도를 보이는 것으로 알려져 있습니다. 이는 매우 높은 수준의 정확도입니다. 하지만 이 키트의 특이도음성 판정의 정확도는 99.5로 다소 낮습니다. 즉 위양성 결과의 가능성이 약간 있다는 뜻입니다.

감기 후 부비동염과 기침 감기 한달째 기침2주째 계속해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아급성 기침에 해당되며 대부분은 감염 이후에 생기는 기침으로 시간이 지나면 호전이 되는 경우가 많습니다. 힘드시겠지만 경과를 지켜보시고 지속시는 호흡기내과를 방문해 보세요

문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 레이저치료에 의해 피부자극으로 인해 발생한 주사rosacea일 가능성이 있어보입니다. 정확한것은 피부과 진료를 받으시고 적절한 치료를 받는게 좋겠습니다.

손목 반점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부발진은 성병외에도 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 정확한 진단을 위해 피부과 전문의의 상담을 받는 것이 좋겠습니다.

숨쉬기 답답,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 검사에서 별다른 이상이 없는데 숨쉬기 답답한 증상이 나타나면 과도한 긴장이나 걱정 불안같은 심리적 이유때문일 수 있습니다. 그렇다면 이것들을 치료 해야지요

요도 상태 어떨까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도 곤지름이나 성사마귀는 성관계를 통해서 전염되는 질환입니다. 따라서 성관계를 한 적이 없다면 요도 곤지름이나 성사마귀가 있을 가능성은 매우 낮습니다. 요도 아래의 보라색 물집은 혈관일 가능성이 높습니다. 혈관은 피부 표면 아래에 위치해 있기 때문에 혈관이 튀어나와 보일 수 있습니다. 혈관은 특별한 질환이 아니므로 치료가 필요하지 않습니다. 만약 혈관이 튀어나와서 불편하다면 병원에서 제거할 수 있습니다. 요도 곤지름이나 성사마귀가 의심된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 진료를 통해 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받을 수 있습니다.

숨쉬기 답답,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 검사에서 별다른 이상이 없는데 숨쉬기 답답한 증상이 나타나면 과도한 긴장이나 걱정 불안같은 심리적 이유때문일 수 있습니다. 그렇다면 이것들을 치료 해야지요

배란통과 갈색냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이번 배란기 동안 지속되는 갈색 냉과 배란통 율령거림 등의 증상은 호르몬 변화나 일시적인 신체 상태의 변화로 인한 것일 수 있습니다. 그러나 갈색 냉이 오래 지속되고 다른 증상들도 함께 나타난다면 자궁내막증이나 다른 여성 질환을 의심해볼 필요가 있습니다. 혼자 해결하기보다는 증상이 심해질 경우 가능한 빨리 산부인과 진료를 받는 것이 좋습니다.

눈을 자주 만지면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만지거나 비비는 습관이 지속되면 피부와 조직에 자극을 주어 염증이 반복될 수 있습니다. 그러나 눈꺼풀이 처지는 것은 주로 나이 피부 탄력 저하 유전적 요인 등으로 발생합니다. 자주 만지는 습관이 장기적으로 눈 주위 피부에 손상을 줄 수 있지만 즉각적으로 눈꺼풀 처짐을 유발하는 주요 원인은 아닙니다. 현재 다래끼가 발생한 상황으로 보이므로 안과를 방문하시기 바랍니다.

공복혈당 및 혈압수치가 차이나는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공복혈당이 그렇다고 하

면 이전보다 공복혈당이 오른것으로 판단됩니다. 혈압은 측정할때마다 혈당도 마찬가지로 조금 차이가 있을 수 있는데 약물복용이 필요한 정도가 아니면 경과관찰 합니다

브라질리언 왁싱 후 관리 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 브라질리언 왁싱으로 생긴 모낭염의 가능성이 높습니다. 좋아질때까지는 가급적 환부에 자극을 주지 않는 것이 필요합니다

왼쪽 검지 발가락 일부분이 누르면 찌릿합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경미한 연조직염 가능성이 있습니다. 통증이 지속된다면 단기간 경구 항생제 복용이 도움이 됩니다. 증상이 악화되면 진료를 보시기 바랍니다.

속이 누런 메모리폼 베게 커버없이 사용했는데 탈모나 두피염 생기나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 답변은 어렵습니다. 메모리폼 베게를 사용하지 않고 탈모나 두피염이 없어지면 메모리폼 베게 때문이라고 볼수 있습니다. 그렇지 않으면 가능성이 많이 떨어집니다

가족력 유전 관련해서질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그렇다고 생각됩니다. 혹시라도 이해가 가지 않거나 의심되는 부분은 어떤것이 있는지 말씀해주시면 답변드리겠습니다

붉은 냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아피임약을 복용하는 초기 몇 주 동안 부정출혈이 발생할 수 있습니다. 이는 약물에 대한 몸의 적응 과정 중에 흔히 나타나는 부작용입니다. 10알째까지 복용했어도 아직 몸이 완전히 적응하지 않았을 수 있습니다. 부정출혈이 계속되거나 심해지면 산부인과 의사와 상의하는 것이 좋습니다. 자궁 조직검사와 다른 검사가 정상이라면 야 복용 초기의 일시적인 현상일 가능성이 큼니다.

붉은 냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아피임약을 복용하는 초기 몇 주 동안 부정출혈이 발생할 수 있습니다. 이는 약물에 대한 몸의 적응 과정 중에 흔히 나타나는 부작용입니다. 10알째까지 복용했어도 아직 몸이 완전히 적응하지 않았을 수 있습니다. 부정출혈이 계속되거나 심해지면 산부인과 의사와 상의하는 것이 좋습니다. 자궁 조직검사와 다른 검사가 정상이라면 야 복용 초기의 일시적인 현상일 가능성이 큼니다.

단식 후 숙변 색깔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇다고 보시면될것 같습니다. 대변새깔만으로 대장암이나 위암을 의심하는 것은 무리가 있다고 판단됩니다. 일반적으로 초록변은 대변통과시간이 짧은경우에 나타납니다

VOCs 가스가 탈모나 두피염을 유발할 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가능성은 좀 떨어진다고 생각합니다. 어떤 voc가스에 얼마나 많은양에 얼마나 오래동안 노출되었는지에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 원인은 알기 어렵습니다

메모리폼 베게베고자면 Vocs가스가나와서 탈모생기나요?,안녕하세요. 요약 두피에 영향을 줄 수는 있지만 그게 두피염이라는 건 아닙니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

성기 상처의 세균 감염이 팔꿈치에 발생한 염증에 영향을 줄 수 도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 상담은 해보셔요. 하지만 3달전에 있었던 성기 상처 염증이 시간이 지난 지금 팔꿈치 염증에 영향을 주지는 않습니다

눈을 자주 만지면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만지거나 비비는 습관이 지속되면 피부와 조직에 자극을 주어 염증이 반복될 수 있습니다. 그러나 눈꺼풀이 처지는 것은 주로 나이 피부 탄력 저하 유전적 요인 등으로 발생합니다. 자주 만지는 습관이 장기적으로 눈 주위 피부에 손상을 줄 수 있지만 즉각적으로 눈꺼풀 처짐을 유발하는 주요 원인은 아닙니다. 현재 다래끼가 발생한 상황으로 보이므로 안과를 방문하시기 바랍니다.

공복혈당 및 혈압수치가 차이나는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 공복혈당이 그렇다고 하

면 이전보다 공복혈당이 오른것으로 판단됩니다. 혈압은 측정할때마다 혈당도 마찬가지로 조금 차이가 있을 수 있는데 약물복용이 필요한 정도가 아니면 경과관찰 합니다

붉은 냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아피임약을 복용하는 초기 몇 주 동안 부정출혈이 발생할 수 있습니다. 이는 약물에 대한 몸의 적응 과정 중에 흔히 나타나는 부작용입니다. 10알째 까지 복용했어도 아직 몸이 완전히 적응하지 않았을 수 있습니다. 부정출혈이 계속되거나 심해지면 산부인과 의사와 상의하는 것이 좋습니다. 자궁 조직검사와 다른 검사가 정상이라면 야 복용 초기의 일시적인 현상일 가능성이 큼니다.

이약들을 평생 먹어야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프사신바이정 유니콜정 에졸정 휴펜정 다타남서방정 처방 받았군요. 주치의와 언제까지 복용해야 하는지에 대한 정확한 상담을 받도록 하십시오.

이거 큰일 난건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 가능성은 낮으면 질이나 자궁 경부의 상처나 손상이 있을 수 있어 출혈이 지속된다면 산부인과 진료를 보시기 바랍니다.

눈 위나 아래쪽이 미세하게 노랗습니다...황달일까요?,안녕하세요 요약 1. 언급한 눈은 공막입니다. 2. 전체가 노랗진 않고 3. 공막은 유전적으로 하얗고 누런 정도의 차이가 있습니다. 4. 최근에 건강검진을 했으면 빌리루빈 검사항목도 있는지 봐보세요 5. 보통 황달이 오면 눈 전체가 노랗집니다. 건승하세요

턱 밑 근육? 이 잘못된거 같아요,안녕하세요 요약 1. 간혹 턱이나 근육 주변에 있는 임파선이 2. 근육이나 턱뼈 다른 근육 사이에 끼기는 경우도 있습니다. 3. 그걸로 자극받아 주변 조직이 아플 수 있습니다. 4. 기존 치료했던 병원에서 다시 치료와 진료를 봐보세요 건승하세요

제가 궁금한 것들에다가 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품이 질문자의 피부에 적합한지는 결국 사용을 해보아야 알 수 있습니다. 올려주신 성분상 피부 자극을 심하게 유발하는 성분은 없는 것으로 보입니다.

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이론적으로는 얼굴 등에도 발생할 수 있으나 무좀이 호발하는 부위도 아니고 자주 씻고 마르기에 크게 문제될 가능성은 적을듯합니다.

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품이 질문자의 피부에 적합한지는 결국 사용을 해보아야 알 수 있습니다. 올려주신 성분상 피부 자극을 심하게 유발하는 성분은 없는 것으로 보입니다.

턱 밑 근육? 이 잘못된거 같아요,안녕하세요 요약 1. 간혹 턱이나 근육 주변에 있는 임파선이 2. 근육이나 턱뼈 다른 근육 사이에 끼기는 경우도 있습니다. 3. 그걸로 자극받아 주변 조직이 아플 수 있습니다. 4. 기존 치료했던 병원에서 다시 치료와 진료를 봐보세요 건승하세요

턱 밑 인파선이 끼긴 경우 어느 과 병원에 가야하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 안하고 약과 물리치료로 일단 해봐야해서 정형외과 가서 물리치료 받으면 괜찮아 집니다. 수술하려면 일반 외과 가야합니다.

휘발성유기화합물VOCs에 노출되었을때 생기는 증상들에 대해서 궁금합니다,안녕하세요 요약 오존과 미세먼지는 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

메모리폼 베개에서 휘발성유기화합물VOCs이나오나요,안녕하세요 요약 1. 소재에 따라 다른

니다. 2. 샀던 곳에 직접 물어봐서 확인해야 할 문제입니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기 중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인 물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

착상혈일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유산관계로는 임신이 불가능하며 생리 3일전에는 가임기가 아니어서 임신가능성은 없으니 착상혈은 아닐 것으로 생각됩니다

아기 사타구니와 팔다리 수포가 생겼습시다사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수족구 수두 같은 것을의심해볼만 합니다. 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 혹시 원래 아토피 같은것이 있나요?

경구피임약 피임효과? 임신가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약은 용량과 용법을 치키는 것이 가장 중요합니다. 새로운 약으로 바꾸어도 효과는 지속될 것으로 생각됩니다. 복용이 하루 늦었네요

제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간접적이니 접촉으로 무좀균이 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 따라서 크게 걱정하지 않아도 될 것으로 생각됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

파상풍관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 십년안에 파상풍 접종이 없었다고 하면 파상풍 접종이 필요한 상황으로 판단됩니다. 상처가 나면 위험성은 존재합니다

파상풍관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그것도 상처가 있는것이니 파상풍에 대한 예방조치를 하시는 것이 필요하다고 생각됩니다. 파상풍검사는 어렵습니다.

혹시 치루일까요?,안녕하세요 요약 1. 피부 꼬리 입니다. 2. 피부꼬리는 항문 질환으로 부종이 생긴 뒤에 발생하는 병변입니다. 피부꼬리는 항문 주위 피부가 늘어져 너덜거리고 주름이 잡혀 있는 상태로 대개 치열이나 치핵 등으로 항문 주위 피부가 부었다가 가라 앉으면서 발생합니다. 건승하세요

잇몸치료후에도 잇몸이 아픡니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 거의 한달 정도 다 되어가는 잇몸 치료를 받은 이후에도 계속해서 잇몸이 아픡니다. 스트레스를 잘 받는 성격인데 그로인해 잇몸치료를 했음에도 잇몸이 계속 아플 수 있나요? 아니면 다른 이상이 있을까요? 충치가 있다고 하였는데 심한 것만 치료하고 나머지는 아직 치료 안해도 괜찮다고 해서 안했습니다. 잇몸 치료 받으신 부분을 치과에 가서서 다시 한번 체크 받아보시는 것이 좋을 듯합니다

마른 기침 3주 짜,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 폐결핵 폐렴 천식 등 폐질환에 대한 감별이 필요하므로 흉부엑스레이와 폐기능 검사가 가능한 내과 내원하여 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

혹시 치루일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서는 명확하게 치루로 의심되는 소견은 보이지 않지만 이것만으로는 정확히 알 수 없습니다. 치루는 보통 항문농양이나 만성치열이 발생한 후에 생기는 것으로 항문 안쪽에서 괄약근을 관통해서 바깥쪽으로 연결되는 염증 길입니다. 가끔 통증이 동반 되는 경우도 있지만 농양을 동반 하지 않은 치루는 아프지 않고 분비물이 나오는 경우도 있습니다. 증상이 있다면 가까운 항문외과를 방문하시어 진료를 받아보시길 권유드립니다. 감사합니다.

입냄새,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혀에서 나는 냄새는 주로 혀 표면에 쌓인 세균과 음식물 찌꺼기 때문일 가능성이 큼니다. 치석 편도결석 비염 등이 원인이 아닐 경우 혀 청결 상태가 문제일 수 있습니다. 혀 클리너를 사용해 혀를 정기적으로 청소하면 냄새를 줄이는 데 도움이 됩니다. 구강청결제를 사용하거나 정기적으로 물을 많이 마시는 것도 도움이 될 수 있습니다.

조영제 테스트주사시 감염될수있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제 사용 전 알레르기 반응을 알기 위한 일반적인 검사입니다. 피하주사 부위를 네임펜으로 덧그려놓아 불안하신 것 같은데 감염증이 발생할 위험은 낮습니다. 해당 부위가 더 붉어진다거나 부어오르면 진료를 받으시기 바랍니다.

배란통과 갈색냉,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이번 배란기 동안 지속되는 갈색 냉과 배란통 울렁거림 등의 증상은 호르몬 변화나 일시적인 신체 상태의 변화로 인한 것일 수 있습니다. 그러나 갈색 냉이 오래 지속되고 다른 증상들도 함께 나타난다면 자궁내막증이나 다른 여성 질환을 의심해볼 필요가 있습니다. 혼자 해결하기보다는 증상이 심해질 경우 가능한 빨리 산부인과 진료를 받는 것이 좋습니다.

약효과질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 세잘정 Cetirizine 항히스타민제로 알레르기 증상을 완화하며 효과는 24시간 가량 지속됩니다. 베솔론정 Prednisolone 스테로이드제로 염증과 알레르기 반응을 억제하며 약효는 복용 후 12시간 내에 시작되어 36시간 정도 지속될 수 있습니다. 케이캡정 Tegoprazan 위산 분비 억제제로 위염과 위궤양 치료에 사용되며 약효는 복용 후 30분 내에 시작되어 약 24시간 지속됩니다.

이게 혹시 뭔가요?~,안녕하세요. 메디이즈입니다. 닭살처럼 보이는 피부병변이 걱정스러우시군요. 모공각화증일 가능성이 높아보입니다. 불편감을 유발하지 않는다면 그냥 두셔도 괜찮은 병변입니다. 만약 변화가 느껴진다면 악화되는 것 같다면 비뇨의학과를 방문하시기 바랍니다.

질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 선생님 안녕하세요 다름이 아니라 제가 오른쪽 위 17번치아 크랙소견으로 치아장치교정용반지? 같은거를 427일에 대학병원 교정과에서 끼워주셨는데요 그 장치가 씹히는데 정상반응인가요? 지난주 목요일에 보존과에서 첫 신경치료 진행했고 신경치료 한부분은 접착제로 메워놓으신 상태입니다. 다음외래는 617일이고 그때 두번째 신경치료 진행예정인데장치끼운거때문에 조금 뒤로 미뤄주셨어요 장치가 씹히면 다시 내원해서 확인을 받는게 나을까요? 치아 크랙으로 밴드 장치 하신거 같습니다. 치아 사이가 끼는 느낌은 들 수 있구요 씹히는 느낌이 있다면 가서서 체크 받아보시는게 좋을 듯 합니다.

조영제 주사시 감염여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제에 대한 알레르기 반응을 평가하기 위해 피내주사를 맞았고 그 부위에 표시한 상황이라 이해됩니다. 말씀하신 패혈증과 같은 심각한 감염증이 발생할 가능성은 거의 없습니다. 안심하셔도 됩니다.

화농성 종기 연속 재발,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반복적인 화농성 종기는 면역 체계의 약화나 특정 세균의 지속적인 감염으로 인한 것일 수 있습니다. 세균이나 바이러스가 혈관을 타고 퍼질 가능성은 굉장히 낮고 주로 피부 표면에서의 감염이 반복되는 경우가 많습니다. 한선염보다는 여러 부위에서 반복적으로 발생하는 점에서 특정 균주에 의한 피부 감염증이 더 의심됩니다. 지속적인 문제라면 꾸준한 항생제 치료나 면역력 검사가 필요할 수 있겠습니다.

화농성 종기 연속 재발,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반복적인 화농성 종기는 면역 체계의 약화나 특정 세균의 지속적인 감염으로 인한 것일 수 있습니다. 세균이나 바이러스가 혈관을 타고 퍼질 가능성은 굉장히 낮고 주로 피부 표면에서의 감염이 반복되는 경우가 많습니다. 한선염보다는 여러 부위에서 반복적으로 발생하는 점에서 특정 균주에 의한 피부 감염증이 더 의심됩니다. 지속적인 문제라면 꾸준한 항생제 치료나 면역력 검사가 필요할 수 있겠습니다.

눈을 옆으로 돌릴때마다 번쩍거리는 작은알갱이가보입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 망막에 문제가 없다고 진단받았다면 큰 문제는 아닐 가능성이 큼니다. 갑자기 생기는 알갱이 같은 빛은 광시증의 일종으로 눈의 피로나 스트레스 항불안제의 부작용 등으로 나타날 수 있습니다.

다. 그러나 증상이 지속되거나 악화된다면 추가적인 검사를 받는 것이 좋습니다. 특히 다른 이상 증상시야 장애 시력 저하 등이 동반된다면 즉시 안과를 방문하시기 바랍니다.

지능에 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과거의 후두부 부상도 영향을 미쳤을 수 있지만 현재 증상은 최근의 문제와 더 관련이 깊을 것입니다. 고등학생이므로 학업 스트레스도 기억력에 영향을 주었을 수는 있습니다. 정확한 원인을 파악하기 위해 신경과나 정신건강의학과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋겠습니다.

빠가뛰어나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양측의 대칭이 중요합니다. 발목은 사진만으로는 정상으로 보이며 손목 척골측의 용기부분은 반대측과 같이 찍어서 올려주시면 좋겠습니다. 허리의 원인으로 발등만 불편할 수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요추 질환이 있다면 하지의 방사통이 있을 수 있지만 발등 일부만 불편감이 있는 경우는 흔하지 않습니다. 다른 원인을 찾아 보아야 합니다.

귀 돌발성난청과 허벅지 감각 이상함이 관련 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 관련이 없을 것 같습니다 돌발성난청과 이상지각성대퇴신경통이 같이 생긴 상태인데 각각 따로 치료 받으시면 됩니다.

왼쪽눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속된다면 안과에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 눈의 상태를 검사하고 충혈의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다. 충혈의 원인은 다양할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 결막염입니다. 결막염은 눈의 흰자위와 눈꺼풀 안쪽을 덮고 있는 결막에 염증이 생기는 질환입니다. 결막염은 세균이나 바이러스에 감염되거나 알레르기 반응으로 인해 발생할 수 있습니다. 결막염은 안약을 사용하거나 항생제 등을 복용하면 치료할 수 있습니다. 다른 원인으로는 눈의 피로 건조증 과민성 반응 등이 있습니다. 눈의 피로나 건조증은 충분한 휴식을 취하거나 눈에 수분을 공급하면 증상이 완화될 수 있습니다. 과민성 반응은 특정 물질에 대한 알레르기 반응으로 인해 발생합니다. 과민성 반응은 알레르기 물질을 피하면 증상이 완화될 수 있습니다. 왼쪽 눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속된다면 안과에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 눈의 상태를 검사하고 충혈의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다.

담석증 문의드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담석이 1.7cm 정도이고 통증이 있다면 경우에 따라서 담낭절제술 수술까지도 고려해봐야 할 사항인거 같습니다. 소화기내과 진료를 보시고 적절한 치료를 받으시기 바랍니다.

신속검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 애보트 바이오라인 HIV 12 3.0 신속키트의 경우 제조사 설명서에 따르면 HIV 감염 후 12주 이후 실시 시 99.6의 민감도를 보이는 것으로 알려져 있습니다. 이는 매우 높은 수준의 정확도입니다. 하지만 이 키트의 특이도음성 판정의 정확도는 99.5로 다소 낮습니다. 즉 위양성 결과의 가능성이 약간 있다는 뜻입니다.

무릎 불안함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. MRI를 찍지는 않습니다. 허리를 위주로 엑스레이를 확인하고 대퇴사두근 근력의 대칭성 등을 확인하여 사두근의 순환을 위한 대퇴신경이 완치료를 받으시면 가장 좋겠습니다.

허리의 원인으로 발등만 불편할 수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요추 질환이 있다면 하지의 방사통이 있을 수 있지만 발등 일부만 불편감이 있는 경우는 흔하지 않습니다. 다른 원인을 찾아 보아야 합니다.

성기에 발진이 생겼는데 성병인지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 비뇨의학과 진료를 받아보시면 좋을 것 같습니다 자극을 받아서 생긴것

같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요. 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

장유착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마그밀을 복용하지 않으면 변이 잘 나오지 않는 상황이지군요. 다행히 가스는 잘 배출되는 것 같습니다. 그렇다면 장이 완전히 막힌 상황 장폐색은 아니라는 의미이고 최소한 수술까지 갈만한 문제는 아니라고 예상됩니다. 다만 변비가 만성적으로 존재하는 것 같으니 약으로 우선 증상 조절해보시고 내과에서 꾸준히 관리받아보시는 것이 좋겠습니다.

신속검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 애보트 바이오라인 HIV 12 3.0 신속키트의 경우 제조사 설명서에 따르면 HIV 감염 후 12주 이후 실시 시 99.6%의 민감도를 보이는 것으로 알려져 있습니다. 이는 매우 높은 수준의 정확도입니다. 하지만 이 키트의 특이도음성 판정의 정확도는 99.5로 다소 낮습니다. 즉 위양성 결과의 가능성이 약간 있다는 뜻입니다.

허리의 원인으로 발등만 불편할 수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요추 질환이 있다면 하지의 방사통이 있을 수 있지만 발등 일부만 불편감이 있는 경우는 흔하지 않습니다. 다른 원인을 찾아 보아야 합니다.

무릎 불안함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. MRI를 찍지는 않습니다. 허리를 위주로 엑스레이를 확인하고 대퇴사두근 근력의 대칭성 등을 확인하여 사두근의 순환을 위한 대퇴신경이 완치료를 받으시면 가장 좋겠습니다.

가끔씩 감정을 조절하기 힘든데 약을 복용하면 가시적인 효과가 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 분노조절장애도 여러가지 유형과 복합적인 정신과질환과 연관이 있습니다. 간헐적 폭발성장애의 한 형태로 보여집니다. 꼭 반드시 정신과진료를 보시고 상담과 적절한 약을 처방받기를 권합니다. 보험 문제보다는 건강이 우선이니.. 지금 상황에서는 건강이 우선일 것으로 보이네요.

담석증 문의드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담석이 1.7cm 정도이고 통증이 있다면 경우에 따라서 담낭절제술 수술까지도 고려해봐야 할 사항인거 같습니다. 소화기내과 진료를 보시고 적절한 치료를 받으시기 바랍니다.

혹시 치루일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서는 명확하게 치루로 의심되는 소견은 보이지 않지만 이것만으로는 정확히 알 수 없습니다. 치루는 보통 항문농양이나 만성치열이 발생한 후에 생기는 것으로 항문 안에서 괄약근을 관통해서 바깥쪽으로 연결되는 염증 길입니다. 가끔 통증이 동반 되는 경우도 있지만 농양을 동반 하지 않은 치루는 아프지 않고 분비물이 나오는 경우도 있습니다. 증상이 있다면 가까운 항문외과를 방문하시어 진료를 받아보시길 권유드립니다. 감사합니다.

장유착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마그밀을 복용하지 않으면 변이 잘 나오지 않는 상황이지군요. 다행히 가스는 잘 배출되는 것 같습니다. 그렇다면 장이 완전히 막힌 상황 장폐색은 아니라는 의미이고 최소한 수술까지 갈만한 문제는 아니라고 예상됩니다. 다만 변비가 만성적으로 존재하는 것 같으니 약으로 우선 증상 조절해보시고 내과에서 꾸준히 관리받아보시는 것이 좋겠습니다.

왼쪽눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속된다면 안과에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 눈의 상태를 검사하고 충혈의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다. 충혈의 원인은 다양할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 결막염입니다. 결막염은 눈의 흰자위와 눈꺼풀 안쪽을 덮고 있는 결막에 염증이 생기는 질환입니다. 결막염은 세균이나 바이러스에 감염되거나 알레르기 반응으

로 인해 발생할 수 있습니다. 결막염은 안약을 사용하거나 항생제 등을 복용하면 치료할 수 있습니다. 다른 원인으로는 눈의 피로 건조증 과민성 반응 등이 있습니다. 눈의 피로나 건조증은 충분한 휴식을 취하거나 눈에 수분을 공급하면 증상이 완화될 수 있습니다. 과민성 반응은 특정 물질에 대한 알레르기 반응으로 인해 발생합니다. 과민성 반응은 알레르기 물질을 피하면 증상이 완화될 수 있습니다. 왼쪽 눈 동공 오른쪽만 심한 충혈이 지속된다면 안과에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 눈의 상태를 검사하고 충혈의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다.

신속검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 애보트 바이오라인 HIV 12 3.0 신속키트의 경우 제조사 설명서에 따르면 HIV 감염 후 12주 이후 실시 시 99.6%의 민감도를 보이는 것으로 알려져 있습니다. 이는 매우 높은 수준의 정확도입니다. 하지만 이 키트의 특이도음성 판정의 정확도는 99.5로 다소 낮습니다. 즉 위양성 결과의 가능성이 약간 있다는 뜻입니다.

무릎 불안함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. MRI를 찍지는 않습니다. 허리를 위주로 엑스레이를 확인하고 대퇴사두근 근력의 대칭성 등을 확인하여 사두근의 순환을 위한 대퇴신경이 완치료를 받으시면 가장 좋겠습니다.

이 약들을 먹고 지능저하가 일어날수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련없을 것 같습니다 진료 받으신 병원에 방문하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

안녕하세요 제가 궁금한 것들에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 내용 중 클렌징폼과 노세범 파우더에 포함된 스쿠알란 토크페롤 비타민E 성분에 대한 걱정이신가요? 해당 화장품품을 사용하시고 특별히 부작용 없으셨다면 동일한 성분이 포함된 에스트라 로션도 사용해보실 수 있습니다.

왼팔 안쪽에 통증이 있는데 심장질환 연관통일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼팔이 아프다는 증상만으로 심장 질환만을 의심하지는 않습니다. 경추부 문제에 의한 증상일 수도 있고 다양한 원인들이 있습니다

단식 후 숙변 색깔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇다고 보시면될것 같습니다. 대변새깔만으로 대장암이나 위암을 의심하는 것은 무리가 있다고 판단됩니다. 일반적으로 초록변은 대변통과시간이 짧은경우에 나타납니다

VOCs 가스가 탈모나 두피염을 유발할 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가능성은 좀 떨어진다고 생각합니다. 어떤 voc가스에 얼마나 많은양에 얼마나 오래동안 노출되었는지에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 원인은 알기 어렵습니다

메모리폼 베개베고자면 Vocs가스가나와서 탈모생기나요?,안녕하세요. 요약 두피에 영향을 줄 수는 있지만 그게 두피염이라는 건 아닙니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

성기 상처의 세균 감염이 팔꿈치에 발생한 염증에 영향을 줄 수 도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 상담은 해보셔요. 하지만 3달전에 있었던 성기 상처 염증이 시간이 지난 지금 팔꿈치 염증에 영향을 주지는 않습니다

속이 누런 메모리폼 베개 커버없이 사용했는데 탈모나 두피염 생기나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 답변은 어렵습니다. 메모리폼 베개를 사용하지 않고 탈모나 두피염이 없다면 메모리폼 베개 때문이라고 볼수 있습니다. 그렇지 않으면 가능성이 많이 떨어집니다

성기에 붉은 반점,안녕하세요 요약 1. 귀두포피염인지 확진 받아 보세요 2. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나게 됩니다. 귀두포피염은 귀두와 포피에 염증이 생기는 질환인데 귀두 표면과 포피 내면 사이에는 항상 습기가 있어 세균이 침입해 번식하기 쉽습니다. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나거나 기저귀나 속옷에 농성 분비물이 묻어 나오기도 하고 환부의 탈색이 관찰되기도 합니다. 건승하세요

생리혈 착상혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 착상혈은 비교적 소량이고 나타나기도 하고 그렇지 않기도 해서 임상적인 의미를 두지 않습니다. 임신여부든 임태기나 직접진료를 통해서 확인해보시는 것을 권합니다

손에 수포가 꽃처럼 생겼어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 단정지어이 이야기하기는 어렵지만 수포가 점점 번지면서 통증이나 가려움이 동반되면 대상포진의 가능성을 염두에 두어야 합니다.

메모리폼 베개에서 휘발성유기화합물VOCs이나오나요,안녕하세요 요약 1. 소재에 따라 다릅니다. 2. 샀던 곳에 직접 물어봐서 확인해야 할 문제입니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인 물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

휘발성유기화합물VOCs에 노출되었을때 생기는 증상들에 대해서 궁금합니다,안녕하세요 요약 오존과 미세먼지는 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

아기 사타구니와 팔다리 수포가 생겼습시다사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수족구 수두 같은 것들의 의심해볼만 합니다. 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 혹시 원래 아토피 같은 것이 있나요?

착상혈일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유산관계로는 임신이 불가능하며 생리 3일전에는 가임기가 아니어서 임신가능성은 없으니 착상혈은 아닐 것으로 생각됩니다

귀두염증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 더이상의 자극을 하지말고 경과를 지켜보셔도 되고 항생제 연고 정도는 바르면서 경과를 지켜보셔도 괜찮을 것 같습니다

감기가 오래가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 폐결핵 폐렴 천식 등 폐질환에 대한 감별이 필요하므로 흉부엑스레이와 폐기능 검사가 가능한 내과 내원하여 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

마른 기침 3주 쯤,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 폐결핵 폐렴 천식 등 폐질환에 대한 감별이 필요하므로 흉부엑스레이와 폐기능 검사가 가능한 내과 내원하여 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

잇몸치료후에도 잇몸이 아픉니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 거의 한달 정도 다 되어가는 잇몸 치료를 받은 이후에도 계속해서 잇몸이 아픉니다. 스트레스를 잘 받는 성격인데 그로인해 잇몸치료를 했음에도 잇몸이 계속 아플 수 있나요? 아니면 다른 이상이 있을까요? 충치가 있다고 하였는데 심한 것만 치료하고 나머지는 아직 치료 안해도 괜찮다고 해서 안했습니다. 잇몸 치료 받으신 부분을 치과에 가셔서 다시 한번 체크 받아보시는 것이 좋을 듯합니다

성기 두드러기 물질은 없었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물질이 없었다고하면 성기포진으로 보기는 어려워보이고 성매개 질환은 아닐가능성이 높습니다. 과도한 자극이 반복되었다

면 그것이 원인일 가능성이 높아보입니다

성기에 붉은 두드러기 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 헤르페스2형 성기포진이아닌가 싶습니다. 초기 사진은 혹시 없나요? 물질이 잡혔으면 헤르페스의심스럽네요

경구피임약 피임효과? 임신가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약은 용량과 용법을 지키는 것이 가장 중요합니다. 새로운 약으로 바꾸어도 효과는 지속될 것으로 생각됩니다. 복용이 하루 늦었네요

선생님 답변감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요관암은 비교적 다른 암에 비하여 드물고 일반적으로 암은 유전성향보다는 생활 습관 환경의 영향을 더 많이 받는것 같습니다

이건 모낭인가요 곤지름인가요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

파상풍관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그것도 상처가 있는것이니 파상풍에 대한 예방조치를 하시는 것이 필요하다고 생각됩니다. 파상풍검사는 어렵습니다.

혹시 치루일까요?,안녕하세요 요약 1. 피부 꼬리 입니다. 2. 피부꼬리는 항문 질환으로 부종이 생긴 뒤에 발생하는 병변입니다. 피부꼬리는 항문 주위 피부가 늘어져 너덜거리고 주름이 잡혀 있는 상태로 대개 치열이나 치핵 등으로 항문 주위 피부가 부었다가 가라 앉으면서 발생합니다. 건승하세요

금연약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문제 없이 처방 및 복용 가능할 가능성이 높지만 환자 개개인에 따른 차이가 있을 수 있어 담당선생님과 먼저 상의하시기를 권유합니다
오른쪽 서혜부사타구니음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는느낌이에요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 탈장입니다. 탈장은 복강 내 장기가 복벽을 통해 튀어나온 상태를 말합니다. 탈장은 서혜부 탈장 복벽 탈장 배꼽 탈장 등이 있습니다. 서혜부 탈장은 오른쪽 서혜부에서 발생하는 경우가 많습니다. 탈장은 증상이 없거나 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 탈장은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 탈장은 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 염증이나 종양으로 인해 발생할 수도 있습니다. 염증은 세균이나 바이러스에 감염되어 발생할 수 있습니다. 종양은 암이나 양성 종양이 있을 수 있습니다. 염증이나 종양은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 염증이나 종양은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 염증은 항생제를 복용하거나 수술로 치료할 수 있습니다. 종양은 종양의 종류에 따라 치료 방법이 다릅니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 혈관 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 혈관 질환은 혈관이 막히거나 좁아져서 발생할 수 있습니다. 혈관 질환은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 혈관 질환은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 혈관 질환은 약물 치료나 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 신경 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 신경 질환은 신경이 손상되어 발생할 수 있습니다. 신경 질환은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 신경 질환은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 신경 질환은 약물 치료나 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 탈장 염증 종양 혈관 질환 신경 질환 등이 원인이 될 수 있습니다.

정확한 원인을 진단하기 위해서는 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

가슴 중앙 눌렀을때 통증 심장문제 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장질환은 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생하지 않습니다. 따라서 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생했다면 다른 질환이 원인일 가능성이 높습니다. 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생하는 원인은 다양할 수 있으며 심장질환이 아닌 다른 질환일 가능성이 더 높습니다. 따라서 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생했다면 병원에 내원하여 진료를 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품이 질문자의 피부에 적합한지는 결국 사용을 해보아야 알 수 있습니다. 올려주신 성분상 피부 자극을 심하게 유발하는 성분은 없는 것으로 보입니다.

에이즈 발진일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 에이즈 발진을 알 수 없습니다. 게다가 잠복기를 고려하면 아직 증상이 나타날 때는 아닌것 같습니다. 위험한 관계는 피하시는 것이 중요합니다

파상풍관련 질문.안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 십년간에 파상풍 접종이 없었다고 하면 파상풍 접종이 필요한 상황으로 판단됩니다. 상처가 나면 위험성은 존재합니다

혹시 치루일까요.안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서는 명확하게 치루로 의심되는 소견은 보이지 않지만 이것만으로는 정확히 알 수 없습니다. 치루는 보통 항문농양이나 만성치열이 발생한 후에 생기는 것으로 항문 안쪽에서 괄약근을 관통해서 바깥쪽으로 연결되는 염증 길입니다. 가끔 통증이 동반 되는 경우도 있지만 농양을 동반 하지 않은 치루는 아프지 않고 분비물이 나오는 경우도 있습니다. 증상이 있다면 가까운 항문외과를 방문하시어 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

잇몸치료후에도 잇몸이 아픕니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 거의 한달 정도 다 되어가는 잇몸 치료를 받은 이후에도 계속해서 잇몸이 아픕니다. 스트레스를 잘 받는 성격인데 그로인해 잇몸치료를 했음에도 잇몸이 계속 아플 수 있나요? 아니면 다른 이상이 있을까요? 충치가 있다고 하였는데 심한 것만 치료하고 나머지는 아직 치료 안해도 괜찮다고 해서 안했습니다. 잇몸 치료 받으신 부분을 치과에 가서서 다시 한번 체크 받아보시는 것이 좋을 듯합니다

귀 뒤 멍울 통증 목 멍울 질문이요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀 뒤에 딱딱하게 만져지는 멍울은 임파선 종양일 가능성이 있습니다. 임파선 종양은 림프계의 림프절에서 발생하는 종양으로 림프절이 붓고 딱딱해지면서 통증이 생길 수 있습니다. 임파선 종양은 림프절이 붓는 다른 질환과 구별하기 위해 초음파 검사를 시행합니다. 초음파 검사는 림프절의 크기와 모양 위치 등을 확인할 수 있으며 림프절 종양의 경우 림프절이 딱딱하고 불규칙한 모양을 보이고 주변 조직과 경계가 명확하지 않습니다. 귀 뒤의 멍울이 임파선 종양일 가능성이 있으므로 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받는 것이 좋습니다. 임파선 종양은 대부분 양성이지만 악성인 경우도 있으므로 조기에 발견하여 치료하는 것이 중요합니다. 목 왼쪽 측면에 멍울이 생긴 것은 임파선염일 가능성이 있습니다. 임파선염은 림프절에 염증이 생기는 질환으로 림프절이 붓고 통증이 생길 수 있습니다. 임파선염은 바이러스나 세균에 감염되어 발생할 수 있으며 치료하지 않으면 림프절이 파열되어 흉터가 남을 수 있습니다. 목 왼쪽 측면에 생긴 멍울이 임파선염일 가능성이 있으므로 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받는 것이 좋습니다. 임파선염은 대부분 자연적으로 치유되지만 증상이 심한 경우에는 항생제를 복용하거나 림프절을 절제해야 합니다. 귀 뒤의 멍울과 목 왼쪽 측면에 생긴 멍울은 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받는 것이 좋습니다.

잇몸치료후에도 잇몸이 아픉니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 거의 한달 정도 다 되어 가는 잇몸 치료를 받은 이후에도 계속해서 잇몸이 아픉니다. 스트레스를 잘 받는 성격인데 그로 인해 잇몸치료를 했음에도 잇몸이 계속 아플 수 있나요? 아니면 다른 이상이 있을까요? 충치가 있다고 하였는데 심한 것만 치료하고 나머지는 아직 치료 안해도 괜찮다고 해서 안했습니다. 잇몸 치료 받으신 부분을 치과에 가서서 다시 한번 체크 받아보시는 것이 좋을 듯합니다

선생님 답변감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요관암은 비교적 다른 암에 비하여 드물고 일반적으로 암은 유전성향보다는 생활 습관 환경의 영향을 더 많이 받는것 같습니다

오른쪽 서혜부사타구니음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는느낌이에요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 탈장입니다. 탈장은 복강 내 장기가 복벽을 통해 튀어나온 상태를 말합니다. 탈장은 서혜부 탈장 복벽 탈장 배꼽 탈장 등이 있습니다. 서혜부 탈장은 오른쪽 서혜부에서 발생하는 경우가 많습니다. 탈장은 증상이 없거나 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 탈장은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 탈장은 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 염증이나 종양으로 인해 발생할 수도 있습니다. 염증은 세균이나 바이러스에 감염되어 발생할 수 있습니다. 종양은 암이나 양성 종양이 있을 수 있습니다. 염증이나 종양은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 염증이나 종양은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 염증은 항생제를 복용하거나 수술로 치료할 수 있습니다. 종양은 종양의 종류에 따라 치료 방법이 다릅니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 혈관 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 혈관 질환은 혈관이 막히거나 좁아져서 발생할 수 있습니다. 혈관 질환은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 혈관 질환은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 혈관 질환은 약물 치료나 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 신경 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 신경 질환은 신경이 손상되어 발생할 수 있습니다. 신경 질환은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 신경 질환은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 신경 질환은 약물 치료나 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 탈장 염증 종양 혈관 질환 신경 질환 등이 원인이 될 수 있습니다. 정확한 원인을 진단하기 위해서는 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

배변 시 힘을 주면 핑크색 무언가가 튀어나오고 하얀색 돌기같은것들이 올라와있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈변의 원인 대부분 치핵과 같은 항문 출혈인 경우가 많습니다. 하지만 대장 질환에 대한 감별이 필요하므로 대장내시경 등 검사를 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

눈 위나 아래쪽이 미세하게 노랗습니다...황달일까요?,안녕하세요 요약 1. 언급한 눈은 공막입니다. 2. 전체가 노랗진 않고 3. 공막은 유전적으로 하얗고 누런 정도의 차이가 있습니다. 4. 최근에 건강검진을 했으면 빌리루빈 검사항목도 있는지 봐보세요 5. 보통 황달이 오면 눈 전체가 노랗집니다. 건승하세요

제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간접적이니 접촉으로 무좀균이 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 따라서 크게 걱정하지 않아도 될 것으로 생각됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

배변 시 힘을 주면 핑크색 무언가가 튀어나오고 하얀색 돌기같은것들이 올라와있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈변의 원인 대부분 치핵과 같은 항문 출혈인 경우가 많습니다. 하지만 대장 질환에 대한 감별이 필요하므로 대장내시경 등 검사를 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

턱 밑 인파선이 끼긴 경우 어느 과 병원에 가야하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 안 하고 약과 물리치료로 일단 해보야해서 정형외과 가서 물리치료 받으면 괜찮아 집니다. 수술 하려면 일반 외과 가야합니다.

이거 큰일 난건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 가능성은 낮으면 질이나 자궁 경부의 상처나 손상이 있을 수 있어 출혈이 지속된다면 산부인과 진료를 보시기 바랍니다.

아데노이드 비대증이였을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아데노이드 비대는 이비인후과 검사를 통해 쉽게 진단할 수 있습니다. 이비인후과 내원하여 검사를 해보도록하고 수면 무호흡증이 있다면 수술적 치료를 고려해 볼 수 있습니다.

선생님 답변감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요관암은 비교적 다른 암에 비하여 드물고 일반적으로 암은 유전성향보다는 생활 습관 환경의 영향을 더 많이 받는것 같습니다

메모리폼 베개에서 휘발성유기화합물VOCs이나오나요,안녕하세요 요약 1. 소재에 따라 다릅니다. 2. 샀던 곳에 직접 물어봐서 확인해야 할 문제입니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

혹시 치루일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서는 명확하게 치루로 의심되는 소견은 보이지 않지만 이것만으로는 정확히 알 수 없습니다. 치루는 보통 항문농양이나 만성치열이 발생한 후에 생기는 것으로 항문 안쪽에서 괄약근을 관통해서 바깥쪽으로 연결되는 염증 길입니다. 가끔 통증이 동반 되는 경우도 있지만 농양을 동반 하지 않은 치루는 아프지 않고 분비물이 나오는 경우도 있습니다. 증상이 있다면 가까운 항문외과를 방문하시어 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

휘발성유기화합물VOCs에 노출되었을때 생기는 증상들에 대해서 궁금합니다,안녕하세요 요약 오존과 미세먼지는 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

아기 사타구니와 팔다리 수포가 생겼습니다사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수족구 수두 같은 것들의의심해볼만 합니다. 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 혹시 원래 아토피 같은것이 있나요?

귀 뒤 멍울 통증 목 멍울 질문이요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀 뒤에 딱딱하게 만져지는 멍울은 임파선 종양일 가능성이 있습니다. 임파선 종양은 림프계의 림프절에서 발생하는 종양으로 림프절이 붓고 딱딱해지면서 통증이 생길 수 있습니다. 임파선 종양은 림프절이 붓는 다른 질환과 구별하기 위해 초음파 검사를 시행합니다. 초음파 검사는 림프절의 크기와 모양 위치 등을 확인할 수 있으며 림프절 종양의 경우 림프절이 딱딱하고 불규칙한 모양을 보이고 주변 조직과 경계가 명확하지 않습니다. 귀 뒤의 멍울이 임파선 종양일 가능성이 있으므로 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받는 것이 좋습니다. 임파선 종양은 대부분 양성이지만 악성인 경우도 있으므로 조기에 발견하여 치료하는 것이 중요합니다. 목 왼쪽 측면에 멍울이 생긴 것은 임파선염일 가능성이 있습니다. 임파선염은 림프절에 염증이 생기는 질환으로 림프절이 붓고 통증이 생길 수 있습니다. 임파선염은 바이러스나 세균에 감염되어 발생할 수 있으

며 치료하지 않으면 림프절이 파열되어 흉터가 남을 수 있습니다. 목 왼쪽 측면에 생긴 멍울이 임파선염일 가능성이 있으므로 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받는 것이 좋습니다. 임파선염은 대부분 자연적으로 치유되지만 증상이 심한 경우에는 항생제를 복용하거나 림프절을 절제해야 합니다. 귀 뒤의 멍울과 목 왼쪽 측면에 생긴 멍울은 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받는 것이 좋습니다.

착상혈일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유산관계로는 임신이 불가능하며 생리 3일전에는 가임기가 아니어서 임신가능성은 없으니 착상혈은 아닐 것으로 생각됩니다

배변 시 힘을 주면 핑크색 무언가가 튀어나오고 하얀색 돌기같은것들이 올라와있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈변의 원인 대부분 치핵과 같은 항문 출혈인 경우가 많습니다. 하지만 대장 질환에 대한 감별이 필요하므로 대장내시경 등 검사를 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

혹시 치루일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서는 명확하게 치루로 의심되는 소견은 보이지 않지만 이것만으로는 정확히 알 수 없습니다. 치루는 보통 항문농양이나 만성치열이 발생한 후에 생기는 것으로 항문 안쪽에서 괄약근을 관통해서 바깥쪽으로 연결되는 염증 길입니다. 가끔 통증이 동반 되는 경우도 있지만 농양을 동반 하지 않은 치루는 아프지 않고 분비물이 나오는 경우도 있습니다. 증상이 있다면 가까운 항문외과를 방문하시어 진료를 받아보시길 권유드립니다. 감사합니다.

경구피임약 피임효과? 임신가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약은 용량과 용법을 지키는 것이 가장 중요합니다. 새로운 약으로 바꾸어도 효과는 지속될 것으로 생각됩니다. 복용이 하루 늦었네요

귀두염증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 더이상의 자극을 하지말고 경과를 지켜보셔도 되고 항생제 연고 정도는 바르면서 경과를 지켜보셔도 괜찮을 것 같습니다

아바스틴 안구 주사 1회후 비문증 증상 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아바스틴베바시주맙 안구 주사 후 비문증이 발생하는 경우는 드물지만 가능한 부작용 중 하나입니다. 비문증은 아바스틴 안구 주사 시 발생할 수 있는 드문 합병증으로 알려져 있습니다. 발생 빈도는 대략 0.213.7 정도로 보고되고 있습니다.

제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간접적이니 접촉으로 무좀균이 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 따라서 크게 걱정하지 않아도 될 것으로 생각됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

파상풍관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 십년안에 파상풍 접종이 없었다고 하면 파상풍 접종이 필요한 상황으로 판단됩니다. 상처가 나면 위험성은 존재합니다

성기 두드러기 물집은 없었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물집이 없었다고하면 성기포진으로 보기는 어려워보이고 성매개 질환은 아닐가능성이 높습니다. 과도한 자극이 반복되었다면 그것이 원인일 가능성이 높아보입니다

성기에 붉은 두드러기 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 헤르페스2형 성기포진인가 아닌가 싶습니다. 초기 사진은 혹시 없나요? 물집이 잡혔으면 헤르페스의심스럽네요

에이즈 발진일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 에이즈 발진을 알 수 없습니다. 게다가 잠복기를 고려하면 아직 증상이 나타날 때는 아닌것 같습니다. 위험한 관계는 피하는 것이 중요합니다

파상풍관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그것도 상처가 있는것이니 파상풍에 대한

예방조치를 하시는 것이 필요하다고 생각합니다. 파상풍검사는 어렵습니다.

간수치 5배로 고덱스약 처방 받은 환자입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베톨 치질약을 간수치 낮추는 고스약과 함께 섭취해도 괜찮습니다. 베톨과 고스는 상호 악영향을 주지 않습니다.

소변pcr은 음성인데 전립선액을 배출한 소변에서 성병양성이 나올 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병 검사는 소변 PCR 검사로 진행하게 되며 소변 PCR 검사에서 성병이 음성으로 나왔다면 전립선액을 배출한 소변에서 성병 양성이 나올 가능성은 매우 낮습니다. 다만 소변 PCR 검사에서 성병이 음성으로 나왔음에도 불구하고 전립선염 증상이 지속된다면 전립선염이 아닌 다른 질환의 가능성을 고려해 볼 필요가 있습니다. 따라서 현재의 증상이 지속된다면 병원에 내원하여 정확한 진단을 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

오른쪽 서혜부사타구니음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는느낌이에요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 탈장입니다. 탈장은 복강 내 장기가 복벽을 통해 튀어나온 상태를 말합니다. 탈장은 서혜부 탈장 복벽 탈장 배꼽 탈장 등이 있습니다. 서혜부 탈장은 오른쪽 서혜부에서 발생하는 경우가 많습니다. 탈장은 증상이 없거나 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 탈장은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 탈장은 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 염증이나 종양으로 인해 발생할 수도 있습니다. 염증은 세균이나 바이러스에 감염되어 발생할 수 있습니다. 종양은 암이나 양성 종양이 있을 수 있습니다. 염증이나 종양은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 염증이나 종양은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 염증은 항생제를 복용하거나 수술로 치료할 수 있습니다. 종양은 종양의 종류에 따라 치료 방법이 다릅니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 혈관 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 혈관 질환은 혈관이 막히거나 좁아져서 발생할 수 있습니다. 혈관 질환은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 혈관 질환은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 혈관 질환은 약물 치료나 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 신경 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 신경 질환은 신경이 손상되어 발생할 수 있습니다. 신경 질환은 통증 팽만감 압박감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 신경 질환은 초음파 검사나 CT 검사로 진단할 수 있습니다. 신경 질환은 약물 치료나 수술로 치료할 수 있습니다. 오른쪽 서혜부 사타구니 음낭까지의 부위가 붓고 딱딱해지는 느낌은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 탈장 염증 종양 혈관 질환 신경 질환 등이 원인이 될 수 있습니다. 정확한 원인을 진단하기 위해서는 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

5살 아이 흉부 가운데 혹이 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일차적으로는 소아과 방문이 가능합니다. 아니면 흉부외과 진료를 받아보시는 것이 가장 좋을 것으로 생각합니다.

잇몸치료후에도 잇몸이 아픕니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 거의 한달 정도 다 되어가는 잇몸 치료를 받은 이후에도 계속해서 잇몸이 아픕니다. 스트레스를 잘 받는 성격인데 그로인해 잇몸치료를 했음에도 잇몸이 계속 아플 수 있나요? 아니면 다른 이상이 있을까요? 충치가 있다고 하였는데 심한 것만 치료하고 나머지는 아직 치료 안해도 괜찮다고 해서 안했습니다. 잇몸 치료 받으신 부분을 치과에 가셔서 다시 한번 체크 받아보시는 것이 좋을 듯합니다

혹시 치루일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서는 명확하게 치루로 의심되는 소견은

보이지 않지만 이것만으로는 정확히 알 수 없습니다. 치루는 보통 항문농양이나 만성치열이 발생한 후에 생기는 것으로 항문 안쪽에서 괄약근을 관통해서 바깥쪽으로 연결되는 염증 길입니다. 가끔 통증이 동반 되는 경우도 있지만 농양을 동반 하지 않은 치루는 아프지 않고 분비물이 나오는 경우도 있습니다. 증상이 있다면 가까운 항문외과를 방문하시어 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

무릎 멍 사마귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 내가 인지 하지 못하는 외상으로 멍이 드는 수가 있습니다. 무릎으로 바닥을 기는 동작으로도 멍이 가능합니다. 사마귀는 신경쓰이지 않으면 그냥 두셔도 됩니다

귀 뒤 멍을 통증 목 멍을 질문이요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀 뒤에 딱딱하게 만져지는 멍울은 임파선 종양일 가능성이 있습니다. 임파선 종양은 림프계의 림프절에서 발생하는 종양으로 림프절이 붓고 딱딱해지면서 통증이 생길 수 있습니다. 임파선 종양은 림프절이 붓는 다른 질환과 구별하기 위해 초음파 검사를 시행합니다. 초음파 검사는 림프절의 크기와 모양 위치 등을 확인할 수 있으며 림프절 종양의 경우 림프절이 딱딱하고 불규칙한 모양을 보이고 주변 조직과 경계가 명확하지 않습니다. 귀 뒤의 멍울이 임파선 종양일 가능성이 있으므로 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받는 것이 좋습니다. 임파선 종양은 대부분 양성이지만 악성인 경우도 있으므로 조기에 발견하여 치료하는 것이 중요합니다. 목 왼쪽 측면에 멍울이 생긴 것은 임파선염일 가능성이 있습니다. 임파선염은 림프절에 염증이 생기는 질환으로 림프절이 붓고 통증이 생길 수 있습니다. 임파선염은 바이러스나 세균에 감염되어 발생할 수 있으며 치료하지 않으면 림프절이 파열되어 흉터가 남을 수 있습니다. 목 왼쪽 측면에 생긴 멍울이 임파선염일 가능성이 있으므로 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받는 것이 좋습니다. 임파선염은 대부분 자연적으로 치유되지만 증상이 심한 경우에는 항생제를 복용하거나 림프절을 절제해야 합니다. 귀 뒤의 멍울과 목 왼쪽 측면에 생긴 멍울은 초음파 검사를 시행하여 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받는 것이 좋습니다.

항문농양수술,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다. 혹시라도 출혈이 다시 심해지면 응급실 방문도 고려해보시는 것이 좋겠습니다.

치과 의사가 송곳니를 갈아버린 후 신경쓰거나 눌러보면 시린 느낌이 듭니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 치아교정을 받고 있고요. 치과 의사가 언젠가 미용을 위해서 한번 송곳니 양쪽을 다 갈아낸 적이 있는데 그 송곳니를 자꾸 신경쓰거나 세게 눌러보면 시린 느낌이 듭니다. 치아를 많이 갈아내서 그런건가요? 고칠 수 있나요...? 교합과 모양을 위해 송곳니를 다듬으신 것 같네요 보통 이런 경우는 시림증상이 나타나는 경우는 드물긴 합니다 치료 받으신 치과에 가셔서 증상을 말씀하시고 상담을 받아보시는 것이 좋을 듯 합니다

전립선염이 아닐경우 어떤 병을 생각해야 하나요?..안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선염이 아닐 경우 다음과 같은 질환을 생각해 볼 수 있습니다. 전립선 비대증 방광염 요로 감염 요도염 균이 없는 전립선염 과민성 방광 신경성 요실금 전립선암 이러한 질환은 증상이 비슷하기 때문에 정확한 진단을 위해서는 병원에 방문하여 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

첫 관계 후 생리 늦어짐 질문 드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 다음과 같은 사항들을 고려해 볼 수 있습니다. 1. 스트레스 첫 성관계는 여성에게 심리적 스트레스를 줄 수 있습니다. 이로 인해 생리 주기가 일시적으로 변할 수 있습니다. 2. 호르몬 변화 성관계 후 여성의 호르몬 수준이 변화할 수 있으며 이로 인해 생리 주기가 지연될 수 있습니다. 3. 임신 가능성 콘돔 사용 후에도 임신 가능성은 낮지만 완전히 배제할 수는 없습니다. 생리 지연이 지속될 경우 임신 여부를 확인해볼 필요가 있습니다. 4. 정상적인 변동 때로는 생리

주기가 12일 정도 지연되는 것이 정상적일 수 있습니다. 스트레스나 호르몬 변화로 인한 일시적인 지연일 가능성이 높습니다. 이런 상황에서는 여자친구의 상태를 주의 깊게 관찰하고 생리가 1주일 이상 지연될 경우 병원에 방문하여 확인해보는 것이 좋습니다. 그 전까지는 너무 걱정하지 마시고 여자친구를 이해하고 지지해주는 것이 중요합니다.

뇌검사 관련해서 질문드려요, 안녕하세요. 메디이즈입니다. 먼저 MRA 검사에서 뇌동맥류가 의심되어 CTA 검사를 추가로 받으신 것은 정상적인 진단 과정이었습니다. 뇌동맥류는 크기가 작을 경우 주기적인 추적 검사가 필요한데 교수님께서 1년 간격으로 CTA 검사를 받아보라고 하신 것은 적절한 판단으로 보입니다. 방사선 피폭에 대한 걱정은 이해할 수 있습니다. CTA 검사는 CT 촬영을 기반으로 하므로 방사선 노출이 있습니다. 하지만 의사가 판단하기에 1년 간격으로 추적 검사를 받는 것이 환자의 건강을 위해 필요하다고 판단했다면 그 위험성은 크지 않을 것으로 보입니다. 전문가의 조언을 따르는 것이 가장 중요합니다. 의사와 상담하여 정기적인 추적 검사의 필요성과 방사선 노출의 위험성을 다시 한번 확인해보시는 것이 좋겠습니다. 필요하다면 MRI와 같은 대안적인 검사법도 고려해볼 수 있습니다. 전반적으로 의사의 권고에 따라 주기적인 검사를 받는 것이 뇌동맥류 관리를 위해 중요합니다. 방사선 피폭에 대한 우려는 이해할 수 있지만 전문가의 판단을 신뢰하고 협조하는 것이 가장 중요합니다. 별레 물린데 어떤약이 잘듣는지 질문드립니다, 안녕하세요. 메디이즈입니다. 별레 물린 데에 가장 많이 사용되는 약물은 다음과 같습니다 1. 항히스타민제 모기 및 벌레 물린 데에 가장 효과적인 약물입니다. 대표적으로 로라타딘 세티리진 펠라르고닌 등이 있습니다. 이런 약물은 가려움증을 줄이고 붓기를 가라앉히는 데 도움됩니다. 2. 스테로이드 연고 히드로코르티손 연고나 크림은 염증 및 가려움증 완화에 도움됩니다. 피부에 바르면 효과적입니다. 3. 소독제 벌레 물린 데를 깨끗이 씻고 소독하는 것이 중요합니다. 포비돈 요오드 알코올 등의 소독제를 사용하면 좋습니다. 4. 진통제 아세트아미노펜이나 이부프로펜 등의 진통제는 통증 완화에 도움됩니다. 이런 약물들을 적절히 사용하면 벌레 물린 데로 인한 가려움증 붓기 통증 등을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 단 과도한 사용은 피하시고 의사 상담 후 사용하시는 것이 좋습니다. 또한 모기 기피제 사용 깨끗한 환경 유지 적절한 수면 등의 예방법도 함께 고려해보시기 바랍니다.

벌 쏘인곳 두드러기, 안녕하세요. 메디이즈입니다. 알러지 반응이 발생하면 12주간 재발이 반복될 수 있어 꾸준히 약물 치료를 하고 완전히 호전되면 중단하는 것을 권합니다.

기립성빈맥, 안녕하세요. 메디이즈입니다. 기립성빈맥은 자율신경실조증의 증상 중 하나입니다. 자율신경실조증은 자율신경계의 기능이 저하되어 발생하는 질환으로 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 기립성빈맥은 눕거나 앉아 있을 때는 정상적인 심박수를 유지하다가 일어서면 심박수가 갑자기 증가하는 증상입니다. 기립성빈맥은 어지럼증 두통 실신 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 기립성빈맥의 치료에는 혈압을 낮추는 약물과 교감신경을 억제하는 약물이 사용됩니다. 혈압을 낮추는 약물로는 칼슘채널차단제 베타차단제 등이 사용되고 교감신경을 억제하는 약물로는 메토프롤롤 프로프라놀롤 등이 사용됩니다. 알프졸람과 인놀은 기립성빈맥의 치료에 효과가 없는 것으로 알려져 있습니다. 기립성빈맥의 치료에는 혈압을 낮추는 약물과 교감신경을 억제하는 약물이 사용되므로 알프라람과 인놀을 먹어도 효과가 없는 경우 다른 약물을 사용해야 합니다. 기립성빈맥은 심각한 합병증을 유발할 수 있으므로 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 진료를 받아야 합니다.

실신 구토 식은땀 원인이 뭘까요, 안녕하세요. 메디이즈입니다. 실신 구토 식은땀은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 혈압이 낮아서 발생할 수도 있고 뇌졸중이나 심장마비와 같은 중

증 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 혈압이 낮아서 실신하는 경우는 혈압이 갑자기 떨어지면서 뇌로 가는 혈액량이 줄어들어서 어지러움이나 실신을 유발합니다. 혈압이 낮아서 실신을 하는 경우는 보통 눕거나 누워서 쉬면 증상이 호전됩니다. 뇌졸중이나 심장마비와 같은 중증 질환으로 인해 실신하는 경우는 뇌나 심장에 혈액 공급이 부족해져서 발생합니다. 뇌졸중이나 심장마비로 인해 실신하는 경우는 보통 눕거나 누워서 쉬어도 증상이 호전되지 않으며 심한 경우 사망에 이를 수 있습니다. 실신 구토 식은땀이 발생했다면 반드시 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다. 병원에서 검사를 통해 정확한 원인을 진단하고 치료를 받아야 합니다.

갑상선암 수술 후 약복용과 당뇨,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선 호르몬 복용으로 당뇨 위험이 높아지거나 갑상선 기능항진증 저하증에 걸리지는 않습니다. 갑상선 전절제 하셨으면 갑상선 저하증이 오니 갑상선 호르몬 복용이 필요합니다

메디키넷 갑상선 호르몬 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료가 필요한 내용입니다 ADHD 약으로 인한 부작용으로 갑상선 호르몬에 이상이 생기지는 않습니다 반대로 갑상선에 문제가 있을 시 ADHD유사 소견은 보일 수 있을 수 있는 것다 볼 수 있을 것이고 메키넷 리타드는 일종의 흥분제 각성제의 항정신약물인데 왜 복용을 하시는지? 메키넷 리타드 때문에도 심부전 증이나 심장떨림등을 보일 수 있기에 인물은 답이 아닙니다 주신 내용은 복용하는 약으로 인한 이차적 증상일 가능성이 높아 보여 왜 약을 복용하시는지부터 체크를 해 보아야할 부분입니다

고환이 딱딱해진거 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 타박상으로 인해 고환백막이 파열되어 왼쪽 고환을 2주전 수술을 했는데 그 왼쪽고환에 굳어있는듯한 느낌이 드는군요. 크게 걱정하지 마시고 수술 받으신 병원 주치의와 정확한 상담을 받도록 하십시오.

원인 불명 몸살,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은 여성분인것으로 보아 호르몬 주기에 따라 나타나는 증상일 가능성도 있을듯합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 병원 진료 권유합니다.

성병관련 문의자신 포함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

귀두에 붉은 점이 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 당분간 안 건드리기만 해도 좋아지는 경우가 많습니다. 피부 질환 중 가장 흔한 형태인 자극성 접촉 피부염은 누구에나 자극적인 물질에 접촉한 경우에 발생하는 피부염으로 병변이 매우 다양하여 흉반에서 수포나 궤양 까지도 생길 수 있습니다. 건승하세요.

휘발성유기화합물VOCs에 노출되었을때 생기는 증상들에 대해서 궁금합니다,안녕하세요 요약 오존과 미세먼지는 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

메모리폼 베개에서 휘발성유기화합물VOCs이나오나요,안녕하세요 요약 1. 소재에 따라 다릅니다. 2. 샀던 곳에 직접 물어봐서 확인해야 할 문제입니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인 물질이 되는 탄화수소화합물입니다. 건승하세요

혹시 치루일까요?,안녕하세요 요약 1. 피부 꼬리 입니다. 2. 피부꼬리는 항문 질환으로 부종이 생긴 뒤에 발생하는 병변입니다. 피부꼬리는 항문 주위 피부가 늘어져 너덜거리고 주름이

잡혀 있는 상태로 대개 치열이나 치핵 등으로 항문 주위 피부가 부었다가 가라 앉으면서 발생
합니다. 건승하세요

가래 색 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 음식을 섭취한 직후에 뱉어내는 가래는
드신 음식의 색에 따라 변화할 수 있습니다. 가래에 섞여들어갈 수 있기 때문입니다. 다만 이
러한 가래의 색 변화가 지속적으로 관찰된다면 음식과 관계없는 가래의 색이라 볼 수 있습니
다.

물마실때 목에 걸리는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식 후 속이 더부룩하고 트림이 많
이 나는 것은 소화 불량이나 일시적인 위장 장애일 가능성이 큽니다. 현재는 증상이 거의 사
라졌지만 물을 마실 때 목에 걸리고 트림이 나는 느낌이 지속된다면 역류성 식도염의 초기 증
상일 수 있습니다. 생활에 큰 지장이 없더라도 증상이 계속되거나 악화되면 병원을 방문하여
정확한 진단을 받는 것이 좋습니다.

이거 큰일 난건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 가능성은 낮으면 질이나 자궁 경부의
상처나 손상이 있을 수 있어 출혈이 지속된다면 산부인과 진료를 보시기 바랍니다.

손에 수포가 꽃처럼 생겼어요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 단정지어이 이야기하기는 어
렵지만 수포가 점점 번지면서 통증이나 가려움이 동반되면 대상포진의 가능성을 염두에 두어
야 합니다.

성기 피부에 붉은 두드러기 같은 게 생겼는데 이게 뭔지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이물
질에 대한 염증 반응입니다. 비뇨기와 병원에 가서서 바르는 약과 먹는 약 처방받아서 사용
하면 호전됩니다.....

아데노이드 비대증이었을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아데노이드 비대는 이비인후과 검
사를 통해 쉽게 진단할 수 있습니다. 이비인후과 내원하여 검사를 해보도록하고 수면 무호흡
증이 있다면 수술적 치료를 고려해 볼 수 있습니다.

아기 사타구니와 팔다리 수포가 생겼습시다사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수족구 수두
같은 것들의심해볼만 합니다. 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 혹시 원래 아토피 같은것
이 있나요?

착상혈일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유산관계로는 임신이 불가능하며 생리 3일전에는
가임기가 아니어서 임신가능성은 없으니 착상혈은 아닐 것으로 생각됩니다

경구피임약 피임효과? 임신가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약은 용량과 용법을 치키
는 것이 가장 중요합니다. 새로운 약으로 바꾸어도 효과는 지속될 것으로 생각됩니다. 복용이
하루 늦었네요

귀두염증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 더이상의 자극을 하지말고 경과를 지켜보셔도 되고 항
생제 연고 정도는 바르면서 경과를 지켜보셔도 괜찮을 것 같습니다

제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간접적이니 접촉으로 무좀
균이 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 따라서 크게 걱정하지 않아도 될 것으로 생각됩니다.
답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

성기 두드러기 물집은 없었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물집이 없었다고하면 성기포진
으로 보기는 어려워보이고 성매개 질환은 아닐가능성이 높습니다. 과도한 자극이 반복되었다
면 그것이 원인일 가능성이 높아보입니다

아바스틴 안구 주사 1회후 비문증 증상 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아바스틴베바시주맙
안구 주사 후 비문증이 발생하는 경우는 드물지만 가능한 부작용 중 하나입니다. 비문증은 아
바스틴 안구 주사 시 발생할 수 있는 드문 합병증으로 알려져 있습니다. 발생 빈도는 대략

0.213.7 정도로 보고되고 있습니다.

파상풍관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그것도 상처가 있는것이니 파상풍에 대한 예방조치를 하시는 것이 필요하다고 생각합니다. 파상풍검사는 어렵습니다.

귀두염증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 더이상의 자극을 하지말고 경과를 지켜보셔도 되고 항생제 연고 정도는 바르면서 경과를 지켜보셔도 괜찮을 것 같습니다

성기 두드러기 물질은 없었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물질이 없었다고하면 성기포진으로 보기는 어려워보이고 성매개 질환은 아닐가능성이 높습니다. 과도한 자극이 반복되었다면 그것이 원인일 가능성이 높아보입니다

파상풍관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 십년안에 파상풍 접종이 없었다고 하면 파상풍 접종이 필요한 상황으로 판단됩니다. 상처가 나면 위험성은 존재합니다

성기에 붉은 두드러기 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 헤르페스2형 성기포진인가 아닌가 싶습니다. 초기 사진은 혹시 없나요? 물질이 잡혔으면 헤르페스의심스럽네요

파상풍관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그것도 상처가 있는것이니 파상풍에 대한 예방조치를 하시는 것이 필요하다고 생각합니다. 파상풍검사는 어렵습니다.

에이즈 발진일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 에이즈 발진을 알 수 없습니다. 게다가 잠복기를 고려하면 아직 증상이 나타날 때는 아닌것 같습니다. 위험한 관계는 피하시는 것이 중요합니다

아기 사타구니와 팔다리 수포가 생겼습니다사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수족구 수두 같은 것을의심해볼만 합니다. 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 혹시 원래 아토피 같은것이 있나요?

파상풍관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그것도 상처가 있는것이니 파상풍에 대한 예방조치를 하시는 것이 필요하다고 생각합니다. 파상풍검사는 어렵습니다.

착상혈일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유산관계로는 임신이 불가능하며 생리 3일전에는 가임기가 아니어서 임신가능성은 없으니 착상혈은 아닐 것으로 생각합니다

에이즈 발진일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 에이즈 발진을 알 수 없습니다. 게다가 잠복기를 고려하면 아직 증상이 나타날 때는 아닌것 같습니다. 위험한 관계는 피하시는 것이 중요합니다

제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간접적이니 접촉으로 무좀균이 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 따라서 크게 걱정하지 않아도 될 것으로 생각합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

사랑니 꼭 뽑아야 할까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이번주에 아래 사랑니를 뽑았는데 진짜 너무 아팠어서 윗 사랑니 뽑기가 싫어졌어요 이거 꼭 뽑아야 하나요? 또 괜히 찾아보다가 상악동 천공 생길수도 있다는 글을 봤어요 치과에서는 아래 신경만 말씀하시고 상악동 천공은 말씀 안해주셨는데 저는 해당사항이 아니라서 그런걸까요? 엑스레이 사진이 흐릿해 정확히 판단하기가 어렵습니다 씨티를 찍어보시면 더 정확한 상태를 알 수 있을 듯 하네요

이럴때는 혈당을 어느 시점에서 측정해야 하는지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식후 혈당 체크의 의미는 식사후 인슐린 분비능 혈당조절력을 보고자 함인 것이기에 언제 몇시가 중요한 것이 아니라 식사 음식의 섭취 하나하나를 다 그 기준으로 보아야만 합니다

아바스틴 안구 주사 1회후 비문증 증상 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아바스틴베바시주맙 안구 주사 후 비문증이 발생하는 경우는 드물지만 가능한 부작용 중 하나입니다. 비문증은 아

바스틴 안구 주사 시 발생할 수 있는 드문 합병증으로 알려져 있습니다. 발생 빈도는 대략 0.213.7 정도로 보고되고 있습니다.

파상풍관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 십년안에 파상풍 접종이 없었다고 하면 파상풍 접종이 필요한 상황으로 판단됩니다. 상처가 나면 위험성은 존재합니다

성기에 붉은 두드러기 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 헤르페스2형 성기포진이아닌가 싶습니다. 초기 사진은 혹시 없나요? 물질이 잡혔으면 헤르페스의심스럽네요

경구피임약 피임효과? 임신가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약은 용량과 용법을 지키는 것이 가장 중요합니다. 새로운 약으로 바꾸어도 효과는 지속될 것으로 생각됩니다. 복용이 하루 늦었네요

성기에 붉은 반점,안녕하세요 요약 1. 귀두포피염인지 확진 받아 보세요 2. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나게 됩니다. 귀두포피염은 귀두와 포피에 염증이 생기는 질환인데 귀두 표면과 포피 내면 사이에는 항상 습기가 있어 세균이 침입해 번식하기 쉽습니다. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나거나 기저귀나 속옷에 농성 분비물이 묻어 나오기도 하고 환부의 탈색이 관찰되기도 합니다. 건승하세요

손에 수포가 꽃처럼 생겼어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 단정지어이 이야기하기는 어렵지만 수포가 점점 번지면서 통증이나 가려움증이 동반되면 대상포진의 가능성을 염두에 두어야 합니다.

제가 궁금한 것들에다가 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품이 질문자의 피부에 적합한지는 결국 사용을 해보아야 알 수 있습니다. 올려주신 성분상 피부 자극을 심하게 유발하는 성분은 없는 것으로 보입니다.

금연약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문제 없이 처방 및 복용 가능할 가능성이 높지만 환자 개개인에 따른 차이가 있을 수 있어 담당선생님과 먼저 상의하시기를 권유합니다

턱 밑 근육? 이 잘못된거 같아요,안녕하세요 요약 1. 간혹 턱이나 근육 주변에 있는 임파선이 2. 근육이나 턱뼈 다른 근육 사이에 끼기는 경우도 있습니다. 3. 그걸로 자극받아 주변 조직이 아플 수 있습니다. 4. 기존 치료했던 병원에서 다시 치료와 진료를 봐보세요 건승하세요

눈 위나 아래쪽이 미세하게 노랗습니다...황달일까요?,안녕하세요 요약 1. 언급한 눈은 공막입니다. 2. 전체가 노랗진 않고 3. 공막은 유전적으로 하얗고 누런 정도의 차이가 있습니다. 4. 최근에 건강검진을 했으면 빌리루빈 검사항목도 있는지 봐보세요 5. 보통 황달이 오면 눈 전체가 노랗집니다. 건승하세요

갑상선암 수술 후 기능저하증으로 인한 합병증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선 암으로 갑상선 전절제 수술을 받으셨다고 하면 갑상선을 모두 제거 하였으니 갑상선 기능 저하증이 오는것은 당연합니다. 그래서 수술후에 갑상선 호르몬을 보충합니다

이약들을 평생 먹어야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프사신바이정 유니콜정 에졸정 휴펜정 다타남서방정 처방 받았군요. 주치의와 언제까지 복용해야 하는지에 대한 정확한 상담을 받도록 하십시오.

눈 위나 아래쪽이 미세하게 노랗습니다...황달일까요?,안녕하세요 요약 1. 언급한 눈은 공막입니다. 2. 전체가 노랗진 않고 3. 공막은 유전적으로 하얗고 누런 정도의 차이가 있습니다. 4. 최근에 건강검진을 했으면 빌리루빈 검사항목도 있는지 봐보세요 5. 보통 황달이 오면 눈

전체가 노래잡니다. 건승하세요

이건 모낭인가요 곤지름인가요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

금연약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문제 없이 처방 및 복용 가능할 가능성이 높지만 환자 개개인에 따른 차이가 있을 수 있어 담당선생님과 먼저 상의하시기를 권유합니다
안녕하세요 제가 궁금한 것들에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 내용 중 클렌징폼과 노세범 파우더에 포함된 스쿠알란 토크페롤 비타민E 성분에 대한 걱정이신가요? 해당 화장품을 사용하시고 특별히 부작용 없으셨다면 동일한 성분이 포함된 에스트라 로션도 사용해보실 수 있습니다.

제가 궁금한 것들에다가 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품이 질문자의 피부에 적합한지는 결국 사용을 해보아야 알 수 있습니다. 올려주신 성분상 피부 자극을 심하게 유발하는 성분은 없는 것으로 보입니다.

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이론적으로는 얼굴 등에도 발생할 수 있으나 무좀이 호발하는 부위도 아니고 자주 씻고 마르기에 크게 문제될 가능성은 적을듯합니다.

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품이 질문자의 피부에 적합한지는 결국 사용을 해보아야 알 수 있습니다. 올려주신 성분상 피부 자극을 심하게 유발하는 성분은 없는 것으로 보입니다.

턱 밑 근육? 이 잘못된거 같아요,안녕하세요 요약 1. 간혹 턱이나 근육 주변에 있는 임파선이 2. 근육이나 턱뼈 다른 근육 사이에 끼기는 경우도 있습니다. 3. 그걸로 자극받아 주변 조직이 아플 수 있습니다. 4. 기존 치료했던 병원에서 다시 치료와 진료를 봐주세요 건승하세요

턱 밑 근육? 이 잘못된거 같아요,안녕하세요 요약 1. 간혹 턱이나 근육 주변에 있는 임파선이 2. 근육이나 턱뼈 다른 근육 사이에 끼기는 경우도 있습니다. 3. 그걸로 자극받아 주변 조직이 아플 수 있습니다. 4. 기존 치료했던 병원에서 다시 치료와 진료를 봐주세요 건승하세요

성기 피부에 붉은 두드러기 같은 게 생겼는데 이게 뭔지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이물질에 대한 염증 반응입니다. 비뇨기과 병원에 가서서 바르는 약과 먹는 약 처방받아서 사용하면 호전됩니다.....

턱 밑 인파선이 끼긴 경우 어느 과 병원에 가야하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 안하고 약과 물리치료로 일단 해봐야해서 정형외과 가서 물리치료 받으면 괜찮아 집니다. 수술하려면 일반 외과 가야합니다.

이거 큰일 난건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 가능성은 낮으면 질이나 자궁 경부의 상처나 손상이 있을 수 있어 출혈이 지속된다면 산부인과 진료를 보시기 바랍니다.

아데노이드 비대증이였을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아데노이드 비대는 이비인후과 검사를 통해 쉽게 진단할 수 있습니다. 이비인후과 내원하여 검사를 해보도록하고 수면 무호흡증이 있다면 수술적 치료를 고려해 볼 수 있습니다.

성기 피부에 붉은 두드러기 같은 게 생겼는데 이게 뭔지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이물질에 대한 염증 반응입니다. 비뇨기과 병원에 가서서 바르는 약과 먹는 약 처방받아서 사용하면 호전됩니다.....

아데노이드 비대증이었을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아데노이드 비대는 이비인후과 검사를 통해 쉽게 진단할 수 있습니다. 이비인후과 내원하여 검사를 해보도록하고 수면 무호흡증이 있다면 수술적 치료를 고려해 볼 수 있습니다.

턱 밑 인파선이 낀 경우 어느 과 병원에 가야하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 안하고 약과 물리치료로 일단 해보야해서 정형외과 가서 물리치료 받으면 괜찮아 집니다. 수술하려면 일반 외과 가야합니다.

생리혈 착상혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 착상혈은 비교적 소량이고 나타나기도 하고 그렇지 않기도 해서 임상적인 의미를 두지 않습니다. 임신여부든 임태기나 직접진료를 통해서 확인해보시는 것을 권합니다

정신과 약 관련 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 항우울제와 항불안제 같은 약물은 사람마다 부작용이 다르게 나타나는 경우가 흔합니다. 이는 각 개인의 유전적 차이 대사 속도 기존 건강 상태 그리고 다른 복용 중인 약물들과의 상호작용 등에 따라 달라집니다. 어떤 사람은 약물이 잘 맞아 증상이 개선되지만 다른 사람은 구역질 구토 불면증 등의 부작용을 경험할 수 있습니다. 개인별로 약물에 대한 반응이 다르기 때문에 처방한 의사와의 상담을 통해 적절한 약물과 용량을 찾는 것이 중요합니다.

배란기 갈색냉 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리주기 중간 즈음에 반복되는 출혈 및 통증이라는 증상은 문의하신 내용처럼 배란통일 가능성이 높아 보이나 정확한 것은 전문의의 초음파 검사를 통해 자궁내막질환이나 자궁용종과 같은 다른 이유들이 배제되어야 합니다. 다른 문제들이 없고 주기적으로 배란기 즈음의 출혈과 통증반복이라고 진단된다면 그 불편감이 일상생활에 어느정도의 영향을 주는지에 따라 배란을 일정기간 억제하거나 다른 호르몬 보조치료가 필요할지 전문의 상담을 통해 증상완화 또는 치료를 하실 수 있습니다. 배란호르몬 주기 변화에 따른 증상들인 경우이므로 배란을 억제하기 위한 경구피임약 진통제 등이 도움되기도 합니다. 가까운 시기에 산부인과 진료를 보신 후 정확한 설명을 듣기 바랍니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

눈 위나 아래쪽이 미세하게 노랗습니다...황달일까요?,안녕하세요 요약 1. 언급한 눈은 공막입니다. 2. 전체가 노랗진 않고 3. 공막은 유전적으로 하얗고 누런 정도의 차이가 있습니다. 4. 최근에 건강검진을 했으면 빌리루빈 검사항목도 있는지 봐보세요 5. 보통 황달이 오면 눈 전체가 노랗집니다. 건승하세요

턱 밑 근육? 이 잘못된거 같아요,안녕하세요 요약 1. 간혹 턱이나 근육 주변에 있는 임파선이 2. 근육이나 턱뼈 다른 근육 사이에 낀기는 경우도 있습니다. 3. 그걸로 자극받아 주변 조직이 아플 수 있습니다. 4. 기존 치료했던 병원에서 다시 치료와 진료를 봐보세요 건승하세요

턱 밑 근육? 이 잘못된거 같아요,안녕하세요 요약 1. 간혹 턱이나 근육 주변에 있는 임파선이 2. 근육이나 턱뼈 다른 근육 사이에 낀기는 경우도 있습니다. 3. 그걸로 자극받아 주변 조직이 아플 수 있습니다. 4. 기존 치료했던 병원에서 다시 치료와 진료를 봐보세요 건승하세요

채외충격파가 아니었다구요 ,안녕하세요 요약 1. 아픈게 염증때문인지 2. 의심하고 있는 초음파 때문인지 3. 다시 병원에서 확인하는 수 밖에 없습니다. 4. 아픈 부위를 누르면 더 아프듯이 초음파로 아픈 부위를 처치하면 더 아플 수 있습니다. 건승하세요

이 약들을 먹고 배에 복수가 찰수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물의 부작용으로 복수가 찰 가능성은 매우 낮습니다. 체내 수분이 저류되는 경우 팔다리나 얼굴이 붓는 증상이

나타날 수는 있어도 복수가 차기는 어렵습니다. 복수는 간경화가 심하게 진행되어 혈중 알부민 수치가 낮을 때와 같은 상황에 복강에 고이기 시작합니다.

비염 가래 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만성 비염과 인후염이 동시에 있을 때 콧물이 목으로 넘어가 가래에 섞일 수 있습니다. 투명한 점액 사이에 초록 노란색 덩어리가 있는 것은 콧물이 목으로 넘어와서 가래에 섞이는 현상일 가능성이 큼니다. 인후염이 있을 때도 염증으로 인해 가래가 더 끈적하고 색이 변할 수 있습니다.

교정이 필요한 치열인가요?,안녕하세요 요약 1. 교정은 개인 만족도와 의식에 따라 달라집니다. 2. 앞이 윗니 아랫니 모두 가지런하지 않는데 3. 이걸로 스트레스 받거나 대인관계에서 위축감이 생기면 4. 교정하는 겁니다. 5. 현재 연령에서도 교정가능 합니다. 건승하세요.

가슴 중앙 위쪽 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 너무 예민하시거나 증상에 대한 과도한 관심 걱정 불안증상으로 인한것 같습니다. 계속되면 진료 받아보셔요. 규칙적인 운동을 권해드립니다

피부상태심한가려움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만성 습진으로 인해 피부 색소 침착이 동반된 것으로 보입니다. 치료에도 호전이 없다면 상급병원 피부과 진료를 권해드립니다.

아무런 외상없이 Crps가 올 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 호전되었다면 CRPS 가능성은 매우 낮으며 외상 없이도 CRPS가 발생하는 경우도 있습니다. 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

변상권 선생님 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 네 2. 네 없을 가능성이 높아 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

변 상태가 안좋은것 같은데 괜찮은걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 알려주신 여러가지 증상으로 궤장암을 의심하기에는 여러가지로 부족하다고 생각합니다. 거사를 통해서 확인해보시는 것을 권합니다

사랑니 꼭 뽑아야 할까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이번주에 아래 사랑니를 뽑았는데 진짜 너무 아팠어서 윗 사랑니 뽑기가 싫어졌어요 이거 꼭 뽑아야 하나요? 또 괜히 찾아보다가 상악동 천공 생길수도 있다는 글을 봤어요 치과에서는 아래 신경만 말씀하시고 상악동 천공은 말씀 안해주셨는데 저는 해당사항이 아니라서 그런걸까요? 엑스레이 사진이 흐릿해 정확히 판단하기가 어렵습니다 씨티를 찍어보시면 더 정확한 상태를 알 수 있을 듯 하네요

초음파 치료 후 통증 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외 충격파 치료시 손상 부위에 통증은 흔하게 나타납니다. 하지만 통증이 심하다면 강도를 조절해야 하므로 치료사에게 이야기하기 바랍니다.

초음파 치료 후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외 충격파 치료시 손상 부위에 통증은 흔하게 나타납니다. 하지만 통증이 심하다면 강도를 조절해야 하므로 치료사에게 이야기하기 바랍니다.

귀두 끝 붉은 발진 및 요도 끝 작열감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의심스러운 관계를 하고 귀두 끝 발진이 생겼군요. 포비아가 와서 그런가 너무 두렵군요. 크게 걱정하지 마시고 검사 받으신 병원 주치의와 정확한 상담을 받도록 하십시오.

왼팔 안쪽에 통증이 있는데 심장질환 연관통일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼팔이 아프다는 증상만으로 심장 질환만을 의심하지는 않습니다. 경추부 문제에 의한 증상일 수도 있고 다양한 원인들이 있습니다

이럴때는 혈당을 어느 시점에서 측정해야 하는지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식후 혈당

체크의 의미는 식사후 인슐린 분비능 혈당조절력을 보고자 함인 것이기에 언제 몇시가 중요한 것이 아니라 식사 음식의 섭취 하나하나를 다 그 기준으로 보아야만 합니다

임신준비를 위한 휴약기간 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의주신 약제들은 보통 하루 2회 복용 즉 12시간마다 복용을 추천받는 약입니다. 복용약제 반감기는 24시간 미만 보통은 1620시간으로 알려진 약제들입니다.으로 여유있게 1주일이면 체내에서 충분히 대사가 가능합니다. 텍사메타손주사의 반감기는 최대 3일정도로 긴 편이므로 주사제는 최대 23주면 체내에서 사라집니다. 임신을 준비하고 있으므로 지금부터 꾸준히 엽산제를 복용하면서 피부염으로 인해 복용중이거나 주사중인 피부염 치료를 완전히 중단하고 최소 1개월정도의 휴약기를 가진다면 안전한 임신준비가 될 것 같습니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

이 약들을 먹고 지능저하가 일어날수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련없을 것 같습니다 진료 받으신 병원에 방문하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

숨이 잘 안 쉬어집니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 스트레스나 과도한 걱정이나 불안 증상 같은 것은 없나요? 만약 그렇다면 하면 심리적인 이유 때문에 나타나는 증상이 아닌가 의심해볼 수 있습니다

가는변 관련해서 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장 내시경상 이상 소견이 없다면 구조적인 문제가 아니라 단순 변비로 인해 가는변이 나오는 것으로 변비에 대한 약물 치료가 필요합니다.

초음파 검사관련해서질문드려요 궁금해서질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사나 소변검사는 검체를 처리하여 결과가 나올 때까지 수일 이상 소요되지만 초음파는 실시간으로 영상을 확인하는 검사이기 때문입니다.

소변스틱 검사 아질산염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 없다고 하면 일단은 약물복용 같은 치료 없이 증상이 어떻게 변하는지 경과를 지켜보시는 것을 권합니다. 질염약 먹은것과는 연관은 적어보입니다

이건 모낭인가요 곤지름인가요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이론적으로는 얼굴 등에도 발생할 수 있으나 무좀이 호발하는 부위도 아니고 자주 씻고 마르기에 크게 문제될 가능성은 적을듯합니다.

이약들을 평생 먹어야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프사신바이정 유니콜정 에졸정 휴펜정 다타남서방정 처방 받았군요. 주치의와 언제까지 복용해야 하는지에 대한 정확한 상담을 받도록 하십시오.

안녕하세요 제가 궁금한 것들에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 내용 중 클렌징폼과 노세범 파우더에 포함된 스쿠알란 토크페롤 비타민E 성분에 대한 걱정이신가요? 해당 화장품을 사용하시고 특별히 부작용 없으셨다면 동일한 성분이 포함된 에스트라로션도 사용해보실 수 있습니다.

금연약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문제 없이 처방 및 복용 가능할 가능성이 높지만 환자 개개인에 따른 차이가 있을 수 있어 담당선생님과 먼저 상의하시기를 권유합니다

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이론적으로는

얼굴 등에도 발생할 수 있으나 무좀이 호발하는 부위도 아니고 자주 씻고 마르기에 크게 문제 될 가능성은 적을듯합니다.

브라질리언 왁싱 후 관리 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 브라질리언 왁싱으로 생긴 모낭염의 가능성이 높습니다. 좋아질때까지는 가급적 환부에 자극을 주지 않는 것이 필요합니다

금연약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문제 없이 처방 및 복용 가능할 가능성이 높지만 환자 개개인에 따른 차이가 있을 수 있어 담당선생님과 먼저 상의하시기를 권유합니다

초음파 물리치료 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 외상에 의한 증상이라면 일반적으로 23주 정도 지속될 수 있습니다. 증상이 호전되지 않는다면 다시 한번 진료 권유합니다

목에 가시 걸린 듯한 느낌이 들어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지속적으로 증상이 있다면 내시경 검사를 하여 식도 손상 여부를 확인하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 확률이 높지 않아도 존재합니다. 업소에 따라 성병 여부는 다를 수 있습니다. 우선 경과관찰하시면 될듯하나 원하신다면 검사를 해보는 방법도 있습니다

왼쪽 검지 발가락 일부분이 누르면 찌릿합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경미한 연조직염 가능성이 있습니다. 통증이 지속된다면 단기간 경구 항생제 복용이 도움이 됩니다. 증상이 악화되면 진료를 보시기 바랍니다.

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 확률이 높지 않아도 존재합니다. 업소에 따라 성병 여부는 다를 수 있습니다. 우선 경과관찰하시면 될듯하나 원하신다면 검사를 해보는 방법도 있습니다

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요 요약 1. 성병은 상대방이 세균이나 바이러스 질환이 있어야 가능합니다. 2. 그리고 언급한 행위로도 옮길 수는 있지만 3. 세균이나 바이러스가 있어야 전염됩니다. 건승하세요

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요 요약 1. 성병은 상대방이 세균이나 바이러스 질환이 있어야 가능합니다. 2. 그리고 언급한 행위로도 옮길 수는 있지만 3. 세균이나 바이러스가 있어야 전염됩니다. 건승하세요

가족력 유전 관련해서질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그렇다고 생각됩니다. 혹시라도 이해가 가지 않거나 의심되는 부분은 어떤것이 있는지 말씀해주시면 답변드리겠습니다

안녕하세요 제가 궁금한 것들에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 내용 중 클렌징폼과 노세범 파우더에 포함된 스쿠알란 토코페롤 비타민E 성분에 대한 걱정이신가요? 해당 화장품을 사용하시고 특별히 부작용 없으셨다면 동일한 성분이 포함된 에스트라로션도 사용해보실 수 있습니다.

단식 후 숙변 색깔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇다고 보시면될것 같습니다. 대변새깔만으로 대장암이나 위암을 의심하는 것은 무리가 있다고 판단됩니다. 일반적으로 초록변은 대변통과시간이 짧은경우에 나타납니다

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병에 걸릴 확률은 어느 정도인지 수치로 표현하기는 어렵지만 일단 있을 수 있습니다. 상대방이 성병을 가지고 있는지 아닌지 알수 없기 때문에 답변은 어렵습니다

메모리폼 베게베고자면 Vocs가스가나와서 탈모생기나요?,안녕하세요 요약 두피에 영향을 줄 수는 있지만 그게 두피염이라는 건 아닙니다. 휘발성유기화합물VOCs은 대기중으로 휘발되어 악취를 유발하고 광화학반응에 의해 오존을 발생시키며 2차 미세먼지의 원인물질이 되는 탄화

수소화합물입니다. 건승하세요

VOCs 가스가 탈모나 두피염을 유발할 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가능성은 좀 떨어진다고 생각합니다. 어떤 voc가스에 얼마나 많은양에 얼마나 오래동안 노출되었는지에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 원인은 알기 어렵습니다

속이 누런 메모리폼 베게 커버없이 사용했는데 탈모나 두피염 생기나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 답변은 어렵습니다. 메모리폼 베게를 사용하지 않고 탈모나 두피염이 없어지면 메모리폼 베게 때문이라고 볼수 있습니다. 그렇지 않으면 가능성이 많이 떨어집니다

이건 모낭인가요 곤지름인가요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

성기 상처의 세균 감염이 팔꿈치에 발생한 염증에 영향을 줄 수 도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 상담은 해보셔요. 하지만 3달전에 있었던 성기 상처 염증이 시간이 지난 지금 팔꿈치 염증에 영향을 주지는 않습니다

입술이 가렵고 따가워요.,안녕하세요 요약 1. 구순염입니다. 2. 병원에서 진료 후 3. 세균감염이나 바이러스 감염에 준한 항생제나 항바이러스가 필요할 수 있습니다. 구순염은 입술과 얼굴 피부의 경계 부위에 각종 자극에 의해 발생한 염증인데 바이러스 감염 세균 감염 영양 장애 면역 장애 스트레스 외상 유전적 원인 호르몬 장애 기타 전신 질환 같은 여러 요인들이 단독 또는 복합적으로 관여하며 비타민B12 결핍 철분 및 엽산 결핍 등이 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 건승하세요

벌레 물린 흔적이 있는데 혹시 진드기일까요?,안녕하세요 요약 1. 연조직염입니다. 2. 발적 발열 부종을 특징으로하는 연조직염이라는 병이 있습니다. 3. 항생연고 발라보고 해결안되면 병원에서 치료하면 금세 해결됩니다. 연조직염은 피부표면의 작은 상처를 통해 세균 침투로 진피와 피하조직에 일어나는 세균 감염증이며 봉소염 봉과직염 봉와직염이라고도 합니다. 연조직염의 증상은 발생한 부위에 홍반 열감 부종 압통을 동반하며 질병이 진행되면 물집과 고름이 생기기도 합니다. 건승하세요

관계후 15일 뒤 얼리임신테스트기,안녕하세요 얼리 임신테스트기의 경우 수정 후 79일이면 소변 검사로 임신을 확인할 수 있으며 정확도는 95이상입니다. 임신 초반에는 임신테스트기에서 음성이 나올 가능성도 있지만 일반 임신 테스트기 보다 1주일 정도 먼저 임신 사실을 알 수 있게 됩니다. 건승하세요

오른쪽 턱 위 멍울이 만져집니다.,안녕하세요. 요약 1. 턱 위에도 임파선이 있기도 합니다. 2. 구내염 때문에 2차적으로 부을 수 있으며 3. 수주 지나서도 계속 있거나 주변부위에 만져지는 멍울 갯수가 많아지면 평가가 필요합니다. 걱정이 앞서면 정밀검사초음파 CT를 하면 다른 질환들이 감별이 됩니다. 건승하세요.

성기에 붉은 반점,안녕하세요 요약 1. 귀두포피염인지 확진 받아 보세요 2. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나게 됩니다. 귀두포피염은 귀두와 포피에 염증이 생기는 질환인데 귀두 표면과 포피 내면 사이에는 항상 습기가 있어 세균이 침입해 번식하기 쉽습니다. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나거나 기저귀나 속옷에 농성 분비물이 묻어 나오기도 하고 환부의 탈색이 관찰되기도 합니다. 건승하세요

이약들을 평생 먹어야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프사신바이정 유니콜정 에졸정 휴펜정 다타남서방정 처방 받았군요. 주치의와 언제까지 복용해야 하는지에 대한 정확한 상담

을 받도록 하십시오.

입안에 붉은 부위가 생겼어요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 조그마한 상처로 나타난 일시적인 출혈의 가능성이 높다고 판단됩니다. 계속되면 진료받아보श्य.

생리혈 착상혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 착상혈은 비교적 소량이고 나타나기도 하고 그렇지 않기도 해서 임상적인 의미를 두지 않습니다. 임신여부든 임태기나 직접진료를 통해서 확인해보시는 것을 권합니다

이약들을 평생 먹어야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프사신바이정 유니콜정 에졸정 휴펜정 다타남서방정 처방 받았군요. 주치의와 언제까지 복용해야 하는지에 대한 정확한 상담을 받도록 하십시오.

성기에 붉은 반점,안녕하세요 요약 1. 귀두포피염인지 확진 받아 보세요 2. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나게 됩니다. 귀두포피염은 귀두와 포피에 염증이 생기는 질환인데 귀두 표면과 포피 내면 사이에는 항상 습기가 있어 세균이 침입해 번식하기 쉽습니다. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나거나 기저귀나 속옷에 농성 분비물이 묻어 나오기도 하고 환부의 탈색이 관찰되기도 합니다. 건승하세요

이약들을 평생 먹어야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프사신바이정 유니콜정 에졸정 휴펜정 다타남서방정 처방 받았군요. 주치의와 언제까지 복용해야 하는지에 대한 정확한 상담을 받도록 하십시오.

간수치 5배로 고덱스약 처방 받은 환자입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베톨 치질약을 간수치 낮추는 고스약과 함께 섭취해도 괜찮습니다. 베톨과 고스는 상호 악영향을 주지 않습니다.

첫 관계 후 생리 늦어짐 질문 드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 다음과 같은 사항들을 고려해 볼 수 있습니다. 1. 스트레스 첫 성관계는 여성에게 심리적 스트레스를 줄 수 있습니다. 이로 인해 생리 주기가 일시적으로 변할 수 있습니다. 2. 호르몬 변화 성관계 후 여성의 호르몬 수준이 변화할 수 있으며 이로 인해 생리 주기가 지연될 수 있습니다. 3. 임신 가능성 콘돔 사용 후에도 임신 가능성은 낮지만 완전히 배제할 수는 없습니다. 생리 지연이 지속될 경우 임신 여부를 확인해볼 필요가 있습니다. 4. 정상적인 변동 때로는 생리 주기가 12일 정도 지연되는 것이 정상적일 수 있습니다. 스트레스나 호르몬 변화로 인한 일시적인 지연일 가능성이 높습니다. 이런 상황에서는 여자친구의 상태를 주의 깊게 관찰하고 생리가 1주일 이상 지연될 경우 병원에 방문하여 확인해보는 것이 좋습니다. 그 전까지는 너무 걱정하지 마시고 여자친구를 이해하고 지지해주는 것이 중요합니다.

뇌검사 관련해서질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먼저 MRA 검사에서 뇌동맥류가 의심되어 CTA 검사를 추가로 받으신 것은 정상적인 진단 과정이었습니다. 뇌동맥류는 크기가 작을 경우 주기적인 추적 검사가 필요한데 교수님께서 1년 간격으로 CTA 검사를 받아보자고 하신 것은 적절한 판단으로 보입니다. 방사선 피폭에 대한 걱정은 이해할 수 있습니다. CTA 검사는 CT 촬영을 기반으로 하므로 방사선 노출이 있습니다. 하지만 의사가 판단하기에 1년 간격으로 추적 검사를 받는 것이 환자의 건강을 위해 필요하다고 판단했다면 그 위험성은 크지 않을 것으로 보입니다. 전문가의 조언을 따르는 것이 가장 중요합니다. 의사와 상담하여 정기적인 추적 검사의 필요성과 방사선 노출의 위험성을 다시 한번 확인해보시는 것이 좋겠습니다. 필요하다면 MRI와 같은 대안적인 검사법도 고려해볼 수 있습니다. 전반적으로 의사의 권고에 따라 주기적인 검사를 받는 것이 뇌동맥류 관리를 위해 중요합니다. 방사선 피폭

에 대한 우려는 이해할 수 있지만 전문가의 판단을 신뢰하고 협조하는 것이 가장 중요합니다. 별레 물린데 어떤약이 잘듣는지 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 별레 물린 데에 가장 많이 사용되는 약물은 다음과 같습니다 1. 항히스타민제 모기 및 별레 물린 데에 가장 효과적인 약물입니다. 대표적으로 로라타딘 세티리진 펠라르고닌 등이 있습니다. 이런 약물은 가려움증을 줄이고 붓기를 가라앉히는 데 도움이됩니다. 2. 스테로이드 연고 히드로코르티손 연고나 크림은 염증 및 가려움증 완화에 도움이됩니다. 피부에 바르면 효과적입니다. 3. 소독제 별레 물린 데를 깨끗이 씻고 소독하는 것이 중요합니다. 포비돈 요오드 알코올 등의 소독제를 사용하면 좋습니다. 4. 진통제 아세트아미노펜이나 이부프로펜 등의 진통제는 통증 완화에 도움이됩니다. 이런 약물들을 적절히 사용하면 별레 물린 데로 인한 가려움증 붓기 통증 등을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 단 과도한 사용은 피하시고 의사 상담 후 사용하시는 것이 좋습니다. 또한 모기 기피제 사용 깨끗한 환경 유지 적절한 수면 등의 예방법도 함께 고려해 보시기 바랍니다.

가슴 중앙 눌렀을때 통증 심장문제 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장질환은 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생하지 않습니다. 따라서 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생했다면 다른 질환이 원인일 가능성이 높습니다. 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생하는 원인은 다양할 수 있으며 심장질환이 아닌 다른 질환일 가능성이 더 높습니다. 따라서 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생했다면 병원에 내원하여 진료를 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

실신 구토 식은땀 원인이 뭘까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실신 구토 식은땀은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 혈압이 낮아서 발생할 수도 있고 뇌졸중이나 심장마비와 같은 중증 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 혈압이 낮아서 실신하는 경우는 혈압이 갑자기 떨어지면서 뇌로 가는 혈액량이 줄어들어서 어지러움이나 실신을 유발합니다. 혈압이 낮아서 실신을 하는 경우는 보통 눕거나 누워서 쉬면 증상이 호전됩니다. 뇌졸중이나 심장마비와 같은 중증 질환으로 인해 실신하는 경우는 뇌나 심장에 혈액 공급이 부족해져서 발생합니다. 뇌졸중이나 심장마비로 인해 실신하는 경우는 보통 눕거나 누워서 쉬어도 증상이 호전되지 않으며 심한 경우 사망에 이를 수 있습니다. 실신 구토 식은땀이 발생했다면 반드시 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다. 병원에서 검사를 통해 정확한 원인을 진단하고 치료를 받아야 합니다.

귀두 끝 붉은 발진 및 요도 끝 작열감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의심스러운 관계를 하고 귀두 끝 발진이 생겼군요. 포비아가 와서 그런가 너무 두렵군요. 크게 걱정하지 마시고 검사 받으신 병원 주치의와 정확한 상담을 받도록 하십시오.

고환이 딱딱해진거 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 타박상으로 인해 고환백막이 파열되어 왼쪽 고환을 2주전 수술을 했는데 그 왼쪽고환에 굳어있는듯한 느낌이 드는군요. 크게 걱정하지 마시고 수술 받으신 병원 주치의와 정확한 상담을 받도록 하십시오.

메디키넷 갑상선 호르몬 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료가 필요한 내용입니다 ADHD 약으로 인한 부작용으로 갑상선 호르몬에 이상이 생기지는 않습니다 반대로 갑상선에 문제가 있을 시 ADHD유사 소견은 보일 수 있을 수 있는 것다 볼 수 있을 것이고 메키넷 리타드는 일종의 흥분제 각성제의 항정신약물인데 왜 복용을 하시는지? 메키넷 리타드 때문에도 심부전증이나 심장떨림등을 보일 수 있기에 인물은 답이 아닙니다 주신 내용은 복용하는 약으로 인한 이차적 증상일 가능성이 높아 보여 왜 약을 복용하시는지부터 체크를 해 보아야할 부분입니다

피곤하면 귀 먹먹해지는 이유,안녕하세요 요약 1. 이관기능장애입니다. 2. 지속되면 합병증이

생기므로 검사와 치료를 해야 합니다. 침을 삼킬 때 하품이나 트림을 할 때 귀가 먹먹해지고 자신의 숨소리나 목소리까지 들려 괴로운 질환인 이관기능장애입니다. 높은 산에 오르거나 비행기를 탔을 때 귀가 먹먹하거나 답답한 느낌을 겪어본 적이 있으실텐데 이런 증상이 사라지지 않고 1주일 이상 지속되고 쉬이 사라졌다가 반복해서 나타난다면 이관기능장애가 있는지 확인해 봐야합니다. 코와 귀의 기압을 조절하는 이관은 비인강콧구멍 속과 중이강고막 안쪽의 공간을 연결해 주는 통로인데 비염 부비동염 알레르기 비염 등이 원인으로 발현되고 이관기능장애가 지속되면 중이염이 동반되기도 합니다. 중이염이 있는지 기존 증상도 같이 치료해야 좋아질겁니다. 건승하세요

물마실때 목에 걸리는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식 후 속이 더부룩하고 트림이 많이 나는 것은 소화 불량이나 일시적인 위장 장애일 가능성이 큼니다. 현재는 증상이 거의 사라졌지만 물을 마실 때 목에 걸리고 트림이 나는 느낌이 지속된다면 역류성 식도염의 초기 증상일 수 있습니다. 생활에 큰 지장이 없더라도 증상이 계속되거나 악화되면 병원을 방문하여 정확한 진단을 받는 것이 좋습니다.

가래 색 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 음식을 섭취한 직후에 뱉어내는 가래는 드신 음식의 색에 따라 변화할 수 있습니다. 가래에 섞여들어갈 수 있기 때문입니다. 다만 이러한 가래의 색 변화가 지속적으로 관찰된다면 음식과 관계없는 가래의 색이라 볼 수 있습니다.

간식 먹고 가글,요약 1. 안하는 거 보단 낫지만 2. 양치를 대신하진 못합니다. 구강청결제는 가글 형식이라 치아 표면에 붙어있는 치태를 제거하는 효과는 칫솔질에 비해 현저히 떨어지며 치아와 잇몸에 안 좋은 영향을 주는 세균이나 기타 음식물들은 치아와 잇몸에 강하게 붙어있기 때문에 양치대신 가글만으로 칫솔질의 효과를 보기는 어렵습니다. 건승하세요.

정신과 약 관련 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 항우울제와 항불안제 같은 약물은 사람마다 부작용이 다르게 나타나는 경우가 흔합니다. 이는 각 개인의 유전적 차이 대사 속도 기존 건강 상태 그리고 다른 복용 중인 약물들과의 상호작용 등에 따라 달라집니다. 어떤 사람은 약물이 잘 맞아 증상이 개선되지만 다른 사람은 구역질 구토 불면증 등의 부작용을 경험할 수 있습니다. 개인별로 약물에 대한 반응이 다르기 때문에 처방한 의사와의 상담을 통해 적절한 약물과 용량을 찾는 것이 중요합니다.

정신과 약 관련 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 항우울제와 항불안제 같은 약물은 사람마다 부작용이 다르게 나타나는 경우가 흔합니다. 이는 각 개인의 유전적 차이 대사 속도 기존 건강 상태 그리고 다른 복용 중인 약물들과의 상호작용 등에 따라 달라집니다. 어떤 사람은 약물이 잘 맞아 증상이 개선되지만 다른 사람은 구역질 구토 불면증 등의 부작용을 경험할 수 있습니다. 개인별로 약물에 대한 반응이 다르기 때문에 처방한 의사와의 상담을 통해 적절한 약물과 용량을 찾는 것이 중요합니다.

배란기 갈색냉 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리주기 중간 즈음에 반복되는 출혈 및 통증이라는 증상은 문외지신 내용처럼 배란통일 가능성이 높아 보이나 정확한 것은 전문의의 초음파 검사를 통해 자궁내막질환이나 자궁용종과 같은 다른 이유들이 배제되어야 합니다. 다른 문제들이 없고 주기적으로 배란기 즈음의 출혈과 통증반복이라고 진단된다면 그 불편감이 일상생활에 어느정도의 영향을 주는지에 따라 배란을 일정기간 억제하거나 다른 호르몬 보조치료가 필요할지 전문의 상담을 통해 증상완화 또는 치료를 하실 수 있습니다. 배란호르몬 주기 변화에 따른 증상들인 경우이므로 배란을 억제하기 위한 경구피임약 진통제 등이 도움되기도 합니다. 가까운 시기에 산부인과 진료를 보신 후 정확한 설명을 듣기 바랍니다. 문의에 참고

가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

성병 가능성 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 가능성은 없어 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

이 약들을 먹고 배에 복수가 찰수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물의 부작용으로 복수가 찰 가능성은 매우 낮습니다. 체내 수분이 저류되는 경우 팔다리나 얼굴이 붓는 증상이 나타날 수는 있어도 복수가 차기는 어렵습니다. 복수는 간경화가 심하게 진행되어 혈중 알부민 수치가 낮을 때와 같은 상황에 복강에 고이기 시작합니다.

비염 가래 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만성 비염과 인후염이 동시에 있을 때 콧물이 목으로 넘어가 가래에 섞일 수 있습니다. 투명한 점액 사이에 초록 노란색 덩어리가 있는 것은 콧물이 목으로 넘어와서 가래에 섞이는 현상일 가능성이 큼니다. 인후염이 있을 때도 염증으로 인해 가래가 더 끈적하고 색이 변할 수 있습니다.

왼쪽 갈비뼈가 튀어 나와 있습니다,안녕하세요 요약 1. 갈비뼈 양측 비대칭은 정상 변이입니다. 2. 통증 발적 종창이 있지 않으면 의미를 부여할 이유도 없고 3. 입체적으로 갈비뼈의 모양을 확인하고 싶으면 4. 흉부외과에서 3D CT를 찍으면 모양은 확인할 수 있습니다. 건승하세요

브라질리언 왁싱 후 관리 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 브라질리언 왁싱으로 생긴 모낭염의 가능성이 높습니다. 좋아질때까지는 가급적 환부에 자극을 주지 않는 것이 필요합니다

입안에 붉은 부위가 생겼어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇습니다. 조그마한 상처로 나타난 일시적인 출혈의 가능성이 높다고 판단됩니다. 계속되면 진료받아보श्य.

생리혈 착상혈 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 착상혈은 비교적 소량이고 나타나기도 하고 그렇지 않기도 해서 임상적인 의미를 두지 않습니다. 임신여부든 임태기나 직접진료를 통해서 확인해보시는 것을 권합니다

갑상선암 수술 후 기능저하증으로 인한 합병증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선 암으로 갑상선 전절제 수술을 받으셨다고 하면 갑상선을 모두 제거 하였으니 갑상선 기능 저하증이 오는것은 당연합니다. 그래서 수술후에 갑상선 호르몬을 보충합니다

남성 호르몬 lh와 fsh 수치가 높음 testosterone 수치 정상,안녕하세요 요약 1. FSH와 LH는 남성에서는 정소기능부전증의 검사에 이용됩니다. 2. 테스토스테론이 정상이면 수개월 후 재검하여 추이를 보면 됩니다. 3. 테스토스테론까지 감소되었으면 남성 성선기능저하로 갱년기에 접어드는 단계입니다. FSH와 LH는 난소에서 난포발육과 성숙 배란 황체화 황체 퇴축 등 일련의 난소주기를 조절하고 있으며 FSH는 주로 난포발육에 관여하고 LH는 배란과 황체화에 관여하는 호르몬입니다. 여성에서는 배란 장애 남성에서는 정소기능부전증의 검사에 이용됩니다. 남성 정상치 LH 318 mIU/mL FSH 318 mIU/mL 건승하세요

변 상태가 안좋은것 같은데 괜찮은걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 알려주신 여러가지 증상으로 궤장암을 의심하기에는 여러가지로 부족하다고 생각합니다. 거사를 통해서 확인해보시는 것을 권합니다

곤지름일까요?.,안녕하세요 요약 1. 곤지름은 아니고 2. 계속 퍼지는 양상이면 편평사마귀인지 구별해 봐야 할겁니다. 오돌토돌 몸에 돌아나는 작은 돌기같은 편평사마귀는 편평한 모양으로 튀어나와 있으면서 다발성으로 발생합니다. 5mm미만의 작은 크기와 다발성으로 번지면서 가슴과 배 쪽으로 내려오기도 하고 등이나 어깨 팔 다리로 번질 수도 있습니다. 건승하세요

왼팔 안쪽에 통증이 있는데 심장질환 연관통일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼팔이 아프다는 증상만으로 심장 질환만을 의심하지는 않습니다. 경추부 문제에 의한 증상일 수도 있고 다양한 원인들이 있습니다

아무런 외상없이 Crps가 올 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 호전되었다면 CRPS 가능성은 매우 낮으며 외상 없이도 CRPS가 발생하는 경우도 있습니다. 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

구강 임질 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구강 임질은 성적인 접촉 후에 발생하며 주로 목에 통증이 생기는 것이 특징입니다. 그러나 콧물을 동반한 목감기 이후에 목 통증이 발생한 경우 단순한 바이러스 감염이나 감기일 가능성이 높습니다. 구강 임질은 일반적으로 콧물 같은 증상을 동반하지 않습니다. 만약 성적인 접촉 후 목 통증이 지속된다면 구강 임질을 의심해 볼 수는 있습니다.

편평사마귀는 치료를 어떻게하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로 대략 구분이 가능하지만 구분이 어렵다면 조직검사를 하게 되고 편평사마귀도 레이저 등으로 제거할 수 있습니다.

이럴때는 혈당을 어느 시점에서 측정해야 하는지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식후 혈당 체크의 의미는 식사후 인슐린 분비능 혈당조절력을 보고자 함인 것이기에 언제 몇시가 중요한 것이 아니라 식사 음식의 섭취 하나하나를 다 그 기준으로 보아야만 합니다

이 약들을 먹고 지능저하가 일어날수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련없을 것 같습니다 진료 받으신 병원에 방문하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

가는변 관련해서 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장 내시경상 이상 소견이 없다면 구조적인 문제가 아니라 단순 변비로 인해 가는변이 나오는 것으로 변비에 대한 약물 치료가 필요합니다.

성기 상처의 세균 감염이 팔꿈치에 발생한 염증에 영향을 줄 수 도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 상담은 해보श्य. 하지만 3달전에 있었던 성기 상처 염증이 시간이 지난 지금 팔꿈치 염증에 영향을 주지는 않습니다

초음파 검사관련해서질문드려요 궁금해서질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사나 소변검사는 검체를 처리하여 결과가 나올 때까지 수일 이상 소요되지만 초음파는 실시간으로 영상을 확인하는 검사이기 때문입니다.

소변스틱 검사 아질산염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 없다고 하면 일단은 약물복용 같은 치료 없이 증상이 어떻게 변하는지 경과를 지켜보시는 것을 권합니다. 질염약 먹은것과는 연관은 적어보입니다

목에 가시 걸린 듯한 느낌이 들어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지속적으로 증상이 있다면 내시경 검사를 하여 식도 손상 여부를 확인하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

왼쪽 검지 발가락 일부분이 누르면 찌릿합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경미한 연조직염 가능성이 있습니다. 통증이 지속된다면 단기간 경구 항생제 복용이 도움이 됩니다. 증상이 악화되면 진료를 보시기 바랍니다.

가족력 유전 관련해서질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그렇다고 생각됩니다. 혹시라도 이해가 가지 않거나 의심되는 부분은 어떤것이 있는지 말씀해주시면 답변드리겠습니다

아..그럼 통증 부위를 자극해서 통증이 있는걸까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 강도가 좀 강해서 그랬던것 같습니다. 강도를 낮추어서 통증도 좀 줄어 들었나요? 시간이 지나면서 점점 더 좋아지실 것으로 생각합니다

단식 후 숙변 색깔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇다고 보시면될것 같습니다. 대변새깔만으로 대장암이나 위암을 의심하는 것은 무리가 있다고 판단됩니다. 일반적으로 초록변은 대변통과시간이 짧은경우에 나타납니다

단식 후 숙변 색깔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그렇다고 보시면될것 같습니다. 대변새깔만으로 대장암이나 위암을 의심하는 것은 무리가 있다고 판단됩니다. 일반적으로 초록변은 대변통과시간이 짧은경우에 나타납니다

부적절한 질문으로 게시가 중단됩니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병에 걸릴 확률은 어느 정도인지 수치로 표현하기는 어렵지만 일단 있을 수 있습니다. 상대방이 성병을 가지고 있는지 아닌지 알수 없기 때문에 답변은 어렵습니다

VOCs 가스가 탈모나 두피염을 유발할 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가능성은 좀 떨어진다고 생각합니다. 어떤 voc가스에 얼마나 많은양에 얼마나 오래동안 노출되었는지에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 원인은 알기 어렵습니다

속이 누런 메모리폼 베게 커버없이 사용했는데 탈모나 두피염 생기나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 답변은 어렵습니다. 메모리폼 베게를 사용하지 않고 탈모나 두피염이 없어지면 메모리폼 베게 때문이라고 볼수 있습니다. 그렇지 않으면 가능성이 많이 떨어집니다

피검사 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리혈이 많거나 채식위주의 식사를 하는 경우에 나타날 수 있습니다. 철분약을 꾸준히 드시면 일반적으로 회복됩니다. 잘안되면 철분주사 투여 고려 할 수 있습니다

가슴 중앙 위쪽 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 너무 예민하시거나 증상에 대한 과도한 관심 걱정 불안증상으로 인한것 같습니다. 계속되면 진료 받아보셔요. 규칙적인 운동을 권해드립니다

숨이 잘 안 쉬어집니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 스트레스나 과도한 걱정이나 불안 증상 같은 것은 없나요? 만약 그렇다고 하면 심리적인 이유 때문에 나타나는 증상이 아닌가 의심해볼 수 있습니다

초음파 물리치료 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 외상에 의한 증상이라면 일반적으로 23주 정도 지속될 수 있습니다. 증상이 호전되지 않는다면 다시 한번 진료 권유합니다

초음파 물리 치료 중 통증...,안녕하세요 초음파치료는 높은 주파수를 이용하여 심부 몸속 깊숙히 있는 근육에 열을 전달해주는 치료입니다. 관절구축 및 유착방지 관절강직감소 통증완화 골절치유 염증회복 살균 효과가 있습니다. 누르면서 통증부위를 자극할 수 있습니다. 건승하세요

가래 색 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 음식을 섭취한 직후에 뱉어내는 가래는 드신 음식의 색에 따라 변화할 수 있습니다. 가래에 섞여들어갈 수 있기 때문입니다. 다만 이러한 가래의 색 변화가 지속적으로 관찰된다면 음식과 관계없는 가래의 색이라 볼 수 있습니다.

물마실때 목에 걸리는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식 후 속이 더부룩하고 트림이 많이 나는 것은 소화 불량이나 일시적인 위장 장애일 가능성이 큽니다. 현재는 증상이 거의 사라졌지만 물을 마실 때 목에 걸리고 트림이 나는 느낌이 지속된다면 역류성 식도염의 초기 증상일 수 있습니다. 생활에 큰 지장이 없더라도 증상이 계속되거나 악화되면 병원을 방문하여

정확한 진단을 받는 것이 좋습니다.

배란기 갈색냉 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리주기 중간 즈음에 반복되는 출혈 및 통증이라는 증상은 문의하신 내용처럼 배란통일 가능성이 높아 보이나 정확한 것은 전문의의 초음파 검사를 통해 자궁내막질환이나 자궁용종과 같은 다른 이유들이 배제되어야 합니다. 다른 문제들이 없고 주기적으로 배란기 즈음의 출혈과 통증반복이라고 진단된다면 그 불편감이 일상생활에 어느정도의 영향을 주는지에 따라 배란을 일정기간 억제하거나 다른 호르몬 보조치료가 필요할지 전문의 상담을 통해 증상완화 또는 치료를 하실 수 있습니다. 배란호르몬 주기 변화에 따른 증상들인 경우이므로 배란을 억제하기 위한 경구피임약 진통제 등이 도움되기도 합니다. 가까운 시기에 산부인과 진료를 보신 후 정확한 설명을 듣기 바랍니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

정신과 약 관련 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 항우울제와 항불안제 같은 약물은 사람마다 부작용이 다르게 나타나는 경우가 흔합니다. 이는 각 개인의 유전적 차이 대사 속도 기존 건강 상태 그리고 다른 복용 중인 약물들과의 상호작용 등에 따라 달라집니다. 어떤 사람은 약물이 잘 맞아 증상이 개선되지만 다른 사람은 구역질 구토 불면증 등의 부작용을 경험할 수 있습니다. 개인별로 약물에 대한 반응이 다르기 때문에 처방한 의사와의 상담을 통해 적절한 약물과 용량을 찾는 것이 중요합니다.

왼쪽 검지 발가락 일부분이 누르면 찌릿합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경미한 연조직염 가능성이 있습니다. 통증이 지속된다면 단기간 경구 항생제 복용이 도움이 됩니다. 증상이 악화되면 진료를 보시기 바랍니다.

피검사 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리혈이 많거나 채식위주의 식사를 하는 경우에 나타날 수 있습니다. 철분약을 꾸준히 드시면 일반적으로 회복됩니다. 잘안되면 철분주사 투여 고려 할 수 있습니다

엑스레이와 시티촬영을 연달아서 해도 괜찮을까요,안녕하세요 저선량 나선형 CT는 기존 CT에 비해 방사선 조사량을 16으로 줄이면서도 검사결과는 비슷한 결과를 얻을 수 있는 검사법입니다. 일반적으로 흉부 X선은 평균 방사선량이 0.1mSv 저선량 폐 CT 2mSv 자연 방사선량은 연량 평균 2.4mSv입니다. 건승하세요

갈비뼈 튀어나옴 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 딱히 크게 문제되는 상황은 아닐 듯합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 흉부외과 진료 권유합니다.

왼쪽 갈비뼈가 튀어 나와 있습니다,안녕하세요 요약 1. 갈비뼈 양측 비대칭은 정상 변이입니다. 2. 통증 발적 종창이 있지 않으면 의미를 부여할 이유도 없고 3. 입체적으로 갈비뼈의 모양을 확인하고 싶으면 4. 흉부외과에서 3D CT를 찍으면 모양은 확인할 수 있습니다. 건승하세요

성병 가능성 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 가능성은 없어 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

이 약들을 먹고 배에 복수가 찰수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물의 부작용으로 복수가 찰 가능성은 매우 낮습니다. 체내 수분이 저류되는 경우 팔다리나 얼굴이 붓는 증상이 나타날 수는 있어도 복수가 차기는 어렵습니다. 복수는 간경화가 심하게 진행되어 혈중 알부민 수치가 낮을 때와 같은 상황에 복강에 고이기 시작합니다.

피부상태심한가려움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만성 습진으로 인해 피부 색소 침착이 동반

된 것으로 보입니다. 치료에도 호전이 없다면 상급병원 피부과 진료를 권해드립니다.

곤지름일까요?.,안녕하세요 요약 1. 곤지름은 아니고 2. 계속 퍼지는 양상이면 편평사마귀인지 구별해 봐야 합니다. 오돌토돌 몸에 돌아나는 작은 돌기같은 편평사마귀는 편평한 모양으로 튀어나와 있으면서 다발성으로 발생합니다. 5mm미만의 작은 크기와 다발성으로 번지면서 가슴과 배 쪽으로 내려오기도 하고 등이나 어깨 팔 다리로 번질 수도 있습니다. 건승하세요

구강 임질 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구강 임질은 성적인 접촉 후에 발생하며 주로 목에 통증이 생기는 것이 특징입니다. 그러나 콧물을 동반한 목감기 이후에 목 통증이 발생한 경우 단순한 바이러스 감염이나 감기일 가능성이 높습니다. 구강 임질은 일반적으로 콧물 같은 증상을 동반하지 않습니다. 만약 성적인 접촉 후 목 통증이 지속된다면 구강 임질을 의심해 볼 수는 있습니다.

편평사마귀는 치료를 어떻게하나요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로 대략 구분이 가능하지만 구분이 어렵다면 조직검사를 하게 되고 편평사마귀도 레이저 등으로 제거할 수 있습니다.

사랑니 꼭 뽑아야 할까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이번주에 아래 사랑니를 뽑았는데 진짜 너무 아팠어서 위 사랑니 뽑기가 싫어졌어요 이거 꼭 뽑아야 하나요? 또 괜히 찾아보다가 상악동 천공 생길수도 있다는 글을 봤어요 치과에서는 아래 신경만 말씀하시고 상악동 천공은 말씀 안해주셨는데 저는 해당사항이 아니라서 그런걸까요? 엑스레이 사진이 흐릿해 정확히 판단하기가 어렵습니다 씨티를 찍어보시면 더 정확한 상태를 알 수 있을 듯 하네요

귀두 끝 붉은 발진 및 요도 끝 작열감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의심스러운 관계를 하고 귀두 끝 발진이 생겼군요. 포비아가 와서 그런가 너무 두렵군요. 크게 걱정하지 마시고 검사 받으신 병원 주치의와 정확한 상담을 받도록 하십시오.

초음파 물리치료 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 외상에 의한 증상이라면 일반적으로 23주 정도 지속될 수 있습니다. 증상이 호전되지 않는다면 다시 한번 진료 권유합니다

초음파 치료 후 통증 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외 충격파 치료시 손상 부위에 통증은 흔하게 나타납니다. 하지만 통증이 심하다면 강도를 조절해야 하므로 치료사에게 이야기하기 바랍니다.

초음파 치료 후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외 충격파 치료시 손상 부위에 통증은 흔하게 나타납니다. 하지만 통증이 심하다면 강도를 조절해야 하므로 치료사에게 이야기하기 바랍니다.

목에 가시 걸린 듯한 느낌이 들어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지속적으로 증상이 있다면 내시경 검사를 하여 식도 손상 여부를 확인하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이럴때는 혈당을 어느 시점에서 측정해야 하는지요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식후 혈당 체크의 의미는 식사후 인슐린 분비능 혈당조절력을 보고자 함인 것이기에 언제 몇시가 중요한 것이 아니라 식사 음식의 섭취 하나하나를 다 그 기준으로 보아야만 합니다

초음파 검사관련해서질문드려요 궁금해서질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사나 소변검사는 검체를 처리하여 결과가 나올 때까지 수일 이상 소요되지만 초음파는 실시간으로 영상을 확인하는 검사이기 때문입니다.

왼팔 안쪽에 통증이 있는데 심장질환 연관통일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼팔이 아프다는 증상만으로 심장 질환만을 의심하지는 않습니다. 경추부 문제에 의한 증상일 수도 있

고 다양한 원인들이 있습니다

아무런 외상없이 Crps가 올 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 호전되었다면 CRPS 가능성은 매우 낮으며 외상 없이도 CRPS가 발생하는 경우도 있습니다. 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이 약들을 먹고 지능저하가 일어날수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련없을 것 같습니다 진료 받으신 병원에 방문하시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

가는변 관련해서 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장 내시경상 이상 소견이 없다면 구조적인 문제가 아니라 단순 변비로 인해 가는변이 나오는 것으로 변비에 대한 약물 치료가 필요합니다.

임신준비를 위한 휴약기간 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의주신 약제들은 보통 하루 2회 복용 즉 12시간마다 복용을 추천받는 약입니다. 복용약제 반감기는 24시간 미만 보통은 1620시간으로 알려진 약제들입니다.으로 여유있게 1주일이면 체내에서 충분히 대사가 가능합니다. 텍사메타손주사의 반감기는 최대 3일정도로 긴 편이므로 주사제는 최대 23주면 체내에서 사라집니다. 임신을 준비하고 있으므로 지금부터 꾸준히 엽산제를 복용하면서 피부염으로 인해 복용중이거나 주사중인 피부염 치료를 완전히 중단하고 최소 1개월정도의 휴약기를 가진다면 안전한 임신준비가 될 것 같습니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

숨이 잘 안 쉬어집니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 스트레스나 과도한 걱정이나 불안 증상 같은 것은 없나요? 만약 그렇다고 하면 심리적인 이유 때문에 나타나는 증상이 아닌가 의심해볼 수 있습니다

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품을 사용하고 피부에 문제가 발생하지 않는다면 지속적으로 사용해도 됩니다. 사용 전에 적합한지 알 수는 없습니다.

임신준비를 위한 휴약기간 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의주신 약제들은 보통 하루 2회 복용 즉 12시간마다 복용을 추천받는 약입니다. 복용약제 반감기는 24시간 미만 보통은 1620시간으로 알려진 약제들입니다.으로 여유있게 1주일이면 체내에서 충분히 대사가 가능합니다. 텍사메타손주사의 반감기는 최대 3일정도로 긴 편이므로 주사제는 최대 23주면 체내에서 사라집니다. 임신을 준비하고 있으므로 지금부터 꾸준히 엽산제를 복용하면서 피부염으로 인해 복용중이거나 주사중인 피부염 치료를 완전히 중단하고 최소 1개월정도의 휴약기를 가진다면 안전한 임신준비가 될 것 같습니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

배란기 갈색냉 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리주기 중간 즈음에 반복되는 출혈 및 통증이라는 증상은 문의주신 내용처럼 배란통일 가능성이 높아 보이나 정확한 것은 전문의의 초음파 검사를 통해 자궁내막질환이나 자궁용종과 같은 다른 이유들이 배제되어야 합니다. 다른 문제들이 없고 주기적으로 배란기 즈음의 출혈과 통증반복이라고 진단된다면 그 불편감이 일상생활에 어느정도의 영향을 주는지에 따라 배란을 일정기간 억제하거나 다른 호르몬 보조치료가 필요할지 전문의 상담을 통해 증상완화 또는 치료를 하실 수 있습니다. 배란호르몬 주기 변화에 따른 증상들인 경우이므로 배란을 억제하기 위한 경구피임약 진통제 등이 도움되기도 합니다. 가까운 시기에 산부인과 진료를 보신 후 정확한 설명을 듣기 바랍니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

예방접종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의주신 내용상 1차 접종효과가 아예 없어서 다시 1

차부터 맞아야 하는 것은 아니므로 너무 걱정하지 마시고 7월21일과 11월 21일 2차 3차의 예방접종 스케줄을 잘 지켜 접종 마무리하시면 되겠습니다. 일반적으로 고용량 스테로이드 prednisone 기준 20 mg일 또는 2 mg/kg일 이상을 장기간14일 이상 사용한 경우 T세포 기능에 영향을 미쳐 백신 효능이 감소할 수 있다고 알려져 있으나 문의상 위 상황에 해당되는 것은 아닌 것으로 보이므로 예정대로 접종 하시기 바랍니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

성병 가능성 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 가능성은 없어 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

변상권 선생님 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 네 2. 네 없을 가능성이 높아 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

가래 색 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음식을 섭취한 직후에 뱉어내는 가래는 드신 음식의 색에 따라 변화할 수 있습니다. 가래에 섞여들어갈 수 있기 때문입니다. 다만 이러한 가래의 색 변화가 지속적으로 관찰된다면 음식과 관계없는 가래의 색이라 볼 수 있습니다.

물마실때 목에 걸리는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식 후 속이 더부룩하고 트림이 많이 나는 것은 소화 불량이나 일시적인 위장 장애일 가능성이 큼니다. 현재는 증상이 거의 사라졌지만 물을 마실 때 목에 걸리고 트림이 나는 느낌이 지속된다면 역류성 식도염의 초기 증상일 수 있습니다. 생활에 큰 지장이 없더라도 증상이 계속되거나 악화되면 병원을 방문하여 정확한 진단을 받는 것이 좋습니다.

간식 먹고 가글,요약 1. 안하는 거 보단 낫지만 2. 양치를 대신하진 못합니다. 구강청결제는 가글 형식이라 치아 표면에 붙어있는 치태를 제거하는 효과는 칫솔질에 비해 현저히 떨어지며 치아와 잇몸에 안 좋은 영향을 주는 세균이나 기타 음식물들은 치아와 잇몸에 강하게 붙어있기 때문에 양치대신 가글만으로 칫솔질의 효과를 보기는 어렵습니다. 건승하세요.

정신과 약 관련 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 항우울제와 항불안제 같은 약물은 사람마다 부작용이 다르게 나타나는 경우가 흔합니다. 이는 각 개인의 유전적 차이 대사 속도 기존 건강 상태 그리고 다른 복용 중인 약물들과의 상호작용 등에 따라 달라집니다. 어떤 사람은 약물이 잘 맞아 증상이 개선되지만 다른 사람은 구역질 구토 불면증 등의 부작용을 경험할 수 있습니다. 개인별로 약물에 대한 반응이 다르기 때문에 처방한 의사와의 상담을 통해 적절한 약물과 용량을 찾는 것이 중요합니다.

배란기 갈색냉 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리주기 중간 즈음에 반복되는 출혈 및 통증이라는 증상은 문의주신 내용처럼 배란통일 가능성이 높아 보이나 정확한 것은 전문의의 초음파 검사를 통해 자궁내막질환이나 자궁용종과 같은 다른 이유들이 배제되어야 합니다. 다른 문제들이 없고 주기적으로 배란기 즈음의 출혈과 통증반복이라고 진단된다면 그 불편감이 일상생활에 어느정도의 영향을 주는지에 따라 배란을 일정기간 억제하거나 다른 호르몬 보조치료가 필요할지 전문의 상담을 통해 증상완화 또는 치료를 하실 수 있습니다. 배란호르몬 주기 변화에 따른 증상들인 경우이므로 배란을 억제하기 위한 경구피임약 진통제 등이 도움되기도 합니다. 가까운 시기에 산부인과 진료를 보신 후 정확한 설명을 듣기 바랍니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

성병 가능성 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기

어려우나 가능성은 없어 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

이 약들을 먹고 배에 복수가 찰수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물의 부작용으로 복수가 찰 가능성은 매우 낮습니다. 체내 수분이 저류되는 경우 팔다리나 얼굴이 붓는 증상이 나타날 수는 있어도 복수가 차기는 어렵습니다. 복수는 간경화가 심하게 진행되어 혈중 알부민 수치가 낮을 때와 같은 상황에 복강에 고이기 시작합니다.

비염 가래 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만성 비염과 인후염이 동시에 있을 때 콧물이 목으로 넘어가 가래에 섞일 수 있습니다. 투명한 점액 사이에 초록 노란색 덩어리가 있는 것은 콧물이 목으로 넘어와서 가래에 섞이는 현상일 가능성이 큼니다. 인후염이 있을 때도 염증으로 인해 가래가 더 끈적하고 색이 변할 수 있습니다.

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품을 사용하고 피부에 문제가 발생하지 않는다면 지속적으로 사용해도 됩니다. 사용 전에 적합한지 알 수는 없습니다.

남성 호르몬 lh와 fsh 수치가 높음 testosterone 수치 정상,안녕하세요 요약 1. FSH와 LH는 남성에서는 정소기능부전증의 검사에 이용됩니다. 2. 테스토스테론이 정상이면 수개월 후 재검하여 추이를 보면 됩니다. 3. 테스토스테론까지 감소되었으면 남성 성선기능저하로 갱년기에 접어드는 단계입니다. FSH와 LH는 난소에서 난포발육과 성숙 배란 황체화 황체 퇴축 등 일련의 난소주기를 조절하고 있으며 FSH는 주로 난포발육에 관여하고 LH는 배란과 황체화에 관여하는 호르몬입니다. 여성에서는 배란 장애 남성에서는 정소기능부전증의 검사에 이용됩니다. 남성 정상치 LH 318 mIU/mL FSH 318 mIU/mL 건승하세요

엑스레이와 시티촬영을 연달아서 해도 괜찮을까요,안녕하세요 저선량 나선형 CT는 기존 CT에 비해 방사선 조사량을 16으로 줄이면서도 검사결과는 비슷한 결과를 얻을 수 있는 검사법입니다. 일반적으로 흉부 X선은 평균 방사선량이 0.1mSv 저선량 폐 CT 2mSv 자연 방사선량은 연량 평균 2.4mSv입니다. 건승하세요

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품을 사용하고 피부에 문제가 발생하지 않는다면 지속적으로 사용해도 됩니다. 사용 전에 적합한지 알 수는 없습니다.

안녕하세요 제가 궁금한 것에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품을 사용하고 피부에 문제가 발생하지 않는다면 지속적으로 사용해도 됩니다. 사용 전에 적합한지 알 수는 없습니다.

구강 임질 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구강 임질은 성적인 접촉 후에 발생하며 주로 목에 통증이 생기는 것이 특징입니다. 그러나 콧물을 동반한 목감기 이후에 목통증이 발생한 경우 단순한 바이러스 감염이나 감기일 가능성이 높습니다. 구강 임질은 일반적으로 콧물 같은 증상을 동반하지 않습니다. 만약 성적인 접촉 후 목통증이 지속된다면 구강 임질을 의심해 볼 수는 있습니다.

안과 관련 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 망막에 혈관 종양이 있고 뇌 혈관에는 이상이 없다면 와이번 메이슨 증후군WyburnMason Syndrome일 가능성은 낮습니다. 이 증후군은 눈과 뇌 모두에 혈관 기형이 존재하는 경우가 일반적입니다. 그러니 정확한 병명을 확인하기 위해서는 당시 진료본 의사에게 직접 문의해보시는게 가장 정확합니다.

곤지름일까요??.안녕하세요 요약 1. 곤지름은 아니고 2. 계속 퍼지는 양상이면 편평사마귀인지 구별해 봐야 할겁니다. 오돌토돌 몸에 돌아나는 작은 돌기같은 편평사마귀는 편평한 모

양으로 튀어나와 있으면서 다발성으로 발생합니다. 5mm미만의 작은 크기와 다발성으로 번지면서 가슴과 배 쪽으로 내려오기도 하고 등이나 어깨 팔 다리로 번질 수도 있습니다. 건승하세요

구강 임질 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구강 임질은 성적인 접촉 후에 발생하며 주로 목에 통증이 생기는 것이 특징입니다. 그러나 콧물을 동반한 목감기 이후에 목 통증이 발생한 경우 단순한 바이러스 감염이나 감기일 가능성이 높습니다. 구강 임질은 일반적으로 콧물 같은 증상을 동반하지 않습니다. 만약 성적인 접촉 후 목 통증이 지속된다면 구강 임질을 의심해 볼 수는 있습니다.

성병 가능성 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 가능성은 없어 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

유방암 의심 진단,안녕하세요. 메디이즈입니다. 0.5cm이라면 못할 것은 없습니다만 초음파를 보기 전에는 저도 모르겠네요. 어차피 지금 상황에서 대학병원진료는 무리이실 것 같고 만약 불안하시면 다른 병원 가서서 조직검사 해보시기 바랍니다. 만약 유방암이라 했을 때 초음파에서 보이는게 다가 아니기 때문에 이 정보만으로 0기나 1기라고 말씀드릴 수는 없습니다만 그럴 가능성이 높겠지요. 지식인에 질문 주신 분 같은데 수술 당일이나 다음날 출근은 불가능합니다. 보통 수술 후 12일 정도는 입원하는 것이 기본이고 전절제를 하셨을 때 재건을 같이 하실 경우 입원 기간은 2주 정도까지 길어질 수 있습니다. 감사합니다.

편도염 편도결석 관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하얗고 노란색 같은 것들은 편도염으로 인해 발생한 삼출물로 편도염이 호전되면 사라지게 됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

예방접종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의주신 내용상 1차 접종효과가 아예 없어서 다시 1차부터 맞아야 하는 것은 아니므로 너무 걱정하지 마시고 7월21일과 11월 21일 2차 3차의 예방접종 스케줄을 잘 지켜 접종 마무리하시면 되겠습니다. 일반적으로 고용량 스테로이드 prednisone 기준 20 mg일 또는 2 mgkg일 이상을 장기간14일 이상 사용한 경우 T세포 기능에 영향을 미쳐 백신 효능이 감소할 수 있다고 알려져 있으나 문의상 위 상황에 해당되는 것은 아닌 것으로 보이므로 예정대로 접종 하시기 바랍니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

뇌 ct 한번만 봐주세요 ,안녕하세요 요약 해면상 혈관종은 중추신경계 혈관 기형의 510 정도의 혈관 기형 일종입니다. 중추 신경계 혈관 기형의 일종으로 동정맥 기형 다음으로 많은 혈관 기형입니다. 병변 내의 반복적인 미세 출혈로 점차 크기가 커지면 종괴 효과로 뇌신경 장애가 일어날 수 있습니다. 건승하세요

초음파 물리 치료 중 통증...,안녕하세요 초음파치료는 높은 주파수를 이용하여 심부 몸속 깊숙히 있는 근육에 열을 전달해주는 치료입니다. 관절구축 및 유착방지 관절강직감소 통증완화 골절치유 염증회복 살균 효과가 있습니다. 누르면서 통증부위를 자극할 수 있습니다. 건승하세요

간식 먹고 가글,요약 1. 안하는 거 보단 낫지만 2. 양치를 대신하진 못합니다. 구강청결제는 가글 형식이라 치아 표면에 붙어있는 치태를 제거하는 효과는 칫솔질에 비해 현저히 떨어지며 치아와 잇몸에 안 좋은 영향을 주는 세균이나 기타 음식물들은 치아와 잇몸에 강하게 붙어있기 때문에 양치대신 가글만으로 칫솔질의 효과를 보기는 어렵습니다. 건승하세요.

치루수술 한달차. 블랙헤드같은 피지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 수술후 상태는 좋은것

으로 생각됩니다. 이제 진료 받으실때가 다 되어가시는 것 같은데 진찰 받으면서 확인해보시는 것을 권합니다

부정맥 있을때 스트레스 받으면 갑자기 심박수가 올라갈 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스를 받으면 교감 신경이 항진되어 심박수가 증가할 수 있습니다. 하지만 증상이 반복된다면 진료를 보시기 바랍니다.

남자 성기 붉은점 생김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 궤양의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

피곤하면 귀 먹먹해지는 이유,안녕하세요 요약 1. 이관기능장애입니다. 2. 지속되면 합병증이 생기므로 검사와 치료를 해야 합니다. 침을 삼킬 때 하품이나 트림을 할 때 귀가 먹먹해지고 자신의 숨소리나 목소리까지 들려 괴로운 질환인 이관기능장애입니다. 높은 산에 오르거나 비행기를 탔을 때 귀가 먹먹하거나 답답한 느낌을 겪어본 적이 있으실텐데 이런 증상이 사라지지 않고 1주일 이상 지속되고 쉬이 사라졌다가 반복해서 나타난다면 이관기능장애가 있는지 확인해 봐야합니다. 코와 귀의 기압을 조절하는 이관은 비인강콧구멍 속과 중이강고막 안쪽의 공간을 연결해 주는 통로인데 비염 부비동염 알레르기 비염 등이 원인으로 발현되고 이관기능장애가 지속되면 중이염이 동반되기도 합니다. 중이염이 있는지 기존 증상도 같이 치료해야 좋아질겁니다. 건승하세요

왼쪽 갈비뼈가 튀어 나와 있습니다,안녕하세요 요약 1. 갈비뼈 양측 비대칭은 정상 변이입니다. 2. 통증 발작 증창이 있지 않으면 의미를 부여할 이유도 없고 3. 입체적으로 갈비뼈의 모양을 확인하고 싶으면 4. 흉부외과에서 3D CT를 찍으면 모양은 확인할 수 있습니다. 건승하세요

갈비뼈 튀어나옴 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 딱히 크게 문제되는 상황은 아닐 듯합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 흉부외과 진료 권유합니다.

갈비뼈 튀어나옴 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 딱히 크게 문제되는 상황은 아닐 듯합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 흉부외과 진료 권유합니다.

원인 불명 몸살,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은 여성분인것으로 보아 호르몬 주기에 따라 나타나는 증상일 가능성도 있을듯합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 병원 진료 권유합니다.

토했는데 개불같은 조각들이 나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 술이 좀 과하셨던 것이 아닌가 싶습니다. 정확하게 무엇인지는 알수 없지만 토하기전에 드신 음식물일 것으로 생각됩니다

왼쪽 목근육 뻣뻣하고 뭉친 느낌.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임상적으로 문제가 될것 같지는 않습니다. 목빗근이 긴장되면 두경부에 통증을 유발할 수 있습니다. 가정의학과 진료 받아 보세요

목 가래가 끼요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼마나 오래되셨나요? 가래를 뱉으면 나오나요? 아니면 걸린 느낌만 있으신가요? 약을 복용하면서 증상이 좋아지면 수술을 할 필요는 없어보입니다

피부 착색,안녕하세요. 메디이즈입니다. 샤워를 하지못했다고 해서 색소침착이 생기는 것은 아닐 것으로 생각됩니다. 흑색가시세포증이 원래 부터 있었던것이 아닌가 싶습니다.

손 붓기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 큰 문제는 없을 것으로 생각합니다. 보통 클라이밍을 하고 난 다음과는 큰 차이가 있나요? 안하다가 갑자기 하셔서 그러실 수 있습니다 성기에 점이 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 단순 모반으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

타박상 후 물리치료 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외 충격파 치료를 받은 것으로 생각되는데 치료 과정에서 통증이 유발될 수 있습니다. 하지만 통증이 심하다면 조절이 필요합니다.

엑스레이와 시티촬영을 연달아서 해도 괜찮을까요,안녕하세요 저선량 나선형 CT는 기존 CT에 비해 방사선 조사량을 16으로 줄이면서도 검사결과는 비슷한 결과를 얻을 수 있는 검사법입니다. 일반적으로 흉부 X선은 평균 방사선량이 0.1mSv 저선량 폐 CT 2mSv 자연 방사선량은 연평균 2.4mSv입니다. 건승하세요

남자 성기 붉은점 생김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 궤양의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

성병관련 문의사진 포함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

음경 안쪽 표면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 포다이스반 등 다양한 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

브라질리언 왁싱 후 갈색 원 멍든건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 오전에 브라질리언 왁싱 후 집에와서 보니 갈색원들이 있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

엉덩이 부근에 통증이 있습니다,안녕하세요 요약 천장관절증후군인지 확인이 필요합니다. 꼬리뼈인 천골과 엉덩이 뼈인 장골이 연결되는 부위에 염증이 생기는 질환인데 골반에 직접적인 충격을 주는 외상이나 교통사고 잘못된 자세 등에 의해 발생합니다. 증상으로는 엉덩이 허벅지에 통증이 발생하는 경우 통증으로 인해 양반다리 자세가 불편한 경우 다리가 당기거나 감각이상 화끈거림 등이 나타나는 경우 방치할 경우 골관절염 골반 내 불안정성 강직성 척추염이 발생할 수 있어 빠른 진료와 치료가 필요합니다. 다른 병원으로 가보세요 건승하세요

남자 성기 붉은점 생김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 궤양의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

성병관련 문의사진 포함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

음경 안쪽 표면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 포다이스반 등 다양한 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

브라질리언 왁싱 후 갈색 원 멍든건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 오전에 브라질리

언 의심 후 집에와서 보니 갈색원들이 있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받으록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

엉덩이 부근에 통증이 있습니다.안녕하세요 요약 천장관절증후군인지 확인이 필요합니다. 꼬리뼈인 천골과 엉덩이 뼈인 장골이 연결되는 부위에 염증이 생기는 질환인데 골반에 직접적인 충격을 주는 외상이나 교통사고 잘못된 자세 등에 의해 발생합니다. 증상으로는 엉덩이 허벅지에 통증이 발생하는 경우 통증으로 인해 양반다리 자세가 불편한 경우 다리가 당기거나 감각이상 화끈거림 등이 나타나는 경우 방치할 경우 골관절염 골반 내 불안정성 강직성 척추염이 발생할 수 있어 빠른 진료와 치료가 필요합니다. 다른 병원으로 가보세요 건승하세요 기립성빈맥,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기립성빈맥은 자율신경실조증의 증상 중 하나입니다. 자율신경실조증은 자율신경계의 기능이 저하되어 발생하는 질환으로 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 기립성빈맥은 눕거나 앉아 있을 때는 정상적인 심박수를 유지하다가 일어서면 심박수가 갑자기 증가하는 증상입니다. 기립성빈맥은 어지럼증 두통 실신 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 기립성빈맥의 치료에는 혈압을 낮추는 약물과 교감신경을 억제하는 약물이 사용됩니다. 혈압을 낮추는 약물로는 칼슘채널차단제 베타차단제 등이 사용되고 교감신경을 억제하는 약물로는 메토프롤롤 프로프라놀롤 등이 사용됩니다. 알프졸람과 인놀은 기립성빈맥의 치료에 효과가 없는 것으로 알려져 있습니다. 기립성빈맥의 치료에는 혈압을 낮추는 약물과 교감신경을 억제하는 약물이 사용되므로 알프라람과 인놀을 먹어도 효과가 없는 경우 다른 약물을 사용해야 합니다. 기립성빈맥은 심각한 합병증을 유발할 수 있으므로 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 진료를 받아야 합니다.

별 쏘인곳 두드리기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알러지 반응이 발생하면 12주간 재발이 반복될 수 있어 꾸준히 약물 치료를 하고 완전히 호전되면 중단하는 것을 권합니다.

이게 뭘까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원으로 오세요 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 건승하세요

문제있는 점인가요?,안녕하세요 요약 1. 아래 증상들과 비교해 보세요 2. 동일한 점 내부에 서로 다른 피부 색깔과 색조가 있으면 문제가 될 수 있습니다. 악성 흑색종의 증상은 다음과 같습니다. 비대칭 경계 불규칙성 동일한 점 내부에 서로 다른 피부 색깔과 색조가 나타남 6mm보다 큰연필지우개보다 큰 지름 점의 크기 증가 건승하세요

일반 개인병원은 피부암 진찰이 불가한가요?,안녕하세요 요약 1. 조직검사를 하려면 2차 병원이나 종합병원 급 이상에서 해 줄겁니다. 2. 근처 피부과 의원에 전화로 문의해 보세요 3. 조직검사가 필요하면 가능한지. 가능하면 거기로 가보세요 4. 조직검사가 확진검사입니다. 건승하세요

안녕하세요 제가 궁금한 것들에 답변 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 제품이 현재 피부에 맞지 않을지는 실제 사용해서 부작용이 나타나지 않는지를 확인해야 가능합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

삐소리와 동시에 3초 동안 소리가 잘 안들려요,안녕하세요 요약 1. 돌발성 난청도 언급한 증상이 생깁니다. 2. 병원에서 원인 확인 및 치료를 병행해야 할겁니다. 돌발성 난청은 특별한 원인 없이 수시간에서 23일 이내에 갑자기 감각신경성 난청이 발생하는 경우입니다. 갑자기 귀에서 이명이 들리거나 먹먹해지면서 안들리는 경우 빨리 치료해야 회복될 가능성이 높기

때문에 즉시 이비인후과에서 검사가 필요한 귀의 응급질환 중 하나입니다. 건승하세요

부정맥 있을때 스트레스 받으면 갑자기 심박수가 올라갈 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스를 받으면 교감 신경이 항진되어 심박수가 증가할 수 있습니다. 하지만 증상이 반복된다면 진료를 보시기 바랍니다.

15일 뒤 얼리임신테스트기 저녁소변,안녕하세요 얼리 임신테스트기의 경우 수정 후 79일이면 소변 검사로 임신을 확인할 수 있으며 정확도는 95이상입니다. 임신 초반에는 임신테스트기에서 음성이 나올 가능성도 있지만 일반 임신 테스트기 보다 1주일 정도 먼저 임신 사실을 알 수 있게 됩니다. 건승하세요

피나스테리드 복용량과 DHT 혈중농도의 상관관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈모약을 복용하여 DHT 농도를 일반인과 같은 수준으로 맞추면 탈모 치료효과는 없을 것으로 생각됩니다. 피스테리드가 뇌에 부정적인 영향을 줄것 같지는 않으나 만약 그렇다면 중단을 고려하시는 것이 좋겠습니다

타박상 후 물리치료 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외 충격과 치료를 받은 것으로 생각되는데 치료 과정에서 통증이 유발될 수 있습니다. 하지만 통증이 심하다면 조절이 필요합니다.

토했는데 개불같은 조각들이 나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 술이 좀 과하셨던 것이 아닌가 싶습니다. 정확하게 무엇인지는 알수 없지만 토하기전에 드신 음식물일 것으로 생각됩니다

부정맥 있을때 스트레스 받으면 갑자기 심박수가 올라갈 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스를 받으면 교감 신경이 항진되어 심박수가 증가할 수 있습니다. 하지만 증상이 반복된다면 진료를 보시기 바랍니다.

타박상 후 물리치료 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외 충격과 치료를 받은 것으로 생각되는데 치료 과정에서 통증이 유발될 수 있습니다. 하지만 통증이 심하다면 조절이 필요합니다.

남자 성기 붉은점 생김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 궤양의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

피부 착색,안녕하세요. 메디이즈입니다. 샤워를 하지못했다고 해서 색소침착이 생기는 것은 아닐 것으로 생각됩니다. 흑색가시세포증이 원래 부터 있었던것이 아닌가 싶습니다.

편도염 편도결석 관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하얗고 노란색 같은 것들은 편도염으로 인해 발생한 삼출물로 편도염이 호전되면 사라지게 됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

성기에 점이 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 단순 모반으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손 붓기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다. 보통 클라이밍을 하고 난 다음과는 큰 차이가 있나요? 안하다가 갑자기 하셔서 그러실 수 있습니다

몽정후 오줌싼후에 정액이나오는데 정상인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 새벽5시쯤에 몽정을하고 처리를한뒤 일상생활을하다가 오후5시에 소변을봤는데 소변을다누고 요도쪽을 아래에서부터 살살밀어올려보니 하얀색 탁한액체가 올라왔군요. 크게 걱정하지 마시고 비뇨기과 진료를 한번 받도록 하십시오.

엉덩이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상은 좌골신경통에 의한 것으로 보입니다. 척추 디스크에 의한 신경압박때문은 아닌지 정형외과 진료 보시기 추천드립니다.

왼쪽 목근육 뻣뻣하고 뭉친 느낌.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임상적으로 문제가 될것 같지는 않습니다. 목빗근이 긴장되면 두경부에 통증을 유발할 수 있습니다. 가정의학과 진료 받아 보셔요

목 가래가 끼요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼마나 오래되셨나요? 가래를 뱉으면 나오나요? 아니면 걸린 느낌만 있으신가요? 약을 복용하면서 증상이 좋아지면 수술을 할 필요는 없어보입니다

유방암 의심 진단,안녕하세요. 메디이즈입니다. 0.5cm이라면 못할 것은 없습니다만 초음파를 보기 전에는 저도 모르겠네요. 어차피 지금 상황에서 대학병원진료는 무리이실 것 같고 만약 불안하시면 다른 병원 가서서 조직검사 해보시기 바랍니다. 만약 유방암이라 했을 때 초음파에서 보이는게 다가 아니기 때문에 이 정보만으로 0기나 1기라고 말씀드릴 수는 없습니다만 그럴 가능성이 높겠지요. 지식인에 질문 주신 분 같은데 수술 당일이나 다음날 출근은 불가능합니다. 보통 수술 후 12일 정도는 입원하는 것이 기본이고 전절제를 하셨을 때 재건을 같이 하실 경우 입원 기간은 2주 정도까지 길어질 수 있습니다. 감사합니다.

피부 착색,안녕하세요. 메디이즈입니다. 샤워를 하지못했다고 해서 색소침착이 생기는 것은 아닐 것으로 생각합니다. 흑색가시세포증이 원래 부터 있었던것이 아닌가 싶습니다.

손 붓기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 큰 문제는 없을 것으로 생각합니다. 보통 클라이밍을 하고 난 다음과는 큰 차이가 있나요? 안하다가 갑자기 하셔서 그러실 수 있습니다

치루수술 한달차. 블랙헤드같은 피지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 수술후 상태는 좋은것으로 생각합니다. 이제 진료 받으실때가 다 되어가시는 것 같은데 진찰 받으면서 확인해보시는 것을 권합니다

예방접종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의주신 내용상 1차 접종효과가 아예 없어서 다시 1차부터 맞아야 하는 것은 아니므로 너무 걱정하지 마시고 7월21일과 11월 21일 2차 3차의 예방접종 스케줄을 잘 지켜 접종 마무리하시면 되겠습니다. 일반적으로 고용량 스테로이드 prednisone 기준 20 mg일 또는 2 mgkg일 이상을 장기간14일 이상 사용한 경우 T세포 기능에 영향을 미쳐 백신 효능이 감소할 수 있다고 알려져 있으나 문의상 위 상황에 해당되는 것은 아닌 것으로 보이므로 예정대로 접종 하시기 바랍니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

갑상선암 수술 후 약복용과 당뇨,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선 호르몬 복용으로 당뇨 위험이 높아지거나 갑상선 기능항진증 저하증에 걸리지는 않습니다. 갑상선 전절제 하셨으면 갑상선 저하증이 오니 갑상선 호르몬 복용이 필요합니다

성병관련 문의사진 포함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

관계후 15일 뒤 얼리임신테스트기,안녕하세요 얼리 임신테스트기의 경우 수정 후 79일이면 소변 검사로 임신을 확인할 수 있으며 정확도는 95이상입니다. 임신 초반에는 임신테스트기에서 음성이 나올 가능성도 있지만 일반 임신 테스트기 보다 1주일 정도 먼저 임신 사실을 알 수 있게 됩니다. 건승하세요

유방암 의심 진단,안녕하세요. 메디이즈입니다. 0.5cm이라면 못할 것은 없습니다만 초음파를 보기 전에는 저도 모르겠네요. 어차피 지금 상황에서 대학병원진료는 무리이실 것 같고 만약

불안하시면 다른 병원 가서서 조직검사 해보시기 바랍니다. 만약 유방암이라 했을 때 초음파에서 보이는게 다가 아니기 때문에 이 정보만으로 0기나 1기라고 말씀드릴 수는 없습니다만 그럴 가능성이 높겠지요. 지식인에 질문 주신 분 같은데 수술 당일이나 다음날 출근은 불가능합니다. 보통 수술 후 12일 정도는 입원하는 것이 기본이고 전절제를 하셨을 때 재건을 같이 하실 경우 입원 기간은 2주 정도까지 길어질 수 있습니다. 감사합니다.

하지정맥에 혈전 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사경화요법을 하고나면 그부위 혈전이 생길 수 있습니다. 이는 치료를 위해서 일부러 혈관을 경화시키는 과정에서 생기는 것이라 너무 염려 안 하셔도 됩니다. 시간이 지나면 사라집니다. 주사경화요법을 한 자리가 아니고 다른 부위에 생긴 혈전이면 이것이 좀 더 커지는지 나중에 다시 검사를 받아보셔야 할 것 같습니다. 표재정맥에 생기는 혈전은 크게 문제가 되지 않으니 너무 걱정하실 필요는 없지만 그 부위가 붓거나 빨갛게 달아오르면 정맥염을 의심할 수 있으니 이때는 약물치료를 해야합니다. 손목 tfcc 콜라겐 주사 질문있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일반적으로는 통증이 좀 심한 주사에 속하기는 합니다. 불편감이 지속되면 처치 받은 병원에서 다시 한번 상담 받아보시길 권장 드립니다. 감사합니다.

갑상선암 수술 후 약복용과 당뇨,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선 호르몬 복용으로 당뇨 위험이 높아지거나 갑상선 기능항진증 저하증에 걸리지는 않습니다. 갑상선 전절제 하셨으면 갑상선 저하증이 오니 갑상선 호르몬 복용이 필요합니다

편도염 편도결석 관련 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하얗고 노란색 같은 것들은 편도염으로 인해 발생한 삼출물로 편도염이 호전되면 사라지게 됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

예방접종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의주신 내용상 1차 접종효과가 아예 없어서 다시 1차부터 맞아야 하는 것은 아니므로 너무 걱정하지 마시고 7월21일과 11월 21일 2차 3차의 예방접종 스케줄을 잘 지켜 접종 마무리하시면 되겠습니다. 일반적으로 고용량 스테로이드 prednisone 기준 20 mg일 또는 2 mg/kg일 이상을 장기간14일 이상 사용한 경우 T세포 기능에 영향을 미쳐 백신 효능이 감소할 수 있다고 알려져 있으나 문의상 위 상황에 해당되는 것은 아닌 것으로 보이므로 예정대로 접종 하시기 바랍니다. 문의에 참고가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

피검사 결과 간수치가 5배정도 높다고 하셨습니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 비만 말고 다른 원인 약물 바이러스간염 같은 이유는 없는 지 확인 이 필요합니다. 검사 결과에 맞추어 치료하시면 잘 좋아지실 겁니다

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요 요약 1. 기존에 편두통은 있지 않았는지 확인해 보세요 2. 일반 진통제에 반응 안하면 신경과에서 진료를 받아 보세요 3. 타이레놀은 두알이 불건 따로 들어가건 어쨌든 식도 위로 넘어가면 된겁니다. 건승하세요

편도염에 걸리면 편도결석이 생기나요?,안녕하세요 편도결석의 가장 흔한 원인은 만성 편도염입니다. 편도염을 자주 앓다 보면 편도라고 하는 편도의 작은 구멍들이 커지는데 이 커진 구멍 속에 음식물 찌꺼기가 끼면 세균이 잘 번식할 수 있는 환경이 되고 세균들이 뭉치면서 작은 알갱이를 형성하면 편도결석이 되는 겁니다. 알갱이는 물리적으로 제거를 해 주거나 우연히 떨어집니다. 건승하세요

브라질리언 왁싱 후 갈색 원 멍든건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 오전에 브라질리언 왁싱 후 집에와서 보니 갈색원들이 있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받으시길 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

갈비뼈 골절,안녕하세요 3개 이상이 갈비뼈 골절 기흉 혈흉 등의 경우가 아니면 특별한 치료가 필요치 않으며 단순한 늑골골절인 경우에는 응급조치가 필요없고 합병증이 없는 경우에는 통증경감의 목적으로 탄력붕대 등으로 고정을 34주 하기도 하고 깁스를 하기가 불가능 하기 때문에 안정을 취하면서 쉬는 것이 가장 중요합니다. 한 두달 정도 지나면 대부분 잘 낫습니다. 통증이 생기면 참지 마시고 병원에서 검사와 진료를 진행해 보세요 건승하세요

허벅지 팔 쥐와 힘빠짐 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허벅지 팔 쥐와 힘빠짐 증상은 근육 경련의 증상으로 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 저칼륨혈증으로 칼륨이 부족해지면 근육이 경련을 일으킬 수 있습니다. 또한 저나트륨혈증 저마그네슘혈증 갑상선 기능 저하증 당뇨병 간 질환 신장 질환 뇌졸중 척수 손상 등 다양한 질환이 근육 경련을 유발할 수 있습니다. 따라서 정확한 원인을 파악하기 위해서는 병원에 내원하여 진료를 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

별레 물린 흔적이 있는데 혹시 진드기일까요?,안녕하세요 요약 1. 연조직염입니다. 2. 발적 발열 부종을 특징으로하는 연조직염이라는 병이 있습니다. 3. 항생연고 발라보고 해결안되면 병의원에서 치료하면 금새 해결됩니다. 연조직염은 피부표면의 작은 상처를 통해 세균 침투로 진피와 피하조직에 일어나는 세균 감염증이며 봉소염 봉과직염 봉와직염이라고도 합니다. 연조직염의 증상은 발생한 부위에 홍반 열감 부종 압통을 동반하며 질병이 진행되면 물집과 고름이 생기기도 합니다. 건승하세요

여러가지 궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왜 양치를 안하셨을까요? 양치를 오래 안하시면 충치나 치주질환으로 고생을 하실수 있으니 걱정만 하지마시고 양치를 잘 하세요

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요 요약 1. 기존에 편두통은 있지 않았는지 확인해 보세요 2. 일반 진통제에 반응 안하면 신경과에서 진료를 받아 보세요 3. 타이레놀은 두알이 불건 따로 들어가건 어쨌든 식도 위로 넘어가면 된겁니다. 건승하세요

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 몇 달 동안 안 하면 치아에 치석이 생기고 잇몸이 붓고 염증이 생길 수 있습니다. 이로 인해 두통이 생길 수 있습니다. 양치를 하지 않으면 치아와 잇몸 건강에 좋지 않으니 꼭 양치를 하시기 바랍니다. 타이레놀은 물에 녹지 않는 약이기 때문에 입에 넣고 물을 마시면 붙어 있는 상태로 먹게 됩니다. 타이레놀은 물을 마시면 흡수가 더 잘 되기 때문에 타이레놀을 먹을 때는 물과 함께 먹는 것이 좋습니다. 타이레놀을 먹었는데도 머리가 아프다면 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다. 워치로 심박수를 재보면 괜찮게 나오는 것은 좋지만 머리가 아프다면 꼭 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다.

치과 의사가 송곳니를 갈아버린 후 신경쓰거나 눌러보면 시린 느낌이 듭니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치아교정을 받고 있고요. 치과 의사가 언젠가 미용을 위해서 한번 송곳니 양쪽을 다 갈아낸 적이 있는데 그 송곳니를 자꾸 신경쓰거나 세게 눌러보면 시린 느낌이 듭니다. 치아를 많이 갈아내서 그런건가요? 고칠 수 있나요...? 교합과 모양을 위해 송곳니를 다듬으신 것 같네요 보통 이런 경우는 시림증상이 나타나는 경우는 드물긴 합니다 치료 받으신 치과에 가서서 증상을 말씀하시고 상담을 받아보시는 것이 좋을 듯 합니다

관계후 15일 뒤 얼리임신테스트기,안녕하세요 얼리 임신테스트기의 경우 수정 후 79일이면 소변 검사로 임신을 확인할 수 있으며 정확도는 95이상입니다. 임신 초반에는 임신테스트기에서 음성이 나올 가능성도 있지만 일반 임신 테스트기 보다 1주일 정도 먼저 임신 사실을

알 수 있게 됩니다. 건승하세요

원인 불명 몸살,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은 여성분인것으로 보아 호르몬 주기에 따라 나타나는 증상일 가능성도 있을듯합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 병원 진료 권유합니다.

가슴 중앙 눌렀을때 통증 심장문제 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장질환은 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생하지 않습니다. 따라서 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생했다면 다른 질환이 원인일 가능성이 높습니다. 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생하는 원인은 다양할 수 있으며 심장질환이 아닌 다른 질환일 가능성이 더 높습니다. 따라서 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생했다면 병원에 내원하여 진료를 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

귀두에 붉은 돌기가 올라왔어요,안녕하세요 요약 1. 귀두포피염 초기 병변입니다. 2. 별다른 증상 없고 더 번지지도 않으면 자극 말고 귀두를 잠시 쉬게 해주세요 귀두포피염은 귀두와 포피에 염증이 생기는 질환인데 귀두 표면과 포피 내면 사이에는 항상 습기가 있어 세균이 침입해 번식하기 쉽습니다. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나거나 기저귀나 속옷에 농성 분비물이 묻어 나오기도 하고 환부의 탈색이 관찰되기도 합니다. 건승하세요

고혈압약과 고용량 칼슘약 같이 먹으면 안 되는 건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고혈압과 관계없이 칼슘이 부족하다면 칼슘을 섭취해도 됩니다. 용량은 적당한 용량이 좋은데 적당하다는 것은 개인에 따라 다릅니다. 너무 많은 양을 먹으면 변비나 위장장애 요로결석같은 문제가 생기기 쉽습니다. 부작용이 생기지 않는 선에서 적당한 용량을 복용하는 것이 좋습니다. 치과 의사가 송곳니를 갈아버린 후 신경쓰거나 눌러보면 시린 느낌이 듭니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 치아교정을 받고 있고요. 치과 의사가 언젠가 미용을 위해서 한번 송곳니 양쪽을 다 갈아낸 적이 있는데 그 송곳니를 자꾸 신경쓰거나 세게 눌러보면 시린 느낌이 듭니다. 치아를 많이 갈아내서 그런건가요? 고칠 수 있나요...? 교합과 모양을 위해 송곳니를 다듬으신 것 같네요 보통 이런 경우는 시림증상이 나타나는 경우는 드물긴 합니다 치료 받으신 치과에 가셔서 증상을 말씀하시고 상담을 받아보시는 것이 좋을 듯 합니다

갈비뼈 골절,안녕하세요 3개 이상이 갈비뼈 골절 기흉 혈흉 등의 경우가 아니면 특별한 치료가 필요치 않으며 단순한 늑골골절인 경우에는 응급조치가 필요없고 합병증이 없는 경우에는 통증경감의 목적으로 탄력붕대 등으로 고정을 34주 하기도 하고 깁스를 하기가 불가능 하기 때문에 안정을 취하면서 쉬는 것이 가장 중요합니다. 한 두달 정도 지나면 대부분 잘 낫습니다. 통증이 생기면 참지 마시고 병원에서 검사와 진료를 진행해 보세요 건승하세요

피나스테리드 복용량과 DHT 혈중농도의 상관관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈모약을 복용하여 DHT 농도를 일반인과 같은 수준으로 맞추면 탈모 치료효과는 없을 것으로 생각합니다. 피스테리드가 뇌에 부정적인 영향을 줄것 같지는 않으나 만약 그렇다면 중단을 고려하시는 것이 좋겠습니다

브라질리언 왁싱 후 갈색 원 멍든건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 오전에 브라질리언 왁싱 후 집에서 보니 갈색원들이 있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

편도염에 걸리면 편도결석이 생기나요?,안녕하세요 편도결석의 가장 흔한 원인은 만성 편도염입니다. 편도염을 자주 앓다 보면 편도와라고 하는 편도의 작은 구멍들이 커지는데 이 커진 구멍 속에 음식물 찌꺼기가 끼면 세균이 잘 번식할 수 있는 환경이 되고 세균들이 뭉치면

서 작은 알갱이를 형성하면 편도결석이 되는 겁니다. 알갱이는 물리적으로 제거를 해 주거나 우연히 떨어집니다. 건승하세요

고환이 딱딱해진거 같습니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 타박상으로 인해 고환백막이 파열되어 왼쪽 고환을 2주전 수술을 했는데 그 왼쪽고환에 굳어있는듯한 느낌이 드는군요. 크게 걱정하지 마시고 수술 받으신 병원 주치의와 정확한 상담을 받도록 하십시오.

원인 불명 몸살,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은 여성분인것으로 보아 호르몬 주기에 따라 나타나는 증상일 가능성도 있을듯합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 병원 진료 권유합니다.

전립선염이 아닐경우 어떤 병을 생각해야 하나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선염이 아닐 경우 다음과 같은 질환을 생각해 볼 수 있습니다. 전립선 비대증 방광염 요로 감염 요도염 균이 없는 전립선염 과민성 방광 신경성 요실금 전립선암 이러한 질환은 증상이 비슷하기 때문에 정확한 진단을 위해서는 병원에 방문하여 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

항문농양수술,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다. 혹시라도 출혈이 다시 심해지면 응급실 방문도 고려해보시는 것이 좋겠습니다.

오른쪽 턱 위 멍울이 만져집니다.,안녕하세요. 요약 1. 턱 위에도 임파선이 있기도 합니다. 2. 구내염 때문에 2차적으로 부을 수 있으며 3. 수주 지나서도 계속 있거나 주변부위에 만져지는 멍울 갯수가 많아지면 평가가 필요합니다. 걱정이 앞서면 정밀검사초음파 CT를 하면 다른 질환들이 감별이 됩니다. 건승하세요.

간수치 5배로 고덱스약 처방 받은 환자입니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 베톨 치질약을 간수치 낮추는 고스약과 함께 섭취해도 괜찮습니다. 베톨과 고스는 상호 악영향을 주지 않습니다.

무릎 멍 사마귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 내가 인지 하지 못하는 외상으로 멍이 드는 수가 있습니다. 무릎으로 바닥을 기는 동작으로도 멍이 가능합니다. 사마귀는 신경쓰이지 않으면 그냥 두셔도 됩니다

기립성빈맥,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기립성빈맥은 자율신경실조증의 증상 중 하나입니다. 자율신경실조증은 자율신경계의 기능이 저하되어 발생하는 질환으로 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 기립성빈맥은 눕거나 앉아 있을 때는 정상적인 심박수를 유지하다가 일어서면 심박수가 갑자기 증가하는 증상입니다. 기립성빈맥은 어지럼증 두통 실신 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 기립성빈맥의 치료에는 혈압을 낮추는 약물과 교감신경을 억제하는 약물이 사용됩니다. 혈압을 낮추는 약물로는 칼슘채널차단제 베타차단제 등이 사용되고 교감신경을 억제하는 약물로는 메토프롤롤 프로프라놀롤 등이 사용됩니다. 알프졸람과 인놀은 기립성빈맥의 치료에 효과가 없는 것으로 알려져 있습니다. 기립성빈맥의 치료에는 혈압을 낮추는 약물과 교감신경을 억제하는 약물이 사용되므로 알프라람과 인놀을 먹어도 효과가 없는 경우 다른 약물을 사용해야 합니다. 기립성빈맥은 심각한 합병증을 유발할 수 있으므로 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 진료를 받아야 합니다.

답변 감사합니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 췌장암을 의심할 수 없습니다. 걱정되신다고 하면 췌장암 검사로 확인하시는것이 가장 확실하다고 생각됩니다

성병관련 문의사진 포함,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

초음파상 신장 물혹에 대해 질문드립니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 신장 물혹은 신장 내

부에 발생하는 남성 종양으로 크기가 1cm 이하인 경우는 대부분 자연적으로 소실되거나 크기가 증가하지 않습니다. 따라서 1.35 x 1.47의 십자가 모양의 신장 물혹은 대부분 자연적으로 소실될 가능성이 높습니다. 다만 신장 물혹이 크기가 증가하거나 증상이 발생하는 경우는 정밀 검사를 받아 보시는 것이 좋습니다.

첫 관계 후 생리 늦어짐 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 다음과 같은 사항들을 고려해 볼 수 있습니다. 1. 스트레스 첫 성관계는 여성에게 심리적 스트레스를 줄 수 있습니다. 이로 인해 생리 주기가 일시적으로 변할 수 있습니다. 2. 호르몬 변화 성관계 후 여성의 호르몬 수준이 변화할 수 있으며 이로 인해 생리 주기가 지연될 수 있습니다. 3. 임신 가능성 콘돔 사용 후에도 임신 가능성은 낮지만 완전히 배제할 수는 없습니다. 생리 지연이 지속될 경우 임신 여부를 확인해볼 필요가 있습니다. 4. 정상적인 변동 때로는 생리 주기가 12일 정도 지연되는 것이 정상적일 수 있습니다. 스트레스나 호르몬 변화로 인한 일시적인 지연일 가능성이 높습니다. 이런 상황에서는 여자친구의 상태를 주의 깊게 관찰하고 생리가 1주일 이상 지연될 경우 병원에 방문하여 확인해보는 것이 좋습니다. 그 전까지는 너무 걱정하지 마시고 여자친구를 이해하고 지지해주는 것이 중요합니다.

5살 아이 흉부 가운데 혹이 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일차적으로는 소아과 방문이 가능합니다. 아니면 흉부외과 진료를 받아보시는 것이 가장 좋을 것으로 생각됩니다.

남성형 탈모 m0단계 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈모 초기 단계에서는 모발 영양제. 바르는 미녹시딜 등의 일반 의약품으로도 관리가 됩니다 다만 탈모 가족력이 있는지 확인하고 진행 양상이 빠르다면 초기부터 탈모 약물 치료가 필요할수도있습니다 모발은 한번 소실이되면 그 후에 다시 자라게하기 어려울수 있으니 아직 건강한 상태에서 미리미리 예방차원에서 관리하는 것도 중요합니다. 피나스테리드는 상대적으로 검증된 안전한 약물 중 하나이기때문에 많이 걱정되신다면 복용을 시작하는 것도 좋은방법입니다.

소변pcr은 음성인데 전립선액을 배출한 소변에서 성병양성이 나올 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병 검사는 소변 PCR 검사로 진행하게 되며 소변 PCR 검사에서 성병이 음성으로 나왔다면 전립선액을 배출한 소변에서 성병 양성이 나올 가능성은 매우 낮습니다. 다만 소변 PCR 검사에서 성병이 음성으로 나왔음에도 불구하고 전립선염 증상이 지속된다면 전립선염이 아닌 다른 질환의 가능성을 고려해 볼 필요가 있습니다. 따라서 현재의 증상이 지속된다면 병원에 내원하여 정확한 진단을 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

뇌검사 관련해서질문드려요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먼저 MRA 검사에서 뇌동맥류가 의심되어 CTA 검사를 추가로 받으신 것은 정상적인 진단 과정이었습니다. 뇌동맥류는 크기가 작을 경우 주기적인 추적 검사가 필요한데 교수님께서 1년 간격으로 CTA 검사를 받아보자고 하신 것은 적절한 판단으로 보입니다. 방사선 피폭에 대한 걱정은 이해할 수 있습니다. CTA 검사는 CT 촬영을 기반으로 하므로 방사선 노출이 있습니다. 하지만 의사가 판단하기에 1년 간격으로 추적 검사를 받는 것이 환자의 건강을 위해 필요하다고 판단했다면 그 위험성은 크지 않을 것으로 보입니다. 전문가의 조언을 따르는 것이 가장 중요합니다. 의사와 상담하여 정기적인 추적 검사의 필요성과 방사선 노출의 위험성을 다시 한번 확인해보시는 것이 좋겠습니다. 필요하다면 MRI와 같은 대안적인 검사법도 고려해볼 수 있습니다. 전반적으로 의사의 권고에 따라 주기적인 검사를 받는 것이 뇌동맥류 관리를 위해 중요합니다. 방사선 피폭에 대한 우려는 이해할 수 있지만 전문가의 판단을 신뢰하고 협조하는 것이 가장 중요합니다. 별레 물린데 어떤약이 잘듣는지 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 별레 물린 데에 가장 많이 사용되는 약물은 다음과 같습니다 1. 항히스타민제 모기 및 벌레 물린 데에 가장

효과적인 약물입니다. 대표적으로 로라타딘 세티리진 펠라르고닌 등이 있습니다. 이런 약물은 가려움증을 줄이고 붓기를 가라앉히는 데 도움됩니다. 2. 스테로이드 연고 히드로코르티손 연고나 크림은 염증 및 가려움증 완화에 도움됩니다. 피부에 바르면 효과적입니다. 3. 소독제 벌레 물린 데를 깨끗이 씻고 소독하는 것이 중요합니다. 포비돈 요오드 알코올 등의 소독제를 사용하면 좋습니다. 4. 진통제 아세트아미노펜이나 이부프로펜 등의 진통제는 통증 완화에 도움됩니다. 이런 약물들을 적절히 사용하면 벌레 물린 데로 인한 가려움증 붓기 통증 등을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 단 과도한 사용은 피하시고 의사 상담 후 사용하시는 것이 좋습니다. 또한 모기 기피제 사용 깨끗한 환경 유지 적절한 수면 등의 예방법도 함께 고려해 보시기 바랍니다.

실신 구토 식은땀 원인이 뭘까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실신 구토 식은땀은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 혈압이 낮아서 발생할 수도 있고 뇌졸중이나 심장마비와 같은 중증 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 혈압이 낮아서 실신하는 경우는 혈압이 갑자기 떨어지면서 뇌로 가는 혈액량이 줄어들어서 어지러움이나 실신을 유발합니다. 혈압이 낮아서 실신을 하는 경우는 보통 눕거나 누워서 쉬면 증상이 호전됩니다. 뇌졸중이나 심장마비와 같은 중증 질환으로 인해 실신하는 경우는 뇌나 심장에 혈액 공급이 부족해져서 발생합니다. 뇌졸중이나 심장마비로 인해 실신하는 경우는 보통 눕거나 누워서 쉬어도 증상이 호전되지 않으며 심한 경우 사망에 이를 수 있습니다. 실신 구토 식은땀이 발생했다면 반드시 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다. 병원에서 검사를 통해 정확한 원인을 진단하고 치료를 받아야 합니다.

메디키넷 갑상선 호르몬 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료가 필요한 내용입니다 ADHD 약으로 인한 부작용으로 갑상선 호르몬에 이상이 생기지는 않습니다 반대로 갑상선에 문제가 있을 시 ADHD유사 소견은 보일 수 있을 수 있는 것다 볼 수 있을 것이고 메키넷 리타드는 일종의 흥분제 각성제의 항정신약물인데 왜 복용을 하시는지? 메키넷 리타드 때문에도 심부전증이나 심장떨림등을 보일 수 있기에 인눌은 답이 아닙니다 주신 내용은 복용하는 약으로 인한 이차적 증상일 가능성이 높아 보여 왜 약을 복용하시는지부터 체크를 해 보아야할 부분입니다

돌발성난청입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 돌발성 난청은 13은 호전되는 경과를 보이는데 호전되는 기간은 수주 이상 소요될 수 있습니다. 현재는 치료에 집중하는 수 밖에 없습니다.

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 오래 동안 하지 않았다면 충치와 같은 치아 질환이 문제가 되면 타이레놀은 위과 같이 복용했더라도 크게 문제가 되지 않습니다.

별 쏘인곳 두드리기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알러지 반응이 발생하면 12주간 재발이 반복될 수 있어 꾸준히 약물 치료를 하고 완전히 호전되면 중단하는 것을 권합니다.

메디키넷 갑상선 호르몬 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료가 필요한 내용입니다 ADHD 약으로 인한 부작용으로 갑상선 호르몬에 이상이 생기지는 않습니다 반대로 갑상선에 문제가 있을 시 ADHD유사 소견은 보일 수 있을 수 있는 것다 볼 수 있을 것이고 메키넷 리타드는 일종의 흥분제 각성제의 항정신약물인데 왜 복용을 하시는지? 메키넷 리타드 때문에도 심부전증이나 심장떨림등을 보일 수 있기에 인눌은 답이 아닙니다 주신 내용은 복용하는 약으로 인한 이차적 증상일 가능성이 높아 보여 왜 약을 복용하시는지부터 체크를 해 보아야할 부분입니다

코목 감기약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감기를 앓고 후두에 염증이 완전히 가라 앉지 않아 목소리가 아직 정상적으로 나오지 않는 것으로 보입니다. 목을無理하지 마시고 쉬고 수분섭취를 충분히 자주 하고 건조하지 않게 습도 조절하시는 게 좋습니다. 음주나 흡연은 삼가하시고 이뇨작용이 있는 카페인도 함유된 음료도 피하시고 회복되는데 시간이 필요합니다. 시간이 지나도 목소리가 호전되지 않으면 후두내시경을 통해 성대검사를 받아보시길 바랍니다.

제 약좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 돌발성 난청에서는 스테로이드를 고용량으로 사용하게 되고 그거에 따른 부작용이 있을 수 있습니다. 두통 어지러움 안면홍조 발한이상 등 말씀하신 부작용이 있을 수 있습니다. 하지만 부작용이 크지 않다면 돌발성 난청의 가장 중요한 약이 스테로이드입니다. 스테로이드를 유지하시면서 증상이 호전되면 담당 선생님과 상의하셔서 용량을 줄여 나가시는게 좋을 듯 합니다.

가슴 중앙 눌렀을때 통증 심장문제 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장질환은 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생하지 않습니다. 따라서 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생했다면 다른 질환이 원인일 가능성이 높습니다. 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생하는 원인은 다양할 수 있으며 심장질환이 아닌 다른 질환일 가능성이 더 높습니다. 따라서 가슴 중앙을 눌렀을 때 통증이 발생했다면 병원에 내원하여 진료를 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

오른쪽 턱 위 멍울이 만져집니다.,안녕하세요. 요약 1. 턱 위에도 임파선이 있기도 합니다. 2. 구내염 때문에 2차적으로 부을 수 있으며 3. 수주 지나서도 계속 있거나 주변부위에 만져지는 멍울 갯수가 많아지면 평가가 필요합니다. 걱정이 앞서면 정밀검사초음파 CT를 하면 다른 질환들이 감별이 됩니다. 건승하세요.

간수치 5배로 고텍스약 처방 받은 환자입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베톨 치질약을 간수치 낮추는 고스약과 함께 섭취해도 괜찮습니다. 베톨과 고스는 상호 악영향을 주지 않습니다.

허벅지 팔 쥐와 힘빠짐 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허벅지 팔 쥐와 힘빠짐 증상은 근육 경련의 증상으로 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 저칼륨혈증으로 칼륨이 부족해지면 근육이 경련을 일으킬 수 있습니다. 또한 저나트륨혈증 저마그네슘혈증 갑상선 기능 저하증 당뇨병 간 질환 신장 질환 뇌졸중 척수 손상 등 다양한 질환이 근육 경련을 유발할 수 있습니다. 따라서 정확한 원인을 파악하기 위해서는 병원에 내원하여 진료를 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

펜폴캡슐간질성 방광염 복용 수면 내시경,안녕하세요. 하이닥 내과 상담의 이상환입니다 가능합니다. 다만 내시경 하는 의사에게 미리 복용약을 알려주신다면 적절한 수면제 선택으로 충분히 받으실 수 있습니다

초음파상 신장 물혹에 대해 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신장 물혹은 신장 내부에 발생하는 낭성 종양으로 크기가 1cm 이하인 경우는 대부분 자연적으로 소실되거나 크기가 증가하지 않습니다. 따라서 1.35 x 1.47의 십자가 모양의 신장 물혹은 대부분 자연적으로 소실될 가능성이 높습니다. 다만 신장 물혹이 크기가 증가하거나 증상이 발생하는 경우는 정밀 검사를 받아 보시는 것이 좋습니다.

5살 아이 흉부 가운데 혹이 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일차적으로는 소아과 방문이 가능합니다. 아니면 흉부외과 진료를 받아보시는 것이 가장 좋을 것으로 생각됩니다.

간수치 5배로 고텍스약 처방 받은 환자입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베톨 치질약을 간수치 낮추는 고스약과 함께 섭취해도 괜찮습니다. 베톨과 고스는 상호 악영향을 주지 않습니다.

항문농양수술,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다. 혹시라도 출혈이 다시 심해지면 응급실 방문도 고려해보시는 것이 좋겠습니다.

소변pcr은 음성인데 전립선액을 배출한 소변에서 성병양성이 나올 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병 검사는 소변 PCR 검사로 진행하게 되며 소변 PCR 검사에서 성병이 음성으로 나왔다면 전립선액을 배출한 소변에서 성병 양성이 나올 가능성은 매우 낮습니다. 다만 소변 PCR 검사에서 성병이 음성으로 나왔음에도 불구하고 전립선염 증상이 지속된다면 전립선염이 아닌 다른 질환의 가능성을 고려해 볼 필요가 있습니다. 따라서 현재의 증상이 지속된다면 병원에 내원하여 정확한 진단을 받아 보시는 것이 좋겠습니다.

귀두에 붉은 돌기가 올라왔어요,안녕하세요 요약 1. 귀두포피염 초기 병변입니다. 2. 별다른 증상 없고 더 번지지도 않으면 자극 말고 귀두를 잠시 쉬게 해주세요 귀두포피염은 귀두와 포피에 염증이 생기는 질환인데 귀두 표면과 포피 내면 사이에는 항상 습기가 있어 세균이 침입해 번식하기 쉽습니다. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나거나 기저귀나 속옷에 농성 분비물이 묻어 나오기도 하고 환부의 탈색이 관찰되기도 합니다. 건승하세요

첫 관계 후 생리 늦어짐 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 다음과 같은 사항들을 고려해 볼 수 있습니다. 1. 스트레스 첫 성관계는 여성에게 심리적 스트레스를 줄 수 있습니다. 이로 인해 생리 주기가 일시적으로 변할 수 있습니다. 2. 호르몬 변화 성관계 후 여성의 호르몬 수준이 변화할 수 있으며 이로 인해 생리 주기가 지연될 수 있습니다. 3. 임신 가능성 콘돔 사용 후에도 임신 가능성은 낮지만 완전히 배제할 수는 없습니다. 생리 지연이 지속될 경우 임신 여부를 확인해볼 필요가 있습니다. 4. 정상적인 변동 때로는 생리 주기가 12일 정도 지연되는 것이 정상적일 수 있습니다. 스트레스나 호르몬 변화로 인한 일시적인 지연일 가능성이 높습니다. 이런 상황에서는 여자친구의 상태를 주의 깊게 관찰하고 생리가 1주일 이상 지연될 경우 병원에 방문하여 확인해보는 것이 좋습니다. 그 전까지는 너무 걱정하지 마시고 여자친구를 이해하고 지지해주는 것이 중요합니다.

뇌검사 관련해서질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먼저 MRA 검사에서 뇌동맥류가 의심되어 CTA 검사를 추가로 받으신 것은 정상적인 진단 과정이었습니다. 뇌동맥류는 크기가 작을 경우 주기적인 추적 검사가 필요한데 교수님께서 1년 간격으로 CTA 검사를 받아보자고 하신 것은 적절한 판단으로 보입니다. 방사선 피폭에 대한 걱정은 이해할 수 있습니다. CTA 검사는 CT 촬영을 기반으로 하므로 방사선 노출이 있습니다. 하지만 의사가 판단하기에 1년 간격으로 추적 검사를 받는 것이 환자의 건강을 위해 필요하다고 판단했다면 그 위험성은 크지 않을 것으로 보입니다. 전문가의 조언을 따르시는 것이 가장 중요합니다. 의사와 상담하여 정기적인 추적 검사의 필요성과 방사선 노출의 위험성을 다시 한번 확인해보시는 것이 좋겠습니다. 필요하다면 MRI와 같은 대안적인 검사법도 고려해볼 수 있습니다. 전반적으로 의사의 권고에 따라 주기적인 검사를 받는 것이 뇌동맥류 관리를 위해 중요합니다. 방사선 피폭에 대한 우려는 이해할 수 있지만 전문가의 판단을 신뢰하고 협조하는 것이 가장 중요합니다. 별레 물린데 어떤약이 잘듣는지 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 별레 물린 데에 가장 많이 사용되는 약물은 다음과 같습니다 1. 항히스타민제 모기 및 벌레 물린 데에 가장 효과적인 약물입니다. 대표적으로 로라타딘 세티리진 펠라르고닌 등이 있습니다. 이런 약물은 가려움증을 줄이고 붓기를 가라앉히는 데 도움됩니다. 2. 스테로이드 연고 히드로코르티손 연고나 크림은 염증 및 가려움증 완화에 도움됩니다. 피부에 바르면 효과적입니다. 3. 소독제 벌레 물린 데를 깨끗이 씻고 소독하는 것이 중요합니다. 포비돈 요오드 알코올 등의 소독제를

사용하면 좋습니다. 4. 진통제 아세트아미노펜이나 이부프로펜 등의 진통제는 통증 완화에 도움됩니다. 이런 약물들을 적절히 사용하면 벌레 물린 데로 인한 가려움증 붓기 통증 등을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 단 과도한 사용은 피하시고 의사 상담 후 사용하시는 것이 좋습니다. 또한 모기 기피제 사용 깨끗한 환경 유지 적절한 수면 등의 예방법도 함께 고려해 보시기 바랍니다.

무릎 멍 사마귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 내가 인지 하지 못하는 외상으로 멍이 드는 수가 있습니다. 무릎으로 바닥을 기는 동작으로도 멍이 가능합니다. 사마귀는 신경쓰이지 않으면 그냥 두셔도 됩니다

별 쏘인곳 두드러기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알러지 반응이 발생하면 12주간 재발이 반복될 수 있어 꾸준히 약물 치료를 하고 완전히 호전되면 중단하는 것을 권합니다.

기립성빈맥,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기립성빈맥은 자율신경실조증의 증상 중 하나입니다. 자율신경실조증은 자율신경계의 기능이 저하되어 발생하는 질환으로 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 기립성빈맥은 눕거나 앉아 있을 때는 정상적인 심박수를 유지하다가 일어서면 심박수가 갑자기 증가하는 증상입니다. 기립성빈맥은 어지럼증 두통 실신 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 기립성빈맥의 치료에는 혈압을 낮추는 약물과 교감신경을 억제하는 약물이 사용됩니다. 혈압을 낮추는 약물로는 칼슘채널차단제 베타차단제 등이 사용되고 교감신경을 억제하는 약물로는 메토프롤롤 프로프라놀롤 등이 사용됩니다. 알프졸람과 인놀은 기립성빈맥의 치료에 효과가 없는 것으로 알려져 있습니다. 기립성빈맥의 치료에는 혈압을 낮추는 약물과 교감신경을 억제하는 약물이 사용되므로 알프라람과 인놀을 먹어도 효과가 없는 경우 다른 약물을 사용해야 합니다. 기립성빈맥은 심각한 합병증을 유발할 수 있으므로 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 진료를 받아야 합니다.

실신 구토 식은땀 원인이 뭘까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실신 구토 식은땀은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 혈압이 낮아서 발생할 수도 있고 뇌졸중이나 심장마비와 같은 중증 질환으로 인해 발생할 수도 있습니다. 혈압이 낮아서 실신하는 경우는 혈압이 갑자기 떨어지면서 뇌로 가는 혈액량이 줄어들어서 어지러움이나 실신을 유발합니다. 혈압이 낮아서 실신을 하는 경우는 보통 눕거나 누워서 쉬면 증상이 호전됩니다. 뇌졸중이나 심장마비와 같은 중증 질환으로 인해 실신하는 경우는 뇌나 심장에 혈액 공급이 부족해져서 발생합니다. 뇌졸중이나 심장마비로 인해 실신하는 경우는 보통 눕거나 누워서 쉬어도 증상이 호전되지 않으며 심한 경우 사망에 이를 수 있습니다. 실신 구토 식은땀이 발생했다면 반드시 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다. 병원에서 검사를 통해 정확한 원인을 진단하고 치료를 받아야 합니다.

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 몇 달 동안 안 하면 치아에 치석이 생기고 잇몸이 붓고 염증이 생길 수 있습니다. 이로 인해 두통이 생길 수 있습니다. 양치를 하지 않으면 치아와 잇몸 건강에 좋지 않으니 꼭 양치를 하시기 바랍니다. 타이레놀은 물에 녹지 않는 약이기 때문에 입에 넣고 물을 마시면 붙어 있는 상태로 먹게 됩니다. 타이레놀은 물을 마시면 흡수가 더 잘 되기 때문에 타이레놀을 먹을 때는 물과 함께 먹는 것이 좋습니다. 타이레놀을 먹었는데도 머리가 아프다면 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다. 위치로 심박수를 재보면 괜찮게 나오는 것은 좋지만 머리가 아프다면 꼭 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다.

소변볼때 방광쪽과 항문 회음부쪽이 시려워요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 증상은 비교적 흔한 증상으로 대부분 비슷한 증상을 호소하시는 분들을 상담 검사해보면 심하지 않은

만성 전립선염이 이러한 증상을 일으키는 경우를 많이 볼 수 있습니다. 성가시고 불편한 증상이지만 참을 만하시면 지켜보시다가 필요한 경우 비뇨의학과 전문의의 진료를 받아보시면 도움이 될 수 있습니다. 감사합니다.

무릎 멍 사마귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 내가 인지 하지 못하는 외상으로 멍이 드는 수가 있습니다. 무릎으로 바닥을 기는 동작으로도 멍이 가능합니다. 사마귀는 신경쓰이지 않으면 그냥 두셔도 됩니다

답변 감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 췌장암을 의심할 수 없습니다. 걱정 되신다고 하면 췌장암 검사로 확인하시는것이 가장 확실하다고 생각합니다

5살 아이 흉부 가운데 혹이 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일차적으로는 소아과 방문이 가능합니다. 아니면 흉부외과 진료를 받아보시는 것이 가장 좋을 것으로 생각합니다.

15일 뒤 얼리임신테스트기 저녁소변,안녕하세요 얼리 임신테스트기의 경우 수정 후 79일이면 소변 검사로 임신을 확인할 수 있으며 정확도는 95이상입니다. 임신 초반에는 임신테스트기 에서 음성이 나올 가능성도 있지만 일반 임신 테스트기 보다 1주일 정도 먼저 임신 사실을 알 수 있게 됩니다. 건승하세요

피나스테리드 복용량과 DHT 혈중농도의 상관관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈모약을 복용하여 DHT 농도를 일반인과 같은 수준으로 맞추면 탈모 치료효과는 없을 것으로 생각합니다. 피스테리드가 뇌에 부정적인 영향을 줄것 같지는 않으나 만약 그렇다면 중단을 고려하시는 것이 좋겠습니다

갈비뼈 골절,안녕하세요 3개 이상이 갈비뼈 골절 기흉 혈흉 등의 경우가 아니면 특별한 치료가 필요치 않으며 단순한 늑골골절인 경우에는 응급조치가 필요없고 합병증이 없는 경우에는 통증경감의 목적으로 탄력붕대 등으로 고정을 34주 하기도 하고 깁스를 하기가 불가능 하기 때문에 안정을 취하면서 쉬는 것이 가장 중요합니다. 한 두달 정도 지나면 대부분 잘 낫습니다. 통증이 생기면 참지 마시고 병원에서 검사와 진료를 진행해 보세요 건승하세요

편도염에 걸리면 편도결석이 생기나요?,안녕하세요 편도결석의 가장 흔한 원인은 만성 편도염입니다. 편도염을 자주 앓다 보면 편도와라고 하는 편도의 작은 구멍들이 커지는데 이 커진 구멍 속에 음식물 찌꺼기가 끼면 세균이 잘 번식할 수 있는 환경이 되고 세균들이 뭉치면서 작은 알갱이를 형성하면 편도결석이 되는 겁니다. 알갱이는 물리적으로 제거를 해 주거나 우연히 떨어집니다. 건승하세요

항문농양수술,안녕하세요. 메디이즈입니다. 큰 문제는 없을 것으로 생각합니다. 혹시라도 출혈이 다시 심해지면 응급실 방문도 고려해보시는 것이 좋겠습니다.

이거 헤르페스인가요 아니면 또다른 성병인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계한지는 4주정도 되었고 생식기를 불안해서 엄청 자주만지긴 했군요. 3일전부터 생식기가 느낌이 먼가 이상하고 따갑고 오늘보니 사진에 보는거와 같이 빨게져있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

잔변감 어떻게 해소하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 상태를 알기는 어렵지만 지금 변비가 있는 상태인가요? 배변을 잘 할 수 있도록 섬유질 섭취를 늘리고 운동도 열심히 하고 약물 치료도 필요할 수 있습니다

성병 문의드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 가능성은 있습니다 2. 네 낫습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

안녕하세요 정신과약 복용 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정신과 약과 투딘은 상호작용이 없는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 투딘을 먹고 10분 정도 후에 정신과 약을 복용해도 별 문제가 없습니다. 다만 투딘을 복용하고 정신과 약을 복용하기 전에 의사나 약사에게 문의하는 것이 좋습니다.

남자 민감한 부위 점제거 관련 질문있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부과나 비뇨기과 모두 진료가 가능합니다. 하지만 내원 전에 병원에 미리 문의를 하는 것이 가장 정확합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

원형탈모 두피함몰,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 정확하게 두피 함몰이 확인되지 않은상태이니 직접 진료받고 확인이 필요합니다. 주사 맞지 않고 함몰이 나타날 것 같지는 않습니다
안녕하세요 이거 매독 궤양 전조증상 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독 전조 증상일 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

갈색 침 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흡연자의 갈색 침이 나오는 이유는 다음과 같습니다. 1.타르 타르는 담배 연기에 포함된 물질 중 하나로 갈색 또는 검은색의 끈적끈적한 액체입니다. 타르는 구강 내에 오래 남아 있으면 갈색 침을 유발할 수 있습니다. 2.니코틴 니코틴은 담배 연기에 포함된 또 다른 물질로 갈색 침을 유발하는 원인 중 하나입니다. 니코틴은 구강 내 점막을 자극하여 침 분비를 증가시키고 이로 인해 갈색 침이 나올 수 있습니다. 3. 구강 내 세균 흡연으로 인해 구강 내 세균이 증가할 수 있습니다. 이들 세균은 침과 결합하여 갈색 침을 만들 수 있습니다. 4.구강 위생 불량 흡연은 구강 위생을 불량하게 만들 수 있습니다. 이로 인해 구강 내에 치태나 치석 등이 쌓이게 되면 갈색 침이 나올 수 있습니다. 5. 기타 흡연으로 인해 구강 내 점막에 상처가 생기거나 구강 내에 염증이 생긴 경우에도 갈색 침이 나올 수 있습니다. 갈색 침이 나오는 것은 흡연으로 인한 건강 문제의 신호일 수 있습니다. 따라서 흡연을 중단하고 구강 위생을 개선하는 것이 중요합니다. 만약 갈색 침이 지속적으로 나오거나 다른 증상과 함께 나타나는 경우에는 전문가의 진료를 받는 것이 좋습니다.
기흉 시술후 후유증 관련문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 환자분의 진찰이라던지 흉부 영상이 있지 않아 객관적인 판단은 일단 어려우나 주치의의 의견이 그러하다면 다시 주치의에게 방문해 보시는게 좋겠네요

암 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프절 전이 여부에 따라 병기가 달라지지만 폐암도 조직학적 분류가 다양하기 때문에 완치가 안된다고 단정 짓기는 어렵습니다. 최종 결과 확인 후 치료를 결정하게 됩니다.

윗배 동그란 무언가가 만져짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위장관의 움직임일 수도 있고 실제 피하 종양일 수도 있어 상기 증상이 나타나는 부위에 대하여 초음파 검사를 해 보는 것을 권합니다.

갈비뼈 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없으면 골절이 있어도 병원을 안가셔도 됩니다. 살짝의 통증이 있다면 가까운 병원에서 늑골 엑스레이를 찍게 됩니다.

각막쪽 진료를 받아봐야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 아마도 결석제거후에 상처나 염증이 남아있어서 그런것이 아닌가 의심스럽습니다. 약사용하면서 경과를 지켜보셔요

한쪽 다리가 너무 아파요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한쪽 다리에만 통증이 있다면 요추 질환이나 무릎 관절 질환 등에 대한 감별이 필요합니다. 정형외과 내원하여 진료를 보시기 바랍니다.

청소년기에 코파는 습관,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흔한 습관이라고 보기는 어려울듯합니다
다만 자는 동안 지속적으로 코를 판다면 장갑을 끼고 주무셔보는것도 도움이 될듯합니다

답변 감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 췌장암을 의심할 수 없습니다. 걱정
되신다고 하면 췌장암 검사로 확인하시는것이 가장 확실하다고 생각합니다

귀두에 붉은 돌기가 올라왔어요,안녕하세요 요약 1. 귀두포피염 초기 병변입니다. 2. 별다른
증상 없고 더 번지지도 않으면 자극 말고 귀두를 잠시 쉬게 해주세요 귀두포피염은 귀두와
포피에 염증이 생기는 질환인데 귀두 표면과 포피 내면 사이에는 항상 습기가 있어 세균이 침
입해 번식하기 쉽습니다. 귀두와 포피가 빨갛게 붓고 습윤해지는 증상이 나타나며 요도구 부
종 동통 배뇨 곤란 등의 증상이 나타나거나 기저귀나 속옷에 농성 분비물이 묻어 나오기도 하
고 환부의 탈색이 관찰되기도 합니다. 건승하세요

관계후 15일 뒤 얼리임신테스트기,안녕하세요 얼리 임신테스트기의 경우 수정 후 79일이면
소변 검사로 임신을 확인할 수 있으며 정확도는 95이상입니다. 임신 초반에는 임신테스트기
에서 음성이 나올 가능성도 있지만 일반 임신 테스트기 보다 1주일 정도 먼저 임신 사실을
알 수 있게 됩니다. 건승하세요

오른쪽 턱 위 멍울이 만져집니다.,안녕하세요. 요약 1. 턱 위에도 임파선이 있기도 합니다.
2. 구내염 때문에 2차적으로 부을 수 있으며 3. 수주 지나서도 계속 있거나 주변부위에 만져
지는 멍울 갯수가 많아지면 평가가 필요합니다. 걱정이 앞서면 정밀검사초음파 CT를 하면
다른 질환들이 감별이 됩니다. 건승하세요.

변 상태가 안좋은건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변을 보고 물을 내렸을 때 변기에 묻어
있는 경우를 종종 볼 수 있는데 이런 변은 변 내에 기름이 지나치게 많다는 것을 의미합니다.
몸이 지방을 잘 소화하지 못한 채 변으로 보내 변기에 묻는 모습을 볼 수 있어요. 이 외에도
췌장염을 앓으면 지방을 잘 흡수하지 못해 끈적이는 변을 볼 수 있으니 계속해서 끈적한 변을
본다면 병원에서 정확한 검사를 받아보시는 것이 좋습니다.

변 상태 안좋은건가요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 주신 정보만으로는 큰 문제는 없
을 것 같습니다. 췌장암은 검사를 통해서 확인해보시고 증상으로 미리 판단하지는 마세요

삐소리와 동시에 3초 동안 소리가 잘 안들려요,안녕하세요 요약 1. 돌발성 난청도 언급한 증
상이 생깁니다. 2. 병원에서 원인 확인 및 치료를 병행해야 할겁니다. 돌발성 난청은 특별한
원인 없이 수시간에서 23일 이내에 갑자기 감각신경성 난청이 발생하는 경우입니다. 갑자기
귀에서 이명이 들리거나 먹먹해지면서 안들리는 경우 빨리 치료해야 회복될 가능성이 높기
때문에 즉시 이비인후과에서 검사가 필요한 귀의 응급질환 중 하나입니다. 건승하세요

소변중 쿠퍼액,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변을 누는 중에 마지막에 케겔운동 하듯이 힘
을주면 점액질 액이 나오는군요. 쿠퍼액의 가능성은 거의 없습니다. 크게 걱정하지 마시고
비뇨기와 진료를 한번 받도록 하십시오.

일반 개인병원은 피부암 진찰이 불가한가요?,안녕하세요 요약 1. 조직검사를 하려면 2차 병
원이나 종합병원 급 이상에서 해 줄겁니다. 2. 근처 피부과 의원에 전화로 문의해 보세요 3.
조직검사가 필요하면 가능한지. 가능하면 거기로 가보세요 4. 조직검사가 확진검사입니다. 건
승하세요

변 상태 안좋은건가요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 주신 정보만으로는 큰 문제는 없
을 것 같습니다. 췌장암은 검사를 통해서 확인해보시고 증상으로 미리 판단하지는 마세요

여러가지 궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왜 양치를 안하셨을까요? 양치를
오래 안하시면 충치나 치주질환으로 고생을 하실수 있으니 걱정만 하지마시고 양치를 잘 하셔

요

피검사 결과 간수치가 5배정도 높다고 하셨습니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 비만 말고 다른 원인 약물 바이러스간염 같은 이유는 없는 지 확인 이 필요합니다. 검사 결과에 맞추어 치료하시면 잘 좋아지실 겁니다

변 상태가 안좋은건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변을 보고 물을 내렸을 때 변기에 묻어 있는 경우를 종종 볼 수 있는데 이런 변은 변 내에 기름이 지나치게 많다는 것을 의미합니다. 몸이 지방을 잘 소화하지 못한 채 변으로 보내 변기에 묻는 모습을 볼 수 있어요. 이 외에도 췌장염을 앓으면 지방을 잘 흡수하지 못해 끈적이는 변을 볼 수 있으니 계속해서 끈적한 변을 본다면 병원에서 정확한 검사를 받아보시는 것이 좋습니다.

눈 관련질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 증상으로 볼 때는 안구 건조증이 맞는 것 같습니다. 안구 건조증은 원인에 따라 치료 방법이 다를 수 있기 때문에 가까운 안과에 가서 건조증에 대한 검사와 치료를 받아보시는 것을 권유드립니다. 혈당이 약간 높은 정도로는 눈에 큰 영향은 없으며 당뇨의 합병증으로 황반변성이 생기는 것은 아니고 황반부종 등의 당뇨망막병증은 혈당이 오랫동안 조절되지 않을 경우 발생할 수 있습니다. 기본 검사 시 안저 사진만 찍어보셔도 시력에 영향을 줄 수 있는 황반의 병변 여부는 확인할 수 있습니다. 감사합니다.

원래 웃다가 눈물이 나면 한 쪽 눈에만 눈물이 나나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 해당 부분은 건조증 관련 검사랑 눈물길 기능 관련 검사를 해봐야 정확히 말씀드릴 수 있을 듯 합니다. 검사 양상에 따라서 원인이 달라질 듯 해서요. 감사합니다.

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요 요약 1. 기존에 편두통은 있지 않았는지 확인해 보세요 2. 일반 진통제에 반응 안하면 신경과에서 진료를 받아 보세요 3. 타이레놀은 두알이 불건 따로 들어가건 어쨌든 식도 위로 넘어가면 된겁니다. 건승하세요

벌레 물린 흔적이 있는데 혹시 진드기일까요?,안녕하세요 요약 1. 연조직염입니다. 2. 발적 발열 부종을 특징으로하는 연조직염이라는 병이 있습니다. 3. 항생연고 발라보고 해결안되면 병의원에서 치료하면 금세 해결됩니다. 연조직염은 피부표면의 작은 상처를 통해 세균 침투로 진피와 피하조직에 일어나는 세균 감염증이며 봉소염 봉과직염 봉와직염이라고도 합니다. 연조직염의 증상은 발생한 부위에 홍반 열감 부종 압통을 동반하며 질병이 진행되면 물집과 고름이 생기기도 합니다. 건승하세요

편도염에 걸리면 편도결석이 생기나요?,안녕하세요 편도결석의 가장 흔한 원인은 만성 편도염입니다. 편도염을 자주 앓다 보면 편도와라고 하는 편도의 작은 구멍들이 커지는데 이 커진 구멍 속에 음식물 찌꺼기가 끼면 세균이 잘 번식할 수 있는 환경이 되고 세균들이 뭉치면서 작은 알갱이를 형성하면 편도결석이 되는 겁니다. 알갱이는 물리적으로 제거를 해 주거나 우연히 떨어집니다. 건승하세요

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 몇 달 동안 안 하면 치아에 치석이 생기고 잇몸이 붓고 염증이 생길 수 있습니다. 이로 인해 두통이 생길 수 있습니다. 양치를 하지 않으면 치아와 잇몸 건강에 좋지 않으니 꼭 양치를 하시기 바랍니다. 타이레놀은 물에 녹지 않는 약이기 때문에 입에 넣고 물을 마시면 붙어 있는 상태로 먹게 됩니다. 타이레놀은 물을 마시면 흡수가 더 잘 되기 때문에 타이레놀을 먹을 때는 물과 함께 먹는 것이 좋습니다. 타이레놀을 먹었는데도 머리가 아프다면 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다. 위치로 심박수를 재보면 괜찮게 나오는 것은 좋지만 머리가 아프다면 꼭 병원에 가서 진료를 받아 보시기 바랍니다.

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요 요약 1. 기존에 편두통은 있지 않았는지 확인해 보세요 2. 일반 진통제에 반응 안하면 신경과에서 진료를 받아 보세요 3. 타이레놀은 두알이 불건 따로 들어가건 어쨌든 식도 위로 넘어가면 된겁니다. 건승하세요

궁금한것이 여러가지 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 오래 동안 하지 않았다면 충치와 같은 치아 질환이 문제가 되면 타이레놀은 위과 같이 복용했더라도 크게 문제가 되지 않습니다.

여러가지 궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왜 양치를 안하셨을까요? 양치를 오래 안하시면 충치나 치주질환으로 고생을 하실수 있으니 걱정만 하지마시고 양치를 잘 하세요

브라질리언 왁싱 후 갈색 원 멍든건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 오전에 브라질리언 왁싱 후 집에와서 보니 갈색원들이 있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

후두경에 설편도 부종? 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 후두염으로 일시적으로 편도가 부어오른 것 같습니다. 약물치료 잘하시고 자극적인 음식매운거 탄산..은 피하시고 건강관리 잘하시기 바랍니다. 염증이 좋아지면 자연스레 좋아질수 있습니다.

브라질리언 왁싱 후 갈색 원 멍든건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 오전에 브라질리언 왁싱 후 집에와서 보니 갈색원들이 있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

뿌리 쪽에 검은 것이 있는데 뭘까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 신경 쓰이면 피부과에서 점을 제거하면 됩니다. 3. 가끔씩 점도 짜면 2차 염증이 생겨서 자주 꺾을 수 있습니다. 건승하세요.

일반 개인병원은 피부암 진찰이 불가한가요?,안녕하세요 요약 1. 조직검사를 하려면 2차 병원이나 종합병원 급 이상에서 해 줄겁니다. 2. 근처 피부과 의원에 전화로 문의해 보세요 3. 조직검사가 필요하면 가능한지. 가능하면 거기로 가보세요 4. 조직검사가 확진검사입니다. 건승하세요

갈비뼈 골절,안녕하세요 3개 이상이 갈비뼈 골절 기흉 혈흉 등의 경우가 아니면 특별한 치료가 필요치 않으며 단순한 늑골골절인 경우에는 응급조치가 필요없고 합병증이 없는 경우에는 통증경감의 목적으로 탄력붕대 등으로 고정을 34주 하기도 하고 깁스를 하기가 불가능 하기 때문에 안정을 취하면서 쉬는 것이 가장 중요합니다. 한 두달 정도 지나면 대부분 잘 낫습니다. 통증이 생기면 참지 마시고 병원에서 검사와 진료를 진행해 보세요 건승하세요

성관계 이후 통증 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부 자극으로 인한 일시적인 증상일 가능성이 높습니다. 청결을 유지해주시고 자극이 심하면 냉찜질을 하거나 보습제를 사용해보세요. 며칠 안에 호전되지 않고 피부증상이 심해지면 피부과진료 보시기 바랍니다.

심인성 어지럼증 약물치료 문의입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 약물 치료를 하더라도 결국 심리적인 문제가 호전되어야 증상이 좋아질 수 있습니다. 단기간에 좋아지기는 어렵습니다.

엉덩이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상은 좌골신경통에 의한 것으로 보입니다. 척추 디스크에 의한 신경압박때문은 아닌지 정형외과 진료 보시기 추천드립니다.

엉덩이 부근에 통증이 있습니다,안녕하세요 요약 천장관절증후군인지 확인이 필요합니다.

꼬리뼈인 천골과 엉덩이 뼈인 장골이 연결되는 부위에 염증이 생기는 질환인데 골반에 직접적인 충격을 주는 외상이나 교통사고 잘못된 자세 등에 의해 발생합니다. 증상으로는 엉덩이 허벅지에 통증이 발생하는 경우 통증으로 인해 양반다리 자세가 불편한 경우 다리가 당기거나 감각이상 화끈거림 등이 나타나는 경우 방치할 경우 골관절염 골반 내 불안정성 강직성 척추염이 발생할 수 있어 빠른 진료와 치료가 필요합니다. 다른 병원으로 가보세요 건승하세요

오른쪽 갈비뼈 밑 배꼽 우측 누르면 덩어리 만져짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀해주신것만으로 답변은 좀 어렵습니다. 직접 진찰을 해보거나 검사를 통해서 확인이 필요한 상황으로 판단됩니다

스테로이드 연고 사용을 줄이면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스테로이드 연고는 경구 스테로이드에 비해 부작용이 심하지 않으므로 충분 기간 사용하고 병변이 완전히 호전되면 중단하는 것을 권해드립니다.

갈비뼈 골절,안녕하세요 3개 이상이 갈비뼈 골절 기흉 혈흉 등의 경우가 아니면 특별한 치료가 필요치 않으며 단순한 늑골골절인 경우에는 응급조치가 필요없고 합병증이 없는 경우에는 통증경감의 목적으로 탄력붕대 등으로 고정을 34주 하기도 하고 깁스를 하기가 불가능 하기 때문에 안정을 취하면서 쉬는 것이 가장 중요합니다. 한 두달 정도 지나면 대부분 잘 낫습니다. 통증이 생기면 참지 마시고 병원에서 검사와 진료를 진행해 보세요 건승하세요

뿌리 쪽에 검은 것이 있는데 뭘까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 신경 쓰이면 피부과에서 점을 제거하면 됩니다. 3. 가끔씩 점도 짜면 2차 염증이 생겨서 자주 긁을 수 있습니다. 건승하세요.

이거 헤르페스인가요 아니면 또다른 성병인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계한지는 4주정도 되었고 생식기를 불안해서 엄청 자주만지긴 했군요. 3일전부터 생식기가 느낌이 먼가 이상하고 따갑고 오늘보니 사진에 보는거와 같이 빨게져있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

두피염 CRP수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두피염의 염증이 심한정도에 따라 다를 수 있습니다. 심하면 당연히 오를 수 있습니다. 얼마나 높이 올라갔는지요?

배변 시 출혈과 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상으로 봐서는 치열항문이 찢어지는 질환이 발생된 것으로 의심됩니다. 항문에 문제가 없는 사람이라도 변이 단단하고 굵게 나올 때 가끔 치열이 발생할 수 있는데 부드러운 배변을 위하여 섬유질과 수분 섭취를 많이하고 변 부드럽게 하는 약을 쓰고 하면 대부분 좋아지는데 그런 것을 급성치열이라고 합니다. 반면 괄약근 압력이 높거나 진행된 치핵치질이 있는 분들은 찢어지는 것이 반복되어 염증 반응이 진행되면서 상처가 낫지 않고 계속 심해져서 궤양 같은 것이 생기게 되는데 그런 것을 만성치열이라고 합니다. 이런 경우엔 수술적 치료가 필요하게 됩니다. 만약 증상이 지속되거나 반복되면 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

피검사 결과 간수치가 5배정도 높다고 하셨습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 비만 말고 다른 원인 약물 바이러스간염 같은 이유는 없는 지 확인이 필요합니다. 검사 결과에 맞추어 치료하시면 잘 좋아지실 겁니다

복부ct 위대장내시경 혈액검사 이상없다는데 통증이 계속 남아있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀드리조심스럽긴 한데요 검사에서 이상이없이나왔는데 통증이 지속되는 경우는 허리에서 자율신경이 눌러서 불편할 수 있으니 진찰해서 그렇다면 그부분을 치료해볼 수 있습니다 성병 문의드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우

나 1. 가능성은 있습니다 2. 네 낮습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

안녕하세요 정신과약 복용 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정신과 약과 투딘은 상호작용이 없는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 투딘을 먹고 10분 정도 후에 정신과 약을 복용해도 별 문제가 없습니다. 다만 투딘을 복용하고 정신과 약을 복용하기 전에 의사나 약사에게 문의하는 것이 좋습니다.

사정 이후 소변에서 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 큰 문제는 없고 일시적으로 나타나는 증상일 가능성이 높습니다 혈정액이 나타나는 원인은 다양합니다. 1.전립선염 정낭염 등 염증이나 감염 전립선 정낭 요도에 염증이나 감염이 있을 경우 혈정액이 발생할 수 있습니다. 2.외상 생식기에 외상을 입은 경우에도 혈정액이 나타날 수 있습니다. 3.혈관 문제 혈관에 문제가 생겨 출혈이 발생하는 경우에도 혈정액이 나타날 수 있습니다. 4.악성 종양 드물지만 전립선암 등의 악성 종양이 원인이 될 수 있습니다. 5.기타 과도한 자위나 격렬한 성행위로 인해 음경 및 회음부 부위에 경미한 외상을 입어 주변부의 작은 혈관이 파열되어 혈정액이 발생할 수 있습니다. 혈정액이 지속적으로 나타나는 경우에는 비뇨기과를 방문하여 검사를 받는 것이 좋습니다.

이게 뭡까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원으로 오세요 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 건승하세요

귀두 부분에 하얀 좁쌀 같은 게 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병은 아닙니다. 타이슨 샘은 정상 피지샘이 두드러져 보이는 건데 귀두 아래 음경포피소대 양측에 좁쌀 모양의 하얀색 돌기 형태로 나타나게 됩니다. 정상 변이의 일종이기 때문에 치료가 필요 없으나 형태가 전형적이지 않거나 다른 질병과 구분이 되지 않는 경우에는 조직검사를 비롯한 정밀검사를 시행하기도 합니다. 건승하세요.

15일 뒤 얼리임신테스트기 저녁소변,안녕하세요 얼리 임신테스트기의 경우 수정 후 79일이면 소변 검사로 임신을 확인할 수 있으며 정확도는 95이상입니다. 임신 초반에는 임신테스트기에서 음성이 나올 가능성도 있지만 일반 임신 테스트기 보다 1주일 정도 먼저 임신 사실을 알 수 있게 됩니다. 건승하세요

돌발성난청입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 돌발성 난청은 13은 호전되는 경과를 보이는 데 호전되는 기간은 수주 이상 소요될 수 있습니다. 현재는 치료에 집중하는 수 밖에 없습니다.

판토가 종류의 일반의약품은 영양제인가요? 치료제인가요? 먹다가 끊으면 머리가 더 빠지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 설명하신 증상으로 보아선 휴지기 탈모증이 의심됩니다. 여성형탈모증은 모발이 많이 빠지는 증상보다는 정수리 부위 모발이 가늘어지는 증상으로 진행이 됩니다. 정수리 모발이 가늘어졌는지는 후두부 모발의 굵기와 비교해 보면 알 수 있습니다. 대학병원으로 의뢰서를 써 주셨으면 대학병원에 가서서 정확한 진단을 받아 보시는 것이 좋을 것으로 생각됩니다. 판타 종류는 영양제입니다. 이런 영양제가 휴지기 탈모증의 경우 치료제 역할을 할 수 있습니다. 판타 종류의 약을 복용하다가 중단한다고 머리가 더 빠지지 않습니다. 판타 종류의 약은 복용하시는 것이 좋을 것으로 생각되고 탈모 치료에서 스테로이드는 원형탈모증에 주로 사용하는 약물이고 휴지기 탈모증이나 여성형 탈모증에는 사용하지 않습니다. 감사합니다.

통증이 없는데 신경치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치과 검진을 가서 엑스레이 촬영 후에 왼쪽 어금니 옆면이 썩어서 신경치료 후에 크라운을 해야한다고 견적을 받았습니다. 통증이 전혀 없는데 신경치료를 하는 경우가 있나요? 충치가 만성으로 오랜 기간동안 진행 된 경우라면 지금은 통증이 없지만 충치 자체는 깊이 진행 되었을 수도 있습니다. 하지만 미심쩍으시다면 치과보존과 전문의나 치과대학병원 보존과에 가셔서 다시 한번 더 검사를 받아보시는 것도 나쁘지 않으실 듯 합니다.

빠소리와 동시에 3초 동안 소리가 잘 안들려요,안녕하세요 요약 1. 돌발성 난청도 언급한 증상이 생깁니다. 2. 병원에서 원인 확인 및 치료를 병행해야 할겁니다. 돌발성 난청은 특별한 원인 없이 수시간에서 23일 이내에 갑자기 감각신경성 난청이 발생하는 경우입니다. 갑자기 귀에서 이명이 들리거나 먹먹해지면서 안들리는 경우 빨리 치료해야 회복될 가능성이 높기 때문에 즉시 이비인후과에서 검사가 필요한 귀의 응급질환 중 하나입니다. 건승하세요

일반 개인병원은 피부암 진찰이 불가한가요?,안녕하세요 요약 1. 조직검사를 하려면 2차 병원이나 종합병원 급 이상에서 해 줄겁니다. 2. 근처 피부과 의원에 전화로 문의해 보세요 3. 조직검사가 필요하면 가능한지. 가능하면 거기로 가보세요 4. 조직검사가 확진검사입니다. 건승하세요

입술이 가렵고 따가워요.,안녕하세요 요약 1. 구순염입니다. 2. 병원에서 진료 후 3. 세균감염이나 바이러스 감염에 준한 항생제나 항바이러스가 필요할 수 있습니다. 구순염은 입술과 얼굴 피부의 경계 부위에 각종 자극에 의해 발생한 염증인데 바이러스 감염 세균 감염 영양 장애 면역 장애 스트레스 외상 유전적 원인 호르몬 장애 기타 전신 질환 같은 여러 요인들이 단독 또는 복합적으로 관여하며 비타민B12 결핍 철분 및 엽산 결핍 등이 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 건승하세요

문제있는 점인가요?,안녕하세요 요약 1. 아래 증상들과 비교해 보세요 2. 동일한 점 내부에 서로 다른 피부 색깔과 색조가 있으면 문제가 될 수 있습니다. 악성 흑색종의 증상은 다음과 같습니다. 비대칭 경계 불규칙성 동일한 점 내부에 서로 다른 피부 색깔과 색조가 나타남 6mm보다 큰연필지우개보다 큰 지름 점의 크기 증가 건승하세요

경구피임약 하루 빼먹은 날 관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 우선 빼먹은 날 이후 제대로 복용했고 그때가 생리 시작 얼마 안되는 날이어서 피임은 되었을것으로 생각됩니다. 만약에 이번주기에 다시 빼먹는 날이 생긴다면 피임효과가 떨어질수 있으니 제대로 복용을 권고드립니다. 다시 빼먹게 된다면 그 주기는 다른 피임방법콘돔으로 피임을 하고 약을 중단한후 생리를 유도한후에 생리시작일부터 다시 복용하도록 하세요.

진료기록 적을때,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반드시 그럴 필요는 없고 담당의가 가장 알아보기 쉬운 용어로 기록합니다. 담당의의 주관적인 성향으로 생각됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

남자인데 가슴이 이상합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 남성도 유방 질환이 발생할 수 있으므로 초음파 검사가 가능한 병원 내원하여 진료를 보시는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

통증이 없는데 신경치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치과 검진을 가서 엑스레이 촬영 후에 왼쪽 어금니 옆면이 썩어서 신경치료 후에 크라운을 해야한다고 견적을 받았습니다. 통증이 전혀 없는데 신경치료를 하는 경우가 있나요? 충치가 만성으로 오랜 기간동안 진행 된 경우라면 지금은 통증이 없지만 충치 자체는 깊이 진행 되었을 수도 있습니다. 하지만 미심쩍으시다면 치과보존과 전문의나 치과대학병원 보존과에 가셔서 다시 한번 더 검사를 받아보시

는 것도 나쁘지 않으실 듯 합니다.

구강 내 어두운 반점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 질문자 분께서 올려주신 구강 내 사진을 보면 이상 소견이 보이지 않는 듯 합니다. 사진의 화질 및 각도에 따라 다르게 보일 수 있는 부분이 있으므로 가까운 치과에 방문하셔서 검진하는 것을 추천드립니다.

사정 이후 소변에서 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 큰 문제는 없고 일시적으로 나타나는 증상일 가능성이 높습니다 혈정액이 나타나는 원인은 다양합니다. 1.전립선염 정낭염 등 염증이나 감염 전립선 정낭 요도에 염증이나 감염이 있을 경우 혈정액이 발생할 수 있습니다. 2.외상 생식기에 외상을 입은 경우에도 혈정액이 나타날 수 있습니다. 3.혈관 문제 혈관에 문제가 생겨 출혈이 발생하는 경우에도 혈정액이 나타날 수 있습니다. 4.악성 종양 드물지만 전립선암 등의 악성 종양이 원인이 될 수 있습니다. 5.기타 과도한 자위나 격렬한 성행위로 인해 음경 및 회음부 부위에 경미한 외상을 입어 주변부의 작은 혈관이 파열되어 혈정액이 발생할 수 있습니다. 혈정액이 지속적으로 나타나는 경우에는 비뇨기과를 방문하여 검사를 받는 것이 좋습니다.

통증이 없는데 신경치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치과 검진을 가서 엑스레이 촬영 후에 왼쪽 어금니 옆면이 썩어서 신경치료 후에 크라운을 해야한다고 견적을 받았습니다. 통증이 전혀 없는데 신경치료를 하는 경우가 있나요? 충치가 만성으로 오랜 기간동안 진행 된 경우라면 지금은 통증이 없지만 충치 자체는 깊이 진행 되었을 수도 있습니다. 하지만 미심쩍으시다면 치과보존과 전문의나 치과대학병원 보존과에 가셔서 다시 한번 더 검사를 받아보시는 것도 나쁘지 않으실 듯 합니다.

판토가 종류의 일반의약품은 영양제인가요? 치료제인가요? 먹다가 끊으면 머리가 더 빠지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 설명하신 증상으로 보아선 휴지기 탈모증이 의심됩니다. 여성형탈모증은 모발이 많이 빠지는 증상보다는 정수리 부위 모발이 가늘어지는 증상으로 진행이 됩니다. 정수리 모발이 가늘어졌는지는 후두부 모발의 굵기와 비교해 보면 알 수 있습니다. 대학병원으로 의뢰서를 써 주셨으면 대학병원에 가셔서 정확한 진단을 받아 보시는 것이 좋을 것으로 생각합니다. 판타 종류의 약은 영양제입니다. 이런 영양제가 휴지기 탈모증의 경우 치료제 역할을 할 수 있습니다. 판타 종류의 약을 복용하다가 중단한다고 머리가 더 빠지지 않습니다. 판타 종류의 약은 복용하시는 것이 좋을 것으로 생각되고 탈모 치료에서 스테로이드는 원형탈모증에 주로 사용하는 약물이고 휴지기 탈모증이나 여성형 탈모증에는 사용하지 않습니다. 감사합니다.

판토가 종류의 일반의약품은 영양제인가요? 치료제인가요? 먹다가 끊으면 머리가 더 빠지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 설명하신 증상으로 보아선 휴지기 탈모증이 의심됩니다. 여성형탈모증은 모발이 많이 빠지는 증상보다는 정수리 부위 모발이 가늘어지는 증상으로 진행이 됩니다. 정수리 모발이 가늘어졌는지는 후두부 모발의 굵기와 비교해 보면 알 수 있습니다. 대학병원으로 의뢰서를 써 주셨으면 대학병원에 가셔서 정확한 진단을 받아 보시는 것이 좋을 것으로 생각합니다. 판타 종류는 영양제입니다. 이런 영양제가 휴지기 탈모증의 경우 치료제 역할을 할 수 있습니다. 판타 종류의 약을 복용하다가 중단한다고 머리가 더 빠지지 않습니다. 판타 종류의 약은 복용하시는 것이 좋을 것으로 생각되고 탈모 치료에서 스테로이드는 원형탈모증에 주로 사용하는 약물이고 휴지기 탈모증이나 여성형 탈모증에는 사용하지 않습니다. 감사합니다.

갈비뼈 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없으면 골절이 있어도 병원을 안가셔도 됩니다. 살짝의 통증이 있다면 가까운 병원에서 늑골 엑스레이를 찍게 됩니다.

안검하수뇌신경빠른답변바랍니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 병적인 안검하수는 가장 중요한 질환이 중증근무력증이며 그 다음으로는 다발성경화증 시신경염 뇌의 동정맥류 뇌종양등이 심각한 문제들입니다. 여러 다양한 검사들이 가능한데 신경과 진찰에 의해 검사의 종류를 정합니다. 반대측과 비교되는 신경학적 징후를 찾고 그 범위를 좁히는 검사를 하게됩니다.

돌발성난청입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 돌발성 난청은 13은 호전되는 경과를 보이는 데 호전되는 기간은 수주 이상 소요될 수 있습니다. 현재는 치료에 집중하는 수 밖에 없습니다.

얼굴 좌측에서 턱 소리가 납니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 턱관절 외에는 턱하고 느낄 부위가 없습니다. 저작근 중 교근과 익상돌기근을 진찰하여 근육이완치료를 하면 쉽게 호전될 수 있습니다. 보톡스로 해결하는 것도 가능합니다.

복부ct 위대장내시경 혈액검사 이상없다는데 통증이 계속 남아있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀드리조심스럽긴 한데요 검사에서 이상이없이나왔는데 통증이 지속되는 경우는 허리에서 자율신경이 눌러서 불편할 수 있으니 진찰해서 그렇다면 그부분을 치료해볼 수 있습니다 두피염 CRP수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두피염의 염증이 심한정도에 따라 다를 수 있습니다. 심하면 당연히 오를 수 있습니다. 얼마나 높이 올라갔는지요?

뇌 CT 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 청력과는 관련이 없는 부위입니다. 크기가 크지 않고 위치는 신경학적으로 중요한 신경경로와는 관련이 적겠습니다. 미리 걱정하실 필요없이 좋은 결과가 나오길 바랍니다.

오른쪽 갈비뼈 밑 배꼽 우측 누르면 덩어리 만져짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀해주신것만으로 답변은 좀 어렵습니다. 직접 진찰을 해보거나 검사를 통해서 확인이 필요한 상황으로 판단됩니다

땀이 안나는 체질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한의사 선생님께 물어보시면 좀더 확실한 답변을 들으실 수 있을 것 같습니다 땀이 잘 안나는 체질이 건강상으로 좋은지 나쁜지는 단순히 판단하기 어렵습니다. 땀은 체온을 조절하는 중요한 역할을 하기 때문에 적절한 수준의 발汗은 건강에 필수적입니다. 하지만 과도한 발汗은 오히려 체내 수분과 전해질 불균형을 초래하여 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 따라서 땀이 적게 나는 체질이 건강에 미치는 영향은 개인의 건강 상태와 생활 환경에 따라 다르다고 볼 수 있습니다.

한쪽 다리가 너무 아파요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한쪽 다리에만 통증이 있다면 요추 질환이나 무릎 관절 질환 등에 대한 감별이 필요합니다. 정형외과 내원하여 진료를 보시기 바랍니다.

안녕하세요 정신과약 복용 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정신과 약과 투딘은 상호작용이 없는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 투딘을 먹고 10분 정도 후에 정신과 약을 복용해도 별 문제가 없습니다. 다만 투딘을 복용하고 정신과 약을 복용하기 전에 의사나 약사에게 문의하는 것이 좋습니다.

성장호르몬 수치가 높은데요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 비타민 C D 어류 콜라겐 루테인 지아잔틴은 성장호르몬의 분비에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 복용을 해도 괜찮습니다. 2. YIT1 유산균은 조골세포에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 복용을 해도 괜찮습니다. 다만 뇌하수체 선종이 있는 경우는 성장호르몬의 분비가 과다할 수 있으므로 정기적으로 검사를 받아야 합니다. 또한 뇌하수체 선종이 크기가 크거나 성장호르몬의 분비가 심하게 과다할 경우는 수술이나 약물 치료가 필요할 수 있습니다. 따라서 현재의 증상이 심하지 않다고 하더라도 정기적으로 검사를 받아보고 필요할 경우 치료를 받는 것이 좋습니다.

소변pcr검사시 소변을 본 후 급하게 물을먹고 다시 본 소변으로 검사를 해도 문제가 없나요?,
안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변 PCR 검사를 위해 소변을 본 후 물을 마시고 다시 본 소변으로 검사를 하는 것은 문제가 없습니다. 소변 PCR 검사는 소변에 있는 바이러스의 양을 측정하는 검사이기 때문에 소변이 맑거나 진한 정도에는 영향을 받지 않습니다. 다만 소변을 많이 마시면 소변의 농도가 낮아져 검사 결과가 잘 나오지 않을 수 있으므로 소변을 너무 많이 마시는 것은 좋지 않습니다. 소변 PCR 검사를 하기 전에 물을 마셔도 되지만 소변을 너무 많이 마시는 것은 좋지 않습니다.

대변색이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹는거에 영향을 받을 수도 있습니다. 최근 먹는 영양제 혹은 음식 검토해 보세요. 장에서 이동속도가 빨라져 담즙성분이 미처 다 소화되지 못했을 때 녹색변을 보일 수 있습니다. 장염이나 설사시에도 나타날 수 있습니다.

종아리 노란명 단순한 명인가요? 너무 커요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 명일 가능성이 높습니다. 여기저기 여러개 생기거나 지속되면 혈액응고에 관한 검사를 한번 고려해볼 수 있습니다

단순히 체한걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 복통과 설사가 있기 때문에 아마도 장염으로 고생하시는 것 같습니다. 복통이 있는 경우 간혹 혈압이 일시적으로 떨어지면서 나타나는 증상이었을 것으로 생각됩니다

30대 중후반 여자 절개로 피임 수술 후 다시 임신 가능한가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 절제라는 것은 나팔관을 절제했다는 것인가요? 복원수술이 가능한지 진료 받아보시고 성공한다면 가능할 것 같습니다 이것이 안되면 다른 방법으로 시도해보실수도 있을 것 같습니다

흡연으로 인한 혈관 질환이 회복 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 이년밖에 되지 않고 하루 반갑정도 피우셨다고 하니 지금이라도 금연하시면 이전으로 회복되실 것으로 기대합니다

땀이 안나는 체질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한의사 선생님께 물어보시면 좀더 확실한 답변을 들으실 수 있을 것 같습니다 땀이 잘 안나는 체질이 건강상으로 좋은지 나쁜지는 단순히 판단하기 어렵습니다. 땀은 체온을 조절하는 중요한 역할을 하기 때문에 적절한 수준의 발汗은 건강에 필수적입니다. 하지만 과도한 발汗은 오히려 체내 수분과 전해질 불균형을 초래하여 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 따라서 땀이 적게 나는 체질이 건강에 미치는 영향은 개인의 건강 상태와 생활 환경에 따라 다르다고 볼 수 있습니다.

여자친구가 자궁내막증과 근종으로 비잔정을 복용하였는데요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물에 대한 부작용은 개인차이가 있을 수 있습니다. 주치의 선생님과 상의가 필요합니다 흔히 알려진 부작용은 다음과 같습니다 불규칙적인 월경출혈 체중증가 고창배에 가스참 부종 두통 우울증 유방에 통증

미노썬 복용 중 모기발진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀하시는 증상이 미썬과 연관되었을 가능성이 의심된다고 한다면 당연히 약을 중단하고 변경을 고려해보아야 합니다

어느과 진찰을 받아야할지 모르겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 생긴 증상이라고 하면 가정의학과 진료 받아보셔도 괜찮을 것으로 생각됩니다. 최근 많이 무리하거나 스트레스가 많았을까요? 잠은 잘 자나요? 운동은 규칙적으로 하시나요?

소변중 쿠퍼엑,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변을 누는 중에 마지막에 케겔운동 하듯이 힘을주면 점액질 액이 나오는군요. 쿠퍼엑의 가능성은 거의 없습니다. 크게 걱정하지 마시고 비뇨기와 진료를 한번 받도록 하십시오.

종아리 노란명 단순한 명인가요? 너무 커요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 명일 가능성이

높습니다. 여기저기 여러개 생기거나 지속되면 혈액응고에 관한 검사를 한번 고려해볼 수 있습니다

영당이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상은 좌골신경통에 의한 것으로 보입니다. 척추 디스크에 의한 신경압박때문은 아닌지 정형외과 진료 보시기 추천드립니다.

갑상선 항진증에 걸린 상태에서 감기에 걸릴 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선항진증 및 갑상선기능저하증 등 갑상선과 상관 없이 감기에 걸릴 수 있습니다. 증상 지속시 내과 진료 권유합니다

배변 시 출혈과 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상으로 봐서는 치열항문이 찢어지는 질환이 발생된 것으로 의심됩니다. 항문에 문제가 없는 사람이라도 변이 단단하고 굵게 나올 때 가끔 치열이 발생할 수 있는데 부드러운 배변을 위하여 섬유질과 수분 섭취를 많이하고 변 부드럽게 하는 약을 쓰고 하면 대부분 좋아지는데 그런 것을 급성치열이라고 합니다. 반면 괄약근 압력이 높거나 진행된 치핵치질이 있는 분들은 찢어지는 것이 반복되어 염증 반응이 진행되면서 상처가 낫지 않고 계속 심해져서 궤양 같은 것이 생기게 되는데 그런 것을 만성치열이라고 합니다. 이런 경우엔 수술적 치료가 필요하게 됩니다. 만약 증상이 지속되거나 반복되면 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

아침에 장이 꼬이는것 같은 복통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성 대장증후군 등의 가능성이 높을듯합니다만 증상이 지속된다면 정확한 확인 위해 가까운 내과 진료 권유합니다

단순히 체한걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 복통과 설사가 있기 때문에 아마도 장염으로 고생하시는 것 같습니다. 복통이 있는 경우 간혹 혈압이 일시적으로 떨어지면서 나타나는 증상이었을 것으로 생각됩니다

땀냄새,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 원인을 찾기는 어렵울것 같습니다. 암내는 아니죠? 암내는 수술을 해야 합니다 땀에서 냄새가 나는 이유는 다음과 같습니다. 땀 자체의 냄새 땀은 99가 물로 이루어져 있으며 나머지 1는 소금 칼륨 질소 함유물 젖산 등의 성분으로 구성되어 있습니다. 이러한 성분들이 냄새를 유발할 수 있습니다. 세균과 박테리아 땀을 많이 흘리면 세균과 박테리아가 번식하기 좋은 환경이 됩니다. 이들이 땀에 포함된 단백질과 지방을 분해하면서 냄새 나는 화합물을 생성합니다. 각질 발에 땀이 나면 각질이 불어나게 되고 세균이 불어난 각질을 갇아 먹으면서 이소발레릭산 등의 악취를 풍기는 화학 물질을 생성합니다. 식습관 고지방 고칼로리 음식은 땀샘 분비를 촉진하고 체취를 강하게 만듭니다. 반면에 항산화 성분이 풍부한 채소와 과일은 산화 방지를 도와 땀 냄새를 줄이는 데 도움이 됩니다. 질환 일부 질환은 땀 냄새를 악화시킬 수 있습니다. 예를 들어 당뇨병이나 신장 질환 등이 땀 냄새에 영향을 미칠 수 있습니다. 스트레스 스트레스가 많은 상황에서도 땀 냄새가 강해질 수 있습니다. 이는 스트레스 호르몬인 코르티솔이 땀 분비를 증가시키기 때문입니다. 기타 흡연 음주 약물 등도 땀 냄새에 영향을 미칠 수 있습니다.

손목이랑 손가락이 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손이나 팔을 많이 사용하는 일을 하거나 운동을 하시나요? 반복적으로 나타나거나 심해지면 진찰을 자세하게 해봐야 할 것 같습니다.

땀이 안나는 체질,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한의사 선생님께 물어보시면 좀더 확실한 답변을 들으실 수 있을 것 같습니다 땀이 잘 안나는 체질이 건강상으로 좋은지 나쁜지는 단순히 판단하기 어렵습니다. 땀은 체온을 조절하는 중요한 역할을 하기 때문에 적절한 수준의 발한은 건강에 필수적입니다. 하지만 과도한 발한은 오히려 체내 수분과 전해질 불균형을 초래하여 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 따라서 땀이 적게 나는 체질이 건강에 미치는 영향은 개

인의 건강 상태와 생활 환경에 따라 다르다고 볼 수 있습니다.

성병 문의드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 가능성은 있습니다 2. 네 낮습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쿠퍼엑 자체로는 임신 가능성이 낮지만 사정 전에 나오는 쿠퍼엑에 정자가 일부 섞여 있을 수 있습니다. 임신 가능성은 매우 낮지만 0는 아닙니다.

관계 일주일 후 임신 증상인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리임태기를 사용하면 관계후 810일 지나면 결과를 알 수 있습니다. 이번 일요일이 되어도 일주밖에 안되니 알기 어렵습니다. 임신증상으로 보기는 어렵습니다

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쿠퍼엑만으로 임신은 어렵다고는 하지만 전혀 가능성이 없는 것은 아니라고 합니다. 피임은 항상 확실하게 하시는 것이 필요합니다.

경구피임약 사용후 생리 늦춰짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 당장 진료가 필요한 것은 아니지만 생리가 계속 미뤄지면 임신가능성을 생각해서 임태기나 산부인과 진료가 필요합니다 이거 헤르페스인가요 아니면 또다른 성병인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계한지는 4주정도 되었고 생식기를 불안해서 엄청 자주만지긴 했군요. 3일전부터 생식기가 느낌이 뭔가 이상하고 따갑고 오늘보니 사진에 보는거와 같이 빨게져있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

소변중 쿠퍼엑,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변을 누는 중에 마지막에 케겔운동 하듯이 힘을주면 점액질 액이 나오는군요. 쿠퍼엑의 가능성은 거의 없습니다. 크게 걱정하지 마시고 비뇨기와 진료를 한번 받도록 하십시오.

배변 시 출혈과 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상으로 봐서는 치열항문이 찢어지는 질환이 발생된 것으로 의심됩니다. 항문에 문제가 없는 사람이라도 변이 단단하고 굵게 나올 때 가끔 치열이 발생할 수 있는데 부드러운 배변을 위하여 섬유질과 수분 섭취를 많이하고 변 부드럽게 하는 약을 쓰고 하면 대부분 좋아지는데 그런 것을 급성치열이라고 합니다. 반면 괄약근 압력이 높거나 진행된 치핵치질이 있는 분들은 찢어지는 것이 반복되어 염증 반응이 진행되면서 상처가 낫지 않고 계속 심해져서 궤양 같은 것이 생기게 되는데 그런 것을 만성치열이라고 합니다. 이런 경우엔 수술적 치료가 필요하게 됩니다. 만약 증상이 지속되거나 반복되면 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

안녕하세요 이거 매독 궤양 전조증상 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독 전조 증상일 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

암 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프절 전이 여부에 따라 병기가 달라지지만 폐암도 조직학적 분류가 다양하기 때문에 완치가 안된다고 단정 짓기는 어렵습니다. 최종 결과 확인 후 치료를 결정하게 됩니다.

갈비뼈 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없으면 골절이 있어도 병원을 안가셔도 됩니다. 살짝의 통증이 있다면 가까운 병원에서 늑골 엑스레이를 찍게 됩니다.

배변 시 출혈과 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상으로 봐서는 치열항문이 찢어지는 질환이 발생된 것으로 의심됩니다. 항문에 문제가 없는 사람이라도 변이 단단하고 굵게 나올 때 가끔 치열이 발생할 수 있는데 부드러운 배변을 위하여 섬유질과 수분 섭취를 많이하고 변 부

드럽게 하는 약을 쓰고 하면 대부분 좋아지는데 그런 것을 급성치열이라고 합니다. 반면 괄약근 압력이 높거나 진행된 치핵치질이 있는 분들은 찢어지는 것이 반복되어 염증 반응이 진행되면서 상처가 낫지 않고 계속 심해져서 궤양 같은 것이 생기게 되는데 그런 것을 만성치열이라고 합니다. 이런 경우엔 수술적 치료가 필요하게 됩니다. 만약 증상이 지속되거나 반복되면 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

저한테 모든 벌레가 꼬입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 벌레가 특정 사람에게 꼬이는 이유는 알기 어려울거 같네요 특정 체취에 의한 것일수 있고 체온이나 피부색깔 옷색깔에 의해서도 있고요. 예방차원에서 외출시 벌레 퇴치제를 사용해보거나 보통 벌레가 싫어하는 밝은 색상의 옷을 입고 외출하시는게 좋겠네요.

성관계 이후 통증 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부 자극으로 인한 일시적인 증상일 가능성이 높습니다. 청결을 유지해주시고 자극이 심하면 냉찜질을 하거나 보습제를 사용해보세요. 며칠 안에 호전되지 않고 피부증상이 심해지면 피부과진료 보시기 바랍니다.

후두경에 설편도 부종? 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 후두염으로 일시적으로 편도가 부어오른 것 같습니다. 약물치료 잘하시고 자극적인 음식매운거 탄산..은 피하시고 건강관리 잘하시기 바랍니다. 염증이 좋아지면 자연스레 좋아질수 있습니다.

엉덩이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상은 좌골신경통에 의한 것으로 보입니다. 척추 디스크에 의한 신경압박때문은 아닌지 정형외과 진료 보시기 추천드립니다.

소변pcr검사시 소변을 본 후 급하게 물을먹고 다시 본 소변으로 검사를 해도 문제가 없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변 PCR 검사를 위해 소변을 본 후 물을 마시고 다시 본 소변으로 검사를 하는 것은 문제가 없습니다. 소변 PCR 검사는 소변에 있는 바이러스의 양을 측정하는 검사이기 때문에 소변이 맑거나 진한 정도에는 영향을 받지 않습니다. 다만 소변을 많이 마시면 소변의 농도가 낮아져 검사 결과가 잘 나오지 않을 수 있으므로 소변을 너무 많이 마시는 것은 좋지 않습니다. 소변 PCR 검사를 하기 전에 물을 마셔도 되지만 소변을 너무 많이 마시는 것은 좋지 않습니다.

암 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프절 전이 여부에 따라 병기가 달라지지만 폐암도 조직학적 분류가 다양하기 때문에 완치가 안된다고 단정 짓기는 어렵습니다. 최종 결과 확인 후 치료를 결정하게 됩니다.

심인성 어지럼증 약물치료 문의입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 약물 치료를 하더라도 결국 심리적인 문제가 호전되어야 증상이 좋아질 수 있습니다. 단기간에 좋아지기는 어렵습니다.

스테로이드 연고 사용을 줄이면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스테로이드 연고는 경구 스테로이드에 비해 부작용이 심하지 않으므로 충분 기간 사용하고 병변이 완전히 호전되면 중단하는 것을 권해드립니다.

오른쪽 갈비뼈 밑 배꼽 우측 누르면 덩어리 만져짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀해주신것만으로 답변은 좀 어렵습니다. 직접 진찰을 해보거나 검사를 통해서 확인이 필요한 상황으로 판단됩니다

이거 헤르페스인가요 아니면 또다른 성병인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계한지는 4주정도 되었고 생식기를 불안해서 엄청 자주만지긴 했군요. 3일전부터 생식기가 느낌이 먼가 이상하고 따갑고 오늘보니 사진에 보는거와 같이 빨게져있군요. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

두피염 CRP수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두피염의 염증이 심한정도에 따라 다를 수 있습니다. 심하면 당연히 오를 수 있습니다. 얼마나 높이 올라갔는지요?

각막쪽 진료를 받아봐야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 아마도 결석제거후에 상처나 염증이 남아있어서 그런것이 아닌가 의심스럽습니다. 약사용하면서 경과를 지켜보श्य

소변중 쿠퍼엑,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변을 누는 중에 마지막에 케겔운동 하듯이 힘을주면 점액질 액이 나오는군요. 쿠퍼엑의 가능성은 거의 없습니다. 크게 걱정하지 마시고 비뇨기와 진료를 한번 받도록 하십시오.

안녕하세요 이거 매독 궤양 전조증상 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독 전조 증상일 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

구강 내 어두운 반점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 질문자 분께서 올려주신 구강 내 사진을 보면 이상 소견이 보이지 않는 듯 합니다. 사진의 화질 및 각도에 따라 다르게 보일 수 있는 부분이 있으므로 가까운 치과에 방문하셔서 검진하는 것을 추천드립니다.

마지막 신경치료 후 임시치아,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경치료 마무리 시에는 신경 치료를 위해 치아에 났던 구멍을 다시 채우는 과정을 진행합니다. 그 과정이 마무리 되면 치아를 씹우는 보철크라운 치료를 진행합니다. 크라운 제작을 위한 치아 삭제 후 귀가 시에 임시치아를 제작해드립니다. 일반적인 과정이니 걱정하지 않으셔도 될듯 합니다.

급성만성 췌장염이랑 관련있을까요...?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀하시는 증상으로 급성 또는 만성췌장염을 의심하는것은 무리가 있다고 판단됩니다. 아마도 통증부위의 척추근육의 문제일 가능성이 높습니다

베타차단제 복용 후 수면내시경,안녕하세요. 메디이즈입니다. 테민 드시면서 수면내시경은 크게 문제는 없을 것으로 생각합니다. 검사전에 미리 복용사실을 알리고 상의해보श्य

피부암인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 손으로 많이 만졌다고 하니 이로인한 염증반응으로 색소침착이 생기고 약간 부풀어오른것처럼 보입니다. 피부암은 아닌것 같습니다

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쿠퍼엑 자체로는 임신 가능성이 낮지만 사정 전에 나오는 쿠퍼엑에 정자가 일부 섞여 있을 수 있습니다. 임신 가능성은 매우 낮지만 0는 아닙니다.

빨리 내시경검사를 해봐야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 내시경검사를 하셔서 출혈이 있는지 있으면 위치와 원인을 찾는 것이 필요해 보입니다. 체중이 늘어나니 다행이 나쁜병이 있는 것은아닌것 같습니다

경구피임약 사용후 생리 늦춰짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 당장 진료가 필요한 것은 아니지만 생리가 계속 미뤄지면 임신가능성을 생각해서 임태기나 산부인과 진료가 필요합니다 임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쿠퍼엑만으로 임신은 어렵다고는 하지만 전혀 가능성이 없는 것은 아니라고 합니다. 피임은 항상 확실하게 하시는 것이 필요합니다.

관계 일주일 후 임신 증상인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리임태기를 사용하면 관계후 810일 지나면 결과를 알 수 있습니다. 이번 일요일이 되어도 일주밖에 안되니 알기 어렵습니다. 임신증상으로 보기는 어렵습니다

네오덱스 안연고 부작용 없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기간을 정할 수는 없지만 필요한 단기간 사용을 권합니다 찾아보니 이런 부작용이 있다고 합니다. 일상적인 상황에서는 부

작용은 드문편입니다 전신 투여 자주 일어나는 부작용 위장관계 식욕증가 소화불량 중추신경계 불면 초조 가끔 일어나는 부작용 내분비계 및 대사 당뇨병 다모증hirsutism 관절통 비출혈 눈 백내장 드물게 일어나는 부작용 근신경 및 골격계 근육 소모muscle wasting 내분비계 및 대사 무월경증 나트륨과 물의 저류 Cushing 증후군 고혈당증 골bone 성장 지체 위장관계 복부 팽만감 궤양성 식도염 췌장염 소화성 궤양 중추신경계 경련 정신병 mood swings 두통 섬망delirium 환각hallucinations 도취감euphoria 피부 피부위축 타박상 색소 침착hyperpigmentation 여드름 기타 과민반응 국소 적용 드물게 일어나는 부작용 국소 작열감burning 소양증 자극감 건조감 소포염folliculitis 다모증hypertrichosis 여드름 형태의 발진acneiform eruptions 색소감소증hypopigmentation 입주위의 피부염 알러지성 접촉성 피부염 피부 연화maceration 이차 감염 피부 위축 striae 땀띠miliaria

남자 민감한 부위 점제거 관련 질문있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부과나 비뇨기과 모두 진료가 가능합니다. 하지만 내원 전에 병원에 미리 문의를 하는 것이 가장 정확합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

남자친구 요도염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1 대부분은 성매개 질환이라고 생각됩니다 2. 상재균으로 있다가 증상이 나타났는지 명확하게 알기는 어렵지만 증상이 나타나면 일단 치료가 필요합니다

왼쪽 팔다리 힘 빠지는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경외과에서 이상이 없다는 소견을 들었다면 신경과 진료를 보는 것을 권해드립니다. 신경과적 질환에 대한 감별이 필요하기 때문입니다.

진료기록 적을때,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반드시 그럴 필요는 없고 담당의가 가장 알아 보기 쉬운 용어로 기록합니다. 담당의의 주관적인 성향으로 생각됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

관계 후 10일 이후 임신 증상 뭐가 있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 관계 후 10일 정도 지난 상태에서 임신이 되었다하더라도 임신이라고 이야기할만한 특징적인 증상이 나타나기는 어려울듯합니다. 2주 이상 지나 임신테스트 권유합니다

윗배 동그란 무언가가 만져짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위장관의 움직임일 수도 있고 실제 피하 종양일 수도 있어 상기 증상이 나타나는 부위에 대하여 초음파 검사를 해 보는 것을 권합니다.

기흉 시술후 후유증 관련문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 환자분의 진찰이라던지 흉부 영상이 있지 않아 객관적인 판단은 일단 어려우나 주치의의 의견이 그러하다면 다시 주치의에게 방문해 보시는게 좋겠네요

감정조절 능력에 문제가 생긴건지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감정의 기복이 심하다면 우울증과 같은 질환의 증상일 수 있습니다. 좀 더 지켜보고 호전이 없다면 정신건강의학과 진료를 권해드립니다.

한쪽 다리가 너무 아파요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한쪽 다리에만 통증이 있다면 요추 질환이나 무릎 관절 질환 등에 대한 감별이 필요합니다. 정형외과 내원하여 진료를 보시기 바랍니다.

청소년기에 코파는 습관,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흔한 습관이라고 보기는 어려울듯합니다 다만 자는 동안 지속적으로 코를 판다면 장갑을 끼고 주무셔보는것도 도움이 될듯합니다

경구피임약 하루 빼먹은 날 관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 우선 빼먹은 날 이후 제대로 복용했고 그때가 생리 시작 얼마 안되는 날이어서 피임은 되었을것으로 생각됩니다. 만약에 이

번주기에 다시 빼먹는 날이 생긴다면 피임효과가 떨어질수 있으니 제대로 복용을 권고드립니다. 다시 빼먹게 된다면 그 주기는 다른 피임방법콘돔으로 피임을 하고 약을 중단한후 생리를 유도한후에 생리시작일부터 다시 복용하도록 하세요.

남자인데 가슴이 이상합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 남성도 유방 질환이 발생할 수 있으므로 초음파 검사가 가능한 병원 내원하여 진료를 보시는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

안녕하세요 이거 매독 궤양 전조증상 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독 전조 증상일 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

청소년기에 코파는 습관,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흔한 습관이라고 보기는 어려울듯합니다만 자는 동안 지속적으로 코를 판다면 장갑을 끼고 주무셔보는것도 도움이 될듯합니다

관계 후 10일 이후 임신 증상 뭐가 있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 관계 후 10일 정도 지난 상태에서 임신이 되었다하더라도 임신이라고 이야기할만한 특징적인 증상이 나타나는 어려울듯합니다. 2주 이상 지나 임신테스트 권유합니다

기흉 시술후 후유증 관련문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 환자분의 진찰이라던지 흉부 영상이 있지 않아 객관적인 판단은 일단 어려우나 주치의의 의견이 그러하다면 다시 주치의에게 방문해 보시는게 좋겠네요

아침에 장이 꼬이는것 같은 복통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성 대장증후군 등의 가능성이 높을듯합니다만 증상이 지속된다면 정확한 확인 위해 가까운 내과 진료 권유합니다

갑상선 항진증에 걸린 상태에서 감기에 걸릴 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선항진증 및 갑상선기능저하증 등 갑상선과 상관 없이 감기에 걸릴 수 있습니다. 증상 지속시 내과 진료 권유합니다

남자친구 요도염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1 대부분은 성매개 질환이라고 생각됩니다 2. 상재균으로 있다가 증상이 나타났는지 명확하게 알기는 어렵지만 증상이 나타나면 일단 치료가 필요합니다

땀냄새,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 원인을 찾기는 어렵울것 같습니다. 암내는 아니죠? 암내는 수술을 해야 합니다 땀에서 냄새가 나는 이유는 다음과 같습니다. 땀 자체의 냄새 땀은 99가 물로 이루어져 있으며 나머지 1는 소금 칼륨 질소 함유물 젖산 등의 성분으로 구성되어 있습니다. 이러한 성분들이 냄새를 유발할 수 있습니다. 세균과 박테리아 땀을 많이 흘리면 세균과 박테리아가 번식하기 좋은 환경이 됩니다. 이들이 땀에 포함된 단백질과 지방을 분해하면서 냄새 나는 화합물을 생성합니다. 각질 발에 땀이 나면 각질이 불어나게 되고 세균이 불어난 각질을 갉아 먹으면서 이소발레릭산 등의 악취를 풍기는 화학 물질을 생성합니다. 식습관 고지방 고칼로리 음식은 땀샘 분비를 촉진하고 체취를 강하게 만듭니다. 반면에 항산화 성분이 풍부한 채소와 과일은 산화 방지를 도와 땀 냄새를 줄이는 데 도움이 됩니다. 질환 일부 질환은 땀 냄새를 악화시킬 수 있습니다. 예를 들어 당뇨병이나 신장 질환 등이 땀 냄새에 영향을 미칠 수 있습니다. 스트레스 스트레스가 많은 상황에서도 땀 냄새가 강해질 수 있습니다. 이는 스트레스 호르몬인 코르티솔이 땀 분비를 증가시키기 때문입니다. 기타 흡연 음주 약물 등도 땀 냄새에 영향을 미칠 수 있습니다.

여자친구가 자궁내막증과 근종으로 비잔정을 복용하였는데요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물에 대한 부작용은 개인차이가 있을 수 있습니다. 주치의 선생님과 상의가 필요합니다 흔히 알려진 부작용은 다음과 같습니다 불규칙적인 월경출혈 체중증가 고창배에 가스참 부종 두통

우울증 유방에 통증

베타차단제 복용 후 수면내시경,안녕하세요. 메디이즈입니다. 테민 드시면서 수면내시경은 크게 문제는 없을 것으로 생각합니다. 검사전에 미리 복용사실을 알리고 상의해보셔야

혈변 습관 및 개선 수단 문의 여쭙니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료 받은 소견대로라면 치열항문이 찢어지는 질환이 발생된 것으로 의심됩니다. 항문에 문제가 없는 사람이라도 변이 단단하고 굵게 나올 때 가끔 치열이 발생할 수 있는데 부드러운 배변을 위하여 섬유질과 수분 섭취를 많이하고 변 부드럽게 하는 약을 쓰고 하면 대부분 좋아지는데 그런 것을 급성치열이라고 합니다. 반면 괄약근 압력이 높거나 진행된 치핵치질이 있는 분들은 찢어지는 것이 반복되어 염증 반응이 진행되면서 상처가 낫지 않고 계속 심해져서 궤양 같은 것이 생기게 되는데 그런 것을 만성치열이라고 합니다. 이런 경우엔 수술적 치료가 필요하게 됩니다. 수술 얘기가 나오지 않았다면 아직 만성은 아닐 것으로 생각되며 그렇다면 위에서 말씀 드린대로 식단조절과 약물치료하면서 경과 관찰 하시기 바랍니다. 증상이 좋아지지 않으면 다시 방문해 보시기 바랍니다. 감사합니다.

갑상선 항진증에 걸린 상태에서 감기에 걸릴 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상선항진증 및 갑상선기능저하증 등 갑상선과 상관 없이 감기에 걸릴 수 있습니다. 증상 지속시 내과 진료 권유합니다

30대 중후반 여자 절개로 피임 수술 후 다시 임신 가능한가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 절제라는 것은 나팔관을 절제했다는 것인가요? 복원수술이 가능한지 진료 받아보시고 성공한다면 가능할 것 같습니다 이것이 안되면 다른 방법으로 시도해보실수도 있을 것 같습니다

흡연으로 인한 혈관 질환이 회복 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 이년밖에 되지 않고 하루 반갑정도 피우셨다고 하니 지금이라도 금연하시면 이전으로 회복되실 것으로 기대합니다

피부암인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 손으로 많이 만졌다고 하니 이로인한 염증반응으로 색소침착이 생기고 약간 부풀어오른것처럼 보입니다. 피부암은 아닌것 같습니다

남자친구 요도염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1 대부분은 성매개 질환이라고 생각합니다 2. 상재균으로 있다가 증상이 나타났는지 명확하게 알기는 어렵지만 증상이 나타나면 일단 치료가 필요합니다

성장호르몬 수치가 높은데요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 비타민 C D 어류 콜라겐 루테인 지아잔틴은 성장호르몬의 분비에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 복용을 해도 괜찮습니다. 2. YTT 유산균은 조골세포에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 복용을 해도 괜찮습니다. 다만 뇌하수체 선종이 있는 경우는 성장호르몬의 분비가 과다할 수 있으므로 정기적으로 검사를 받아야 합니다. 또한 뇌하수체 선종이 크기가 크거나 성장호르몬의 분비가 심하게 과다할 경우는 수술이나 약물 치료가 필요할 수 있습니다. 따라서 현재의 증상이 심하지 않다고 하더라도 정기적으로 검사를 받아보고 필요할 경우 치료를 받는 것이 좋습니다.

임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쿠퍼엑 자체로는 임신 가능성이 낮지만 사정 전에 나오는 쿠퍼엑에 정자가 일부 섞여 있을 수 있습니다. 임신 가능성은 매우 낮지만 0는 아닙니다.

근막통에 항정신성약물을 복용해도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근막통증 증후군은 신경 전달 물질에 의해 영향을 받으므로 항불안제 등을 치료로 사용하기도 합니다. 따라서 호전이 있다면 치료를 지속하기 바랍니다.

손목이랑 손가락이 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손이나 팔을 많이 사용하는 일을 하거나 운동을 하시나요? 반복적으로 나타나거나 심해지면 진찰을 자세하게 해봐야 할 것 같습니다.

급성만성 췌장염이랑 관련있을까요...?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀하시는 증상으로 급성 또는 만성췌장염을 의심하는것은 무리가 있다고 판단됩니다. 아마도 통증부위의 척추근육의 문제일 가능성이 높습니다

미노썬 복용 중 모기발진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀하시는 증상이 미썬과 연관되었을 가능성이 의심된다고 한다면 당연히 약을 중단하고 변경을 고려해보아야 합니다

소변pcr검사시 소변을 본 후 급하게 물을먹고 다시 본 소변으로 검사를 해도 문제가 없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변 PCR 검사를 위해 소변을 본 후 물을 마시고 다시 본 소변으로 검사를 하는 것은 문제가 없습니다. 소변 PCR 검사는 소변에 있는 바이러스의 양을 측정하는 검사이기 때문에 소변이 맑거나 진한 정도에는 영향을 받지 않습니다. 다만 소변을 많이 마시면 소변의 농도가 낮아져 검사 결과가 잘 나오지 않을 수 있으므로 소변을 너무 많이 마시는 것은 좋지 않습니다. 소변 PCR 검사를 하기 전에 물을 마셔도 되지만 소변을 너무 많이 마시는 것은 좋지 않습니다.

경구피임약 사용후 생리 늦춰짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 당장 진료가 필요한 것은 아니지만 생리가 계속 미뤄지면 임신가능성을 생각해서 임태기나 산부인과 진료가 필요합니다 임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 쿠퍼엑만으로 임신은 어렵다고는 하지만 전혀 가능성이 없는 것은 아니라고 합니다. 피임은 항상 확실하게 하시는 것이 필요합니다.

관계 일주일 후 임신 증상인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리임태기를 사용하면 관계후 810일 지나면 결과를 알 수 있습니다. 이번 일요일이 되어도 일주밖에 안되니 알기 어렵습니다. 임신증상으로 보기는 어렵습니다

침 안삼키면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에 페리스젤을 사용해보신적이 있으시다고 하면 큰 문제는 없을 것 같습니다 이번이 처음이라면 페리스젤에 민감하신 분일 수 있습니다.

네오덱스 안연고 부작용 없나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기간을 정할 수는 없지만 필요한 단기간 사용을 권합니다 찾아보니 이런 부작용이 있다고 합니다. 일상적인 상황에서는 부작용은 드문편입니다 전신 투여 자주 일어나는 부작용 위장관계 식욕증가 소화불량 중추신경계 불면 초조 가끔 일어나는 부작용 내분비계 및 대사 당뇨병 다모증hirsutism 관절통 비출혈 눈 백내장 드물게 일어나는 부작용 근신경 및 골격계 근육 소모muscle wasting 내분비계 및 대사 무월경증 나트륨과 물의 저류 Cushing 증후군 고혈당증 골bone 성장 지체 위장관계 복부 팽만감 궤양성 식도염 췌장염 소화성 궤양 중추신경계 경련 정신병 mood swings 두통 섬망delirium 환각hallucinations 도취감euphoria 피부 피부위축 타박상 색소 침착hyperpigmentation 여드름 기타 과민반응 국소 적용 드물게 일어나는 부작용 국소 작열감burning 소양증 자극감 건조감 소포염folliculitis 다모증hypertrichosis 여드름 형태의 발진acneiform eruptions 색소감소증hypopigmentation 입주위의 피부염 알러지성 접촉성 피부염 피부 연화maceration 이차 감염 피부 위축 striae 땀띠miliaria

빨리 내시경검사를 해봐야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 내시경검사를 하셔서 출혈이 있는지 있으면 위치와 원인을 찾는 것이 필요해 보입니다. 체중이 늘어나니 다행이 나쁜병이 있는 것은아닌것 같습니다

안검하수뇌신경빠른답변바랍니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병적인 안검하수는 가장 중요한 질환이 중증근무력증이며 그 다음으로는 다발성경화증 시신경염 뇌의 동정맥류 뇌종양등이

심각한 문제들입니다. 여러 다양한 검사들이 가능한데 신경과 진찰에 의해 검사의 종류를 정합니다. 반대측과 비교되는 신경학적 징후를 찾고 그 범위를 좁히는 검사를 하게됩니다.

약 4시간 전 물파스를 손가락에 바르고 몇 십분 뒤...안녕하세요. 메디이즈입니다. 물파스를 왜 바르셨을까요? 물파스에 의한 자극증상일 수도 있고 아니면 손가락에 상처가 있을 수도 있습니다. 큰 문제는 아닐것 같습니다.

철분수치 감소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈색소 13 이상이므로 빈혈이 아닙니다. 단순 철분 저하는 철분제 복용의 적응증이 아니므로 현재 검사 수치에 대하여 걱정할 필요는 없습니다.

아침에 장이 꼬이는것 같은 복통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성 대장증후군 등의 가능성이 높을듯합니다만 증상이 지속된다면 정확한 확인 위해 가까운 내과 진료 권유합니다

아침에 장이 꼬이는것 같은 복통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성 대장증후군 등의 가능성이 높을듯합니다만 증상이 지속된다면 정확한 확인 위해 가까운 내과 진료 권유합니다

종아리 노란명 단순한 명인가요? 너무 커요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 명일 가능성이 높습니다. 여기저기 여러개 생기거나 지속되면 혈액응고에 관한 검사를 한번 고려해볼 수 있습니다

손가락 봉합후 실데나필 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실나필을 복용한다고 해서 상처 부위가 빨리 회복되지는 않습니다. 따라서 실나필을 현 상황에서 복용할 이유는 없습니다.

이불 코팅제 성분이 폐에 들어가서 남아있을 수도 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이불코팅제 성분과 연관은 별로 없어 보입니다. 결과 보러 가셔서 이것에 대하여 주치의 선생님과 상의한번 해보셔요

임신준비 중 방광염약 네프신 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 임신이 이루어지지 않았다면 크게 문제가 되지 않습니다. 따라서 사후 피임약을 복용하는 것이 큰 도움은 되지 않습니다.

담석증 토마토 문이드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담석증이 있을 경우 토마토를 복용한다고 해서 담석에 영향을 미치지지는 않습니다. 따라서 걱정하지 말고 섭취해도 되겠습니다.

잠드려 하면 불특정하게 움찔거려 깡니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분의 수면장애는 깊은 수면에 들지 않는 경우가 많습니다. 카페인등 수면에 방해를 주는 음식을 주의하시고 가벼운 운동을 해보셔요

곤지름인가요 ...? 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이 관찰되어 HPV 검사에서 음성이더라도 제거가 필요하겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이것도 알레르기인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 음식을 다 먹고 나서 증상이 있다면 알려지 보다는 메밀 성분 자체에 의한 반응 가능성이 높습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

감기몸살일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피검사로 염증의 유무를 확인해 보시는게 좋겠습니다. 특별히 염증이 아니라면 증상완화제를 복용하면서 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

단순히 체한걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 복통과 설사가 있기 때문에 아마도 장염으로 고생하시는 것 같습니다. 복통이 있는 경우 간혹 혈압이 일시적으로 떨어지면서 나타나는 증상이었을 것으로 생각됩니다

아침 객혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 객혈이 있는 경우에는 결핵 기관지확장증 폐암을 감별해야 합니다. 심한 급성 기관지염에서도 객혈이 있을 수 있으나 원인을 감별해야 합니다

얼굴 흉터 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼마나 오래된 상처인가에 따라 다른데 오래되지 않은것이라고하면 손대지 말고 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다. 좋아지지 않으면 치료를 받아보셔요

20대 중반 맥압이 걱정됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 맥압의 차이는 있으나 실신과 같은 증상이 따로 없다면 일단은 경과를 지켜 보셔도 될꺼 같습니다. 정기적인 혈압을 체크해 보시기 바랍니다.

혈변 습관 및 개선 수단 문의 여쭙니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료 받은 소견대로라면 치열항문이 찢어지는 질환이 발생된 것으로 의심됩니다. 항문에 문제가 없는 사람이라도 변이 단단하고 굵게 나올 때 가끔 치열이 발생할 수 있는데 부드러운 배변을 위하여 섬유질과 수분 섭취를 많이하고 변 부드럽게 하는 약을 쓰고 하면 대부분 좋아지는데 그런 것을 급성치열이라고 합니다. 반면 괄약근 압력이 높거나 진행된 치핵치질이 있는 분들은 찢어지는 것이 반복되어 염증 반응이 진행되면서 상처가 낫지 않고 계속 심해져서 궤양 같은 것이 생기게 되는데 그런 것을 만성치열이라고 합니다. 이런 경우엔 수술적 치료가 필요하게 됩니다. 수술 얘기가 나오지 않았다면 아직 만성은 아닐 것으로 생각되며 그렇다면 위에서 말씀 드린대로 식단조절과 약물치료하면서 경과 관찰 하시기 바랍니다. 증상이 좋아지지 않으면 다시 방문해 보시기 바랍니다. 감사합니다.

손가락 봉합후 실나필 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실나필을 복용한다고 해서 상처 부위가 빨리 회복되지는 않습니다. 따라서 실나필을 현 상황에서 복용할 이유는 없습니다.

저 성대결절 인가요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상은 성대 결절 가능성이 있지만 성대에 실제 결절 유무를 확인해야 합니다. 성대 결절이 악성화하지는 않으나 후두암이 성대 결절처럼 보일 수 있습니다.

어느과 진찰을 받아야할지 모르겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 생긴 증상이라고 하면 가정의학과 진료 받아보셔도 괜찮을 것으로 생각됩니다. 최근 많이 무리하거나 스트레스가 많았을까요? 잠은 잘 자나요? 운동은 규칙적으로 하시나요?

철분수치 감소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈색소 13 이상이므로 빈혈이 아닙니다. 단순 철분 저하는 철분제 복용의 적응증이 아니므로 현재 검사 수치에 대하여 걱정할 필요는 없습니다.

아침에 장이 꼬이는것 같은 복통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성 대장증후군 등의 가능성이 높을듯합니다만 증상이 지속된다면 정확한 확인 위해 가까운 내과 진료 권유합니다
근막통에 항정신성약물을 복용해도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근막통증 증후군은 신경 전달 물질에 의해 영향을 받으므로 항불안제 등을 치료로 사용하기도 합니다. 따라서 호전이 있다면 치료를 지속하기 바랍니다.

어머니 식습관,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식습관을 가능하면 교정하신느게 좋겠습니다. 과도한 식사나 금식은 당뇨의 조절에 도움을 주지 않고 악영향을 줄 수 있습니다.

원형탈모 진행상황?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원형탈모 치료 중이라하더라도 조금 더 커지거나 다른 부위에도 발생할 수 있습니다. 흰머리가 올라오는 것은 흔한 증상이며 치료가 되고 있는 과정입니다. 스테로이드 주사는 2주 간격 4회 이내가 좋지만 6회 정도 까지 투여하는 경우도 있습니다. 감사합니다.

얼굴 피부 색소침착 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착의 경우 회복하는데 2개월에서 6개월정도의 시간이 필요합니다. 일단 경과를 지켜 보시는 편이 유리하겠습니다. 감사합니다.

귀두포피염 일까요?사진첨부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두포피염의 소견으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

성기 기동에 딱딱한 피지같은게 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종 등의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

새벽에 자주 깡니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 새벽에 자주 깨는 것은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 스트레스입니다. 스트레스를 받으면 수면의 질이 떨어지고 새벽에 자주 깨게 됩니다. 또한 수면 부족이나 불규칙한 수면 습관도 새벽에 자주 깨는 원인이 될 수 있습니다. 새벽에 자주 깨는 것을 해결하기 위해서는 스트레스를 줄이고 규칙적인 수면 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 잠자리에 들기 전에는 스마트폰이나 컴퓨터 사용을 피하고 따뜻한 우유나 차를 마시는 것이 도움이 됩니다. 새벽에 깨는 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아야 합니다. 병원에서는 수면 장애의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다.

선생님들 CT 사진 한번만 봐 주시겠습니까?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑작스런일로 너무 걱정이 많으실것 같습니다. 제가 보기에 크기는 별로 큰것 같지는 않습니다. 맘편히 가시세요.

생리불순,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리불순은 생리주기가 28일보다 짧거나 길거나 생리량이 너무 많거나 적거나 생리통이 심하거나 생리가 2회 이상 연달아 나오는 경우를 말합니다. 생리불순은 여성의 10 정도가 겪는 흔한 증상입니다. 생리불순은 호르몬 이상 스트레스 체중 변화 약물 복용 갑상선 질환 난소 질환 등의 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 생리불순은 피임약을 복용하면 증상을 완화할 수 있습니다. 피임약은 여성호르몬인 에스트로겐과 프로게스테론을 함유하고 있어 생리주기를 규칙적으로 만들어줍니다. 또한 생리통을 완화하고 생리량을 줄여주기도 합니다. 피임약은 의사의 처방을 받아야 복용할 수 있습니다. 피임약을 복용할 때는 부작용에 대해 주의해야 합니다. 피임약을 복용하면 두통 구역질 메스꺼움 유방통 체중 증가 등의 부작용이 나타날 수 있습니다. 피임약을 복용해도 생리불순이 개선되지 않는다면 병원에서 진료를 받아 원인을 찾아 치료해야 합니다. 생리불순의 원인이 질환일 경우 해당 질환을 치료하면 생리불순이 개선될 수 있습니다. 생리불순은 여성의 건강에 영향을 미칠 수 있으므로 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아야 합니다.

식사량을 엄청 줄였는데 살이 안빠져요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식사조절 및 운동으로도 체중감소가 없는 경우 필요하다면 약물치료가 도움이 될 수 있습니다. 가까운 비만 클리닉을 방문해 보세요

어느과 진찰을 받아야할지 모르겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 생긴 증상이라고 하면 가정의학과 진료 받아보셔도 괜찮을 것으로 생각됩니다. 최근 많이 무리하거나 스트레스가 많았을까요? 잠은 잘 자나요? 운동은 규칙적으로 하시나요?

기침과 목 이물감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 답답하시겠네요. 이런경우 스테로이드 흡입제를 사용하면서 경과를 지켜보시면 어떨까 싶습니다. 그러면 증상이 좋아질것 같습니다

안녕하세요 선생님,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 보기에는 청각이상으로 시행한 뇌 ct 사진에서 우연하게 발견된 병변으로 생각됩니다. 서로 연관은 없어 보입니다

23개월 여아점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보이는 점은 밀크 반점으로 생각되지는 않습니다. 너무 걱정하지 말고 경과를 지켜보시면서 점이 변화가 있는지 사진찍어두세요

임팩트 비타민 약 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일주일은 장기복용으로 생각하기는

어렵습니다. 아주 단기 초단기 처방입니다. 몸이 더 나빠지지는 않을 것으로 생각됩니다

고3 여학생 어지러움증 추가 문의 올립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 이상이 있는지 없는지를 자세한 진찰과 검사를 통해서 확인하는 것이 필요합니다. 더이상의 추측은 의미가 없어보입니다

발이 오목발 아치형입니다. 이런 발유형은 아무래도 서서하는 일도 임신 힘들겠죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 답변이 늦어 죄송합니다. 진료중이라 이해 부탁드립니다. 발 안쪽이 오목하게 되어있는 것은 정상입니다. 그래야 체중이 분산이 되기때문에 발이 덜 피곤합니다. 발 안쪽이 오목하지 않은 평발이 조금만 걸어도 쉽게 발이 피로해집니다. 오목한 정상이므로 너무 크게 걱정안하셔도 될것 같습니다. 발이 아프고 불편하면 편한 운동화를 신거나 하이힐이나 바닥이 딱딱한 것만 피하고 신발에 신경을 쓰시면 좋을것 같습니다.

아픈이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 사용하지 않던 다리를 무리하게 갑자기 사용했다고 하면 그것이 통증의 원인이 될 수 있을것으로 판단됩니다.

가게 유리철거하는곳 근처지나가면 유리조각이나 가루가 두피로 튀어서 두피염이나 탈모가생길수있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유리 파편이 두피에 닿으면 물리적인 손상이나 염증을 일으킬 수 있습니다. 탈모나 두피염으로 진행될 가능성은 낮지만 상처가 나거나 염증이 생길 수 있습니다. 두피에 이상이 느껴지거나 상처가 있다면 피부과를 방문해 확인받아보시면 되겠습니다.

입술포진?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소위 말하는 헤르페스 감염단순포진 맞습니다. HSV1 바이러스에 의한 질환이고 보통 구강대 구강으로 전염이 많이 이루어 집니다. 성관계에 의한 감염은 생식기 감염을 많이 일으키는 HSV2형이 해당됩니다. 보통 치료는 아시클로비어 연고 등약국에서 구매 가능으로 치료 될 수 도 있으며 확실히 치료하고 싶거나 빠른 경과 호전을 위해서는 병원에서 약 처방을 받으면 됩니다. 피곤하거나 스트레스를 많거나 감기 등 면역력이 저하될 때 재발성으로 증상이 많이 발현 됩니다.

저 성대결절 인가요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 성대결절이 의심되면 검사로 확인이 필요합니다 2. 목소리를 최대한 사용하지 않으면서 경과를 지켜보실 수 있습니다 3. 악성으로 변하지 않습니다

오른쪽 윗가슴 통증과 증상 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로는 알기 어렵지만 검사에서 이상이 없었다고 하면 특히 우측 가슴통증이라고 하시니 근육통의 가능성을 생각해볼 수 있습니다

고중량 저반복을 하면 키가 안크나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 키는 유전적인 부분이 가장 큰 부분을 차지 합니다. 하지만 성장기에는 과도한 무게보다는 전체적인 자극을 줄 수 있는 운동이나 밸런스 운동을 해주시는 것을 추천 드려요

가슴이 두근거릴때 운동하면 안좋나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두근거림이 계속 된다면 명확한 이유를 찾아보시고 운동 하실 것을 추천 드립니다. 다양한 원인들이 있을 수 있기에 운동이 독이 될 수 있습니다.

경구용 미녹시딜 하루에 1정 복용 괜찮나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부작용이 없다면 1정까지는 괜찮습니다. 다만 고혈압약과 같이 복용시 혈압저하 효과가 더 있을 수 있으며 간혹 단독으로 복용시에도 국소 부종눈주위 부종 두통 등이 있을 수 있습니다. 여성인 경우에는 14정 복용이 권장됩니다.

손가락 봉합 후 행동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 커피는 마셔도 됩니다. 손가락 방향은 정해진 것은 없고 편안한 방향으로 하시되 심장보다 높게 올리면 욕신거림이 덜 할수 있습니다

피부암인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부암의 경우는 대부분 크기의 변화가 있는경우가 대부분이고 환자분 병변은 가피로 보여집니다. 일단은 경과를 보시고 지속시 피부과에서 확인해 보시기 바랍니다.

뇌에 문제가 있다고 합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 난청에는 스테로이드 사용이 가장 표본적인 기본 치료입니다. CT 상의 이상소견은 별개의 문제라는 의미이며 난청과 눈의 침침함은 서로 관련성이 있습니다. 신경과 치료를 병행하심도 좋습니다.

암걸리면 몸이 피로해지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암에 걸리면 몸이 피로해질 수 있습니다. 암세포가 성장하고 증식하면서 우리 몸의 에너지를 소모하고 영양 공급을 방해하기 때문입니다. 또 암 치료 과정에서 항암화학요법 방사선 치료 등으로 인해 염증성 시토카인이 분비되고 근육의 대사 변화가 발생합니다. 이러한 과정은 피로감을 가중시킵니다.

뇌 CT 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 청력과는 관련이 없는 부위입니다. 크기가 크지 않고 위치는 신경학적으로 중요한 신경경로와는 관련이 적겠습니다. 미리 걱정하실 필요 없이 좋은 결과가 나오길 바랍니다.

이거 헤르페스인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변이 뚜렷한 수포의 형태를 보이지는 않아서 아직 판단하기 이른 것 같습니다. 경과를 지켜보시고 병변이 더 많아진다면 불편한 증상이 심해지면 비뇨의학과를 방문하시기 바랍니다.

고3 딸아이 어지러움증 관련 걱정이 되어 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정 많으시겠네요. 몸이 흔들리면서 중심을 잡지 못한다고 하면 말씀드리기 조심스럽지만 소뇌기능을 체크해보시는 것이 필요해 보입니다

당뇨가 아닙니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨 검사는 피검사로 진단을 합니다. 당뇨가 없으시다면 식생활 습관이 그러신 건데 가능하면 교정하시는게 좋겠습니다.

손날로 손가락 끝으로 손찌르기 하다 벽 찔렸는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 부상을 입었군요 엑스레이는 필요치 않을 가능성이 많겠습니다. 근육 끝부분 힘줄의 손상이 있을 것으로 생각되며 보호대를 쓰는게 편할 수 있으며 소염제는 기본적으로 복용합니다.

아픈이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 사용하지 않던 다리를 무리하게 갑자기 사용했다고 하면 그것이 통증의 원인이 될 수 있을것으로 판단됩니다.

뇌 ct좀 봐주세요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크기가 크지 않고 위치는 신경학적으로 중요한 신경경로와는 관련이 적겠습니다. 미리 걱정하실 필요 없이 좋은 결과가 나오길 바랍니다.

23개월 여아 점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 단순 모반 가능성이 높아 보입니다. 하지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 병원 내원하여 진료를 보시는 것을 권합니다. 신경섬유종은 유전성 질환으로 가능성이 매우 낮습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

23개월 여아점,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보이는 점은 밀크 반점으로 생각되지는 않습니다. 너무 걱정하지 말고 경과를 지켜보시면서 점이 변화가 있는지 사진찍어두세요

23개월 여아,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경섬유종증은 사춘기 전에는 0.5cm 이상의 크기로 6개 이상 될때 고려하게 됩니다. 그리고 많은 진단 항목중 한 요소에 불과합니다. 다양한 판단이 중요하며 신경섬유종 주근깨 골이상 눈이상 등 다양한 검사 이후 진단하게 됩니다. 물론 최종 진단은 유전자 검사가 필요합니다. 다른 동반되는 소견 없이 사진과 같은 반점만 있을 경우에는 조금은 지켜보셔도 되지 않을까 생각합니다.

당뇨가 아닙니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨 검사는 피검사로 진단을 합니다. 당뇨가 없으시다면 식생활 습관이 그러신 건데 가능하면 교정하시는게 좋겠습니다.

건강기능식품,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. L카르니틴은 체내에서 지방을 에너지로 바꾸는 데 도움을 주는 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 코엔자임Q10은 세포의 에너지 생산에 필요한 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 엘브 원스일리 멀티비타민은 비타민과 미네랄이 함유된 영양제로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 오메가3는 불포화지방산으로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 따라서 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. 다만 약물과 영양제를 함께 복용할 때는 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

성인 adhd,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성인 ADHD는 완치보다는 관리가 목표입니다. 일반적으로 약물치료와 행동치료를 통해 증상을 효과적으로 통제할 수 있습니다. 생활습관 개선과 심리치료도 중요한 역할을 합니다. 그러니 지속적인 관리와 치료를 이어가시길 권해드립니다. 오른쪽 윗가슴 통증과 증상 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로는 알기 어렵지만 검사에서 이상이 없었다고 하면 특히 우측 가슴통증이라고 하시니 근육통의 가능성을 생각해볼 수 있습니다

고3 여학생 어지러움증 추가 문의 올립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 이상이 있는지 없는지를 자세한 진찰과 검사를 통해서 확인하는 것이 필요합니다. 더이상의 추측은 의미가 없어보입니다

20대 중반 맥압이 걱정됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 맥압의 차이는 있으나 실신과 같은 증상이 따로 없다면 일단은 경과를 지켜 보셔도 될꺼 같습니다. 정기적인 혈압을 체크해 보시기 바랍니다.

대변색이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹는거에 영향을 받을 수도 있습니다. 최근 먹는 영양제 혹은 음식 검토해 보세요. 장에서 이동속도가 빨라져 담즙성분이 미쳐 다 소화되지 못했을 때 녹색변을 보일 수 있습니다. 장염이나 설사시에도 나타날 수 있습니다.

설사나 그런거는 없습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위염 등 위장장애가 있을 경우 소화에 영향을 미칠 수는 있습니다. 위장에서 필요한 산성화 작업 포함 소화작업이 잘안되어 상복부 불편감 구역감 속쓰림 심하면 역류성 식도염까지 발생할 수는 있습니다. 녹색변 하고 위장장애하고는 큰 영향은 아니고 약간은 영향을 미칠 수는 있겠지만 주요 원인은 아닐 거라고 생각됩니다. 주로 담즙은 소장 대장을 거치면서 황토색으로 변하기 때문입니다.

설사나 그런거는 없습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위염 등 위장장애가 있을 경우 소화에 영향을 미칠 수는 있습니다. 위장에서 필요한 산성화 작업 포함 소화작업이 잘안되어 상복부 불편감 구역감 속쓰림 심하면 역류성 식도염까지 발생할 수는 있습니다. 녹색변 하고 위장장애하고는 큰 영향은 아니고 약간은 영향을 미칠 수는 있겠지만 주요 원인은 아닐 거라고 생각됩니다. 주로 담즙은 소장 대장을 거치면서 황토색으로 변하기 때문입니다.

아침 객혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 객혈이 있는 경우에는 결핵 기관지확장증 폐암을 감별해야 합니다. 심한 급성 기관지염에서도 객혈이 있을 수 있으나 원인을 감별해야 합니다

잠드려 하면 불특정하게 움찔거려 깡니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분의 수면장애는 깊은 수면에 들지 않는 경우가 많습니다. 카페인등 수면에 방해를 주는 음식을 주의하시고 가벼운 운동을 해보세요

검은변에 과산화수소를 뿌렸더니 거품이 생겼습니다 혈변인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흑변을 조심해야 하는 이유는 상부 위장관에서의 출혈을 의심할 수 있기 때문입니다. 흑변에 과산화수소를 뿌렸을 때 거품반응이 보인다는 것은 혈액이 존재함을 시사합니다. 따라서 병원

을 방문하셔야 하는 소견이라 볼 수 있으니 곧바로 근처 내과를 방문하셔야 합니다.

담석증 토마토 문의드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담석증이 있을 경우 토마토를 복용한다고 해서 담석에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 걱정하지 말고 섭취해도 되겠습니다.

임신준비 중 방광염약 네프신 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 임신이 이루어지지 않았다면 크게 문제가 되지 않습니다. 따라서 사후 피임약을 복용하는 것이 큰 도움은 되지 않습니다.

자세나 입은 옷에 따라 고환의 통증이 유발될 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오른쪽 고환의 통증이 반복적으로 나타난다면 몇 가지 가능성을 고려해볼 수 있습니다. 이는 고환염 부고환염 정계정맥류 탈장 등과 같은 문제일 수 있습니다. 특히 통증이 오래 지속되거나 심해진다면 반드시 비뇨의학과를 방문해 진료받아보시는 것이 안전합니다.

임신준비 중 방광염약 네프신 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 임신이 이루어지지 않았다면 크게 문제가 되지 않습니다. 따라서 사후 피임약을 복용하는 것이 큰 도움은 되지 않습니다.

기침과 목 이물감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 답답하시겠네요. 이런경우 스테로이드 흡입제를 사용하면서 경과를 지켜보시면 어떨까 싶습니다. 그러면 증상이 좋아질것 같습니다 이것도 알레르기인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 음식을 다 먹고 나서 증상이 있다면 알려지 보다는 메밀 성분 자체에 의한 반응 가능성이 높습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

감기몸살일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피검사로 염증의 유무를 확인해 보시는게 좋겠습니다. 특별히 염증이 아니라면 증상완화제를 복용하면서 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

기침과 목 이물감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 답답하시겠네요. 이런경우 스테로이드 흡입제를 사용하면서 경과를 지켜보시면 어떨까 싶습니다. 그러면 증상이 좋아질것 같습니다 어지럼증인데 딱 맞아떨어지는 원인을 못찾겠습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지러움의 원인은 말초성과 중추성으로 나누어 볼 수 있습니다. 이비인후과나 신경과를 방문하셔서 진단을 해 보시는걸 추천 드립니다.

아침 객혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 객혈이 있는 경우에는 결핵 기관지확장증 폐암을 감별해야 합니다. 심한 급성 기관지염에서도 객혈이 있을 수 있으나 원인을 감별해야 합니다 뇌 CT 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 청력과는 관련이 없는 부위입니다. 크기가 크지 않고 위치는 신경학적으로 중요한 신경경로와는 관련이 적겠습니다. 미리 걱정하실 필요없이 좋은 결과가 나오길 바랍니다.

안녕하세요 선생님,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 보기에는 청각이상으로 시행한 뇌 ct 사진에서 우연하게 발견된 병변으로 생각됩니다. 서로 연관은 없어 보입니다

성기 귀두부분 피지낭종인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 구진 등의 피부 소견 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

시력안경도수 등문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 보통 위 정도 도수라면 0.40.6정도 시력이 나옵니다. 2. 도움이 되는 것은 사실이지만 얼마만큼 도움이 되는지를 수치화해서 말씀드리기는 어렵습니다. 3. 녹내장 가족력이 없고 물구나무를 계속 서는 정도로 얼굴이나 눈에 압력이 올라가게 운동을 하지 않는다면 근력운동을 하더라도 순간적으로 안압이 올라갈 수 있지만 눈에 큰 영향을 주지는 않습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

코뼈 비관혈적 정복술을 받은 후 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비관혈적 정복술 후 코뼈

골절 회복 기간은 일반적으로 약 6주 정도 걸립니다. 초기 2주 동안은 특히 조심해야 하며 부목을 착용하더라도 배드민턴이나 조깅과 같은 신체 활동은 피하는 것이 좋겠습니다. 부목 착용 시에도 충격을 줄 수 있어 추가 손상을 일으킬 여지가 있습니다. 주치의와 상의하여 운동이 가능한 시점을 확인하시는게 좋겠고 일반적으로 46주 후에 가벼운 운동을 시작하는 것이 안전합니다.

머리에서 소리가 납니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시죠? 이비인후과적으로 문제가 없다고 하면 신경과 진찰을 한번 받아보실 수 있습니다. 소리가 간헐적인가요? 지속적으로 나나요?

항문에서 변이 묻어나올 경우,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 항문외과에서 진료를 받아야 합니다. 엉덩이에서 따가움이 느껴지고 대변이 묻어나오는 증상은 항문 누공 치루 항문 주위 피부염 괄약근 약화 치핵 등이 원인일 수 있습니다. 항문외과에서의 진료를 통해 원인을 알아내야 하겠습니다.

하체저림 헤르페스 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 나중에 사주째 다시 혈액검사를 받아서 확인하시는 것이 최선으로 보입니다 현재로는 관련은 없어 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

무릎 애매한 통증 허벅지증상 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뼈에 이상이 없다? 골절이 아니거나 변형이 없다는 이야기 이지 이것이 정상이라는 것은 아닙니다. 생활 속에서 무릎 관절에 부담이 되어 나타나는 현상 같은데 대표적으로는 슬개골 연골 연화증 같은 것도 있습니다. 진찰이 중요할 듯하며 정형외과 진료가 좋겠습니다. 다니시던 곳에서 마땅한 만족을 못하신다면 병원을 옮겨 보시는것도 어떨까 하네요. 감사합니다.

대퇴골 몸통 골절,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 다치셨나 봅니다. 통증에 준해서 치료하면서 조금 더 지켜보아도 되지 않을까 합니다. 수술하신 주치의 선생님과 상담 잘 해보시고 정기적인 진료 받도록 하세요. 감사합니다.

극상근염 처방약 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 다이아세린Adtrodar과 셀레콕시브Celebrex는 주로 관절염 치료에 사용되는 약물이지만 근육 염증이나 통증 관리에도 사용될 수 있습니다. 1. 다이아세린Adtrodar 주로 골관절염 치료에 사용되며 염증을 줄이고 관절 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 2. 셀레콕시브Celebrex 선택적 COXII 억제제로 NSAIDs처럼 염증과 통증을 줄이는 데 효과적입니다. 3. 마이오날Myonal 근육 이완제로 근육 통증과 경련을 완화하는 데 도움을 줍니다. 따라서 이 약들은 근육 염증과 관련된 통증과 염증을 완화하는 데도 적합한 처방입니다. 의사의 지시에 따라 복용하면 도움이 될 것이라 보입니다.

어머니 식습관,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식습관을 가능하면 교정하신느게 좋겠습니다. 과도한 식사나 금식은 당뇨의 조절에 도움을 주지 않고 악영향을 줄 수 있습니다.

이것도 알레르기인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 음식을 다 먹고 나서 증상이 있다면 알러지 보다는 메밀 성분 자체에 의한 반응 가능성이 높습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

동공홍채테두리 색변짐푸른색 안압 연관성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네. 아이가 가지고 있는 눈의 병으로 걱정이 많으실 것 같습니다. 답변을 드리자면 우선 위에 표시한 부분은 동공이 아닙니다. 동공은 홍채 가운데 빈공간을 말하며 광량에 따라 커졌다 작아졌다 하는 부분입니다. 위에 표시한 부분은 검은자위각막과 흰자위결막과 공막의 경계부위에 해당하는 부분입니다. 표시한 부분은 안압이 높아서 저렇게 변한 것일 가능성은 낮습니다. 정상적인 눈이라

하더라도 검은자위와 흰자위의 경계부위가 저렇게 보이는 경우가 훨씬 더 많습니다. 다만 어린 나이에 고안압이 지속된다면 검은자위 자체의 크기가 커지는 경향이 있습니다. 따라서 검은자위의 직경이 보통 1012mm정도 되는데 이보다 훨씬 커 보인다면 진료를 꼭 보는 것이 필요하겠습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

지켜보는 정도,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아픈 부위나 증상이 무엇인지 얼마나 아프는지 어떤 진통제를 복용했는지에 따라 달라질 수 있습니다. 만약 통증이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 통증이 심하지 않고 일상생활에 지장을 주지 않는다면 일주일 정도 더 지켜보는 것도 좋습니다. 하지만 통증이 점점 심해지거나 다른 증상이 나타난다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 진통제를 복용할 때는 용법과 용량을 잘 지켜서 복용해야 합니다. 또한 진통제를 복용해도 통증이 나아지지 않는다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

곤지름인가요 ...? 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이 관찰되어 HPV 검사에서 음성이더라도 제거가 필요하겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

이것도 알레르기인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 음식을 다 먹고 나서 증상이 있다면 알려지 보다는 메밀 성분 자체에 의한 반응 가능성이 높습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

설사나 그런거는 없습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위염 등 위장장애가 있을 경우 소화에 영향을 미칠 수는 있습니다. 위장에서 필요한 산성화 작업 포함 소화작업이 잘안되어 상복부 불편감 구역감 속쓰림 심하면 역류성 식도염까지 발생할 수는 있습니다. 녹색변 하고 위장장애하고는 큰 영향은 아니고 약간은 영향을 미칠 수는 있겠지만 주요 원인은 아닐 거라고 생각됩니다. 주로 담즙은 소장 대장을 거치면서 황토색으로 변하기 때문입니다.

안과적 문제인지 다른 문제인지 답변부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 망막 진료 보시면서 검사 많이 하시긴 했네요. 해당 검사들을 받아도 큰 이상이 없다면 scintillating scotoma 같은 편두통의 안구 증상일 수 있으니 신경과 진료도 한번 받아보시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.

20대 중반 맥압이 걱정됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 맥압의 차이는 있으나 실신과 같은 증상이 따로 없다면 일단은 경과를 지켜 보셔도 될꺼 같습니다. 정기적인 혈압을 체크해보시기 바랍니다.

다리수술 후 다리모양이 이상해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조금 더 큰 병원 방문하셔서 초음파 및 MRI등의 검사등을 받아보시는게 좋을것 같습니다 정확한 원인을 파악하셔야 그에 대한 처치가 가능할것 같습니다. 뼈의 변형에 의한것인지 근육의 변형인지... 종합병원급으로 한번 방문해보시기 바랍니다. 감사합니다.

23개월 여아,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경섬유종증은 사춘기 전에는 0.5cm 이상의 크기로 6개 이상 될때 고려하게 됩니다. 그리고 많은 진단 항목중 한 요소에 불과합니다. 다양한 판단이 중요하며 신경섬유종 주근깨 골이상 눈이상 등 다양한 검사 이후 진단하게 됩니다. 물론 최종 진단은 유전자 검사가 필요합니다. 다른 동반되는 소견 없이 사진과 같은 반점만 있을 경우에는 조금은 지켜보셔도 되지 않을까 생각됩니다.

대변색이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹는거에 영향을 받을 수도 있습니다. 최근 먹는 영양제 혹은 음식 검토해 보세요. 장에서 이동속도가 빨라져 담즙성분이 미쳐 다 소화되지 못했을 때 녹색변을 보일 수 있습니다. 장염이나 설사시에도 나타날 수 있습니다.

원형탈모 진행상황?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원형탈모 치료 중이라하더라도 조금 더 커지거나 다른 부위에도 발생할 수 있습니다. 흰머리가 올라오는 것은 흔한 증상이며 치료가 되고 있는 과정입니다. 스테로이드 주사는 2주 간격 4회 이내가 좋지만 6회 정도 까지 투여하는 경우도 있습니다. 감사합니다.

파스 알레르기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 일단 지금은 집에서 냉찜질을 해서 가려움을 가라앉히고 라다 크림바르면서 항히스타민 지르텍 같은거 있으면 드시고 내일 진료 받아보셔요

입 벽에 하얗게 일어나면서 아픕니다. 구강성교로 성기 전염이 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 걱정안하셔도 될 것 같습니다 구내염으로 보이고 감염되지는 않습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

이거 흑색종인가요???,안녕하세요. 요약 1. 외상이 있었는지부터 확인해 보세요. 2. 발톱 내부에 피멍이 들었다가 굳은 겁니다. 3. 발톱이 자라면서 같이 올라올거니 그때 같이 발톱과 잘라 주면 됩니다. 4. 조갑흑색종은 아닙니다. 건승하세요

전립선염과 배뇨사정 상담부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련은 없을 것 같습니다 병원을 정하셔서 꾸준히 치료와 관리를 받으시면 좋을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

하체저림 헤르페스 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 나중에 사주째 다시 혈액검사 를 받아서 확인하시는 것이 최선으로 보입니다 현재로는 관련은 없어 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

머리가 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의식의 변화라던지 두통이나 구토가 지속이 되는지 확인해 보시고 증상이 지속이되면 머리 영상 검사를 해보시는게 좋겠습니다

락스뜨거운물 수증기? 공기 마시게됨 폐 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황 상 폐에 큰 손상이 발생하였을 가능성은 낮습니다. 하지만 걱정이 된다면 흉부엑스레이 검사는 받아 보는 것을 권합니다.

레이저 제모 화상흉터 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착은 대부분의 경우에서 2개월에서 6개월 정도 시간이 지나면 회복이 되는경우가 많아 일단은 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

얼굴 피부 색소침착 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착의 경우 회복하는데 2개월에서 6개월정도의 시간이 필요합니다. 일단 경과를 지켜 보시는 편이 유리하겠습니다. 감사합니다.

귀두포피염 일까요?사진첨부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두포피염의 소견으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

식사량을 엄청 줄였는데 살이 안빠져요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식사조절 및 운동으로도 체중감소가 없는 경우 필요하다만 약물치료가 도움이 될 수 있습니다. 가까운 비만 클리닉을 방문해 보세요

새벽에 자주 깡니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 새벽에 자주 깨는 것은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 스트레스입니다. 스트레스를 받으면 수면의 질이 떨어지

고 새벽에 자주 깨게 됩니다. 또한 수면 부족이나 불규칙한 수면 습관도 새벽에 자주 깨는 원인이 될 수 있습니다. 새벽에 자주 깨는 것을 해결하기 위해서는 스트레스를 줄이고 규칙적인 수면 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 잠자리에 들기 전에는 스마트폰이나 컴퓨터 사용을 피하고 따뜻한 우유나 차를 마시는 것이 도움이 됩니다. 새벽에 깨는 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아야 합니다. 병원에서는 수면 장애의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다.

생리불순,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리불순은 생리주기가 28일보다 짧거나 길거나 생리량이 너무 많거나 적거나 생리통이 심하거나 생리가 2회 이상 연달아 나오는 경우를 말합니다. 생리불순은 여성의 10 정도가 겪는 흔한 증상입니다. 생리불순은 호르몬 이상 스트레스 체중 변화 약물 복용 갑상선 질환 난소 질환 등의 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 생리불순은 피임약을 복용하면 증상을 완화할 수 있습니다. 피임약은 여성호르몬인 에스트로겐과 프로게스테론을 함유하고 있어 생리주기를 규칙적으로 만들어줍니다. 또한 생리통을 완화하고 생리량을 줄여주기도 합니다. 피임약은 의사의 처방을 받아야 복용할 수 있습니다. 피임약을 복용할 때는 부작용에 대해 주의해야 합니다. 피임약을 복용하면 두통 구역질 메스꺼움 유방통 체중 증가 등의 부작용이 나타날 수 있습니다. 피임약을 복용해도 생리불순이 개선되지 않는다면 병원에서 진료를 받아 원인을 찾아 치료해야 합니다. 생리불순의 원인이 질환일 경우 해당 질환을 치료하면 생리불순이 개선될 수 있습니다. 생리불순은 여성의 건강에 영향을 미칠 수 있으므로 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아야 합니다.

성기 기동에 딱딱한 피지같은게 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종 등의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

임팩트 비타민 약 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일주일만 장기복용으로 생각하기는 어렵습니다. 아주 단기 초단기 처방입니다. 몸이 더 나빠지지는 않을 것으로 생각됩니다. 머리에서 소리가 납니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시죠? 이비인후과적으로 문제가 없다고 하면 신경과 진찰을 한번 받아보실 수 있습니다. 소리가 간헐적인가요? 지속적으로 나나요?

편도선염 목 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 편도선염이나 인후염이 있을 때 목에서 소량의 출혈이 발생할 수 있습니다. 염증이 있는 부위가 자극을 받아 출혈이 생길 수 있습니다. 소량의 출혈이 금방 멎었다면 큰 문제는 아닐 가능성이 높지만 출혈이 지속되거나 양이 많아지면 즉시 병원을 방문하시는 것이 안전합니다.

성기 기동에 딱딱한 피지같은게 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종 등의 가능성으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

귀두포피염 일까요?사진첨부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두포피염의 소견으로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

포경 수술부위 아래 혹? 명을?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 포경 수술후 한달째인데 몇일전부터 발기시 수술부위 바로 아래쪽에 수술라인대로 긴 혹 명을 같은게 생겼군요. 크게 걱정하지 마시고 수술 받으신 병원에 내원하셔서 직접 상담을 받도록 하십시오.

임팩트 비타민 약 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일주일만 장기복용으로 생각하기는 어렵습니다. 아주 단기 초단기 처방입니다. 몸이 더 나빠지지는 않을 것으로 생각됩니다

새벽에 자주 깡니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 새벽에 자주 깨는 것은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 스트레스입니다. 스트레스를 받으면 수면의 질이 떨어지고 새벽에 자주 깨게 됩니다. 또한 수면 부족이나 불규칙한 수면 습관도 새벽에 자주 깨는 원인이 될 수 있습니다. 새벽에 자주 깨는 것을 해결하기 위해서는 스트레스를 줄이고 규칙적인 수면 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 잠자리에 들기 전에는 스마트폰이나 컴퓨터 사용을 피하고 따뜻한 우유나 차를 마시는 것이 도움이 됩니다. 새벽에 깨는 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아야 합니다. 병원에서는 수면 장애의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다.

얼굴 피부 색소침착 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착의 경우 회복하는데 2개월에서 6개월정도의 시간이 필요합니다. 일단 경과를 지켜 보시는 편이 유리하겠습니다. 감사합니다.

식사량을 엄청 줄였는데 살이 안빠져요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식사조절 및 운동으로도 체중감소가 없는 경우 필요하다면 약물치료가 도움이 될 수 있습니다. 가까운 비만 클리닉을 방문해 보세요

아픈이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 사용하지 않던 다리를 무리하게 갑자기 사용했다고 하면 그것이 통증의 원인이 될 수 있을것으로 판단됩니다.

지켜보는 정도,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아픈 부위나 증상이 무엇인지 얼마나 아픈지 어떤 진통제를 복용했는지에 따라 달라질 수 있습니다. 만약 통증이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 통증이 심하지 않고 일상생활에 지장을 주지 않는다면 일주일 정도 더 지켜보는 것도 좋습니다. 하지만 통증이 점점 심해지거나 다른 증상이 나타난다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 진통제를 복용할 때는 용법과 용량을 잘 지켜서 복용해야 합니다. 또한 진통제를 복용해도 통증이 나아지지 않는다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

새벽에 자주 깡니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 새벽에 자주 깨는 것은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 스트레스입니다. 스트레스를 받으면 수면의 질이 떨어지고 새벽에 자주 깨게 됩니다. 또한 수면 부족이나 불규칙한 수면 습관도 새벽에 자주 깨는 원인이 될 수 있습니다. 새벽에 자주 깨는 것을 해결하기 위해서는 스트레스를 줄이고 규칙적인 수면 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 잠자리에 들기 전에는 스마트폰이나 컴퓨터 사용을 피하고 따뜻한 우유나 차를 마시는 것이 도움이 됩니다. 새벽에 깨는 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아야 합니다. 병원에서는 수면 장애의 원인을 찾아 치료할 수 있습니다.

생리불순,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리불순은 생리주기가 28일보다 짧거나 길거나 생리량이 너무 많거나 적거나 생리통이 심하거나 생리가 2회 이상 연달아 나오는 경우를 말합니다. 생리불순은 여성의 10 정도가 겪는 흔한 증상입니다. 생리불순은 호르몬 이상 스트레스 체중 변화 약물 복용 갑상선 질환 난소 질환 등의 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 생리불순은 피임약을 복용하면 증상을 완화할 수 있습니다. 피임약은 여성호르몬인 에스트로겐과 프로게스테론을 함유하고 있어 생리주기를 규칙적으로 만들어줍니다. 또한 생리통을 완화하고 생리량을 줄여주기도 합니다. 피임약은 의사의 처방을 받아야 복용할 수 있습니다. 피임약을 복용할 때는 부작용에 대해 주의해야 합니다. 피임약을 복용하면 두통 구역질 메스꺼움 유방통 체중 증가 등의 부작용이 나타날 수 있습니다. 피임약을 복용해도 생리불순이 개선되지 않는다면 병원에서 진료를 받아 원인을 찾아 치료해야 합니다. 생리불순의 원인이 질

한일 경우 해당 질환을 치료하면 생리불순이 개선될 수 있습니다. 생리불순은 여성의 건강에 영향을 미칠 수 있으므로 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에서 진료를 받아야 합니다. 레이저 제모 화상흉터 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착은 대부분의 경우에서 2개월에서 6개월 정도 시간이 지나면 회복이 되는경우가 많아 일단은 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

아픈이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 사용하지 않던 다리를 무리하게 갑자기 사용했다고 하면 그것이 통증의 원인이 될 수 있을것으로 판단됩니다.

변이 끝이 가늘어요 사진첨부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 현상일 수도 있으니 일단은 경과를 지켜 보시고 지속적인 변의 굵기 변화가 있다면 대장 내시경을 검사를 받아 보시기 바랍니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장용종을 말씀하시느건지 정확하지는 않으나 대장용종이 있는 경우라면 정기적인 대장 내시경을 해 보시는게 좋겠습니다. 감사합니다

림프절 멍울 초음파 소견 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지속적인 멍울이라면 조직검사를 하나 대부분은 호전되는 경우가 많습니다. 크기 변화를 지켜 보시고 일단은 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

변비약 복용중인데 중단을 언제해야합니까?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만성변비가 지속이 되는 경우에는 기질적원인이 있는지 확인해 보시고 식이요법과 약물요법을 병용해 보시면서 경과를 확인하시기 바랍니다.

파스 알레르기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 일단 지금은 집에서 냉찜질을 해서 가려움을 가라앉히고 라다 크림바르면서 항히스타민 지르텍 같은거 있으면 드시고 내일 진료 받아보셔요

다리수술 후 다리모양이 이상해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술하신 병원에서 기다려보자고 했으면 속상하시겠지만 기다려 보시는게 좋겠으며 지속시에는 영상 촬영이 판단에 도움을 줄 수 있을꺼 같습니다.

머리가 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의식의 변화라던지 두통이나 구토가 지속이 되는지 확인해 보시고 증상이 지속이되면 머리 영상 검사를 해보시는게 좋겠습니다

어머니 식습관,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식습관을 가능하면 교정하신느게 좋겠습니다. 과도한 식사나 금식은 당뇨의 조절에 도움을 주지 않고 악영향을 줄 수 있습니다.

얼굴 피부 색소침착 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착의 경우 회복하는데 2개월에서 6개월정도의 시간이 필요합니다. 일단 경과를 지켜 보시는 편이 유리하겠습니다. 감사합니다.

식사량을 엄청 줄였는데 살이 안빠져요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식사조절 및 운동으로도 체중감소가 없는 경우 필요하다만 약물치료가 도움이 될 수 있습니다. 가까운 비만 클리닉을 방문해 보세요

피부뭉가나신건지 모르겠지만 손땀피부 만지고 제얼굴만지면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 튀어나왔다는 색소 병변은 검버섯일 수도 있겠네요. 어쨌든 전염성 피부 질환으로 보이지는 않습니다. 수포가 생겨있는 바이러스질환 같은 것이 아니라면 마사지를 위해 만졌다고 해도 전염되었을 가능성은 없으니까 안심하세요. 문의에 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

어느날 손가락에 이런게 생겼는데 뭘까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손 습진일 수도 있지만 손으로 뭔가를 만지는 작업을 많이 하거나 화학 물질 등에 접촉되어서 그럴 수도 있습니다. 어쨌든 습진 연고를 발라주면 도움이 될 것 같습니다. 병원으로 내원하시어 피부과 전

문의에게 보다 자세한 진료를 받고 치료를 받는 것이 가장 좋을 것 같습니다. 문의에 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

머리에서 소리가 납니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시죠? 이비인후과적으로 문제가 없다고 하면 신경과 진찰을 한번 받아보실 수 있습니다. 소리가 간헐적인가요? 지속적으로 나나요?

손가락 끝이 가렵고 통증이 느껴집니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 끝의 빨갛고 열감 통증 가려움증이 있는 증상이 나타난다면 피부과를 방문하는 것이 가장 적합하다고 판단됩니다. 현 상황에서는 피부과 전문의가 가장 정확한 진단과 치료를 제공할 수 있을 것이라 보입니다.

성인 adhd,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성인 ADHD는 완치보다는 관리가 목표입니다. 일반적으로 약물치료와 행동치료를 통해 증상을 효과적으로 통제할 수 있습니다. 생활습관 개선과 심리치료도 중요한 역할을 합니다. 그러니 지속적인 관리와 치료를 이어가시길 권해드립니다.

하루종일 24시간 납니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 원인을 찾는 검사를 받아보시는것이 좋겠습니다. 갑자기 시작된 것이면 심리적인 원인도 생각해봐야 합니다

편도선염 목 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 편도선염이나 인후염이 있을 때 목에서 소량의 출혈이 발생할 수 있습니다. 염증이 있는 부위가 자극을 받아 출혈이 생길 수 있습니다. 소량의 출혈이 금방 멎었다면 큰 문제는 아닐 가능성이 높지만 출혈이 지속되거나 양이 많아지면 즉시 병원을 방문하시는 것이 안전합니다.

손날로 손가락 끝으로 손찌르기 하다 벽 찔렀는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 부상을 입었군요 엑스레이는 필요치 않을 가능성이 많겠습니다. 근육 끝부분 힘줄의 손상이 있을 것으로 생각되며 보호대를 쓰는게 편할 수 있으며 소염제는 기본적으로 복용합니다.

뒤꿈치쪽 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아킬레스건염으로 진단될 가능성이 많으며 검사는 엑스레이상 정상이고 초음파 상은 약간의 이상이 나타날 수 있습니다. 장딴지근과 가지미근의 주사치료 물리치료 등이 좋으며 소염제를 같이 복용하셔도 됩니다.

뇌에 문제가 있다고 합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 난청에는 스테로이드 사용이 가장 표본적인 기본 치료입니다. CT 상의 이상소견은 별개의 문제라는 의미이며 난청과 눈의 침침함은 서로 관련성이 있습니다. 신경과 치료를 병행하심도 좋습니다.

파스 알레르기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 일단 지금은 집에서 냉찜질을 해서 가려움을 가라앉히고 라다 크림바르면서 항히스타민 지르텍 같은거 있으면 드시고 내일 진료 받아보셔요

이거 헤르페스인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변이 뚜렷한 수포의 형태를 보이지는 않아서 아직 판단하기 이른 것 같습니다. 경과를 지켜보시고 병변이 더 많아진다면 불편한 증상이 심해지면 비뇨의학과를 방문하시기 바랍니다.

고3 딸아이 어지러움증 관련 걱정이 되어 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정 많으시겠네요. 몸이 흔들리면서 중심을 잡지 못한다고 하면 말씀드리기 조심스럽지만 소뇌기능을 체크해보시는 것이 필요해 보입니다

경구용 미녹시딜 하루에 1정 복용 괜찮나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부작용이 없다면 1정까지는 괜찮습니다. 다만 고혈압약과 같이 복용시 혈압저하 효과가 더 있을 수 있으며 간혹 단독으로 복용시에도 국소 부종눈주위 부종 두통 등이 있을 수 있습니다. 여성인 경우에는 14정 복용이 권장됩니다.

머리에서 소리가 납니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시죠? 이비인후과적으로 문

제가 없다고 하면 신경과 진찰을 한번 받아보실 수 있습니다. 소리가 간헐적인가요? 지속적으로 나나요?

극상근염 처방약 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 다이아세린Adtrodar과 셀레콕시브Celebrex는 주로 관절염 치료에 사용되는 약물이지만 근육 염증이나 통증 관리에도 사용될 수 있습니다. 1. 다이아세린Adtrodar 주로 골관절염 치료에 사용되며 염증을 줄이고 관절 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 2. 셀레콕시브Celebrex 선택적 COXII 억제제로 NSAIDs처럼 염증과 통증을 줄이는 데 효과적입니다. 3. 마이오날Myonal 근육 이완제로 근육 통증과 경련을 완화하는 데 도움을 줍니다. 따라서 이 약들은 근육 염증과 관련된 통증과 염증을 완화하는 데도 적합한 처방입니다. 의사의 지시에 따라 복용하면 도움이 될 것이라 보입니다.

소음순 피피명같은 게 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 어떤 질병으로 인하여 생긴것으로 보이지는 않고 과도한 마찰이나 가벼운 외상으로 인한것이 아닌가 생각됩니다. 번지거나 호전되지 않으면 진료 받아보셔요

소음순 피피명같은 게 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 어떤 질병으로 인하여 생긴것으로 보이지는 않고 과도한 마찰이나 가벼운 외상으로 인한것이 아닌가 생각됩니다. 번지거나 호전되지 않으면 진료 받아보셔요

성인 adhd,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성인 ADHD는 완치보다는 관리가 목표입니다. 일반적으로 약물치료와 행동치료를 통해 증상을 효과적으로 통제할 수 있습니다. 생활습관 개선과 심리치료도 중요한 역할을 합니다. 그러니 지속적인 관리와 치료를 이어가시길 권해드립니다. 오른쪽 윗가슴 통증과 증상 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로는 알기 어렵지만 검사에서 이상이 없었다고 하면 특히 우측 가슴통증이라고 하시니 근육통의 가능성을 생각해볼 수 있습니다

이거 흑색종인가요???,안녕하세요. 요약 1. 외상이 있었는지부터 확인해 보세요. 2. 발톱 내부에 피멍이 들었다가 굳은 겁니다. 3. 발톱이 자라면서 같이 올라올거니 그때 같이 발톱과 잘라 주면 됩니다. 4. 조갑흑색종은 아닙니다. 건승하세요

이거 흑색종인가요???,안녕하세요. 요약 1. 외상이 있었는지부터 확인해 보세요. 2. 발톱 내부에 피멍이 들었다가 굳은 겁니다. 3. 발톱이 자라면서 같이 올라올거니 그때 같이 발톱과 잘라 주면 됩니다. 4. 조갑흑색종은 아닙니다. 건승하세요

음주 후 포카리음료 섭취,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구토 직후에는 세시간 정도 났때까지는 물을 안드시는 것이 좋아요 .그안에 물드시면 다시 토하는 경우가 흔히 있습니다. 일시적으로 도움이 될수 있습니다

항문에서 변이 묻어나올 경우,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 항문외과에서 진료를 받아야 합니다. 엉덩이에서 따가움이 느껴지고 대변이 묻어나오는 증상은 항문 누공 치루 항문 주위 피부염 괄약근 약화 치핵 등이 원인일 수 있습니다. 항문외과에서의 진료를 통해 원인을 알아내야 하겠습니다.

극상근염 처방약 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 다이아세린Adtrodar과 셀레콕시브Celebrex는 주로 관절염 치료에 사용되는 약물이지만 근육 염증이나 통증 관리에도 사용될 수 있습니다. 1. 다이아세린Adtrodar 주로 골관절염 치료에 사용되며 염증을 줄이고 관절 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 2. 셀레콕시브Celebrex 선택적 COXII 억제제로 NSAIDs처럼 염증과 통증을 줄이는 데 효과적입니다. 3. 마이오날Myonal 근육 이완제로 근육 통증과 경련을 완화하는 데 도움을 줍니다. 따라서 이 약들은 근육 염증과 관련된 통증과 염증을 완화하는 데도 적합한 처방입니다. 의사의 지시에 따라 복용하면 도움이 될 것이라 보입니다.

화장실 처리 단계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일반적으로 소변을 보고 난 후에는 요도에서 항문 쪽으로 닦는 것이 위생적입니다. 항문과 요도 사이가 가깝고 요도의 길이가 짧기에 세균이 쉽게 침투될 수 있기 때문입니다. 질부분은 굳이 필요없습니다 개인의 청결 관리 방법은 다양할 수 있으며 특별히 정해져 있는 것은 아닙니다

상처있는 손으로 길고양이 만지면 안될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위를 한다고 해서 문제가 되는 질환이 감염되지는 않습니다. 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

항문에서 변이 묻어나올 경우,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 항문외과에서 진료를 받아야 합니다. 엉덩이에서 따가움이 느껴지고 대변이 묻어나오는 증상은 항문 누공 치루 항문 주위 피부염 괄약근 약화 치핵 등이 원인일 수 있습니다. 항문외과에서의 진료를 통해 원인을 알아내야 하겠습니다.

극상근염 처방약 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 다이아세린Adtrodar과 셀레콕시브Celebrex는 주로 관절염 치료에 사용되는 약물이지만 근육 염증이나 통증 관리에도 사용될 수 있습니다. 1. 다이아세린Adtrodar 주로 골관절염 치료에 사용되며 염증을 줄이고 관절 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 2. 셀레콕시브Celebrex 선택적 COXII 억제제로 NSAIDs처럼 염증과 통증을 줄이는 데 효과적입니다. 3. 마이오날Myonal 근육 이완제로 근육 통증과 경련을 완화하는 데 도움을 줍니다. 따라서 이 약들은 근육 염증과 관련된 통증과 염증을 완화하는 데도 적합한 처방입니다. 의사의 지시에 따라 복용하면 도움이 될 것이라 보입니다.

림프절 명물 초음파 소견 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지속적인 명물이라면 조직검사를 하나 대부분은 호전되는 경우가 많습니다. 크기 변화를 지켜 보시고 일단은 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

병원에서 정계정맥류 진단받았는데 불편함이 있습니다,안녕하세요. 요약 통증을 비롯한 증상이 반복되면 치료를 해야 합니다. 정계정맥류는 고환에서 체내 순환계로 빠져나가는 혈류가 원활하게 순환되지 못하고 저류되거나 울혈이 생기면 정맥혈관이 확장되어 발생하게 됩니다. 오래 서 있거나 장기간 금욕이나 소변을 오랫동안 참게 되면 고환에 묵직한 느낌과 함께 통증이 생길 수 있습니다. 건승하세요.

구각염 키스,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구각염이란 입술의 가장자리 양 끝 쪽에 발생하는 질환으로 다양한 원인이 있습니다. 환자분의 면역력과도 관련이 있고 침이 지속적으로 구각 입술 가장자리에 노출이 되어도 발생할 수 있습니다. 따라서 그러한 행동을 자제해주시는 부분이 구각염의 발생 빈도를 낮추는 해결 방법이 될 수 있을 것 같습니다. 좋은 하루 보내세요.

키스만 하면 임신 가능성있나요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 네 정상생리적 반응입니다 2. 임신가능성은 없습니다 3. 이런경우도 임신은 불가합니다 임신은 정자와 난자가 만나야 가능합니다

청소년 카페인 적정량을 지키면 계속 먹어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 찾아보니 청소년은 체중 1kg당 카페인 2.5mg 정도가 권장되고 있습니다. 체중 60kg라면 150mg이 적정 허용량으로 보입니다. 안정용량에서 큰 문제가 되지는 않겠지만 매일 약으로 복용하는 것은 장기적으로 의존성과 부작용을 초래할 수 있습니다. 카페인 중독이나 면역력저하과도한 섭취시에는 가능의 가능성도 있으니 장기복용은 하지 않고.. 다른 자연적인 방법으로 각성을 유지하는 것이 좋겠습니다.

Hpv 바이러스에 대한 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. HPV 바이러스는 성관

계를 통해서만 전염되는 바이러스입니다. 따라서 태어날 때부터 HPV 바이러스가 생길 수는 없습니다. 2. HPV 바이러스는 성관계를 통해서만 전염되는 바이러스입니다. 따라서 성관계를 하지 않았더라도 HPV 바이러스에 감염될 수 있습니다. 하지만 키스와 문정은 성관계가 아니기 때문에 HPV 바이러스에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. HPV 바이러스는 성관계를 통해서만 전염되는 바이러스이지만 성관계를 하지 않았더라도 HPV 바이러스에 감염될 수 있습니다. 따라서 HPV 바이러스에 감염되지 않기 위해서는 성관계를 하지 않는 것이 가장 좋습니다. 하지만 성관계를 하는 경우에는 콘돔을 사용하는 것이 HPV 바이러스에 감염되는 것을 예방할 수 있습니다. HPV 바이러스에 감염되면 자궁경부암 생식기 사마귀 음경암 등을 유발할 수 있습니다. 따라서 HPV 바이러스에 감염되지 않도록 예방하는 것이 중요합니다.

경구피임약 피임 기간,안녕하세요. 메디이즈입니다. 꾸준히 약을 복용했다면 휴약기 동안도 피임 효과가 유지가 됩니다. 따라서 임신 가능성은 낮습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다. 사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴집니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴지는 경우 림프절염이나 탈장 혹은 고환염 등이 있을 수 있습니다. 림프절염은 림프절이 붓고 통증이 생기는 질환으로 세균이나 바이러스 감염으로 인해 발생할 수 있습니다. 탈장은 복강 내의 장기가 복벽의 약한 부위를 통해 튀어나오는 질환으로 복압이 증가할 때 발생할 수 있습니다. 고환염은 고환에 염증이 생기는 질환으로 세균이나 바이러스 감염으로 인해 발생할 수 있습니다. 림프절염이나 탈장 고환염은 모두 병원에서 치료가 가능합니다. 림프절염은 항생제를 사용하고 탈장은 수술을 통해 치료하고 고환염은 항생제를 사용하거나 고환을 제거하는 수술을 통해 치료합니다. 따라서 사타구니 안쪽에서 혹과 통증이 느껴지는 경우 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

암걸리면 몸이 피로해지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암에 걸리면 몸이 피로해질 수 있습니다. 암세포가 성장하고 증식하면서 우리 몸의 에너지를 소모하고 영양 공급을 방해하기 때문입니다. 또 암 치료 과정에서 항암화학요법 방사선 치료 등으로 인해 염증성 시토카인이 분비되고 근육의 대사 변화가 발생합니다. 이러한 과정은 피로감을 가중시킵니다.

신경이 다친건가요 아니면 근육이 다친건지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시간이 지나면 금방 회복될 가능성이 많습니다. 순간적인 과한 전기자극등에 의해 주변조직의 과긴장등인 경우가 많습니다. 며칠동안 증상 지속된다면 병원 방문하셔서 상담 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.

상복부 팽만감 설사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상복부 팽만감과 설사는 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 마라탕을 먹고 상복부 팽만감과 설사가 발생했다면 마라탕의 매운 성분이 위장관에 자극을 주어 발생했을 가능성이 있습니다. 또한 마라탕을 먹고 설사가 발생했다면 마라탕에 들어있는 식중독균에 감염되었을 가능성도 있습니다. 마라탕을 먹고 상복부 팽만감과 설사가 발생했다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 증상을 확인하고 원인을 파악한 후 적절한 치료를 처방할 수 있습니다. 네이버 검색을 통해 위암을 진단하는 것은 불가능합니다. 위암은 내시경 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 위암은 조기 발견하면 완치할 수 있는 질환입니다. 따라서 상복부 팽만감과 설사가 지속된다면 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

뒤꿈치쪽 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아킬레스건염으로 진단될 가능성이 많으며 검사는 엑스레이상 정상이고 초음파 상은 약간의 이상이 나타날 수 있습니다. 장딴지근과 가지미근의 주사치료 물리치료 등이 좋으며 소염제를 같이 복용하셔도 됩니다.

귀 먹먹함과 두통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀 먹먹함과 두통은 감기나 비염 등의 호흡기

질환으로 인해 발생할 수 있습니다. 호흡기 질환은 코막힘 목의 통증 기침 발열 등의 증상을 동반할 수 있습니다. 호흡기 질환은 대부분 자연적으로 치료되지만 증상이 심하거나 오래 지속되는 경우에는 병원에서 치료를 받아야 합니다. 타이레놀은 두통을 치료하는 데 도움이 될 수 있지만 귀 먹먹함과 두통을 유발하는 원인을 치료하지는 않습니다. 따라서 귀 먹먹함과 두통이 심하거나 오래 지속되는 경우에는 병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

뇌에 문제가 있다고 합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 난청에는 스테로이드 사용이 가장 표본적인 기본 치료입니다. CT 상의 이상소견은 별개의 문제라는 의미이며 난청과 눈의 침침함은 서로 관련성이 있습니다. 신경과 치료를 병행하심도 좋습니다.

임신인가요 생리인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신과 생리 증상은 비슷할 수 있지만 차이가 있습니다. 임신 증상은 생리 예정일보다 2주 이상 지난 후에 나타나며 생리 주기와 관계없이 나타납니다. 생리 증상은 생리 예정일 23일 전부터 나타나며 생리 주기에 따라 나타납니다. 따라서 생리 예정일보다 2주 이상 지난 후에 생리 증상이 나타난다면 임신 가능성이 있습니다. 하지만 임신 테스트를 하기 전에는 임신 여부를 확신할 수 없습니다. 따라서 임신 테스트를 해보거나 산부인과에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

아 선생님 전기로 인해 생긴 근육 문제라면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전기로 인해 근육 손상이 생겼다면 보통 몇 주에서 몇 달이 걸려서 회복됩니다. 하지만 손상이 심한 경우라면 회복에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 손상된 근육은 시간이 지나면서 점점 회복되지만 완전히 회복되지 않을 수도 있습니다. 따라서 전기로 근육 손상이 생겼다면 손상 부위를 보호하고 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 또한 통증이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

이거 헤르페스인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변이 뚜렷한 수포의 형태를 보이지는 않아서 아직 판단하기 이른 것 같습니다. 경과를 지켜보시고 병변이 더 많아진다면 불편한 증상이 심해지면 비뇨의학과를 방문하시기 바랍니다.

전기로 인해 생긴 통증 피부인지 근육문제인지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한 달 전 정전기 소리와 함께 손가락 통증이 생겼다면 피부 손상보다는 근육 손상이 더 확률이 높습니다. 정전기는 전기 충격을 일으키지만 피부 손상은 거의 없습니다. 하지만 정전기는 근육을 수축시킬 수 있고 이로 인해 통증이 발생할 수 있습니다. 따라서 손가락 통증이 가만히 있으면 안 아프고 날카로운 물체에 스칠 때만 아프다면 근육 손상이 더 확률이 높다고 볼 수 있습니다. 만약 통증이 심하거나 지속된다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

포경 수술부위 아래 혹? 멍울?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 포경 수술후 한달째인데 몇일전부터 발기시 수술부위 바로 아래쪽에 수술라인대로 긴 혹 멍울 같은게 생겼군요. 크게 걱정하지 마시고 수술 받으신 병원에 내원하셔서 직접 상담을 받도록 하십시오.

손날로 손가락 끝으로 손찌르기 하다 벽 찔렸는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 부상을 입었군요 엑스레이는 필요치 않을 가능성이 많겠습니다. 근육 끝부분 힘줄의 손상이 있을 것으로 생각되며 보호대를 쓰는게 편할 수 있으며 소염제는 기본적으로 복용합니다.

미주신경성 실신 했으면 관리가 필요한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미주신경성 실신은 심장과 뇌를 연결하는 미주신경의 이상으로 인해 발생하는 질환입니다. 미주신경은 심장의 박동수를 조절하는 역할을 하는데 미주신경이 과도하게 활성화되면 심장 박동수가 급격히 떨어지면서 실신할 수 있습니다. 미주신경성 실신은 심장 질환이 아니므로 심장초음파나 피검사를 해도 이상이 없을 수 있습니다. 하지만 미주신경성 실신은 심각한 부상을 입을 수 있는 질환이므로 반드시 심장쪽 검사를 받고 관리를 받아야 합니다. 미주신경성 실신은 심장 박동수가

급격히 떨어지면서 발생하기 때문에 심장 박동수를 안정적으로 유지하는 약물을 복용하거나 심장 박동수를 안정적으로 유지하는 생활습관을 가지는 것이 도움이 됩니다. 또한 미주신경성 실신은 스트레스를 받으면 발생할 가능성이 높기 때문에 스트레스를 관리하는 것도 도움이 됩니다.

코뼈 비관혈적 정복술을 받은 후 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비관혈적 정복술 후 코뼈 골절 회복 기간은 일반적으로 약 6주 정도 걸립니다. 초기 2주 동안은 특히 조심해야 하며 부목을 착용하더라도 배드민턴이나 조깅과 같은 신체 활동은 피하는 것이 좋겠습니다. 부목 착용 시에도 충격을 줄 수 있어 추가 손상을 일으킬 여지가 있습니다. 주치의와 상의하여 운동이 가능한 시점을 확인하시는게 좋겠고 일반적으로 46주 후에 가벼운 운동을 시작하는 것이 안전합니다.

돌발성 난청에 대해,안녕하세요. 메디이즈입니다. 돌발성 난청은 갑자기 한쪽 귀의 청력이 떨어지는 질환입니다. 돌발성 난청은 치료가 늦을수록 회복이 어려워지므로 증상이 나타나면 즉시 치료를 시작하는 것이 좋습니다. 돌발성 난청의 치료에는 스테로이드 약물과 이뇨제 항혈소판제 등의 약물을 사용합니다. 또한 비타민과 미네랄 등을 보충하는 것도 도움이 됩니다. 돌발성 난청은 치료 후에도 약 10 정도에서 청력이 완전히 회복되지 않는 경우가 있습니다. 하지만 치료를 하면 대부분 청력이 어느 정도 회복되므로 치료를 시작하는 것이 좋습니다. 현재 5년 정도 지난 상태지만 지금이라도 치료를 시작하면 청력이 어느 정도 회복될 수 있습니다.

포경 수술부위 아래 혹? 명을?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 포경 수술후 한달째인데 몇일전부터 발기시 수술부위 바로 아래쪽에 수술라인대로 긴 혹 명을 같은게 생겼군요. 크게 걱정하지 마시고 수술 받으신 병원에 내원하셔서 직접 상담을 받으록 하십시오.

손날로 손가락 끝으로 손찌르기 하다 벽 찔렸는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 부상을 입었군요 엑스레이는 필요치 않을 가능성이 많겠습니다. 근육 끝부분 힘줄의 손상이 있을 것으로 생각되며 보호대를 쓰는게 편할 수 있으며 소염제는 기본적으로 복용합니다.

편도선염 목 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 편도선염이나 인후염이 있을 때 목에서 소량의 출혈이 발생할 수 있습니다. 염증이 있는 부위가 자극을 받아 출혈이 생길 수 있습니다. 소량의 출혈이 금방 멎었다면 큰 문제는 아닐 가능성이 높지만 출혈이 지속되거나 양이 많아지면 즉시 병원을 방문하시는 것이 안전합니다.

편도선염 목 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 편도선염이나 인후염이 있을 때 목에서 소량의 출혈이 발생할 수 있습니다. 염증이 있는 부위가 자극을 받아 출혈이 생길 수 있습니다. 소량의 출혈이 금방 멎었다면 큰 문제는 아닐 가능성이 높지만 출혈이 지속되거나 양이 많아지면 즉시 병원을 방문하시는 것이 안전합니다.

코뼈 비관혈적 정복술을 받은 후 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비관혈적 정복술 후 코뼈 골절 회복 기간은 일반적으로 약 6주 정도 걸립니다. 초기 2주 동안은 특히 조심해야 하며 부목을 착용하더라도 배드민턴이나 조깅과 같은 신체 활동은 피하는 것이 좋겠습니다. 부목 착용 시에도 충격을 줄 수 있어 추가 손상을 일으킬 여지가 있습니다. 주치의와 상의하여 운동이 가능한 시점을 확인하시는게 좋겠고 일반적으로 46주 후에 가벼운 운동을 시작하는 것이 안전합니다.

스테로이드 주사로 신경손상 되었다면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통 수개월 이상 소요가 되는데 증상이 지속된다면 신경과 진료가 가장 적합합니다. 신경과 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

운동 후 잘 때 팔 저림과 정 자세로 누울 때 팔 저림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동을 무리해서 근육손상으로 인한 통증일 수도 있고요 흉곽출구증후군일 가능성도 있어보이네요. 신경과진료와 더불어 정형외과 진료도 같이 보시는게 좋겠습니다.

기상후 머리 무거움 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 수면 무호흡 증상이 있는지 주간에 과도한 졸리움이 있는지 운전하다가 졸리움이 있는지 확인해 보시고 필요하다면 수면다원검사가 도움이 됩니다.

안녕하세요 피임약과 먹어도 되는 약인지 여쭙보고 싶습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 드시는 피임약 머시론하고 처방받은 약중에 트란사민정은 혈전의 부작용이 우려되니 함께 복용하지 않으시는것을 권합니다.

안녕하세요 추가 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임효과에는 영향은 없을 것으로 생각합니다. 3일 정도 드신것은 큰 문제는 없을 것으로 생각합니다. 흡연은 안하시죠? 그약은 빼고 드시죠?

선생님 안녕하세요 답변에 대한 추가 질문 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 트란사민정을 드시는 이유는 무엇인가요? 보통은 잘 사용하는 약은 아닌데... 꼭 드셔야 하는 약이 아니면 드시지 않는편이 좋을 것 같습니다.

소음 노출 청력 손상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 청력검사를 해봐야 알 수 있습니다. 그 정도의 소음 노출에는 청력 저하가 안 일어날 가능성이 많습니다. 가까운 이비인후과에 가서 청력검사받으세요

안녕하세요 트라넥사민산 피임약 복용하면 안되는건가요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에 복용해도 문제없을 것이라고 답변을 올렸었는데 정정을 해야 할것 같습니다 가급적이면 동시 복용하지 않으시는 것이 좋을 것 같습니다. 혈액응고가 촉진될 수 있다고 합니다 . 트라사민산은 왜 드시는 것인가요?

헬리코박터균 치료받으려는데 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 위내시경을 했다면 헬리코박터 제균 치료를 목적으로 다시 검사를 할 필요는 없습니다. 헬리코박터 균은 자연적으로 소실되지 않습니다.

20세 중반 혈압 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 젊기 때문에 생활 습관 조절을 먼저 해보고 계속 높다면 이차성 고혈압에 대한 검사가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

관계한지 일주일만에 임신증상이 나타나기도하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통 임신 관련 증상은 HCG 가 상승해야 하므로 3주 이후에 나타납니다. 하지만 개인차가 있을 수는 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

하품하다가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 턱관절장애악관절 증상일 수 있습니다. 턱관절은 뼈 근육 인대 신경 디스크 등 다양한 구조물들이 존재합니다. 하품을 심하게 하거나 질긴 음식을 많이 씹거나 할때 증상이 발생할 수 있습니다. 심한경우 턱관절의 부정교합이 발생할 수도 있겠지요. 최대한 입을 크게 벌리는 것을 삼가하고 질긴 음식을 씹는 행위를 자제해야 합니다. 소염진통제 등이 필요할 수 도 있습니다. 최대한 예방을 함에도 불구하고 증상이 지속될 때 턱관절장애 전문병원의 진료가 필요할 수 있습니다.

해면체 손상에 대하여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근에 운동하다가 꼬추를 바닥에 부딪혔군요. 크게 걱정하지 마시고 비뇨기와 내원하셔서 현재 상태에 대한 정확한 진료를 받도록 하십시오.

편도에 동그란게 생겼습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 편도에 동그란 덩이가 보이기 시작

했고 사라지지 않고 지속되어 걱정스러우신 상황이라 이해됩니다. 이비인후과에서 가장 정확한 진찰을 받아보실 수 있겠으니 검사가 필요한지에 대해 상담받아보시기를 권해드립니다.

신경이 다친건가여 근육이 다친건가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 저희 경우라면 손 증상부위의 순환을 담당하는 교감신경의 출구 경로를 압박하는 근육을 찾기위한 진찰과 그 치료를 위주로 할 것 같습니다.

암걸리면 몸이 피로해지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암에 걸리면 몸이 피로해질 수 있습니다. 암세포가 성장하고 증식하면서 우리 몸의 에너지를 소모하고 영양 공급을 방해하기 때문입니다. 또 암 치료 과정에서 항암화학요법 방사선 치료 등으로 인해 염증성 시토카인이 분비되고 근육의 대사 변화가 발생합니다. 이러한 과정은 피로감을 가중시킵니다.

화장실 처리 단계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일반적으로 소변을 보고 난 후에는 요도에서 항문 쪽으로 닦는 것이 위생적입니다. 항문과 요도 사이가 가깝고 요도의 길이가 짧기에 세균이 쉽게 침투될 수 있기 때문입니다. 질부분은 굳이 필요없습니다 개인의 청결 관리 방법은 다양할 수 있으며 특별히 정해져 있는 것은 아닙니다

뇌에 문제가 있다고 합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 난청에는 스테로이드 사용이 가장 표본적인 기본 치료입니다. CT 상의 이상소견은 별개의 문제라는 의미이며 난청과 눈의 침침함은 서로 관련성이 있습니다. 신경과 치료를 병행하심도 좋습니다.

이거 헤르페스인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변이 뚜렷한 수포의 형태를 보이지는 않아서 아직 판단하기 이른 것 같습니다. 경과를 지켜보시고 병변이 더 많아진다면 불편한 증상이 심해지면 비뇨의학과를 방문하시기 바랍니다.

뇌에 문제가 있다고 합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 난청에는 스테로이드 사용이 가장 표본적인 기본 치료입니다. CT 상의 이상소견은 별개의 문제라는 의미이며 난청과 눈의 침침함은 서로 관련성이 있습니다. 신경과 치료를 병행하심도 좋습니다.

뒤꿈치쪽 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아킬레스건염으로 진단될 가능성이 많으며 검사는 엑스레이상 정상이고 초음파 상은 약간의 이상이 나타날 수 있습니다. 장딴지근과 가지미근의 주사치료 물리치료 등이 좋으며 소염제를 같이 복용하셔도 됩니다.

음주잘문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 금주가 훨씬 좋습니다. 막걸리 한잔도 좋지 않습니다. 적포도주와 같은 경우 예전 논문에서는 혈관질환의 위험률을 줄인다는 자료는 있지만 득과 실을 따졌을때 술을 드시지 않는 것을 권합니다.

영양제 먹는 순서 문의드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유산균은 일어나자마자 콜라겐은 취침전 멀티비타민과 루테인 오메가3는 같이 식후 입니다 인터넷 구매한 건기식의 경우는 원료의 출처를 제대로 기재하지 않거나 유효기간을 속여 파는 경우도 있으니 이왕이면 약국에서 상담 제대로 받고 주성분 외에 부성분의 조합이 좋은 것으로 추천받아서 구매하시길 바라겠습니다

안약과 눈물약 간격을 어떻게 하면 좋을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안약이 중요한 성분이라면 최소 10분에서 30분 후에 넣는 것이 맞습니다 특히 안압을 맞추거나 염증 물질을 제거하는 것이라면요 평소에는 5분 간격을 띠면 되기는 하지만 그렇게 희석되면 효과가 없거나 같이 넣었을때 약효가 감소하기 쉬운 안약은 멀찌감치 시간을 띄워서 넣어주시시오 그리고 2분 정도 눈 감아야 안약은 흡수되는 것 꼭 기억하시길 바랍니다

세인트존스워트 페리카 영양제랑 피부과 항생제랑 상호관련,안녕하세요. 하이닥 상담약사 이영준입니다 성한 풀이라고 불리는 이 영양제는 긍정적인 삶을 도와주기에 참 좋은 성분입니다 그런데 항히스타민 성분 피부 이비인후과 에서 많이 쓰는과 호르몬제에는 교란을 일으키

는 대표적인 성분이기때 주의를 기울여야 합니다 성한품의 경우는 취침전에 따로 먹으면 그나마 상호작용이 덜 할 것으로 판단합니다 .

멜라논하이드로퀴논 크림과 아크리프 크림을 병행해도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 멜논 크림의 경우에는 취침전에 붙을 거의 다 끈 상태에서 사용하는 것입니다 여드름 연고의 경우에는 언제든지 바를 수 있으니 바르는 시기만 간격을 둔다면 같이 사용해도 좋겠습니다 같이 바를 경우 흡수에 서로 방해를 해서 약효가 잘 안나올 확률이 있어서 그렇습니다 독시크정 복용 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알약을 반을 잘려서 복용하는 것은 좋은 방법입니다 문제는 정확하게 용량이 균등하게 배분되어 있지 않은 경우도 있다는 확률이 있는 것이나 매일 잘라서 먹는다면 몸속의 항생제 농도는 거의 일정하게 될 것으로 생각됩니다 독시사이클린 사실 매독 치료를 위해 사용하는 상당히 강력한 항생제 입니다 이왕이면 항생제 최대한 안 먹고 치료할 수 있는 방법을 찾아보심을 추천드립니다 꼭 유산균 복용으로 장건강이 상하지 않도록 하시구요

임신준비중 남자 약 복용문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 바르는 겔은 괜찮습니다 두피에만 적용이 되니까요 이소티논은 호르몬 유사체이기때 복용하면 안되겠습니다 술과 담배 2가지도 줄여주시는 것 기억하시고 예쁜 아이 준비 잘 하시길 기원합니다

일자목 목디스크 판정후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옆목 목빗근에 압박되는 경신경총의 줄기 중에 횡경신경이 압박되면 해당부위의 통증이 발생할 수 있습니다. 옆목의 물리치료와 신경치료가 도움이 됩니다.

물토...안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸살 초기일 수 있으며 두통만으로 제한 한다고 하면 구역감이나 구토는 두통의 흔한 동반증상입니다. 가까운 곳에서 진토제 주사를 맞고 약을 복용하는게 효과적일 수 있겠습니다.

손가락 신경이 다치면 회복되는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락을 포함하여 신경이 다친 경우 회복기간을 임상적으로 미리 예측할 수 없습니다. 손상된 상태로 회복이 되지 않는 경우도 가능합니다.

근전도 검사에서 이상소견이 나올까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위의 결과지를 가지고 가시면 아마도 같은 결과가 나올 가능성이 많습니다. 근전도검사는 검사자의 꼼꼼함이 중요한데 타 병원의 결과지가 비정상인 경우 현재의 검사결과가 정상일 가능성은 없습니다.

뒤꿈치쪽 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아킬레스건염으로 진단될 가능성이 많으며 검사는 엑스레이상 정상이고 초음파 상은 약간의 이상이 나타날 수 있습니다. 장딴지근과 가시미근의 주사치료 물리치료 등이 좋으며 소염제를 같이 복용하셔도 됩니다.

음주 후 포카리음료 섭취,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구토 직후에는 세시간 정도 났때까지는 물을 안드시는 것이 좋아요 .그안에 물드시면 다시 토하는 경우가 흔히 있습니다. 일시적으로 도움이 될수 있습니다

손톱이 하얀? 가로줄이 났습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서 관찰되는 손톱의 상태는 전반적으로 건강하다고 보여집니다. 다만 갑상선 항진증으로 치료받는 중이며 피로를 과도하게 느끼는 상황인 경우 갑상선 호르몬과 관련된 증상일 가능성은 있어보입니다.

화장실 처리 단계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일반적으로 소변을 보고 난 후에는 요도에서 항문 쪽으로 닦는 것이 위생적입니다. 항문과 요도 사이가 가깝고 요도의 길이가 짧기에 세균이 쉽게 침투될 수 있기 때문입니다. 질부분은 굳이 필요없습니다 개인의 청결 관리 방법은 다양할 수 있으며 특별히 정해져 있는 것은 아닙니다

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장용종을 말씀하시느건지 정확하지는 않으나 대장

용종이 있는 경우라면 정기적인 대장 내시경을 해 보시는게 좋겠습니다. 감사합니다

암걸리면 몸이 피로해지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암에 걸리면 몸이 피로해질 수 있습니다. 암세포가 성장하고 증식하면서 우리 몸의 에너지를 소모하고 영양 공급을 방해하기 때문입니다. 또 암 치료 과정에서 항암화학요법 방사선 치료 등으로 인해 염증성 시토카인이 분비되고 근육의 대사 변화가 발생합니다. 이러한 과정은 피로감을 가중시킵니다.

오른쪽 윗가슴 통증과 증상 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로는 알기 어렵지만 검사에서 이상이 없었다고 하면 특히 우측 가슴통증이라고 하시니 근육통의 가능성을 생각해볼 수 있습니다

음주 후 포카리음료 섭취,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구토 직후에는 세시간 정도 뭘때까지는 물을 안드시는 것이 좋아요 .그안에 물드시면 다시 토하는 경우가 흔히 있습니다. 일시적으로 도움이 될수 있습니다

고 2 학생,안녕하세요 요약 1. 가임기인지가 중요하고 2. 정액이 뺐으면 결국 임신 가능성도 있습니다. 3. 생리 중에 사정하지 않는 이상 가능성은 있으니 4. 시기가 다가오면 임신테스트기로 확인해 보세요 건승하세요

고중량운동이 안압이나 시신경에 문제가 생길 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1RM1회 최대 중량 운동은 안압을 순간적으로 크게 상승시킬 수 있습니다. 이러한 순간적인 안압 상승은 시신경에 일시적인 스트레스를 줄 수 있으며 특히 녹내장과 같은 안압 관련 문제가 있는 경우에는 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 일반적으로 건강한 사람에게는 일시적인 안압 상승이 시신경에 장기적인 문제를 일으키지 않을 가능성이 높습니다. 다만 발살바 호흡법은 압력을 더 높이므로 안압을 걱정하신다면 가급적 피하셔야 할 행동이라 볼 수 있습니다. 헤르페스 증상인지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 4주 짜 혈액검사를 받아보시면 정확할 것 같습니다 다리가 저린다고 헤르페스 증상은 아니니 걱정안하셔도 될 것 같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

자세나 입은 옷에 따라 고환의 통증이 유발될 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오른쪽 고환의 통증이 반복적으로 나타난다면 몇 가지 가능성을 고려해볼 수 있습니다. 이는 고환염 부고환염 정계정맥류 탈장 등과 같은 문제일 수 있습니다. 특히 통증이 오래 지속되거나 심해 진다면 반드시 비뇨의학과를 방문해 진료받아보시는 것이 안전합니다.

헤르페스 혈액검사 신뢰도,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 항체가 생기는데에는시간이 걸리기 때문에 증상과 상관없이 4주는 지나서 검사를 받는것이 더 정확합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

음주잘문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 금주가 훨씬 좋습니다. 막걸리 한잔도 좋지 않습니다. 적포도주와 같은 경우 예전 논문에서는 혈관질환의 위험률을 줄인다는 자료는 있지만 득과 실을 따졌을때 술을 드시지 않는 것을 권합니다.

입술포진?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소위 말하는 헤르페스 감염단순포진 맞습니다. HSV1 바이러스에 의한 질환이고 보통 구강대 구강으로 전염이 많이 이루어 집니다. 성관계에 의한 감염은 생식기 감염을 많이 일으키는 HSV2형이 해당됩니다. 보통 치료는 아시클로비어 연고 등약국에서 구매 가능으로 치료 될 수 도 있으며 확실히 치료하고 싶거나 빠른 경과 호전을 위해서는 병원에서 약 처방을 받으면 됩니다. 피곤하거나 스트레스를 많거나 감기 등 면역력이 저하될 때 재발성으로 증상이 많이 발현 됩니다.

CT와 MRI를 같은 날에 찍어도 되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제를 사용하신다면 조영제로 인한 부작용이 있을 수도 있습니다. CT 의 경우는 방사선 노출로 인한 위험성이 있을 수도 있습니다만 필요한 경우 2가지 검사는 시행합니다

알레르기 비염약 중 스테로이드나 안압이 오르는 약이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베리지정베포타스틴 베실산염 씨투정세티리진 토스텐캡슐아세틸시스테인 토프드정레바미피드는 안압 상승과 직접적인 관련이 적습니다. 만약 안압 상승이 우려된다면 안과를 방문하셔서 측정해보시면 되겠습니다.

손가락 봉합 후 행동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 커피는 마셔도 됩니다. 손가락 방향은 정해진 것은 없고 편안한 방향으로 하시되 심장보다 높게 올리면 욕신거림이 덜 할수 있습니다

가게 유리철거하는곳 근처지나가면 유리조각이나 가루가 두피로 튀어서 두피염이나 탈모가생길수있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유리 파편이 두피에 닿으면 물리적인 손상이나 염증을 일으킬 수 있습니다. 탈모나 두피염으로 진행될 가능성은 낮지만 상처가 나거나 염증이 생길 수 있습니다. 두피에 이상이 느껴지거나 상처가 있다면 피부과를 방문해 확인받아보시면 되겠습니다.

경구용 미녹시딜 하루에 1정 복용 괜찮나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부작용이 없다면 1정까지는 괜찮습니다. 다만 고혈압약과 같이 복용시 혈압저하 효과가 더 있을 수 있으며 간혹 단독으로 복용시에도 국소 부종눈주위 부종 두통 등이 있을 수 있습니다. 여성인 경우에는 14정 복용이 권장됩니다.

손가락 끝이 가렵고 통증이 느껴집니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 끝의 빨갛고 열감 통증 가려움증이 있는 증상이 나타난다면 피부과를 방문하는 것이 가장 적합하다고 판단됩니다. 현 상황에서는 피부과 전문의가 가장 정확한 진단과 치료를 제공할 수 있을 것이라 보입니다.

성인 adhd,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성인 ADHD는 완치보다는 관리가 목표입니다. 일반적으로 약물치료와 행동치료를 통해 증상을 효과적으로 통제할 수 있습니다. 생활습관 개선과 심리치료도 중요한 역할을 합니다. 그러니 지속적인 관리와 치료를 이어가시길 권해드립니다.

비관혈적 정복술 후 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어느 부위에 대한 비관혈적 정복술이었는데에 따라 제한되는 동작이나 운동이 달라질 것입니다. 조금 더 구체적인 정보가 필요한 상황이므로 다시 질문을 해보신다거나 진료받으셨던 정형외과를 다시 방문해보실수도 있겠습니다.

야즈 부정출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 출혈량이 상당한 상황으로 증상이 악화되었다 판단할만한데 이러한 경우 발견되지 못한 산부인과적 질환이 출혈의 원인일 가능성도 조심스레 의심해보아야 할 것이라 생각합니다. 추가적인 산부인과 진료를 받아보시기를 권해드립니다.

저 성대결절 인가요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 성대결절이 의심되면 검사로 확인이 필요합니다 2. 목소리를 최대한 사용하지 않으면서 경과를 지켜보실 수 있습니다 3. 악성으로 변하지 않습니다

입술포진?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소위 말하는 헤르페스 감염단순포진 맞습니다. HSV1 바이러스에 의한 질환이고 보통 구강대 구강으로 전염이 많이 이루어 집니다. 성관계에 의한 감염은 생식기 감염을 많이 일으키는 HSV2형이 해당됩니다. 보통 치료는 아시클로비어 연고 등약국에서 구매 가능으로 치료 될 수 도 있으며 확실히 치료하고 싶거나 빠른 경과 호전을 위해서는 병원에서 약 처방을 받으면 됩니다. 피곤하거나 스트레스를 많거나 감기 등 면역력이 저하될 때 재발성으로 증상이 많이 발현 됩니다.

헤르페스 혈액검사 질문있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1형 IgG 양성이란 입술 포진을 가지고 있다는 말입니다. 이번 성관계로 2형 포진인 성기 포진은 안생긴거 같습니다.

혼합치핵 레이저 절제술 후 한달,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 아물기까지 보통 2달 정도 소요 되기 때문에 아직은 벌어진 상처가 남아 있을 것이고 부을 수도 있습니다. 혈전성 외치핵은 항문혈관이 터져서 새 나온 혈액이 굳은 것으로 며칠 지나면 흡수되어서 부은 것이 저절로 가라앉는 경우가 많으나 크거나 단단하면 잘 흡수되지 않아 제거가 필요한 경우도 있습니다. 수술 후 경과에 대한 질문은 수술 받으셨던 병원에 가셔서 상처를 보이고 직접 설명을 들으시는 것이 좋습니다. 감사합니다.

경구용 미녹시딜 하루에 1정 복용 괜찮나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부작용이 없다면 1정까지는 괜찮습니다. 다만 고혈압약과 같이 복용시 혈압저하 효과가 더 있을 수 있으며 간혹 단독으로 복용시에도 국소 부종눈주위 부종 두통 등이 있을 수 있습니다. 여성인 경우에는 14정 복용이 권장됩니다.

레이저 시술 후 시력손상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보통은 안구 보호대를 착용시키고 시술하는게 일반적이긴 합니다. 다만 눈을 감는 것 만으로도 거의 대부분 차폐가 되기는 합니다. 혹시 걱정되신다면 안과에서 각막과 망막 상태를 한번 확인해보시는게 도움이 될 듯 합니다. 감사합니다.

헤르페스 혈액검사 신뢰도,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 항체가 생기는데에는시간이 걸리기 때문에 증상과 상관없이 4주는 지나서 검사를 받는것이 더 정확합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

빛 번짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈을 깜박이게 되면 눈물층의 분포가 변화해서 일시적으로 빛번짐이 있을 수는 있고 해당 증상은 큰 이상은 아니긴 합니다. 빛번짐의 원인이 무엇이나에 따라서 발생 상황 빈도 등은 달라질 수 있을 듯 합니다.

비주얼 스노우 증상일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전형적인 비주얼 스노우라고 하긴 좀 그런 거 같네요. 다만 망막이나 시신경에 이상이 없다면 특별한 치료 방법이 있을 거 같지는 않습니다. 안과에서 한번쯤 망막이랑 시신경 이상 여부만 확인하시고 괜찮다면 경과관찰해보시는 게 좋을 듯 합니다. 감사합니다.

눈 한쪽 쌍꺼풀 찢해짐.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다래끼가 쌍꺼풀 라인에 걸쳐있을 때 절개배놓하게되면 해당 부위 쌍꺼풀 라인의 변화를 동반할 수 있습니다. 열어졌다면 수술로 라인을 좀 더 선명하게 만들 수 있지만 찢어진 것은 지켜보셔야 할 듯 합니다. 감사합니다.

경구용 미녹시딜 하루에 1정 복용 괜찮나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부작용이 없다면 1정까지는 괜찮습니다. 다만 고혈압약과 같이 복용시 혈압저하 효과가 더 있을 수 있으며 간혹 단독으로 복용시에도 국소 부종눈주위 부종 두통 등이 있을 수 있습니다. 여성인 경우에는 14정 복용이 권장됩니다.

손가락 봉합 후 행동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 커피는 마셔도 됩니다. 손가락 방향은 정해진 것은 없고 편안한 방향으로 하시되 심장보다 높게 올리면 욱신거림이 덜 할수 있습니다

손가락 봉합 후 행동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 커피는 마셔도 됩니다. 손가락 방향은 정해진 것은 없고 편안한 방향으로 하시되 심장보다 높게 올리면 욱신거림이 덜 할수 있습니다

둘코락스 과다복용 점액변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둘락스는 변비약으로 사용되지만 과다복용하는 경우에 장 점막을 자극하고 점액변과 같은 문제를 일으킬 여지가 있습니다. 복용을 중단하시고 가까운 내과를 방문해 진료받아보시는게 안전하겠습니다.

입술포진?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소위 말하는 헤르페스 감염단순포진 맞습니다. HSV1 바이러스에 의한 질환이고 보통 구강대 구강으로 전염이 많이 이루어 집니다. 성관계에 의한 감염은 생식기 감염을 많이 일으키는 HSV2형이 해당됩니다. 보통 치료는 아시클로비어 연고 등약국에서 구매 가능으로 치료 될 수 도 있으며 확실히 치료하고 싶거나 빠른 경과 호전을 위해서는 병원에서 약 처방을 받으면 됩니다. 피곤하거나 스트레스를 많거나 감기 등 면역력이 저하될 때 재발성으로 증상이 많이 발현 됩니다.

피부암인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부암의 경우는 대부분 크기의 변화가 있는경우가 대부분이고 환자분 병변은 가피로 보여집니다. 일단은 경과를 보시고 지속시 피부과에서 확인해 보시기 바랍니다.

레이저 제모 화상 흉터,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착은 보통 624개월 정도지나면 저절로 좋아진다고 합니다. 제모는 색소침착이 좋아질동안 당분간 좀 어려울것 같습니다

이 약을 먹고 지능이 떨어질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용하신 약물들이 지능에 미치는 영향에 대해 걱정하시는군요. 복용한 약물들이 지능에 영구적인 영향을 미칠 가능성은 매우 낮습니다. 프록신바이정 유네콜정 휴펜정 에소졸정 다타남서방정은 일시적인 정신적 부작용이 있을 수는 있지만 일반적으로 지능에 큰 영향을 미치지 않습니다.

미움받을용기가 아예없음. 강박증..안녕하세요. 메디이즈입니다. 강박증일 수 있습니다. 많이 힘드시겠습니다. 강박증은 일종의 불안장애 증상으로 치료가 쉽지는 않지만 꾸준한 치료가 필요해 보입니다

프록사신바이정을 먹고 인지능력이 떨어질수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용하신 약물들이 지능에 미치는 영향에 대해 걱정하시는군요. 복용한 약물들이 지능에 영구적인 영향을 미칠 가능성은 매우 낮습니다. 프록사신바이정 이전에 질문하셨던 유니정 휴펜정 에졸정 다스남서방정은 일시적인 정신적 부작용이 있을 수는 있지만 일반적으로 지능에 큰 영향을 미치지 않습니다.

CT와 MRI를 같은 날에 찍어도 되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제를 사용하신다면 조영제로 인한 부작용이 있을 수도 있습니다. CT 의 경우는 방사선 노출로 인한 위험성이 있을 수도 있습니다만 필요한 경우 2가지 검사는 시행합니다

둘코락스 과다복용 점액변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둘락스는 변비약으로 사용되지만 과다 복용하는 경우에 장 점막을 자극하고 점액변과 같은 문제를 일으킬 여지가 있습니다. 복용을 중단하시고 가까운 내과를 방문해 진료받아보시는게 안전하겠습니다.

둘코락스 과다복용 점액변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둘락스는 변비약으로 사용되지만 과다 복용하는 경우에 장 점막을 자극하고 점액변과 같은 문제를 일으킬 여지가 있습니다. 복용을 중단하시고 가까운 내과를 방문해 진료받아보시는게 안전하겠습니다.

물토...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸살 초기일 수 있으며 두통만으로 제한 한다고 하면 구역감이나 구토는 두통의 흔한 동반증상입니다. 가까운 곳에서 진토제 주사를 맞고 약을 복용하는게 효과적일 수 있겠습니다.

프록사신바이정을 먹고 인지능력이 떨어질수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용하신 약물들이 지능에 미치는 영향에 대해 걱정하시는군요. 복용한 약물들이 지능에 영구적인 영향을 미칠 가능성은 매우 낮습니다. 프록사신바이정 이전에 질문하셨던 유니정 휴펜정 에졸정 다스남서방정은 일시적인 정신적 부작용이 있을 수는 있지만 일반적으로 지능에 큰 영향을 미치지 않습니다.

레이저 제모화상 흉터,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착은 사람마다 다양하나 보통은 2

개월에서 6개월 사이에는 없어지는 것으로 알려져 있습니다. 일단은 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

야즈 부정출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 출혈량이 상당한 상황으로 증상이 악화되었다 판단할만한데 이러한 경우 발견되지 못한 산부인과적 질환이 출혈의 원인일 가능성도 조심스레 의심해보아야 할 것이라 생각합니다. 추가적인 산부인과 진료를 받아보시기를 권해드립니다. 정신과약이랑 비뇨기과약을 같이 먹으면 안되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 증상이 있다면 같이 복용 하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

미음받을용기가 아예없음. 강박증.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 강박증일 수 있습니다. 많이 힘드시겠습니다. 강박증은 일종의 불안장애 증상으로 치료가 쉽지는 않지만 꾸준한 치료가 필요해 보입니다

검은변에 과산화수소를 뿌렸더니 거품이 생겼습니다 혈변인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흑변을 조심해야 하는 이유는 상부 위장관에서의 출혈을 의심할 수 있기 때문입니다. 흑변에 과산화수소를 뿌렸을 때 거품반응이 보인다는 것은 혈액이 존재함을 시사합니다. 따라서 병원을 방문하셔야 하는 소견이라 볼 수 있으니 곧바로 근처 내과를 방문하셔야 합니다.

둘코락스 과다복용 점액변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둘락스는 변비약으로 사용되지만 과다 복용하는 경우에 장 점막을 자극하고 점액변과 같은 문제를 일으킬 여지가 있습니다. 복용을 중단하시고 가까운 내과를 방문해 진료받아보시는게 안전하겠습니다.

왼쪽 가슴 흉통이 찌릿 하고 잠깐 왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 협심증에 의한 흉통은 아닌듯 합니다. 근육에서 일시적인 근경련이 있었거나 신경통에 의한 증상인 것 같네요. 통증이 지속된다면 내과나 신경과 진료를 보시기 바랍니다.

이와 같은 콜레스테롤 상승이 식단에 의한 것인지 타고난 엘디엘 수치인 것인지 감이 안옵니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실제로 임상적으로 수치가 많이 높지 않으면 유전적인 소인으로 보지는 않습니다. 생활 습관과 연관인 있을 가능성이 높지요

음주잘문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 금주가 훨씬 좋습니다. 막걸리 한잔도 좋지 않습니다. 적포도주와 같은 경우 예전 논문에서는 혈관질환의 위험률을 줄인다는 자료는 있지만 득과 실을 따졌을때 술을 드시지 않는 것을 권합니다.

지속적인 가위눌림 어떻게 해야 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스가 많으시지요? 그때까지는 약물의 도움을 받아보시면 어떨까 싶습니다. 시험전 컨디션 조절이 필요해 보입니다

레이저 제모화상 흉터,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착은 사람마다 다양하나 보통은 2개월에서 6개월 사이에는 없어지는 것으로 알려져 있습니다. 일단은 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

녹슨 귀걸이를 모르고 계속 차고 있었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 십년간에 파상풍 접종이 없었다면 접종이 필요합니다. 상처 소독을 하여 염증이 생기지 않도록 관리가 필요합니다

음주잘문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 금주가 훨씬 좋습니다. 막걸리 한잔도 좋지 않습니다. 적포도주와 같은 경우 예전 논문에서는 혈관질환의 위험률을 줄인다는 자료는 있지만 득과 실을 따졌을때 술을 드시지 않는 것을 권합니다.

헤르페스 혈액검사 신뢰도,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 항체가 생기는데에는시간이 걸리기 때문에 증상과 상관없이 4주는 지나서 검사를

받는것이 더 정확합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문 달아주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

지속적인 가위눌림 어떻게 해야 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스가 많으시지요? 그때까지는 약물의 도움을 받아보시면 어떨까 싶습니다. 시험전 컨디션 조절이 필요해 보입니다

레이저 제모 화상 흉터,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소침착은 보통 624개월 정도지나면 저절로 좋아진다고 합니다. 제모는 색소침착이 좋아질동안 당분간 좀 어려울것 같습니다

신경이 다치면 회복 기간이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경이 다치면 회복 기간은 신경의 손상 정도에 따라 다릅니다. 만약 신경이 완전히 절단된 경우에는 회복이 불가능하지만 신경이 부분적으로 손상된 경우에는 시간이 지나면서 회복될 수 있습니다. 신경이 부분적으로 손상된 경우에는 보통 36개월 정도의 시간이 걸리며 회복이 되더라도 이전과 같은 기능을 회복하지 못할 수도 있습니다. 신경이 다친 경우에는 신경의 손상 정도를 정확하게 진단하고 적절한 치료를 받아야 합니다. 신경이 다친 경우에는 통증 저림 감각 이상 등의 증상이 나타날 수 있으며 신경이 완전히 절단된 경우에는 마비 증상이 나타날 수 있습니다. 신경의 손상이 심한 경우에는 신경 재건술을 받아야 할 수도 있습니다. 신경이 다친 경우에는 신경의 손상 정도에 따라 회복 기간이 다르기 때문에 정확한 진단과 치료가 필요합니다. 신경이 다친 경우에는 병원에 방문하여 진료를 받아보시기 바랍니다.

정신건강 관련 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알코올 의존증과 불안 장애가 함께 있는 것으로 보이며 자해를 한다면 응급 진료가 필요합니다. 정신건강의학과 진료를 받으시 보시기 바랍니다.

임신전조증상일까요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미레나는 피임 효과가 높아 임신 가능성은 매우 낮지만 완전히 배제할 수는 없습니다. 미레나 시술 후 부정출혈과 통증은 흔한 부작용으로 초기 몇 달 동안 나타날 수 있습니다. 또 허리와 아랫배 통증 몸살 같은 증상은 감염이나 다른 원인일 가능성이 크므로 우선 임신 테스트를 통해 확인해보시기 바랍니다.

헤르페스 증상인지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 4주 짜 혈액검사를 받아보시면 정확할 것 같습니다 다리가 저린다고 헤르페스 증상은 아니니 걱정안하셔도 될 것 같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

도브 바디워시를 바디로션으로 착각하고 사용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 도브 바디워시를 실수로 바디로션처럼 사용하셨다 하더라도 물로 잘 행구었다면 큰 문제는 없을 것입니다. 입속에 바디워시가 들어갔다면 즉시 물로 충분히 행구시면 되는데 입술에 묻은 것을 소량 섭취했다고 하더라도 문제가 발생할 가능성은 적습니다. 피부나 입안에 불편함 발진 가려움증 등이 나타나면 피부과를 방문해보시면 되겠습니다.

저번주 토요일에 집에서 어딘가에 좀 세게 발가락을 부딪쳐서 발톱에서 피가 나고 피멍이 들었는데 밴드 꼬박꼬박 붙이고 다니니 피멍은 거의 다 빠지고 있는데 발가락 붓기가 아직도 안빠져서 걱정입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발가락을 다치셨군요. 발가락은 뼈가 약해서 쉽게 부러집니다. 가까운 정형외과에서 방사선 촬영을 해보시기 바랍니다. 감사합니다.

얼굴뼈 관련질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 얼굴뼈는 태어나서부터 지속적으로 자라다가 청소년 시기에 더욱 급격한 성장이 이루어져 1517세까지 성장이 이루어집니다. 2. 얼굴뼈는 24시간 계속 성장합니다. 다만 성장호르몬이 더욱 많이 나오는 수면시기에 조금 더 속도가 빠를수 는 있겠네요 3. 마스크는 아직까지 얼굴성장에 영향을 미친다는 의미있는 연구 결과는

없습니다. 다만 피부에 영향은 많이 줄 수는 있습니다. 4. ㅎㅎ 외모에 관심이 많이 있을 나
이입니다. 못생겼다는건 본인만의 생각일 수 있습니다. 실제로 못생겼다고 해서 외모가 그 사
람의 모든 걸 반영하지도 않습니다. 자신만의 위치에서 그 역할을 잘 하고 있을 때 잘 생겨
보일 수 도 있습니다. 외모 쪽이 아니라 다른 영역에서 잘 생겼을 수 있잖아요. 그것을 더욱
발전시키면 됩니다. 그리고 중학생때는 꾸미지도 않고 여드름도 많이 생기기도 하고 여러가지
완성되지 않은 나이니 자신감을 갖고 노력하면 외모도 바꿀 수 있습니다. 지금 나이에는 잘
먹고 공부 열심히 하고 운동 열심히 할 때 제일 멋있어 보입니다. 정말 정말 마음에 안들면
성인이 되서 성형을 할 수 도 있겠지요. 아직은 완성되지도 않았고 바뀔 수도 있으며 또 실제
로는 잘생겼을 수도 있는데 본인만 그렇게 생각할 수 도 있으니 자신감을 갖고 학창 시절 잘
생활해 봅시다

둘코락스 과다복용 점액변,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둘락스는 변비약으로 사용되지만 과다
복용하는 경우에 장 점막을 자극하고 점액변과 같은 문제를 일으킬 여지가 있습니다. 복용을
중단하시고 가까운 내과를 방문해 진료받아보시는게 안전하겠습니다.

검은변에 과산화수소를 뿌렸더니 거품이 생겼습니다 혈변인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다.
흑변을 조심해야 하는 이유는 상부 위장관에서의 출혈을 의심할 수 있기 때문입니다. 흑변에
과산화수소를 뿌렸을 때 거품반응이 보인다는 것은 혈액이 존재함을 시사합니다. 따라서 병원
을 방문하셔야 하는 소견이라 볼 수 있으니 곧바로 근처 내과를 방문하셔야 합니다.

검은변에 과산화수소를 뿌렸더니 거품이 생겼습니다 혈변인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다.
흑변을 조심해야 하는 이유는 상부 위장관에서의 출혈을 의심할 수 있기 때문입니다. 흑변에
과산화수소를 뿌렸을 때 거품반응이 보인다는 것은 혈액이 존재함을 시사합니다. 따라서 병원
을 방문하셔야 하는 소견이라 볼 수 있으니 곧바로 근처 내과를 방문하셔야 합니다.

갑상선 항진증과 다리에 쥐가 나는 것이 연관이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑상
선 호르몬 과다 분비로 인한갑상선 항진증과 다리에 쥐가 나는 것 사이에 연관성이 있을 수
있습니다. 지금 갑상선 기능이 정상으로 잘 조절되면 이것 때문이 아닐수도 있습니다 보통 이
년정도 약물치료를 합니다 더 오래가는 경우도 있습니다

화상 소독 가정의학과?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 화상 상처는 관리를 잘 해주어야 회복도
빠르고 흔적도 최소화 될 수 있습니다. 가정의학과에서도 잘 치료 받을 수 있습니다

항문성교 후 매독,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 모양만 가지고서는 이것이 성매개 질환으
로 보이지는 않습니다. 의심스러운 위험한 관계였다면 검사로 확인해봣요

변의가 없습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변의가 없는 것이 뇌졸중이후에 나타난 것일
까요? 배변은 몇일에 한번 가나요? 변비가 있으신가요? 야채드시는 양을 좀더 늘려보실수 있
을 까요? 변의가 없어도 규칙적으로 화장실을 가셔도 됩니다

프록사신바이정을 먹고 인지능력이 떨어질수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용하신
약물들이 지능에 미치는 영향에 대해 걱정하시는군요. 복용한 약물들이 지능에 영구적인 영향
을 미칠 가능성은 매우 낮습니다. 프록사신바이정 이전에 질문하셨던 유니정 휴펜정 에졸정
다스남서방정은 일시적인 정신적 부작용이 있을 수는 있지만 일반적으로 지능에 큰 영향을 미
치지 않습니다.

이 약을 먹고 지능이 떨어질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용하신 약물들이 지능
에 미치는 영향에 대해 걱정하시는군요. 복용한 약물들이 지능에 영구적인 영향을 미칠 가능
성은 매우 낮습니다. 프록신바이정 유네콜정 휴펜정 에소졸정 다타남서방정은 일시적인 정신
적 부작용이 있을 수는 있지만 일반적으로 지능에 큰 영향을 미치지 않습니다.

손가락 신경이 다치면 회복되는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락을 포함하여 신경이 다친 경우 회복기간을 임상적으로 미리 예측할 수 없습니다. 손상된 상태로 회복이 되지 않는 경우도 가능합니다.

프록사신바이정을 먹고 인지능력이 떨어질수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용하신 약물들이 지능에 미치는 영향에 대해 걱정하시는군요. 복용한 약물들이 지능에 영구적인 영향을 미칠 가능성은 매우 낮습니다. 프록사신바이정 이전에 질문하셨던 유니정 휴펜정 에졸정 다스남서방정은 일시적인 정신적 부작용이 있을 수는 있지만 일반적으로 지능에 큰 영향을 미치지 않습니다.

이 약을 먹고 지능이 떨어질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용하신 약물들이 지능에 미치는 영향에 대해 걱정하시는군요. 복용한 약물들이 지능에 영구적인 영향을 미칠 가능성은 매우 낮습니다. 프록신바이정 유네콜정 휴펜정 에소졸정 다타남서방정은 일시적인 정신적 부작용이 있을 수는 있지만 일반적으로 지능에 큰 영향을 미치지 않습니다.

야즈 부작용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 야와 같은 호르몬제는 초기 복용 시 부정출혈이 흔한 부작용으로 나타날 수 있습니다. 출혈이 멈췄다가 다시 발생하는 것도 호르몬 조절 과정에서 나타날 수 있습니다. 그러니 출혈이 심해지지 않는다면 지켜보면서 계속 복용해도 됩니다. 하지만 지금보다 출혈이 심해지거나 불편한 수준으로 악화된다면 병원을 방문하시기 바랍니다.

지속적인 가위눌림 어떻게 해야 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스가 많으시지요? 그때까지는 약물의 도움을 받아보시면 어떨까 싶습니다. 시험전 컨디션 조절이 필요해 보입니다.

이와 같은 콜레스테롤 상승이 식단에 의한 것인지 타고난 엘디엘 수치인 것인지 감이 안옵니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실제로 임상적으로 수치가 많이 높지 않으면 유전적인 소인으로 보지는 않습니다. 생활 습관과 연관된 있을 가능성이 높지요.

건강기능식품,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. L카르니틴은 체내에서 지방을 에너지로 바꾸는 데 도움을 주는 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 코엔자임Q10은 세포의 에너지 생산에 필요한 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 엘브 원스일리 멀티비타민은 비타민과 미네랄이 함유된 영양제로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 오메가3는 불포화지방산으로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 따라서 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. 다만 약물과 영양제를 함께 복용할 때는 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

생리예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 안합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 시작하지 않았고 임신테스트기도 음성이 나왔다면 임신 가능성은 낮습니다. 하지만 임신테스트기는 임신 4주차 이후에 정확한 결과를 얻을 수 있고 임신 초기에는 임신테스트기가 음성이 나올 수도 있습니다. 따라서 생리 예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 시작하지 않았고 임신테스트기도 음성이 나왔다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 병원에서는 임신테스트기와 함께 혈액 검사를 시행하여 임신 여부를 확인할 수 있습니다. 만약 임신이 확인된다면 임신 초기 관리에 대한 상담을 받을 수 있습니다. 만약 임신이 확인되지 않는다면 생리불순의 원인을 찾기 위한 검사를 시행할 수 있습니다. 생리불순은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있으며 원인에 따라 치료 방법이 다릅니다. 따라서 생리불순이 있다면 병원에 방문하여 정확한 진단과 치료를 받아야 합니다.

자꾸 시다는 느낌?이 들어요 침이계속생기구요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 신경치료로 인해 신경 과민 반응이 일어날 수 있습니다. 또한 스트레스나 불안도 이런 증상을 유발할 수 있겠습니다. 혹은 침 분비와 관련된 신경의 문제일 가능성도 있습니다. 따라서 증상이 지속된다면 치과의사나 신경과 전문의의 진료를 받는 것이 좋겠습니다.

물토...안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸살 초기일 수 있으며 두통만으로 제한 한다고 하면 구역감이나 구토는 두통의 흔한 동반증상입니다. 가까운 곳에서 진토제 주사를 맞고 약을 복용하는게 효과적일 수 있겠습니다.

암에 걸리면 청력이 떨어질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암과 청력 저하는 직접적인 연관성이 없습니다. 그러나 암 치료 과정에서 사용되는 약물이나 방사선 치료 등이 청력에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 항암제 중 일부는 청각 신경에 손상을 줄 수 있으며 방사선 치료는 내이에 영향을 주어 청력 저하를 유발할 수 있습니다.

백혈구증가증질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 백혈구 증가증은 백혈구 수치가 정상보다 높게 나타나는 증상을 말합니다. 백혈구 증가증은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있으며 백혈병은 백혈구 증가증의 원인 중 하나입니다. 하지만 백혈구 증가증이 있다고 해서 모두 백혈병인 것은 아니며 백혈구 증가증이 있는 경우에도 백혈병이 아니라는 것을 확인하기 위해 조직 검사를 시행합니다. 조직 검사는 명운을 떼어내어 현미경으로 관찰하는 검사로 명운의 모양과 크기만 보고 판단할 수 있는 것은 아닙니다. 백혈구 증가증이 있는 경우 백혈병이 아닌지 확인하기 위해 조직 검사를 시행하는 것이 좋습니다.

황달인지 사진 판단 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 상태와 비교를 해야 할 수 있기에 정확히 답 드리기는 어렵지만 크게 문제되지는 않을듯합니다. 많이 걱정된다면 내과 진료 권유합니다

콧대를 부딪혔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부종이나 출혈이 없다면 비골의 손상 가능성은 낮으며 이로 인해 영구적인 변형이 발생할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

헤르페스 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비뇨기과를 두 곳 갔는데 두 의사선생님 모두 증상으로 박션헤르페스가 아닐거라고 하셨군요. 크게 걱정하지 마시고 편한 마음 가지도록 하십시오.

녹슨 귀걸이를 모르고 계속 차고 있었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 십년간에 파상풍 접종이 없었다면 접종이 필요합니다. 상처 소독을 하여 염증이 생기지 않도록 관리가 필요합니다

구내염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독 병변을 육안으로 구별하기는 어렵습니다. 위험한 관계를 가졌다고 하니 성매개 질환에 대한 검사가 필요하다고 판단됩니다.

파상풍일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 증상으로미루어 파상풍을 의심하기는 무리가 있습니다. 파상풍의 잠복기는 3일에서 21일 정도이며 대부분 14일 이내에 증상이 나타납니다. 상처가 심하면 진료를 받아보셔요

음식이 가슴에 걸린 것일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 정보만으로 음식이 기도쪽으로 넘어갔을 가능성은 없어보이며 큰 덩어리가 내려가면서 압박을 하고 지나갔을 수는 있습니다

비뇨기과약을 먹고 청력저하가 올수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프신바이는 성분이 ciprofloaxcin인데 경구 복용을 해도 귀독성은 별로 없는 것으로 알려져 있습니다. 부작용은 개인에 따라 달라질 수 있습니다

갈색냉이 계속 나와요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 갈색냉이 나오는 것은 호르몬의 문제나

지금 복용하고 있는 콘타와는 연관이 적어보이고 질염이 생긴것이 아닌가 싶습니다.

갈색냉이 계속 나와요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 갈색냉이 나오는 것은 호르몬의 문제나 지금 복용하고 있는 콘타와는 연관이 적어보이고 질염이 생긴것이 아닌가 싶습니다.

콧대를 부딪혔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부종이나 출혈이 없다면 비골의 손상 가능성은 낮으며 이로 인해 영구적인 변형이 발생할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

고환과 음경 성장의 관계,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고환 한쪽이 없더라도 음경 성장은 정상적으로 이루어질 수 있습니다. 한쪽 고환만으로도 충분한 테스토스테론을 생산해 2차 성징과 성기 발달을 지원할 수 있기 때문입니다. 다만 고환이 하나인 경우 호르몬을 유지하는지 확인하는 것이 중요하므로 정기적인 건강 검진이 필요합니다. 특정한 문제가 있다면 내분비내과 전문의와 상담하는 것이 좋겠습니다.

피부 기미,질문입니다 색소침착도요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 레이저 치료 후 색소침착이 발생했다면 추가로 반복적인 레이저치료가 필요할 수 있습니다. 색소 병변은 1회의 레이저 치료로 사라지지는 않습니다. 다회의 치료가 필요하며 재발이 흔하여 반복적인 치료가 필요한 편입니다. 병원을 다시 방문해보세요.

왼쪽 가슴 흉통이 찌릿 하고 잠깐 왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 협심증에 의한 흉통은 아닌듯 합니다. 근육에서 일시적인 근경련이 있었거나 신경통에 의한 증상인 것 같네요. 통증이 지속된다면 내과나 신경과 진료를 보시기 바랍니다.

건강기능식품,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복용 중인 콘타와 인놀은 L카르니틴 코엔자임 Q10 멀티비타민 오메가3와 큰 상호작용이 없습니다. 비타민 K는 혈액 응고와 관련 있으므로 적정량 섭취에 주의할 필요가 있습니다. 불안감이나 가슴 답답함이 지속된다면 영양제 섭취를 중단하고 정신건강의학과를 방문하여 주치의와 상의해보시기 바랍니다.

건강기능식품,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. L카르니틴은 체내에서 지방을 에너지로 바꾸는 데 도움을 주는 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 코엔자임Q10은 세포의 에너지 생산에 필요한 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 엘브 원스일리 멀티비타민은 비타민과 미네랄이 함유된 영양제로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 오메가3는 불포화지방산으로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 따라서 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. 다만 약물과 영양제를 함께 복용할 때는 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

소중이 뼈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 회음부 부근의 뼈가 골절되거나 함몰되면 가만히 있어도 통증이 매우 심할 수 있습니다. 이 부위의 골절은 심한 통증 부종 명 움직임의 제한을 동반할 수 있습니다. 이러한 증상이 나타난다면 즉시 의료 기관을 방문해 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다.

직장암 검진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 대장내시경에도 이상이 없었고 올해하신 피검사 대변검사 CEA검사 모두 정상이라서 직장암일 가능성은 없어보입니다. 변비가 생길 정도의 직장암이라면 많이 진행되어야 나타나는 증상입니다. 직장암이라면 최근에 체중감소가 심하거나 대변이 가늘어지거나 혈변이 지속되거나 다른 전신증상도 동반하게 됩니다. 변이 단단한 것은 섬유질이 적거나 수분섭취가 부족해서 주로 발생하니 식습관을 좀 변화를 주시는게 좋겠습니다.

생리예정일 이후로 5일째 미뤄졌습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정과 콘돔을 사용한 경우 임신 가능성은 낮지만 완전히 배제할 수는 없습니다. 다만 임신 테스트기에서 두 번

모두 음성 결과가 나왔다면 임신 가능성은 매우 낮습니다. 생리 지연의 원인은 스트레스 생활 패턴 변화 호르몬 불균형 등 여러 가지가 있을 수 있습니다. 만약 생리가 지속적으로 지연된다면 며칠 후 다시 임신 테스트를 해보거나 산부인과 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

생리예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 안합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 시작하지 않았고 임신테스트기도 음성이 나왔다면 임신 가능성은 낮습니다. 하지만 임신테스트기는 임신 4주차 이후에 정확한 결과를 얻을 수 있고 임신 초기에는 임신테스트기가 음성이 나올 수도 있습니다. 따라서 생리 예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 시작하지 않았고 임신테스트기도 음성이 나왔다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 병원에서는 임신테스트기와 함께 혈액 검사를 시행하여 임신 여부를 확인할 수 있습니다. 만약 임신이 확인된다면 임신 초기 관리에 대한 상담을 받을 수 있습니다. 만약 임신이 확인되지 않는다면 생리불순의 원인을 찾기 위한 검사를 시행할 수 있습니다. 생리불순은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있으며 원인에 따라 치료 방법이 다릅니다. 따라서 생리불순이 있다면 병원에 방문하여 정확한 진단과 치료를 받아야 합니다.

물토...안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸살 초기일 수 있으며 두통만으로 제한 한다고 하면 구역감이나 구토는 두통의 흔한 동반증상입니다. 가까운 곳에서 진토제 주사를 맞고 약을 복용하는게 효과적일 수 있겠습니다.

유두습진 대처법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유두습진은 유두 주위의 피부가 붉게 변하고 가려우며 딱지가 앉거나 진물이 나는 질환입니다. 유두습진의 원인은 정확하게 밝혀지지 않았지만 피부 건조 알레르기 땀 자극성 물질의 접촉 젖꼭지 압박 등이 원인이 될 수 있습니다. 유두습진을 치료하기 위해서는 원인을 제거하고 습진 부위를 깨끗하게 유지하며 보습제를 바르는 것이 중요합니다. 유두습진은 드레싱밴드를 붙이는 것으로도 치료할 수 있습니다. 드레싱밴드는 습진 부위를 보호하고 진물을 흡수하며 가려움을 완화하는 효과가 있습니다. 그러나 드레싱밴드는 장기간 사용하면 피부염이 악화될 수 있으므로 주의해야 합니다. 유두습진을 치료하기 위해서는 병원 치료가 필요할 수도 있습니다. 병원에서는 항생제 스테로이드 제 항히스타민제 등을 처방하기도 합니다. 유두습진은 빨리 치료하지 않으면 젖꼭지 염증이나 유두 궤양으로 진행될 수 있으므로 증상이 나타나면 빠르게 치료하는 것이 좋습니다.

흉터비후성반흔에 레티놀 크림 발라도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 레놀 크림은 피부 재생을 촉진하는 효과가 있습니다. 흉터 부위에 레놀 크림을 바르면 흉터가 더 빨리 나올 수 있지만 흉터가 더 붉어질 수도 있습니다. 흉터 부위에 레놀 크림을 바르고 흉터가 더 붉어졌다면 레놀 크림을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 흉터가 더 붉어지는 것은 일시적인 현상이며 시간이 지나면 다시 원래대로 돌아올 것입니다. 하지만 흉터가 더 붉어지고 통증이 느껴진다면 병원에 방문하여 진료를 받아보시는 것이 좋습니다.

흉터비후성반흔에 레티놀 크림 발라도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 레놀 크림은 피부 재생을 촉진하는 효과가 있습니다. 흉터 부위에 레놀 크림을 바르면 흉터가 더 빨리 나올 수 있지만 흉터가 더 붉어질 수도 있습니다. 흉터 부위에 레놀 크림을 바르고 흉터가 더 붉어졌다면 레놀 크림을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 흉터가 더 붉어지는 것은 일시적인 현상이며 시간이 지나면 다시 원래대로 돌아올 것입니다. 하지만 흉터가 더 붉어지고 통증이 느껴진다면 병원에 방문하여 진료를 받아보시는 것이 좋습니다.

남성 임신준비중 푸로작, 렉사프로 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 준비 중 남성이 푸작과 렉사로를 복용하는 것은 크게 문제가 없습니다. 하지만 약을 복용하고 있는 경우 임신 전에 의사와 상담을 하는 것이 좋습니다. 의사와 상담을 통해 약의 복용을 중단해야 하는지

아니면 복용을 계속해야 하는지 결정할 수 있습니다.

임신4주차6일 임태기 진하기 괜찮나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 테스트기에서 T선이 진해지는 것은 임신 호르몬인 hCG 수치가 증가하고 있음을 나타냅니다. 5주차에 아기집이 보이지 않을 경우 자궁외 임신이나 유산 가능성을 고려해야 하지만 너무 일찍 검사한 경우도 있으니 조급해하지 않는 것이 좋겠습니다. 다음 진료 시 초음파 검사를 통해 아기집이 보이는지 확인해보시기 바랍니다.

일자목 목디스크 판정후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옆목 목빗근에 압박되는 경신경총의 줄기 중에 횡경신경이 압박되면 해당부위의 통증이 발생할 수 있습니다. 옆목의 물리치료와 신경치료가 도움이 됩니다.

자꾸 시다는 느낌?이 들어요 침이계속생기구요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 신경치료로 인해 신경 과민 반응이 일어날 수 있습니다. 또한 스트레스나 불안도 이런 증상을 유발할 수 있습니다. 혹은 침 분비와 관련된 신경의 문제일 가능성도 있습니다. 따라서 증상이 지속된다면 치과의사나 신경과 전문의의 진료를 받는 것이 좋겠습니다.

암에 걸리면 청력이 떨어질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암과 청력 저하는 직접적인 연관성이 없습니다. 그러나 암 치료 과정에서 사용되는 약물이나 방사선 치료 등이 청력에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 항암제 중 일부는 청각 신경에 손상을 줄 수 있으며 방사선 치료는 내이에 영향을 주어 청력 저하를 유발할 수 있습니다.

오른쪽 귀 눈이 멍멍하고 오른쪽 다리가 저립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오른쪽 귀가 멍멍하고 오른쪽 다리가 저린 증상은 뇌졸중의 증상일 수 있습니다. 뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 터져서 뇌에 혈액이 공급되지 못해 발생하는 질환입니다. 뇌졸중은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심하면 사망에 이를 수 있습니다. 뇌졸중의 증상은 다음과 같습니다. 한쪽 팔다리가 마비되거나 감각이 없어짐 한쪽 얼굴이 마비되거나 감각이 없어짐 한쪽 눈이 보이지 않음 말을 잘 못하거나 이해하지 못함 어지러움 두통 구토 의식 저하 뇌졸중의 증상이 나타나면 즉시 병원으로 가서 검사를 받아야 합니다. 뇌졸중은 조기에 치료하면 후유증을 최소화할 수 있습니다. 뇌졸중의 치료는 다음과 같습니다. 혈전용해제 치료 혈전용해제는 혈관을 막고 있는 혈전을 녹여서 혈액 공급을 회복시키는 약물입니다. 뇌졸중 발생 후 4.5시간 이내에 투여해야 효과가 있습니다. 혈관 내 스텐트 삽입술 혈관 내 스텐트 삽입술은 혈관을 막고 있는 혈전을 제거하고 스텐트를 삽입하여 혈관을 넓히는 수술입니다. 약물 치료 뇌졸중의 위험을 줄이기 위해 혈압약 혈당약 콜레스테롤약 등을 복용합니다. 뇌졸중의 치료비용은 병원마다 차이가 있습니다. 뇌졸중은 갑자기 발생하는 질환이기 때문에 예방이 중요합니다. 뇌졸중의 위험을 줄이기 위해서는 다음과 같은 생활습관을 지키는 것이 좋습니다. 금연 절주 규칙적인 운동 건강한 식습관 적정 체중 유지 혈압 혈당 콜레스테롤 관리 뇌졸중은 조기에 치료하면 후유증을 최소화할 수 있습니다. 뇌졸중의 증상이 나타나면 즉시 병원으로 가서 검사를 받아야 합니다.

요도입구 쪽에 물집 같은 게 보이는데 어떤 걸로 의심되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도입구 쪽에 약간 노란 혹은 흰색이 가까운 물집 같은 게 보이는군요. 다양한 가능성으로 우선 병원 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오.

헤르페스 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비뇨기과를 두 곳 갔는데 두 의사선생님 모두 증상으로 봐선헤르페스가 아닐거라고 하셨군요. 크게 걱정하지 마시고 편한 마음 가지도록 하십시오.

헤르페스 2형 입술에 날 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 예 교차감염으로 헤르페

스 2형이 입술에도 날 수 있습니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=rtxvXzt7nTA>

암에 걸리면 청력이 떨어질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암과 청력 저하는 직접적인 연관성이 없습니다. 그러나 암 치료 과정에서 사용되는 약물이나 방사선 치료 등이 청력에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 항암제 중 일부는 청각 신경에 손상을 줄 수 있으며 방사선 치료는 내이에 영향을 주어 청력 저하를 유발할 수 있습니다.

화상 소독 가정의학과?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 화상 상처는 관리를 잘 해주어야 회복도 빠르고 흔적도 최소화 될 수 있습니다. 가정의학과에서도 잘 치료 받을 수 있습니다

치과 오진 가능성이 있을까요? 정말 답답하고 힘듭니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 바이트윙은 치근단 엑스레이를 찍는 방법을 달리 하여 치아 사이 충치 판별을 좀 더 용이하도록 하는 방법 입니다. 충치는 육안으로 검사하고 엑스레이로 보완하는게 좋습니다. 가장 정확한 방법은 그 부위를 제거해서 보는 것이긴 합니다만 이 경우 치아를 삭제해야 하는 단점이 있구요 정 미심쩍으시다면 대학병원 치과보존과에 가셔서 검사를 한번 더 받아보시는 것도 좋을 듯 합니다

인레이 치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 한달전 어금니쪽 인레이가 조금 깨져서 이빨 사이에 음식이 잘 끼게 되서 치과에서 인레이 제거후 새로운 인레이 치료를 했는데 시림 증상이 생겼습니다. 그 당시 충치도 없었는데 왜 시리나요? 기존 인레이 부위를 제거했기 때문에 일시적으로 시림 증상이 있을 수 있습니다. 시림 증상이 오래 지속 된다면 치료 받으신 치과에 가셔서 검사와 상담을 받아보세요.

숨 내뱉어지고 힘 빠짐2,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상은 전형적인 경우도 많지만 환자에 따라 조금씩은 다를 수 있습니다. 물론 탄력발작도 의심할 수 있는 증상들이지만 정확한 진단을 위해서는 해당 증상에 대해 검사할 수 있는 병원에서 전문의 진료를 받으시고 확인하는 것이 가장 중요합니다. 인터넷에 질병에 대한 정보가 많은 탓에 자신의 증상이 왜곡되는 경우도 많으니 의사의 정확한 진단을 받아보시길 바랍니다.

안녕하세요 피임약 다른약과 복용해도 되는지 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스톨나약과 기존약들은 감기약에 쓰이는 약 성분들이네요. 항히스타민 비충혈제거제 진통소염제 등등.. 머론같은 경구피임약에 상호작용의 가능성은 떨어져 보입니다.

황달인지 사진 판단 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 상태와 비교를 해아할 수 있기에 정확히 답 드리기는 어렵지만 크게 문제되지는 않을듯합니다. 많이 걱정된다면 내과 진료 권유합니다

음식이 가슴에 걸린 것일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 정보만으로 음식이 기도쪽으로 넘어갔을 가능성은 없어보이며 큰 덩어리가 내려가면서 압박을 하고 지나갔을 수는 있습니다

소중이 뼈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 회음부 부근의 뼈가 골절되거나 함몰되면 가만히 있어도 통증이 매우 심할 수 있습니다. 이 부위의 골절은 심한 통증 부종 명 움직임의 제한을 동반할 수 있습니다. 이러한 증상이 나타난다면 즉시 의료 기관을 방문해 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다.

음식이 가슴에 걸린 것일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 정보만으로 음식이 기도쪽으로 넘어갔을 가능성은 없어보이며 큰 덩어리가 내려가면서 압박을 하고 지나갔을 수는 있습니다

왼쪽 가슴 흉통이 찌릿 하고 잠깐 왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 협심증에 의한 흉통

은 아닌듯 합니다. 근육에서 일시적인 근경련이 있었거나 신경통에 의한 증상인 것 같네요. 통증이 지속된다면 내과나 신경과 진료를 보시기 바랍니다.

눈꺼풀 안쪽 결막 육아종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈꺼풀 안쪽 결막에 튀어나온 조직은 결막 육아종이라고 합니다. 결막 육아종은 결막에 생기는 섬유성 종양으로 주로 눈꺼풀 안쪽에 생깁니다. 결막 육아종은 크기가 작고 증상이 없는 경우가 많지만 크기가 커지거나 증상이 심해지는 경우 제거를 해야 합니다. 결막 육아종은 외과적 수술로 제거할 수 있습니다. 수술은 간단하고 통증이 적지만 재발할 수 있습니다. 결막 육아종을 제거하기 위해서는 안과 전문의를 찾아가야 합니다. 안과 전문의는 결막 육아종의 크기와 위치 환자의 상태 등을 고려하여 치료 방법을 결정합니다. 결막 육아종은 치료가 잘 되는 질환이므로 안과 전문의를 찾아가서 적절한 치료를 받으시기 바랍니다.

요도입구 쪽에 물집 같은 게 보이는데 어떤 걸로 의심되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도입구 쪽에 약간 노란 혹은 흰색이 가까운 물집 같은 게 보이는군요. 다양한 가능성으로 우선 병원 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오.

직장암 검진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 대장내시경에도 이상이 없었고 올해하신 피검사 대변검사 CEA검사 모두 정상이라서 직장암일 가능성은 없어보입니다. 변비가 생길 정도의 직장암이라면 많이 진행되어야 나타나는 증상입니다. 직장암이라면 최근에 체중감소가 심하거나 대변이 가늘어지거나 혈변이 지속되거나 다른 전신증상도 동반하게 됩니다. 변이 단단한 것은 섬유질이 적거나 수분섭취가 부족해서 주로 발생하니 식습관을 좀 변화를 주시는게 좋겠습니다.

생리예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 안합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 시작하지 않았고 임신테스트기도 음성이 나왔다면 임신 가능성은 낮습니다. 하지만 임신테스트기는 임신 4주차 이후에 정확한 결과를 얻을 수 있고 임신 초기에는 임신테스트기가 음성이 나올 수도 있습니다. 따라서 생리 예정일이 5일 지났는데 아직 생리를 시작하지 않았고 임신테스트기도 음성이 나왔다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 병원에서는 임신테스트기와 함께 혈액 검사를 시행하여 임신 여부를 확인할 수 있습니다. 만약 임신이 확인된다면 임신 초기 관리에 대한 상담을 받을 수 있습니다. 만약 임신이 확인되지 않는다면 생리불순의 원인을 찾기 위한 검사를 시행할 수 있습니다. 생리불순은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있으며 원인에 따라 치료 방법이 다릅니다. 따라서 생리불순이 있다면 병원에 방문하여 정확한 진단과 치료를 받아야 합니다.

기관지에서 수포음이 들립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정말 폐의 기관지에 문제가 있는지 의사선생님이 직접 청진을 해보거나 Xray검사나 폐CT검사를 받아 보시는게 좋겠습니다. 폐의 문제가 아니라도 자려고 누울때 증상이 심해진다면 비염에 의해서 목으로 넘어가는건 아닌지 또는 역류성 식도염같이 음식물이 넘어가서 증상이 있는건지 확인이 필요해 보입니다. 고양이에 의한 알레르기 반응인지도 확인이 필요하겠네요. 자세한것은 주치의 선생님과 상의하여 필요한 검사를 받아보시는게 좋겠습니다.

백혈구증가증질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 백혈구 증가증은 백혈구 수치가 정상보다 높게 나타나는 증상을 말합니다. 백혈구 증가증은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있으며 백혈병은 백혈구 증가증의 원인 중 하나입니다. 하지만 백혈구 증가증이 있다고 해서 모두 백혈병인 것은 아니며 백혈구 증가증이 있는 경우에도 백혈병이 아니라는 것을 확인하기 위해 조직 검사를 시행합니다. 조직 검사는 명울을 떼어내어 현미경으로 관찰하는 검사로 명울의 모양과 크기만 보고 판단할 수 있는 것은 아닙니다. 백혈구 증가증이 있는 경우 백혈병이 아닌지 확

인하기 위해 조직 검사를 시행하는 것이 좋습니다.

물토...안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸살 초기일 수 있으며 두통만으로 제한 한다고 하면 구역감이나 구토는 두통의 흔한 동반증상입니다. 가까운 곳에서 진토제 주사를 맞고 약을 복용하는게 효과적일 수 있겠습니다.

기관지에서 수포음이 들립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 정말 폐의 기관지에 문제가 있는지 의사선생님이 직접 청진을 해보거나 Xray검사나 폐CT검사를 받아 보시는게 좋겠습니다. 폐의 문제가 아니라도 자려고 누울때 증상이 심해진다면 비염에 의해서 목으로 넘어가는건 아닌지 또는 역류성 식도염같이 음식물이 넘어가서 증상이 있는건지 확인이 필요해 보입니다. 고양이에 의한 알레르기 반응인지도 확인이 필요하겠네요. 자세한것은 주치의 선생님과 상의하여 필요한 검사를 받아보시는게 좋겠습니다.

황달인지 사진 판단 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 상태와 비교를 해야 할 수 있기에 정확히 답 드리기는 어렵지만 크게 문제되지는 않을듯합니다. 많이 걱정된다면 내과 진료 권유합니다

건강기능식품,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. L카르니틴은 체내에서 지방을 에너지로 바꾸는 데 도움을 주는 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 코엔자임Q10은 세포의 에너지 생산에 필요한 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 엘브 원스일리 멀티비타민은 비타민과 미네랄이 함유된 영양제로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 오메가3는 불포화지방산으로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 따라서 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. 다만 약물과 영양제를 함께 복용할 때는 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

황달인지 사진 판단 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 상태와 비교를 해야 할 수 있기에 정확히 답 드리기는 어렵지만 크게 문제되지는 않을듯합니다. 많이 걱정된다면 내과 진료 권유합니다

건강기능식품,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. L카르니틴은 체내에서 지방을 에너지로 바꾸는 데 도움을 주는 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 코엔자임Q10은 세포의 에너지 생산에 필요한 물질로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 엘브 원스일리 멀티비타민은 비타민과 미네랄이 함유된 영양제로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 오메가3는 불포화지방산으로 심장 기능을 향상시키는 효과가 있습니다. 따라서 현재 복용 중인 약물과 영양제 사이에 상호작용은 없을 것으로 보입니다. 다만 약물과 영양제를 함께 복용할 때는 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

일자목 목디스크 판정후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옆목 목빗근에 압박되는 경신경총의 줄기 중에 횡경신경이 압박되면 해당부위의 통증이 발생할 수 있습니다. 옆목의 물리치료와 신경치료가 도움이 됩니다.

직장암 검진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 대장내시경에도 이상이 없었고 올해하신 피검사 대변검사 CEA검사 모두 정상이라서 직장암일 가능성은 없어보입니다. 변비가 생길 정도의 직장암이라면 많이 진행되어야 나타나는 증상입니다. 직장암이라면 최근에 체중감소가 심하거나 대변이 가늘어지거나 혈변이 지속되거나 다른 전신증상도 동반하게 됩니다. 변이 단단한 것은 섬유질이 적거나 수분섭취가 부족해서 주로 발생하니 식습관을 좀 변화를 주시는게 좋겠습니다.

기관지에서 수포음이 들립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정말 폐의 기관지에 문제가 있는지 의사선생님이 직접 청진을 해보거나 Xray검사나 폐CT검사를 받아 보시는게 좋겠습니다. 폐의 문제가 아니라도 자려고 누울때 증상이 심해진다면 비염에 의해서 목으로 넘어가는건 아닌지 또는 역류성 식도염같이 음식물이 넘어가서 증상이 있는건지 확인이 필요해 보입니다. 고양이에 의한 알레르기 반응인지도 확인이 필요하겠네요. 자세한것은 주치의 선생님과 상의하여 필요한 검사를 받아보시는게 좋겠습니다.

ADHD 궁금합니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 우선 직접 진료하신 전문의 소견이 가장 신뢰성 있다는 것을 알려드립니다. 아래 내용은 참고만 하시는 것이 좋습니다. 말씀하신 것처럼 어린시절 12세 이전에 해당 증상이 없었다면 ADHD 가능성은 떨어집니다. 주의집중력 문제는 다른 증상우울 불안 불면 등에도 많은 영향을 받기 때문에 그러한 증상을 먼저 확인하고 교정하는 것이 중요합니다. 특히 현재 자녀가 스트레스를 많이 받을 수 있는 고3이고 우울 불안 증상이 동반되고 있다면 이 부분을 먼저 치료하는 것이 중요할 것으로 보입니다. ADHD 진단시 주의점에 대해서 포스팅한 블로그 글 공유드리겠습니다. <httpsblog.naver.comkongjung223223063695>

황달인지 사진 판단 부탁드립니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소 상태와 비교를 해야 할 수 있기에 정확히 답 드리기는 어렵지만 크게 문제되지는 않을듯합니다. 많이 걱정된다면 내과 진료 권유합니다

유두습진 대처법.안녕하세요. 메디이즈입니다. 유두습진은 유두 주위의 피부가 붉게 변하고 가려우며 딱지가 앉거나 진물이 나는 질환입니다. 유두습진의 원인은 정확하게 밝혀지지 않았지만 피부 건조 알레르기 땀 자극성 물질의 접촉 젖꼭지 압박 등이 원인이 될 수 있습니다. 유두습진을 치료하기 위해서는 원인을 제거하고 습진 부위를 깨끗하게 유지하며 보습제를 바르는 것이 중요합니다. 유두습진은 드레싱밴드를 붙이는 것으로도 치료할 수 있습니다. 드레싱밴드는 습진 부위를 보호하고 진물을 흡수하며 가려움을 완화하는 효과가 있습니다. 그러나 드레싱밴드는 장기간 사용하면 피부염이 악화될 수 있으므로 주의해야 합니다. 유두습진을 치료하기 위해서는 병원 치료가 필요할 수도 있습니다. 병원에서는 항생제 스테로이드 제 항히스타민제 등을 처방하기도 합니다. 유두습진은 빨리 치료하지 않으면 젖꼭지 염증이 나 유두 궤양으로 진행될 수 있으므로 증상이 나타나면 빠르게 치료하는 것이 좋습니다.

흉터비후성반흔에 레티놀 크림 발라도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 레티놀 크림은 피부 재생을 촉진하는 효과가 있습니다. 흉터 부위에 레티놀 크림을 바르면 흉터가 더 빨리 나올 수 있지만 흉터가 더 붉어질 수도 있습니다. 흉터 부위에 레티놀 크림을 바르고 흉터가 더 붉어졌다면 레티놀 크림을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 흉터가 더 붉어지는 것은 일시적인 현상이며 시간이 지나면 다시 원래대로 돌아올 것입니다. 하지만 흉터가 더 붉어지고 통증이 느껴진다면 병원에 방문하여 진료를 받아보시는 것이 좋습니다.

남성 임신준비중 푸로작. 렉사프로 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 준비 중 남성이 푸작과 렉사로를 복용하는 것은 크게 문제가 없습니다. 하지만 약을 복용하고 있는 경우 임신 전에 의사와 상담을 하는 것이 좋습니다. 의사와 상담을 통해 약의 복용을 중단해야 하는지 아니면 복용을 계속해야 하는지 결정할 수 있습니다.

백혈구증가증질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 백혈구 증가증은 백혈구 수치가 정상보다 높게 나타나는 증상을 말합니다. 백혈구 증가증은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있으며 백혈병은 백혈구 증가증의 원인 중 하나입니다. 하지만 백혈구 증가증이 있다고 해서 모두 백혈병인 것은 아니며 백혈구 증가증이 있는 경우에도 백혈병이 아니라는 것을 확인하기 위해 조직 검

사를 시행합니다. 조직 검사는 명을을 떼어내어 현미경으로 관찰하는 검사로 명을의 모양과 크기만 보고 판단할 수 있는 것은 아닙니다. 백혈구 증가증이 있는 경우 백혈병이 아닌지 확인하기 위해 조직 검사를 시행하는 것이 좋습니다.

공복혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경과를 지켜보는 수 밖에없는데 탄수화물 섭취를 줄이고 채식위주의 식사를 해주셔요. 근육운동 열심히하시구요 평생관리가 필요할 수 있을 것 같습니다

다리 무릎쪽 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오금근이 통증은 치료하지 않으면 뛰기가 많이 곤란하며 쭈그러 앉기도 불편해 집니다. 오금근이 아닐 수도 있으나 가까운 병원에서 물리치료와약 복용 정도는 해보시기를 권합니다.

대변에 붉은 실 같은게 나오는데 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 궤양성 대장염을 앓고 계신 상황인데 대변에서 선홍빛 실이 23cm 정도 관찰되는 상황이라 걱정스러우시군요. 말씀하신대로 혈변이 보인 경우에 주의해야 하므로 신경쓰이실만한 상황이라 보입니다. 다만 색만 선홍빛이고 출혈이 아닌 것 같은 특징들이 보이며 복통이나 배변양상의 변화와 같은 다른 증상이 동반되지 않았다면 우선은 지속적으로 이러한 변이 나오는지를 기다려보실 수 있겠습니다. 조금이라도 의심스럽다면 병원을 방문하시기 바랍니다.

유관확장미세석회증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 촬영 영상과 초음파 영상을 봐야 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 미세석회와 유관확장된 부위를 바늘 총조직검사를 우선 해 보고 총조직검사에서 문제가 없다면 좀 지켜보는 방법도 있습니다. 유관확장만 있고 확장된 관 내에 결절이 뚜렷하지 않다면 유관확장 분비성 변화로 인한 미세석회화 가능성이 더 높긴 합니다. 맘모토를 하면 좀 더 정확히 진단할 수는 있는데 비용이 많이 들어서요. 병원을 옮겨서 진료를 한 번 다시 받아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 감사합니다.

미세석회 유관확장 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 미세석회 군집 병변에 대해 8년 전 조직 검사를 하였고 양성판정을 받은 부위라고 하더라도 해당 병변이 변화를 보이는 경우 추가적인 조직검사가 필요한 경우도 있습니다. 구체적인 영상검사 결과에 따라 판단이 달라질 수 있으므로 유방외과 진료를 추가로 받아보시기 바랍니다.

회음부 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경미한 열상이라면 시간이 지나면서 저절로 호전되는 경우가 많지만 열상이 크다면 산부인과 내원하여 진료를 보는 것을 권합니다.

질입구쪽 아프타성 궤양,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질염과 외음부염이 동반된 것으로 보입니다. 통증이 있고 냉이 나온다면 약물 치료를 하는 것이 필요하므로 진료를 보시기 바랍니다.

왼쪽 눈 머리 이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸살기운과 두통은 관련이 많습니다. 몸살에 의한 자율신경 변화가 동반되어 두통은 편두통 양상과 비슷하게 잘 나타나며 약은 일반적인 진통제를 드시면 되는데 약효가 개인차가 있는 것 뿐이니 효과가 없으면 종류를 바꾸어 보시면 됩니다.

왼쪽 눈 머리 이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 편두통 가능성이 높습니다. 따라서 상기 증상이 반복된다면 신경과에서 진료를 보는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

얼굴과 몸에 자꾸 조금씩 두드러기가나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자외선 차단제에 의해 피부가 붉어지고 화끈거리는 등의 자극증상이 나타나지 않는다면 자외선 차단제는 잘 사용하시는 것이 지금의 상황에 도움이 된다고 볼 수 있습니다. 자외선으로 인한 자극이 피부질환을 악화시킬 여지가 있어보입니다. 화장품에 의한 접촉성 피부염은 오랜 관리가 필요한 편이니

피부과를 꾸준히 다니며 치료받아보시기 바랍니다.

치루 수술 후 육신거림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 다 낫지 않았기 때문에 통증은 있을 수 있습니다. 많이 붓거나 출혈이 심하면 진료가 필요합니다. 보다 더 자세한 내용은 수술 받으셨던 병원에 전화 하셔서 문의 하시는 것이 보다 정확한 답변을 들으실 수 있을 것입니다. 감사합니다.

버스 창문 햇빛,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일상 생활에서 햇빛에 눈부심을 느껴도 대부분 눈의 손상은 주지 않습니다. 햇빛에 의한 눈의 손상은 일광망막병증의 형태로 나타나는데 햇빛을 정면으로 수 분간 쳐다봐야 생길 수 있습니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

피부에 빨간게 올라오는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 사진을 보기에는 모낭염으로 생각됩니다. 어떤증상이있나요? 연고 바른다면 항생제 연고를 발라보시고 효과없거나 퍼지면 진료 받아보셔요

습윤밴드 제거 후 항생제 연고 발랐는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 상태로 보면 괜찮을 것 같긴한데 흉이 생기고 안생기고는 처음 다칠때 상처 깊이에 의하여 결정되고 상처를 얼마나 잘 치료하느냐에따라서 흉 크기가 영향을 받을 수 있습니다.

밴드를 붙이는 것이 파상풍 예방에 관련이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안타깝게도 파상풍은 밴드로 예방이 안됩니다. 상처관리와 예방접종으로 통해서 예방이 가능한 것으로 알고 있습니다.

손가락 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 가지고 있는 연고는 자극성 피부염의 간지럼증에 도움이 될수 있으니 발라보시고 차도가 없거나 심해지면 진료 받아보셔요

식후 커피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 나쁘지는 않지만 위염이라던지 역류성 식도염이 있는 경우라면 위에 좋지는 않습니다. 가능하면 적절한 카페인 섭취가 도움이 됩니다. 감사합니다.

목에 핏줄 같은 게 있는데 원래 이런건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문자님께서 촬영하신 부분은 인두이고 이 부분에는 원래도 혈관이 잘 관찰됩니다. 구강 점막은 혈관 분포가 많은 것이 특징입니다. 불편한 증상이 있다면 이비인후과 진료를 받으시면 되고 불편하지 않다면 신경쓰실만한 부분은 없어보입니다.

머리가 팽 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 환자분의 증상은 급속한 체위변경에 의한 미주신경성 실신이 의심됩니다. 대부분 빠른 체위 변경에 의해 일어나므로 천천히 몸을 일어나 보도록 해 보세요. 감사합니다.

어제 파라핀 치료를 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기본적으로 참을 수 있는 정도까지 뜨겁게 합니다. 나이가 젊으시니 열에 의한 손상의 가능성은 적습니다. 치료는 반복해 보시고 효과가 없으면 중단한다 라고 생각하시면 됩니다.

뼈 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뼈가 골절되는 수준의 강한 충격이 가해지거나 24시간 내내 압박감을 가하는 어떠한 자극이 있는 수준이 아니라면 일시적인 자극으로 뼈가 변형되기는 어렵습니다. 질문자님의 말씀과 같은 상황으로는 문제가 되지는 않겠습니다.

성관계 자위 시 방귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성대장증후군은 스트레스나 감정적변화에 따라 대장이 과민반응을 보여 가스가 많이 발생할 수 있습니다. 평소 식이섬유를 많이 섭취하시고.. 가스가 많이 발생할 수 있는 음식들콩 탄산 기름진 음식을 멀리하시는게 좋겠습니다.

응급처치 늦었나여???파라핀 치료 부작용 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파라핀치료 받은후에

화상을 입는 경우는 거의 없습니다. 많이 불편하면 다시 병원에서 진료 한 번 받아보시는것이 어떨까요?

선생님추가질문이요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 불편한 증상으로 대학병원을 방문하셨고 1년 전의 대장내시경 결과가 정상이라는 점 진찰한 의사의 의견이 올해의 검사는 필요치 않은 과한 검사라는 점을 고려하면 경과를 지켜보시는 것이 더 합당해보입니다.

알레르기성 비염으로 인한 증상 중에,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알레르기 비염과 급성 인후두염이 동반된 것으로 보입니다. 증상이 있다면 병원 내원하여 진료를 보는 것을 권해드리겠습니다.

선생님 추가질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1년전 검사가 제대로 이루어졌다면 일반적으로 추가로 검사를 권하지는 않습니다. 하지만 걱정이 된다면 근처 병원에서 검사를 다시하는 것도 문제는 되지 않습니다.

골다공증 초고위험군 치료와 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골다공증이 심하시군요. 골다공증 치료는 골절의 위험을 낮추는 것이 가장 중요합니다. 척추는 골절 위험이 높으니 당분간 넘어지거나 추락하는 손상을 입지않도록 주의하셔야 합니다. 그래서 이베네티 주사를 1년 사용하고 해를 쪼이면서 체중이 실리는 걷기운동을 하시고 칼슘 비타민드를 계속 투여하고 뼈에 필요한 단백질이나 미네랄을 식사에서 충분히 보충하고 1년후 검사해서 수치를 보고 다른 약으로 바꿔야 합니다. 병원은 처음 방문한 곳에 계속 다니시는 것이 좋습니다. 감사합니다.

추가적인 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이두근에 근육통이 생긴거 같네요. 평소보다 근육을 많이 써서 근육손상이나 근육통이 발생한게 아닌가 싶습니다. 근육통이 심하시면 근육이 회복될수있게.. 통증이 없을때까지 아픈 근육은 쓰지 마시기 바랍니다. 현재 통증이 심하면 진통소염제같은 진통제를 복용해보세요. 도움이 되셨기를 바라며.. 궁금한 사항있으면 언제든지 물어보세요

협심증 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동하고 무관하게 통증이 있다면.. 협심증이 아닐 가능성이 높습니다. 통증지점을 겹으로 알 수있는 부위가 있다면.. 근육통일 가능성이 높습니다. 과도한 운동을 하고 있다면.. 근육이 회복될 수 있게 휴식을 취하시고요. 통증이 심하면 진통소염제를 복용하는게 좋겠네요.

머리가 주기적으로 아프고 뒷목이 뻣근합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 박동성으로 느껴지는 두통으로 보아 편두통일 가능성이 높습니다. 두통은 여러종류가 있어서.. 신경과 진료를 보시어 정밀한 진찰이 필요해 보입니다. 두통을 유발하는 요인을 피하고 휴식으로 좋아질수는 있는데요. 그보다 먼저 검사를 통해 두통의 원인을 찾고 필요시 약물치료를 같이 하는게 좋겠습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다.

눈 밑 근육 떨림이 너무 심합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈아래 근육떨림이 나타나는건.. 눈아래 근육에서 경련이 발생한거 같네요. 보통 스트레스나 수면부족으로 인한 피로에 의해서 나타나게 되는데요. 카페인이나 알콜같은 것에 의해서도 나타나고.. 전해질마그네슘 칼슘..의 불균형에도 나타날 수 있습니다. 충분한 수면과 휴식에도 증상이 지속된다면 신경과 진료를 받아서.. 정확한 원인과 적절한 치료를 받는게 좋겠습니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 이게 무슨 증상인지 궁금합니다. 구글링해도 안나와요장갑끼면 손등불편감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장갑을 끼지 않으면 손등 불편한 증상이 어떤가요? 전혀 없는지 아니면 똑같이 나타나는지요? 하지 불안증후군이 있으신가요? 일단 진료는 한번 받아보셔요

갤럭시워치 심전도 측정인데 확인해주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 갤럭시 워치 심전도 측정리듬은 문제는 없어보이는데요. 혹시 측정하는 이유와 걱정되는 부분은 무엇인지요?

손등통증 관련 문의입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지 불안 증후군에 대한 치료를 받아보시면서 경과를 지켜볼 수 있습니다. 손으로 만지만 장갑끼고 있을때처럼 증상이 나타나나요? 가정의학과나 신경과 진료 받아보셔요

뺨에서 바퀴벌레 더듬이가 나왔는데 병원 가봐야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 놀라셨겠네요. 일단 증상이 없으면 억지로 토하려 하지말고 그냥 지켜보실 수 있어요. 그게 무엇인지 알 수 있으면 좋을 것 같네요

왼쪽 눈이 아프다가 갑자기 관자놀이가 아픕니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 눈 부근이 아프다가 지금은 관자놀이로 통증부위가 옮겨간 양상입니다. 이러한 통증의 양상만으로 두통의 구체적인 원인을 진단하기는 어렵지만 편두통이 보통 편측으로 나타난다는 점을 고려하면 가능성은 있습니다. 추가적인 진찰이 필요하므로 증상이 나아지지 않으면 가까운 신경과를 방문해보시기 바랍니다.

아까 너무급해요 글쓴 사람인데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 청소년기임을 감안한다고 해도 마스크 착용이 얼굴 골격의 발달에 미치는 영향은 제한적입니다. 마스크의 장시간 착용이 얼굴의 형태를 변형시킨다는 직접적인 증거도 없습니다. 그러니 과도한 우려라고 볼 수 있겠고 코막힘 등의 질환이 구조적 변화로 이어질 가능성은 있으니 불편한 증상이 있는지를 먼저 살펴보시기 바랍니다.

손가락 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 가지고 있는 연고는 자극성 피부염의 간지럼증에 도움이 될수 있으니 발라보시고 차도가 없거나 심해지면 진료 받아보셔요

식후 커피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 나쁘지는 않지만 위염이라던지 역류성 식도염이 있는 경우라면 위에 좋지는 않습니다. 가능하면 적절한 카페인 섭취가 도움이 됩니다. 감사합니다.

피부에 빨간게 올라오는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 사진을 보기에는 모낭염으로 생각이됩니다. 어떤증상이있나요? 연고 바른다면 항생제 연고를 발라보시고 효과없거나 퍼지면 진료 받아보셔요

밴드를 붙이는 것이 파상풍 예방에 관련이 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안타깝게도 파상풍은 밴드로 예방이 안됩니다. 상처관리와 예방접종으로 통해서 예방이 가능한 것으로 알고 있습니다.

뺨에서 바퀴벌레 더듬이가 나왔는데 병원 가봐야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 놀라셨겠네요. 일단 증상이 없으면 억지로 토하려 하지말고 그냥 지켜보실 수 있어요. 그게 무엇인지 알 수 있으면 좋을 것 같네요

손등통증 관련 문의입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지 불안 증후군에 대한 치료를 받아보시면서 경과를 지켜볼 수 있습니다. 손으로 만지만 장갑끼고 있을때처럼 증상이 나타나나요? 가정의학과나 신경과 진료 받아보셔요

머리가 주기적으로 아프고 뒷목이 뻣근합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 박동성으로 느껴지는 두통으로 보아 편두통일 가능성이 높습니다. 두통은 여러종류가 있어서.. 신경과 진료를 보시어 정밀한 진찰이 필요해 보입니다. 두통을 유발하는 요인을 피하고 휴식으로 좋아질수는 있는데요. 그보다 먼저 검사를 통해 두통의 원인을 찾고 필요시 약물치료를 같이 하는게 좋겠습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다.

알레르기성 비염으로 인한 증상 중에,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알레르기 비염과 급성 인후두염이 동반된 것으로 보입니다. 증상이 있다면 병원 내원하여 진료를 보는 것을 권해드리겠습니다.

가는변 잔변감 관련해서 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가는 변은 대장 내에서 변이 충분히 굳지 않아서 발생합니다. 대장 내에서 변이 충분히 굳지 않으면 변이 가는 모양으로 나오게 됩니다. 가는 변은 대장암의 증상 중 하나이지만 대장암이 아니더라도 가는 변이 나올 수 있습니다. 대장암이 의심되는 경우에는 대장내시경 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 대장내시경 검사는 항문에 카메라가 달린 관을 삽입하여 대장을 관찰하는 검사입니다. 대장내시경 검사를 통해 대장암을 조기에 발견하면 치료가 쉽습니다. 가는 변은 대장암이 아니더라도 식이요법과 운동을 통해 개선할 수 있습니다. 식이요법으로는 섬유질이 풍부한 음식을 섭취하고 운동으로는 규칙적으로 걷는 것이 좋습니다. 가는 변이 지속된다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

눈 밑 근육 떨림이 너무 심합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈아래 근육떨림이 나타나는 건.. 눈아래 근육에서 경련이 발생한거 같네요. 보통 스트레스나 수면부족으로 인한 피로에 의해서 나타나게 되는데요. 카페인이나 알콜같은 것에 의해서도 나타나고.. 전해질마그네슘 칼슘..의 불균형에도 나타날 수 있습니다. 충분한 수면과 휴식에도 증상이 지속된다면 신경과 진료를 받아서.. 정확한 원인과 적절한 치료를 받는데 좋겠습니다. 도움이 되셨길 바랍니다.

눈 밑 근육 떨림이 너무 심합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈아래 근육떨림이 나타나는 건.. 눈아래 근육에서 경련이 발생한거 같네요. 보통 스트레스나 수면부족으로 인한 피로에 의해서 나타나게 되는데요. 카페인이나 알콜같은 것에 의해서도 나타나고.. 전해질마그네슘 칼슘..의 불균형에도 나타날 수 있습니다. 충분한 수면과 휴식에도 증상이 지속된다면 신경과 진료를 받아서.. 정확한 원인과 적절한 치료를 받는데 좋겠습니다. 도움이 되셨길 바랍니다.

이게 무슨 증상인지 궁금합니다. 구글링해도 안나와요장갑끼면 손등불편감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장갑을 끼지 않으면 손등 불편한 증상이 어떤가요? 전혀 없는지 아니면 똑같이 나타나는지요? 하지 불안증후군이 있으신가요? 일단 진료는 한번 받아보셔요

갤럭시워치 심전도 측정인데 확인해주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 갤럭시 워치 심전도 측정리듬은 문제는 없어보이는데요. 혹시 측정하는 이유와 걱정되는 부분은 무엇인지요? 응급처치 늦었나여???파라핀 치료 부작용 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파라핀치료 받은후에 화상을 입는 경우는 거의 없습니다. 많이 불편하면 다시 병원에서 진료 한 번 받아보시는것이 어떨까요?

헤르페스 결막염 가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 결막염은 주로 다음과 같은 경로로 감염됩니다. 직접 접촉 환자의 눈물 분비물 등과 직접 접촉해 바이러스가 전파 감염된 사람과 키스하거나 신체 접촉 시 전파 가능 간접 접촉 환자가 사용한 수건 화장품 렌즈 케이스 등 개인 용품 공유로 전파 오염된 물체나 표면에 있는 바이러스가 눈에 접촉해 감염 자가 감염 입술 또는 피부 주변의 단순 헤르페스 병변에서 바이러스가 손으로 옮겨 눈에 접촉 신생아 감염 분만 시 산모의 활성 질환으로부터 신생아가 감염

머리가 주기적으로 아프고 뒷목이 뻣근합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 박동성으로 느껴지는 두통으로 보아 편두통일 가능성이 높습니다. 두통은 여러종류가 있어서.. 신경과 진료를 보시어 정밀한 진찰이 필요해 보입니다. 두통을 유발하는 요인을 피하고 휴식으로 좋아질수는 있는데요. 그보다 먼저 검사를 통해 두통의 원인을 찾고 필요시 약물치료를 같이 하는게 좋겠습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다.

추가적인 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이두근에 근육통이 생긴거 같네요. 평소보다 근육을 많이 써서 근육손상이나 근육통이 발생한게 아닌가 싶습니다. 근육통이 심하시면 근육이 회복될수있게.. 통증이 없을때까지 아픈 근육은 쓰지 마시기 바랍니다. 현재 통증이

심하면 진통소염제같은 진통제를 복용해보세요. 도움이 되셨기를 바라며.. 궁금한 사항있으면 언제든지 물어보세요

다리 무릎쪽 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오금근이 통증은 치료하지 않으면 뛰기가 많이 곤란하며 쭈그려 앉기도 불편해 집니다. 오금근이 아닐 수도 있으나 가까운 병원에서 물리 치료와약 복용 정도는 해보시기를 권합니다.

스마일라식 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 안경을 벗고 난 후 평소에 너무 잘 보이니까 주로 멍때리거나 눈에 힘을 빼고 보거나 힘을 뺀 주고 보거나 그러는데 이런 것들은 시력이랑 다 상관 없나요? 2. 그럼 평소에 눈에 힘을 빼고 보는 게 좋은 걸까요? 크게 상관 없습니다. 편하게 보이시는 대로 보시면 되는데요 억지로 힘을 줘서 보실 필요는 없습니다. 3. 눈에 뭐가 들어가서 가까이 거울을 보니 잘 안 보이고 멀리 봐야 잘 보이던데 앞으로도 계속 그런 걸까요? 가까이 볼 때 우리 눈은 초점을 가까이 당기는 조절을 하게 되는데요 근시인 분들은 조절을 하지 않아도 초점이 가까이에 있어서 가까운걸 편하게 볼 수 있습니다. 라식 등으로 근시를 없애면 그만큼 조절을 해야 해서 처음엔 불편할 수 있는데요 3달 정도 바뀐 굴절 상태에 적응하게 되면 정상적으로 보시게 될 거예요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

조직검사 결과 좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 침규콘딜로마는 인유두종바이러스 HPV 감염에 의한 성기나 항문 주변의 사마귀성 질환입니다. 환자나 무증상 감염자와 성접촉으로 전파되고 2개월3개월 잠복기 이후 내외음부 회음부 항문 주위에 육안으로 확인할 수 있는 용기된 병변이 나타나게 됩니다. 인유두종 바이러스 감염자궁경부암의 주요 원인에 의한 세포변형의 경우는 단순 반응성 세포변화보다는 특유의 세포변화Koilocytosis 원반세포증가 보이게 됩니다. 건승하세요.

협심증 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동하고 무관하게 통증이 있다면.. 협심증이 아닐 가능성이 높습니다. 통증지점을 겹으로 알 수있는 부위가 있다면.. 근육통일 가능성이 높습니다. 과도한 운동을 하고 있다면.. 근육이 회복될 수 있게 휴식을 취하시고요. 통증이 심하면 진통소염제를 복용하는게 좋겠네요.

알레르기성 비염으로 인한 증상 중에,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알레르기 비염과 급성 인후두염이 동반된 것으로 보입니다. 증상이 있다면 병원 내원하여 진료를 보는 것을 권해드리겠습니다.

선생님 추가질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1년전 검사가 제대로 이루어졌다면 일반적으로 추가로 검사를 권하지는 않습니다. 하지만 걱정이 된다면 근처 병원에서 검사를 다시 하는 것도 문제는 되지 않습니다.

스마일라식 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 안경을 벗고 난 후 평소에 너무 잘 보이니까 주로 멍때리거나 눈에 힘을 빼고 보거나 힘을 뺀 주고 보거나 그러는데 이런 것들은 시력이랑 다 상관 없나요? 2. 그럼 평소에 눈에 힘을 빼고 보는 게 좋은 걸까요? 크게 상관 없습니다. 편하게 보이시는 대로 보시면 되는데요 억지로 힘을 줘서 보실 필요는 없습니다. 3. 눈에 뭐가 들어가서 가까이 거울을 보니 잘 안 보이고 멀리 봐야 잘 보이던데 앞으로도 계속 그런 걸까요? 가까이 볼 때 우리 눈은 초점을 가까이 당기는 조절을 하게 되는데요 근시인 분들은 조절을 하지 않아도 초점이 가까이에 있어서 가까운걸 편하게 볼 수 있습니다. 라식 등으로 근시를 없애면 그만큼 조절을 해야 해서 처음엔 불편할 수 있는데요 3달 정도 바뀐 굴절 상태에 적응하게 되면 정상적으로 보시게 될 거예요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

달무리 무지개,안녕하세요. 메디이즈입니다. 습한날 가로등을 보면 정상적으로 달무리 주변부로 무지개 띠가 보일 수 있습니다. 녹내장 증상은 아니니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 안압이 많이 높으면 빛이 번져 보일 수 있는데요 증상이 나타날 정도로 안압이 올라가려면 시력도 떨어지고 머리도 아프고 구토도 나고 하는 등 다른 증상이 동반되게 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

며칠전 부비동염에 걸렸는데 이후 이상한 증상이 있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 시선 이동시마다 느껴지는 신경통은 일반적인 증상이 아니여서 무엇이다라고 말씀드리기는 어렵겠네요. 뇌의 어떤 부분 ex. 시신경에 자극이 되거나 압박시에도 나타날 수가 있고 스트레스나 불안증세가 신체적증상으로 나타날 수도 있고요. 부비동염의 의해서도 흔하지는 않겠지만..염증이 퍼지거나 신경에 자극을주어서도 생길 수가 있겠네요. 신경과에 방문하여 상담받아보시고 적절한 치료를 받으시기 바랍니다.

골다공증 초고위험군 치료와 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골다공증이 심하시군요. 골다공증 치료는 골질의 위험을 낮추는 것이 가장 중요합니다. 척추는 골질 위험이 높으니 당분간 넘어지거나 추락하는 손상을 입지않도록 주의하셔야 합니다. 그래서 이베네티 주사를 1년 사용하고 해를 쪼이면서 체중이 실리는 걷기운동을 하시고 칼슘 비타민드를 계속 투여하고 뼈에 필요한 단백질이나 미네랄을 식사에서 충분히 보충하고 1년후 검사해서 수치를 보고 다른 약으로 바꿔야 합니다. 병원은 처음 방문한 곳에 계속 다니시는 것이 좋습니다. 감사합니다.

제 증상이 어떤 건가요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 루게릭병은 아주 드문 희귀질환이기도 하고.. 보통 50대 중년남성에서 호발하니 아직은 젊어서 가능성이 매우 떨어집니다. 손아귀에 힘이 안들어가고 근육이 빠진 이유를 좀 더 일반적인 것에 대해 검사를 해보는게 좋겠네요 증상을 보면 손목터널증후군의 가능성이 높아보이는데..목디스크가 있거나 거북목 증후군에 의해서도 신경에 영향을 주어 손목에 힘이 빠지거나 아플수도 있으니 정형외과에서 검사를 받아보시기 바랍니다. 그리고 적절한 운동과 스트레칭을 통해서도 근육을 강화시키고 이완시키는 쪽으로도 해보시기 바랍니다.

성관계 자위 시 방귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성대장증후군은 스트레스나 감정적변화에 따라 대장이 과민반응을 보여 가스가 많이 발생할 수 있습니다. 평소 식이섬유를 많이 섭취하시고.. 가스가 많이 발생할 수 있는 음식들콩 탄산 기름진 음식을 멀리하시는게 좋겠습니다.

치료시기가 늦은걸까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 증상에 효과가 있을 약 처방입니다. 아주 초기에는 어지럽고 졸릴 수 있지만 심하지 않으면 지속적으로 복용해 보시면 되겠습니다.

버스 창문 햇빛,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일상 생활에서 햇빛에 눈부심을 느껴도 대부분 눈의 손상은 주지 않습니다. 햇빛에 의한 눈의 손상은 일광망막병증의 형태로 나타나는데 햇빛을 정면으로 수 분간 쳐다봐야 생길 수 있습니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

응급처치 늦었나여???파라핀 치료 부작용 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파라핀치료 받은후에 화상을 입는 경우는 거의 없습니다. 많이 불편하면 다시 병원에서 진료 한 번 받아보시는것이 어떨까요?

가는변 잔변감 관련해서 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가는 변은 대장 내에서 변이 충분히 굳지 않아서 발생합니다. 대장 내에서 변이 충분히 굳지 않으면 변이 가는 모양으로 나오게 됩니다. 가는 변은 대장암의 증상 중 하나이지만 대장암이 아니더라도 가는 변이

나올 수 있습니다. 대장암이 의심되는 경우에는 대장내시경 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 대장내시경 검사는 항문에 카메라가 달린 관을 삽입하여 대장을 관찰하는 검사입니다. 대장내시경 검사를 통해 대장암을 조기에 발견하면 치료가 쉽습니다. 가는 변은 대장암이 아니더라도 식이요법과 운동을 통해 개선할 수 있습니다. 식이요법으로는 섬유질이 풍부한 음식을 섭취하고 운동으로는 규칙적으로 걷는 것이 좋습니다. 가는 변이 지속된다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

생리대 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 독성쇼크증후군은 생리대 교체를 잊어버리는 것만으로는 걸리기 어렵습니다. 독성쇼크증후군은 생리대의 흡수력이 부족하거나 생리대를 오래 착용했을 때 생기는 질염이나 세균 감염에 의해 발생합니다. 따라서 생리대 교체를 잊어버렸더라도 생리대의 흡수력이 충분하고 생리대 착용 시간이 짧다면 독성쇼크증후군에 걸릴 가능성이 낮습니다. 하지만 생리대 교체를 잊어버렸을 때는 생리대 착용 시간을 줄이고 생리대의 흡수력을 확인하는 것이 좋습니다. 또한 생리대 착용 후에는 깨끗한 물로 씻고 생리대를 바꿀 때마다 손을 씻는 것이 좋습니다. 만약 생리대 교체를 잊어버리고 오래 착용했을 때 생리대 착용 부위에 통증이나 가려움증 발열 두통 구토 등의 증상이 나타나면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

어제 파라핀 치료를 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기본적으로 참을 수 있는 정도까지 뜨겁게 합니다. 나이가 젊으시니 열에 의한 손상의 가능성은 적습니다. 치료는 반복해 보시고 효과가 없으면 중단한다 라고 생각하시면 됩니다.

질초음파로 염증 확인이 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질초음파는 질염을 확인하는 검사는 아닙니다. 질세균검사STD 검사로 확인하게 됩니다. 자궁경부암검사는 자궁경부 세포의 이상을 확인하는 검사로 이 역시 질염을 확인하는 검사는 아닙니다. 진료해주신 원장님이 임상적인 소견 증상에 대한 처방으로 소독과 약물치료를 시행한 것이 아닌가 추정됩니다. 정확한 진단 및 의견은 산부인과 검진으로 확인하시길 추천 드립니다. 감사합니다.

며칠전 부비동염에 걸렸는데 이후 이상한 증상이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시선 이동시마다 느껴지는 신경통은 일반적인 증상이 아니어서 무엇이다라고 말씀드리기는 어렵겠네요. 뇌의 어떤 부분 ex. 시신경에 자극이 되거나 압박시에도 나타날 수가 있고 스트레스나 불안증세가 신체적증상으로 나타날 수도 있고요. 부비동염의 의해서도 흔하지는 않겠지만.. 염증이 퍼지거나 신경에 자극을주어서도 생길 수가 있겠네요. 신경과에 방문하여 상담받아보시고 적절한 치료를 받으시기 바랍니다.

어제 파라핀 치료를 받았는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기본적으로 참을 수 있는 정도까지 뜨겁게 합니다. 나이가 젊으시니 열에 의한 손상의 가능성은 적습니다. 치료는 반복해 보시고 효과가 없으면 중단한다 라고 생각하시면 됩니다.

치료시기가 늦은걸까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 증상에 효과가 있을 약 처방입니다. 아주 초기에는 어지럽고 졸릴 수 있지만 심하지 않으면 지속적으로 복용해 보시면 되겠습니다.

왼쪽 눈 머리 이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸살기운과 두통은 관련이 많습니다. 몸살에 의한 자율신경 변화가 동반되어 두통은 편두통 양상과 비슷하게 잘 나타나며 약은 일반적인 진통제를 드시면 되는데 약효가 개인차가 있는 것 뿐이니 효과가 없으면 종류를 바꾸어 보시면 됩니다.

약을 옳게 처방 받은건지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 약은 근이완제는 아니며 혈액순환에 관련된 약입니다. 환자분의 상태를 제가 본 것은 아니지만 처방하신 선생님

께 확인해 보고 드시는게 좋겠습니다.

다리 무릎쪽 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오금근이 통증은 치료하지 않으면 뛰기가 많이 곤란하며 쭉그려 앉기도 불편해 집니다. 오금근이 아닐 수도 있으나 가까운 병원에서 물리치료와약 복용 정도는 해보시기를 권합니다.

신경과 약 질문 드려요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 같이 복용하셔도 됩니다. 발목의 손상에 의한 통증이 있다면 다른 종류의 진통제NSAIDs 를 추가하고 써펜은 빼고 드시는 것도 괜찮겠습니다.

헤르페스 결막염 가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 결막염은 주로 다음과 같은 경로로 감염됩니다. 직접 접촉 환자의 눈물 분비물 등과 직접 접촉해 바이러스가 전파 감염된 사람과 키스하거나 신체 접촉 시 전파 가능 간접 접촉 환자가 사용한 수건 화장품 렌즈 케이스 등 개인 용품 공유로 전파 오염된 물체나 표면에 있는 바이러스가 눈에 접촉해 감염 자가 감염 입술 또는 피부 주변의 단순 헤르페스 병변에서 바이러스가 손으로 옮겨 눈에 접촉 신생아 감염 분만 시 산모의 활성 질환으로부터 신생아가 감염

발목 인대쪽이 아픈데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 약도 효과가 있습니다. 제가 처방하는 약과는 다르기는합니다. 써펜은 진통효과는 적은 해열제이며 가펜틴는 심한 신경통 리트릴은 신경안정을 주된 목적으로 사용합니다.

전기 통함으로 생긴 통증으로 병원 갔는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근거가 있는 처방입니다. 신경안정제가 신경 관련된 통증에 대한 효과가 좋은 편이고 소염진통제의 효과가 적은 경우가 있습니다. 소염제 처방을 원하시면 보통은 원하시는대로 해드립니다.

성관계 자위 시 방귀,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과민성대장증후군은 스트레스나 감정적변화에 따라 대장이 과민반응을 보여 가스가 많이 발생할 수 있습니다. 평소 식이섬유를 많이 섭취하시고.. 가스가 많이 발생할 수 있는 음식들콩 탄산 기름진 음식을 멀리하시는게 좋겠습니다.

제 증상이 어떤 건가요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 루게릭병은 아주 드문 희귀질환이기도 하고.. 보통 50대 중년남성에서 호발하니 아직은 젊어서 가능성이 매우 떨어집니다. 손아귀에 힘이 안들어가고 근육이 빠진 이유를 좀 더 일반적인 것에 대해 검사를 해보는게 좋겠네요 증상을 보면 손목터널증후군의 가능성이 높아보이는데..목디스크가 있거나 거북목 증후군에 의해서도 신경에 영향을 주어 손목에 힘이 빠지거나 아플수도 있으니 정형외과에서 검사를 받아보시기 바랍니다. 그리고 적절한 운동과 스트레칭을 통해서도 근육을 강화시키고 이완시키는 쪽으로도 해보시기 바랍니다.

습윤밴드 제거 후 항생제 연고 발랐는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 상태로 보면 괜찮을 것 같긴한데 흉이 생기고 안생기고는 처음 다칠때 상처 깊이에 의하여 결정되고 상처를 얼마나 잘 치료하느냐에따라서 흉 크기가 영향을 받을 수 있습니다.

응급처치 늦었나여???파라핀 치료 부작용 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파라핀치료 받은후에 화상을 입는 경우는 거의 없습니다. 많이 불편하면 다시 병원에서 진료 한 번 받아보시는것이 어떨까요?

생리대 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 독성쇼크증후군은 생리대 교체를 잊어버리는 것만으로는 걸리기 어렵습니다. 독성쇼크증후군은 생리대의 흡수력이 부족하거나 생리대를 오래 착용했을 때 생기는 질염이나 세균 감염에 의해 발생합니다. 따라서 생리대 교체를 잊어버렸더라도 생리대의 흡수력이 충분하고 생리대 착용 시간이 짧다면 독성쇼크증후군에 걸릴 가능성이 낮습니다. 하지만 생리대 교체를 잊어버렸을 때는 생리대 착용 시간을 줄이고 생리대의 흡수

력을 확인하는 것이 좋습니다. 또한 생리대 착용 후에는 깨끗한 물로 씻고 생리대를 바꿀 때마다 손을 씻는 것이 좋습니다. 만약 생리대 교체를 잊어버리고 오래 착용했을 때 생리대 착용 부위에 통증이나 가려움증 발열 두통 구토 등의 증상이 나타나면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

치료시기가 늦은걸까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 증상에 효과가 있을 약 처방입니다. 아주 초기에는 어지럽고 졸릴 수 있지만 심하지 않으면 지속적으로 복용해 보시면 되겠습니다.

가는변 잔변감 관련해서 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가는 변은 대장 내에서 변이 충분히 굳지 않아서 발생합니다. 대장 내에서 변이 충분히 굳지 않으면 변이 가는 모양으로 나오게 됩니다. 가는 변은 대장암의 증상 중 하나이지만 대장암이 아니더라도 가는 변이 나올 수 있습니다. 대장암이 의심되는 경우에는 대장내시경 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 대장내시경 검사는 항문에 카메라가 달린 관을 삽입하여 대장을 관찰하는 검사입니다. 대장내시경 검사를 통해 대장암을 조기에 발견하면 치료가 쉽습니다. 가는 변은 대장암이 아니더라도 식이요법과 운동을 통해 개선할 수 있습니다. 식이요법으로는 섬유질이 풍부한 음식을 섭취하고 운동으로는 규칙적으로 걷는 것이 좋습니다. 가는 변이 지속된다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

치루 수술 후 육신거림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 다 낫지 않았기 때문에 통증은 있을 수 있습니다. 많이 붓거나 출혈이 심하면 진료가 필요합니다. 보다 더 자세한 내용은 수술 받으셨던 병원에 전화 하셔서 문의 하시는 것이 보다 정확한 답변을 들으실 수 있을 것입니다. 감사합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 헤르페스 같지는 않고 단순 종기같은 모낭염 또는 피지종으로 보입니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

유관확장미세석회증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 촬영 영상과 초음파 영상을 봐야 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 미세석회화 유관확장된 부위를 바늘 총조직검사를 우선 해 보고 총조직검사에서 문제가 없다면 좀 지켜보는 방법도 있습니다. 유관확장만 있고 확장된 관 내에 결절이 뚜렷하지 않다면 유관확장 분비성 변화로 인한 미세석회화 가능성이 더 높긴 합니다. 맘모토를 하면 좀 더 정확히 진단할 수는 있는데 비용이 많이 들어서요. 병원을 옮겨서 진료를 한 번 다시 받아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 감사합니다.

대상포진신경통 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진 급성기에는 신경통약을 드실 필요 없이 진통제와 항바이러스제로 조절 하시면됩니다. 초기에 치료하시면 곧 좋아지실 겁니다

치루 수술 후 육신거림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 다 낫지 않았기 때문에 통증은 있을 수 있습니다. 많이 붓거나 출혈이 심하면 진료가 필요합니다. 보다 더 자세한 내용은 수술 받으셨던 병원에 전화 하셔서 문의 하시는 것이 보다 정확한 답변을 들으실 수 있을 것입니다. 감사합니다.

식후 커피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 나쁘지는 않지만 위염이라던지 역류성 식도염이 있는 경우라면 위에 좋지는 않습니다. 가능하면 적절한 카페인 섭취가 도움이 됩니다. 감사합니다.

머리가 핑 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 환자분의 증상은 급속한 체위변경에 의한 미주신경성 실신이 의심됩니다. 대부분 빠른 체위 변경에 의해 일어나므로 천천히 몸을 일어나 보도록 해 보세요. 감사합니다.

치료시기가 늦은걸까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 증상에 효과가 있을 약 처방입니다. 아주 초기에는 어지럽고 졸릴 수 있지만 심하지 않으면 지속적으로 복용해 보시면 되겠습니다.

대상포진신경통 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진 급성기에는 신경통약을 드실 필요 없이 진통제와 항바이러스제로 조절 하시면됩니다. 초기에 치료하시면 곧 좋아지실 겁니다 이 약들이랑 타이레놀 먹어도되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기침과 가래를 멈추게 하고 몸속 히스타민 분비를 줄여주는 전문약을 받으셨군요 타이레놀과 성분이 겹치지 않기에 같이 복용 가능합니다 현재 전문약에 진통소염제가 없기에 함께 복용해도 건강에 이상이 없겠습니다 건강하세요

테아닌 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 테아닌의 하루 권장용량은 다음과 같습니다. 성인 200250mg 테아닌은 녹차에 들어있는 아미노산의 한 종류로 스트레스로 인한 긴장 완화에 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. 식약처에서 고시한 최대 용량은 250mg이니 이를 지켜서 섭취하는 것이 좋습니다. 대체로 하루 12회를 권장하며 하루 최대 3회 복용 가능하다고 합니다

버스 창문 햇빛,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일상 생활에서 햇빛에 눈부심을 느껴도 대부분 눈의 손상은 주지 않습니다. 햇빛에 의한 눈의 손상은 일광망막병증의 형태로 나타나는데 햇빛을 정면으로 수 분간 쳐다봐야 생길 수 있습니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

왼쪽 입술 옆에 침 흐르는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 증상으로만 보면 뇌졸중을 의심하기는 좀 어려운것 같습니다. 다만 증상에 대한 관심이 많으신것이 아닌가 싶습니다

대상포진신경통 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진 급성기에는 신경통약을 드실 필요 없이 진통제와 항바이러스제로 조절 하시면됩니다. 초기에 치료하시면 곧 좋아지실 겁니다

포도상구균 감염?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염을 유발하는 원인균을 반드시 확인해야 하는 것은 아니며 단기간의 항생제에 호전이 잘 되므로 처방 받아 복용하기 바랍니다.

숨 쉬기 힘들 때 쓸 수 있는 방법이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속 된다면 심부전과 같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

왼쪽 눈 머리 이 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 편두통 가능성이 높습니다. 따라서 상기 증상이 반복된다면 신경과에서 진료를 보는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

조직검사 결과 좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 침규콘딜로마는 인유두종바이러스 HPV 감염에 의한 성기나 항문 주변의 사마귀성 질환입니다. 환자나 무증상 감염자와 성접촉으로 전파되고 2개월3개월 잠복기 이후 내외음부 회음부 항문 주위에 육안으로 확인할 수 있는 융기된 병변이 나타나게 됩니다. 인유두종 바이러스 감염자궁경부암의 주요 원인에 의한 세포변형의 경우는 단순 반응성 세포변화보다는 특유의 세포변화Koilocytosis 원반세포증가 보이게 됩니다. 건승하세요.

복부동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부대동맥류가 있다고 해서 하지직거상을 하는게 딱히 문제가 되지는 않을듯합니다. 술 담배를 금하고 체중 조절 규칙적인 운동 등이 도움이 됩니다

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀

모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 하지만 모양이 변할 수 있으니 변화를 살펴보기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

고혈당 후 저혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체중이 감소되면서 신체 혈당조절 과정에서 혼선이 빚어진걸로 생각합니다. 비만을 치료하면 당뇨가 많이 좋아지는 것은 사실입니다. 꾸준히 비만치료를 하는 것이 많은 도움이 되고 그 과정에서 혈당의 기복이 심해진다면 복용중인 약제를 조절해야 합니다. 비만이던 시기에 먹던 약을 체중이 감소된 상태에서 그대로 먹게 되면 저혈당 같은 양상이 생길 수가 있습니다. 진료중인 병원을 방문해서 약을 조절받는 것이 좋을 것 같습니다.

아까 너무급해요 글쓴 사람인데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 청소년기임을 감안한다고 해도 마스크 착용이 얼굴 골격의 발달에 미치는 영향은 제한적입니다. 마스크의 장시간 착용이 얼굴의 형태를 변형시킨다는 직접적인 증거도 없습니다. 그러니 과도한 우려라고 볼 수 있겠고 코막힘 등의 질환이 구조적 변화로 이어질 가능성은 있으니 불편한 증상이 있는지를 먼저 살펴보시기 바랍니다.

사후피임약 복용 후 경구피임약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황대로 된다면 생리 첫날에 경구 피임약을 복용하면 될 것으로 생각합니다. 경구 피임약 복용하고 난 후 1주일간은 이중 피임을 권해드립니다.

이거 매독인가요? ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 우선 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

임신 혈액검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이 시기는 다음 생리에정일 이후이므로 생리에정일 이후에 테스트하는 것을 추천합니다. 건승하세요.

손등에 상처가 끓는거 같은데 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손등에 상처가 끓는 것은 피부 감염이 발생한 것입니다. 피부 감염은 세균에 의해 발생하며 증상으로는 통증 붉은색 발적 부종 고름 등이 있습니다. 피부 감염이 발생하면 항생제 연고를 바르고 상처 부위를 깨끗하게 유지해야 합니다. 또한 손을 자주 씻고 상처에 물을 닿지 않도록 해야 합니다. 만약 상처가 심하거나 통증이 심하다면 병원에서 치료를 받아야 합니다.

귀두 돌기? 이건 정상일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 진주양 구진으로 판단됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

질초음파로 염증 확인이 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질초음파는 질염을 확인하는 검사는 아닙니다. 질세균검사STD 검사로 확인하게 됩니다. 자궁경부암검사는 자궁경부 세포의 이상을 확인하는 검사로 이 역시 질염을 확인하는 검사는 아닙니다. 진료해주신 원장님이 임상적인 소견 증상에 대한 처방으로 소독과 약물치료를 시행한 것이 아닌가 추정됩니다. 정확한 진단 및 의견은 산부인과 검진으로 확인하시길 추천 드립니다. 감사합니다.

멍이 생겼는데 병원에 가봐야할지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금상처는 멍이라기보다는 어디에 부딪히거나 쓸린것이 아닌가 싶는데 최근에 그런 외상을 입은적이 있는지요? 멍이 생겼는데 병원에 가봐야할지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금상처는 멍이라기보다는 어디에 부딪히거나 쓸린것이 아닌가 싶는데 최근에 그런 외상을 입은적이 있는지요? hpv 인유두종 관련해서요.. 질문있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요 문의해주신 내용에 대해 안내드리겠습니다. 결과만 보아서는 이전에 다른분으로 부터 전염 되었을 가능성이 높습니다

편도 종물질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 뚜렷하지 않아서 답변을 정확하게 드리기는 어렵네요. 이비인후과 선생님 말대로 해보셔요. 계속 커지는 것 같으면 제거를 고려하실 수 있습니다

파라딘점안액 얼마동안 써도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파딘은 스테로이드 안약은 아니고 알러지에 사용하는 항히스타민 성분의 안약입니다. 녹내장이나 백내장 등 스테로이드 안약의 합병증은 생기지 않고 안전하게 사용할 수 있는 약이니깐 안심하시고 넣으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

약을 옳게 처방 받은건지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 약은 근이완제는 아니며 혈액순환에 관련된 약입니다. 환자분의 상태를 제가 본 것은 아니지만 처방하신 선생님께서 확인해 보고 드시는게 좋겠습니다.

회음부 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경미한 열상이라면 시간이 지나면서 저절로 호전되는 경우가 많지만 열상이 크다면 산부인과 내원하여 진료를 보는 것을 권합니다.

골다공증 주사 임플란트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프롤를 투여 중이라면 주사를 맞은 후 4개월째에 임플란트 시술을 하고 이후 2개월 경과한 시점에 재접종을 할 수 있습니다. 담당의와 상의하기 바랍니다.

질입구쪽 아프트성 궤양,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질염과 외음부염이 동반된 것으로 보입니다. 통증이 있고 냉이 나온다면 약물 치료를 하는 것이 필요하므로 진료를 보시기 바랍니다.

안구건조증 알려지상태에서 시력검사값,안녕하세요. 메디이즈입니다. ARK 값이 안좋게 나오다가 보다 눈이 정상상태일 때의 값이 나오지 않을 수 있습니다. 한마디로 부정확하게 검사결과가 나올 수 있습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

이런 어지러움 원인 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럼증이 지속되어 여러 검사를 시행하신 상황이나 진단명을 찾기 어려운 상황이라 보입니다. 여러 진료과를 방문하고 검사를 시행해도 원인을 찾기 어려운 상황이라면 정신건강의학과에서의 진료가 필요한 상황일 가능성도 있습니다. 불안감이나 우울감 등의 원인이 신체적 증상을 유발하는 경우도 있기 때문입니다.

경구피임약을 락킵 락킵 먹은 상태로 질내사정을 했습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약을 용량과 용법을 지키지 않았다고 하면 피임효과는 별로 생각하시면 됩니다. 임신가능성에 대비하시는 것이 좋겠습니다

심전도 결과지 상태좀 여쭙수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 불편한 증상이 무엇인가요? 심전도 결과는 큰 이상은 없으신것이 아닌가 싶습니다. 검진 결과를 지켜보시는 것이 좋겠습니다

약을 옳게 처방 받은건지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 약은 근이완제는 아니며 혈액순환에 관련된 약입니다. 환자분의 상태를 제가 본 것은 아니지만 처방하신 선생님께서 확인해 보고 드시는게 좋겠습니다.

회음부 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경미한 열상이라면 시간이 지나면서 저절로 호전되는 경우가 많지만 열상이 크다면 산부인과 내원하여 진료를 보는 것을 권합니다.

질입구쪽 아프트성 궤양,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질염과 외음부염이 동반된 것으로 보입니다. 통증이 있고 냉이 나온다면 약물 치료를 하는 것이 필요하므로 진료를 보시기 바랍니다.

남자친구가hpv ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에 이미 감염되었거나 남자친구로부터 전염되는.. 두가지 경우 모두 다 가능합니다. HPV는 서로 다른 유형의 감염이 동시에 이루어지

는 경우가 많습니다.

골다공증 주사 임플란트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프롤를 투여 중이라면 주사를 맞은 후 4개월째에 임플란트 시술을 하고 이후 2개월 경과한 시점에 재접종을 할 수 있습니다. 담당의와 상의하기 바랍니다.

다리 붓기 안빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리를 다친지 2주 된 상황이고 아직 부종이 다 빠지지 않으셨군요. 병원에서 인대의 염좌를 진단한 상황이라 보이는데 부종이 빠지지 않는다고 해서 발목을 못 쓰게 되는 것은 아닙니다. 다만 부종이 빠지는 데에는 상당한 시간이 소요되는 편입니다. 통증이 사라지고 일상생활이 가능해지면 천천히 재활운동 해보시면 됩니다.

여자친구와 관계 직후 빨간 반점이 올라왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

팔 다리 힘 빠지고 가려운 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 팔과 다리에서 느껴지는 힘빠지는 느낌 가려운 느낌이 있고 힘이 빠지는 증상까지 동반되는 것 같습니다. 4주간 이러한 증상이 몸의 여기저기를 돌아가는 양상을 보이는 상황인데 신경과 관련된 불편함일 것임이 추정되거나 특정한 부위에 국한된 문제를 의심하긴 어렵습니다. 신경과 진료를 받아보시기를 권해드릴 수 있습니다.

발목 인대쪽이 아픈데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 약도 효과가 있습니다. 제가 처방하는 약과는 다르기는합니다. 써펜은 진통효과는 적은 해열제이며 가펜틴는 심한 신경통 리트릴은 신경안정을 주된 목적으로 사용합니다.

쇄골 위 안쪽을 누르면 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 누르지 않으면 불편한 증상이 없다면 그냥 두고 보셔도 됩니다. 부위는 흉쇄유돌근이나 전사각근이 위치하는 곳이 아닌가 싶습니다

성기 피부 부분 쓰라림증상사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

성기부분 피부 쓰라림사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

제가 아픈곳이 현재 여러군데있는데 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발목 통증이 있으신가요? 통증의 원인에 따라 다를 수 있지만 약이 통증 완화에 도움이 될 수 있을 것으로 판단됩니다. 원인모를 복통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복통이 지속되는 경우에는 일상생활에서 다음과 같은 사항을 주의해야 합니다. 식습관 개선 자극적인 음식이나 기름진 음식은 피하고식이섬유가 풍부한 음식을 섭취하는 것이 좋습니다. 금주도 필요합니다 스트레스 관리 스트레스는 복통의 원인 중 하나이므로 스트레스를 적절히 관리하는 것이 중요합니다. 충분한 휴식 충분한 휴식을 취하여 몸의 피로를 해소하는 것이 좋습니다.

피임약 야즈중단후 부정출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 야 3개월 드시다가 중단하면 다시 출혈이 있을 수 있습니다. 부작용때문에 중단하신거니 다시 드시지말고 경과를 지켜보셔요

신경과 약 질문 드려요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 같이 복용하셔도 됩니다. 발목의 손상에 의한 통증이 있다면 다른 종류의 진통제NSAIDs 를 추가하고 써펜은 빼고 드시는 것도 괜찮겠습니다.

성병인가요 질염인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 사마귀양 병변이 다발성으로 관찰되어 성병 가능성을 고려해야 합니다. 병원 내원하여 검사 및 진료를 받아 보시기 바랍니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 헤르페스 같지는 않고 단순 종기같은 모낭염 또는 피지종으로 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 하지만 모양이 변할 수 있으니 변화를 살펴보기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 하지만 모양이 변할 수 있으니 변화를 살펴보기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

헤르페스 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 감염의 가능성이 있는 병변으로 비뇨의학과 내원하여 검사 및 진료가 필요하겠습니다. 진료를 보실 것을 권해드립니다.

탈모약 부작용 브레인포그 오면 중단 해야 하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탈모약이 브레인포그 증상을 유발하는 경우는 흔하지 않지만 약물에 의한 부작용은 해당 약물을 중단해야 호전이 되는 것이 일반적입니다.

유관확장미세석회증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 촬영 영상과 초음파 영상을 봐야 말씀을드릴 수 있을 것 같은데요. 미세석회화 유관확장된 부위를 바늘 총조직검사를 우선 해 보고 총조직검사에서 문제가 없다면 좀 지켜보는 방법도 있습니다. 유관확장만 있고 확장된 관 내에 결절이 뚜렷하지 않다면 유관확장 분비성 변화로 인한 미세석회화 가능성이 더 높긴 합니다. 맘모토를 하면 좀 더 정확히 진단할 수는 있는데 비용이 많이 들어서요. 병원을 옮겨서 진료를 한 번 다시 받아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 감사합니다.

사후피임약 복용 후 경구피임약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황대로 된다면 생리 첫날에 경구 피임약을 복용하면 될 것으로 생각됩니다. 경구 피임약 복용하고 난 후 1주일간은 이중 피임을 권해드립니다.

질초음파로 염증 확인이 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질초음파는 질염을 확인하는 검사는 아닙니다. 질세균검사STD 검사로 확인하게 됩니다. 자궁경부암검사는 자궁경부 세포의 이상을 확인하는 검사로 이 역시 질염을 확인하는 검사는 아닙니다. 진료해주신 원장님이 임상적인 소견 증상에 대한 처방으로 소독과 약물치료를 시행한 것이 아닌가 추정됩니다. 정확한 진단 및 의견은 산부인과 검진으로 확인하시길 추천 드립니다. 감사합니다.

소변 후 휴지에 분홍색 피비침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 부정출혈 등의 가능성도 있지만 혈뇨의 가능성도 있습니다. 증상 없는 혈뇨라면 경과관찰해도 될듯합니다

파상풍을 유발하는 균은 알콜이나 세제로도 죽일 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파상풍은 파상풍균이 생산한 신경독소에 의해 발생합니다. 파상풍균은 흙이나 먼지 동물의 분변 등에 존재하며 녹슨 쇠나 오염된 흙이 옷이나 소지품에 닿아 파상풍균이 묻을 수 있습니다. 옷에 묻은 파상풍균이 기존의 상처나 점막에 닿아 감염될 가능성은 있지만 매우 낮습니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁을 하면 옷에 묻은 파상풍균이 대부분 제거됩니다. 물건에 묻은 경우 손소독제로 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다. 균으로 오염된 옷을 수건이나 다른 옷과 함께 세탁해도 되지만 가능하면 따로 세탁하는 것이 좋습니다. 파상풍을 예방하기 위해서는 상처가 났을 때 적절한 조치를 취하는

것이 중요합니다. 상처가 났을 때는 상처 부위를 깨끗하게 소독하고 필요한 경우 파상풍 예방접종을 받는 것이 좋습니다. 야외활동을 할 때는 오염된 흙이나 먼지 등에 노출되지 않도록 주의해야 합니다. 파상풍을 유발하는 균은 혐기성 세균으로 산소가 없는 환경에서 번식합니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁이나 건조 등의 방법으로 제거할 수 있습니다. 알코올이나 세제로도 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다

저같은 경우는 음허화동인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음허화동은 음기가 허약해져서 열이 얼굴로 올라오는 증상을 말합니다. 과도한 자위는 음기를 소모시키기 때문에 음허화동이 발생할 수 있습니다. 하지만 음허화동은 얼굴에만 열이 나는 것이 아니라 몸 전체에 열이 나는 증상입니다. 따라서 얼굴에 열이 나는 것이 음허화동이라고 단정할 수는 없습니다. 정확한 진단을 위해서는 한방병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

턱 길어짐 턱관절,안녕하세요. 메디이즈입니다. 7개월 전 현재 사진입니다. 작년까지 치아교정을 했고 발치도 했습니다. 현재 유지보조장치를 끼고 있습니다. 7개월 전에 비해서 턱뼈가 더 아래로 내려오고 턱 끝이 튀어나와 턱이 더 커진 것 같은데 어떻게 해야 하나요? 주걱턱인가요? 부정교합 교정을 했기 때문에 부정교합은 아닙니다. 7개월동안 체중이 약 7키로정도 증가했는데 이것도 영향이 있을까요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다 성인이 되고 난 뒤에는 턱뼈가 자라는 경우는 거의 없다고 보시면 되구요 아마도 체중 증가에 따른 얼굴 변화나 씹는 습관에 따른 턱근육 변화 때문이 아닐까 생각 됩니다.

성기기둥 곁피부 갈라지고 아픔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부과 내원하시면 정확한 진단 가능하므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 반드시 수술적 치료를 해야 하는 것은 아닙니다. 꾸준히 운동을 통해 주변 근육을 강화해 주게 되면 수술을 하지 않고 유지할 수 있습니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 따님이 눈맞춤 호명반응 상호작용이 잘 이루어지고 있어 자폐스펙트럼일 가능성은 떨어지고.. 언어발달 지연 정도로만 있는거 같아보이네요 따님한테 지속적으로 관심을 가지고 평소 대화를 많이 가지려고 노력해주세요 언어 자극활동을 꾸준히 하시면 많은 도움이 될겁니다. 정확한 진찰을위해 소아과전문의 진료를 받아 보시기 바랍니다.

성기 갈라지듯이 상처나고 아픔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기에 피부염이 관찰되는 상황인데 이러한 피부염이 잘 낫지 않고 지속되는 경우에는 진료가 필요하겠습니다. 가까운 비뇨의학과나 피부과를 방문하여 진료받고 치료받아보시기를 권해드립니다.

간치료를 받아도 간수치가 안떨어져요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간수치가 조금 좋아질때까지는 수술이 좀 미뤄질수도 있을 것 같습니다. 탄수화물을 최대한 줄이고 채소위주의 식사를 해보셔요. 체중이 좀 줄어야 할 것 같습니다

아까 너무급해요 글쓴 사람인데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 청소년기임을 감안한다고 해도 마스크 착용이 얼굴 골격의 발달에 미치는 영향은 제한적입니다. 마스크의 장시간 착용이 얼굴의 형태를 변형시킨다는 직접적인 증거도 없습니다. 그러니 과도한 우려라고 볼 수 있겠고 코막힘 등의 질환이 구조적 변화로 이어질 가능성은 있으니 불편한 증상이 있는지를 먼저 살펴보시기 바랍니다.

이거 표피낭종? 종기? 터진거 잘 아물고 있는거 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잘 아물고 있는 것으로 생각됩니다. 혹시 믿음이 잘 안가거나 의심스러운 부분이 따로 있으신가요? 지시 받은대로 하시면 될것 같습니다

목에 멀치 넘어갔을 때,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 지금 불편함이 없으시다고 하니 멀치가 무사히 식도를 통과 했을 것으로 추측이 됩니다. 안심하셔도 괜찮을 것 같습니다.

배란일 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질 외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

외상후 스트레스 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 지금 증상에 대하여 약물 치료를 하고 있는데도 증상이 심하면 약물을 조절할 수 있는 여지가 있는지 진료 받으시면서 상담해보셔요

에보프림 비타민D 유산균 락토피트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 에림 락핏 비타민디 같이 드셔도 됩니다. 변비가 있으면 가장먼저 섬유질이 풍부한 채소 섭취를 늘려주시는 것이 필요합니다

대학병원에서 폐기능 검사를 하게 되었는데 힘든 검사이려나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 폐기능검사는 숨을 끝까지 들이마시고 췌게 끝까지 길게 내쉬고를 반복하는 검사로 무서워할 정도로 힘든검사는 아니니 안심하세요

너무 급해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마스크를 오랜시간 착용하는 것이 안면의 변형을 유발할까 걱정스러우시군요. 불가능에 가까운 일이므로 염려하시지 않아도 괜찮습니다. 불균형이 관찰되더라도 마스크가 원인이라 보기 어렵습니다.

유두에서 붉은 피가 조금 나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유두에서 피가 나오는 경우는 대부분이 유방의 유두종이지만 유방암의 경우도 있습니다. 일단 혈성 유두분비물이 나오면 유방초음파 검사와 유방촬영을 시행해보는 것이 좋습니다. 의심되는 병변이 있을 때 유방의 총생검 등 조직검사를 시행합니다. 유두종이 의심되는 경우에도 조직검사를 시행해서 비정형이 있는지 확인하게 됩니다. 물론 유방암도 조직검사를 통해서 진단이 됩니다. 감사합니다.

공복혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경과를 지켜보는 수 밖에없는데 탄수화물 섭취를 줄이고 채식위주의 식사를 해주셔요. 근육운동 열심히하시구요 평생관리가 필요할 수 있을 것 같습니다

공복혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경과를 지켜보는 수 밖에없는데 탄수화물 섭취를 줄이고 채식위주의 식사를 해주셔요. 근육운동 열심히하시구요 평생관리가 필요할 수 있을 것 같습니다

간치료를 받아도 간수치가 안떨어져요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간수치가 조금 좋아질때까지는 수술이 좀 미뤄질수도 있을 것 같습니다. 탄수화물을 최대한 줄이고 채소위주의 식사를 해보셔요. 체중이 좀 줄어야 할 것 같습니다

유두에서 붉은 피가 조금 나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유두에서 피가 나오는 경우는 대부분이 유방의 유두종이지만 유방암의 경우도 있습니다. 일단 혈성 유두분비물이 나오면 유방초음파 검사와 유방촬영을 시행해보는 것이 좋습니다. 의심되는 병변이 있을 때 유방의 총생검 등 조직검사를 시행합니다. 유두종이 의심되는 경우에도 조직검사를 시행해서 비정형이 있는지 확인하게 됩니다. 물론 유방암도 조직검사를 통해서 진단이 됩니다. 감사합니다.

전신 이상감각 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가슴을 찌르는 듯한 통증이 있다가 등까지 불편한 증상이 나타났고 이제는 전신의 감각이상을 느끼시는 상황입니다. 심질환은 아니었다고 하시니 불안감이나 우울감 등의 정신건강의학적인 증상을 유발하는 질환이 동반한 신체증상이 아닌지도 확인해보시는게 좋겠습니다.

여자친구와 관계 직후 빨간 반점이 올라왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지

마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

성기기둥 겉피부 갈라지고 아픔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부과 내원하시면 정확한 진단 가능하므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

비뇨기와 의사선생님들께 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

이거 매독인가요? ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 우선 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

유두에서 붉은 피가 조금 나왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유두에서 피가 나오는 경우는 대부분이 유방의 유두종이지만 유방암의 경우도 있습니다. 일단 혈성 유두분비물이 나오면 유방초음파 검사와 유방촬영을 시행해보는 것이 좋습니다. 의심되는 병변이 있을 때 유방의 총생검 등 조직검사를 시행합니다. 유두종이 의심되는 경우에도 조직검사를 시행해서 비정형이 있는지 확인하게 됩니다. 물론 유방암도 조직검사를 통해서 진단이 됩니다. 감사합니다.

피임약 효과 떨어트리는 약이 있는지 궁금합니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 처방받은 전문약 중에 여성호르몬 농도에 영향을 그래도 준다 싶은 약은 항히스타민 성분인 페라민과 액페린 2가지 입니다 1일 3회 식후 복용을 꼬박꼬박 하신다고 하면 머론은 취침전에 복용후 주무시는게 제일 간섭을 안받고 안전하다고 생각합니다 감기약 복용을 마친 후에는 원래의 복용시간으로 되돌리셔도 되겠습니다

발목 아킬레스건쪽 힘줄이 부었어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아킬레스건은 장딴지근과 가자미근의 힘줄부분으로 언급한 근육들의 혈행이 호전되고 단축이 해소되어야 치료가 됩니다. 약간의 활동제한을 하면서 치료에 전념하시기 바랍니다.

영양제 복용 순서,안녕하세요. 메디이즈입니다. 홀로 하나씩 영양제를 사먹다보면 조합이 뒤틀리거나 몸에 오히려 무리일 수 있습니다 이왕이면 약국에 가서서 상담을 받고 드셨으면 합니다 인터넷 구매나 홈쇼핑 구매는 그 누구도 건강악화를 책임져주지 않습니다 무엇보다 센름은 100등 중 최하위권에 속하기에 좀더 좋은 영양제로 바꾸심이 좋겠습니다 아침을 안드실 확률이 높으니 아침에 비타민D와 콜라겐 점심식사후 비타민 C와 글루타치온 오메가 3 저녁 식사후 종합 영양제 아연 비오틴 마늘추출물 그리고 피스테리드 이렇게가 안전해보입니다

수술후 장유착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선 적출 수술은 복강경이나 로봇을 이용하여 전립선과 주변 조직을 제거하는 수술입니다. 수술 후 복벽에 유착이 생길 수 있으며 이는 복벽이 딱딱해지면서 움직임이 제한되는 것을 말합니다. 복벽에 유착이 생기면 복통이나 불편함을 느낄 수 있으며 배변 활동에도 영향을 줄 수 있습니다. 시티 검사에서 이상이 없다면 장유착으로 인한 증상은 아닐 가능성이 높습니다. 하지만 설사와 가스 차는 증상이 지속된다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 설사와 가스 차는 증상은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 장유착 이외에도 과민성 대장 증후군 급성 장염 크론병 궤양성 대장염 등의 질환이 원인일 수 있습니다. 따라서 증상이 지속된다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

안녕하세요 선생님 소변 성병검사 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변으로 성병

인지 여부는 배양검사와 PCR검사 다 가능합니다. 그 중에서 대부분 PCR검사를 하고 있습니다. 첫소변이 균이 가장 많아 검사결과 신뢰도가 높지만 PCR검사는 아주 소량이어도 확인 가능하여 2번이나 음성이면 정확도가 높다고 볼 수 있겠네요. 요로결석이 요로에 염증반응을 일으켜 염증과 혈뇨 둘 다 가능합니다. 혈뇨 없이 염증만도 가능하고요.

엽산 과다복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 엽산은 세포분열과 생장에 도움을 주는 영양성분입니다 몸속에서 필요한 양까지만 쓰고는 바로 배출하는 수용성이기에 안전합니다 그래서 임산부들이 많이 먹어야 하는 유명한 임신영양제가 과량 들어 있습니다 전혀 축적이 안되기에 괜찮습니다 좋은 성분들이 많이 있네요 배합이 좋아보입니다

경구피임약을 찍엄찍엄 먹은 상태로 질내사정을 했습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약을 용량과 용법을 지키지 않았다고 하면 피임효과는 별로 생각하시면 됩니다. 임신가능성에 대비하시는 것이 좋겠습니다

안구건조증 알려지 상태에서 시력검사값,안녕하세요. 메디이즈입니다. ARK 값이 안 좋게 나온다고 보다 눈이 정상상태일 때의 값이 나오지 않을 수 있습니다. 한마디로 부정확하게 검사결과가 나올 수 있습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

대학병원에서 폐기능 검사를 하게 되었는데 힘든 검사이려나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 폐기능검사는 숨을 끝까지 들이마시고 쉼게 끝까지 길게 내쉬고를 반복하는 검사로 무서워할 정도로 힘든검사는 아니니 안심하세요

전신 이상감각 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가슴을 찌르는 듯한 통증이 있다가 등까지 불편한 증상이 나타났고 이제는 전신의 감각이상을 느끼시는 상황입니다. 심질환은 아니었다고 하시니 불안감이나 우울감 등의 정신건강의학적인 증상을 유발하는 질환이 동반한 신체증상이 아닌지도 확인해보시는게 좋겠습니다.

답변받고 추가질문 드립니다.....안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문이 워낙 많아서 기존의 질문 내용과 제가 답변드린 내용이 잘 기억이나지 않네요. 죄송합니다만 겪으신 증상에 대해 추가적인 궁금증이 있으시면 이를 포함하여 다시 질문해보시겠습니까? 저도 다시 확인해보겠습니다.

외상후 스트레스 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 지금 증상에 대하여 약물 치료를 하고 있는데도 증상이 심하면 약물을 조절할 수 있는 여지가 있는지 진료 받으시면서 상담해보셔요

에보프림 비타민D 유산균 락토핏,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 에림 락핏 비타민디 같이 드셔도 됩니다. 변비가 있으면 가장먼저 섬유질이 풍부한 채소 섭취를 늘려주시는 것이 필요합니다

대학병원에서 폐기능 검사를 하게 되었는데 힘든 검사이려나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 폐기능검사는 숨을 끝까지 들이마시고 쉼게 끝까지 길게 내쉬고를 반복하는 검사로 무서워할 정도로 힘든검사는 아니니 안심하세요

너무 급해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마스크를 오랜시간 착용하는 것이 안면의 변형을 유발할까 걱정스러우시군요. 불가능에 가까운 일이므로 염려하시지 않아도 괜찮습니다. 불균형이 관찰되더라도 마스크가 원인이라 보기 어렵습니다.

제가 아픈곳이 현재 여러군데있는데 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발목 통증이 있으신가요? 통증의 원인에 따라 다를 수 있지만 약이 통증 완화에 도움이 될 수 있을 것으로 판단됩니다 여자친구와 관계 직후 빨간 반점이 올라왔어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

대학병원에서 폐기능 검사를 하게 되었는데 힘든 검사이려나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 폐기능검사는 숨을 끝까지 들이마시고 쉼게 끝까지 길게 내쉬고를 반복하는 검사로 무서워할 정도로 힘든검사는 아니니 안심하세요

원인모를 복통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복통이 지속되는 경우에는 일상생활에서 다음과 같은 사항을 주의해야 합니다. 식습관 개선 자극적인 음식이나 기름진 음식은 피하고 식이섬유가 풍부한 음식을 섭취하는 것이 좋습니다. 금주도 필요합니다 스트레스 관리 스트레스는 복통의 원인 중 하나이므로 스트레스를 적절히 관리하는 것이 중요합니다. 충분한 휴식 충분한 휴식을 취하여 몸의 피로를 해소하는 것이 좋습니다.

목에 열치 넘어갔을 때,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 지금 불편함이 없으시다고 하니 열치가 무사히 식도를 통과 했을 것으로 추측이 됩니다. 안심하셔도 괜찮을 것 같습니다.

이거 표피낭종? 종기? 터진거 잘 아물고 있는거 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잘 아물고 있는 것으로 생각됩니다. 혹시 믿음이 잘 안가거나 의심스러운 부분이 따로 있으신가요? 지시 받은대로 하시면 될것 같습니다

경구피임약을 찍엄찍엄 먹은 상태로 질내사정을 했습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약을 용량과 용법을 지키지 않았다고 하면 피임효과는 별로 생각하시면 됩니다. 임신가능성에 대비하시는 것이 좋겠습니다

가임기 첫날 질외사정 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기에 피임이 완벽하지 못했을 가능성이 있기 때문에 임신가능성을 얼마나 이야기하기 어렵지만 사후피임조치가 필요하다고 생각됩니다.

이런 어지러움 원인 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럼증이 지속되어 여러 검사를 시행하신 상황이나 진단명을 찾기 어려운 상황이라 보입니다. 여러 진료과를 방문하고 검사를 시행해도 원인을 찾기 어려운 상황이라면 정신건강의학과에서의 진료가 필요한 상황일 가능성도 있습니다. 불안감이나 우울감 등의 원인이 신체적 증상을 유발하는 경우도 있기 때문입니다.

다리 붓기 안빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리를 다친지 2주 된 상황이고 아직 부종이 다 빠지지 않으셨군요. 병원에서 인대의 염좌를 진단한 상황이라 보이는데 부종이 빠지지 않는다고 해서 발목을 못 쓰게 되는 것은 아닙니다. 다만 부종이 빠지는 데에는 상당한 시간이 소요되는 편입니다. 통증이 사라지고 일상생활이 가능해지면 천천히 재활운동 해보시면 됩니다.

파라딘점안액 얼마동안 써도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파딘은 스테로이드 안약은 아니고 알러지에 사용하는 항히스타민 성분의 안약입니다. 녹내장이나 백내장 등 스테로이드 안약의 합병증은 생기지 않고 안전하게 사용할 수 있는 약이니까 안심하시고 넣으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

에보프림 비타민D 유산균 락토피트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 에림 락핏 비타민디 같이 드셔도 됩니다. 변비가 있으면 가장먼저 섬유질이 풍부한 채소 섭취를 늘려주시는 것이 필요합니다

심전도 결과지 상태좀 여쭙수 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 불편한 증상이 무엇인가요? 심전도 결과는 큰 이상은 없으신것이 아닌가 싶습니다. 검진 결과를 지켜보시는 것이 좋겠습니다

안구건조증 알려지상태에서 시력검사값,안녕하세요. 메디이즈입니다. ARK 값이 안좋게 나온다고 보다 눈이 정상상태일 때의 값이 나오지 않을 수 있습니다. 한마디로 부정확하게 검사결과

가 나올 수 있습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

편도 종물질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 뚜렷하지 않아서 답변을 정확하게 드리는 어렵네요. 이비인후과 선생님 말대로 해보श्य. 계속 커지는 것 같으면 제거를 고려하실 수 있습니다

제가 아픈곳이 현재 여러군데있는데 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발목 통증이 있으신가요? 통증의 원인에 따라 다를 수 있지만 약이 통증 완화에 도움이 될 수 있을 것으로 판단됩니다

피임약 야즈중단후 부정출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 야 3개월 드시다가 중단하면 다시 출혈이 있을 수 있습니다. 부작용때문에 중단하신거나 다시 드시지말고 경과를 지켜보श्य

목에 멸치 넘어갔을 때,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 지금 불편함이 없으시다고 하니 멸치가 무사히 식도를 통과 했을 것으로 추측이 됩니다. 안심하श्य도 괜찮을 것 같습니다.

목에 멸치 넘어갔을 때,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 지금 불편함이 없으시다고 하니 멸치가 무사히 식도를 통과 했을 것으로 추측이 됩니다. 안심하श्य도 괜찮을 것 같습니다.

외상후 스트레스 장애,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 지금 증상에 대하여 약물 치료를 하고 있는데도 증상이 심하면 약물을 조절할 수 있는 여지가 있는지 진료 받으시면서 상담해보श्य

이거 표피낭종? 종기? 터진거 잘 아물고 있는거 맞을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잘 아물고 있는 것으로 생각됩니다. 혹시 민음이 잘 안가거나 의심스러운 부분이 따로 있으신가요? 지시 받은대로 하श्य면 될것 같습니다

쇄골 위 안쪽을 누르면 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 누르지 않으면 불편한 증상이 없다면 그냥 두고 보श्य도 됩니다. 부위는 흉쇄유돌근이나 전사각근이 위치하는 곳이 아닌가 싶습니다

원인모를 복통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복통이 지속되는 경우에는 일상생활에서 다음과 같은 사항을 주의해야 합니다. 식습관 개선 자극적인 음식이나 기름진 음식은 피하고식이섬유가 풍부한 음식을 섭취하는 것이 좋습니다. 금주도 필요합니다 스트레스 관리 스트레스는 복통의 원인 중 하나이므로 스트레스를 적절히 관리하는 것이 중요합니다. 충분한 휴식 충분한 휴식을 취하여 몸의 피로를 해소하는 것이 좋습니다.

안구건조증 알려지상태에서 시력검사값,안녕하세요. 메디이즈입니다. ARK 값이 안좋게 나오다가 보다 눈이 정상상태일 때의 값이 나오지 않을 수 있습니다. 한마디로 부정확하게 검사결과가 나올 수 있습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

여자친구 임신 남자가 해야할일?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임을 하지 않은 채 질내사정을 하셨고 임신의 가능성이 높은 시기라는 것을 뒤늦게라도 아셨다면 지금이라도 임신여부를 확인하श्य야 합니다. 임신여부부터 확인하시고 말씀하신 일들에 대해 상담을 받으시는게 좋겠습니다.

여자친구 임신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 주신 정보와 증상만으로 임신여부를 알기 어렵으니 임신반응검사를 하श्य나 산부인과 진료를 받아보श्य는 것을 고려해보श्य요

도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정이 많으श्य지요. 어린나이에는 유방암이 발생하는 경우는 거의 없어요. 너무 걱정마श्य고 진료받아보श्य는것을 권합니다

팔 가려움증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 팔 가려움증은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 건조한 피부입니다. 건조한 피부는 피부 표면의 수분이 부족해져서 가려움을 유발합니다. 건조한 피부를 예방하기 위해서는 물을 충분히 마श्य고 보습제를 바르는 것이 좋습니다. 팔 가려움증의 다른 원인으로는 아토피 피부염 접촉성 피부염 습진 등이 있

습니다. 아토피 피부염은 유전적 요인과 환경적 요인에 의해 발생하는 만성 염증성 피부 질환입니다. 접촉성 피부염은 피부를 자극하는 물질에 접촉하여 발생하는 피부 질환입니다. 습진은 피부가 건조해지거나 염증이 생겨서 발생하는 피부 질환입니다. 팔 가려움증을 치료하기 위해서는 원인을 찾아야 합니다. 건조한 피부로 인한 가려움증은 보습제를 바르는 것으로 치료할 수 있습니다. 아토피 피부염 접촉성 피부염 습진 등은 병원에서 치료를 받아야 합니다. 팔 가려움증이 심한 경우에는 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 팔 가려움증의 원인을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다.

침삼킬때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 침삼킬 때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아프다면 인두염일 가능성이 있습니다. 인두염은 인두의 염증을 말합니다. 인두는 목구멍의 뒤쪽에 있는 기관으로 혀와 식도를 연결합니다. 인두염은 주로 바이러스 감염으로 발생합니다. 인두염의 증상은 목의 통증 기침 가래 발열 두통 피로감 등입니다. 인두염은 보통 12주 안에 자연적으로 치유됩니다. 하지만 증상이 심하거나 오래 지속되면 병원을 방문하여 치료를 받아야 합니다. 인두염을 예방하기 위해서는 손을 자주 씻고 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 또한 환기가 잘되는 곳에서 생활하고 과로를 피하는 것이 좋습니다. 침삼킬 때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아프다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 인두염을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다.

팔과 손 등 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 너무 무리한 신체활동으로 나타나는 증상이 의심됩니다. 따뜻한 목욕이나 반신욕 하시고 진통제를 드셔보시면 좋겠습니다. 찜질은 냉찜질이 좋을 것 같습니다

탄튬액 사용 후 인후통 악화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탄튬액은 인후염 치료에 사용되는 소염진통제입니다. 탄튬액은 인후의 통증을 완화시켜주지만 염증을 악화시킬 수 있습니다. 따라서 탄튬액을 과도하게 사용하거나 오랫동안 사용하면 인후염이 악화될 수 있습니다. 인후염이 심한 경우 탄튬액을 사용하는 대신 꿀을 섭취하는 것이 좋습니다. 꿀은 인후염을 완화시키는 효과가 있습니다. 또한 꿀은 항균 효과가 있어 인후염을 악화시키는 세균을 제거할 수 있습니다. 인후염이 심한 경우 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 인후염의 원인을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다. 인후염을 예방하기 위해서는 손을 자주 씻고 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 또한 환기가 잘되는 곳에서 생활하고 과로를 피하는 것이 좋습니다.

항문 안에 빨간색 혹이 있어요사진주의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 치핵을 의심할 수 있습니다. 치핵은 항문 내에 있는 혈관이 부풀어 오른 상태를 말합니다. 치핵은 치질이라고도 불립니다. 치핵은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있지만 가장 흔한 원인은 변비입니다. 변비로 인해 변이 딱딱해지면 항문을 통과할 때 항문 내에 있는 혈관이 압박을 받아 부풀어 오르게 됩니다. 치핵은 대부분 통증이 없습니다. 하지만 치핵이 커지거나 염증이 생기면 항문 통증이 발생할 수 있습니다. 또한 치핵이 탈출하면 항문에서 빨간색 혹이 나오는 증상이 나타날 수 있습니다. 치핵은 대부분 증상이 가벼워서 별다른 치료 없이 자연적으로 치유됩니다. 하지만 치핵이 심한 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 병원에 가서 진료를 받아보시기 바랍니다. 의사는 항문 검사를 통해 치핵을 진단할 수 있습니다. 또한 의사는 치핵의 크기와 위치 염증의 정도 등을 확인하기 위해 초음파 검사나 내시경 검사를 시행할 수 있습니다. 치핵은 대부분 별다른 치료 없이 자연적으로 치유됩니다. 하지만 치핵이 심한 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다.

따라서 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 병원에 가서 진료를 받아보시기 바랍니다.

항문 안에 빨간색 혹이 있어요사진주의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 치핵을 의심할 수 있습니다. 치핵은 항문 내에 있는 혈관이 부풀어 오른 상태를 말합니다. 치핵은 치질이라고도 불립니다. 치핵은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있지만 가장 흔한 원인은 변비입니다. 변비로 인해 변이 딱딱해지면 항문을 통과할 때 항문 내에 있는 혈관이 압박을 받아 부풀어 오르게 됩니다. 치핵은 대부분 통증이 없습니다. 하지만 치핵이 커지거나 염증이 생기면 항문 통증이 발생할 수 있습니다. 또한 치핵이 탈출하면 항문에서 빨간색 혹이 나오는 증상이 나타날 수 있습니다. 치핵은 대부분 증상이 가벼워서 별다른 치료 없이 자연적으로 치유됩니다. 하지만 치핵이 심한 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 병원에 가서 진료를 받아보시기 바랍니다. 의사는 항문 검사를 통해 치핵을 진단할 수 있습니다. 또한 의사는 치핵의 크기와 위치 염증의 정도 등을 확인하기 위해 초음파 검사나 내시경 검사를 시행할 수 있습니다. 치핵은 대부분 별다른 치료 없이 자연적으로 치유됩니다. 하지만 치핵이 심한 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. 따라서 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 병원에 가서 진료를 받아보시기 바랍니다.

항문속에 빨간색 혹이 보여요사진주의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상으로 항문 점막안에 무언가 있습니다. 의견대로 내치핵으로 보입니다. 통증의 원인이 될 수 있으며 항문 안의 상황도 알아야 하니 항문경 검사를 받아보시기 바랍니다.

잘 아물고 있는 건가요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다만 잘 아물고 있는 것으로 보입니다. 양치하실 때 주의하시고 일주일 뒤 치과에서 꼭 체크 받으시면 좋을 듯 합니다

가슴에 뭐가 났는데 뭔지 모르겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모양이 바뀌는 것 같으시다고요? 모양과 크기가 바뀌면 이상은 없는지 조직검사가 필요할 수 있습니다. 자꾸 신경쓰시면 제거도 고려해보셔요.. 그냥 점모반이 아닌가 싶습니다

속쓰림증상등통증같아요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 명치부 통증이 있다면 위장관 질환이나 담낭 질환을 감별해야 합니다. 증상이 지속된다면 위내시경과 복부 초음파 검사가 필요하므로 내과 진료를 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

오랜만에 소변검사를 받았는데 혈뇨 단백뇨가 둘 다 나왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈뇨와 단백뇨가 지속적으로 나오거나 이전보다 점점 양이나 정도가 늘어나고 있다고 하면 다시 검사 한번 더 해보고 원인을 찾는 추가 검사를 해보시는 것이 필요해 보입니다

명치쪽 답답함과 소화불량 설사가 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 위장염으로 보입니다. 수분 섭취를 충분히 해주시고 증상이 지속되거나 발열 복통의 악화가 있다면 약물 치료 및 검사가 필요하므로 내과 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

명치쪽 답답함과 소화불량 설사가 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 위장염으로 보입니다. 수분 섭취를 충분히 해주시고 증상이 지속되거나 발열 복통의 악화가 있다면 약물 치료 및 검사가 필요하므로 내과 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

생리 기간 길어짐,안녕하세요 요약 단순한 생리불순인지 질병에 의한 생리불순인지 확인해 봐야 합니다. 정상적인 생리 주기는 2138일 기간은 38일 하루 생리량은 2080ml입니다. 이 범위를 벗어나면 생리 불순이라고 합니다. 스트레스 갑작스러운 체중 증가감소 고강도의 과한 운동 신경성 식욕 부진 같은 섭식장애는 호르몬 분비에 영향을 줘 생리 주기를 변화시킬수 있는데 무배란자궁근종자궁내막암과 자궁경부암 같은 질환 갑상샘 기능 이상 같은 내분비계 장애가 원인이 될 수도 있습니다. 건승하세요

혈압이 왔다 갔다 하는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 수시로 오르락 내리락 하면서 변화합니다. 혈압의 일중변화 즉 하루 동안 혈압이 변동하는 데 영향을 미치는 주요 인자는 다음과 같습니다. 생체리듬체내 시계 혈압은 하루 중 특정 시간대에 가장 높고 가장 낮은 리듬을 보입니다. 일반적으로 아침 기상 직후가 최고치 야간 수면 시간이 최저치입니다. 활동 수준 활동량이 많아지면 혈압이 상승하고 휴식을 취하면 혈압이 하락합니다. 스트레스 업무 스트레스 정신적 긴장 등으로 인해 상황별로 혈압이 급격히 오를 수 있습니다. 식사 염분 과다 섭취 시 일시적으로 혈압이 상승합니다. 식후 23시간 내 최고치를 보입니다. 카페인 커피 차 콜라 등 카페인 함유 음료를 섭취하면 일시적으로 혈압이 상승합니다. 약물 일부 진통제 감기약 약물 등은 혈압에 영향을 미칠 수 있습니다. 운동 운동 시 일시적으로 혈압이 상승하지만 규칙적 운동은 전반적인 혈압 조절에 도움이 됩니다. 기온 변화 추위나 더위 등 기온 변화로 인해 일시적인 혈압 변동이 발생할 수 있습니다. 이처럼 다양한 생리적 환경적 요인들이 하루 동안 혈압의 변화 패턴에 영향을 주게 됩니다.

사타구니쪽 혹? 멍울이 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생긴지 얼마나 오래되었나요? 누르면 통증도 있나요? 얼마되지 않고 통증이 있으면 가정의학과 진료 받아보셔도 될것 같습니다

발목 인대쪽이 아픈데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 언급하신 약도 효과가 있습니다. 제가 처방하는 약과는 다르기는합니다. 써펜은 진통효과는 적은 해열제이며 가펜틴는 심한 신경통 리트릴은 신경안정을 주된 목적으로 사용합니다.

쇄골 위 안쪽을 누르면 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 누르지 않으면 불편한 증상이 없다면 그냥 두고 보셔도 됩니다. 부위는 흉쇄유돌근이나 전사각근이 위치하는 곳이 아닌가 싶습니다

치핵이 터졌습니다 어떻게하죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵치질은 크게 내치핵과 외치핵으로 구분하는데요. 내치핵은 심하면 수술을 해야하지만.. 질문하신분은 외치핵일 가능성이 높아보입니다. 외치핵은 보존요법온수좌욕 연고로도 치유가 잘되고.. 24주정도면 혈전파막지가 자연적으로 흡수되면서 좋아집니다. 보통 장기간 변기에 있거나 과도하게 힘줄때 발생하니... 좋아지더라도 재발 안되게 조심하시고요. 통증이 심해지거나 출혈이 좋아지지 않으면 항문외과 진료 보시길 바랍니다.

사타구니 혹? 멍울,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 임파선염 가능성이 높지만 경부 초음파를 확인하여 실제 림프절염인지 다른 병변인지 감별을 하는 것이 필요합니다. 림프절염이라면 항생제와 소염제 복용이 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

발바닥에 점 이있는데 약간 커지고 색이 진해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색 종과 같은 피부암 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

종아리 뒤 멍?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 압박스타킹을 신으면 종아리 근막이 압박되어 출혈이 생길 수 있습니다. 통증이 있으시면 초음파검사를 해보시는 것이 좋습니다. 감사합니다. 손톱이 반만 죽은 것 같아요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 불편한 증상이 남아있나요? 시간이 지나면서 새로운 손톱이 자라나올 것으로 생각됩니다. 손톱 뿌리부분을 다쳤다고하면 손톱이 밑게 날 수도 있습니다

후두근 경직 뭉침 있으면 어떻게 해야되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육이 뭉친 상황이라 이에 대한 진료가 필요하시다면 정형외과나 신경외과를 방문하여 해당 증상을 유발할만한

병적인 문제는 없는지를 확인받아보시고 특별한 문제가 없다면 증상에 대한 관리를 위해 말씀하신 의원들을 방문해보셔도 괜찮습니다.

쿠퍼액 임신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

가임기 첫날 질외사정 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기에 피임이 완벽하지 못했을 가능성이 있기 때문에 임신가능성을 얼마다 이야기하기 어렵지만 사후피임조치가 필요하다고 생각됩니다.

숨 불편함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 심부전과 같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 나이가 젊기 때문에 큰 질환일 가능성은 낮습니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

임신 가능성이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일부 연구에 의한 결과이고 실제로는 가임기 여부 등 고려해야 할 사항이 많아 임신 가능성은 이보다는 낮다고 판단됩니다.

손등에 상처가 끓는거 같은데 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손등에 상처가 끓는 것은 피부 감염이 발생한 것입니다. 피부 감염은 세균에 의해 발생하며 증상으로는 통증 붉은색 발적 부종 고름 등이 있습니다. 피부 감염이 발생하면 항생제 연고를 바르고 상처 부위를 깨끗하게 유지해야 합니다. 또한 손을 자주 씻고 상처에 물을 닿지 않도록 해야 합니다. 만약 상처가 심하거나 통증이 심하다면 병원에서 치료를 받아야 합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵 수술 후 출혈과 분비물 변실금 증상이 나타나는 것은 수술 후 정상적인 회복 과정으로 볼 수 있습니다. 출혈은 수술 부위의 혈관이 붓거나 염증이 생기면서 발생할 수 있으며 분비물은 수술 부위의 염증으로 인해 발생할 수 있습니다. 변실금은 수술 후 항문 근육이 약해지면서 발생할 수 있습니다. 수술 후 출혈과 분비물 변실금 증상은 보통 12개월 정도 지속되며 점차 사라집니다. 하지만 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

고혈당 후 저혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체중이 감소되면서 신체 혈당조절 과정에서 혼선이 빚어진걸로 생각됩니다. 비만을 치료하면 당뇨가 많이 좋아지는 것은 사실입니다. 꾸준히 비만치료를 하는 것이 많은 도움이 되고 그 과정에서 혈당의 기복이 심해진다면 복용중인 약제를 조절해야 합니다. 비만이던 시기에 먹던 약을 체중이 감소된 상태에서 그대로 먹게 되면 저혈당 같은 양상이 생길 수가 있습니다. 진료중인 병원을 방문해서 약을 조절받는 것이 좋을 것 같습니다.

복부동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부대동맥류가 있다고 해서 하지직거상을 하는게 딱히 문제가 되지는 않을듯합니다. 술 담배를 금하고 체중 조절 규칙적인 운동 등이 도움이 됩니다

소변 후 휴지에 분홍색 피비침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 부정출혈 등의 가능성도 있지만 혈뇨의 가능성도 있습니다. 증상 없는 혈뇨라면 경과관찰해도 될듯합니다

소변 후 휴지에 분홍색 피비침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 부정출혈 등의 가능성도 있지만 혈뇨의 가능성도 있습니다. 증상 없는 혈뇨라면 경과관찰해도 될듯합니다

파상풍을 유발하는 균은 알콜이나 세제로도 죽일 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파상풍은 파상풍균이 생산한 신경독소에 의해 발생합니다. 파상풍균은 흙이나 먼지 동물의 분변 등에 존재하며 녹슨 쇠나 오염된 흙이 옷이나 소지품에 닿아 파상풍균이 묻을 수 있습니다.

옷에 묻은 파상풍균이 기존의 상처나 점막에 닿아 감염될 가능성은 있지만 매우 낮습니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁을 하면 옷에 묻은 파상풍균이 대부분 제거됩니다. 물건에 묻은 경우 손소독제로 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다. 균으로 오염된 옷을 수건이나 다른 옷과 함께 세탁해도 되지만 가능하면 따로 세탁하는 것이 좋습니다. 파상풍을 예방하기 위해서는 상처가 났을 때 적절한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 상처가 났을 때는 상처 부위를 깨끗하게 소독하고 필요한 경우 파상풍 예방접종을 받는 것이 좋습니다. 야외활동을 할 때는 오염된 흙이나 먼지 등에 노출되지 않도록 주의해야 합니다. 파상풍을 유발하는 균은 혐기성 세균으로 산소가 없는 환경에서 번식합니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁이나 건조 등의 방법으로 제거할 수 있습니다. 알코올이나 세제로도 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다.

비뇨기와 의사선생님들께 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

얼굴 이상증세...피부염이 맞긴 한가요...?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 볼에만 열감 가려움 붉어짐 증세가 원형으로 생겼고 만져보면 단단하게 부어오르게 느껴지는 증상은 피부염일 가능성이 있습니다. 피부염은 피부 표면의 염증을 말하며 원인은 다양합니다. 피부염은 증상에 따라 치료 방법이 달라지므로 정확한 진단을 위해 피부과 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 대학병원에서 진료를 받아보는 것도 좋은 방법입니다.

새끼발톱 변색 무좀인가요 흑색종인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱이 짙은 갈색으로 변색하는 경우는 무좀이나 흑색종일 가능성이 있습니다. 무좀은 곰팡이 감염으로 발생하는 피부 질환으로 발톱이 두꺼워지고 갈색으로 변색되며 각질이 생길 수 있습니다. 흑색종은 피부암의 일종으로 피부색이 변색되며 딱딱한 덩어리가 생길 수 있습니다. 발톱이 변색된 경우 정확한 진단을 위해 피부과 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

프로로주사 부작용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골반이 불편하시군요. 프로로주사는 혈당하고는 관계가 없습니다. 본인은 프로로 주사를 맞는다고 알고계신데 혹시 스테로이드 주사를 맞으시는 것은 아닌지 문의해보시기 바랍니다. 그게 아니라면 주사를 맞는 스트레스때문에 약간 오를 수는 있습니다. 감사합니다.

코딱지 방지하면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코딱지는 콧속에서 먼지와 세균을 걸러내는 역할을 합니다. 코딱지를 방지하면 콧구멍이 넓어지는 것이 아니라 코딱지가 딱딱하게 굳어져서 코막힘이 생기거나 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 코딱지가 생기면 깨끗하게 제거하는 것이 좋습니다.

인대 파열,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인대 파열은 발목을 삐끗했을 때 발생하는 부상입니다. 인대가 파열되면 통증과 부종이 발생하며 움직일 때마다 불편함을 느낄 수 있습니다. 인대 파열은 보통 26주 정도 깁스를 하게 되며 이후에는 물리치료와 운동을 통해 회복합니다. 깁스를 한 채로 뛰어가면 인대가 더 많이 늘어나고 파열될 수 있습니다. 또한 인대가 파열된 부위에 압박이 가해지면 통증이 심해질 수 있습니다. 따라서 인대 파열이 있는 경우 반드시 깁스를 하고 깁스를 풀고 나서도 물리치료와 운동을 통해 인대를 강화해야 합니다.

경미한 뇌출혈? 도와주세요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌출혈은 뇌혈관이 터져서 뇌에 피가 고이는 질환입니다. 뇌출혈은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있습니다. 뇌출혈의 증상으로는 갑자기 한쪽 팔다리에 마비가 오거나 갑자기 말이 어눌

해지거나 갑자기 어지러워지거나 갑자기 쓰러지는 증상이 있습니다. 뇌출혈은 뇌의 어느 부위가 손상되었느냐에 따라 증상이 다르게 나타날 수 있습니다. 뇌출혈은 뇌의 혈관이 좁아지거나 막히는 뇌경색과는 다릅니다. 뇌경색은 뇌혈관이 좁아지거나 막혀서 뇌에 혈액이 공급되지 못하는 질환입니다. 뇌경색의 증상으로는 갑자기 한쪽 팔다리에 마비가 오거나 갑자기 말이 어눌해지거나 갑자기 어지러워지거나 갑자기 쓰러지는 증상이 있습니다. 뇌경색은 뇌의 어느 부위가 손상되었느냐에 따라 증상이 다르게 나타날 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 모두 뇌에 손상을 주는 질환이지만 증상이 다르고 치료 방법도 다릅니다. 뇌출혈은 응급 수술이 필요할 수 있지만 뇌경색은 혈전 용해제를 투여하거나 스텐트 시술을 하는 등 약물 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 모두 조기에 치료를 받아야 합병증을 예방할 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색을 예방하기 위해서는 고혈압 당뇨 고지혈증 등을 조절하고 흡연과 음주를 피하며 규칙적인 운동을 하는 것이 좋습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있으므로 평소에 건강 관리를 잘 하고 뇌출혈과 뇌경색의 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 말씀하신 증상은 뇌출혈의 증상과는 다릅니다. 뇌출혈은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있습니다. 말씀하신 증상은 뇌출혈의 증상과는 다르고 뇌출혈의 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

종아리 뒤 멍?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 압박스타킹을 신으면 종아리 근막이 압박되어 출혈이 생길 수 있습니다. 통증이 있으시면 초음파검사를 해보시는 것이 좋습니다. 감사합니다.

과식 후 호흡곤란,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식 후 호흡곤란은 역류성 식도염의 증상일 수 있습니다. 역류성 식도염은 위산이 식도로 역류하여 식도 점막에 염증을 일으키는 질환입니다. 역류성 식도염의 증상으로는 속쓰림 가슴 통증 목이 칼칼한 느낌 신물이 올라오는 느낌 과식 후 호흡곤란 등이 있습니다. 역류성 식도염은 생활습관을 개선하고 약물 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 생활습관 개선으로는 식사를 빨리 먹지 않고 식사 후 바로 눕지 않는 것이 좋습니다. 약물 치료로는 위산 분비를 억제하는 약물 위산을 중화시키는 약물 위산 역류를 막는 약물이 사용됩니다. 과식 후 호흡곤란이 심하거나 증상이 지속된다면 대학병원에서 정밀 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

전기 통함으로 생긴 통증으로 병원 갔는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근거가 있는 처방입니다. 신경안정제가 신경 관련된 통증에 대한 효과가 좋은 편이고 소염진통제의 효과가 적은 경우가 있습니다. 소염제 처방을 원하시면 보통은 원하시는대로 해드립니다.

성기기둥 곁피부 갈라지고 아픔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부과 내원하시면 정확한 진단 가능하므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

성기 갈라지듯이 상처나고 아픔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기에 피부염이 관찰되는 상황인데 이러한 피부염이 잘 낫지 않고 지속되는 경우에는 진료가 필요하겠습니다. 가까운 비뇨 의학과나 피부과를 방문하여 진료받고 치료받아보시기를 권해드립니다.

성기 갈라지듯이 상처나고 아픔,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기에 피부염이 관찰되는 상황인데 이러한 피부염이 잘 낫지 않고 지속되는 경우에는 진료가 필요하겠습니다. 가까운 비뇨 의학과나 피부과를 방문하여 진료받고 치료받아보시기를 권해드립니다.

약한 어지럼증이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약한 어지럼증이 3주째 지속되고 있다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 어지럼증은 다양한 원인으로 발생할 수 있는데 정확한 원인을 파악하고 적절한 치료를 받아야 합니다. 어지럼증의 원인으로는 귀 질환 뇌 질

환 혈관 질환 약물 부작용 등이 있습니다. 귀 질환으로는 메니에르병 전정신경염 등이 있습니다. 뇌 질환으로는 뇌졸중 뇌종양 등이 있습니다. 혈관 질환으로는 저혈압 고혈압 등이 있습니다. 약물 부작용으로는 항생제 항암제 등이 있습니다. 귀 질환은 이비인후과에서 진료를 받고 뇌 질환은 신경과에서 진료를 받고 혈관 질환은 순환기내과에서 진료를 받고 약물 부작용은 약물 처방을 한 의사에게 진료를 받아야 합니다. 어지럼증은 일상생활에 지장을 줄 수 있는 질환이기 때문에 증상이 지속되고 있다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

멍이 생겼는데 병원에 가봐야할지 궁금합니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금상처는 멍이라기보다는 어디에 부딪히거나 쓸린것이 아닌가 싶는데 최근에 그런 외상을 입은적이 있는지요? 파라딘점안액 얼마동안 써도 되나요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파딘은 스테로이드 안약은 아니고 알러지에 사용하는 항히스타민 성분의 안약입니다. 녹내장이나 백내장 등 스테로이드 안약의 합병증은 생기지 않고 안전하게 사용할 수 있는 약이니까 안심하시고 넣으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

이런 어지러움 원인 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럼증이 지속되어 여러 검사를 시행하신 상황이나 진단명을 찾기 어려운 상황이라 보입니다. 여러 진료과를 방문하고 검사를 시행해도 원인을 찾기 어려운 상황이라면 정신건강의학과의 진료가 필요한 상황일 가능성도 있습니다. 불안감이나 우울감 등의 원인이 신체적 증상을 유발하는 경우도 있기 때문입니다.

hvp 인유두종 관련해서요.. 질문있습니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요 문의해주신 내용에 대해 안내드리겠습니다. 결과만 보아서는 이전에 다른분으로 부터 전염 되었을 가능성이 높습니다

다리 붓기 안빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리를 다친지 2주 된 상황이고 아직 부종이다 빠지지 않으셨군요. 병원에서 인대의 염좌를 진단한 상황이라 보이는데 부종이 빠지지 않는다고 해서 발목을 못 쓰게 되는 것은 아닙니다. 다만 부종이 빠지는 데에는 상당한 시간이 소요되는 편입니다. 통증이 사라지고 일상생활이 가능해지면 천천히 재활운동 해보시면 됩니다.

팔 다리 힘 빠지고 가려운 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 팔과 다리에서 느껴지는 힘빠지는 느낌 가려운 느낌이 있고 힘이 빠지는 증상까지 동반되는 것 같습니다. 4주간 이러한 증상이 몸의 여기저기를 돌아가는 양상을 보이는 상황인데 신경과 관련된 불편함일 것임이 추정되거나 특정한 부위에 국한된 문제를 의심하긴 어렵습니다. 신경과 진료를 받아보시기를 권해드릴 수 있겠습니다.

멍이 생겼는데 병원에 가봐야할지 궁금합니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금상처는 멍이라기보다는 어디에 부딪히거나 쓸린것이 아닌가 싶는데 최근에 그런 외상을 입은적이 있는지요? 한쪽 귀만 뜨거운데 열은 안 나고 오히려 낮습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 감기기운이 좀 있으신것이 아닌가 싶습니다. 열이오르려고 할때나 오르고 있을때 한기를 좀 더 느낄 수 있습니다. 큰병같지는 않네요

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 따님이 눈맞춤 호명반응 상호작용이 잘 이루어지고 있어 자폐스펙트럼일 가능성은 떨어지고.. 언어발달지연 정도로만 있는거 같아보이네요 따님한테 지속적으로 관심을 가지고 평소 대화를 많이 가지려고 노력해주세요 언어 자극활동을 꾸준히 하시면 많은 도움이 될겁니다. 정확한 진찰을위해 소아과전문의 진료를 받아 보시기 바랍니다.

멍이 생겼는데 병원에 가봐야할지 궁금합니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금상처는 멍이라기보다는 어디에 부딪히거나 쓸린것이 아닌가 싶는데 최근에 그런 외상을 입은적이 있는지요?

시아에 잔상 안사라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안과에서 며칠전에 상기 검사를 다 하셨으면 다시 안과에 가보실 필요는 없어 보입니다. 시신경이나 뇌 문제로 잔상이 지속되는 증상은 거의 생기지는 않습니다. 다른 눈의 문제는 아닐거고요. 응급으로 시간을 다뤄서 진료를 해야 할 증상은 아닌듯 하니까 일단 조금 더 지켜보시는 게 나을 듯 합니다. 안과 검진을 다시 해보실 수는 있겠는데요 안과 검사에서 이상이 다시 발견되지는 않을 듯 하네요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

남자친구가hpv ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에 이미 감염되었거나 남자친구로부터 전염되는.. 두가지 경우 모두 다 가능합니다. HPV는 서로 다른 유형의 감염이 동시에 이루어지는 경우가 많습니다.

남자친구가hpv ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에 이미 감염되었거나 남자친구로부터 전염되는.. 두가지 경우 모두 다 가능합니다. HPV는 서로 다른 유형의 감염이 동시에 이루어지는 경우가 많습니다.

윤곽 주사 후 전자담배,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전자 담배도 혈관의 수축을 유발하므로 주사 제재에 의한 이상 반응이 나타날 수 있어 시술 후 1주일 간은 흡연을 피하는 것을 권합니다.

파라딘점안액 얼마동안 써도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파딘은 스테로이드 안약은 아니고 알러지에 사용하는 항히스타민 성분의 안약입니다. 녹내장이나 백내장 등 스테로이드 안약의 합병증은 생기지 않고 안전하게 사용할 수 있는 약이니까 안심하시고 넣으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

새끼발톱 변색 무좀인가요 흑색종인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱이 짙은 갈색으로 변색하는 경우는 무좀이나 흑색종일 가능성이 있습니다. 무좀은 곰팡이 감염으로 발생하는 피부 질환으로 발톱이 두꺼워지고 갈색으로 변색되며 각질이 생길 수 있습니다. 흑색종은 피부암의 일종으로 피부색이 변색되며 딱딱한 덩어리가 생길 수 있습니다. 발톱이 변색된 경우 정확한 진단을 위해 피부과 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

인대 파열,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인대 파열은 발목을 삐끗했을 때 발생하는 부상입니다. 인대가 파열되면 통증과 부종이 발생하며 움직일 때마다 불편함을 느낄 수 있습니다. 인대 파열은 보통 26주 정도 깁스를 하게 되며 이후에는 물리치료와 운동을 통해 회복합니다. 깁스를 한 채로 뛰어가면 인대가 더 많이 늘어나고 파열될 수 있습니다. 또한 인대가 파열된 부위에 압박이 가해지면 통증이 심해질 수 있습니다. 따라서 인대 파열이 있는 경우 반드시 깁스를 하고 깁스를 풀고 나서도 물리치료와 운동을 통해 인대를 강화해야 합니다.

코딱지 방치하면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코딱지는 콧속에서 먼지와 세균을 걸러내는 역할을 합니다. 코딱지를 방치하면 콧구멍이 넓어지는 것이 아니라 코딱지가 딱딱하게 굳어져서 코막힘이 생기거나 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 코딱지가 생기면 깨끗하게 제거하는 것이 좋습니다.

얼굴 이상증세...피부염이 맞긴 한가요...?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 볼에만 열감 가려움 붉어짐 증세가 원형으로 생겼고 만져보면 단단하게 부어오르게 느껴지는 증상은 피부염일 가능성이 있습니다. 피부염은 피부 표면의 염증을 말하며 원인은 다양합니다. 피부염은 증상에 따라 치료 방법이 달라지므로 정확한 진단을 위해 피부과 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 대학병원에서 진료를 받아보는 것도 좋은 방법입니다.

약 복용 생리불순,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리불순은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 약 복용도 생리불순의 원인이 될 수 있습니다. 특히 호르몬분비계 이상을 조절하는 약

을 복용할 경우 생리불순이 발생할 수 있습니다. 생리불순이 발생하면 생리 주기가 불규칙해지고 생리량이 많아지거나 적어질 수 있습니다. 또한 생리혈 덩어리가 생길 수 있습니다. 생리불순이 발생하면 산부인과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 생리불순의 원인을 파악하고 적절한 치료를 받아야 합니다. 생리불순은 대부분 치료가 가능하므로 너무 걱정하지 마세요.

경미한 뇌출혈? 도와주세요...안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌출혈은 뇌혈관이 터져서 뇌에 피가 고이는 질환입니다. 뇌출혈은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있습니다. 뇌출혈의 증상으로는 갑자기 한쪽 팔다리에 마비가 오거나 갑자기 말이 어눌해지거나 갑자기 어지러워지거나 갑자기 쓰러지는 증상이 있습니다. 뇌출혈은 뇌의 어느 부위가 손상되었느냐에 따라 증상이 다르게 나타날 수 있습니다. 뇌출혈은 뇌의 혈관이 좁아지거나 막히는 뇌경색과는 다릅니다. 뇌경색은 뇌혈관이 좁아지거나 막혀서 뇌에 혈액이 공급되지 못하는 질환입니다. 뇌경색의 증상으로는 갑자기 한쪽 팔다리에 마비가 오거나 갑자기 말이 어눌해지거나 갑자기 어지러워지거나 갑자기 쓰러지는 증상이 있습니다. 뇌경색은 뇌의 어느 부위가 손상되었느냐에 따라 증상이 다르게 나타날 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 모두 뇌에 손상을 주는 질환이지만 증상이 다르고 치료 방법도 다릅니다. 뇌출혈은 응급 수술이 필요할 수 있지만 뇌경색은 혈전 용해제를 투여하거나 스텐트 시술을 하는 등 약물 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 모두 조기에 치료를 받아야 합병증을 예방할 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색을 예방하기 위해서는 고혈압 당뇨 고지혈증 등을 조절하고 흡연과 음주를 피하며 규칙적인 운동을 하는 것이 좋습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있으므로 평소에 건강 관리를 잘 하고 뇌출혈과 뇌경색의 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 말씀하신 증상은 뇌출혈의 증상과는 다릅니다. 뇌출혈은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있습니다. 말씀하신 증상은 뇌출혈의 증상과는 다르고 뇌출혈의 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

과식 후 호흡곤란,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식 후 호흡곤란은 역류성 식도염의 증상일 수 있습니다. 역류성 식도염은 위산이 식도로 역류하여 식도 점막에 염증을 일으키는 질환입니다. 역류성 식도염의 증상으로는 속쓰림 가슴 통증 목이 칼칼한 느낌 신물이 올라오는 느낌 과식 후 호흡곤란 등이 있습니다. 역류성 식도염은 생활습관을 개선하고 약물 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 생활습관 개선으로는 식사를 빨리 먹지 않고 식사 후 바로 눕지 않는 것이 좋습니다. 약물 치료로는 위산 분비를 억제하는 약물 위산을 중화시키는 약물 위산 역류를 막는 약물이 사용됩니다. 과식 후 호흡곤란이 심하거나 증상이 지속된다면 대학병원에서 정밀 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

윤곽 주사 후 전자담배,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전자 담배도 혈관의 수축을 유발하므로 주사 제재에 의한 이상 반응이 나타날 수 있어 시술 후 1주일 간은 흡연을 피하는 것을 권합니다.

전기 충격으로 생긴 통증 약 처방 받았는데...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 신경통의 양상이라면 소염진통제보다는 신경안정제 계열의 진통제가 더 효과적일 수 있습니다. 담당의에게 문의해 보시기 바랍니다.

약한 어지럼증이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약한 어지럼증이 3주째 지속되고 있다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 어지럼증은 다양한 원인으로 발생할 수 있는데 정확한 원인을 파악하고 적절한 치료를 받아야 합니다. 어지럼증의 원인으로는 귀 질환 뇌 질

환 혈관 질환 약물 부작용 등이 있습니다. 귀 질환으로는 메니에르병 전정신경염 등이 있습니다. 뇌 질환으로는 뇌졸중 뇌종양 등이 있습니다. 혈관 질환으로는 저혈압 고혈압 등이 있습니다. 약물 부작용으로는 항생제 항암제 등이 있습니다. 귀 질환은 이비인후과에서 진료를 받고 뇌 질환은 신경과에서 진료를 받고 혈관 질환은 순환기내과에서 진료를 받고 약물 부작용은 약물 처방을 한 의사에게 진료를 받아야 합니다. 어지럼증은 일상생활에 지장을 줄 수 있는 질환이기 때문에 증상이 지속되고 있다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

프로로주사 부작용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골반이 불편하시군요. 프로로주사는 혈당하고는 관계가 없습니다. 본인은 프로로 주사를 맞는다고 알고계신데 혹시 스테로이드 주사를 맞으시는 것은 아닌지 문의해보시기 바랍니다. 그게 아니라면 주사를 맞는 스트레스때문에 약간 오를 수는 있습니다. 감사합니다.

프로로주사 부작용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골반이 불편하시군요. 프로로주사는 혈당하고는 관계가 없습니다. 본인은 프로로 주사를 맞는다고 알고계신데 혹시 스테로이드 주사를 맞으시는 것은 아닌지 문의해보시기 바랍니다. 그게 아니라면 주사를 맞는 스트레스때문에 약간 오를 수는 있습니다. 감사합니다.

전기 통함으로 생긴 통증으로 병원 갔는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근거가 있는 처방입니다. 신경안정제가 신경 관련된 통증에 대한 효과가 좋은 편이고 소염진통제의 효과가 적은 경우가 있습니다. 소염제 처방을 원하시면 보통은 원하시는대로 해드립니다.

시야에 잔상 안사라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안과에서 며칠전에 상기 검사를 다 하셨으면 다시 안과에 가보실 필요는 없어 보입니다. 시신경이나 뇌 문제로 잔상이 지속되는 증상은 거의 생기지는 않습니다. 다른 눈의 문제는 아닐거고요. 응급으로 시간을 다뺏아서 진료를 해야 할 증상은 아닌듯 하니까 일단 조금 더 지켜보시는 게 나을 듯 합니다. 안과 검진을 다시 해보실 수는 있겠는데요 안과 검사에서 이상이 다시 발견되지는 않을 듯 하네요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

시야에 잔상 안사라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에 검사에서 이상이 없었다면 당장 문제가 되는 광시증은 아닌 것으로 판단됩니다. 안과에서 권고 받은 것처럼 신경과 진료를 함께 보는 것이 좋겠습니다.

충치일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 맨끝에있는 치아가 뭔가 사이사이에 까매보여서 양치질을 했는데도 이러네요 판별하기 어려울까요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵지만 충치 일걸로 생각됩니다. 가까운 치과에 가서서 검사를 받아보세요

턱 길어짐 턱관절,안녕하세요. 메디이즈입니다. 7개월 전 현재 사진입니다. 작년까지 치아교정을 했고 발치도 했습니다. 현재 유지보조장치를 끼고 있습니다. 7개월 전에 비해서 턱뼈가 더 아래로 내려오고 턱 끝이 튀어나와 턱이 더 커진 것 같은데 어떻게 해야 하나요? 주걱턱 인가요? 부정교합 교정을 했기 때문에 부정교합은 아닙니다. 7개월동안 체중이 약 7키로정도 증가했는데 이것도 영향이 있을까요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다 성인이 되고 난 뒤에는 턱뼈가 자라는 경우는 거의 없다고 보시면 되구요 아마도 체중 증가에 따른 얼굴 변화나 씹는 습관에 따른 턱근육 변화 때문이 아닐까 생각 됩니다.

피부 당김 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부를 계속 당기면 피부가 늘어나거나 처질 수 있습니다. 피부는 탄력섬유에 의해 탄력을 유지하는데 피부를 계속 당기면 탄력섬유가 손상되어 피부가 늘어나거나 처지게 됩니다. 또한 피부를 계속 당기면 피부 세포가 손상되어 피부 노화가 촉진될 수 있습니다. 따라서 피부를 자주 당기거나 만지지 않는 것이 좋습니다

다. 만약 피부를 당기는 것이 불가피하다면 피부 손상을 최소화하기 위해 부드럽게 당기고 자주 당기지 않는 것이 좋습니다.

피부 당김 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부를 계속 당기면 피부가 늘어나거나 처질 수 있습니다. 피부는 탄력섬유에 의해 탄력을 유지하는데 피부를 계속 당기면 탄력섬유가 손상되어 피부가 늘어나거나 처지게 됩니다. 또한 피부를 계속 당기면 피부 세포가 손상되어 피부 노화가 촉진될 수 있습니다. 따라서 피부를 자주 당기거나 만지지 않는 것이 좋습니다. 만약 피부를 당기는 것이 불가피하다면 피부 손상을 최소화하기 위해 부드럽게 당기고 자주 당기지 않는 것이 좋습니다.

피부 속 탄력섬유 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부를 자주 당기거나 만지면 피부의 탄력이 감소할 수 있습니다. 피부의 탄력은 탄력섬유에 의해 결정되는데 피부를 자주 당기거나 만지면 탄력섬유가 손상될 수 있습니다. 탄력섬유가 손상되면 피부의 탄력이 감소하고 피부가 처지게 됩니다. 피부를 자주 당기거나 만지는 것은 단순히 물리적 자극으로 인해 피부가 처지게 되는 것은 아닙니다. 피부를 자주 당기거나 만지면 탄력섬유가 손상되어 피부가 처지게 됩니다. 피부를 자주 당기거나 만지면 탄력섬유가 손상될 수 있습니다. 탄력섬유가 손상되면 피부의 탄력이 감소하고 피부가 처지게 됩니다. 피부를 자주 당기거나 만지면 적은 힘이라도 자주 힘을 받게되면 탄력이 감소하게 됩니다. 피부 탄력을 유지하기 위해서는 피부를 자주 당기거나 만지지 않는 것이 좋습니다. 피부 탄력을 유지하기 위해서는 꾸준한 운동과 건강한 식습관을 유지하는 것이 좋습니다. 또한 피부 관리를 통해 피부를 건강하게 유지하는 것이 좋습니다.

갑작스런 가려움증에 감기약 복용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 트플로리딘 클르페니라민이 가려움에 도움이 될 수 있습니다 둘중하나를 선택하자면 케비 코프를 권합니다 슈페드린이 부작용이 다양합니다 건강하세요

전기 통함으로 생긴 통증으로 병원 갔는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근거가 있는 처방입니다. 신경안정제가 신경 관련된 통증에 대한 효과가 좋은 편이고 소염진통제의 효과가 적은 경우가 있습니다. 소염제 처방을 원하시면 보통은 원하시는대로 해드립니다.

임신 가능성이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일부 연구에 의한 결과이고 실제로는 가임기 여부 등 고려해야 할 사항이 많아 임신 가능성은 이보다는 낮다고 판단됩니다.

고혈당 후 저혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체중이 감소되면서 신체 혈당조절 과정에서 혼선이 빚어진걸로 생각합니다. 비만을 치료하면 당뇨가 많이 좋아지는 것은 사실입니다. 꾸준히 비만치료를 하는 것이 많은 도움이 되고 그 과정에서 혈당의 기복이 심해진다면 복용중인 약제를 조절해야 합니다. 비만이던 시기에 먹던 약을 체중이 감소된 상태에서 그대로 먹게 되면 저혈당 같은 양상이 생길 수가 있습니다. 진료중인 병원을 방문해서 약을 조절받는 것이 좋을 것 같습니다.

아 선생님 피부를 봤는데 이상 없어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콘센트 선을 밟고 전기가 흐르는 느낌을 받았다면 콘센트 선의 전류가 손가락에 흐른 것으로 생각합니다. 손가락에 전류가 흐르면 손가락의 내부 조직이 손상될 수 있습니다. 손가락의 내부 조직이 손상되면 피부에는 아무런 이상이 없지만 손가락이 아플 수 있습니다. 손가락이 아프다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 진료를 받으면 손가락의 내부 조직이 손상되었는지 확인할 수 있고 손가락의 내부 조직이 손상된 경우에는 적절한 치료를 받을 수 있습니다. 손가락의 내부 조직이 손상된 경우에는 손가락의 통증을 완화하는 약을 처방받을 수 있습니다.

다리 힘빠짐 조절,안녕하세요. 메디이즈입니다. 딱히 임상적으로 의미있는 상태는 아닐듯하나

신경이 눌린다거나 해서 나타난 증상일 수도 있어 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 신경 외과 진료 권유합니다.

약 복용 생리불순,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리불순은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 약 복용도 생리불순의 원인이 될 수 있습니다. 특히 호르몬분비계 이상을 조절하는 약을 복용할 경우 생리불순이 발생할 수 있습니다. 생리불순이 발생하면 생리 주기가 불규칙해지고 생리량이 많아지거나 적어질 수 있습니다. 또한 생리혈 덩어리가 생길 수 있습니다. 생리불순이 발생하면 산부인과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 생리불순의 원인을 파악하고 적절한 치료를 받아야 합니다. 생리불순은 대부분 치료가 가능하므로 너무 걱정하지 마세요.

경미한 뇌출혈? 도와주세요...안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌출혈은 뇌혈관이 터져서 뇌에 피가 고이는 질환입니다. 뇌출혈은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있습니다. 뇌출혈의 증상으로는 갑자기 한쪽 팔다리에 마비가 오거나 갑자기 말이 어눌해지거나 갑자기 어지러워지거나 갑자기 쓰러지는 증상이 있습니다. 뇌출혈은 뇌의 어느 부위가 손상되었느냐에 따라 증상이 다르게 나타날 수 있습니다. 뇌출혈은 뇌의 혈관이 좁아지거나 막히는 뇌경색과는 다릅니다. 뇌경색은 뇌혈관이 좁아지거나 막혀서 뇌에 혈액이 공급되지 못하는 질환입니다. 뇌경색의 증상으로는 갑자기 한쪽 팔다리에 마비가 오거나 갑자기 말이 어눌해지거나 갑자기 어지러워지거나 갑자기 쓰러지는 증상이 있습니다. 뇌경색은 뇌의 어느 부위가 손상되었느냐에 따라 증상이 다르게 나타날 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 모두 뇌에 손상을 주는 질환이지만 증상이 다르고 치료 방법도 다릅니다. 뇌출혈은 응급 수술이 필요할 수 있지만 뇌경색은 혈전 용해제를 투여하거나 스텐트 시술을 하는 등 약물 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 모두 조기에 치료를 받아야 합병증을 예방할 수 있습니다. 뇌출혈과 뇌경색을 예방하기 위해서는 고혈압 당뇨 고지혈증 등을 조절하고 흡연과 음주를 피하며 규칙적인 운동을 하는 것이 좋습니다. 뇌출혈과 뇌경색은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있으므로 평소에 건강 관리를 잘 하고 뇌출혈과 뇌경색의 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 말씀하신 증상은 뇌출혈의 증상과는 다릅니다. 뇌출혈은 갑자기 발생하는 경우가 많고 증상이 심해지면 사망에 이를 수 있습니다. 말씀하신 증상은 뇌출혈의 증상과는 다르고 뇌출혈의 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

턱 길어짐 턱관절,안녕하세요. 메디이즈입니다. 7개월 전 현재 사진입니다. 작년까지 치아교정을 했고 발치도 했습니다. 현재 유지보조장치를 끼고 있습니다. 7개월 전에 비해서 턱뼈가 더 아래로 내려오고 턱 끝이 튀어나와 턱이 더 커진 것 같은데 어떻게 해야 하나요? 주걱턱 인가요? 부정교합 교정을 했기 때문에 부정교합은 아닙니다. 7개월동안 체중이 약 7키로정도 증가했는데 이것도 영향이 있을까요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다 성인이 되고 난 뒤에는 턱뼈가 자라는 경우는 거의 없다고 보시면 되구요 아마도 체중 증가에 따라 얼굴 변화나 씹는 습관에 따른 턱근육 변화 때문이 아닐까 생각 됩니다.

과식 후 호흡곤란,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식 후 호흡곤란은 역류성 식도염의 증상일 수 있습니다. 역류성 식도염은 위산이 식도로 역류하여 식도 점막에 염증을 일으키는 질환입니다. 역류성 식도염의 증상으로는 속쓰림 가슴 통증 목이 칼칼한 느낌 신물이 올라오는 느낌 과식 후 호흡곤란 등이 있습니다. 역류성 식도염은 생활습관을 개선하고 약물 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 생활습관 개선으로는 식사를 빨리 먹지 않고 식사 후 바로 눕지 않는 것이 좋습니다. 약물 치료로는 위산 분비를 억제하는 약물 위산을 중화시키는 약물 위산

역류를 막는 약물이 사용됩니다. 과식 후 호흡곤란이 심하거나 증상이 지속된다면 대학병원에서 정밀 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

프로로주사 부작용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골반이 불편하시군요. 프로로주사는 혈당과는 관계가 없습니다. 본인은 프로로 주사를 맞는다고 알고계신데 혹시 스테로이드 주사를 맞으시는 것은 아닌지 문의해보시기 바랍니다. 그게 아니라면 주사를 맞는 스트레스때문에 약간 오를 수는 있습니다. 감사합니다.

파상풍을 유발하는 균은 알콜이나 세제로도 죽일 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파상풍은 파상풍균이 생산한 신경독소에 의해 발생합니다. 파상풍균은 흙이나 먼지 동물의 분변 등에 존재하며 녹슨 쇠나 오염된 흙이 옷이나 소지품에 닿아 파상풍균이 묻을 수 있습니다. 옷에 묻은 파상풍균이 기존의 상처나 점막에 닿아 감염될 가능성은 있지만 매우 낮습니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁을 하면 옷에 묻은 파상풍균이 대부분 제거됩니다. 물건에 묻은 경우 손소독제로 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다. 균으로 오염된 옷을 수건이나 다른 옷과 함께 세탁해도 되지만 가능하면 따로 세탁하는 것이 좋습니다. 파상풍을 예방하기 위해서는 상처가 났을 때 적절한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 상처가 났을 때는 상처 부위를 깨끗하게 소독하고 필요한 경우 파상풍 예방접종을 받는 것이 좋습니다. 야외활동을 할 때는 오염된 흙이나 먼지 등에 노출되지 않도록 주의해야 합니다. 파상풍을 유발하는 균은 혐기성 세균으로 산소가 없는 환경에서 번식합니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁이나 건조 등의 방법으로 제거할 수 있습니다. 알코올이나 세제로도 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다

파상풍을 유발하는 균은 알콜이나 세제로도 죽일 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파상풍은 파상풍균이 생산한 신경독소에 의해 발생합니다. 파상풍균은 흙이나 먼지 동물의 분변 등에 존재하며 녹슨 쇠나 오염된 흙이 옷이나 소지품에 닿아 파상풍균이 묻을 수 있습니다. 옷에 묻은 파상풍균이 기존의 상처나 점막에 닿아 감염될 가능성은 있지만 매우 낮습니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁을 하면 옷에 묻은 파상풍균이 대부분 제거됩니다. 물건에 묻은 경우 손소독제로 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다. 균으로 오염된 옷을 수건이나 다른 옷과 함께 세탁해도 되지만 가능하면 따로 세탁하는 것이 좋습니다. 파상풍을 예방하기 위해서는 상처가 났을 때 적절한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 상처가 났을 때는 상처 부위를 깨끗하게 소독하고 필요한 경우 파상풍 예방접종을 받는 것이 좋습니다. 야외활동을 할 때는 오염된 흙이나 먼지 등에 노출되지 않도록 주의해야 합니다. 파상풍을 유발하는 균은 혐기성 세균으로 산소가 없는 환경에서 번식합니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁이나 건조 등의 방법으로 제거할 수 있습니다. 알코올이나 세제로도 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다

고혈당 후 저혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체중이 감소되면서 신체 혈당조절 과정에서 혼선이 빚어진걸로 생각됩니다. 비만을 치료하면 당뇨가 많이 좋아지는 것은 사실입니다. 꾸준히 비만치료를 하는 것이 많은 도움이 되고 그 과정에서 혈당의 기복이 심해진다면 복용중인 약제를 조절해야 합니다. 비만이던 시기에 먹던 약을 체중이 감소된 상태에서 그대로 먹게 되면 저혈당 같은 양상이 생길 수가 있습니다. 진료중인 병원을 방문해서 약을 조절받는 것이 좋을 것 같습니다.

복부동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부대동맥류가 있다고 해서 하지직거상을 하는게

딱히 문제가 되지는 않을듯합니다. 술 담배를 금하고 체중 조절 규칙적인 운동 등이 도움이 됩니다

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵 수술 후 출혈과 분비물 변실금 증상이 나타나는 것은 수술 후 정상적인 회복 과정으로 볼 수 있습니다. 출혈은 수술 부위의 혈관이 붓거나 염증이 생기면서 발생할 수 있으며 분비물은 수술 부위의 염증으로 인해 발생할 수 있습니다. 변실금은 수술 후 항문 근육이 약해지면서 발생할 수 있습니다. 수술 후 출혈과 분비물 변실금 증상은 보통 12개월 정도 지속되며 점차 사라집니다. 하지만 증상이 심하거나 오래 지속된다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

이거 매독인가요? ?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 우선 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

목 졸림시 회복,안녕하세요. 메디이즈입니다. 목 졸림은 목을 압박하여 숨을 막는 행위로 질식사 위험이 있습니다. 12초 정도 목이 졸린 경우라면 뇌세포가 죽거나 목이 뺏뺏해지는 등의 후유증이 나타날 가능성은 낮습니다. 하지만 목 졸림은 심각한 스트레스를 유발할 수 있고 불안감이나 공포감을 느낄 수 있습니다. 따라서 목이 졸린 경우라면 가급적 병원을 찾아 진료를 받는 것이 좋습니다. 병원에서는 목 졸림으로 인한 후유증을 확인하고 스트레스를 해소할 수 있는 방법을 알려줄 수 있습니다.

소변 후 휴지에 분홍색 피비침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 부정출혈 등의 가능성도 있지만 혈뇨의 가능성도 있습니다. 증상 없는 혈뇨라면 경과관찰해도 될듯합니다

소변 후 휴지에 분홍색 피비침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 부정출혈 등의 가능성도 있지만 혈뇨의 가능성도 있습니다. 증상 없는 혈뇨라면 경과관찰해도 될듯합니다

손등에 상처가 꺾는거 같은데 어떻게 해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손등에 상처가 꺾는 것은 피부 감염이 발생한 것입니다. 피부 감염은 세균에 의해 발생하며 증상으로는 통증 붉은색 발적 부종 고름 등이 있습니다. 피부 감염이 발생하면 항생제 연고를 바르고 상처 부위를 깨끗하게 유지해야 합니다. 또한 손을 자주 씻고 상처에 물을 닿지 않도록 해야 합니다. 만약 상처가 심하거나 통증이 심하다면 병원에서 치료를 받아야 합니다.

파상풍을 유발하는 균은 알콜이나 세제로도 죽일 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 파상풍은 파상풍균이 생산한 신경독소에 의해 발생합니다. 파상풍균은 흙이나 먼지 동물의 분변 등에 존재하며 녹슨 쇠나 오염된 흙이 옷이나 소지품에 닿아 파상풍균이 묻을 수 있습니다. 옷에 묻은 파상풍균이 기존의 상처나 점막에 닿아 감염될 가능성은 있지만 매우 낮습니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁을 하면 옷에 묻은 파상풍균이 대부분 제거됩니다. 물건에 묻은 경우 손소독제로 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다. 균으로 오염된 옷을 수건이나 다른 옷과 함께 세탁해도 되지만 가능하면 따로 세탁하는 것이 좋습니다. 파상풍을 예방하기 위해서는 상처가 났을 때 적절한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 상처가 났을 때는 상처 부위를 깨끗하게 소독하고 필요한 경우 파상풍 예방접종을 받는 것이 좋습니다. 야외활동을 할 때는 오염된 흙이나 먼지 등에 노출되지 않도록 주의해야 합니다. 파상풍을 유발하는 균은 혐기성 세균으로 산소가 없는 환경에서 번식합니다. 파상풍균은 일반적으로 건조한 환경에서 쉽게 사멸하기 때문에 세탁이나 건조 등의 방법으로 제거할 수 있습니다. 알코올이나 세제로도 제거할 수 있지만 완벽하게 제거하기는 어렵습니다

영구치 결손 교정 결정 고민 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 영구치 결손은 치아의 정상적

인 기능을 유지하기 위해 교정을 하는 것이 좋습니다. 교정을 하지 않으면 유치가 빠진 자리에 치아가 들어오지 않아서 치열이 흐트러지고 돌출입이 심해질 수 있습니다. 또한 치아를 잇는 잇몸뼈가 흡수되어서 치아의 흔들림이 생길 수 있습니다. 교정은 부작용이 무섭고 불편하지만 치아의 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 치료입니다. 교정을 결정하기 전에 병원에서 상담을 받아보고 교정 치료의 장단점을 잘 고려해보시기 바랍니다.

얼굴 이상증세...피부염이 맞긴 한가요...?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 왼쪽 볼에만 열감 가려움 붉어짐 증세가 원형으로 생겼고 만져보면 단단하게 부어오르게 느껴지는 증상은 피부염일 가능성이 있습니다. 피부염은 피부 표면의 염증을 말하며 원인은 다양합니다. 피부염은 증상에 따라 치료 방법이 달라지므로 정확한 진단을 위해 피부과 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 대학병원에서 진료를 받아보는 것도 좋은 방법입니다.

저같은 경우는 음허화동인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음허화동은 음기가 허약해져서 열이 얼굴로 올라오는 증상을 말합니다. 과도한 자위는 음기를 소모시키기 때문에 음허화동이 발생할 수 있습니다. 하지만 음허화동은 얼굴에만 열이 나는 것이 아니라 몸 전체에 열이 나는 증상입니다. 따라서 얼굴에 열이 나는 것이 음허화동이라고 단정할 수는 없습니다. 정확한 진단을 위해서는 한방병원에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

새끼발톱 변색 무좀인가요 흑색종인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱이 짙은 갈색으로 변색하는 경우는 무좀이나 흑색종일 가능성이 있습니다. 무좀은 곰팡이 감염으로 발생하는 피부 질환으로 발톱이 두꺼워지고 갈색으로 변색되며 각질이 생길 수 있습니다. 흑색종은 피부암의 일종으로 피부색이 변색되며 딱딱한 덩어리가 생길 수 있습니다. 발톱이 변색된 경우 정확한 진단을 위해 피부과 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

코딱지 방지하면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코딱지는 콧속에서 먼지와 세균을 걸러내는 역할을 합니다. 코딱지를 방지하면 콧구멍이 넓어지는 것이 아니라 코딱지가 딱딱하게 굳어져서 코막힘이 생기거나 염증이 생길 수 있습니다. 따라서 코딱지가 생기면 깨끗하게 제거하는 것이 좋습니다.

인대 파열,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인대 파열은 발목을 삐끗했을 때 발생하는 부상입니다. 인대가 파열되면 통증과 부종이 발생하며 움직일 때마다 불편함을 느낄 수 있습니다. 인대 파열은 보통 26주 정도 깁스를 하게 되며 이후에는 물리치료와 운동을 통해 회복합니다. 깁스를 한 채로 뛰어가면 인대가 더 많이 늘어나고 파열될 수 있습니다. 또한 인대가 파열된 부위에 압박이 가해지면 통증이 심해질 수 있습니다. 따라서 인대 파열이 있는 경우 반드시 깁스를 하고 깁스를 풀고 나서도 물리치료와 운동을 통해 인대를 강화해야 합니다.

하지직거상운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지직거상운동은 복부근육을 강화시켜주고 혈액순환을 촉진시키는 운동입니다. 쿠션을 사용해서 허리를 편하게 하고 운동을 해도 복부에 힘이 들어가는 것은 어쩔 수 없는 부분입니다. 복부동맥류는 복부동맥이 좁아지거나 막히는 질환으로 하지직거상운동을 해도 복부동맥류에 지장이 없습니다. 오히려 하지직거상운동은 복부동맥류를 예방하는 데 도움이 됩니다.

항문속에 빨간색 혹이 보여요사진주의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상으로 항문 점막안에 무언가 있습니다. 의견대로 내치핵으로 보입니다. 통증의 원인이 될 수 있으며 항문 안의 상황도 알아야 하니 항문경 검사를 받아보시기 바랍니다.

사망판정후 살아나는거 이해가안됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확히 어떤 상황을 설명하시는지 모르겠지만 현재의 사망선언은 심전도를 통해 맥박이 없는것을 충분히 확인한 뒤에 이루어지기에 가능성은 없을듯합니다

임신 가능성이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일부 연구에 의한 결과이고 실제로는 가임기 여부 등 고려해야 할 사항이 많아 임신 가능성은 이보다는 낮다고 판단됩니다.

복부동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부대동맥류가 있다고 해서 하지직거상을 하는게 딱히 문제가 되지는 않을듯합니다. 술 담배를 금하고 체중 조절 규칙적인 운동 등이 도움이 됩니다

소변 후 휴지에 분홍색 피비침,안녕하세요. 메디이즈입니다. 단순 부정출혈 등의 가능성도 있지만 혈뇨의 가능성도 있습니다. 증상 없는 혈뇨라면 경과관찰해도 될듯합니다

목 졸림시 회복,안녕하세요. 메디이즈입니다. 목 졸림은 목을 압박하여 숨을 막는 행위로 질식사 위험이 있습니다. 12초 정도 목이 졸린 경우라면 뇌세포가 죽거나 목이 뺏뺏해지는 등의 후유증이 나타날 가능성은 낮습니다. 하지만 목 졸림은 심각한 스트레스를 유발할 수 있고 불안감이나 공포감을 느낄 수 있습니다. 따라서 목이 졸린 경우라면 가급적 병원을 찾아 진료를 받는 것이 좋습니다. 병원에서는 목 졸림으로 인한 후유증을 확인하고 스트레스를 해소할 수 있는 방법을 알려줄 수 있습니다.

고혈당 후 저혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체중이 감소되면서 신체 혈당조절 과정에서 혼선이 빚어진걸로 생각됩니다. 비만을 치료하면 당뇨가 많이 좋아지는 것은 사실입니다. 꾸준히 비만치료를 하는 것이 많은 도움이 되고 그 과정에서 혈당의 기복이 심해진다면 복용중인 약제를 조절해야 합니다. 비만이던 시기에 먹던 약을 체중이 감소된 상태에서 그대로 먹게 되면 저혈당 같은 양상이 생길 수가 있습니다. 진료중인 병원을 방문해서 약을 조절받는 것이 좋을 것 같습니다.

다리 힘빠짐 조절,안녕하세요. 메디이즈입니다. 딱히 임상적으로 의미있는 상태는 아닐듯하나 신경이 눌린다거나 해서 나타난 증상일 수도 있어 증상이 지속되거나 악화된다면 가까운 신경외과 진료 권유합니다.

경구피임약 복용 중 착상혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 용량과 복용법을 잘 지켜서 드셨다고 하면 임신의 가능성은 거의 없다고 생각됩니다. 착상혈은 임상적으로 부정출혈과 구별은 어렵습니다. 크게 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다.

하지직거상운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지직거상운동은 복부근육을 강화시켜주고 혈액순환을 촉진시키는 운동입니다. 쿠션을 사용해서 허리를 편하게 하고 운동을 해도 복부에 힘이 들어가는 것은 어쩔 수 없는 부분입니다. 복부동맥류는 복부동맥이 좁아지거나 막히는 질환으로 하지직거상운동을 해도 복부동맥류에 지장이 없습니다. 오히려 하지직거상운동은 복부동맥류를 예방하는 데 도움이 됩니다.

수면장애에대해 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동강도를 조금 높여보셔요. 그래서 깊은 수면이 늘어나고 어지럼증이 좋아지면 수면의 질이 좋지 않아서 그런것일 수 있습니다

수면장애에대해 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동강도를 조금 높여보셔요. 그래서 깊은 수면이 늘어나고 어지럼증이 좋아지면 수면의 질이 좋지 않아서 그런것일 수 있습니다

상악동 거상술 빼이식 후 실밥 풀림 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상악동 수술한지 4일차인데 실밥이 너무 허를 찢어서 가위로 조금 자르려고 라다가 좀 많이 풀렸는데 괜찮을 까요? 풀릴때 밑에 하얀 막이 뭐가 들리는 기분이었는데 다시 병원가서 실로 꼬매야 할 까요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다. 치료 받으신 치과에 가서서 검사를 받아보세요.

귀두에 점 같은게 있는데 뭔지아시나요? 제발 답변 부탁드립니다 ,안녕하세요 요약 1. 마찰로 자극을 자주 받으면 2. 멜라닌 색소들의 침착이 생길 수 있습니다. 3. 색소 침착은 특별한 질환이나 문제가 있다는 증거는 아닙니다. 건승하세요

점빠고 색소침착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 듀덤을 붙인 상태에서는 듀덤이 자외선을 차단해줄 수 있으니 추가적으로 자외선 차단 조치가 필요없을것 같습니다. 회복되면 듀덤 떼고 바르시면 됩니다

팔 가려움증 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 바르는 스테로이드와 먹는약을 처방해 주실것으로 생각됩니다. 약은 항히스타민제 가려움이 심하면 스테로이드포함 가능합니다

편평사마귀일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀 드리기 조심스럽네요.제가 보기에는 편평사마귀가 아닌가 싶은데 번지는 경향이 있으면 제거가 필요할 것 같습니다.

속쓰림증상등통증같아요...안녕하세요. 메디이즈입니다. 명치부 통증이 있다면 위장관 질환이나 담낭 질환을 감별해야 합니다. 증상이 지속된다면 위내시경과 복부 초음파 검사가 필요하므로 내과 진료를 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

가슴에 뭐가 났는데 뭔지 모르겠습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 모양이 바뀌는 것 같으시да구요? 모양과 크기가 바뀌면 이상은 없는지 조직검사가 필요할 수 있습니다. 자꾸 신경쓰이시면 제거도 고려해보셔요.. 그냥 점모반이 아닌가 싶습니다

옴 진드기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옴이 사람한테 떨어지고 이불에 남겨져 있는 상태이면 72시간 놔두기만 하면 대부분 다 죽습니다. 그래도 고온60도 이상에 세탁하는게 가장 효과적입니다. 요가매트에는 붙어 있을 가능성은 낮지만.. 가능하면 빠는게 좋겠습니다.

주사피부염 초기 진단 받았는데 약 좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단은 처방해주신 약을 바르면서 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다. 혹시라도 효과가 없어 더 심해지거나하면 약물변경이 필요할 수 있습니다

프록사신바이정 먹고 머리가 멍해질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프록바이정은 호흡기감염증 인후감염 요로감염증 임질 위장관감염증 등에 사용되는 항생제입니다. 해당 의약품 복용한 후에 머리가 멍해지는 등의 부작용이 나타날 수 있다고 합니다. 부작용은 개인차가 있을 수 있습니다

운동시 최대심박수 넘으면 어떻게 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최대심박수는 개인차가 있기때문에.. 꼭 공식에 엄매일 필요는 없습니다. 부정맥같은 심장질환 있는 분한테는 의미가 있겠지만 건강한 상태에서는 크게 의미를 둘 필요는 없습니다. 심박수가 빠르게 회복하고 안정시 심박수도 정상이니 현재 아주 건강한 상태로 보입니다.

명치쪽 답답함과 소화불량 설사가 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 위장염으로 보입니다. 수분 섭취를 충분히 해주시고 증상이 지속되거나 발열 복통의 악화가 있다면 약물 치료 및 검사가 필요하므로 내과 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

생리 기간 길어짐,안녕하세요 요약 단순한 생리불순인지 질병에 의한 생리불순인지 확인해 봐야 합니다. 정상적인 생리 주기는 2138일 기간은 38일 하루 생리량은 2080ml입니다. 이 범위를 벗어나면 생리 불순이라고 합니다. 스트레스 갑작스러운 체중 증가감소 고강도의 과한 운동 신경성 식욕 부진 같은 섭식장애는 호르몬 분비에 영향을 줘 생리 주기를 변화시킬수 있는데 무배란자궁근종자궁내막암과 자궁경부암 같은 질환 갑상샘 기능 이상 같은 내분비계 장애가 원인이 될 수도 있습니다. 건승하세요

생리 기간 길어짐,안녕하세요 요약 단순한 생리불순인지 질병에 의한 생리불순인지 확인해 봐야 합니다. 정상적인 생리 주기는 2138일 기간은 38일 하루 생리량은 2080ml입니다. 이

범위를 벗어나면 생리 불순이라고 합니다. 스트레스 갑작스러운 체중 증가감소 고강도의 과한 운동 신경성 식욕 부진 같은 섭식장애는 호르몬 분비에 영향을 줘 생리 주기를 변화시킬수 있는데 무배란자궁근종자궁내막암과 자궁경부암 같은 질환 갑상샘 기능 이상 같은 내분비계 장애가 원인이 될 수도 있습니다. 건승하세요

오랜만에 소변검사를 받았는데 혈뇨 단백뇨가 둘 다 나왔습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈뇨와 단백뇨가 지속적으로 나오거나 이전보다 점점 양이나 정도가 늘어나고 있다고 하면 다시 검사한번 더 해보고 원인을 찾는 추가 검사를 해보시는 것이 필요해 보입니다

곤지름 의심...안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름을 이전에 앓은적이 있으셔서 곤지름 걱정을 많이 하시는것인가요? 조직검사로 확인해보시는 것이 좋을 것 같습니다

남성 성기 두드러기?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 선명하지는 않아서 정확한 답변은 어렵지만 모공이 도드라지게 보이는 임상적으로 의미는 없는 구진성 병변이 아닌가 싶습니다. 흑색종 일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱아래 멍이 든것이 아닌가 싶습니다. 시간이 지나면서 더 진해지거나 심해지는것 같으면 피부과 진료가 필요할 수 있습니다

혈압이 왔다 갔다 하는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 수시로 오르락 내리락 하면서 변화합니다. 혈압의 일중변화 즉 하루 동안 혈압이 변동하는 데 영향을 미치는 주요 인자는 다음과 같습니다 생체리듬체내 시계 혈압은 하루 중 특정 시간대에 가장 높고 가장 낮은 리듬을 보입니다. 일반적으로 아침 기상 직후가 최고치 야간 수면 시간이 최저치입니다. 활동 수준 활동량이 많아지면 혈압이 상승하고 휴식을 취하면 혈압이 하락합니다. 스트레스 업무 스트레스 정신적 긴장 등으로 인해 상황별로 혈압이 급격히 오를 수 있습니다. 식사 염분 과다 섭취 시 일시적으로 혈압이 상승합니다. 식후 23시간 내 최고치를 보입니다. 카페인 커피 차 콜라 등 카페인 함유 음료를 섭취하면 일시적으로 혈압이 상승합니다. 약물 일부 진통제 감기약 약물 등은 혈압에 영향을 미칠 수 있습니다. 운동 운동 시 일시적으로 혈압이 상승하지만 규칙적 운동은 전반적인 혈압 조절에 도움이 됩니다. 기온 변화 추위나 더위 등 기온 변화로 인해 일시적인 혈압 변동이 발생할 수 있습니다. 이처럼 다양한 생리적 환경적 요인들이 하루 동안 혈압의 변화 패턴에 영향을 주게 됩니다.

사타구니 혹? 명을,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 임파선염 가능성이 높지만 경부 초음파를 확인하여 실제 림프절염인지 다른 병변인지 감별을 하는 것이 필요합니다. 림프절염이라면 항생제와 소염제 복용이 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

사타구니 혹? 명을,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 임파선염 가능성이 높지만 경부 초음파를 확인하여 실제 림프절염인지 다른 병변인지 감별을 하는 것이 필요합니다. 림프절염이라면 항생제와 소염제 복용이 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

사타구니쪽 혹? 명을이 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생긴지 얼마나 오래되셨나요? 누르면 통증도 있나요? 얼마되지 않고 통증이 있으면 가정의학과 진료 받아보셔도 될것 같습니다

귀두 색이 변한거 같아요. 답변부탁드립니다,안녕하세요 요약 1. 마찰로 자극을 자주 받으면 2. 멜라닌 색소들의 침착이 생길 수 있습니다. 3. 색소 침착은 특별한 질환이나 문제가 있다는 증거는 아닙니다. 건승하세요

추가적으로 말씀 드리면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크기가 손바닥 크기정도 되면 굉장히 큰 것 같습니다. 일반외과 진료 받아보시는 것이 좋을 것으로 생각됩니다. 종기가 생긴것이 아닌가 싶네요

치핵이 터졌습니다 어떻게하죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵치질은 크게 내치핵과 외치

핵으로 구분하는데요. 내치핵은 심하면 수술을 해야하지만.. 질문하신분은 외치핵일 가능성이 높아보입니다. 외치핵은 보존요법온수좌욕 연고로도 치유가 잘되고.. 24주정도면 혈전피딱지가 자연적으로 흡수되면서 좋아집니다. 보통 장기간 변기에 있거나 과도하게 힘줄때 발생하니... 좋아지더라도 재발 안되게 조심하시고요. 통증이 심해지거나 출혈이 좋아지지 않으면 항문외과 진료 보시길 바랍니다.

충치일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 맨끝에있는 치아가 뭔가 사이사이에 까매보여서 양치질을 했는데도 이러네요 판별하기 어려울까요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵지만 충치 일걸로 생각합니다. 가까운 치과에 가서서 검사를 받아보세요

해당 사진이 구강유두종 구강암일 수 있는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위2개 사진은 이하선이라고 부르는 귀밑샘의 구멍 입니다. 맨아래사진은 턱밑샘의 침이 나오는 구멍입니다. 걱정하지않으셔도 됩니다. 구강유두종이나 구강암은 아닙니다

방금 발바닥점때문에 질문한 사람입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 작은 점이며 모양이 악성을 시사하지 않아 좀 더 지켜보아도 크게 문제는 되지 않을 것으로 판단됩니다. 도움이 되었기를 바랍니다.

임신 가능성이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일부 연구에 의한 결과이고 실제로는 가임기 여부 등 고려해야 할 사항이 많아 임신 가능성은 이보다는 낮다고 판단됩니다.

금연 후 심혈관계 회복 기간,안녕하세요. 메디이즈입니다. 금연 후 심혈관계의 회복 기간은 다 음과 같습니다 20분 후 혈압과 맥박이 정상으로 돌아옵니다. 12시간 후 혈액 속 일산화탄소 수치가 정상 수준으로 내려갑니다. 212주 후 혈액순환이 개선되기 시작합니다. 19개월 후 폐 기능이 향상되고 기침가래 등의 증상이 개선됩니다. 1년 후 관상동맥 질환 위험이 절반으로 감소합니다. 5년 후 뇌졸중 위험이 비흡연자 수준으로 떨어집니다. 10년 후 폐암 위험이 비흡연자 수준으로 감소합니다. 15년 후 관상동맥 질환으로 인한 심장마비 또는 사망 위험이 비흡연자 수준으로 감소합니다.

옴 진드기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옴이 사람한테 떨어지고 이불에 남겨져 있는 상태이면 72시간 놔두기만 하면 대부분 다 죽습니다. 그래도 고온60도 이상에 세탁하는게 가장 효과적입니다. 요가매트에는 붙어 있을 가능성은 낮지만.. 가능하면 빠는게 좋겠습니다.

방금 발바닥점때문에 질문한 사람입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 작은 점이며 모양이 악성을 시사하지 않아 좀 더 지켜보아도 크게 문제는 되지 않을 것으로 판단됩니다. 도움이 되었기를 바랍니다.

발바닥에 점이 있는데 색이 진해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종과 같은 피부암 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

발바닥에 점 이있는데 약간 커지고 색이 진해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종과 같은 피부암 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

발바닥에 점 이있는데 약간 커지고 색이 진해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종과 같은 피부암 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

프록사신바이정이 안전한 약인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시프로플로사신 성분의 항생

제로 페럼 요로감염 장염 등에 흔히 처방됩니다. 심한 부작용은 없는 약으로 18세 미만에서는 사용을 할 수 없습니다.

주사피부염 초기 진단 받았는데 약 좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단은 처방해주신 약을 바르면서 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다. 혹시라도 효과가 없어 더 심해지거나하면 약물변경이 필요할 수 있습니다

손톱이 반만 죽은 것 같아요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 불편한 증상이 남아있나요? 시간이 지나면서 새로운 손톱이 자라나올 것으로 생각합니다. 손톱 뿌리부분을 다쳤다고하면 손톱이 밑게 날 수도 있습니다

고혈당 후 저혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체중이 감소되면서 신체 혈당조절 과정에서 혼선이 빚어진걸로 생각합니다. 비만을 치료하면 당뇨가 많이 좋아지는 것은 사실입니다. 꾸준히 비만치료를 하는 것이 많은 도움이 되고 그 과정에서 혈당의 기복이 심해진다면 복용중인 약제를 조절해야 합니다. 비만이던 시기에 먹던 약을 체중이 감소된 상태에서 그대로 먹게 되면 저혈당 같은 양상이 생길 수가 있습니다. 진료중인 병원을 방문해서 약을 조절받는 것이 좋을 것 같습니다.

종아리 뒤 멍?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 압박스타킹을 신으면 종아리 근막이 압박되어 출혈이 생길 수 있습니다. 통증이 있으시면 초음파검사를 해보시는 것이 좋습니다. 감사합니다.

종아리 뒤 멍?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 압박스타킹을 신으면 종아리 근막이 압박되어 출혈이 생길 수 있습니다. 통증이 있으시면 초음파검사를 해보시는 것이 좋습니다. 감사합니다.

쿠퍼액 임신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

선생님 급해요 감전사고인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의미있는 감전이 일어났다면 증상이 있을 가능성이 매우 높습니다. 현재 상기 상황으로 볼 때는 의미있는 감전은 발생하지 않은 것으로 보입니다.

남성 성기 두드러기?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 선명하지는 않아서 정확한 답변은 어렵지만 모공이 도드라지게 보이는 임상적으로 의미는 없는 구진성 병변이 아닌가 싶습니다. 혈압이 왔다 갔다 하는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 수시로 오르락 내리락 하면서 변화합니다. 혈압의 일중변화 즉 하루 동안 혈압이 변동하는 데 영향을 미치는 주요 인자는 다음과 같습니다 생체리듬체내 시계 혈압은 하루 중 특정 시간대에 가장 높고 가장 낮은 리듬을 보입니다. 일반적으로 아침 기상 직후가 최고치 야간 수면 시간이 최저치입니다. 활동 수준 활동량이 많아지면 혈압이 상승하고 휴식을 취하면 혈압이 하락합니다. 스트레스 업무 스트레스 정신적 긴장 등으로 인해 상황별로 혈압이 급격히 오를 수 있습니다. 식사 염분 과다 섭취 시 일시적으로 혈압이 상승합니다. 식후 23시간 내 최고치를 보입니다. 카페인 커피 차 콜라 등 카페인 함유 음료를 섭취하면 일시적으로 혈압이 상승합니다. 약물 일부 진통제 감기약 약물 등은 혈압에 영향을 미칠 수 있습니다. 운동 운동 시 일시적으로 혈압이 상승하지만 규칙적 운동은 전반적인 혈압 조절에 도움이 됩니다. 기온 변화 추위나 더위 등 기온 변화로 인해 일시적인 혈압 변동이 발생할 수 있습니다. 이처럼 다양한 생리적 환경적 요인들이 하루 동안 혈압의 변화 패턴에 영향을 주게 됩니다.

충치일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 맨끝에있는 치아가 뭔가 사이사이에 까때보여서 양치질을 했는데도 이러네요 판별하기 어려울까요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵지만 충치 일걸로 생각합니다. 가까운 치과에 가서서 검사를 받아보세요

추가적으로 말씀 드리면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크기가 손바닥 크기정도 되면 굉장히 큰 것 같습니다. 일반외과 진료 받아보시는 것이 좋을 것으로 생각합니다. 종기가 생긴것이 아닌 가 싶네요

운동시 최대심박수 넘으면 어떻게 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최대심박수는 개인차가 있기때문에.. 꼭 공식에 얽매일 필요는 없습니다. 부정맥같은 심장질환 있는 분한테는 의미가 있겠지만 건강한 상태에서는 크게 의미를 둘 필요는 없습니다. 심박수가 빠르게 회복하고 안정시 심박수도 정상이니 현재 아주 건강한 상태로 보입니다.

프록사신바이정 먹고 머리가 멍해질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프록바이정은 호흡기감염증 인후감염 요로감염증 임질 위장관감염증 등에 사용되는 항생제입니다. 해당 의약품 복용한 후에 머리가 멍해지는 등의 부작용이 나타날 수 있다고 합니다. 부작용은 개인차가 있을 수 있습니다

발바닥에 점 이있는데 약간 커지고 색이 진해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색 종과 같은 피부암 가능성이 높아 보이지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손톱이 반만 죽은 것 같아요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 불편한 증상이 남아있나요? 시간이 지나면서 새로운 손톱이 자라나올 것으로 생각합니다. 손톱 뿌리부분을 다쳤다고하면 손톱이 밑에 날 수도 있습니다

해당 사진이 구강유두종 구강암일 수 있는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위2개 사진은 이하선이라고 부르는 귀밑샘의 구멍 입니다. 맨아래사진은 턱밑샘의 침이 나오는 구멍입니다. 걱정하지않으셔도 됩니다. 구강유두종이나 구강암은 아닙니다

임신 가능성이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일부 연구에 의한 결과이고 실제로는 가임기 여부 등 고려해야 할 사항이 많아 임신 가능성은 이보다는 낮다고 판단됩니다.

치핵이 터졌습니다 어떻게하죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵치질은 크게 내치핵과 외치핵으로 구분하는데요. 내치핵은 심하면 수술을 해야하지만.. 질문하신분은 외치핵일 가능성이 높아보입니다. 외치핵은 보존요법온수좌욕 연고로도 치유가 잘되고.. 24주정도면 혈전피막지가 자연적으로 흡수되면서 좋아집니다. 보통 장기간 변기에 있거나 과도하게 힘줄때 발생하니... 좋아지더라도 재발 안되게 조심하시고요. 통증이 심해지거나 출혈이 좋아지지 않으면 항문외과 진료 보시길 바랍니다.

숨 불편함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 심부전과 같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 나이가 젊기 때문에 큰 질환일 가능성은 낮습니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

금연 후 심혈관계 회복 기간,안녕하세요. 메디이즈입니다. 금연 후 심혈관계의 회복 기간은 다음과 같습니다 20분 후 혈압과 맥박이 정상으로 돌아옵니다. 12시간 후 혈액 속 일산화탄소 수치가 정상 수준으로 내려갑니다. 212주 후 혈액순환이 개선되기 시작합니다. 19개월 후 폐 기능이 향상되고 기침가래 등의 증상이 개선됩니다. 1년 후 관상동맥 질환 위험이 절반으로 감소합니다. 5년 후 뇌졸중 위험이 비흡연자 수준으로 떨어집니다. 10년 후 폐암 위험이 비흡연자 수준으로 감소합니다. 15년 후 관상동맥 질환으로 인한 심장마비 또는 사망 위험이 비흡연자 수준으로 감소합니다.

가임기 첫날 질외사정 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기에 피임이 완벽하지 못했을 가능성

이 있기 때문에 임신가능성을 얼마나 이야기하기 어렵지만 사후피임조치가 필요하다고 생각합니다.

발바닥에 점이 있는데 색이 진해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종과 같은 피부암 가능성이 높아 보이지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

경구피임약 복용 중 착상혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 용량과 복용법을 잘 지켜서 드셨다고 하면 임신의 가능성은 거의 없다고 생각합니다. 착상혈은 임상적으로 부정출혈과 구별은 어렵습니다. 크게 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다.

경구피임약 복용 중 착상혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 용량과 복용법을 잘 지켜서 드셨다고 하면 임신의 가능성은 거의 없다고 생각합니다. 착상혈은 임상적으로 부정출혈과 구별은 어렵습니다. 크게 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다.

프록사신바이정이 안전한 약인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시프로플로사신 성분의 항생제로 폐렴 요로감염 장염 등에 흔히 처방됩니다. 심한 부작용은 없는 약으로 18세 미만에서는 사용을 할 수 없습니다.

선생님 급해요 감전사고인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의미있는 감전이 일어났다면 증상이 있을 가능성이 매우 높습니다. 현재 상기 상황으로 볼 때는 의미있는 감전은 발생하지 않은 것으로 보입니다.

가임기 첫날 질외사정 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기에 피임이 완벽하지 못했을 가능성이 있기 때문에 임신가능성을 얼마나 이야기하기 어렵지만 사후피임조치가 필요하다고 생각합니다.

쿠퍼액 임신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

숨 불편함 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 심부전과 같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 나이가 젊기 때문에 큰 질환일 가능성은 낮습니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

옴 진드기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옴이 사람한테 떨어지고 이불에 남겨져 있는 상태이면 72시간 놔두기만 하면 대부분 다 죽습니다. 그래도 고온60도 이상에 세탁하는게 가장 효과적입니다. 요가매트에는 붙어 있을 가능성은 낮지만.. 가능하면 빼는게 좋겠습니다.

운동시 최대심박수 넘으면 어떻게 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최대심박수는 개인차가 있기때문에.. 꼭 공식에 얽매일 필요는 없습니다. 부정맥같은 심장질환 있는 분한테는 의미가 있겠지만 건강한 상태에서는 크게 의미를 둘 필요는 없습니다. 심박수가 빠르게 회복하고 안정시 심박수도 정상이니 현재 아주 건강한 상태로 보입니다.

가임기 첫날 질외사정 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기에 피임이 완벽하지 못했을 가능성이 있기 때문에 임신가능성을 얼마나 이야기하기 어렵지만 사후피임조치가 필요하다고 생각합니다.

경구피임약 복용 중 착상혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 용량과 복용법을 잘 지켜서 드셨다고 하면 임신의 가능성은 거의 없다고 생각합니다. 착상혈은 임상적으로 부정출혈과 구별은 어렵습니다. 크게 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다.

해당 사진이 구강유두종 구강암일 수 있는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위2개 사진은 이하

선이라고 부르는 귀밑샘의 구멍 입니다. 맨아래사진은 턱밑샘의 침이 나오는 구멍입니다. 걱정하지않으셔도 됩니다. 구강유두종이나 구강암은 아닙니다

치핵이 터졌습니다 어떻게하죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵치질은 크게 내치핵과 외치핵으로 구분하는데요. 내치핵은 심하면 수술을 해야하지만.. 질문하신분은 외치핵일 가능성이 높아보입니다. 외치핵은 보존요법온수좌욕 연고로도 치유가 잘되고.. 24주정도면 혈전피딱지가 자연적으로 흡수되면서 좋아집니다. 보통 장기간 변기에 있거나 과도하게 힘줄때 발생하니... 좋아지더라도 재발 안되게 조심하시고요. 통증이 심해지거나 출혈이 좋아지지 않으면 항문외과 진료 보시길 바랍니다.

프록사신바이정 먹고 머리가 멍해질수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프록바이정은 호흡기감염증 인후감염 요로감염증 임질 위장관감염증 등에 사용되는 항생제입니다. 해당 의약품을 복용한 후에 머리가 멍해지는 등의 부작용이 나타날 수 있다고 합니다. 부작용은 개인차이가 있을 수 있습니다

명치쪽 답답함과 소화불량 설사가 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 위장염으로 보입니다. 수분 섭취를 충분히 해주시고 증상이 지속되거나 발열 복통의 악화가 있다면 약물 치료 및 검사가 필요하므로 내과 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손톱이 반만 죽은 것 같아요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이제 불편한 증상이 남아있나요? 시간이 지나면서 새로운 손톱이 자라나올 것으로 생각됩니다. 손톱 뿌리부분을 다쳤다고하면 손톱이 밑게 날 수도 있습니다

금연 후 심혈관계 회복 기간,안녕하세요. 메디이즈입니다. 금연 후 심혈관계의 회복 기간은 다음과 같습니다 20분 후 혈압과 맥박이 정상으로 돌아옵니다. 12시간 후 혈액 속 일산화탄소 수치가 정상 수준으로 내려갑니다. 212주 후 혈액순환이 개선되기 시작합니다. 19개월 후 폐 기능이 향상되고 기침가래 등의 증상이 개선됩니다. 1년 후 관상동맥 질환 위험이 절반으로 감소합니다. 5년 후 뇌졸중 위험이 비흡연자 수준으로 떨어집니다. 10년 후 폐암 위험이 비흡연자 수준으로 감소합니다. 15년 후 관상동맥 질환으로 인한 심장마비 또는 사망 위험이 비흡연자 수준으로 감소합니다.

추가적으로 말씀 드리면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크기가 손바닥 크기정도 되면 굉장히 큰 것 같습니다. 일반외과 진료 받아보시는 것이 좋을 것으로 생각됩니다. 종기가 생긴것이 아닌가 싶네요

추가적으로 말씀 드리면,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크기가 손바닥 크기정도 되면 굉장히 큰 것 같습니다. 일반외과 진료 받아보시는 것이 좋을 것으로 생각됩니다. 종기가 생긴것이 아닌가 싶네요

항문속에 빨간색 혹이 보여요사진주의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상으로 항문 점막안에 무언거 있습니다. 의견대로 내치핵으로 보입니다. 통증의 원인이 될 수 있으며 항문 안의 상황도 알아야 하니 항문경 검사를 받아보시기 바랍니다.

항문 안에 빨간색 혹이 있어요사진주의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 치핵을 의심할 수 있습니다. 치핵은 항문 내에 있는 혈관이 부풀어 오른 상태를 말합니다. 치핵은 치질이라고도 불립니다. 치핵은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있지만 가장 흔한 원인은 변비입니다. 변비로 인해 변이 딱딱해지면 항문을 통과할 때 항문 내에 있는 혈관이 압박을 받아 부풀어 오르게 됩니다. 치핵은 대부분 통증이 없습니다. 하지만 치핵이 커지거나 염증이 생기면 항문 통증이 발생할 수 있습니다. 또한 치핵이 탈출하면 항문에서 빨간색 혹이 나오는 증상이 나타날 수 있습니다. 치핵은 대부분 증상이 가벼워서 별다른 치료 없

이 자연적으로 치유됩니다. 하지만 치핵이 심한 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 병원에 가서 진료를 받아보시기 바랍니다. 의사는 항문 검사를 통해 치핵을 진단할 수 있습니다. 또한 의사는 치핵의 크기와 위치 염증의 정도 등을 확인하기 위해 초음파 검사나 내시경 검사를 시행할 수 있습니다. 치핵은 대부분 별다른 치료 없이 자연적으로 치유됩니다. 하지만 치핵이 심한 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. 따라서 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 병원에 가서 진료를 받아보시기 바랍니다.

복부동맥류 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부동맥류는 혈압이 높아지면 생길 수 있습니다. 따라서 혈압을 정상으로 유지하는 것이 복부동맥류를 예방하는 데 도움이 됩니다. 하지직거상운동은 복부동맥류에 무리하지 않습니다. 하지직거상운동은 다리를 들어 올리는 운동으로 혈압을 낮추는 데 도움이 됩니다. 또한 하지직거상운동은 혈액순환을 개선하고 근력을 강화하는 데 도움이 됩니다. 하지직거상운동을 할 때 무릎이 약간 구부러져도 무릎뼈 슬개골 연골에 이상이 없습니다. 하지직거상운동은 무릎에 무리가 가지 않는 운동입니다. 평생 하지직거상운동을 해야 한다면 운동 강도를 점차 높여가는 것이 좋습니다. 처음에는 하지직거상운동을 3일에 한 번씩 15분 정도 하다가 점차 운동 강도를 높여서 하루에 한 번씩 30분 정도 운동하는 것이 좋습니다. 하지직거상운동은 복부동맥류를 예방하고 혈압을 낮추며 혈액순환을 개선하고 근력을 강화하는 데 도움이 됩니다.

베체트 같은 자가면역질환에 대한 검사가 필요할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베체트 병에 대한 특별한 검사는 없습니다. 일반적으로 다양한 혈액검사를 합니다. 혹시 밀가루 우유 계란 이런거 좋아하시면 23개월 끊어보시면 궤양증상이 줄어들거나 없어지는 경우도 있습니다

수면장애에대해 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동강도를 조금 높여보셔요. 그래서 깊은 수면이 늘어나고 어지럼증이 좋아지면 수면의 질이 좋지 않아서 그런것일 수 있습니다

편평사마귀일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀 드리기 조심스럽네요.제가 보기에는 편평사마귀가 아닌가 싶은데 번지는 경향이 있으면 제거가 필요할 것 같습니다.

오랜만에 소변검사를 받았는데 혈뇨 단백뇨가 둘 다 나왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈뇨와 단백뇨가 지속적으로 나오거나 이전보다 점점 양이나 정도가 늘어나고 있다고 하시면 다시 검사한번 더 해보고 원인을 찾는 추가 검사를 해보시는 것이 필요해 보입니다

드라이소켓인지 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 5월9일 아침에 발치 하였고 토요일까지는 큰 통증이 없다가 한 새벽5시경 짹짹하게 넘어가는 느낌에 잠에서 깬데 그 이후로 살짝의 욱신거리는 통증이 있습니다. 드라이소켓인지 잘 아물고 있는건지 궁금합니다 사진만으로는 정확한 판단이 어렵습니다 드라이소켓으로 보이진 않습니다

잘 아물고 있는 건가요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다만 잘 아물고 있는 것으로 보입니다. 양치하실 때 주의하시고 일주일 뒤 치과에서 꼭 체크 받으시면 좋을 듯 합니다

상악동 거상술 빼이식 후 실밥 풀림 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상악동 수술한지 4일차인데 실밥이 너무 허를 찢려서 가위로 조금 자르려고 라다가 좀 많이 풀렸는데 괜찮을까요? 풀릴때 밑에 하얀 막이 뭐가 들리는 기분이었는데 다시 병원가서 실로 꼬매야 할까요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다. 치료 받으신 치과에 가서서 검사를 받아보세요.

속쓰림증상등통증같아요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 명치부 통증이 있다면 위장관 질환이나

담낭 질환을 감별해야 합니다. 증상이 지속된다면 위내시경과 복부 초음파 검사가 필요하므로 내과 진료를 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

명치쪽 답답함과 소화불량 설사가 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 위장염으로 보입니다. 수분 섭취를 충분히 해주시고 증상이 지속되거나 발열 복통의 악화가 있다면 약물 치료 및 검사가 필요하므로 내과 진료를 보시기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

곤지름 의심...안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름을 이전에 앓은적이 있으셔서 곤지름 걱정을 많이 하시는것인가요? 조직검사로 확인해보시는 것이 좋을 것 같습니다

흑색종 일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱아래 멍이 든것이 아닌가 싶습니다. 시간이 지나면서 더 진해지거나 심해지는것 같으면 피부과 진료가 필요할 수 있습니다

사타구니쪽 혹? 멍울이 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생긴지 얼마나 오래되었나요? 누르면 통증도 있나요? 얼마되지 않고 통증이 있으면 가정의학과 진료 받아보셔도 될것 같습니다

사타구니 혹? 멍울,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 임파선염 가능성이 높지만 경부 초음파를 확인하여 실제 림프절염인지 다른 병변인지 감별을 하는 것이 필요합니다. 림프절염이라면 항생제와 소염제 복용이 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

주사피부염 초기 진단 받았는데 약 좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단은 처방해주신 약을 바르면서 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다. 혹시라도 효과가 없어 더 심해지거나하면 약물변경이 필요할 수 있습니다

점빠고 색소침착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 듀덤을 붙인 상태에서는 듀덤이 자외선을 차단해줄 수 있으니 추가적으로 자외선 차단 조치가 필요없을것 같습니다. 회복되면 듀덤 떼고 바르시면 됩니다

오랜만에 소변검사를 받았는데 혈뇨 단백뇨가 둘 다 나왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈뇨와 단백뇨가 지속적으로 나오거나 이전보다 점점 양이나 정도가 늘어나고 있다고 하면 다시 검사한번 더 해보고 원인을 찾는 추가 검사를 해보시는 것이 필요해 보입니다

사타구니쪽 혹? 멍울이 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생긴지 얼마나 오래되었나요? 누르면 통증도 있나요? 얼마되지 않고 통증이 있으면 가정의학과 진료 받아보셔도 될것 같습니다

편평사마귀일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀 드리기 조심스럽네요.제가 보기에 편평사마귀가 아닌가 싶은데 변지는 경향이 있으면 제거가 필요할 것 같습니다.

가슴에 뭐가 났는데 뭔지 모르겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모양이 바뀌는 것 같으시다고요? 모양과 크기가 바뀌면 이상은 없는지 조직검사가 필요할 수 있습니다. 자꾸 신경쓰시면 제거도 고려해보셔요.. 그냥 점모반이 아닌가 싶습니다

곤지름 의심...안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름을 이전에 앓은적이 있으셔서 곤지름 걱정을 많이 하시는것인가요? 조직검사로 확인해보시는 것이 좋을 것 같습니다

남성 성기 두드러기?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 선명하지는 않아서 정확한 답변은 어렵지만 모공이 도드라지게 보이는 임상적으로 의미는 없는 구진성 병변이 아닌가 싶습니다.

흑색종 일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱아래 멍이 든것이 아닌가 싶습니다. 시간이 지나면서 더 진해지거나 심해지는것 같으면 피부과 진료가 필요할 수 있습니다

라자로스 증후군은 실제 죽었다 깨어나는건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확하게는 잘 모르겠습니다. 세상에는 의학적으로 설명이 잘안되는 일이 실제로 벌어지곤 합니다. 제 생각으로는 의학적으로는 사망한 것이 맞는데 다시 깨어나는 것이 아닌가 싶습니다

혈압이 왔다 갔다 하는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈압은 수시로 오르락 내리락 하면서 변화합니다. 혈압의 일중변화 즉 하루 동안 혈압이 변동하는 데 영향을 미치는 주요 인자는 다음과 같습니다. 생체리듬체내 시계 혈압은 하루 중 특정 시간대에 가장 높고 가장 낮은 리듬을 보입니다. 일반적으로 아침 기상 직후가 최고치 야간 수면 시간이 최저치입니다. 활동 수준 활동량이 많아지면 혈압이 상승하고 휴식을 취하면 혈압이 하락합니다. 스트레스 업무 스트레스 정신적 긴장 등으로 인해 상황별로 혈압이 급격히 오를 수 있습니다. 식사 염분 과다 섭취 시 일시적으로 혈압이 상승합니다. 식후 23시간 내 최고치를 보입니다. 카페인 커피 차 콜라 등 카페인 함유 음료를 섭취하면 일시적으로 혈압이 상승합니다. 약물 일부 진통제 감기약 약물 등은 혈압에 영향을 미칠 수 있습니다. 운동 운동 시 일시적으로 혈압이 상승하지만 규칙적 운동은 전반적인 혈압 조절에 도움이 됩니다. 기온 변화 추위나 더위 등 기온 변화로 인해 일시적인 혈압 변동이 발생할 수 있습니다. 이처럼 다양한 생리적 환경적 요인들이 하루 동안 혈압의 변화 패턴에 영향을 주게 됩니다.

팔 가려움증 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 바르는 스테로이드와 먹는약을 처방해 주실것으로 생각됩니다. 약은 항히스타민제 가려움이 심하면 스테로이드포함 가능합니다

귀두에 변색이 된건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼마나 오래된 소견인가요?임상적으로는 큰 의미는 없어보이는 색소가 아닌가 싶습니다. 지속되거나 심해진다고 하면 진료 받아보셔요. 저 부위는 자극을 주지 말아야 할것 같습니다

각막상피 벗겨짐에 대해 질문 드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 재발성 각막상피미란은 반복각막진무름이라고도 불리는 질환으로 주로 손톱 나뭇가지 등으로 인 한 외상 후에 발생합니다. 외상 외에도 눈썹 찢림 각막상피세포 유전이상 수포각막병 증 당뇨병 등의 원인으로 각막상피가 벗겨진 경우에 나타날 수 있습니다. 치료로는 점안 안약 치료와 수술적 치료가 있습니다. 먼저 점안 안약 치료로는 고삼투압 안연고를 장기간 밤에 자기 전에 투여하는 것이 대표적입니다. 정상적인 각막 부착복합체가 형성되기까지는 오랜 시간이 소요되기 때문에 적어도 612개월 정도는 사용해야 합니다. 이외에도 항생제 안약 스테로이드 안약 자가혈청 안약 등이 도움이 될 수 있습니다. 이런 보존적인 점안 안약 치료가 효과가 없을 때는 수술적 치료 방법을 시행해 볼 수 있습니다.

햄스트링 짧아지면 무릎에도 영향이 가나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 햄스트링은 허벅지 뒤쪽에 있는 근육입니다. 햄스트링이 짧아지면 무릎이 과도하게 굽혀지게 되고 무릎에 무리가 가서 거위발건염이 생길 수 있습니다. 또한 햄스트링이 짧아지면 오다리가 더 심해질 수 있습니다. 오다리는 무릎이 안쪽으로 휘어지는 것을 말합니다. 오다리 때문에 무릎이 아픈 경우 오다리를 교정하는 수술을 받을 수 있습니다. 또한 오다리 때문에 무릎에 무리가 가지 않도록 다리 스트레칭 근력운동 등을 꾸준히 해주는 것이 좋습니다. 무릎이 아프다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 무릎의 상태를 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다.

여자친구 임신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 주신 정보와 증상만으로 임신여부를 알기 어렵으니 임신반응검사를 하거나 산부인과 진료를 받아보시는 것을 고려해보셔요

아안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 말씀하시는 증상만으로 단정짓기는 어렵지만 아마도 피지낭종이 아닌가 싶습니다. 진료 받고 확인해보셔요.

연어는 몸에 안전한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연어는 몸에 안전한 식품입니다. 연어에는 풍부한 영양소가 함유되어 있고 염증을 줄이고 심장 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 연어는 뇌 건강에 좋은 오메가3 지방산이 풍부합니다. 연어에 PCBs가 포함되어 있다는

것은 사실입니다. 하지만 연어를 먹어서 PCBs에 노출되는 양은 매우 적습니다. 또한 연어는 PCBs의 농도가 낮은 편입니다. 따라서 연어를 먹는 것에 대해 걱정할 필요는 없습니다. 만약 PCBs에 대한 우려가 있다면 저장 기간이 짧은 연어를 먹는 것이 좋습니다. 또한 연어를 먹기 전에 껍질을 벗겨내는 것이 좋습니다. 연어는 건강에 좋은 식품입니다. 연어를 꾸준히 먹는 것이 건강에 도움이 됩니다.

이거 티눈일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 티눈으로 보입니다. 티눈은 피부 표면이 딱딱하게 굳어져서 생기는 질환입니다. 티눈은 통증이 없을 수도 있고 통증이 있을 수도 있습니다. 티눈은 병원에서 치료할 수 있습니다. 병원에서는 티눈을 깎거나 레이저로 제거할 수 있습니다. 티눈을 예방하기 위해서는 다음과 같은 방법을 실천하는 것이 좋습니다. 발에 맞는 신발을 신는다. 맨발로 다니지 않는다. 발을 자주 씻고 건조하게 유지한다. 티눈이 생기면 바로 치료한다. 티눈은 흔한 질환이지만 치료하지 않으면 통증이 심해질 수 있습니다. 따라서 티눈이 생기면 빨리 병원에 가서 치료하는 것이 좋습니다.

탄튬액 사용 후 인후통 악화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탄튬액은 인후염 치료에 사용되는 소염진통제입니다. 탄튬액은 인후의 통증을 완화시켜주지만 염증을 악화시킬 수 있습니다. 따라서 탄튬액을 과도하게 사용하거나 오랫동안 사용하면 인후염이 악화될 수 있습니다. 인후염이 심한 경우 탄튬액을 사용하는 대신 꿀을 섭취하는 것이 좋습니다. 꿀은 인후염을 완화시키는 효과가 있습니다. 또한 꿀은 항균 효과가 있어 인후염을 악화시키는 세균을 제거할 수 있습니다. 인후염이 심한 경우 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 인후염의 원인을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다. 인후염을 예방하기 위해서는 손을 자주 씻고 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 또한 환기가 잘되는 곳에서 생활하고 과로를 피하는 것이 좋습니다.

수면장애에대해 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동강도를 조금 높여보셔요. 그래서 깊은 수면이 늘어나고 어지럼증이 좋아지면 수면의 질이 좋지 않아서 그런것일 수 있습니다

팔 가려움증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 팔 가려움증은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 건조한 피부입니다. 건조한 피부는 피부 표면의 수분이 부족해져서 가려움을 유발합니다. 건조한 피부를 예방하기 위해서는 물을 충분히 마시고 보습제를 바르는 것이 좋습니다. 팔 가려움증의 다른 원인으로는 아토피 피부염 접촉성 피부염 습진 등이 있습니다. 아토피 피부염은 유전적 요인과 환경적 요인에 의해 발생하는 만성 염증성 피부 질환입니다. 접촉성 피부염은 피부를 자극하는 물질에 접촉하여 발생하는 피부 질환입니다. 습진은 피부가 건조해지거나 염증이 생겨서 발생하는 피부 질환입니다. 팔 가려움증을 치료하기 위해서는 원인을 찾아야 합니다. 건조한 피부로 인한 가려움증은 보습제를 바르는 것으로 치료할 수 있습니다. 아토피 피부염 접촉성 피부염 습진 등은 병원에서 치료를 받아야 합니다. 팔 가려움증이 심한 경우에는 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 팔 가려움증의 원인을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다.

침삼킬때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 침삼킬 때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아프다면 인두염일 가능성이 있습니다. 인두염은 인두의 염증을 말합니다. 인두는 목구멍의 뒤쪽에 있는 기관으로 혀와 식도를 연결합니다. 인두염은 주로 바이러스 감염으로 발생합니다. 인두염의 증상은 목의 통증 기침 가래 발열 두통 피로감 등입니다. 인두염은 보통 12주 안에 자연적으로 치유됩니다. 하지만 증상이 심하거나 오래 지속되면 병원을 방문하여 치료를 받아야 합니다. 인두염을 예방하기 위해서

는 손을 자주 씻고 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 또한 환기가 잘되는 곳에서 생활하고 과로를 피하는 것이 좋습니다. 침삼킬 때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아프다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 인두염을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다.

유니네콜정을 먹고 인지저하가 일어날수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유콜정베타네 콜염화물은 방광 수축을 촉진하는 약물로 소변 유지 장애 치료에 사용됩니다. 일반적으로 안전한 약으로 알려져 있지만 일부 부작용이 발생할 수 있으며 드물게 인지 기능 저하와 관련된 경우도 보고되었습니다. 유콜정 복용 중 다음과 같은 증상이 나타난다면 즉시 의사와 상담해야 합니다 기억력 저하 집중력 저하 판단력 저하 혼란 언어 장애 기타 비정상적인 증상

하지직거상운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지직거상운동은 복부근육을 강화시켜주고 혈액순환을 촉진시키는 운동입니다. 쿠션을 사용해서 허리를 편하게 하고 운동을 해도 복부에 힘이 들어가는 것은 어쩔 수 없는 부분입니다. 복부동맥류는 복부동맥이 좁아지거나 막히는 질환으로 하지직거상운동을 해도 복부동맥류에 지장이 없습니다. 오히려 하지직거상운동은 복부동맥류를 예방하는 데 도움이 됩니다.

잘 아물고 있는 건가요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다만 잘 아물고 있는 것으로 보입니다. 양치하실 때 주의하시고 일주일 뒤 치과에서 꼭 체크 받으시면 좋을 듯 합니다

복부동맥류 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부동맥류는 혈압이 높아지면 생길 수 있습니다. 따라서 혈압을 정상으로 유지하는 것이 복부동맥류를 예방하는 데 도움이 됩니다. 하지직거상운동은 복부동맥류에 무리하지 않습니다. 하지직거상운동은 다리를 들어 올리는 운동으로 혈압을 낮추는 데 도움이 됩니다. 또한 하지직거상운동은 혈액순환을 개선하고 근력을 강화하는 데 도움이 됩니다. 하지직거상운동을 할 때 무릎이 약간 구부러져도 무릎뼈 슬개골 연골에 이상이 없습니다. 하지직거상운동은 무릎에 무리가 가지 않는 운동입니다. 평생 하지직거상운동을 해야 한다면 운동 강도를 점차 높여가는 것이 좋습니다. 처음에는 하지직거상운동을 3일에 한 번씩 15분 정도 하다가 점차 운동 강도를 높여서 하루에 한 번씩 30분 정도 운동하는 것이 좋습니다. 하지직거상운동은 복부동맥류를 예방하고 혈압을 낮추며 혈액순환을 개선하고 근력을 강화하는 데 도움이 됩니다.

베체트 같은 자가면역질환에 대한 검사가 필요할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베체트 병에 대한 특별한 검사는 없습니다. 일반적으로 다양한 혈액검사를 합니다. 혹시 밀가루 우유 계란 이런거 좋아하시면 23개월 끊어보시면 궤양증상이 줄어들거나 없어지는 경우도 있습니다

팔과 손 등 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 너무 무리한 신체활동으로 나타나는 증상이 의심됩니다. 따뜻한 목욕이나 반신욕 하시고 진통제를 드셔보시면 좋겠습니다. 찜질은 냉찜질이 좋을 것 같습니다

라섹 후 헬스언제부터 가능할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 라섹 수술 후 헬스장에서 운동을 시작할 수 있는 적정 시기는 일반적으로 수술 후 68주 정도가 지난 뒤입니다. 하지만 개인에 따라 완전한 회복 정도가 다르므로 반드시 주치의나 전문의와 상의하여 건강상태를 확인한 후 운동 시작 시기를 결정하는 것이 좋습니다. 안압은 문제가 되지 않을 겁니다.

대체 왜 그럴까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 속발음 현상은 일종의 습관으로 생겨난다고 볼 수 있습니다. 책을 읽을 때 눈으로만 읽는 것이 아니라 입으로 소리 내어 읽는 습관이 있는 경우 책을 읽을 때 속으로 소리 내어 읽는 속발음 현상이 생길 수 있습니다. 또한 티비를

볼 때 자막을 속으로 읽거나 대사를 따라하는 경우도 속발음 현상이라고 볼 수 있습니다. 속 발음 현상을 고치는 방법으로는 책을 읽을 때 눈으로만 읽고 입으로 소리 내어 읽지 않는 습관을 들이는 것이 좋습니다. 또한 티비를 볼 때 자막을 보지 않고 소리만 듣는 습관을 들이는 것도 도움이 됩니다. 속발음 현상은 습관으로 생긴 것이기 때문에 습관을 고치기 위해서는 꾸준한 노력이 필요합니다. 속발음 현상을 고치기 위해 노력하다 보면 속발음 현상이 점차 줄어들고 자연스럽게 없어질 것입니다.

노인분들 구역구토,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사실 집에서 해주실수 있는 것은 별로 없어보입니다. 적절한 영양 공급이 필요한데 잘 못드시면 마시는 영양음료라도 드시게 해주셔요. 자꾸토하면 입으로 먹는것은 어려울 수 있어요

복부동맥류 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부동맥류는 혈압이 높아지면 생길 수 있습니다. 따라서 혈압을 정상으로 유지하는 것이 복부동맥류를 예방하는 데 도움이 됩니다. 하지직거상운동은 복부동맥류에 무리하지 않습니다. 하지직거상운동은 다리를 들어 올리는 운동으로 혈압을 낮추는 데 도움이 됩니다. 또한 하지직거상운동은 혈액순환을 개선하고 근력을 강화하는 데 도움이 됩니다. 하지직거상운동을 할 때 무릎이 약간 구부러져도 무릎뼈 슬개골 연골에 이상이 없습니다. 하지직거상운동은 무릎에 무리가 가지 않는 운동입니다. 평생 하지직거상운동을 해야 한다면 운동 강도를 점차 높여가는 것이 좋습니다. 처음에는 하지직거상운동을 3일에 한 번씩 15분 정도 하다가 점차 운동 강도를 높여서 하루에 한 번씩 30분 정도 운동하는 것이 좋습니다. 하지직거상운동은 복부동맥류를 예방하고 혈압을 낮추며 혈액순환을 개선하고 근력을 강화하는 데 도움이 됩니다.

도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정이 많으시지요. 어린나이에는 유방암이 발생하는 경우는 거의 없어요. 너무 걱정마시고 진료받아보시는것을 권합니다

자궁경부암 검진 필요할까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검진은 필요합니다 자궁경부암 검사를 1년에 12회 정도 받게 되면 대부분의 경우 자궁경부암은 전 단계나 초기 단계에서 진단이 가능합니다. 자궁경부암 정기 검진의 시작은 이를 수록 좋으며 30대가 되면 반드시 1년에 1회 40대 이후에는 1년에 2회 정기 검진을 받는 것이 좋습니다.

노인분들 구역구토,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사실 집에서 해주실수 있는 것은 별로 없어보입니다. 적절한 영양 공급이 필요한데 잘 못드시면 마시는 영양음료라도 드시게 해주셔요. 자꾸토하면 입으로 먹는것은 어려울 수 있어요

자궁경부암 검진 필요할까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검진은 필요합니다 자궁경부암 검사를 1년에 12회 정도 받게 되면 대부분의 경우 자궁경부암은 전 단계나 초기 단계에서 진단이 가능합니다. 자궁경부암 정기 검진의 시작은 이를 수록 좋으며 30대가 되면 반드시 1년에 1회 40대 이후에는 1년에 2회 정기 검진을 받는 것이 좋습니다.

이거 티눈일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 티눈으로 보입니다. 티눈은 피부 표면이 딱딱하게 굳어져서 생기는 질환입니다. 티눈은 통증이 없을 수도 있고 통증이 있을 수도 있습니다. 티눈은 병원에서 치료할 수 있습니다. 병원에서는 티눈을 깎거나 레이저로 제거할 수 있습니다. 티눈을 예방하기 위해서는 다음과 같은 방법을 실천하는 것이 좋습니다. 발에 맞는 신발을 신는다. 맨발로 다니지 않는다. 발을 자주 씻고 건조하게 유지한다. 티눈이 생기면 바로 치료한다. 티눈은 흔한 질환이지만 치료하지 않으면 통증이 심해질 수 있습니다. 따라서 티눈이 생기면 빨리 병원에 가서 치료하는 것이 좋습니다.

연어는 몸에 안전한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연어는 몸에 안전한 식품입니다. 연어에는 풍부한 영양소가 함유되어 있고 염증을 줄이고 심장 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다.

또한 연어는 뇌 건강에 좋은 오메가3 지방산이 풍부합니다. 연어에 PCBs가 포함되어 있다는 것은 사실입니다. 하지만 연어를 먹어서 PCBs에 노출되는 양은 매우 적습니다. 또한 연어는 PCBs의 농도가 낮은 편입니다. 따라서 연어를 먹는 것에 대해 걱정할 필요는 없습니다. 만약 PCBs에 대한 우려가 있다면 저장 기간이 짧은 연어를 먹는 것이 좋습니다. 또한 연어를 먹기 전에 껍질을 벗겨내는 것이 좋습니다. 연어는 건강에 좋은 식품입니다. 연어를 꾸준히 먹는 것이 건강에 도움이 됩니다.

도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걱정이 많으시지요. 어린나이에는 유방암이 발생하는 경우는 거의 없어요. 너무 걱정마시고 진료받아보시는것을 권합니다

팔 가려움증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 팔 가려움증은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 건조한 피부입니다. 건조한 피부는 피부 표면의 수분이 부족해져서 가려움을 유발합니다. 건조한 피부를 예방하기 위해서는 물을 충분히 마시고 보습제를 바르는 것이 좋습니다. 팔 가려움증의 다른 원인으로는 아토피 피부염 접촉성 피부염 습진 등이 있습니다. 아토피 피부염은 유전적 요인과 환경적 요인에 의해 발생하는 만성 염증성 피부 질환입니다. 접촉성 피부염은 피부를 자극하는 물질에 접촉하여 발생하는 피부 질환입니다. 습진은 피부가 건조해지거나 염증이 생겨서 발생하는 피부 질환입니다. 팔 가려움증을 치료하기 위해서는 원인을 찾아야 합니다. 건조한 피부로 인한 가려움증은 보습제를 바르는 것으로 치료할 수 있습니다. 아토피 피부염 접촉성 피부염 습진 등은 병원에서 치료를 받아야 합니다. 팔 가려움증이 심한 경우에는 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 팔 가려움증의 원인을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다.

햄스트링 짧아지면 무릎에도 영향이 가나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 햄스트링은 허벅지 뒤쪽에 있는 근육입니다. 햄스트링이 짧아지면 무릎이 과도하게 굽혀지게 되고 무릎에 무리가 가서 거위발건염이 생길 수 있습니다. 또한 햄스트링이 짧아지면 오다리가 더 심해질 수 있습니다. 오다리는 무릎이 안쪽으로 휘어지는 것을 말합니다. 오다리 때문에 무릎이 아픈 경우 오다리를 교정하는 수술을 받을 수 있습니다. 또한 오다리 때문에 무릎에 무리가 가지 않도록 다리 스트레칭 근력운동 등을 꾸준히 해주는 것이 좋습니다. 무릎이 아프다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 무릎의 상태를 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다.

팔과 손 등 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑자기 너무 무리한 신체활동으로 나타나는 증상이 의심됩니다. 따뜻한 목욕이나 반신욕 하시고 진통제를 드셔보시면 좋겠습니다. 찜질은 냉찜질이 좋을 것 같습니다

하지직거상 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지직거상 운동은 무릎 관절염에 좋은 운동입니다. 하지직거상 운동을 하면 무릎 관절의 혈액순환이 좋아지고 관절의 염증이 감소합니다. 하지직거상 운동을 할 때 무릎이 살짝 구부러져도 운동 효과는 동일합니다. 따라서 하지직거상 운동을 할 때는 무릎이 살짝 구부러져도 괜찮습니다. 하지직거상 운동을 할 때 무릎이 살짝 구부러져서 모래비비는 듯한 느낌이 드는 것은 정상입니다. 이 느낌은 무릎 관절의 염증이 감소하는 것을 의미합니다. 따라서 하지직거상 운동을 할 때는 무릎이 살짝 구부러져도 괜찮고 이 느낌은 정상입니다. 하지직거상 운동은 무릎 관절염에 좋은 운동입니다. 하지직거상 운동을 하면 무릎 관절의 혈액순환이 좋아지고 관절의 염증이 감소합니다. 하지직거상 운동을 할 때는 무릎이 살짝 구부러져도 괜찮습니다. 따라서 하지직거상 운동을 꾸준히 하시면 무릎 관절염을 완화할 수 있습니다.

복부대동맥류 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부대동맥류는 복부 중앙에 있는 대동맥이

넓어지는 질환입니다. 복부대동맥류는 주로 고혈압 흡연 당뇨병 등의 위험인자가 있는 사람에게 발생합니다. 복부대동맥류가 터지면 생명이 위험할 수 있기 때문에 복부대동맥류가 있는 사람은 정기적으로 검진을 받고 위험인자를 관리하는 것이 중요합니다. 복부대동맥류가 있는 사람이 운동을 하는 것은 좋습니다. 운동은 혈압을 낮추고 혈액순환을 개선시켜 복부대동맥류가 터지는 위험을 낮출 수 있습니다. 복부대동맥류가 있는 사람이 운동을 할 때는 무리하지 않는 선에서 꾸준히 하는 것이 좋습니다. 하지직거상이나 걷기와 같은 운동은 복부대동맥류가 있는 사람이 해도 되는 운동입니다. 복부대동맥류가 있는 사람이 운동을 할 때는 다음과 같은 점을 주의해야 합니다. 운동을 시작하기 전에 의사와 상담을 합니다. 운동을 할 때는 갑자기 멈추지 않고 천천히 멈춥니다. 운동을 할 때는 복부에 힘을 주지 않습니다. 운동을 할 때는 물을 충분히 마십니다. 운동을 할 때는 과도한 스트레스를 받지 않습니다. 복부대동맥류가 있는 사람이 운동을 하면 복부대동맥류가 터지는 위험을 낮출 수 있습니다. 복부대동맥류가 있는 사람이 운동을 할 때는 무리하지 않는 선에서 꾸준히 하는 것이 좋습니다.

드라이소켓인지 궁금합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 5월9일 아침에 발치 하였고 토요일까지는 큰 통증이 없다가 한 새벽5시경 짹짹한게 넘어가는 느낌에 잠에서 깬데 그 이후로 살짝의 욱신거리는 통증이 있습니다. 드라이소켓인지 잘 아물고 있는건지 궁금합니다 사진만으로는 정확한 판단이 어렵습니다 드라이소켓으로 보이진 않습니다

침삼킬때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 침삼킬 때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아프다면 인두염일 가능성이 있습니다. 인두염은 인두의 염증을 말합니다. 인두는 목구멍의 뒤쪽에 있는 기관으로 혀와 식도를 연결합니다. 인두염은 주로 바이러스 감염으로 발생합니다. 인두염의 증상은 목의 통증 기침 가래 발열 두통 피로감 등입니다. 인두염은 보통 12주 안에 자연적으로 치유됩니다. 하지만 증상이 심하거나 오래 지속되면 병원을 방문하여 치료를 받아야 합니다. 인두염을 예방하기 위해서는 손을 자주 씻고 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 또한 환기가 잘되는 곳에서 생활하고 과로를 피하는 것이 좋습니다. 침삼킬 때 오른쪽 혀랑 목구멍으로 이어지는 부위가 아프다면 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 인두염을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다.

유니네콜정을 먹고 인지저하가 일어날수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유콜정베타네콜염화물은 방광 수축을 촉진하는 약물로 소변 유지 장애 치료에 사용됩니다. 일반적으로 안전한 약으로 알려져 있지만 일부 부작용이 발생할 수 있으며 드물게 인지 기능 저하와 관련된 경우도 보고되었습니다. 유콜정 복용 중 다음과 같은 증상이 나타난다면 즉시 의사와 상담해야 합니다 기억력 저하 집중력 저하 판단력 저하 혼란 언어 장애 기타 비정상적인 증상

탄툼액 사용 후 인후통 악화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 탄툼액은 인후염 치료에 사용되는 소염진통제입니다. 탄툼액은 인후의 통증을 완화시켜주지만 염증을 악화시킬 수 있습니다. 따라서 탄툼액을 과도하게 사용하거나 오랫동안 사용하면 인후염이 악화될 수 있습니다. 인후염이 심한 경우 탄툼액을 사용하는 대신 꿀을 섭취하는 것이 좋습니다. 꿀은 인후염을 완화시키는 효과가 있습니다. 또한 꿀은 항균 효과가 있어 인후염을 악화시키는 세균을 제거할 수 있습니다. 인후염이 심한 경우 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 인후염의 원인을 진단하고 적절한 치료를 처방해줄 수 있습니다. 인후염을 예방하기 위해서는 손을 자주 씻고 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 또한 환기가 잘되는 곳에서 생활하고 과로를 피하는 것이 좋습니다.

각막상피 벗겨짐에 대해 질문 드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 재발성 각막상피미란은 반

복각막진무름이라고도 불리는 질환으로 주로 손톱 나뭇가지 등으로 인 한 외상 후에 발생합니다. 외상 외에도 눈썹 찢림 각막상피세포 유전이상 수포각막병 증 당뇨병 등의 원인으로 각막 상피가 벗겨진 경우에 나타날 수 있습니다. 치료로는 점안 안약 치료와 수술적 치료가 있습니다. 먼저 점안 안약 치료로는 고삼투압 안연고를 장기간 밤에 자기 전에 투여하는 것이 대표적입니다. 정상적인 각막 부착복합체가 형성되기까지는 오랜 시간이 소요되기 때문에 적어도 612개월 정도는 사용해야 합니다. 이외에도 항생제 안약 스테로이드 안약 자가혈청 안약 등이 도움이 될 수 있습니다. 이런 보존적인 점안 안약 치료가 효과가 없을 때는 수술적 치료 방법을 시행해 볼 수 있습니다.

항문 안에 빨간색 혹이 있어요사진주의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 치핵을 의심할 수 있습니다. 치핵은 항문 내에 있는 혈관이 부풀어 오른 상태를 말합니다. 치핵은 치질이라고도 불립니다. 치핵은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있지만 가장 흔한 원인은 변비입니다. 변비로 인해 변이 딱딱해지면 항문을 통과할 때 항문 내에 있는 혈관이 압박을 받아 부풀어 오르게 됩니다. 치핵은 대부분 통증이 없습니다. 하지만 치핵이 커지거나 염증이 생기면 항문 통증이 발생할 수 있습니다. 또한 치핵이 탈출하면 항문에서 빨간색 혹이 나오는 증상이 나타날 수 있습니다. 치핵은 대부분 증상이 가벼워서 별다른 치료 없이 자연적으로 치유됩니다. 하지만 치핵이 심한 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 병원에 가서 진료를 받아보시기 바랍니다. 의사는 항문 검사를 통해 치핵을 진단할 수 있습니다. 또한 의사는 치핵의 크기와 위치 염증의 정도 등을 확인하기 위해 초음파 검사나 내시경 검사를 시행할 수 있습니다. 치핵은 대부분 별다른 치료 없이 자연적으로 치유됩니다. 하지만 치핵이 심한 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. 따라서 항문 안쪽에 빨간색 혹이 있는 경우 병원에 가서 진료를 받아보시기 바랍니다.

안녕하세요 선생님 소변pcr검사는 검사시기가 빨라도 정확 한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변 PCR 검사는 검사시기가 빨라도 정확합니다. 소변 PCR 검사는 소변에서 성병균의 유전자를 검출하는 검사입니다. 성병균의 유전자는 성관계 후 3일 이내에 소변에 나타나기 때문에 소변 PCR 검사를 3일 이내에 하면 성병균을 검출할 수 있습니다. 소변 PCR 검사는 성병균의 유전자를 검출하는 검사이기 때문에 성병균이 소변에 나오지 않으면 성병균을 검출할 수 없습니다. 성병균이 소변에 나오지 않는 이유는 여러 가지가 있습니다. 첫째 성병균이 소변에 나오지 않을 정도로 적을 수 있습니다. 둘째 성병균이 소변에 나오지 않을 정도로 약할 수 있습니다. 셋째 성병균이 소변에 나오지 않을 정도로 짧은 시간 동안 소변에 있었을 수 있습니다. 소변 PCR 검사는 성병균의 유전자를 검출하는 검사이기 때문에 성병균이 소변에 나오지 않으면 성병균을 검출할 수 없습니다. 따라서 소변 PCR 검사를 했는데 성병균을 검출하지 못했다고 해서 성병이 없다고 단정할 수는 없습니다. 성관계 후 3일 이내에 소변 PCR 검사를 했는데 성병균을 검출하지 못했다면 1주일 후에 다시 소변 PCR 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 1주일 후에 소변 PCR 검사를 했는데도 성병균을 검출하지 못했다면 성병이 없다고 단정할 수 있습니다. 질문자님께서 성관계 후 3일 후와 1주일 후에 소변 PCR 검사를 했는데 모두 음성으로 나왔습니다. 따라서 성병이 없다고 단정할 수 있습니다. 질문자님께서 왼쪽 하복부와 고환의 땀김 하복부 통증 요도 끝의 이상한 느낌 혈뇨 등의 증상이 있다면 요로결석일 가능성이 높습니다. 따라서 병원에 가서 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

벨마비 안면마비 신경과 신경외과 치료 크게 차이 없을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안면비대칭이 뚜렷하다면 벨마비 진단에 문제는 없으며 약 처방은 세밀한 내용은 조금 다르지만 신경외과에서 치료를 받으셔도 됩니다.

피부발진인지 두드러기인지 닭살인지 모르겠습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 닭살 모공 각화증이 의심됩니다 이것은 가렵지는 않지만 아토피와 동반이 잘되어 나타나니 가려워서 긁으면 상처나고 아프고 그런것이 아닌가 싶습니다

유한양행 코푸정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유한양행에서 제작한 코정은 코감기 증상 완화에 효과가 있는 약입니다. 코정에는 에페드린염산염과 염산트라메타몰이 함유되어 있는데 에페드린염산염은 코막힘을 완화하고 염산트라메타몰은 통증을 완화하는 효과가 있습니다. 따라서 코정은 코감기 증상인 코막힘과 통증을 동시에 완화할 수 있습니다. 코정은 코감기 증상 완화에 효과가 있지만 다른 부위의 염증을 완화하는 효과는 없습니다. 따라서 코푸정을 복용한다고 해서 다른 부위의 염증이 완화되지는 않습니다. 코정을 복용하면 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다. 두통 어지러움 불안감 불면증 심장 두근거림 고혈압 소변 장애 설사 구토 복통 피부 발진 코푸정을 복용하고 이상 증상이 나타나면 즉시 복용을 중단하고 의사와 상담해야 합니다.

치아가 왜 이럴까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아랫니가 저 부분만 색이 다르고.. 이를 만져보면 매끈하지가 않고 단차가 느껴진다고 해야할까요? 손톱이 탁 걸리는 느낌이에요. 흠이 파진 느낌? 왜 이러는 걸까요? 통증은 없어요 말씀하신 부분은 치석입니다 치과에 가서 스케일링 꼭 받으세요

코푸정vs엘스테인캡슐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 엘테인은 erdostein성분이고 코푸정에는 Chlorpheniramine Maleate 1.5mg Dihydrocodeine Tartrate 5mg Dlmethylephedrine HCl 17.5mg Guaifenesin 50mg 성분이 들어있습니다 분류는 두가지 모두 진해거담제로 되어있지만 엘테인 거담제에 더 가깝습니다

배란통?인데 아랫배눌러도아픈가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배란기 동안에는 아랫배를 누르면 통증을 느낄 수 있습니다. 배란통은 배란 과정 중에 난소에서 난자가 방출되면서 발생하는 통증인데요. 이때 난소 주변 조직이 염증반응을 일으켜 민감해지고 부어오르게 됩니다. 따라서 아랫배 부위를 누르거나 압박을 가하면 염증으로 인해 민감해진 난소 주변 조직이 자극을 받아 통증이 유발될 수 있습니다.

급격한 체중감소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구체적으로는 다음과 같은 경우를 급격한 체중감소로 정의합니다. 6개월 이내에 체중의 5 이상 감소한 경우 예를 들어 체중이 60kg이었다면 6개월 안에 3kg 이상 감소 1년 이내에 체중의 10 이상 감소한 경우 예를 들어 체중이 70kg이었다면 1년 안에 7kg 이상 감소

무통 혈변 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 채핵 치질 에서 출혈이 있는 것으로 생각됩니다. 출혈이 계속되면 빈혈로 쓰러지는 경우도 있을 수 있으니 항문외과 진료 받아보셔야 오늘 목에 생선가시 박힘때문에 병원에 다녀 왔는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생선 가시가 목에 박히면 이물감이 느껴지고 침을 삼킬 때 통증이 생길 수 있습니다. 생선 가시가 목에 박히면 목이 붓고 염증이 생길 수 있으므로 가시를 제거하는 것이 중요합니다. 생선 가시를 제거하는 방법은 여러 가지가 있지만 가장 일반적인 방법은 핀셋을 이용하는 것입니다. 핀셋을 이용하여 생선 가시를 살살 눌러서 제거하면 됩니다. 핀셋을 이용하여 생선 가시를 제거할 때는 너무 세게 누르지 않도록 주의해야 합니다. 생선 가시를 제거한 후에도 이물감이 남아 있다면 병원에 가서 진료를 받아야 합니다. 병원에서는 생선 가시를 제거하고 염증을 치료할 수 있습니다. 생선 가시가 목에 박히면 목이 붓고 염증이 생길 수 있으므로 가시를 제거하는 것이 중요합니다. 생선 가시를 제거할 때는 핀셋을 이용하는 것이 가장 일반적인 방법입니다. 핀셋을 이용하여 생선 가시를 제거할 때는 너무 세게 누르지 않도록 주의해야 합니다. 생선

가시를 제거한 후에도 이물감이 남아 있다면 병원에 가서 진료를 받아야 합니다.

친구가 준 알러지 약을 먹었는데 불안하고 목이 막힌 기분이 듭니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용하신 약들은 목이 막히는 부작용을 유발하긴 어려울만한 약들입니다. 알레르기 반응으로 추정되는 증상에 복용하신 이후 나타난 증상이니 알레르기 반응이 더 진행하여 나타난 증상은 아닌지 확인이 필요하겠습니다. 숨쉬기 어려워지면 즉시 병원을 방문하시기 바랍니다. 또한 증상이 더 심해지진 않지만 불편한 느낌이 지속된다면 이는 앓고계신 정신건강의학적 질환이 유발한 신체증상일 가능성도 있습니다.

친구에게 받은 알러지 약을 먹었는데 목이 막힌 느낌이 듭니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹은 약때문은 아니고 원래 땅콩 알러지가 있거나 공황장애 때문에 예민하게 반응하는 것이 아닌가 의심스럽습니다. 땅콩 아나필락시스도 의심됩니다

치아가 왜 이럴까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아랫니가 저 부분만 색이 다르고.. 이를 만져보면 매끈하지가 않고 단차가 느껴진다고 해야할까요? 손톱이 탁 걸리는 느낌이에요. 흠이 파진 느낌? 왜 이러는 걸까요? 통증은 없어요 말씀하신 부분은 치석입니다 치과에 가서 스케일링 꼭 받으세요

목에 멸치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 멸치는 1cm 정도의 크기로 목에 박힐 정도의 크기는 아닙니다. 또한 멸치는 뼈가 단단하지 않고 부드러운 편이기 때문에 목에 박히더라도 뼈가 부러져서 흡입되거나 폐에 들어가는 일은 거의 없습니다. 따라서 아침에 멸치를 목으로 넘겼다고 해서 걱정할 필요는 없습니다. 멸치는 목에 박히지 않고 자연스럽게 내려갔을 가능성이 높습니다. 다만 멸치를 목으로 넘긴 후 통증이나 이물감이 느껴진다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

피부발진인지 두드러기인지 닭살인지 모르겠습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 닭살 모공 각화증이 의심됩니다 이것은 가렵지는 않지만 아토피와 동반이 잘되어 나타나니 가려워서 긁으면 상처나고 아프고 그런것이 아닌가 싶습니다

유한양행 코푸정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유한양행에서 제작한 코정은 코감기 증상 완화에 효과가 있는 약입니다. 코정에는 에페드린염산염과 염산트라메타몰이 함유되어 있는데 에페드린염산염은 코막힘을 완화하고 염산트라메타몰은 통증을 완화하는 효과가 있습니다. 따라서 코정은 코감기 증상인 코막힘과 통증을 동시에 완화할 수 있습니다. 코정은 코감기 증상 완화에 효과가 있지만 다른 부위의 염증을 완화하는 효과는 없습니다. 따라서 코푸정을 복용한다고 해서 다른 부위의 염증이 완화되지는 않습니다. 코정을 복용하면 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다. 두통 어지러움 불안감 불면증 심장 두근거림 고혈압 소변 장애 설사 구토 복통 피부 발진 코푸정을 복용하고 이상 증상이 나타나면 즉시 복용을 중단하고 의사와 상담해야 합니다.

코푸정vs엘스테인캡슐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 엘테인은 erdostein성분이고 코푸정에는 Chlorpheniramine Maleate 1.5mg Dihydrocodeine Tartrate 5mg Dlmethylephedrine HCl 17.5mg Guaifenesin 50mg 성분이 들어있습니다 분류는 두가지 모두 진해거담제로 되어있지만 엘테인 거담제에 더 가깝습니다

배란통?인데 아랫배눌러도아픈가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배란기 동안에는 아랫배를 누르면 통증을 느낄 수 있습니다. 배란통은 배란 과정 중에 난소에서 난자가 방출되면서 발생하는 통증인데요. 이때 난소 주변 조직이 염증반응을 일으켜 민감해지고 부어오르게 됩니다. 따라서 아랫배 부위를 누르거나 압박을 가하면 염증으로 인해 민감해진 난소 주변 조직이 자극을 받아 통증이 유발될 수 있습니다.

불편한 점이 있어서 말씀드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 진료 받아보시기를 원하신다고 하면 내분비 내과에 가서서 호르몬에 대한 검사를 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다
노인분들 구역구토,안녕하세요 요약 1. 급성위염에 걸리면 언급한 증상인 조기팽만감 오심 증상 등이 생길 수 있습니다. 2. 대부분 감기의 후유증이나 약물 복용으로 나타날 수 있으며 3. 장기능도 같이 떨어지기 때문에 변이 약간 풀어지는 식으로 나올 수 있습니다. 4. 증상에 준해 약을 추가하거나 바꿔서 잡춰보시고 5. 그래도 지속되면 내시경을 해 보세요 급성 위염에 걸리면 명치 부위의 갑작스러운 통증 구역 구토 등이 발생하고 만성 위염의 경우 아무런 증상이 없기도 하며 소화불량증과 같은 상복부 동통 복부 팽만감 조기 팽만감 구역 속 쓰림 등이 발생할 수 있습니다. 건승하세요.

귀두 피부갈라짐?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 곤지름을 의심할 만한 소견은 없어보입니다. 일단 최대한 자극을 하지말고 연한 스테로이드 연고 발라주세요. 곤지름의 증상은 피부가 약간 올라온 상태이거나 편평한 모양을 하기도 하고 한 개 또는 여러 개가 같이 생기는 경우도 있습니다. 크기도 매우 다양하며 색깔은 분홍색이나 흰색을 띠게 된다. 곤지름은 부드럽고 건드리면 쉽게 피가 자기도 합니다. 때로는 아무 증상 없이 출혈이나 분비물만 나오는 사람도 있다. 임신 중에는 크기가 급격히 증가할 수 있습니다.

노인분들 구역구토,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사실 집에서 해주실수 있는 것은 별로 없어보입니다. 적절한 영양 공급이 필요한데 잘 못드시면 마시는 영양음료라도 드시게 해주세요. 자꾸토하면 입으로 먹는것은 어려울 수 있어요

불편한 점이 있어서 말씀드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 진료 받아보시기를 원하신다고 하면 내분비 내과에 가서서 호르몬에 대한 검사를 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다
라섹 후 헬스언제부터 가능할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 라섹 수술 후 헬스장에서 운동을 시작할 수 있는 적정 시기는 일반적으로 수술 후 68주 정도가 지난 뒤입니다. 하지만 개인에 따라 완전한 회복 정도가 다르므로 반드시 주치의나 전문의와 상의하여 건강상태를 확인한 후 운동 시작 시기를 결정하는 것이 좋습니다. 안압은 문제가 되지 않을 겁니다.

노인분들 구역구토,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사실 집에서 해주실수 있는 것은 별로 없어보입니다. 적절한 영양 공급이 필요한데 잘 못드시면 마시는 영양음료라도 드시게 해주세요. 자꾸토하면 입으로 먹는것은 어려울 수 있어요

무통 혈변 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 채핵 치질 에서 출혈이 있는 것으로 생각됩니다. 출혈이 계속되면 빈혈로 쓰러지는 경우도 있을 수 있으니 항문외과 진료 받아보श्य

노인분들 구역구토,안녕하세요 요약 1. 급성위염에 걸리면 언급한 증상인 조기팽만감 오심 증상 등이 생길 수 있습니다. 2. 대부분 감기의 후유증이나 약물 복용으로 나타날 수 있으며 3. 장기능도 같이 떨어지기 때문에 변이 약간 풀어지는 식으로 나올 수 있습니다. 4. 증상에 준해 약을 추가하거나 바꿔서 잡춰보시고 5. 그래도 지속되면 내시경을 해 보세요 급성 위염에 걸리면 명치 부위의 갑작스러운 통증 구역 구토 등이 발생하고 만성 위염의 경우 아무런 증상이 없기도 하며 소화불량증과 같은 상복부 동통 복부 팽만감 조기 팽만감 구역 속 쓰림 등이 발생할 수 있습니다. 건승하세요.

피부발진인지 두드러기인지 닭살인지 모르겠습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 닭살 모공 각화증이 의심됩니다 이것은 가렵지는 않지만 아토피와 동반이 잘되어 나타나니 가려워서 긁으면 상처나고 아프고 그런것이 아닌가 싶습니다

급격한 체중감소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구체적으로는 다음과 같은 경우를 급격한 체중감소로 정의합니다. 6개월 이내에 체중의 5 이상 감소한 경우 예를 들어 체중이 60kg이었다

면 6개월 안에 3kg 이상 감소 1년 이내에 체중의 10 이상 감소한 경우 예를 들어 체중이 70kg이었다면 1년 안에 7kg 이상 감소

배란일 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배란일 4일 후 관계는 임신 가능성이 있습니다. 배란일은 생리 시작일로부터 14일 전입니다. 따라서 5월 6일은 배란일이고 5월 10일은 배란일 4일 후입니다. 배란일 4일 후에는 임신 가능성이 있으므로 사후피임약을 먹는 것이 좋습니다. 사후피임약은 임신을 방지하기 위해 사용되는 약입니다. 사후피임약은 성관계 후 72시간 이내에 복용해야 효과가 있습니다. 사후피임약을 복용하면 임신 가능성이 줄어들지만 100% 효과가 있는 것은 아닙니다. 사후피임약을 복용하면 부작용이 나타날 수 있습니다. 가장 흔한 부작용은 구토 메스꺼움 두통 복통입니다. 사후피임약을 복용하기 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 의사는 사후피임약의 부작용과 효과에 대해 설명해줄 수 있습니다. 또한 사후피임약을 복용하기 전에 임신 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 임신을 원하지 않는다면 콘돔이나 피임약을 사용하는 것이 좋습니다. 콘돔과 피임약은 임신을 막을 수 있을 뿐만 아니라 성병을 예방할 수 있습니다. 임신은 여성의 삶에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 임신을 원하지 않는다면 사후피임약을 복용하기 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

유한양행 코푸정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유한양행에서 제작한 코정은 코감기 증상 완화에 효과가 있는 약입니다. 코정에는 에페드린염산염과 염산트라메타몰이 함유되어 있는데 에페드린염산염은 코막힘을 완화하고 염산트라메타몰은 통증을 완화하는 효과가 있습니다. 따라서 코정은 코감기 증상인 코막힘과 통증을 동시에 완화할 수 있습니다. 코정은 코감기 증상 완화에 효과가 있지만 다른 부위의 염증을 완화하는 효과는 없습니다. 따라서 코푸정을 복용한다고 해서 다른 부위의 염증이 완화되지는 않습니다. 코정을 복용하면 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다. 두통 어지러움 불안감 불면증 심장 두근거림 고혈압 소변 장애 설사 구토 복통 피부 발진 코푸정을 복용하고 이상 증상이 나타나면 즉시 복용을 중단하고 의사와 상담해야 합니다.

노인분들 구역구토,안녕하세요 요약 1. 급성위염에 걸리면 언급한 증상인 조기팽만감 오심 증상 등이 생길 수 있습니다. 2. 대부분 감기의 후유증이나 약물 복용으로 나타날 수 있으며 3. 장기능도 같이 떨어지기 때문에 변이 약간 풀어지는 식으로 나올 수 있습니다. 4. 증상에 준해 약을 추가하거나 바꿔서 잡해보시고 5. 그래도 지속되면 내시경을 해 보세요 급성 위염에 걸리면 명치 부위의 갑작스러운 통증 구역 구토 등이 발생하고 만성 위염의 경우 아무런 증상이 없기도 하며 소화불량증과 같은 상복부 동통 복부 팽만감 조기 팽만감 구역 속 쓰림 등이 발생할 수 있습니다. 건승하세요.

귀두 피부갈라짐?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 곤지름을 의심할 만한 소견은 없어보입니다. 일단 최대한 자극을 하지말고 연한 스테로이드 연고 발라주세요. 곤지름의 증상은 피부가 약간 올라온 상태이거나 편평한 모양을 하기도 하고 한 개 또는 여러 개가 같이 생기는 경우도 있습니다. 크기도 매우 다양하며 색깔은 분홍색이나 흰색을 띠게 된다. 곤지름은 부드럽고 건드리면 쉽게 피가 자기도 합니다. 때로는 아무 증상 없이 출혈이나 분비물만 나오는 사람도 있다. 임신 중에는 크기가 급격히 증가할 수 있습니다.

코푸정vs엘스테인캡슐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 엘테인은 erdosteine성분이고 코푸정에는 Chlorpheniramine Maleate 1.5mg Dihydrocodeine Tartrate 5mg Dlmethylephedrine HCl 17.5mg Guaifenesin 50mg 성분이 들어있습니다 분류는 두가지 모두 진해거담제로 되어있지만 엘테인 거담제에 더 가깝습니다

배란통?인데 아랫배눌러도아픈가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배란기 동안에는 아랫배를

누르면 통증을 느낄 수 있습니다. 배란통은 배란 과정 중에 난소에서 난자가 방출되면서 발생하는 통증인데요. 이때 난소 주변 조직이 염증반응을 일으켜 민감해지고 부어오르게 됩니다. 따라서 아랫배 부위를 누르거나 압박을 가하면 염증으로 인해 민감해진 난소 주변 조직이 자극을 받아 통증이 유발될 수 있습니다.

라섹 후 헬스언제부터 가능할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 라섹 수술 후 헬스장에서 운동을 시작할 수 있는 적정 시기는 일반적으로 수술 후 68주 정도가 지난 뒤입니다. 하지만 개인에 따라 완전한 회복 정도가 다르므로 반드시 주치의나 전문의와 상의하여 건강상태를 확인한 후 운동 시작 시기를 결정하는 것이 좋습니다. 안압은 문제가 되지 않을 겁니다.

이건 모낭일까요? 혹은 곤지름일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 애매하네요. 지금 보기에 모낭도 아닌것 같고 곤지름도 아닌것 같은데 초기 병변은 조직검사로 진단을 하기도 하니 진료 받아보셔요

목에 멸치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 멸치는 1cm 정도의 크기로 목에 박힐 정도의 크기는 아닙니다. 또한 멸치는 뼈가 단단하지 않고 부드러운 편이기 때문에 목에 박히더라도 뼈가 부러져서 흡입되거나 폐에 들어가는 일은 거의 없습니다. 따라서 아침에 멸치를 목으로 넘겼다고 해서 걱정할 필요는 없습니다. 멸치는 목에 박히지 않고 자연스럽게 내려갔을 가능성이 높습니다. 다만 멸치를 목으로 넘긴 후 통증이나 이물감이 느껴진다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

불편한 점이 있어서 말씀드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 진료 받아보시기를 원하신다고 하면 내분비 내과에 가셔서 호르몬에 대한 검사를 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다

허리 아플때 아웃 사이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한것은 평가를 통해 알수있지만 아웃사이 운동시 엉덩이 바깥쪽 활성화로 인해 허리 부담이 감소해 편해질 수 있습니다.

성조숙증인지 모르겠습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성조숙증은 사춘기 이전에 이차성징이 일찍 발현하는 것을 의미합니다. 따라서 성조숙증은 아닙니다 다른 불편함이없다면 그냥 지내보셔도 괜찮을 것 같습니다

돌출입인가요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안녕하세요 이제 교정 마지막 시긴데요 사랑니 4개를 다 제거해야 자리가 난다고하는데 돌출입 정도가 어느정도 인지 궁금해요 교정기 착용하고있어서 그런건지 아니면 교정기 제거 후엔 괜찮아 지려나요?? 교정기 제거를할지 입을 더 넣고 마무리할지 고민입니다 감사합니다 교정장치 제거해도 입모양은 큰 차이가 없습니다. 사랑니 빼고 뒤로 더 넣는게 나아보입니다.

치아가 왜 이럴까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아랫니가 저 부분만 색이 다르고.. 이를 만져보면 매끈하지가 않고 단차가 느껴진다고 해야할까요? 손톱이 탁 걸리는 느낌이에요. 흠이 파진 느낌? 왜 이러는 걸까요? 통증은 없어요 말씀하신 부분은 치석입니다 치과에 가서 스케일링 꼭 받으세요

사망후 갑자기 의식찾는게 의학적으로 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 라자로 증후군Lazarus syndrome은 심장이 멈췄다가 자발적으로 다시 뛰는 희귀한 현상입니다. 이 증후군은 성경에서 예수 그리스도가 죽은 라자로Lazarus를 다시 살린 사건에 비유하여 명명되었습니다. 라자로 증후군은 심폐소생술CPR이 실패한 후 발생하기 때문에 종종 사후 소생이라고도 합니다. 사망판정받고 갑자기 의식 찾으신분들은 현대 임상으로서는 설명가능하지 않습니다

친구에게 받은 알러지 약을 먹었는데 목이 막힌 느낌이 듭니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹은 약때문은 아니고 원래 땅콩 알러지가 있거나 공황장애 때문에 예민하게 반응하는 것이

아닌가 의심스럽습니다. 땅콩 아나필락시스도 의심됩니다

검은자 크기 달라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검은 눈동자의 크기가 달라지는 것은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 눈의 피로입니다. 눈을 많이 사용하거나 컴퓨터 화면을 오래 보게 되면 눈이 피로해지고 이로 인해 검은 눈동자의 크기가 달라질 수 있습니다. 또한 눈의 질환이나 외상 등으로 인해 검은 눈동자의 크기가 달라질 수 있습니다. 눈의 질환으로는 녹내장 백내장 안구건조증 등이 있으며 외상으로는 눈에 맞은 사고 등이 있습니다. 검은 눈동자의 크기가 달라졌다면 안과를 방문하여 정확한 진단을 받아보는 것이 좋습니다. 안과에서는 검은 눈동자의 크기를 측정하고 눈의 질환이나 외상을 확인할 수 있습니다. 검은 눈동자의 크기가 달라지는 것은 원인에 따라 치료 방법이 다릅니다. 눈의 피로가 원인이라면 휴식을 취하고 눈의 질환이나 외상이 원인이라면 적절한 치료를 받아야 합니다. 검은 눈동자의 크기가 달라지는 것은 일시적인 현상이라면 크게 걱정할 필요는 없습니다. 하지만 검은 눈동자의 크기가 달라지는 것이 지속된다면 안과를 방문하여 정확한 진단을 받아보는 것이 좋습니다.

오늘 목에 생선가시 박힘때문에 병원에 다녀 왔는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생선 가시가 목에 박히면 이물감이 느껴지고 침을 삼킬 때 통증이 생길 수 있습니다. 생선 가시가 목에 박히면 목이 붓고 염증이 생길 수 있으므로 가시를 제거하는 것이 중요합니다. 생선 가시를 제거하는 방법은 여러 가지가 있지만 가장 일반적인 방법은 핀셋을 이용하는 것입니다. 핀셋을 이용하여 생선 가시를 살살 눌러서 제거하면 됩니다. 핀셋을 이용하여 생선 가시를 제거할 때는 너무 세게 누르지 않도록 주의해야 합니다. 생선 가시를 제거한 후에도 이물감이 남아 있다면 병원에 가서 진료를 받아야 합니다. 병원에서는 생선 가시를 제거하고 염증을 치료할 수 있습니다. 생선 가시가 목에 박히면 목이 붓고 염증이 생길 수 있으므로 가시를 제거하는 것이 중요합니다. 생선 가시를 제거할 때는 핀셋을 이용하는 것이 가장 일반적인 방법입니다. 핀셋을 이용하여 생선 가시를 제거할 때는 너무 세게 누르지 않도록 주의해야 합니다. 생선 가시를 제거한 후에도 이물감이 남아 있다면 병원에 가서 진료를 받아야 합니다.

배란일 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배란일 4일 후 관계는 임신 가능성이 있습니다. 배란일은 생리 시작일로부터 14일 전입니다. 따라서 5월 6일은 배란일이고 5월 10일은 배란일 4일 후입니다. 배란일 4일 후에는 임신 가능성이 있으므로 사후피임약을 먹는 것이 좋습니다. 사후피임약은 임신을 방지하기 위해 사용되는 약입니다. 사후피임약은 성관계 후 72시간 이내에 복용해야 효과가 있습니다. 사후피임약을 복용하면 임신 가능성이 줄어들지만 100% 효과가 있는 것은 아닙니다. 사후피임약을 복용하면 부작용이 나타날 수 있습니다. 가장 흔한 부작용은 구토 메스꺼움 두통 복통입니다. 사후피임약을 복용하기 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 의사는 사후피임약의 부작용과 효과에 대해 설명해줄 수 있습니다. 또한 사후피임약을 복용하기 전에 임신 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 임신을 원하지 않는다면 콘돔이나 피임약을 사용하는 것이 좋습니다. 콘돔과 피임약은 임신을 막을 수 있을 뿐만 아니라 성병을 예방할 수 있습니다. 임신은 여성의 삶에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 임신을 원하지 않는다면 사후피임약을 복용하기 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

친구에게 받은 알러지 약을 먹었는데 목이 막힌 느낌이 듭니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹은 약때문은 아니고 원래 땅콩 알러지가 있거나 공황장애 때문에 예민하게 반응하는 것이 아닌가 의심스럽습니다. 땅콩 아나필락시스도 의심됩니다

치아가 왜 이럴까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아랫니가 저 부분만 색이 다르고.. 이를 만져보면 매끈하지가 않고 단차가 느껴진다고 해야할까요? 손톱이 탁 걸리는 느낌이에요. 흠

이 파진 느낌? 왜 이러는 걸까요? 통증은 없어요 말씀하신 부분은 치석입니다 치과에 가서 스케일링 꼭 받으세요

유한양행 코푸정,안녕하세요. 메디이즈입니다. 유한양행에서 제작한 코정은 코감기 증상 완화에 효과가 있는 약입니다. 코정에는 에페드린염산염과 염산트라메타몰이 함유되어 있는데 에페드린염산염은 코막힘을 완화하고 염산트라메타몰은 통증을 완화하는 효과가 있습니다. 따라서 코정은 코감기 증상인 코막힘과 통증을 동시에 완화할 수 있습니다. 코정은 코감기 증상 완화에 효과가 있지만 다른 부위의 염증을 완화하는 효과는 없습니다. 따라서 코푸정을 복용한다고 해서 다른 부위의 염증이 완화되지는 않습니다. 코정을 복용하면 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다. 두통 어지러움 불안감 불면증 심장 두근거림 고혈압 소변 장애 설사 구토 복통 피부 발진 코푸정을 복용하고 이상 증상이 나타나면 즉시 복용을 중단하고 의사와 상담해야 합니다.

사망후 갑자기 의식찾는게 의학적으로 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 라자로 증후군Lazarus syndrome은 심장이 멈췄다가 자발적으로 다시 뛰는 희귀한 현상입니다. 이 증후군은 성경에서 예수 그리스도가 죽은 라자로Lazarus를 다시 살린 사건에 비유하여 명명되었습니다. 라자로 증후군은 심폐소생술CPR이 실패한 후 발생하기 때문에 종종 사후 소생이라고도 합니다. 사망판정받고 갑자기 의식 찾으신분들은 현대 임상으로서는 설명가능하지 않습니다

목에 멸치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 멸치는 1cm 정도의 크기로 목에 박힐 정도의 크기는 아닙니다. 또한 멸치는 뼈가 단단하지 않고 부드러운 편이기 때문에 목에 박히더라도 뼈가 부러져서 흡입되거나 폐에 들어가는 일은 거의 없습니다. 따라서 아침에 멸치를 목으로 넘겼다고 해서 걱정할 필요는 없습니다. 멸치는 목에 박히지 않고 자연스럽게 내려갔을 가능성이 높습니다. 다만 멸치를 목으로 넘긴 후 통증이나 이물감이 느껴진다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

피부발진인지 두드러기인지 닭살인지 모르겠습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 닭살 모공 각화증이 의심됩니다 이것은 가렵지는 않지만 아토피와 동반이 잘되어 나타나니 가려워서 긁으면 상처나고 아프고 그런것이 아닌가 싶습니다

정맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부를 살살 문지르면 혈관이 늘어나지는 않습니다. 피부를 문지르면 혈액순환이 원활해져서 피부가 붉어질 수 있지만 이는 일시적인 현상일 뿐 혈관이 늘어난 것은 아닙니다. 정맥류는 정맥이 울퉁불퉁하게 튀어나오고 굵어지는 질환입니다. 정맥류는 주로 다리에 생기며 장시간 서 있거나 앉아 있는 자세를 취하는 경우 임신 비만 가족력 등이 위험 요소입니다. 정맥류를 예방하기 위해서는 다음과 같은 방법을 실천하는 것이 좋습니다. 앉거나 서 있는 자세를 오래 유지하지 않기 틈틈이 다리를 들어 올려 정맥에 혈액이 정체되지 않도록 하기 걷기 수영 자전거 타기 등 유산소 운동을 꾸준히 하기 체중을 관리하기 꽉 끼는 옷을 피하기 흡연을 피하기 정맥류는 초기에는 증상이 없지만 시간이 지나면서 통증 부종 피부 색깔 변화 피부 궤양 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 정맥류가 의심되는 경우 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

수술후 장유착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선 적출 수술은 복강경이나 로봇을 이용하여 전립선과 주변 조직을 제거하는 수술입니다. 수술 후 복벽에 유착이 생길 수 있으며 이는 복벽이 딱딱해지면서 움직임이 제한되는 것을 말합니다. 복벽에 유착이 생기면 복통이나 불편함을 느낄 수 있으며 배변 활동에도 영향을 줄 수 있습니다. 시티 검사에서 이상이 없다면 장유착으로 인한 증상은 아닐 가능성이 높습니다. 하지만 설사와 가스 차는 증상이 지속된다면

병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 설사와 가스 차는 증상은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 장유착 이외에도 과민성 대장 증후군 급성 장염 크론병 궤양성 대장염 등의 질환이 원인일 수 있습니다. 따라서 증상이 지속된다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

정맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부를 살살 문지르면 혈관이 늘어나지는 않습니다. 피부를 문지르면 혈액순환이 원활해져서 피부가 붉어질 수 있지만 이는 일시적인 현상일 뿐 혈관이 늘어난 것은 아닙니다. 정맥류는 정맥이 울퉁불퉁하게 튀어나오고 굵어지는 질환입니다. 정맥류는 주로 다리에 생기며 장시간 서 있거나 앉아 있는 자세를 취하는 경우 임신 비만 가족력 등이 위험 요소입니다. 정맥류를 예방하기 위해서는 다음과 같은 방법을 실천하는 것이 좋습니다. 앉거나 서 있는 자세를 오래 유지하지 않기 틈틈이 다리를 들어 올려 정맥에 혈액이 정체되지 않도록 하기 걷기 수영 자전거 타기 등 유산소 운동을 꾸준히 하기 체중을 관리하기 꽉 끼는 옷을 피하기 흡연을 피하기 정맥류는 초기에는 증상이 없지만 시간이 지나면서 통증 부종 피부 색깔 변화 피부 궤양 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 정맥류가 의심되는 경우 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

입가 주변 붉은기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 특별히 불편한 증상을 유발하지는 않지만 주 13회 정도 입술 양 끝부분의 붉은 피부병변이 나타나 고민스러우시군요. 구순구각염이 반복적으로 나타나는 상황이라 추정됩니다. 일종의 피부질환이므로 가까운 피부과를 방문하여 진찰을 받아보시기 바랍니다.

엘스테인캡슐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 엘스인캡슐은 가래를 배출하는 데에 도움을 주는 거담제에 속하는 약입니다. 항생제의 역할을 할 수 없고 염증에 대한 조절 역시 할 수 없습니다. 말씀하신 부분에 대한 효과가 필요한 경우 항생제나 소염진통제 스테로이드제 등을 따로 처방해야 하겠습니다.

항문성교 시,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성 매개 질환에 대한 우려가 있으신 상황으로 이해됩니다. 비뇨의학과나 항문외과를 방문해보실 필요가 있을 것으로 판단됩니다. 당장 이상이 없다면 경과를 지켜보다가 증상이 나타날 때 해당 의원을 방문해보시는 것도 방법이 되겠습니다.

근데 조영제로 인해 호흡곤란이 오면 뇌손상이 오나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제로 인해 알러지 반응으로 호흡곤란이 올 수 있고 만약 저산소증이 유발된 기간이 길어진다면 뇌손상이 올 수도 있지만 흔한 경우는 아닙니다.

항생제 설사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치루 수술 후 설사가 나타나는 상황이군요. 항생제를 1회 투약한 것으로 곧바로 설사가 유발되기는 어려우나 항생제가 설사의 원인이라고 하더라도 지금은 지사제를 복용하는 것보다는 오히려 설사를 하는게 더 낫습니다. 변이 단단해지면 배변 시 수술부위를 더 자극할 수 있고 이는 통증을 유발할 수 있습니다. 따라서 무른 변을 보고 잘 씻어내는 것이 더 낫다고 볼 수 있겠습니다.

조영제로 인해서 지능저하가 될수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제 부작용에 대해 걱정스러우시군요. 조영제는 알레르기반응과 같은 부작용을 유발할 수 있지만 말씀하신 지능 저하와 같은 부작용을 유발하지는 못합니다. 몸에 들어오면 24시간 이내에 대부분이 배설되어 사라지므로 영향이 오래 지속되지도 못합니다.

도대체 이걸 무슨 두드러기일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 갑작스레 나타난 광범위한 두드러기는 보통 알레르기 반응에 의한 것이라 추정하는 편입니다만 알레르기 외적인 원인으로 도 두드러기가 발생할 수 있습니다. 따라서 우선은 알레르기약을 복용해보시고 나아지지 않고

더 심해지거나 호흡이 어려워지는 증상 혹은 입술이 붓는 증상이 발생하면 병원을 방문하시기 바랍니다.

오늘 발톱을 좀 세게 부딪혀서 발톱 두군데에서 피가 나서 밴드를 붙이려고 발톱 상태를 확인해보니 피멍이 들었어요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱을 다친 상황이고 당장 병원을 방문하기 어렵지만 피멍이 들어 걱정스러우시군요. 피멍은 발톱 아래에서 출혈이 있었음을 의미하는데 출혈이 더 진행하여 발톱과 발가락에 압박을 가하지 않는다면 괜찮다고 볼 수 있습니다. 따라서 부풀어오르거나 압박감이 심해지지 않는지를 관찰하시고 발톱을 압박해두는 것이 지혈에 도움이 되므로 붕대나 밴드로 감싸보시기 바랍니다. 만약 불편감이 심해지면 병원을 방문하셔야 합니다.

정맥류 예방,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지정맥류 예방에 대한 질문으로 이해했습니다. 예방법은 유발요인을 피하는 것이 유효하며 말씀하신 일들보다는 오랜시간 같은 자세로 앉아있거나 서있는 일을 피하시는 것이 중요합니다. 이러한 자세를 부득이하게 유지해야 한다면 중간중간 자세를 바꾸고 다리를 굽혔다 펴는 등의 동작으로 하지의 정맥혈을 잘 순환시킬 필요가 있습니다. 혹은 압박스타킹을 사용하실수도 있겠습니다.

한쪽눈이 약간 뿌옇게 보입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 시야 혼탁이 있다면 유리체 질환이나 각막 질환에 대한 감별이 필요하므로 증상이 지속되고 있다면 안과 진료를 보시기 바랍니다.

생리인가요 부정출혈인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정 출혈은 생리 기간 이외의 출혈을 의미하므로 생리 전후 출혈은 부정 출혈보다는 생리혈로 보는 것이 보통 일반적입니다.

사타구니에 생겼습니다 쥐젖인가요? 곤지름인가요? 다른건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조직검사를 해봐야 정확하게 알수 있을 것 같습니다. 보기에는 쥐젖의 가능성이 높아보이니 제거하시면 될 것 해결될겁니다

근데 조영제로 인해 호흡곤란이 오면 뇌손상이 오나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제로 인해 알려진 반응으로 호흡곤란이 올 수 있고 만약 저산소증이 유발된 기간이 길어진다면 뇌손상이 올 수도 있지만 흔한 경우는 아닙니다.

충치 치료 시 레진으로 때운 그 부분은 절대 썩지 않나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 레진으로 치료한 부분도 시간이 지나 마모가 되거나 틈사이 균열이 발생하면 충치가 발생할 수 있어 꾸준한 관리가 필요합니다.

선생님 혈당이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈당의 변동은 당뇨병 환자에서 흔하게 관찰됩니다. 이것만으로 혈당을 조절하기는 어려운 일반적으로 당화혈색소가 조절이 잘 되고 있다면 약을 변경할 이유는 없습니다.

정맥류 예방,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지정맥류 예방에 대한 질문으로 이해했습니다. 예방법은 유발요인을 피하는 것이 유효하며 말씀하신 일들보다는 오랜시간 같은 자세로 앉아있거나 서있는 일을 피하시는 것이 중요합니다. 이러한 자세를 부득이하게 유지해야 한다면 중간중간 자세를 바꾸고 다리를 굽혔다 펴는 등의 동작으로 하지의 정맥혈을 잘 순환시킬 필요가 있습니다. 혹은 압박스타킹을 사용하실수도 있겠습니다.

사타구니에 생겼습니다 쥐젖인가요? 곤지름인가요? 다른건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조직검사를 해봐야 정확하게 알수 있을 것 같습니다. 보기에는 쥐젖의 가능성이 높아보이니 제거하시면 될 것 해결될겁니다

포피소대 굳은살?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 끊어지고 조직이 재생되면서 흉터가 남은 흔적입니다. 제거는 불가능 합니다. 연고 도포하면서 지켜보시기 바랍니다.

소변 볼 때 혈뇨 통증 문제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요관결석 위치에 따라서 증상이 다양하게 나타납니다. 결석이 배출 안되고 방광 근처에 걸려있으면 지속적인 배뇨증상이 나타날 수 있습니다. 고환 통증도 나타날 수 있고 요도 통증 빈뇨 급박뇨 대변 마려운 느낌 등등의 자극증상이 나타날 수 있습니다. 결석에 의한 급격한 옆구리 통증과 혈뇨가 반복될 수 있으니 자연 배출을 위해 물 많이 마시고 열심히 뛰어다니십시오.

교감 부교감신경,안녕하세요. 메디이즈입니다. 교감 부교감 설명을 들으셨다면 흔히 하는 자율신경계 기능검사를 하셨을 거 같습니다. 둘 다 항진되어 있는 결과가 나오는 수는 없고 균형이 맞아있다고 보면 됩니다.

건강검진 결과에 관해,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검사당일에는 결과가 안나왔는데 이상이 있는지 없는지 어떻게 알 수 있나요? 검진의 목적은 이상을 조기발견해서 치료를 빨리 하자는 것입니다 폐는 엑스레이를 확인해봐야하고 빈혈은 추가검사를 통해 원인을 확인하고 혈당은 더 높아지지 않도록 관리가 필요하고 이상지혈증은 추적 검사가 필요합니다.

성관계 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변으로 시행하는 성병 PCR 검사는 정확도가 낮은 편입니다. 검사에서 음성이더라도 증상이 있다면 추후 재검이 필요합니다.

사타구니주변에 뭐가 생겼습니다.. 사마귀인가요 쥐젖인가요 뭐가요?...안녕하세요. 메디이즈입니다. 사마귀 쥐젖 등 다양한 질환 가능성이 있지만 육악으로 병변을 확인해야 정확한 답변이 가능하겠습니다. 사진 등을 올려주시면 좋겠습니다.

턱에 붉게 올라왔는데 이게 뭐가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 모낭염으로 보입니다. 통증이 심해지거나 병변이 커진다면 항생제 등 약물 치료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

안구손상 환자 MRI 찍어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안구손상으로 문제가 있다고 하더라도 mri 나 ct 촬영에 지장이 있을 것 같지는 않습니다. 촬영전 주치의 선생님과 다시 상의해보셔요

성기 근처에 이렇게 생겼는데 혹시 성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 4월초에 피가 적어서.. 생리가 아닌 경미한 출혈일 가능성도 있겠네요. 임신테스트기는 관계를 가지고 보통 2주가 지나야 나타나니 지금 한번 다시 해보시는게 좋겠습니다.

복부대동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부대동맥류가 어느정도인지는 알 수는 없지만 하지직거상운동은 복부에 힘이 들어가서 대동맥류를 악화시킬 위험이 있겠네요. 담당선생님과 상의하여 복부에 부담을 주지 않는 운동 걷기나 수영에 대해 의논하는게 좋겠네요.

수술후 장유착,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선 적출 수술은 복강경이나 로봇을 이용하여 전립선과 주변 조직을 제거하는 수술입니다. 수술 후 복벽에 유착이 생길 수 있으며 이는 복벽이 딱딱해지면서 움직임이 제한되는 것을 말합니다. 복벽에 유착이 생기면 복통이나 불편함을 느낄 수 있으며 배변 활동에도 영향을 줄 수 있습니다. 시티 검사에서 이상이 없다면 장유착으로 인한 증상은 아닐 가능성이 높습니다. 하지만 설사와 가스 차는 증상이 지속된다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 설사와 가스 차는 증상은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 장유착 이외에도 과민성 대장 증후군 급성 장염 크론병 궤양성 대장염 등의 질환이 원인일 수 있습니다. 따라서 증상이 지속된다면 병원을 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

조영제를 맞은 다음에 사망할수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제에의한 사망은 매우 드뭅니다. 가장 치명적인 것은 조영제에 의한 아나필락시스 쇼크에 의한 것이 있겠네요. 조영제에 의한 알레르기 반응이 있거나 의심된다면 조영제 주기 전에 항알레르기약을 먼저 복용하면 예방이 가능합니다.

테스트기 다시 해도...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 희미하게 보이는 선은 오류일 가능성이 커서.. 나중에 다시 한번 더 확인해보시는게 좋겠네요. 혼란스럽고 걱정된다면 병원에가서 소변 및 혈액검사를 하는 것도 좋겠습니다. 보통 관계이후 한달내는 음성이 나오는 경우가 많아서 이번달 말까지는 기다려봐야 할것 같네요. 자세한것은 근처 산부인과에서 상담을 받아보시길 권해드립니다.

발목 아킬레스건쪽 힘줄이 부었어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아킬레스건은 장딴지근과 가자미근의 힘줄부분으로 언급한 근육들의 혈행이 호전되고 단축이 해소되어야 치료가 됩니다. 약간의 활동제한을 하면서 치료에 전념하시기 바랍니다.

키가 잘 안 크는것 같습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뼈성장이 지금 빨라졌는지는 검사로 확인해보셨나요 키 예측을 정확하게 할 수는 없습니다 키 크는 방법 과학적 근거와 건강한 생활 습관 1. 성장 과정 및 영향 요인 인간의 키는 크게 유전적 요인과 환경적 요인의 영향을 받습니다. 유전적 요인 부모로부터 물려받은 유전자는 키 결정에 중요한 역할을 하며 전체 키의 약 6080 정도를 차지한다고 알려져 있습니다. 환경적 요인 영양 운동 수면 스트레스 등 다양한 환경적 요인들은 나머지 2040의 키 결정에 영향을 미칩니다. 특히 성장기에 충분한 영양 섭취 규칙적인 운동 충분한 수면을 취하는 것은 키 성장에 중요한 역할을 합니다. 또한 스트레스를 줄이고 건강한 생활 습관을 유지하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 2. 성장 촉진에 위한 과학적 근거 기반 방법 다음은 과학적 근거를 바탕으로 키 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 방법입니다. 1 충분한 영양 섭취 단백질 성장에 필수적인 아미노산을 공급하며 근육과 뼈 성장에 중요한 역할을 합니다. 닭고기 생선 계란 콩류 유제품 등이 풍부한 단백질 공급원입니다. 칼슘 뼈 성장에 필수적인 미네랄이며 우유 치즈 요거트 뼈가 있는 생선연어 정어리 등 등에서 섭취할 수 있습니다. 비타민 D 칼슘 흡수를 돕고 뼈 성장을 촉진하는 비타민입니다. 햇빛 노출 비타민 D 강화 우유 생선 간 기름 등에서 섭취할 수 있습니다. 2 규칙적인 운동 유산소 운동 달리기 수영 자전거 타기 등의 유산소 운동은 심폐 기능 향상과 더불어 성장호르몬 분비를 촉진하여 키 성장에 도움이 됩니다. 스트레칭 운동 척추를 늘리고 자세 교정에 도움을 주는 스트레칭 운동은 골격 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 3 충분한 수면 성장호르몬 분비 성장호르몬은 주로 깊은 수면 중에 분비되므로 충분한 수면은 성장호르몬 분비를 촉진하여 키 성장에 도움이 됩니다. 수면 시간 청소년의 경우 하루 810시간 정도의 충분한 수면을 취하는 것이 좋습니다. 4 스트레스 관리 만성적인 스트레스는 성장호르몬 분비를 감소시키고 키 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 스트레스 해소 방법 명상 요가 음악 감상 등 스트레스를 해소하는 방법을 꾸준히 실천하는 것이 좋습니다.

원인이 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 정확한 진단은 어렵습니다. 의심되면 검사를 통해 확인해보시는 것이 좋겠습니다. 검사전에 약물치료를 시도 해볼수 있습니다. 치료해서 반응이 있으면 있다고 생각할 수 있습니다 심장에 문제가 있는지도 검사를 해봐야 알 수 있습니다

키가 잘 안 크는것 같습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뼈성장이 지금 빨라졌는지는 검사로 확인해보셨나요 키 예측을 정확하게 할 수는 없습니다 키 크는 방법 과학적 근거와 건강한 생활 습관 1. 성장 과정 및 영향 요인 인간의 키는 크게 유전적 요인과 환경적 요인의 영향

을 받습니다. 유전적 요인 부모로부터 물려받은 유전자는 키 결정에 중요한 역할을 하며 전체 키의 약 6080 정도를 차지한다고 알려져 있습니다. 환경적 요인 영양 운동 수면 스트레스 등 다양한 환경적 요인들은 나머지 2040의 키 결정에 영향을 미칩니다. 특히 성장기에 충분한 영양 섭취 규칙적인 운동 충분한 수면을 취하는 것은 키 성장에 중요한 역할을 합니다. 또한 스트레스를 줄이고 건강한 생활 습관을 유지하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 2. 성장 촉진을 위한 과학적 근거 기반 방법 다음은 과학적 근거를 바탕으로 키 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 방법입니다. 1 충분한 영양 섭취 단백질 성장에 필수적인 아미노산을 공급하며 근육과 뼈 성장에 중요한 역할을 합니다. 닭고기 생선 계란 콩류 유제품 등이 풍부한 단백질 공급원입니다. 칼슘 뼈 성장에 필수적인 미네랄이며 우유 치즈 요거트 뼈가 있는 생선연어 정어리 등 등에서 섭취할 수 있습니다. 비타민 D 칼슘 흡수를 돕고 뼈 성장을 촉진하는 비타민입니다. 햇빛 노출 비타민 D 강화 우유 생선 간 기름 등에서 섭취할 수 있습니다. 2 규칙적인 운동 유산소 운동 달리기 수영 자전거 타기 등의 유산소 운동은 심폐 기능 향상과 더불어 성장호르몬 분비를 촉진하여 키 성장에 도움이 됩니다. 스트레칭 운동 척추를 늘리고 자세 교정에 도움을 주는 스트레칭 운동은 골격 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 3 충분한 수면 성장호르몬 분비 성장호르몬은 주로 깊은 수면 중에 분비되므로 충분한 수면은 성장호르몬 분비를 촉진하여 키 성장에 도움이 됩니다. 수면 시간 청소년의 경우 하루 810시간 정도의 충분한 수면을 취하는 것이 좋습니다. 4 스트레스 관리 만성적인 스트레스는 성장호르몬 분비를 감소시키고 키 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 스트레스 해소 방법 명상 요가 음악 감상 등 스트레스를 해소하는 방법을 꾸준히 실천하는 것이 좋습니다.

건강검진 결과에 관해,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검사당일에는 결과가 안나왔는데 이상이 있는지 없는지 어떻게 알 수 있나요? 검진의 목적은 이상을 조기발견해서 치료를 빨리 하자는 것입니다 폐는 엑스레이를 확인해봐야하고 빈혈은 추가검사를 통해 원인을 확인하고 혈당은 더 높아지지 않도록 관리가 필요하고 이상지혈증은 추적 검사가 필요합니다.

키가 잘 안 크는것 같습니다....안녕하세요. 메디이즈입니다. 뼈성장이 지금 빨라졌는지는 검사로 확인해보셨나요 키 예측을 정확하게 할 수는 없습니다 키 크는 방법 과학적 근거와 건강한 생활 습관 1. 성장 과정 및 영향 요인 인간의 키는 크게 유전적 요인과 환경적 요인의 영향을 받습니다. 유전적 요인 부모로부터 물려받은 유전자는 키 결정에 중요한 역할을 하며 전체 키의 약 6080 정도를 차지한다고 알려져 있습니다. 환경적 요인 영양 운동 수면 스트레스 등 다양한 환경적 요인들은 나머지 2040의 키 결정에 영향을 미칩니다. 특히 성장기에 충분한 영양 섭취 규칙적인 운동 충분한 수면을 취하는 것은 키 성장에 중요한 역할을 합니다. 또한 스트레스를 줄이고 건강한 생활 습관을 유지하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 2. 성장 촉진을 위한 과학적 근거 기반 방법 다음은 과학적 근거를 바탕으로 키 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 방법입니다. 1 충분한 영양 섭취 단백질 성장에 필수적인 아미노산을 공급하며 근육과 뼈 성장에 중요한 역할을 합니다. 닭고기 생선 계란 콩류 유제품 등이 풍부한 단백질 공급원입니다. 칼슘 뼈 성장에 필수적인 미네랄이며 우유 치즈 요거트 뼈가 있는 생선연어 정어리 등 등에서 섭취할 수 있습니다. 비타민 D 칼슘 흡수를 돕고 뼈 성장을 촉진하는 비타민입니다. 햇빛 노출 비타민 D 강화 우유 생선 간 기름 등에서 섭취할 수 있습니다. 2 규칙적인 운동 유산소 운동 달리기 수영 자전거 타기 등의 유산소 운동은 심폐 기능 향상과 더불어 성장호르몬 분비를 촉진하여 키 성장에 도움이 됩니다. 스트레칭 운동 척추를 늘리고 자세 교정에 도움을 주는 스트레칭 운동은 골격 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 3 충분한 수면 성장호르몬 분비 성장호르몬은 주로 깊은 수면 중에 분비되므로 충분한 수면은 성장호

르몬 분비를 촉진하여 키 성장에 도움이 됩니다. 수면 시간 청소년의 경우 하루 810시간 정도의 충분한 수면을 취하는 것이 좋습니다. 4 스트레스 관리 만성적인 스트레스는 성장호르몬 분비를 감소시키고 키 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 스트레스 해소 방법 명상 요가 음악 감상 등 스트레스를 해소하는 방법을 꾸준히 실천하는 것이 좋습니다.

복부대동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복부대동맥류가 어느정도인지는 알 수는 없지만 하지직거상운동은 복부에 힘이 들어가서 대동맥류를 악화시킬 위험이 있겠네요. 담당선생님과 상의하여 복부에 부담을 주지 않는 운동 걷기나 수영에 대해 의논하는게 좋겠네요.

테스트기 다시 해도...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 희미하게 보이는 선은 오류일 가능성이 커서.. 나중에 다시 한번 더 확인해보시는게 좋겠네요. 혼란스럽고 걱정된다면 병원에가서 소변 및 혈액검사를 하는 것도 좋겠습니다. 보통 관계이후 한달내는 음성이 나오는 경우가 많아서 이번달 말까지는 기다려봐야 할것 같네요. 자세한것은 근처 산부인과에서 상담을 받아보시길 권해드립니다.

발목 아킬레스건쪽 힘줄이 부었어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아킬레스건은 장딴지근과 가자미근의 힘줄부분으로 언급한 근육들의 혈행이 호전되고 단축이 해소되어야 치료가 됩니다. 약간의 활동제한을 하면서 치료에 전념하시기 바랍니다.

사랑니제거 후 볼 신경 이상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경과 진찰도 받아보시기 바랍니다. 어떤 확실한 치료가 있는것보다는 치료 가능한 다른 문제들을 확인하는 과정이 필요합니다. 그 과정에 고가의 검사가 필요치는 않습니다.

책상에 부딪히고 크게 부어올랐습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 바로 병원에 가서서 초음파 검사로 뽑아내야할 성분일지를 보고 혈종이 확인되면 천자를 해주는게 좋습니다. 오래두면 섬유화가 되어 만성화가 될 수 있습니다.

상악동 거상 술 후 잇몸 터짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어제 상악동 거상술을 받았습니다 뼈 이식 까지 해었는데 실밥이 혀를 너무 찌르고 쏠려서 혀가 너무 아파서 수술부위 사진을 찍어보니 잇몸이 터진듯한 하얀 무언가도 보이고 잘못 ㄷ된건가요? 사진 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다만 터진 것으로 보이진 않습니다. 양치질 하실 때 주의하시고 치과에 가서서 체크 한번 받아보시면 좋으실 듯 합니다.

진짜 제 성기 좀 살려주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이걸 너무 잦은 자위행위후 비누나 세제를 사용해 씻을때 생기는 현상입니다. 병은 아닙니다. 비누나 세제 사용을 중지 하고 물로만 씻도록 해보고 자위도 너무 자주 하지 않도록 해보시고 보습제를 자주 발라주면 좋습니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 4월초에 피가 적어서.. 생리가 아닌 경미한 출혈일 가능성도 있겠네요. 임신테스트기는 관계를 가지고 보통 2주가 지나야 나타나니 지금 한번 다시 해보시는게 좋겠습니다.

헤르페스 피검사 결과 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 댓글주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

조영제를 맞은 다음에 사망할수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제에의한 사망은 매우 드뭅니다. 가장 치명적인 것은 조영제에 의한 아나필락시스 쇼크에 의한 것이 있겠네요. 조영제에 의한 알레르기 반응이 있거나 의심된다면 조영제 주기 전에 항알레르기약을 먼저 복용하면 예방이 가능합니다.

정맥류 예방,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지정맥류 예방에 대한 질문으로 이해했습니다. 예

방법은 유발요인을 피하는 것이 유효하며 말씀하신 일들보다는 오랜시간 같은 자세로 앉아있거나 서있는 일을 피하시는 것이 중요합니다. 이러한 자세를 부득이하게 유지해야 한다면 중간중간 자세를 바꾸고 다리를 굽혔다 펴는 등의 동작으로 하지의 정맥혈을 잘 순환시킬 필요가 있습니다. 혹은 압박스타킹을 사용하실수도 있겠습니다.

정맥류 예방,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지정맥류 예방에 대한 질문으로 이해했습니다. 예방법은 유발요인을 피하는 것이 유효하며 말씀하신 일들보다는 오랜시간 같은 자세로 앉아있거나 서있는 일을 피하시는 것이 중요합니다. 이러한 자세를 부득이하게 유지해야 한다면 중간중간 자세를 바꾸고 다리를 굽혔다 펴는 등의 동작으로 하지의 정맥혈을 잘 순환시킬 필요가 있습니다. 혹은 압박스타킹을 사용하실수도 있겠습니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네. 두 항생제는 종류가 다른 계열이라서 같이 사용합니다. 두 항생제를 같이 사용한다면 더 넓은 범위의 세균을 커버할 수 있겠네요. 그래도 항생제 두종류 다 주는데 걱정되어 둘 중에 하나만 하시다면 일단 주사 항생제만 사용하시는게 좋겠습니다.

목 막히는 느낌,안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성식도염이 진단되었어도 약물PPI제제?에도 효과가 없어서 고민이시군요. 위내시경을 통해 어느정도 심한지 여부를 확인해보시고요. PPI제제ex. 란스톤 효과 없으면 보통 먼저 약용량을 2배로 올려서 처방을 합니다. 그리고 다른 위산제나 위보호제를 추가로 처방하기도 하는데요. 물론 평소에 식이조절이나 복압이 올라가지 않도록 주의해야 하겠죠. 그래도 효과가 없다면 24시간 PH보행식도검사를 통해 정말 GERD인지 여부를 정확하게 확인해보실수 있습니다. 정 안되면 식도하부괄약근 수술을 할 수도 있는데.. 자세한 것은 소화기내과 선생님과 상담하고 결정하는게 좋겠습니다.

PIVKaII 정상범위가 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. PIVKaII는 간암의 조기 진단에 사용되는 검사로 간암이 있을 경우 PIVKaII 수치가 정상 범위보다 높게 나옵니다. 하지만 PIVKaII 수치가 정상 범위보다 높다고 해서 무조건 간암이 있는 것은 아니며 다른 간 질환이나 간 손상도 PIVKaII 수치를 상승시킬 수 있습니다. 따라서 PIVKaII 수치가 높게 나왔다면 간암을 의심해볼 수 있지만 정확한 진단을 위해서는 간 조직 검사가 필요합니다. 혈관종은 간세포가 비정상적으로 증식하여 생긴 종양으로 대부분 양성이지만 간암으로 진행할 가능성도 있어 주의가 필요합니다. 국소염증성병변은 간세포의 염증과 괴사가 동반된 병변으로 간암과 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 체중감소 상복부복통 등허리통증 지방변 미식거림 등의 증상은 다양한 원인으로 발생할 수 있으며 간암의 증상으로 나타날 수도 있습니다. 하지만 증상만으로 간암을 진단할 수는 없으며 정확한 진단을 위해서는 검사가 필요합니다. 따라서 PIVKaII 수치가 높게 나왔다면 간암을 의심해볼 수 있지만 정확한 진단을 위해서는 간 조직 검사가 필요합니다. 또한 체중감소 상복부복통 등허리통증 지방변 미식거림 등의 증상이 있다면 정확한 진단을 위해 병원을 방문하여 검사를 받아보시기 바랍니다.

임플라논 시술 후 복약상담,안녕하세요. 메디이즈입니다. 호르몬 수치를 일정하게 맞춰주는 시술을 하셨군요 35일 정도의 복용은 크게 문제가 없습니다 혹시나 걱정되신다면 슈다페드정을 반만 잘라서 드심을 추천드리겠습니다 호르몬 요법은 체중을 꼭 신경쓰셔야 하니 식습관도 잘 정립하시기를 바랍니다 건강하세요

곤지름 정말 아닌가요..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 진주양구진으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

임신의심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 상황에서는 임신 가능성을 가장 먼저 감별해야 하

므로 반드시 임신테스트기를 사용하여 임신 여부를 확인해 보시기 바랍니다.

영상검사 문의드립니다. 영상의학과내과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담낭의 아주 작은 병변 일 경우 초음파가 더 정확하게 관찰이 되는 경우도 있습니다. 따라서 초음파 검사와 MRI 검사를 함께 고려하여 판단합니다.

옴 일상생활,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 증상이 없다면 일상 생활이 가능하며 격리는 필요하지 않습니다. 피부과 담당의와 상의하여 결정하시는 것을 권해드립니다.

안구손상 환자 MRI 찍어도 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안구손상으로 문제가 있다고 하더라도 mri 나 ct 촬영에 지장이 있을 것 같지는 않습니다. 촬영전 주치의 선생님과 다시 상의해보셔요

가슴 멍울...안녕하세요. 메디이즈입니다. 양성 결절이 악성화될 수도 있고 이전 조직검사에서 양성이더라도 크기가 커진다면 재조직검사나 제거가 필요합니다. 시술 후 검사 결과를 확인해야 합니다.

피임약 중단했는데 임신가능성있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약은 중단하면 배란이 이루어지게 되며 정자는 자궁 내에서 1주일 가까이 생존할 수 있어 확률은 낮지만 임신 가능성은 있습니다.

왼쪽 발 중창이 아프기 시작하더니 일안하게 되었는데 안할때는 움직이긴 계속했는데 발 중창,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 족욕을 좀 해보시고 발가락 발목 스트레칭 하면서 까치발로 걷기 해보셔요 그래도 좋아지지 않거나 심해지면 진료 받아보셔요

자위 후 부정출혈이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 직접진찰을 받아보시는 것이 좋겠습니다. 자기위로행위 이후 출혈은 상처가 나서 출혈이 생긴것이 아닌지 의심스럽습니다

귀 통증 후 눈 밑 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만가지고 진단을 하면 오진의 가능성이 있습니다. 증상이 자꾸변하고 있어서 직접 진찰을 받아보시는것이 좋겠습니다

지루성 피부염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 세안 직후에 유분기가 가장 없을 때 가장 가렵고 이따금씩 몸에도 같은 증상이 나타나는지 아닌지에 따라서 지루성 피부염이나 아니냐가 결정되는 것은 아닙니다. 진료 받아보셔요

우울증 관련 정신과 방문 조언 부탁드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정진건강의학과 진료를 볼 때 담당의에게 자신의 증상을 있는 그대로 이야기하시면 됩니다. 담당의와 대화를 나누다는 생각으로 진료를 보러 가면 됩니다.

치루 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술후에 치유과정에서 나타나는 증상으로 생각됩니다. 많이 불편하시면 전화로 문의 한번 해보시는 것을 권합니다 미리 한번 가보셔도 되구요

책상에 부딪히고 크게 부어올랐습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 바로 병원에 가서서 초음파 검사로 뽑아내야할 성분일지를 보고 혈종이 확인되면 천자를 해주는게 좋습니다. 오래두면 섬유화가 되어 만성화가 될 수 있습니다.

초음파 검사에서는 별 위험 없어보였는데 혈액 검사로 난소암 발견되기도 하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초기 난소암은 초음파에서 관찰되지 않는 경우도 있으며 자궁내막증이 심해도 상기 수치는 상승할 수 있습니다. CT나 MRI 검사 받아보시기 바랍니다.

피부에 이상없는데 가려움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오래된 증상이니 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 만성 가려움증의 원인은 다양합니다. 피부질환 아토피 피부염 건선 습진 등의 피부질환이 가려움증을 유발할 수 있습니다. 내과질환 당뇨병 만성신부전증 갑상선기능항진증 빈혈 등의 내과질환이 가려움증을 유발할 수 있습니다. 정신과질환 스트레스 불안장애 우울증 등의 정신과질환이 가려움증을 유발할 수 있습니다. 기타 약물 부작용 노화 등이 가려

움증을 유발할 수 있습니다.

PIVKaII 정상범위가 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. PIVKaII는 간암의 초기 진단에 사용되는 검사로 간암이 있을 경우 PIVKaII 수치가 정상 범위보다 높게 나옵니다. 하지만 PIVKaII 수치가 정상 범위보다 높다고 해서 무조건 간암이 있는 것은 아니며 다른 간 질환이나 간 손상도 PIVKaII 수치를 상승시킬 수 있습니다. 따라서 PIVKaII 수치가 높게 나왔다면 간암을 의심해볼 수 있지만 정확한 진단을 위해서는 간 조직 검사가 필요합니다. 혈관종은 간세포가 비정상적으로 증식하여 생긴 종양으로 대부분 양성이지만 간암으로 진행할 가능성도 있어 주의가 필요합니다. 국소염증성병변은 간세포의 염증과 괴사가 동반된 병변으로 간암과 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 체중감소 상복부복통 등허리통증 지방변 미식거림 등의 증상은 다양한 원인으로 발생할 수 있으며 간암의 증상으로 나타날 수도 있습니다. 하지만 증상만으로 간암을 진단할 수는 없으며 정확한 진단을 위해서는 검사가 필요합니다. 따라서 PIVKaII 수치가 높게 나왔다면 간암을 의심해볼 수 있지만 정확한 진단을 위해서는 간 조직 검사가 필요합니다. 또한 체중감소 상복부복통 등허리통증 지방변 미식거림 등의 증상이 있다면 정확한 진단을 위해 병원을 방문하여 검사를 받아보시기 바랍니다.

피부에 이상없는데 가려움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오래된 증상이니 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 만성 가려움증의 원인은 다양합니다. 피부질환 아토피 피부염 건선 습진 등의 피부질환이 가려움증을 유발할 수 있습니다. 내과질환 당뇨병 만성신부전증 갑상선기능항진증 빈혈 등의 내과질환이 가려움증을 유발할 수 있습니다. 정신과질환 스트레스 불안장애 우울증 등의 정신과질환이 가려움증을 유발할 수 있습니다. 기타 약물 부작용 노화 등이 가려움증을 유발할 수 있습니다.

의사 선생님 표지낭종 터진거 메디폼 붙일까요 말까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 메디폼은 붙이지 않아도 될것 같습니다. 간단히 소독하고 항생제 연고 바르고 밴드나 거즈붙여서 보호해 주시면 될것 같습니다.

살 빠짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임상적으로 의미있는 체중 감소란 일반적으로 612개월 동안 체중의 5 이상또는 4.5kg의 체중이 감소한 경우를 말합니다.

질문자 요청에 의한 삭제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물로 씻으면 가렵다가 안가렵다로 지루성 피부염이나 아나카를 구분하지는 않지만 물닿고 문지르면 가려울수 있습니다.

니메겐 복용중 특정 화장품 사용시 부작용이 없는지 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 니젠은 이소트레티노인 성분의 여드름약인데 지금 사용하시는 레티노이드 함유 앰플 사용하시는데 문제는 없을 것으로 생각됩니다

초음파 검사에서는 별 위험 없어보였는데 혈액 검사로 난소암 발견되기도 하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초기 난소암은 초음파에서 관찰되지 않는 경우도 있으며 자궁내막증이 심해도 상기 수치는 상승할 수 있습니다. CT나 MRI 검사 받아보시기 바랍니다.

옴 일상생활,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 증상이 없다면 일상 생활이 가능하며 격리는 필요하지 않습니다. 피부과 담당의와 상의하여 결정하시는 것을 권해드립니다.

과도한 자위행위로 인한 정신문제...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과도한 자위행위로 인한 정신문제는 실제로 존재합니다. 과도한 자위행위는 성적 흥분을 위해 뇌에 과도한 자극을 주게 되는데 이로 인해 뇌가 피로해지고 과도한 스트레스를 받게 됩니다. 이로 인해 기억력 저하 학습 능력 저하 일상에 대한 반응 저하 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 과도한 자위행위로 인한 정신문제를 해결하기 위해서는 우선 자위행위를 줄여야 합니다. 자위행위를 줄이면 뇌의 과도한 자극이 줄어들고 뇌가 회복할 수 있습니다. 또한 규칙적인 운동과 균형 잡힌 식사를

통해 뇌를 건강하게 유지해야 합니다. 스트레스를 줄이기 위해 명상이나 요가 등의 활동을 하는 것도 도움이 됩니다. 만약 과도한 자위행위로 인한 정신문제가 심각한 경우 병원을 방문하여 전문적인 치료를 받는 것이 좋습니다. 병원에서는 약물 치료와 심리 치료를 통해 증상을 완화할 수 있습니다. 과도한 자위행위로 인한 정신문제는 충분히 치료할 수 있는 질환입니다. 과도한 자위행위를 줄이고 규칙적인 운동과 균형 잡힌 식사를 통해 뇌를 건강하게 유지하며 스트레스를 줄이기 위해 명상이나 요가 등의 활동을 하는 것만으로도 증상을 완화할 수 있습니다. 만약 증상이 심각한 경우 병원을 방문하여 전문적인 치료를 받는 것이 좋습니다.

옴 일상생활,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 증상이 없다면 일상 생활이 가능하며 격리는 필요하지 않습니다. 피부과 담당의와 상의하여 결정하시는 것을 권해드립니다.

이것도 헤르페스인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 조금 선명하지 않은데 입술에 여러개의 수포가 잡히는 것으로 미루어 헤르페스1형 단순포진이 의심됩니다.

우울증 관련 정신과 방문 조언 부탁드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 정진건강의학과 진료를 볼 때 담당의에게 자신의 증상을 있는 그대로 이야기하시면 됩니다. 담당의와 대화를 나누는 생각으로 진료를 보러 가면 됩니다.

PIVKaII 가 정상인이라면 어느정도 수치가 나오는건지요,안녕하세요. 메디이즈입니다. PIVKaII는 간세포에서 생성되는 단백질로 간세포가 손상되면 혈액으로 유출됩니다. PIVKaII는 간암의 진단 및 치료에 사용되는 검사로 정상인의 경우 PIVKaII 수치는 10 ngmL 미만입니다. PIVKaII 수치가 10 ngmL 이상이면 간암을 의심할 수 있습니다. PIVKaII 수치는 간암의 진단 및 치료에 중요한 검사이지만 다른 질환에서도 PIVKaII 수치가 증가할 수 있습니다. 따라서 PIVKaII 수치가 증가한 경우 간암을 의심할 수 있지만 다른 질환을 배제하기 위해 추가적인 검사를 받아야 합니다.

발모벽 극복법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상은 일종의 불안 장애에 해당합니다. 본인의 의지나 노력만으로 해결하기 어렵다면 정진건강의학과 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

발모벽 극복법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상은 일종의 불안 장애에 해당합니다. 본인의 의지나 노력만으로 해결하기 어렵다면 정진건강의학과 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

발모벽 극복법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발모벽발모광은 자신의 머리카락이나 털을 뽑는 습관으로 스트레스나 불안감 등이 원인이 될 수 있습니다. 이를 없애는 방법은 다음과 같습니다. 1.스트레스 관리 발모벽의 원인 중 하나인 스트레스를 관리하는 것이 중요합니다. 운동 명상 요가 등의 방법을 통해 스트레스를 해소할 수 있습니다. 2.전문가의 도움 심리상담센터나 정신건강의학과를 방문하여 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. 전문가의 상담과 치료를 통해 발모벽을 극복할 수 있습니다. 3.습관 개선 발모 행동을 유발하는 습관을 개선하는 것이 중요합니다. 예를 들어 손에 장갑을 끼거나 머리에 모자를 쓰는 등의 방법을 통해 발모 행동을 방지할 수 있습니다. 4.약물 치료 심한 경우에는 약물 치료를 고려할 수 있습니다.

PIVKaII 검사가 정상범위이긴한데 높습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기저 간질환이 없고 CT상 전형적인 혈관종이 맞다면 AFP가 정상이므로 PIVKaII가 높다고 하여 간암 가능성이 높지 않습니다. 이런 경우 간 MRI 검사가 도움이 됩니다.

옴 일상생활,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 증상이 없다면 일상 생활이 가능하며 격리는 필요하지 않습니다. 피부과 담당의와 상의하여 결정하시는 것을 권해드립니다.

가슴 멍울...안녕하세요. 메디이즈입니다. 양성 결절이 악성화될 수도 있고 이전 조직검사에서

양성이더라도 크기가 커진다면 재조직검사나 제거가 필요합니다. 시술 후 검사 결과를 확인해야 합니다.

피임약 중단했는데 임신가능성있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약은 중단하면 배란이 이루어지게 되며 정자는 자궁 내에서 1주일 가까이 생존할 수 있어 확률은 낮지만 임신가능성은 있습니다.

임신의심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 상황에서는 임신 가능성을 가장 먼저 감별해야 하므로 반드시 임신테스트기를 사용하여 임신 여부를 확인해 보시기 바랍니다.

영상검사 문의드립니다. 영상의학과내과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 담낭의 아주 작은 병변일 경우 초음파가 더 정확하게 관찰이 되는 경우도 있습니다. 따라서 초음파 검사와 MRI 검사를 함께 고려하여 판단합니다.

전립선 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원을가서 소변검사를 했는데 소변은 깨끗하고 정상이라고하고 염이 좀 보인다고 그러는데 그래서 1주일치 약을먹고있는데 호전되는게 안느껴지는군요. 장기간의 치료와 아울러 스트레스 조절 온탕 반신욕 등을 병행하시면 최상의 결과 있을 것입니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?vVHWSjiLQNIIE>

귀두 밑 음경 굵은 상처? 붉은 선 사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다양한 가능성으로 우선 피부과 내원하셔서 정확한 진단을 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

이거 귀두포피염 맞나요? 사진o,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성기에 나는 습진같은거라고 설명 들으셨군요. 크게 걱정하지 마시고 진단 받으신 병원 다시 내원하셔서 정확한 상담을 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

주걱턱의 기준이 무엇인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옆에서 봤을 때 턱이 많이 나와있으면 소위 주걱턱이라고 하는 것 같은데 코의 높이가 있으면 어느정도 괜찮게 보이는 거 같기도 한데 실제로 어떻게 정확하게 정의되는 기준이라는데 있나요? 예를 들어 저 사진에서처럼 윗니와 아랫니를 맞대고 웃었을 때 아랫입술이 윗입술보다 나와있으면 주걱턱인가요? 궁금하네요 주걱턱의 기준을 뭐라고 딱 정할 수는 없습니다만 일반적으로 아래턱이 위턱 보다 더 앞으로 나와있는 상태를 말합니다. 정확한 진단이 필요하다면 치과교정과전문의선생님을 찾으셔서 교정진단을 한번 받아보세요

하지 정맥류 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한건 초음파 검사등으로 정맥의 역류 등이 있는지 확인하는게 제일 정확합니다. 단순 혈관 한두개가 튀어나와있다고 해서 정맥류라고 보진 않습니다. 증상등이 있으시면 근처 정맥류 병원 방문하셔서 검사 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.

당뇨병 예방성 검사 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병으로 인한 합병증은 예방과 관리가 중요한데요 특히 당조절여부와 유병기간이 중요합니다. 2년이면 짧은기간이여서 아직은 합병증이 올 만한 시기는 아닌거 같습니다. 주로 당뇨합병증에 대한 검사로 망막검사 신장기능검사 신경검사 지질검사 정도를 하게 됩니다. 신경외과쪽은 당뇨병환자에게 일반적으로 필수적이지는 않습니다. 당뇨병성 신경병증이 생기면 신경외과적 도움이 필요할수도 있지만 대부분은 내분비내과에서 관리와 약물치료가 가능합니다. 합병증이 안생기게 당조절과 식이조절 체중조절 잘 해나가시기 바랍니다.

항문 습진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문습진이나 항문소양증이 있다면 먼저 항문주의를

깨끗하고 건조하게 유지시켜 주세요. 그래도 가려움증이 심하다면 티베같은 약한 스테로이드 연고도 도움이 될수 있습니다.

생리가 길어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 폴립이 어디에 있었나요? 출혈이 계속되는 다른 원인은 없는지 다시 진료가 필요할 것으로 생각됩니다

발모벽 극복법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발모벽발모광은 자신의 머리카락이나 털을 뽑는 습관으로 스트레스나 불안감 등이 원인이 될 수 있습니다. 이를 없애는 방법은 다음과 같습니다. 1.스트레스 관리 발모벽의 원인 중 하나인 스트레스를 관리하는 것이 중요합니다. 운동 명상 요가 등의 방법을 통해 스트레스를 해소할 수 있습니다. 2.전문가의 도움 심리상담센터나 정신건강의학과를 방문하여 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. 전문가의 상담과 치료를 통해 발모벽을 극복할 수 있습니다. 3.습관 개선 발모 행동을 유발하는 습관을 개선하는 것이 중요합니다. 예를 들어 손에 장갑을 끼거나 머리에 모자를 쓰는 등의 방법을 통해 발모 행동을 방지할 수 있습니다. 4.약물 치료 심한 경우에는 약물 치료를 고려할 수 있습니다.

약 먹은 직후 토하면 목에 걸릴 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가능성은 있지만 매우 희박하다고 생각됩니다. 정말 걸려있는지를 확인하려면 내시경검사가 필요할 수 있습니다.

발가락 사마귀 치료 받아야 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 사마귀가 재발한 것인지 상처가 아직 남아있는지 확실하지가 않네요. 경과를 조금 더 지켜보시고 재발한 것으로 판단되면 다시 치료를 받아야 합니다

하지 정맥류 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한건 초음파 검사등으로 정맥의 역류 등이 있는지 확인하는게 제일 정확합니다. 단순 혈관 한두개가 튀어나와있다고 해서 정맥류라고 보진 않습니다. 증상등이 있으시면 근처 정맥류 병원 방문하셔서 검사 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.

질문자 요청에 의한 삭제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요? 지금 보기에는 지루성 피부염이 아닌가 생각됩니다. 진료를 받고 스테로이드 연고 발라보셔요

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네. 두 항생제는 종류가 다른 계열이라서 같이 사용합니다. 두 항생제를 같이 사용한다면 더 넓은 범위의 세균을 커버할 수 있겠네요. 그래도 항생제 두종류 다 주는게 걱정되어 둘 중에 하나만 하시다면 일단 주사 항생제만 사용하시는게 좋겠습니다.

하지 정맥류 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한건 초음파 검사등으로 정맥의 역류 등이 있는지 확인하는게 제일 정확합니다. 단순 혈관 한두개가 튀어나와있다고 해서 정맥류라고 보진 않습니다. 증상등이 있으시면 근처 정맥류 병원 방문하셔서 검사 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.

발가락 사마귀 치료 받아야 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에는 사마귀가 재발한 것인지 상처가 아직 남아있는지 확실하지가 않네요. 경과를 조금 더 지켜보시고 재발한 것으로 판단되면 다시 치료를 받아야 합니다

혹시 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 내성이 생기지 않도록 하는것이 중요합니다. 하지만 내성이 생기는지 확인은 임상적으로 불가능합니다 불필요한 항생제 사용을 안하거나 필요한 기간 충분히 사용안하거나 복용법을 준수 하지 않거나 하면 내성균발현 가능성이 높아집니다. 저는 개인적으로 아이들 항생제 주사는 거의 사용하지는 않습니다

물을 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 물을 많이 삼키는 것으로 목을 다치기는 어렵습니다 2. 한컵정도는 많은 양은 아닌데 계속 올라오면 진료 받아보셔요 3. 약이 걸렸을 가능성은 매우 낮습니다만 검사를 통해서 확인이 필요합니다

풍진항체 말씀드린것에서요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 감염에 의한것이라고 하면 ig M 이 양성으로 나와야 하는데 그렇지 않고 ig G 양성이어서 걱정 안하셔도 될것 같습니다. 3 차에서 ig M이나오란 법은 없어요 주치의 선생님과 상의 해보셔요

혈당 정상인데 당뇨증상 있습니다 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암이 있는 지는 검사를 해봐 야 하지만 아마도 고도 비만때문으로 흑색가시 세포증이 나타났을 가능성이 높습니다 적극 개 선도 하셔야 하지만 개선한것을 유지 하는것이 더 힘들고 어렵습니다. 방심하면 나빠질 수 있 습니다

허벅지굵다보니 멍이들어서 아파요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 굵지않는데도 멍이 드는 것 이 아니라면 크게 걱정하실 필요는 없어보입니다. 비타민씨 메가도즈 를 잘 챙겨 드셔보셔요.

약 먹은 직후 토하면 목에 걸릴 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가능성은 있지만 매 우 희박하다고 생각됩니다. 정말 걸려있는지를 확인하려면 내시경검사가 필요할 수 있습니다.

혈당 정상인데 당뇨증상 있습니다 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 암이 있는 지는 검사를 해봐 야 하지만 아마도 고도 비만때문으로 흑색가시 세포증이 나타났을 가능성이 높습니다 적극 개 선도 하셔야 하지만 개선한것을 유지 하는것이 더 힘들고 어렵습니다. 방심하면 나빠질 수 있 습니다

남자는 소변을 앉아서보면안되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 남성이 소변을 보는 자세에 대해 일반적으로 권장되는 것은 서서 보는 것입니다. 하지만 반드시 서서만 봐야 하는 것은 아닙니다. 앉아서 소변을 보는 것이 문제가 되는 경우는 거의 없습니다.

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 상태를 알기는 어렵습니다만 좌우가 차이가 있을 수 있습니다. 보통 비익연골은 수술 잘 안하고 비 중격만곡 수술을 많이 합니다. 수술하 신병원에서 다시 진료 받아보셔요. 큰문제는 없어보입니다

이것도 헤르페스인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 조금 선명하지 않은데 입술에 여 러개의 수포가 잡히는 것으로 미루어 헤르페스1형 단순포진이 의심됩니다.

질문자 요청에 의한 삭제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요? 지금 보기에는 지루성 피부염이 아닌가 생각됩니다. 진료를 받고 스테로이드 연고 발라보셔요

귀두포피염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두포피염은 청결하지않고 치료를 안하시면 만성적 으로 재발할 수는 있습니다. 비뇨기과에서 귀두포피염이 아니라 했으니 다른 질환을 먼저 생 각해보셔야 하겠네요.

니메겐 복용중 특정 화장품 사용시 부작용이 없는지 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 니젠은 이소트레티노인 성분의 여드름약인데 지금 사용하시는 레티노이드 함유 앰플 사용하시 는데 문제는 없을 것으로 생각됩니다

누우면 다리가 저립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요추 질환에 대한 검사와 진료 후에도 상기 증상이 지속된다면 하지 신경의 문제에 대하여 신경과 진료를 보시는 것이 도움이 됩니 다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과거에 뇌손상 뇌출혈로 인해 뇌 조직에 손상이 생겨 발생한 뇌연화증으로 보입니다. 증상이 없더라도 신경과 전문의 진료를 받아보시고 주기적으로 뇌CT 검사를 받아보시는게 좋겠습니다.

이어서 질문이요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 만약 상기 증상이 지속된다면 접촉성 피부염 을 유발할 수 있는 항원에 대한 검사를 받아 보는 것이 도움이 될 수 있겠습니다.

건식 반신욕기 사용 특발성 기질화 폐렴 환자,안녕하세요. 메디이즈입니다. 특발성간질성폐질 환에 스테로이드와 면역억제제를 복용하고 계시는군요. 반신욕기를 사용하는 것 자체는 큰문

제가 되지는 않지만 일반인보다 호흡곤란이나 불편감이 빨리 올 수 있습니다. 무조건 숨차는 증상이 있기전까지만 하시는게 좋겠습니다. 더구나 하지정맥류가 있으면 같은자세 오래있으면 증상이 악화되니 짧게만 이용하시는게 좋겠습니다.

항문 습진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문습진이나 항문소양증이 있다면 먼저 항문주의를 깨끗하고 건조하게 유지시켜 주세요. 그래도 가려움증이 심하다면 티베같은 약한 스테로이드 연고도 도움이 될수 있습니다.

혹시 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 내성이 생기지 않도록 하는것이 중요합니다. 하지만 내성이 생기는지 확인은 임상적으로 불가능합니다 불필요한 항생제 사용을 안하거나 필요한 기간 충분히 사용안하거나 복용법을 준수 하지 않거나 하면 내성균발현 가능성이 높아집니다. 저는 개인적으로 아이들 항생제 주사는 거의 사용하지는 않습니다

위염 단식,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위염으로 속이 답답한 느낌은 일반적인 증상일 수 있습니다. 금식을 하면 오히려 위에 스트레스를 주어서 위염이 더 악화시킬 수 있어 좋은방법은 아닙니다. 완전한 단식보다는 위에 부담이 덜 가는 식사를 하거나 소량씩 자주 드시는 것이 좋겠습니다.

뭘에물린건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 문의하신 내용으로 보아 체리 혈관종일 가능성이 가장 높아 보입니다. 원인은 뚜렷히 밝혀지지 않았으나 체질적인 소인이 있으며 피부 노화 과정의 일환으로 보기도 합니다. 수mm 크기의 선홍색의 구진숫아오른 피부 발진이 주로 체간과 팔에 발생하는데 나이를 먹음에 따라 그 숫자가 서서히 늘어납니다. 체리 혈관종 자체가 특별한 문제점은 없으나 미용적인 목적으로 제거를 원하는 경우가 많습니다. 혈관 레이저를 이용하여 34주 간격으로 13회 정도 치료를 받으면 됩니다. 문의에 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

대변색이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹는 음식에 따라 대변색깔이 달라질 수는 있는데요. 연한 갈색 자체는 특별히 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 지방섭취가 많아서 소화가 안되거나 밀가루 같은 음식을 많이 섭취하면 대변색이 연해질수는 있습니다. 만약에 대변색이 점토색처럼 너무 희거나 변볼때 통증 불편감이 있다면 소화기내과 진료보시기를 권합니다.

지속적인 어지럼증이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 중추성 어지럼이자울신경이상 심인성 어지럼 등에 대한 감별이 필요합니다. 가까운 신경과 전문의를 찾아 진료해보시기 바랍니다. 감사합니다.

갑작스러운 두드러기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두드러기 증상은 누구나 생길 수 있으며 원인은 음식 옷 먼지 등등 매우 다양하고 특정 원인을 찾지 못하는 경우도 있습니다. 두드러기는 자연적으로 시간이 지나면 가라앉지만 경우에 따라서는 며칠간 반복적으로 생길 수 있고 드물게는 3개월 이상 만성으로 진행하기도 합니다. 증상이 심한 혹은 일상 생활에 지장이 있는 경우 항히스타민을 복용하면서 경과를 지켜볼 수 있습니다. 감사합니다.

사타구니쪽 피부 변형 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진의 병변은 팽창선조라는 것으로 보통 튼살이라고 부릅니다. 미용적으로 레이저 치료를 받으실 수도 있고 레티노이드 계통의 크림이 도움이 될 수 있습니다. 그냥 두셔도 아무런 문제는 없습니다.

엉덩이 골 끝부분 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변비 등이 있을 가능성이 높고 이로 인해 항문 점막의 손상이 유발된 것으로 보입니다. 따라서 항문외과 진료를 보는 것이 적절합니다.

풍진 항체 수치가 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보건소에서 검사한 수치가 병원보다 높게 나왔네요. 병원의 수치가 너무 낮게나와서 좀 이상하네요. 기관이 달라 검사하는 곳의 차이로인

해 수치가 다르게 나온게 아닐까도 의심이 되네요. IgM은 음성이니 최근 감염은 없으시고 IgG수치가 10이상이니 면역력이 있어 안심해도 될것 같습니다.

하지직거상 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 하지의 운동으로 하지정맥류가 더 심해지지는 않습니다. 오랜시간 같은 자세로 앉아있거나 서있는 자세가 하지정맥류를 유발하거나 악화시키고 운동은 오히려 질환의 증상 개선에 도움이 됩니다. 따라서 문제는 없어보이고 또한 늘어난 정맥은 다시 회복되지는 않으니 앞으로도 주의하실 필요는 있습니다.

임신 가능성이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

안녕하세요. ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아기의 상태를 모르니 머라 말씀 드리기 조심스럽습니다. 주치의 선생님과 상의를 해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 증세가 심하거나 오래동안 호전되지 않아서 그런것이 아닌가 싶습니다

호중구 감소증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1 파상풍 주사는 호중구 감소증에 영향은 없을 것 같습니다 2. 일시적인 증상일 가능성이 높아보입니다 3. 정해진것은 없습니다만 너무 걱정되면 일주일 그렇지 않으면 24주 정도 후에 재검 받아보셔요 감기기운이 있어도 호중구 떨어지고 임파구가 증가할 수 있습니다. 백혈구 수치는 좀 낮은 편이네요

호중구 감소증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1 파상풍 주사는 호중구 감소증에 영향은 없을 것 같습니다 2. 일시적인 증상일 가능성이 높아보입니다 3. 정해진것은 없습니다만 너무 걱정되면 일주일 그렇지 않으면 24주 정도 후에 재검 받아보셔요 감기기운이 있어도 호중구 떨어지고 임파구가 증가할 수 있습니다. 백혈구 수치는 좀 낮은 편이네요

임신 가능성이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

헤르페스 의심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 단순 구내염으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

덱사메타손 주사제 부작용인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 덱사메타손 주사의 부작용은 아닌듯 한데요. 주사는 어디에다가 왜 맞으신건가요? 몇번이나 맞으셨나요? 계속되는것 같으면 주사 맞은 병원에 문의 해보셔요

임신 가능성이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

사타구니쪽 피부변형 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보여지는 병변은 살이 일시적으로 찌거나 피부가 당겨지는 현상으로 생기는 튜스 striae distensae입니다. 치료가 필요한 것은 아니며 미용적인 것 외에 다른 증상이나 특이사항은 없습니다. 감사합니다.

배에 거뭇거뭇한 것이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자극성 접촉 피부염이 생기고 그 후유증으로 염증후 색소침착이 생긴 것으로 판단됩니다. 1년이 넘었다면 치료를 해도 색을 빼기가 쉽지 않습니다. 레이저토닝으로 치료를 시도할 수 있습니다. 23주 간격으로 반복적인 치료가 필요하며 1520회 이상의 치료가 필요할 것으로 판단됩니다. 문의에 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

비중격 만곡증 질문 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아닙니다. 안경때문에 이런 경우는 거의 없습니다. 오히려 이전에 기억이 안 나겠지만 주먹이나 공으로 코를 다친 후 생긴 비

중격만곡증은 흔합니다.

일주일 전 부터 생긴 손가락 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정전기 때문이라 단정하기는 어려울 것 같습니다. 다른 원인도 생각해봐야 하니 가까운 정형외과를 방문하시어 진찰을 받아보시는 것이 좋겠습니다. 감사합니다.

구강암 혀에점??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진을 보면 외상으로 생긴 혈성 수포로 추정됩니다. 자주 혀를 씹는다는 말씀도 하나의 단서가 되겠습니다. 다만 시간이 지나면 자연히 나아져야 하는데 잘 없어지지 않는다면 더 커지는 등의 변화가 있다면 이비인후과 진료를 받아보시기 바랍니다.

항문 주변 빨간원형,안녕하세요. 메디이즈입니다. 후닐의 일반적인 부작용은 아니지만 약을 드신 후에 발생하는 것이라면 약이 원인일 수 있습니다. 약이 원인이라면 약 중단 후 증상이 좋아지게 되지만 다른 원인이라면 좋아지지 않을 것입니다. 그렇다면 진료를 받아 보시고 원인을 찾아 보시기 바랍니다. 감사합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먹는 항생제로 질환이 조절되는지가 가장 중요한 판단이 됩니다. 상기 사항에 대하여 담당의에게 이야기하고 상의를 하기 바랍니다.

콧대와 콧볼이 너무 넓어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 코볼이 넓은 거도 하나의 개성입니다 그러나 그 점이 너무 스트레스가 된다면 수술받는 것도 좋을 듯 합니다. 수술 후 코막힘이 더 심해질 수 있으니 술 전 이비인후과 의사와 상의하세요

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈에는 큰 차이는 없겠습니다. 그리고 빛이 전부 차단되는게 속면에 조금 더 나올 수도 있겠지만 검정 시트 잘 붙이셨다면 살짝 비추는 정도는 크게 영향을 미치지는 않을 듯 합니다. 감사합니다.

체외충격파 치료 후 소염진통제 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외충격파나 증식치료는 염증을 인위적으로 유발하는 치료라 엄밀하게 이야기 하면 소염진통제를 권장하지 않지만 복용을 한다고 해서 그 효과가 크게 감소하거나 하지는 않습니다. 먹으면 안된다 하지만 그럴 필요도 없고 약물을 복용하여 오히려 통증을 다소 완화시키어 편안함을 유도하는 경우도 많습니다. 약을 먹어서 더 아플 것 같지는 않으며 통증의 원인이 다른 곳에서 오지 않았나 싶습니다. 불편감이 지속된다면 진료 받은 곳에 방문을 다시 한번 해보시길 바랍니다. 소염제와 통증 발생의 인과관계는 없어 보입니다. 감사합니다.

여기저기 염증이 생겼는데 어느과를 가야할지 모르겠습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 이비인후과 가십시오 코와 눈이 연결되어서 알려지 증상 후 생긴 경우도 많습니다. 먼저 가서 진료 후 다른 과 추천받는데 추천합니다.

대상포진인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상 포진의 전형적인 수포성 병변이 아니고 신경절을 따라 분포되어 있지 않아 가능성이 낮습니다. 좀 더 병변의 변화를 지켜보시기 바랍니다.

항문 국소마취 항문샘,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사기로 인하여 항문샘에 손상이 될 가능성은 거의 없습니다. 항문샘 손상 여부는 물리적으로 확인 할 수 있는 특별한 방법이 있지도 않습니다. 감사합니다.

당뇨병 예방성 검사 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병으로 인한 합병증은 예방과 관리가 중요한데요 특히 당조절여부와 유병기간이 중요합니다. 2년이면 짧은기간이어서 아직은 합병증이 올 만한 시기는 아닌거 같습니다. 주로 당뇨합병증에 대한 검사로 망막검사 신장기능검사 신경검사 지질검사 정도를 하게 됩니다. 신경외과쪽은 당뇨병환자에게 일반적으로 필수적이지는 않습니다. 당뇨병성 신경병증이 생기면 신경외과적 도움이 필요할수도 있지만 대

부분은 내분비내과에서 관리와 약물치료가 가능합니다. 합병증이 안생기게 당조절과 식이조절 체중조절 잘 해나가시기 바랍니다.

고환 음경 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 자극에 의한 일시적인 경우가 흔하고 이런 경우는 당분간자극을 피하시고 경과를 보시면 대부분 저절로 좋아질 수 있습니다 물론 지속되거나 심해진다면 전립선이나 고환쪽 문제가 있는지 비뇨의학과를 방문하셔서 진료를 받으시면 도움이 될 수 있습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

하지직거상 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 하지의 운동으로 하지정맥류가 더 심해지지는 않습니다. 오랜시간 같은 자세로 앉아있거나 서있는 자세가 하지정맥류를 유발하거나 악화시키고 운동은 오히려 질환의 증상 개선에 도움이 됩니다. 따라서 문제는 없어보이고 또한 늘어난 정맥은 다시 회복되지는 않으니 앞으로도 주의하실 필요는 있습니다.

구강암 혀에점??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진을 보면 외상으로 생긴 혈성 수포로 추정됩니다. 자주 혀를 씹는다는 말씀도 하나의 단서가 되겠습니다. 다만 시간이 지나면 자연히 나아져야 하는데 잘 없어지지 않는다면 더 커지는 등의 변화가 있다면 이비인후과 진료를 받아보시기 바랍니다.

구강암 혀에점??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진을 보면 외상으로 생긴 혈성 수포로 추정됩니다. 자주 혀를 씹는다는 말씀도 하나의 단서가 되겠습니다. 다만 시간이 지나면 자연히 나아져야 하는데 잘 없어지지 않는다면 더 커지는 등의 변화가 있다면 이비인후과 진료를 받아보시기 바랍니다.

어느 날부터 검지와 엄지손가락에 이상한게 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양측 인가요? 손가락에 습진이 생겼을 가능성이 높습니다. 물일을 많이하거나 손을 많이 쓰나요? 편측이면 무좀의 가능성도 생각해볼 수 있습니다

외음부 염증 직접 제거 후 진물 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 습윤밴드는 부위가 피부면 붙여도 되는데 점막부위면 잘 붙어있지 않습니다. 진료를 받아보시는것이 가장 좋을 것 같습니다

종합검진 선택 뭐로 해야할까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 비교적 젊고 기저질환이 없으므로 대장내시경 검사나 갑상선 초음파 검사를 받아 보는 것을 권해드립니다. 도움이 되었기를 바랍니다.

발톱이 서랍장 열면서 살짝 들린것 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 아프셨겠네요. 진물이 나오면 소독은 하시고 밴드나 거즈로 감아서 상처부위를 보호해 주시면 될것 같습니다. 혹시 통증이 심해지면 진료 보셔요

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오랜 기간 통증이 지속된다면 우선은 가까운 병원에서 파라핀욕이라는 물리치료를 3회 정도 받아보시고 호전이 없으면 주사를 통한 적극적인 치료가 도움이 됩니다.

감기걸려서 덱사메타손 주사 맞았는데요 에어탈정 복용되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 드시는 약과 에탈을 함께 드셔도 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다. 지금 드시는 약에 아세트아미노펜 성분이 있어서 에탈을 드시지 않아도 머리가 안아프면 안드셔도 됩니다

덱사메타손 주사제 부작용인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 덱사메타손 주사의 부작용은 아닌듯 한데요. 주사는 어디에다가 왜 맞으신건가요? 몇번이나 맞으셨나요? 계속되는것 같으면 주사 맞은 병원에 문의 해보셔요

삼키는 행동 후 귀고막 먹먹,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이관 기능 장애 가능성이 있어 시간

이 지나면 호전될 가능성이 높습니다. 하지만 통증이 발생한다면 중이염 등의 가능성에 대해 진료가 필요합니다.

이거 조영제 때문인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인지력 저하느낌과 다크서클을 한가지로 설명하려면 뇌와 안면 두경부의 순환장애가 가능한 원인입니다. 신경과 진찰을 보시고 적극적인 신경치료로 빠르게 호전되는 경우가 흔합니다.

명치답답 복부팽만,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소장 세균증식으로 인한 증상일 가능성이 높습니다. 탄수화물 섭취를 줄여주시고 대신 섬유질 섭취를 늘려주시는 것이 필요해 보입니다

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 꼬리 드시는 것이 문제가 될것 같지는 않습니다. 혹시 걱정되는 부분이 어떤것이 있을까요? 저도 개인적으로 꼬리 먹어요

당뇨병 예방성 검사 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병으로 인한 합병증은 예방과 관리가 중요한데요 특히 당조절여부와 유병기간이 중요합니다. 2년이면 짧은기간이어서 아직은 합병증이 올 만한 시기는 아닌거 같습니다. 주로 당뇨합병증에 대한 검사로 망막검사 신장기능검사 신경검사 지질검사 정도를 하게 됩니다. 신경외과쪽은 당뇨병환자에게 일반적으로 필수적이지는 않습니다. 당뇨병성 신경병증이 생기면 신경외과적 도움이 필요할수도 있지만 대부분은 내분비내과에서 관리와 약물치료가 가능합니다. 합병증이 안생기게 당조절과 식이조절 체중조절 잘 해나가시기 바랍니다.

암 혹은 큰 병이 아닐지 너무 걱정됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 점액변이 나온 적 있고 변비가 심한 편인 상황이며 밥을 먹으면 상복부가 불편하고 아픈 상황으로 이해됩니다. 식후에 나타나는 복통이나 위장질환이나 담낭질환을 의심하여 검사를 진행해보실수는 있겠고 변비나 점액변을 고려하면 과민 대장 증후군과 같은 질환도 의심해볼 수 있겠습니다. 내시경 예정이므로 우선은 검사 후 결과를 기다려보시기 바랍니다.

목에 이상한게 박혀있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 박혀있는데 아니라 구강내 궤양으로 보이며 편도염으로 보시면 될듯합니다. 가까운 이비인후과 진료를 권유합니다

꺠럭시워치 심박수오류인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지속적인 이상이 체크된다면 부정맥 가능성에 대하여 심전도 검사를 받아 보는 것이 도움이 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

시신경 이상 여부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위 검사를 통해 안과에서 확인해볼 수있는 검사를 할 수는 있지만 뇌와 시신경사이의 문제나 뇌 자체로 인한 신경학적 판단은 어려울꺼 같습니다. 만약 위와 같은 안과에서 하는 검사에 이상이 없다면 신경과 진료를 받아보시기 바랍니다.

항문 주변 정상인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

누우면 다리가 저립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요추 질환에 대한 검사와 진료 후에도 상기 증상이 지속된다면 하지 신경의 문제에 대하여 신경과 진료를 보시는 것이 도움이 됩니다.

풍진 항체 수치가 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 보건소에서 검사한 수치가 병원보다 높게 나왔네요. 병원의 수치가 너무 낮게나와서 좀 이상하네요. 기관이 달라 검사하는 곳의 차이로 인해 수치가 다르게 나온게 아닐까도 의심이 되네요. IgM은 음성이니 최근 감염은 없으시고 IgG수치가 10이상이니 면역력이 있어 안심해도 될것 같습니다.

엉덩이 골 끝부분 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변비 등이 있을 가능성이 높고 이로 인

해 항문 점막의 손상이 유발된 것으로 보입니다. 따라서 항문외과 진료를 보는 것이 적절합니다.

의자에 앉아서 까치발들기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위가 무릎에 무리를 유발하지는 않겠지만 아킬레스 건에는 하중이 실려 통증이 유발될 수 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손가락 골절의심?및 골절이라고 하는데요...안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 골절과 허벅지는 무관합니다. 비용이 아주 비싸지 않았다면 서비스로 다리를 풀어드리지 않았을까 합니다.

췌장,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 지속되면 검사로 확인해보셔야 합니다 점액변을 보는 원인은 다양합니다. 장염 세균 바이러스 등에 의해 장에 염증이 생기는 질환으로 점액변 설사 복통 등의 증상이 나타납니다. 과민성장증후군 장이 예민해져 복통 설사 변비 등의 증상이 나타나는 질환으로 점액변을 볼 수 있습니다. 대장암 대장에 생긴 암 덩어리로 점액변 혈변 변비 복통 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 기생충 감염 기생충에 감염되면 장 내벽에 상처가 생겨 점액변을 볼 수 있습니다.

굵힌상처 질문자입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그렇군요. 보기엔 수술 자국으로 인한 흉터처럼보이는데... 수술안하셨으면 원인을 잘 알 수없네요. 진료 한번 받아보श्य

귀두 밑 음경 굵힌 상처? 붉은 선 사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다양한 가능성으로 우선 피부과 내원하셔서 정확한 진단을 받도록 하십시요. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

정액검사 염증검출 전립선마사지 후 소변검사 염증 미검출,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전립선마사지를 하고 전립선액이 나오고.. 염증이 있으면 전립선염으로 진단할 수가 있는데요. 전립선액이 안나오고.. 정액에서만 염증징후가 보인다고해서 전립선염으로 확진하기에는 어렵습니다. 정액은 전립선 뿐아니라 부고환이나 정낭에도 영향을 받기 때문이죠. 전립선염은 모르겠지만 정액에 염증반응이 있으니 비뇨기과 의사와 진료상담받아보시기 바랍니다.

명치답답 복부팽만,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소장 세균증식으로 인한 증상일 가능성이 높습니다. 탄수화물 섭취를 줄여주시고 대신 섬유질 섭취를 늘려주시는 것이 필요해 보입니다 조갑주위염으로 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 증상이 좋아질때까지는 치료 하는 것이니 기간이 중요한것은 아닙니다. 항생제로 잘 좋아지지 않으면 진균감염도 고려해볼 수 있습니다

고환 음경 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 자극에 의한 일시적인 경우가 흔하고 이런 경우는 당분간자극을 피하시고 경과를 보시면 대부분 저절로 좋아질 수 있습니다 물론 지속되거나 심해진다면 전립선이나 고환쪽 문제가 있는지 비뇨의학과를 방문하셔서 진료를 받으시면 도움이 될 수 있습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

헤르페스일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런것이 이번이 처음인가요? 지금 보기에는 헤르페스 2형 감염이 의심되는 피부소견이라고 판단됩니다. 치료 받아보श्य

고환 음경 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 자극에 의한 일시적인 경우가 흔하고 이런 경우는 당분간자극을 피하시고 경과를 보시면 대부분 저절로 좋아질 수 있습니다 물론 지속되거나 심해진다면 전립선이나 고환쪽 문제가 있는지 비뇨의학과를 방문하셔서 진료를 받으시면 도움이 될 수 있습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

헤르페스일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런것이 이번이 처음인가요? 지금 보기에는 헤르페스 2형 감염이 의심되는 피부소견이라고 판단됩니다. 치료 받아보श्य

오라퀵 FDA,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오라퀵에서 위음성이라고 하는것은 키트 불량이나 항체 미형성기를 이야기 하는 것은 아니고 12주가 지나도 오라퀵에선 항체가 안 잡히는 사람이 12명중에 1명이 있다는 것이 아닌가 싶습니다. 검사 자체가 지니는 한계를 말하는 것 같습니다

암 혹은 큰 병이 아닐지 너무 걱정됩니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 점액변이 나온 적 있고 변비가 심한 편인 상황이며 밥을 먹으면 상복부가 불편하고 아픈 상황으로 이해됩니다. 식후에 나타나는 복통이나 위장질환이나 담낭질환을 의심하여 검사를 진행해보실수는 있겠고 변비나 점액변을 고려하면 과민 대장 증후군과 같은 질환도 의심해볼 수 있겠습니다. 내시경 예정이므로 우선은 검사 후 결과를 기다려보시기 바랍니다.

갤럭시워치 심박수오류인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지속적인 이상이 체크된다면 부정맥 가능성에 대하여 심전도 검사를 받아 보는 것이 도움이 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

콘서트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콘타와 같은 약물은 초기 복용시 이상 반응이 나타날 수 있지만 시간이 지나면 보통 호전됩니다. 1주일 정도 복용해 보시고 이상 반응이 지속된다면 담당의와 상의하기 바랍니다.

황체낭종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복압이 올라갈 수 있는 운동은 낭종의 파열 가능성이 있어 가벼운 운동을 하는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

굵힌상처 질문자입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그렇군요. 보기엔 수술 자국으로 인한 흉터처럼 보이는데... 수술안하셨으면 원인을 잘 알 수 없네요. 진료 한번 받아보श्य

조갑주위염으로 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 증상이 좋아질때까지는 치료 하는 것이니 기간이 중요한것은 아닙니다. 항생제로 잘 좋아지지 않으면 진균감염도 고려해볼 수 있습니다

조갑주위염으로 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 증상이 좋아질때까지는 치료 하는 것이니 기간이 중요한것은 아닙니다. 항생제로 잘 좋아지지 않으면 진균감염도 고려해볼 수 있습니다

의자에 앉아서 까치발들기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위가 무릎에 무리를 유발하지는 않겠지만 아킬레스 건에는 하중이 실려 통증이 유발될 수 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

명치답답 복부팽만,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소장 세균증식으로 인한 증상일 가능성이 높습니다. 탄수화물 섭취를 줄여주시고 대신 섬유질 섭취를 늘려주시는 것이 필요해 보입니다 한달 동안 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 방사선 노출에 의한 암발생은 매우 높은 방사선 노출과 장기간 빈번하게 노출됐을때 발생하게 되는데요. 방사선 총노출량이 많을수록 위험이 높아지지만.. 단기간인 경우 어느정도 회복될수 있습니다. 앞으로는 되도록이면 방사선량을 줄이는 쪽으로 검사를 받는게 좋겠습니다. 저용량방사선 CT나 초음파 검사를 받는것을 추천드립니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고령에서는 노화로 인한 기능성 소화불량이 잘 생길수가 있는데요. 식습관에 변화를 주는게 좋겠습니다. 식사는 규칙적으로 하고 영양분있는 식사를 하시도록 해주세요 약에 의해서도 불편감을 줄수있으므로.. 특히 항우울제에 의한 것이 아닌지 부작용을 살펴보시는게 좋겠습니다. 되도록이면 약의 종류와 갯수는 줄이는게 좋겠습니다. 스트

레스도 주원인중에 하나이니 잘 확인해보시기 바랍니다. 노인의 기능성 소화불량은 한가지가 아닌 여러 복잡한 원인에 의해 나타날 수있는 증상이니 종합적으로 판단해보시고 가까운 내과 진료를 받아보시기 바랍니다.

한달 동안 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 방사선 노출에 의한 암발생은 매우 높은 방사선 노출과 장기간 빈번하게 노출됐을때 발생하게 되는데요. 방사선 총노출량이 많을수록 위험이 높아지지만.. 단기간인 경우 어느정도 회복될수 있습니다. 앞으로는 되도록이면 방사선량을 줄이는 쪽으로 검사를 받는게 좋겠습니다. 저용량방사선 CT나 초음파 검사를 받는것을 추천드립니다.

답변감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 10년 이상 지속이 되었다면 포경수술을 고려 하시는 것이 좋을것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

소식 답변 감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기름진 음식은 대장에 자극하여 과민성대장증후군 증상을 악화시킬수가 있는데요.. 특히 동물성 기름은 되도록 피하는 것이 좋으며 식물성 기름식용유는 대량으로 사용시 증상을 악화시킬 수 있습니다. 일반 식용유보다는 올리브유나 아보카도 오일 같은게 더 좋습니다. 되도록이면 기름으로 튀기거나 볶은 요리는 줄이는게 좋습니다. 찌거나 삶는음식이 좋겠죠

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 꼬리 드시는 것이 문제가 될것 같지는 않습니다. 혹시 걱정되는 부분이 어떤것이 있을까요? 저도 개인적으로 꼬리 먹어요

남자 곤지름 가능성 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 진주양구진으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

임신 가능성있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기를 예측할 수 없는 상태에서 피임이 완벽하지 않았다면 임신가능성에 대비하시는 것이 필요합니다. 임태기 한번 해보셔요

남자는 성관계가 아니면 요로감염이 잘 안걸리는이유?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은나이에 요도염은 대부분 성접촉에 의한 감염이대부분입니다. 여성의 질액이 요도로 들어갈때 생기는 것인데 확율이 약 25 정도 입니다. 세균이란 통로가 마련되면 어디든 들거가고 이동할수 있습니다. 요도점막을 타고 번식해서 숫자가 많아지니 주변 장기로까지 들어 가는 겁니다. 면역기능이 저하 되면 더 번식해서 다른 주변 장기로 이동하는겁니다.

발목 전거비인대 봉합술후 체중부하시 발바닥에 심한 통증이있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 후 자가 보행을 시작한지 얼마되지 않아 좀 더 지켜보시고 호전이 없다면 족저근막염 등 다른 질환의 합병 여부에 대한 평가가 필요합니다.

정액물은 손으로 임신 될까요?,안녕하세요 요약 1. 멀하던지 비가임기면 임신 가능성은 떨어집니다. 2. 엘라원을 4일 후에 복용 했으면 효과는 떨어지긴 할겁니다. 3. 착상혈은 난자가 수정된 후 약 일주일 뒤쯤 착상되면서 나오는 피입니다. 4. 검사 잘 하세요 건승하세요

발목 전거비인대 봉합술후 체중부하시 발바닥에 심한 통증이있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생길수 있는 증상이며 원래도 문제가 있었을 가능성도 많습니다. 하지만 치료를 해야하는 증상입니다. 발바닥 신경을 압박하는 힘줄의 수축을 의심합니다.

조직검사나 암 검사는 대학병원에서만 가능한건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마음이 급한 것은 이해가 가지만 전립선 암 조직검사는 합병증의 위험성이 있어 대학병원에서 검사를

하는 것이 안전합니다.

오라릭 결과 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음성 가능성이 높지만 키트 불량일 수 있기 때문에 다시 재검을 해보는 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

누우면 다리가 저립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요추 질환에 대한 검사와 진료 후에도 상기 증상이 지속된다면 하지 신경의 문제에 대하여 신경과 진료를 보시는 것이 도움이 됩니다.

목에 이상한게 박혀있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 박혀있는데 아니라 구강내 궤양으로 보이며 편도염으로 보시면 될듯합니다. 가까운 이비인후과 진료를 권유합니다

항문 주변 정상인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 흑색종 가능성이 높아 보이지는 않지만 이전에 비해 크기가 증가하고 모양의 변화가 있다면 피부과 내원하여 조직검사 여부에 대한 상의가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

겉력시워치 심박수오류인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지속적인 이상이 체크된다면 부정맥 가능성에 대하여 심전도 검사를 받아 보는 것이 도움이 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

산부인과 선생님 답변부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 많지 않은 한창때의 나이이신데 자궁탈출증이 생기셔서 복잡한 마음일 것 같습니다. 여러 병원을 다녀보셨고 대부분 수술 그 중에서도 적출수술이 최선이라고 들으신 것 같습니다. 병원들에서 설명 들으셔서 아시겠지만 1 폐사리 는 자궁을 보존하지만 염증이 발생한다든지 관리의 어려움이 있고 2 자궁을 보존하는 수술법 들은 시간이 지나면 결국 다시 재발할 가능성이 높으며 3 자궁적출술 은 피하고 싶은 상황 이라서 고민중이신 것 같습니다. 50대에 이제 막 접어드셨고 아직 생리를 하고 계신지 아니면 50대 후반으로 폐경이 한참 전에 되셨는지 여부 자궁경부의 염증 정도 질건조증 여부 등 여러 가지를 고려하여야 하고 또 자궁탈출증이 있을때 동반될 수 있는 방광류방광이 같이 밑으로 내려오는 질환나 직장류가 있는지 등도 고려해서 설명드려야하겠지만 아직 수술을 피하고 싶으시다면 우선 폐사리를 해보시고 다만 자궁탈출증 3기면 이미 아래쪽으로 상당히 내려온것이라 효과가 충분할지는 확실하지 않습니다 천천히 시간을 두고 고민을 하셔도 좋겠습니다. 온라인상의 답변이라 충분히 만족스럽지 않은 답변이었더라도 양해를 부탁드립니다 중요한 선택을 앞두고 고민하시는 마음 충분히 이해가 됩니다. 그런데 위의 설명들보다 결정을 내리시는데 실질적인 도움이 되는 말씀을 드리자면 1. 여러 병원에서 다 똑같은 설명을 듣고 같은 권유를 받으셨으면 그냥 믿고 그대로 하셔도 좋습니다. 2. 그래도 아직 마음에 미련이 있으시면 2군데 정도 더 방문하셔서 진찰받고 설명을 들어보세요. 제가 설명드린 내용은 진찰없이 드린 것이라서 제외하시고요 방문하실 병원은 꼭 자궁적출술을 광고하는 병원이 아니라 그냥 집에서 가까운 병원들 가서서 들으셔도 좋습니다. 한약으로 치료하라는 광고들도 있고 비싼 수술로 유도할 수도 있습니다. 질문에 깊은 고민이 느껴져서 의학적 지식보다는 가족친지분이면 어떨까하는 마음에서 설명드렸습니다. 좋은 치료받으시기 바랍니다.

손가락 골절의심?및 골절이라고 하는데요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 골절과 허벅지는 무관합니다. 비용이 아주 비싸지 않았다면 서비스로 다리를 풀어드리지 않았을까 합니다.

발목 전거비인대 봉합술후 체중부하시 발바닥에 심한 통증이있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생길수 있는 증상이며 원래도 문제가 있었을 가능성도 많습니다. 하지만 치료를 해야하는 증상입니다. 발바닥 신경을 압박하는 힘줄의 수축을 의심합니다.

질문올려봅니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌하수체라는 조직으로 다른 것 까지 보면 비대가 의심되는지 조언을 드릴 수 있습니다. 다른 경우보다 잘 보이는 편입니다.

영덩이 골 끝부분 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변비 등이 있을 가능성이 높고 이로 인해 항문 점막의 손상이 유발된 것으로 보입니다. 따라서 항문외과 진료를 보는 것이 적절합니다.

손가락 골절의심?및 골절이라고 하는데요...안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 골절과 허벅지는 무관합니다. 비용이 아주 비싸지 않았다면 서비스로 다리를 풀어드리지 않았을까 합니다.

의자에 앉아서 까치발들기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 행위가 무릎에 무리를 유발하지는 않겠지만 아킬레스 건에는 하중이 실려 통증이 유발될 수 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

답변감사합니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 10년 이상 지속이 되었다면 포경수술을 고려 하시는 것이 좋을것 같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

귀두 밑 음경 굵힌 상처? 붉은 선 사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다양한 가능성으로 우선 피부과 내원하셔서 정확한 진단을 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

곤지름 정말 아닌가요...?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 진주양구진으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

췌장,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 지속되면 검사로 확인해보셔야 합니다. 점액변을 보는 원인은 다양합니다. 장염 세균 바이러스 등에 의해 장에 염증이 생기는 질환으로 점액변 설사 복통 등의 증상이 나타납니다. 과민성장증후군 장이 예민해져 복통 설사 변비 등의 증상이 나타나는 질환으로 점액변을 볼 수 있습니다. 대장암 대장에 생긴 암 덩어리로 점액변 혈변 변비 복통 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 기생충 감염 기생충에 감염되면 장 내벽에 상처가 생겨 점액변을 볼 수 있습니다.

곤지름일수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손가락 골절의심?및 골절이라고 하는데요...안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 골절과 허벅지는 무관합니다. 비용이 아주 비싸지 않았다면 서비스로 다리를 풀어드리지 않았을까 합니다.

췌장,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상이 지속되면 검사로 확인해보셔야 합니다. 점액변을 보는 원인은 다양합니다. 장염 세균 바이러스 등에 의해 장에 염증이 생기는 질환으로 점액변 설사 복통 등의 증상이 나타납니다. 과민성장증후군 장이 예민해져 복통 설사 변비 등의 증상이 나타나는 질환으로 점액변을 볼 수 있습니다. 대장암 대장에 생긴 암 덩어리로 점액변 혈변 변비 복통 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 기생충 감염 기생충에 감염되면 장 내벽에 상처가 생겨 점액변을 볼 수 있습니다.

곤지름일수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름이나 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 사마귀 모양이나 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

니다.

눈에 잔상 안사라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분 신경과에서 해결 가능하며 보통은 정밀검사 없이 안구주변의 순환을 호전시키는 치료법이 가능합니다. 편두통과 원리는 비슷하지만 조금 다른 증상입니다.

전립선 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원을가서 소변검사를 했는데 소변은 깨끗하고 정상이라그리고 염이 좀 보인다고 그러는데 그래서 1주일치 약을먹고있는데 호전되는게 안느껴지는군요. 장기간의 치료와 아울러 스트레스 조절 온탕 반신욕 등을 병행하시면 최상의 결과 있을 것입니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?vVHWSjiLQNIIE>

이거 조영제 때문인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인지력 저하느낌과 다크서클을 한가지로 설명하려면 뇌와 안면 두경부의 순환장애가 가능한 원인입니다. 신경과 진찰을 보시고 적극적인 신경치료로 빠르게 호전되는 경우가 흔합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오랜 기간 통증이 지속된다면 우선은 가까운 병원에서 파라핀욕이라는 물리치료를 3회 정도 받아보시고 호전이 없으면 주사를 통한 적극적인 치료가 도움이 됩니다.

피부염 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 먼저 이렇게 오랫동안 반복되는 상태이시기 때문에 아토피가 조절되지 않았을 가능성 및 다른 질환균상식육종등의 감별을 위해서 조직검사등 추가적인 검사를 해보는 것을 좋겠습니다. 만약 아토피 소견으로 확인이 된다면 도포제와 함께 광선치료등 추가적인 치료를 함께 병행하시는 것이 더 안전하고 효과적일거 같습니다. 가까운 피부과를 방문하시어 진료를 받아보시길 권유드립니다.

전립선 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원을가서 소변검사를 했는데 소변은 깨끗하고 정상이라그리고 염이 좀 보인다고 그러는데 그래서 1주일치 약을먹고있는데 호전되는게 안느껴지는군요. 장기간의 치료와 아울러 스트레스 조절 온탕 반신욕 등을 병행하시면 최상의 결과 있을 것입니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?vVHWSjiLQNIIE>

답변감사합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 10년 이상 지속이 되었다면 포경수술을 고려 하시는 것이 좋을것 같습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

여드름 레이저가 모근에 손상을 주는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 상태를 사진만으로는 명확히 확인 할 수 없지만 염증은 다소 호전된 후 여드름 붉은 자국이 남아 있는 상태로 보입니다. 이럴 때는 혈관 레이저를 통한 붉은 자국 치료를 받는 게 도움이 되실텐데 이런 혈관 레이저는 모근에 큰 영향을 주지 않습니다. 큰 걱정하지 마시고 가까운 피부과 방문하시어 진료 받아보시는걸 추천드립니다.

자위 시 고환 위치 이동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 남자는 발기가 되면 고환이 위로 당겨 올라갑니다 당연히... 그건 병이 아니니 걱정안해도 됩니다. 발기가 되면 정계 근육이 수축을 하니 고환이 위로 당겨 올라갑니다.

어렸을 때 사정을 막아서,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사정을 참고 손으로 요도부분을 누른다고 지금말한 증상이나 문제가 발생할수는 없습니다. 그냥 민간에서 나온얘기를 의학 상식처럼 알고 있어서 그런것이며 이미 전립선관을 통해 정액이 나오면 아무리 성기를 누르고 억지로 회음부 근육을 수축해도 이미 전립선 요도부분에 정액이 나오게 됩니다. 그리고 자위를 하

거나 사정을 하면 누구나 약간 피로감을 느끼는데 그게 건강하고 연관되어 여러 문제를 일으키지 않습니다. 그러나 보통 정액은 23 일이 되어야 다시 보충이 되니 너무 자주는 하지 않는 게 좋습니다.

남자는 성관계가 아니면 요로감염이 잘 안걸리는이유?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은나이에 요도염은 대부분 성접촉에 의한 감염이대부분입니다. 여성의 질액이 요도로 들어갈때 생기는 것인데 확율이 약 25 정도 입니다. 세균이란 통로가 마련되면 어디든 들거가고 이동할수 있습니다. 요도점막을 타고 번식해서 숫자가 많아지니 주변 장기로까지 들어 가는 겁니다. 면역기능이 저하 되면 더 번식해서 다른 주변 장기로 이동하는겁니다.

곤지름 정말 아닌가요..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 진주양구진으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

남자 곤지름 가능성 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 진주양구진으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

남성 귀두 끝 피부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 귀두포피염으로 보입니다 자극을 피하시고 항생제연고를 사용하시면 좋아질 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 피부염으로 보입니다 성병 가능성은 없어 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

감기걸려서 덱사메타손 주사 맞았는데요 에어탈정 복용되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 드시는 약과 에탈을 함께 드셔도 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다. 지금 드시는 약에 아세트아미노펜 성분이 있어서 에탈을 드시지 않아도 머리가 안아프면 안드셔도 됩니다

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 꼬리 드시는 것이 문제가 될것 같지는 않습니다. 혹시 걱정되는 부분이 어떤것이 있을까요? 저도 개인적으로 꼬리 먹어요

임신 가능성있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기를 예측할 수 없는 상태에서 피임이 완벽하지 않았다면 임신가능성에 대비하시는 것이 필요합니다. 임태기 한번 해보श्य

임신 가능성있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기를 예측할 수 없는 상태에서 피임이 완벽하지 않았다면 임신가능성에 대비하시는 것이 필요합니다. 임태기 한번 해보श्य

남자는 성관계가 아니면 요로감염이 잘 안걸리는이유?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 젊은나이에 요도염은 대부분 성접촉에 의한 감염이대부분입니다. 여성의 질액이 요도로 들어갈때 생기는 것인데 확율이 약 25 정도 입니다. 세균이란 통로가 마련되면 어디든 들거가고 이동할수 있습니다. 요도점막을 타고 번식해서 숫자가 많아지니 주변 장기로까지 들어 가는 겁니다. 면역기능이 저하 되면 더 번식해서 다른 주변 장기로 이동하는겁니다.

목에 이상한게 박혀있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 박혀있는데 아니라 구강내 궤양으로 보이며 편도염으로 보시면 될듯합니다. 가까운 이비인후과 진료를 권유합니다

근막통증 주사치료 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 경우에만 TPI를 해야한다 이런것은 없습니다. 단 현재 정보만으로 정확하게 환자 상태를 파악할 수는 없어 TPI 가능한 병원에 가서 진료 이후 TPI 여부 결정하시면 될듯합니다

철봉 매달리기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 척추 건강을 위해 하시는 목적이면 힘을 빼고 있으시면 됩니다. 하지만 젊은 분이시기에 힘을 주고 당기는 운동까지 진행하시면 더 좋을거 같네요

피임약 복용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임약은 안먹은 것이 먹은 것보다 안 좋기에 2정 먹은거는 크게 건강에 문제 되지 않습니다 복용 후에 핸드폰 카톡으로 메모하시는 기록이 제일 좋을 듯 합니다

복합소화제 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소화효소제와 우루사 성분과 가스제거 성분이 들어있는 소화제 입니다 과민성 대장과 난청이 있으시다면 오히려 천연 소화효소제 쪽으로 드시는 편이 좋겠습니다 곡물에서 추출한 소화효소들 찾아보면 생각보다 많습니다

영양제 복용 이렇게 해도 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어휴 저는 이렇게는 못 먹을거 같습니다 전문약도 많이 드시는데 위도 안 좋으시고 다 직구로 드시나봅니다 제 영역이 아닌거 같아서 패스 하겠습니다 다른 약사님들의 의견 들어봐주세요

약 복용기간 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 처방전으로 받으신 약의 경우에는 1년 정도 후까지 복용가능합니다 걱정하지 않으셔도 되고 식후에 복용하십시오 빠른 쾌유 바랍니다 건강하세요

점빼고 노스카나,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소 침착이 있는 경우에는 애논을 먼저 쓰시고 이후에 노카나 스킨 벤락스 등 흉터 제거 연고를 바르시면 되겠습니다

스케일링 받고 잇몸치료 받으려고 하는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 하시는 병원에서 하시는걸 추천드립니다만 병원에 방문해서 상의해 보시고 치료를 받으셔도 되겠습니다. 감사합니다.

두통이 계속 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스를 피하기는 어려우며 병원에서는 통증에 대한 조절을 우선적으로 하고 보통은 약 복용을 기반으로 주사치료를 포함해서 물리치료도수치료 등을 흔하게 합니다. 목주변 경직에 초점을 맞추어 진찰과 치료를 하게 됩니다

ADHD가 맞는걸까요? 약을 계속 복용해도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 너무 성급하게 생각하지 마시고 일단 약을 꾸준히 복용해 보시기 바랍니다. 대부분은 약효과가 나타날때까지 시간이 필요합니다. 감사합니다.

모소동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로 관찰되는 피부의 변화를 보면 수술한 부위 옆으로 또 다른 피부병변이 발생한 상태라 판단됩니다. 다만 모낭염일 가능성도 있으니 가까운 외과를 방문하여 정밀한 진찰을 받아보시기 바랍니다.

복부대동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파로는 복부 대동맥류를 정확하게 판단하기 어려워 보통 CT로 추적검사를 하게 됩니다. 크기가 크지 않다면 매년 검사를 하면 됩니다.

혀 반쪽이 미각이 느껴지지 않는 마취 증상이 있는데 어디 병원 가야하고 어떻게 해야하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감각 이상이 있다면 해당 부위를 지배하는 감각 신경의 이상 가능성이 있습니다. 혀의 문제라면 이비인후과나 신경과 진료를 권해드립니다.

지방종 만지면 커지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지방종의 크기가 증가한다면 수술적으로 제거가 필요하며 손으로 만진다고 해서 크기가 커지거나 모양이 변화하지는 않습니다.

살짝 우울하고 집중이 잘 안됩니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 우울감으로 인해 집중력이 저하되고 일상생활에서 성과를 내기가 어려워지는 것 같다면 우울증과 같은 정신건강의학적 질환을 의심해보아야 하는 상황일 수 있겠습니다. 질환에 대한 정확한 진단과 치료가 증상의 호전을 가져올 수 있을 것이므로 병원을 방문해보시는 것이 좋겠습니다. 정확한 진단 없이는 어떤 약이 현 상황에서 도움이 될 지도 알기 어렵습니다.

남성성기 종기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

재발한걸까요? 음경 상피내신생물 곤지름,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조직검사에서 나온 PeIN Penile Intraepithelial Neoplasia은 전암성 상태는 맞습니다 2기이면 조금 더 깊은 피부층까지 관찰된다고 할수 있겠네요. 일단 조직검사를위해 제거를 했으니깐.. 이걸로도 치료는 했다고 할수 있습니다. 각질이 일어난거로는 재발여부는 확실치가 않네요. 주변에 새로운 병변이 나타나거나 변색이 있나도 잘 살펴보시고요. 이상이 발견되면 바로 전문의 선생님 진료를 받기 바랍니다.

귀두 끝 부분 병변 상태,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고름이 의심됩니다. 항생제 연고 바르는게 좋습니다. 비뇨기과 병원에 가서 먹는 항생제랑 바르는 항생제 연고 처방 받으세요..

임신 가능성있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기를 예측할 수 없는 상태에서 피임이 완벽하지 않았다면 임신가능성에 대비하시는 것이 필요합니다. 임태기 한번 해보셔요

근막통증 주사치료 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 경우에만 TPI를 해야한다 이런것은 없습니다. 단 현재 정보만으로 정확하게 환자 상태를 파악할 수는 없어 TPI 가능한 병원에 가서 진료 이후 TPI 여부 결정하시면 될듯합니다

무릎관절염 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무릎관절염이 있는 분들은 허벅지 근력이 강화되는 것이 무릎관절부담을 줄여주고 무릎 관절낭과 주변 점액낭의 활액 순환개선에 도움이 되기 때문에 운동을 하시는 것을 추천드립니다만 걷기보다는 체중부하없이 무릎 관절을 움직이는 운동을 주로 추천드리거나 무릎 관절의 부담을 최소화하면서 엉덩이 허벅지 근력을 개선시키는 근력운동을 추천드립니다. 혼자하시는 운동을 추천드리자면 물속걷기 자전거거부하 조절에 주의 기구근력운동 등이며 맨몸운동으로도 여러가지 방법이 있으니 무릎치료를 받으시는 병원의 담당의사나 물리치료사또는 운동치료사에게 본인의 상태에 맞는 운동을 추천받아보시길 바랍니다. 걷기도 나쁜 운동은 아니나 혹시 무릎 관절에 부담이 올수도 있으니 주의하시는 것이 좋겠습니다.

걷기운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 있으신 상황이 아니라면 걷는 양은 많을수록 좋습니다. 걷기는 유산소운동으로 전신혈행을 좋게 하려는 목적이므로 한번에 오래 걸어주시는게 좋으며 20분 두번 걷는게 무릎에는 더 안전합니다.

Hpv 추가질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 비뇨기과 갔다왔고 육안관찰로 소견 보이지 않는다 하셨고 브러쉬검사와 소변검사 하였고 다음주 월요일에 결과 보기로 하였고요. 크게 걱정하지 마시고 다음주 월요일 정확한 결과 설명후 주치의로부터 확실한 상담을 받도록 하십시오.

수액 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 문제 전혀 없는 분이 수액 500ml 가 짧은 시간에 급격하게 들어간다고 해서 폐부종이 생길 가능성은 없어보입니다.

손목통증 tfcc 질문이요,안녕하세요. 메디이즈입니다. TFCC 손상은 초음파 검사만으로는 알기 어렵습니다. 따라서 약물 치료에도 통증이 지속된다면 손목에 대한 MRI 검사가 필요합니다.

요로결석은 오른쪽인데 왼쪽 하복부 고회환의 빠근함?? 통증?이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사를 한다고 해서 고회환을 알아차리지 못하는 경우도 있습니다. 계속되면 다시 진료 받아보셔요 작은 발견되지 않은 결석이 왼쪽에 있을 수도 있어요

인공눈물 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일회용 인공눈물이든지 병에 들어 있는 인공눈물이든지 굳이 첫 한두 방울을 버리고 넣을 이유는 없는데요 전혀 걱정하실 내용은 아닌

듯 합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

정액문은 손으로 임신 될까요?,안녕하세요 요약 1. 멀하던지 비가임기면 임신 가능성은 떨어 집니다. 2. 엘라원을 4일 후에 복용 했으면 효과는 떨어지긴 할겁니다. 3. 착상혈은 난자가 수정된 후 약 일주일 뒤쯤 착상되면서 나오는 피입니다. 4. 검사 잘 하세요 건승하세요

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 꼬리 드시는 것이 문제가 될것 같지는 않습니다. 혹시 걱정되는 부분이 어떤것이 있을까요? 저도 개인적으로 꼬리 먹어요

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다한증과 같은 땀 분비에 대한 질환을 의심해볼수는 있을 것 같습니다. 다만 보통은 손과 발 겨드랑이 등의 부위에 집중적으로 땀이 분비되는 편인데 양상이 다르다면 원인이 다를 수 있겠습니다. 가까운 신경과에서 진료를 받고 확인해보시기를 권해드립니다.

지루성 두피염 피부염에 항생제를 처방하는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지루성 두피염 피부염에 항생제를 처방하는 이유는 다음과 같습니다. 세균 감염 방지 지루성 두피염 피부염은 종종 세균 감염에 의해 발생합니다. 항생제는 세균을 제거하여 감염을 예방하고 염증을 완화하는 데 도움을 줍니다. 염증 완화 지루성 두피염 피부염은 염증 반응이 과도하게 일어나 발생하는 질환입니다. 항생제는 염증을 완화하여 증상을 개선하는 데 도움을 줍니다.

물 파스 냄새 많이 맡은 후 가슴이 화끈거리여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물파스의 휘발성 물질 냄새를 많이 맡는다고 해서 폐렴이나 폐암이 발병하지는 않습니다. 과한 걱정이라고 볼 수 있습니다. 화끈거리는 증상이 정말로 특정한 물질의 노출로 인한 것이라면 내과 진료가 필요할 수 있습니다. 가까운 내과를 방문해 호흡기질환에 대한 확인을 받아보시기 바랍니다.

눈 굵힘 상처 관련 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각막이나 결막에 미세한 상처가 생겨도 대개는 하루 정도 지나면 깨끗하게 회복이 됩니다. 머리카락이 쓸리는 정도로는 상처가 거의 생기지 않으니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 치료해야 하는 상처가 났으면 이물감이나 충혈 눈물 등의 증상이 생기게 되고 본인이 별로 불편함을 못느낀다면 굳이 안과에서 검사해 볼 필요는 없습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

도핑관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 메페드린은 기침약으로 잘 쓰이는 약인데.. 도핑 검사 금지물질이기도 하네요 메틸페드린은 찾아보니 반감기가 58시간정도이고.. 완전히 배출되는 것은 2448시간 정도 되네요 다음주 월요일까지는 충분한거 같습니다. 그래도 걱정되시면 물을 많이 마시고 운동으로 대사를 촉진시키면 도움이 되겠네요.

CA,안녕하세요. 메디이즈입니다. CA724는 위암 난소암 유방암과 연관이 있지만.. 암이 아니여도 수치가 높게 나올수 있습니다. 임신해서도 or 난소에 물혹이 있어도 수치가 높아질 수 있습니다. 그래도 4배 높은 수치는 주의가 필요하니.. 산부인과 진료보시기 바랍니다.

새치흰머리에 대한 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흰머리가 나는 것은 멜라닌 색소가 감소하면서 나타납니다. 일종의 노화의 한과정이라고 할 수가 있겠쬬. 한부위에 집중적으로 나는것은 그 부위의 세포가 다른데보다 노화가 빨리 왔다고 할수 있겠네요. 신경을 많이 쓰는 직업이라 앞머리가 난것 보다는.. 그 부위에 노화로 인해 멜라닌 색소가 감소해서 발생한거 같네요.

인공눈물 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인공눈물을 개봉할 때 발생할 수 있는 플라스틱 조각에 대한 우려로 원래는 한 두방울을 버리고 사용하시는데 깜빡하고 그냥 사용하신 것이 걱정스러우시군요. 즉시 세척해내셨기 때문에 이물이 들어갔다고 하더라도 씻겨내려갔을 것이라 예상되고 현재 불편한 증상을 경험하지 않는다면 문제될 부분은 없을 것이라 보입니다.

종합검진 선택 뭐로 해야할까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 비교적 젊고 기저질

환이 없으므로 대장내시경 검사나 갑상선 초음파 검사를 받아 보는 것을 권해드립니다. 도움이 되었기를 바랍니다.

잔상이 안사라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안과 검진상 이상이 없다면 시신경 이상이나 중추성 이상에 대한 가능성을 고려하여 신경과 진료를 권한 것으로 보입니다. 신경과 진료를 보시는 것이 좋겠습니다.

외음부 염증 직접 제거 후 진물 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 습윤밴드는 부위가 피부면 붙여도 되는데 점막부위면 잘 붙어있지 않습니다. 진료를 받아보시는것이 가장 좋을 것 같습니다

눈다래끼 흉터? 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다신 진료를 한번 받아보시는것이 좋겠습니다. 시간이 지나면 저절로 좋아지는 것이 일반적입니다. 간혹 주사를 맞기도 합니다

뇌수막종에 대해 궁금한게 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌수막종은 대부분 양성 종양이지만 드물게 악성으로 확인되는 경우도 있습니다. 따라서 조직검사 결과에 대해 담당의에게 재문의하는 것이 좋겠습니다.

발톱이 서랍장 열면서 살짝 들린것 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 아프셨겠네요. 진물이 나오면 소독은 하시고 밴드나 거즈로 감아서 상처부위를 보호해 주시면 될것 같습니다. 혹시 통증이 심해지면 진료 보셔요

남성 귀두 끝 피부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 귀두포피염으로 보입니다 자극을 피하시고 항생제연고를 사용하시면 좋아질 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

오늘 너무 배부르게 먹고나서요...,안녕하세요. 과식을 하게되면 위가 팽창되면서 상부에 있는 폐를 누르기 때문에 숨을 쉬는것이 불편할수 있습니다. 게다가 과식을 하면 위장계에 무리를 주어 소화불량 복부팽만 등의 증상이 나타날수 있습니다. 과식을 하는 습관을 줄이는것이 좋고 게다가 야식은 더더욱 증상을 악화시킵니다. 반복되면 역류성식도염을 유발하게 될겁니다. 건승하세요

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 많은 양으로 과식을 하다 보니 위가 늘어나며 불편함을 느꼈을 가능성이 높아보입니다. 단 크게 문제되지는 않을듯합니다

헤르페스 의심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스와 같은 성병의 특징적인 수포성 피부 병변은 아닌 것으로 보입니다. 단순 구내염으로 보입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 과식을 하게되면 위가 팽창되면서 상부에 있는 폐를 누르기 때문에 숨을 쉬는것이 불편할수 있습니다. 게다가 과식을 하면 위장계에 무리를 주어 소화불량 복부팽만 등의 증상이 나타날수 있습니다. 과식을 하는 습관을 줄이는것이 좋고 게다가 야식은 더더욱 증상을 악화시킵니다. 반복되면 역류성식도염을 유발하게 될겁니다. 건승하세요

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배가 너무 부르면 숨이 차고 심장도 아플 수 있습니다. 이는 배에 가스가 차서 압박을 받기 때문입니다. 대변을 보면서 가스를 배출하고 나면 증상이 나아질 것입니다. 불안장애로 인해 걱정되는 것은 충분히 이해합니다. 하지만 너무 걱정할 필요는 없습니다. 위치로 심박수를 재보면 괜찮게 나오는 것을 보니 건강에 문제가 없다는 것을 알 수 있습니다. 이따가 샤워를 하고 자도 괜찮습니다. 다만 샤워를 너무 오래 하지 않도록 주의하세요. 그리고 샤워 후에는 따뜻한 차를 마시고 푹 쉬면 될

니다. 불안장애가 심한 경우에는 약을 늘리는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 하지만 약을 늘리기 전에 의사와 상담을 하는 것이 좋습니다. 건강을 잘 챙기시길 바랍니다.

남자 곤지름 가능성 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 진주양구진으로 보입니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는데 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

.안녕하세요. 메디이즈입니다. 오랜 기간 통증이 지속된다면 우선은 가까운 병원에서 파라핀욕이라는 물리치료를 3회 정도 받아보시고 호전이 없으면 주사를 통한 적극적인 치료가 도움이 됩니다.

일광화상썬변 딱지인지 대상포진인지 궁금합니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 일광화상으로 저런 병변이 가능합니다. 일광화상은 햇빛에 과도하게 노출되었을 때 피부가 붉어지고 따끔거리는 증상이 나타나는 질환입니다. 일광화상이 심해지면 물집이 생기고 물집이 터지면서 딱지가 생길 수 있습니다. 딱지는 보통 23주 정도 지나면 자연스럽게 떨어집니다. 대상포진은 수두 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 피부에 물집이 생기고 통증이 동반됩니다. 대상포진은 면역력이 떨어진 사람에게 주로 발생합니다. 대상포진은 피부뿐만 아니라 신경에도 영향을 미칠 수 있습니다. 대상포진이 의심되는 경우 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

음낭 습진 때문에 너무 괴롭습니다....안녕하세요. 메디이즈입니다. 음낭 습진은 피부염의 일종으로 피부가 붉어지고 가렵고 진물이 나며 딱딱해지는 증상을 보입니다. 음낭 습진은 원인이 다양하며 치료는 원인에 따라 다르게 진행됩니다. 비뇨기과에서 진료를 받았는데 성병이나 균이 없고 습진이라고 진단을 받았다면 피부과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 피부과에서 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받으면 음낭 습진을 완치할 수 있습니다. 또한 음낭 습진은 생활습관을 개선하는 것도 도움이 됩니다. 습한 환경을 피하고 꽉 끼는 옷을 피하며 자극적인 음식을 피하는 것이 좋습니다.

헤르페스 의심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상대방이 헤르페스 병변이 있었다고 하면 헤르페스를 의심해볼 수 있으나 그렇지 않다면 그냥 단순 구내염가능성이 높아요

성병 검사 하고 난 뒤 성기에 물집 생김,안녕하세요 요약 1. 헤르페스는 궤양이 생기고 진물이 나는 습진 양상으로 생깁니다. 2. 그리고 까지기 때문에 통증도 동반하게 되며 3. 헤르페스 2형의 증상은 보통 12주 안에 나오는 것이 보통입니다. 4. 치료 잘 받으세요 건승하세요 눈에 잔상 안사라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분 신경과에서 해결 가능하며 보통은 정밀검사 없이 안구주변의 순환을 호전시키는 치료법이 가능합니다. 편두통과 원리는 비슷하지만 조금 다른 증상입니다.

산부인과 의사분들은 배란이 언제 된 건지 알 수 있나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 산부인과 의사들은 여성의 배란일을 몇 가지 방법으로 판단할 수 있습니다. 월경 주기 관찰 일반적으로 월경 주기의 14일 전후로 배란이 일어납니다. 규칙적인 주기를 가진 경우 이를 토대로 대략적인 배란일을 예측할 수 있습니다. 기초체온 측정 배란 후 체온이 약간 상승하므로 매일 아침 체온을 측정하여 체온 상승 시점으로 배란일을 판단합니다. 자궁경부 점액 관찰 배란 무렵에는 자궁경부에서 액체 점액이 분비되는데 이를 관찰하여 배란일을 추정합니다. 호르몬 검사 배란 시기에 에스트로겐 LH황체화호르몬 수치가 변하므로 이를 측정하여 배란일을 확인합니다. 초음파 검사 난소의 성숙 난포 크기 변화와 배란 과정을 초음파로 직접 관찰할 수 있습니다. 이러한 방법들을 종합적으로 활용하여 산부인과 의사들은 환자 개인의 배란일을 비교

적 정확히 판단할 수 있습니다

삼키는 행동 후 귀고막 먹먹,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이관 기능 장애 가능성이 있어 시간이 지나면 호전될 가능성이 높습니다. 하지만 통증이 발생한다면 중이염 등의 가능성에 대해 진료가 필요합니다.

심실조기탈분극 부정맥 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심실조기탈분극 부정맥은 심장 박동이 불규칙하게 뛰는 증상입니다. 보통은 심각한 증상을 유발하지 않지만 심한 경우 심장마비나 돌연사를 일으킬 수 있습니다. 심실조기탈분극 부정맥은 약물치로나 수술로 치료할 수 있습니다. 올초 홀터 2회각 3박4일 시 0.1 미만으로 진단받았다면 심실조기탈분극 부정맥의 증상이 심하지 않은 것으로 보입니다. 하지만 증상이 심해졌다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 심전도 검사를 통해 심실조기탈분극 부정맥의 정도를 확인하고 약물치로나 수술이 필요한지 결정할 것입니다. 심실조기탈분극 부정맥은 심각한 질환이 아니지만 증상이 심해진다면 심장마비나 돌연사를 일으킬 수 있습니다. 따라서 증상이 심해지거나 걱정되는 경우에는 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

이건 곤지름일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 곤지름헤르페스매독HIV 감염과 같은 성병의 특징적인 병변이 관찰되지 않으므로 성병의 가능성은 낮습니다. 작은 피부 병변으로 생각되는데 크기 변화가 있다면 진료를 보시기 바랍니다.

감기걸려서 덱사메타손 주사 맞았는데요 에어탈정 복용되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 드시는 약과 에탈을 함께 드셔도 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다. 지금 드시는 약에 아세트아미노펜 성분이 있어서 에탈을 드시지 않아도 머리가 안아프면 안드셔도 됩니다

뇌하수체 질문 드립니다.,안녕하세요 요약 뇌하수체 미세선종이 있는지 확인해 보세요 뇌하수체 선종은 뇌하수체에 발생하는 양성 종양으로 호르몬 분비성 뇌하수체 선종 호르몬 비분비성 뇌하수체 선종으로 구분하게 됩니다. 현재 명확히 밝혀진 원인은 없습니다. 원인불명 건승하세요

뇌하수,안녕하세요 요약 1. 뇌하수체 미세선종이 있는지 확인해 보세요 2. 크기가 작은 경우 그리고 뇌하수체와 연관된 증상이 없으면 주기적인 검사만 하면서 지켜 보게 됩니다. 뇌하수체 선종은 뇌하수체에 발생하는 양성 종양으로 호르몬 분비성 뇌하수체 선종 호르몬 비분비성 뇌하수체 선종으로 구분하게 됩니다. 현재 명확히 밝혀진 원인은 없습니다. 원인불명 건승하세요

경구피임약 효과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황에서는 경구 피임약 복용 1주일 후부터 피임 효과가 나타나므로 1주일간은 다른 방법을 이용한 이중피임을 하는 것을 권해드립니다.

이거 조영제 때문인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인지력 저하느낌과 다크서클을 한가지로 설명하려면 뇌와 안면 두경부의 순환장애가 가능한 원인입니다. 신경과 진찰을 보시고 적극적인 신경치료로 빠르게 호전되는 경우가 흔합니다.

피검사 한거좀 전체적으로 봐주세요,안녕하세요 요약 1. hsCRP는 심혈관질환 예측인자입니다. 2. 심혈관질환이나 뇌졸중 등의 위험인자가 있는지 정밀검사가 필요합니다. 3. 0.3 mgdL 고위험군 입니다. hsCRP는 심혈관질환의 위험도를 예측하는 지표로서 hsCRP는 심혈관질환 심장마비 뇌졸중의 잠재적 위험수준을 확인하는 검사로입니다. 건승하세요

임신가능성이나 임신인가요,안녕하세요 요약 1. 임신테스트기로 검사를 해보세요 2. 백문이 불여일견입니다. 3. 부정출혈일 가능성이 많으며 4. 냉에서 냄새가 나거나 색이 변하면 질염인지도 확인이 필요합니다. 건승하세요

치과 신경치료 후 통증 사진첨부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 신경 치료 후 통증이 있다면 시술 부위를 다시 확인해야 합니다. 치료 받은 병원 내원하여 증상을 이야기하고 조치를 받으시기 바랍니다.

신경치료후 통증이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료받으신 병원에서 다시 확인해보셔야 할 문제라고 보입니다. 치아에 문제는 없는지 일시적인 문제인지 추가적인 처치를 요하는 문제인지 진료를 통해 확인해보시고 진료비에 대한 부분도 해당 치과에 문의해보셔야 알 수 있습니다.

신경치료 후 통증이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료받으신 병원에서 다시 확인해보셔야 할 문제라고 보입니다. 치아에 문제는 없는지 일시적인 문제인지 추가적인 처치를 요하는 문제인지 진료를 통해 확인해보시고 진료비에 대한 부분도 해당 치과에 문의해보셔야 알 수 있습니다.

코 깊숙한 곳 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 코의 통증으로 이비인후과를 방문하셨고 점막이 부어있다는 설명과 함께 약을 받았으며 3일간 복용 후에도 통증이 나아지지 않은 상태라 이해됩니다. 약을 복용해도 나아지지 않는 증상이 있다면 진료를 다시 받아보셔야 하는 상황이라고 판단할 수 있으므로 해당 이비인후과를 다시 방문해보시기를 권해드립니다.

삼키는 행동 후 귀고막 먹먹,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이관 기능 장애 가능성이 있어 시간이 지나면 호전될 가능성이 높습니다. 하지만 통증이 발생한다면 중이염 등의 가능성에 대해 진료가 필요합니다.

이건 곤지름일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 곤지름헤르페스매독HIV 감염과 같은 성병의 특징적인 병변이 관찰되지 않으므로 성병의 가능성은 낮습니다. 작은 피부 병변으로 생각되는데 크기 변화가 있다면 진료를 보시기 바랍니다.

이거 조영제 때문인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인지력 저하느낌과 다크서클을 한가지로 설명하려면 뇌와 안면 두경부의 순환장애가 가능한 원인입니다. 신경과 진찰을 보시고 적극적인 신경치료로 빠르게 호전되는 경우가 흔합니다.

조직검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비특이적이라는 이야기는 어떤 특정질환을 의심하기는 어렵다는 이야기 입니다. 증상이 지속되거나 하여 나중에 검사해서 진행하면 진단명이 바뀌는 경우도 있습니다

감기걸려서 덱사메타손 주사 맞았는데요 에어탈정 복용되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 드시는 약과 에탈을 함께 드셔도 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다. 지금 드시는 약에 아세트아미노펜 성분이 있어서 에탈을 드시지 않아도 머리가 안아프면 안드셔도 됩니다

경구피임약 복용 질문합니다.,안녕하세요 요약 1. 1번에 제일 확실하고 정확한 방법입니다. 2. 2번처럼 하지는 않습니다. 3. 6월 중순이라면 시간이 꽤 남아 있으니 생리일을 기다렸다가 복용하는게 제일 정확합니다. 4. 다만 복용 일주일 동안은 다른 피임방법을 병행해야 합니다. 건승하세요

경구피임약 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오일 정도 드시면 피임효과를 기대할 수 없으니 다른 피임방법을 사용하시면서 생리가 시작되면 다시 피임약을 시작하시는 것을 권합니다

남자 오른쪽 아랫배 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 무거운 짐을 지고 다닌후에 나타난 증상이고 특정자세에서는 심해지거나 좋아지는 것으로 미루어 근육통으로 생각됩니다

피검사 농도에 대해서 질의드립니다.,안녕하세요 요약 유닛 IU International Unit은 국제단

위 표준으로서 IU/mL 또는 U/mL을 쓰게 됩니다. U와 IU는 같은 단위입니다. IU는 international unit의 약자이며 특별한 언급이 없을 경우엔 U와 IU는 같습니다. 건승하세요 불안해요,안녕하세요 요약 1. 동네병원에서 Xray라도 찍어 보세요 2. 재발여부를 확인해 보세요 자연기흉의 경우 환자의 4050가 재발을 하며 이중 상당수가 2차 3차의 재발을 일으킵니다. 건승하세요

자궁탈출증 치료문의드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자궁탈출증 3기라면 수술적 치료 없이 보존적 치료만으로는 증상 개선에는 한계가 있습니다. 자궁 적출술 이외 봉합술도 고려해 볼 수 있습니다.

자궁탈출증 비수술적 치료 문의드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자궁탈출증이 3기정도 진행되면 폐사리외에는 비수술적인 방법은 없답니다. 다만 자궁에 근종이 없고 문제가 없다면 자궁을 보존하고 질전후벽 봉합수술을 통해서 복원이 가능합니다. 문의에 도움이 되셨기를 바랍니다.

접촉성? 알레르기성 피부염...,안녕하세요 요약 물리적 두드러기인지도 확인이 필요합니다. 물리적 두드러기는 물리적 자극에 의한 알레르기 반응으로 발생하는 피부요기증 콜린성두드러기 한랭두드러기 일광 두드러기 등이 있습니다. 급성 두드러기의 경우 짧은 기간에 치료가 끝나지만 만성 두드러기의 경우에는 항히스타민제를 포함한 여러 종류의 약제를 장기간 사용 하여야 합니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다,안녕하세요 요약 1. 치석도 먹으면 결국 변으로 같이 나오게 됩니다. 2. 나도 모르게 먹는 치석도 있을 겁니다. 3. 나도 모르게 먹을때랑 알고 먹을때랑 몸에서 달라진 건 없으니 4. 심리적 요인이 많이 작용한 겁니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다,안녕하세요 요약 1. 치석도 먹으면 결국 변으로 같이 나오게 됩니다. 2. 나도 모르게 먹는 치석도 있을 겁니다. 3. 나도 모르게 먹을때랑 알고 먹을때랑 몸에서 달라진 건 없으니 4. 심리적 요인이 많이 작용한 겁니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입안에 있던 것들이라 그것으로 문제가 되지는 않을듯합니다. 뭔가 과도하게 걱정을 하고 계신듯합니다. 걱정하실 필요 없어보입니다

궁금한것이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 안한 상태에서 물을 마시면 치석과 세균이 섞인 물이 몸에 들어가게 됩니다. 이는 몸에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 치석과 세균이 섞인 물이 잇몸에 들어가면 잇몸염증을 유발할 수 있습니다. 또한 물이 혈관을 통해 뇌로 들어가면 뇌졸중을 유발할 수 있습니다. 따라서 양치를 안한 상태에서는 물을 마시지 않는 것이 좋습니다. 갑자기 양손과 발 한쪽이 저리는 증상은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 혈액순환 장애입니다. 혈액순환 장애가 발생하면 혈액이 손과 발로 잘 공급되지 않아 저림 증상이 나타날 수 있습니다. 또한 뇌졸중이나 심장마비와 같은 질환이 발생하면 혈액순환 장애가 발생할 수 있습니다. 따라서 갑자기 양손과 발 한쪽이 저리면 뇌졸중이나 심장마비를 의심해 볼 필요가 있습니다. 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 심하지 않고 위치로 심박수를 재보니 심박수가 괜찮게 나온다면 자다가 잘못될 가능성은 낮습니다. 하지만 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 심하고 심박수가 불규칙하다면 뇌졸중이나 심장마비를 의심해 볼 필요가 있습니다. 따라서 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 불안장애 약을 먹고 있다면 약을 먹는 동안에는 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나더라도 심각한 질환이 아닐 가능성이 높습니다. 하지만 불안장애 약을 먹고 있는데도 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나고 증상이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

모공색홍색비강진과 영양제,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

여드름? 모낭염?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제로 제대로 말려서 없애는게 좋을 겁니다. 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 종기는 모낭이 있는 부위라면 어디든지 발생할 수 있지만 주로 얼굴 목 겨드랑이 엉덩이 허벅지 살고랑 부분에 잘 발생합니다. 건승하세요.

감기약과 아빌리파이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 증상이 있다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

귀두 끝 부분 병변 상태,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고름이 의심됩니다. 항생제 연고 바르는 게 좋습니다. 비뇨기와 병원에 가서 먹는 항생제랑 바르는 항생제 연고 처방 받으세요..

수액 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 문제 전혀 없는 분이 수액 500ml 가 짧은 시간에 급격하게 들어간다고 해서 폐부종이 생길 가능성은 없어보입니다.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입안에 있던 것들이라 그것으로 문제가 되지는 않을듯합니다. 뭔가 과도하게 걱정을 하고 계신듯합니다. 걱정하실 필요 없어보입니다

재발한걸까요? 음경 상피내신생물 곤지름,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조직검사에서 나온 PeIN Penile Intraepithelial Neoplasia은 전암성 상태는 맞습니다 2기이면 조금 더 깊은 피부층까지 관찰된다고 할수 있겠네요. 일단 조직검사를위해 제거를 했으니깐.. 이걸로도 치료는 했다고 할수 있습니다. 각질이 일어난거로는 재발여부는 확실치가 않네요. 주변에 새로운 병변이 나타나거나 변색이 있나도 잘 살펴보시고요. 이상이 발견되면 바로 전문의 선생님 진료를 받기 바랍니다.

근막통증 주사치료 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 경우에만 TPI를 해야한다 이런것은 없습니다. 단 현재 정보만으로 정확하게 환자 상태를 파악할 수는 없어 TPI 가능한 병원에 가서 진료 이후 TPI 여부 결정하시면 될듯합니다

무릎관절염 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무릎관절염이 있는 분들은 허벅지 근력이 강화되는 것이 무릎관절부담을 줄여주고 무릎 관절낭과 주변 점액낭의 활액 순환개선에 도움이 되기 때문에 운동을 하시는 것을 추천드립니다만 걷기보다는 체중부하없이 무릎 관절을 움직이는 운동을 주로 추천드리거나 무릎 관절의 부담을 최소화하면서 엉덩이 허벅지 근력을 개선시키는 근력운동을 추천드립니다. 혼자하시는 운동을 추천드리자면 물속걷기 자전거 거부하 조절에 주의 기구근력운동 등이며 맨몸운동으로도 여러가지 방법이 있으니 무릎치료를 받으시는 병원의 담당의사나 물리치료사또는 운동치료사에게 본인의 상태에 맞는 운동을 추천받아보시길 바랍니다. 걷기도 나쁜 운동은 아니나 혹시 무릎 관절에 부담이 올수도 있으니 주의하시는 것이 좋겠습니다.

도핑관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 메페드린은 기침약으로 잘 쓰이는 약인데.. 도핑 검사 금지물질이기도 하네요 메틸페드린은 찾아보니 반감기가 58시간정도이고.. 완전히 배출되는 것은 2448시간 정도 되네요 다음주 월요일까지는 충분한거 같습니다. 그래도 걱정되시면 물을 많이 마시고 운동으로 대사를 촉진시키면 도움이 되겠네요.

새치흰머리에 대한 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흰머리가 나는 것은 멜라닌 색소가 감소하면서 나타납니다. 일종의 노화의 한과정이라고 할 수가 있겠죠. 한부위에 집중적

으로 나는것은 그 부위의 세포가 다른데보다 노화가 빨리 왔다고 할수 있겠네요. 신경을 많이 쓰는 직업이라 앞머리가 난것 보다는.. 그 부위에 노화로 인해 멜라닌 색소가 감소해서 발생한거 같네요.

인공눈물 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인공눈물을 개봉할 때 발생할 수 있는 플라스틱 조각에 대한 우려로 원래는 한 두방울을 버리고 사용하시는데 깜빡하고 그냥 사용하신 것이 걱정스러우시군요. 즉시 세척해내셨기 때문에 이물이 들어갔다고 하더라도 씻겨내려갔을 것이라 예상되고 현재 불편한 증상을 경험하지 않는다면 문제될 부분은 없을 것이라 보입니다.

생리 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 산과 검사로 인해서 생리가 밀리거나 할것 같지는 않습니다. 원래 생리주기는 여러가지 이유로 변동이 있을 수 있습니다. 정상적인 생리주기가 미뤄진다면 임신 가능성을 먼저 생각해볼수 있고 임신이 아니라면 조금 기다려야 합니다 생리주기가 미뤄지는 주된 원인은 다음과 같습니다. 스트레스 스트레스로 인해 뇌하수체에서 방출되는 호르몬 분비가 영향을 받아 난소 기능에 이상이 생길 수 있습니다. 체중 변화 급격한 체중 증가 또는 감소는 생리 주기를 교란시킬 수 있습니다. 과도한 운동 지나친 운동은 에스트로겐 수치를 낮추어 무월경을 유발할 수 있습니다. 갑상선 기능 이상 갑상선 호르몬 과다 또는 갑상선 호르몬 결핍증은 생리 주기에 영향을 미칠 수 있습니다. 다낭성 난소 증후군 다낭성 난소로 인해 호르몬 불균형이 생기면 생리 주기가 불규칙해집니다. 약물 복용 경구 피임약 항우울제 항히스타민제 등 특정 약물은 부작용으로 생리 주기에 영향을 줄 수 있습니다. 임신 생리가 멈추는 가장 흔한 이유는 임신입니다.

Adhd가 맞는걸까요? 약을 계속 복용해도 될까요..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. CAT검사가 정상이라고 해도 ADHD가 아니라고는 할 수 없습니다. ADHD의 증상이 다양하고 개인차가 크기 때문이죠. 주의력은 좋은신거 같지만.. 일을 자주 미루거나 아침에 일어나지 못하는 증상도 ADHD로 볼수가 있습니다. 콘타정 같은경우는 원래 초기에 낮은 용량부터 시작하는거여서 부작용여부 확인해보고 괜찮다고 할때 용량을 높이기 때문에.. 일단 정신과선생님 말대로 약용량을 좀 올려보시고 경과를 지켜보는게 좋을꺼 같습니다. 콘타정으로 뇌기능저하는 매우 드문일이므로 크게 걱정안하셔도 됩니다.

어느 날부터 검지와 엄지손가락에 이상한게 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양측 인가요? 손가락에 습진이 생겼을 가능성이 높습니다. 물일을 많이하거나 손을 많이 쓰나요? 편측이면 무좀의 가능성도 생각해볼 수 있습니다

tpi 신경간내주사 차이가 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. TPI는 통증유발점이란곳에 주사를 주는거구요 신경간내주사는 신경인접부위에 주사를 주는 방법입니다. 국소마취제만으로도 효과를 볼수가 있지만 스테로이드 사용시 그 효과를 조금 더 크게 가져갈수도 있습니다. 감사합니다.

외음부 염증 직접 제거 후 진물 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 습윤밴드는 부위가 피부면 붙여도 되는데 점막부위면 잘 붙어있지 않습니다. 진료를 받아보시는것이 가장 좋을 것 같습니다

눈다래끼 흉터? 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다신 진료를 한번 받아보시는것이 좋겠습니다. 시간이 지나면 저절로 좋아지는 것이 일반적입니다. 간혹 주사를 맞기도 합니다

성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 피부염으로 보입니다 성병 가능성은 없어 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

뇌수막종에 대해 궁금한게 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌수막종은 대부분 양성 종

양이지만 드물게 악성으로 확인되는 경우도 있습니다. 따라서 조직검사 결과에 대해 담당의에게 재문의하는 것이 좋겠습니다.

종합검진 선택 뭐로 해야할까요???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 비교적 젊고 기저질환이 없으므로 대장내시경 검사나 갑상선 초음파 검사를 받아 보는 것을 권해드립니다. 도움이 되었기를 바랍니다.

발톱이 서랍장 열면서 살짝 들린것 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 아프셨겠네요. 진물이 나오면 소독은 하시고 밴드나 거즈로 감아서 상처부위를 보호해 주시면 될것 같습니다. 혹시 통증이 심해지면 진료 보셔요

남성 귀두 끝 피부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 귀두포피염으로 보입니다 자극을 피하시고 항생제연고를 사용하시면 좋아질 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오랜 기간 통증이 지속된다면 우선은 가까운 병원에서 파라핀욕이라는 물리치료를 3회 정도 받아보시고 호전이 없으면 주사를 통한 적극적인 치료가 도움이 됩니다.

헤르페스 의심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상대방이 헤르페스 병변이 있었다고 하면 헤르페스를 의심해볼 수 있으나 그렇지 않다면 그냥 단순 구내염가능성이 높아요

잔상이 안사라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안과 검진상 이상이 없다면 시신경 이상이나 중추성 이상에 대한 가능성을 고려하여 신경과 진료를 권한 것으로 보입니다. 신경과 진료를 보시는 것이 좋겠습니다.

눈에 잔상 안사라짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분 신경과에서 해결 가능하며 보통은 정밀검사 없이 안구주변의 순환을 호전시키는 치료법이 가능합니다. 편두통과 원리는 비슷하지만 조금 다른 증상입니다.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황으로 인해 건강에 위중한 영향을 미치거나 건강이 위협되는 일은 발생하지 않습니다. 너무 걱정하지 않기 바랍니다.

당뇨약 어떻게 먹어야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨약은 환자의 기저 질환과 당화혈색소를 보고 판단하여 조절을 합니다. 상기 생각을 담당의에게 이야기하고 조절 받기 바랍니다.

호흡기에 문제가 생긴 걸 까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 심부전과 같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

헤르페스 의심,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상대방이 헤르페스 병변이 있었다고 하면 헤르페스를 의심해볼 수 있으나 그렇지 않다면 그냥 단순 구내염가능성이 높아요

남성성기 종기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

근막통증 주사치료 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 경우에만 TPI를 해야한다 이런것은 없습니다. 단 현재 정보만으로 정확하게 환자 상태를 파악할 수는 없어 TPI 가능한 병원에 가서 진료 이후 TPI 여부 결정하시면 될듯합니다

무릎관절염 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무릎관절염이 있는 분들은 허벅지 근력이 강화

되는 것이 무릎관절부담을 줄여주고 무릎 관절낭과 주변 점액낭의 활액 순환개선에 도움이 되기 때문에 운동을 하시는 것을 추천드립니다만 걷기보다는 체중부하없이 무릎 관절을 움직이는 운동을 주로 추천드리거나 무릎 관절의 부담을 최소화하면서 엉덩이 허벅지 근력을 개선시키는 근력운동을 추천드립니다. 혼자하시는 운동을 추천드리자면 물속걷기 자전거타기 조깅에 주의 기구근력운동 등이며 맨몸운동으로도 여러가지 방법이 있으니 무릎치료를 받으시는 병원의 담당의사나 물리치료사또는 운동치료사에게 본인의 상태에 맞는 운동을 추천받아보시길 바랍니다. 걷기도 나쁜 운동은 아니나 혹시 무릎 관절에 부담이 올수도 있으니 주의하시는 것이 좋겠습니다.

발톱이 서랍장 열면서 살짝 들린것 같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 아프셨겠네요. 진물이 나오면 소독은 하시고 밴드나 거즈로 감아서 상처부위를 보호해 주시면 될것 같습니다. 혹시 통증이 심해지면 진료 보셔요

남성 귀두 끝 피부,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 귀두포피염으로 보입니다 자극을 피하시고 항생제연고를 사용하시면 좋아질 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오랜 기간 통증이 지속된다면 우선은 가까운 병원에서 파라핀욕이라는 물리치료를 3회 정도 받아보시고 호전이 없으면 주사를 통한 적극적인 치료가 도움이 됩니다.

지루성 두피염 피부염에 항생제를 처방하는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지루성 두피염 피부염에 항생제를 처방하는 이유는 다음과 같습니다. 세균 감염 방지 지루성 두피염 피부염은 종종 세균 감염에 의해 발생합니다. 항생제는 세균을 제거하여 감염을 예방하고 염증을 완화하는 데 도움을 줍니다. 염증 완화 지루성 두피염 피부염은 염증 반응이 과도하게 일어나 발생하는 질환입니다. 항생제는 염증을 완화하여 증상을 개선하는 데 도움을 줍니다.

물 파스 냄새 많이 맡은 후 가슴이 화끈거려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물파스의 휘발성 물질 냄새를 많이 맡는다고 해서 폐렴이나 폐암이 발병하지는 않습니다. 과한 걱정이라고 볼 수 있습니다. 화끈거리는 증상이 정말로 특정한 물질의 노출로 인한 것이라면 내과 진료가 필요할 수 있습니다. 가까운 내과를 방문해 호흡기질환에 대한 확인을 받아보시기 바랍니다.

tpi 신경간내주사 차이가 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. TPI는 통증유발점이란곳에 주사를 주는거구요 신경간내주사는 신경인접부위에 주사를 주는 방법입니다. 국소마취제만으로도 효과를 볼수가 있지만 스테로이드 사용시 그 효과를 조금 더 크게 가져갈수도 있습니다. 감사합니다.

이마 부근에 피부 당김과 쑤심이 느껴집니다. 계속 그래서 궁금해서 여쭙습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이마부위의 순환이나 통증도 뒷목에서 관여합니다. 치료는 뒷목의 근육 압박을 풀어서 척추간의 압력을 줄여서 머리와 안면눈을 담당하는 자율신경이 풀리면 호전되게 됩니다

여자친구와 관계시 지루,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지루 증상인 것 같습니다. 아쉽게도 지루는 아직 치료 방법이 없습니다. 만약 발기능 저하로 흥분도가 낮으면 비슷한 증상이 있을 수 있는데 이때는 발기부전제를 복용하고 증상을 확인해 봐도 좋습니다. 가까운 비뇨의학과 방문하셔서 상담받아 보시기 바랍니다.

생리 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 산과 검사로 인해서 생리가 밀리거나 할것 같지는 않습니다. 원래 생리주기는 여러가지 이유로 변동이 있을 수 있습니다. 정상적인 생리주기

가 미뤄진다면 임신 가능성을 먼저 생각해볼수 있고 임신이 아니라면 조금 기다려야 합니다 생리주기가 미뤄지는 주된 원인은 다음과 같습니다. 스트레스 스트레스로 인해 뇌하수체에서 방출되는 호르몬 분비가 영향을 받아 난소 기능에 이상이 생길 수 있습니다. 체중 변화 급격한 체중 증가 또는 감소는 생리 주기를 교란시킬 수 있습니다. 과도한 운동 지나친 운동은 에스트로겐 수치를 낮추어 무월경을 유발할 수 있습니다. 갑상선 기능 이상 갑상선 호르몬 과다 또는 갑상선 호르몬 결핍증은 생리 주기에 영향을 미칠 수 있습니다. 다낭성 난소 증후군 다낭성 난소로 인해 호르몬 불균형이 생기면 생리 주기가 불규칙해집니다. 약물 복용 경구 피임약 항우울제 항히스타민제 등 특정 약물은 부작용으로 생리 주기에 영향을 줄 수 있습니다. 임신 생리가 멈추는 가장 흔한 이유는 임신입니다.

인공눈물 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인공눈물을 개봉할 때 발생할 수 있는 플라스틱 조각에 대한 우려로 원래는 한 두방울을 버리고 사용하시는데 깜빡하고 그냥 사용하신 것이 걱정스러우시군요. 즉시 세척해내셨기 때문에 이물이 들어갔다고 하더라도 씻겨내려갔을 것이라 예상되고 현재 불편한 증상을 경험하지 않는다면 문제될 부분은 없을 것이라 보입니다.

새치흰머리에 대한 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흰머리가 나는 것은 멜라닌 색소가 감소하면서 나타납니다. 일종의 노화의 한과정이라고 할 수가 있겠쎄. 한부위에 집중적으로 나는것은 그 부위의 세포가 다른데보다 노화가 빨리 왔다고 할수 있겠네요. 신경을 많이 쓰는 직업이라 앞머리가 난것 보다는.. 그 부위에 노화로 인해 멜라닌 색소가 감소해서 발생한거 같네요.

외음부 염증 직접 제거 후 진물 관리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 습윤밴드는 부위가 피부면 붙여도 되는데 점막부위면 잘 붙어있지 않습니다. 진료를 받아보시는것이 가장 좋을 것 같습니다

재발한걸까요? 음경 상피내신생물 곤지름,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조직검사에서 나온 PeIN Penile Intraepithelial Neoplasia은 전암성 상태는 맞습니다 2기이면 조금 더 깊은 피부층까지 관찰된다고 할수 있겠네요. 일단 조직검사를위해 제거를 했으니깐.. 이걸로도 치료는 했다고 할수 있습니다. 각질이 일어난거로는 재발여부는 확실치가 않네요. 주변에 새로운 병변이 나타나거나 변색이 있나도 잘 살펴보시고요. 이상이 발견되면 바로 전문의 선생님 진료를 받기 바랍니다.

눈다래끼 흉터? 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다신 진료를 한번 받아보시는것이 좋겠습니다. 시간이 지나면 저절로 좋아지는 것이 일반적입니다. 간혹 주사를 맞기도 합니다

뇌수막종에 대해 궁금한게 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌수막종은 대부분 양성 종양이지만 드물게 악성으로 확인되는 경우도 있습니다. 따라서 조직검사 결과에 대해 담당의에게 재문의하는 것이 좋겠습니다.

어느 날부터 검지와 엄지손가락에 이상한게 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양측 인가요? 손가락에 습진이 생겼을 가능성이 높습니다. 물일을 많이하거나 손을 많이 쓰나요? 편측이면 무좀의 가능성도 생각해볼 수 있습니다

Adhd가 맞는걸까요? 약을 계속 복용해도 될까요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. CAT검사가 정상이라고 해도 ADHD가 아니라고는 할 수 없습니다. ADHD의 증상이 다양하고 개인차가 크기 때문이죠. 주의력은 좋은신거 같지만.. 일을 자주 미루거나 아침에 일어나지 못하는 증상도 ADHD로 볼수가 있습니다. 콘타정 같은경우는 원래 초기에 낮은 용량부터 시작하는거여서 부작용여부 확인해보고 괜찮다고 할때 용량을 높이기 때문에.. 일단 정신과선생님 말대로 약용량을 좀 올려보시고 경과를 지켜보는게 좋을꺼 같습니다. 콘타정으로 뇌기능저하는 매우

드문일이므로 크게 걱정안하셔도 됩니다.

tpi 신경간내주사 차이가 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. TPI는 통증유발점이란곳에 주사를 주는거구요 신경간내주사는 신경인접부위에 주사를 주는 방법입니다. 국소마취제만으로도 효과를 볼수가 있지만 스테로이드 사용시 그 효과를 조금 더 크게 가져갈수도 있습니다. 감사합니다.

성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 피부염으로 보입니다 성병 가능성은 없어 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

생리 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 산과 검사로 인해서 생리가 밀리거나 할것 같지는 않습니다. 원래 생리주기는 여러가지 이유로 변동이 있을 수 있습니다. 정상적인 생리주기가 미뤄진다면 임신 가능성을 먼저 생각해볼수 있고 임신이 아니라면 조금 기다려야 합니다 생리주기가 미뤄지는 주된 원인은 다음과 같습니다. 스트레스 스트레스로 인해 뇌하수체에서 방출되는 호르몬 분비가 영향을 받아 난소 기능에 이상이 생길 수 있습니다. 체중 변화 급격한 체중 증가 또는 감소는 생리 주기를 교란시킬 수 있습니다. 과도한 운동 지나친 운동은 에스트로겐 수치를 낮추어 무월경을 유발할 수 있습니다. 갑상선 기능 이상 갑상선 호르몬 과다 또는 갑상선 호르몬 결핍증은 생리 주기에 영향을 미칠 수 있습니다. 다낭성 난소 증후군 다낭성 난소로 인해 호르몬 불균형이 생기면 생리 주기가 불규칙해집니다. 약물 복용 경구 피임약 항우울제 항히스타민제 등 특정 약물은 부작용으로 생리 주기에 영향을 줄 수 있습니다. 임신 생리가 멈추는 가장 흔한 이유는 임신입니다.

Adhd가 맞는걸까요? 약을 계속 복용해도 될까요..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. CAT검사가 정상이라고 해도 ADHD가 아니라고는 할 수 없습니다. ADHD의 증상이 다양하고 개인차가 크기 때문이죠. 주의력은 좋은신거 같지만.. 일을 자주 미루거나 아침에 일어나지 못하는 증상도 ADHD로 볼수가 있습니다. 콘타정 같은경우는 원래 초기에 낮은 용량부터 시작하는거여서 부작용여부 확인해보고 괜찮다고 할때 용량을 높이기 때문에.. 일단 정신과선생님 말대로 약용량을 좀 올려보시고 경과를 지켜보는게 좋을꺼 같습니다. 콘타정으로 뇌기능저하는 매우 드문일이므로 크게 걱정안하셔도 됩니다.

성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 피부염으로 보입니다 성병 가능성은 없어 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

어느 날부터 검지와 엄지손가락에 이상한게 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양측 인가요? 손가락에 습진이 생겼을 가능성이 높습니다. 물일을 많이하거나 손을 많이 쓰나요? 편측이면 무좀의 가능성도 생각해볼 수 있습니다

CA,안녕하세요. 메디이즈입니다. CA724는 위암 난소암 유방암과 연관이 있지만.. 암이 아니여도 수치가 높게 나올수 있습니다. 임신해서도 or 난소에 물혹이 있어도 수치가 높아질 수 있습니다. 그래도 4배 높은 수치는 주의가 필요하니.. 산부인과 진료보시기 바랍니다.

모소동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로 관찰되는 피부의 변화를 보면 수술한 부위 옆으로 또 다른 피부병변이 발생한 상태라 판단됩니다. 다만 모낭염일 가능성도 있으니 가까운 외과를 방문하여 정밀한 진찰을 받아보시기 바랍니다.

요로결석은 오른쪽인데 왼쪽 하복부 고회의 빠근함?? 통증?이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사를 한다고 해서 고회염을 알아차리지 못하는 경우도 있습니다. 계속되면 다시 진료 받아보श्य 작은 발견되지 않은 결석이 왼쪽에 있을 수도 있어요

안녕하세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 급성 부비동염에서 발살바를 하는 이유가 있나요? 발살바를 해서 불편함이 있으면 하지 않으시는 것이 좋겠습니다 2. 가능성은 별로 없어보입니다.

걷기운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 있으신 상황이 아니라면 걷는 양은 많을 수록 좋습니다. 걷기는 유산소운동으로 전신혈행을 좋게 하려는 목적이므로 한번에 오래 걸어 주시는게 좋으며 20분 두번 걷는게 무릎에는 더 안전합니다.

CA,안녕하세요. 메디이즈입니다. CA724는 위암 난소암 유방암과 연관이 있지만.. 암이 아니여도 수치가 높게 나올수 있습니다. 임신해서도 or 난소에 물혹이 있어도 수치가 높아질 수 있습니다. 그래도 4배 높은 수치는 주의가 필요하니.. 산부인과 진료보시기 바랍니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다한증과 같은 땀 분비에 대한 질환을 의심해볼수는 있을 것 같습니다. 다만 보통은 손과 발 겨드랑이 등의 부위에 집중적으로 땀이 분비되는 편인데 양상이 다르다면 원인이 다를 수 있겠습니다. 가까운 신경과에서 진료를 받고 확인해보시기를 권해드립니다.

tpi 신경간내주사 차이가 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. TPI는 통증유발점이란곳에 주사를 주는거구요 신경간내주사는 신경인접부위에 주사를 주는 방법입니다. 국소마취제만으로도 효과를 볼수가 있지만 스테로이드 사용시 그 효과를 조금 더 크게 가져갈수도 있습니다. 감사합니다.

성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 단순 피부염으로 보입니다 성병 가능성은 없어 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

눈 굵힘 상처 관련 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각막이나 결막에 미세한 상처가 생겨도 대개는 하루 정도 지나면 깨끗하게 회복이 됩니다. 머리카락이 쓸리는 정도로는 상처가 거의 생기지 않으니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 치료해야 하는 상처가 났으면 이물감이나 충혈 눈물 등의 증상이 생기게 되고 본인이 별로 불편함을 못느낀다면 굳이 안과에서 검사해 볼 필요는 없습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

무릎관절염 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무릎관절염이 있는 분들은 허벅지 근력이 강화되는 것이 무릎관절부담을 줄여주고 무릎 관절낭과 주변 점액낭의 활액 순환개선에 도움이 되기 때문에 운동을 하시는 것을 추천드립니다만 걷기보다는 체중부하없이 무릎 관절을 움직이는 운동을 주로 추천드리거나 무릎 관절의 부담을 최소화하면서 엉덩이 허벅지 근력을 개선시키는 근력운동을 추천드립니다. 혼자하시는 운동을 추천드리자면 물속걷기 자전거타기 조깅에 주의 기구근력운동 등이며 맨몸운동으로도 여러가지 방법이 있으니 무릎치료를 받으시는 병원의 담당의사나 물리치료사또는 운동치료사에게 본인의 상태에 맞는 운동을 추천받아보시길 바랍니다. 걷기도 나쁜 운동은 아니나 혹시 무릎 관절에 부담이 올수도 있으니 주의하시는 것이 좋겠습니다.

무릎관절염 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무릎관절염이 있는 분들은 허벅지 근력이 강화되는 것이 무릎관절부담을 줄여주고 무릎 관절낭과 주변 점액낭의 활액 순환개선에 도움이 되기 때문에 운동을 하시는 것을 추천드립니다만 걷기보다는 체중부하없이 무릎 관절을 움직이는 운동을 주로 추천드리거나 무릎 관절의 부담을 최소화하면서 엉덩이 허벅지 근력을 개선시키는 근력운동을 추천드립니다. 혼자하시는 운동을 추천드리자면 물속걷기 자전거타기 조깅에 주의 기구근력운동 등이며 맨몸운동으로도 여러가지 방법이 있으니 무릎치료를 받으시는 병원의 담당의사나 물리치료사또는 운동치료사에게 본인의 상태에 맞는 운동을 추천받아보시길

길 바랍니다. 걷기도 나쁜 운동은 아니나 혹시 무릎 관절에 부담이 올수도 있으니 주의하시는 것이 좋겠습니다.

CA,안녕하세요. 메디이즈입니다. CA724는 위암 난소암 유방암과 연관이 있지만.. 암이 아니어도 수치가 높게 나올수 있습니다. 임신해서도 or 난소에 물혹이 있어도 수치가 높아질 수 있습니다. 그래도 4배 높은 수치는 주의가 필요하니.. 산부인과 진료보시기 바랍니다.

눈 굽힘 상처 관련 문의 드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 각막이나 결막에 미세한 상처가 생겨도 대개는 하루 정도 지나면 깨끗하게 회복이 됩니다. 머리카락이 쓸리는 정도로는 상처가 거의 생기지 않으니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 치료해야 하는 상처가 났으면 이물감이나 충혈 눈물 등의 증상이 생기게 되고 본인이 별로 불편함을 못느낀다면 굳이 안과에서 검사해 볼 필요는 없습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

새치흰머리에 대한 질문입니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 흰머리가 나는 것은 멜라닌 색소가 감소하면서 나타납니다. 일종의 노화의 한과정이라고 할 수가 있겠쬔. 한부위에 집중적으로 나는것은 그 부위의 세포가 다른데보다 노화가 빨리 왔다고 할수 있겠네요. 신경을 많이 쓰는 직업이라 앞머리가 난것 보다는.. 그 부위에 노화로 인해 멜라닌 색소가 감소해서 발생한거 같네요.

인공눈물 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일회용 인공눈물이든지 병에 들어 있는 인공눈물이든지 굳이 첫 한두 방울을 버리고 넣을 이유는 없는데요 전혀 걱정하실 내용은 아닌 듯 합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

Hpv 추가질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 비뇨기과 갔다왔고 육안관찰로 소견 보이지 않는다 하셨고 브러쉬검사와 소변검사 하였고 다음주 월요일에 결과 보기로 하였고요. 크게 걱정하지 마시고 다음주 월요일 정확한 결과 설명후 주치의로부터 확실한 상담을 받도록 하십시오.

도핑관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 메페드린은 기침약으로 잘 쓰이는 약인데.. 도핑 검사 금지물질이기도 하네요 메틸페드린은 찾아보니 반감기가 58시간정도이고.. 완전히 배출되는 것은 2448시간 정도 되네요 다음주 월요일까지는 충분한거 같습니다. 그래도 걱정되시면 물을 많이 마시고 운동으로 대사를 촉진시키면 도움이 되겠네요.

Adhd가 맞는걸까요? 약을 계속 복용해도 될까요..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. CAT검사가 정상이라고 해도 ADHD가 아니라고는 할 수 없습니다. ADHD의 증상이 다양하고 개인차가 크기 때문이죠. 주의력은 좋은신거 같지만.. 일을 자주 미루거나 아침에 일어나지 못하는 증상도 ADHD로 볼수가 있습니다. 콘타정 같은경우는 원래 초기에 낮은 용량부터 시작하는거여서 부작용여부 확인해보고 괜찮다고 할때 용량을 높이기 때문에.. 일단 정신과선생님 말대로 약용량을 좀 올려보시고 경과를 지켜보는게 좋을꺼 같습니다. 콘타정으로 뇌기능저하는 매우 드문일이므로 크게 걱정안하셔도 됩니다.

지루성 두피염 피부염에 항생제를 처방하는 이유,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지루성 두피염 피부염에 항생제를 처방하는 이유는 다음과 같습니다. 세균 감염 방지 지루성 두피염 피부염은 종종 세균 감염에 의해 발생합니다. 항생제는 세균을 제거하여 감염을 예방하고 염증을 완화하는 데 도움을 줍니다. 염증 완화 지루성 두피염 피부염은 염증 반응이 과도하게 일어나 발생하는 질환입니다. 항생제는 염증을 완화하여 증상을 개선하는 데 도움을 줍니다.

살짝 우울하고 집중이 잘 안됩니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 우울감으로 인해 집중력이 저하되고 일상생활에서 성과를 내기가 어려워지는 것 같다면 우울증과 같은 정신건강의학적 질환을 의심해보아야 하는 상황일 수 있겠습니다. 질환에 대한 정확한 진단과 치료가 증상의

호전을 가져올 수 있을 것이므로 병원을 방문해보시는 것이 좋겠습니다. 정확한 진단 없이는 어떤 약이 현 상황에서 도움이 될 지도 알기 어렵습니다.

발쪽에 모세혈관들이 보이는데 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모세혈관이 터진 것은 아니고 거의 정상이거나 일부 확장되어 보이는 상황이나 불편한 증상을 경험하고 계신 것이 아니라면 딱히 문제삼지 않아도 괜찮을만한 수준입니다. 다른 부위에는 이상이 없다고 하시니 경과를 관찰하시면 되겠습니다.

입술에 뾰루지인지 뭔지 잘 모르겠는데 뭐가 났어요 혹시 헤르페스인가요 ? ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 구순염은 수포성 병변이 군집을 이루어서 다수 발병하기 때문에 단독 병변인 해당 뾰루지를 헤르페스 구순염이라 보기는 어렵습니다. 시간이 지나면 호전될 것이라 보이나 잘 나아지지 않는다면 피부과를 방문하시기 바랍니다.

구강 백색,안녕하세요. 메디이즈입니다. 구체적으로 어느 부분의 불편을 호소하시는 것인지 잘 모르겠습니다. 구강 내 특별히 관찰되는 병변은 없어보입니다. 걱정스러운 부분이 있다면 가까운 이비인후과나 치과에서 정밀한 진찰을 받아보시기 바랍니다.

발톱뿌리의 검은 점들과 검은 피떡검은 피 켈리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱 뿌리부분에 외상이 발생한 상황을 의심할 수 있습니다. 기억하는 외상이 딱히 없다면 발가락을 불편하게 압박하는 상황이 여러차례 반복되었을 가능성도 있겠습니다. 정상적인 발톱이 자라나며 출혈이 멎는다면 잘 회복하고 있다고 볼 수 있고 변형된 발톱이 지속적으로 자라나온다면 피부과 진료가 필요합니다.

입 주변 뾰루지에 스테로이드 계열 전문의약품 연고로 효과 봤다면 헤르페스 아닌거죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입 주변에 발생한 피부병변에 대해 스테로이드 연고를 사용했을 때 병변이 호전되었다면 감염성 질환인 헤르페스 구순염의 가능성은 매우 낮습니다. 만약 헤르페스에 의한 병변이었다면 호전되지 않았을 것입니다. 또한 헤르페스로 인한 피부염은 특징적인 형태를 보이기 때문에 진단이 어렵지는 않은 편입니다.

배 아래에 이상한게 만져져요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피하 결절이나 림프절 가능성이 높지만 병변이 저절로 사라지지 않는다면 초음파 검사를 확인하는 것이 가장 효과적인 방법입니다.

인공눈물 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인공눈물을 개봉할 때 발생할 수 있는 플라스틱 조각에 대한 우려로 원래는 한 두방울을 버리고 사용하시는데 깜빡하고 그냥 사용하신 것이 걱정스러우시군요. 즉시 세척해내셨기 때문에 이물이 들어갔다고 하더라도 씻겨내려갔을 것이라 예상되고 현재 불편한 증상을 경험하지 않는다면 문제될 부분은 없을 것이라 보입니다.

왼쪽 다리에서 원인불명의 열감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 특별한 외상 없이 다리 외측으로 이상감각이 느껴지신다면 신경과 또는 신경외과 재활의학과 진료해보시기 바랍니다. 감사합니다.

다리 염증치료후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 상황은 잘 모르겠지만 물집이 어디에 생긴것인가요? 보호대부위에 생긴것이라고 하면 그곳에 마찰이 심해서 그런것 같습니다

걷기운동도 폐활량 증가에 도움이 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 걷는 운동이 실질적으로 폐활량 증가에는 크게 도움이 되지않습니다. 어느 정도 심박수를 올릴 수 있는 가벼운 러닝을 하시는 것을 추천드립니다.

월경 생리 주기가 일정하면 임신확률이 높나요?,안녕하세요 요약 1. 당연 월경 생리주기가 일정하면 임신확률이 높아집니다. 2. 배란도 규칙적으로 하게 되면 임신할 수 있는 기간을 쉽게 예측할 수 있기 때문에 3. 다른 몸 상태만 잘 받쳐준다면 단번에 임신을 할 수도 있습니다

다. 건승하세요

가슴통증이랑 생리 안함,안녕하세요 요약 1. 임신 가능성 여부부터 확인해 보시고 2. 단순한 생리불순인지 질병에 의한 생리불순인지 확인해 봐야 합니다. 3. 다낭성이 원인인지도 다시 확인해 보세요 정상적인 생리 주기는 2138일 기간은 38일 하루 생리량은 2080ml입니다. 이 범위를 벗어나면 생리 불순이라고 합니다. 스트레스 갑작스러운 체중 증가감소 고강도의 과한 운동 신경성 식욕 부진 같은 섭식장애는 호르몬 분비에 영향을 줘 생리 주기를 변화시킬 수 있는데 무배란자궁근종자궁내막암과 자궁경부암 같은 질환 갑상샘 기능 이상 같은 내분비계 장애가 원인이 될 수도 있습니다. 건승하세요

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소화되진는 않으니 미세플라스틱으로 되지는 않고 대변으로 배출될 것으로 생각되니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다

팔 안쪽이 빠근해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 팔 안쪽의 빠근한 증상으로 고민스러우시군요. 피가 통하지 않는다는 부분은 가능성이 많이 떨어지므로 걱정하지 않아도 되겠지만 통증이 지속된다면 근육이나 인대의 문제 신경의 문제를 우선 확인해보아야 하겠습니다. 가까운 정형외과를 방문해 확인해보시기 바랍니다.

무거운거에 손가락 찔었는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분 단순타박상입니다. 골절 여부는 엑스레이를 확인해 보시는게 안전합니다. 의료보험이 되니 비용이 많이 들지는 않습니다.

인공눈물 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일회용 인공눈물이든지 병에 들어 있는 인공눈물이든지 굳이 첫 한두 방울을 버리고 넣을 이유는 없는데요 전혀 걱정하실 내용은 아닌 듯 합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다한증과 같은 땀 분비에 대한 질환을 의심해볼수는 있을 것 같습니다. 다만 보통은 손과 발 겨드랑이 등의 부위에 집중적으로 땀이 분비되는 편인데 양상이 다르다면 원인이 다를 수 있겠습니다. 가까운 신경과에서 진료를 받고 확인해보시기를 권해드립니다.

물 파스 냄새 많이 맡은 후 가슴이 화끈거려여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물파스의 휘발성 물질 냄새를 많이 맡는다고 해서 폐렴이나 폐암이 발병하지는 않습니다. 과한 걱정이라고 볼 수 있습니다. 화끈거리는 증상이 정말로 특정한 물질의 노출로 인한 것이라면 내과 진료가 필요할 수 있습니다. 가까운 내과를 방문해 호흡기질환에 대한 확인을 받아보시기 바랍니다.

눈 굵힘 상처 관련 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각막이나 결막에 미세한 상처가 생겨도 대개는 하루 정도 지나면 깨끗하게 회복이 됩니다. 머리카락이 찌르는 정도로는 상처가 거의 생기지 않으니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 치료해야 하는 상처가 났으면 이물감이나 충혈 눈물 등의 증상이 생기게 되고 본인이 별로 불편함을 못느낀다면 굳이 안과에서 검사해 볼 필요는 없습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

물 파스 냄새 많이 맡은 후 가슴이 화끈거려여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 물파스의 휘발성 물질 냄새를 많이 맡는다고 해서 폐렴이나 폐암이 발병하지는 않습니다. 과한 걱정이라고 볼 수 있습니다. 화끈거리는 증상이 정말로 특정한 물질의 노출로 인한 것이라면 내과 진료가 필요할 수 있습니다. 가까운 내과를 방문해 호흡기질환에 대한 확인을 받아보시기 바랍니다.

눈 굵힘 상처 관련 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각막이나 결막에 미세한 상처가 생겨도 대개는 하루 정도 지나면 깨끗하게 회복이 됩니다. 머리카락이 찌르는 정도로는 상처가 거의 생기지 않으니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 치료해야 하는 상처가 났으면 이물감이나 충혈 눈물 등의 증상이 생기게 되고 본인이 별로 불편함을 못느낀다면 굳이 안과에서

검사해 볼 필요는 없습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

커피는 빈속만 피하면 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소에 그렇게 커피 드셔서 큰 문제가 없다고 하면 식후 커피는 위장에 무리를 주거나 하지는 않을 것으로 생각됩니다.

손에 약간 상처났는데 생고기를 만졌어요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황상 걱정하는 일은 벌어지지 않으니 안심하셔도 됩니다. 당뇨병과 같은 질환은 감염성 질환이 아닙니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손에 상처 난 부분 생고기 만졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병은 감기처럼 옮는 병이 아닙니다. 따라서 상처로 돼지 당노가 절대로 옮거나 하지 않으니 안심하시기 바랍니다.

가만히 서있는데 항문 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵이나 치열이 있을 때 출혈이 있을 수 있습니다. 만약 증상이 반복된다면 진료를 받아 보시기 바랍니다. 2년 전에 문제는 정확한 원인을 짐작하기는 어렵습니다. 감사합니다.

치루 수술 후 좌욕 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치루 수술 후 좌욕 시 통증이 있는 것은 정상적인 반응입니다. 수술 부위의 상처가 아물기 전이기 때문에 통증이 발생할 수 있습니다. 임신가능성이나 임신인가요,안녕하세요 요약 1. 임신테스트기로 검사를 해보세요 2. 백문이 불여일견입니다. 3. 부정출혈일 가능성이 많으며 4. 냉에서 냄새가 나거나 색이 변하면 질염인지도 확인이 필요합니다. 건승하세요

신경치료후 통증이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료받으신 병원에서 다시 확인해보셔야 할 문제라고 보입니다. 치아에 문제는 없는지 일시적인 문제인지 추가적인 처치를 요하는 문제인지 진료를 통해 확인해보시고 진료비에 대한 부분도 해당 치과에 문의해보셔야 할 수 있겠습니다.

신경치료 후 통증이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료받으신 병원에서 다시 확인해보셔야 할 문제라고 보입니다. 치아에 문제는 없는지 일시적인 문제인지 추가적인 처치를 요하는 문제인지 진료를 통해 확인해보시고 진료비에 대한 부분도 해당 치과에 문의해보셔야 할 수 있겠습니다.

코 깊숙한 곳 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 최근 코의 통증으로 이비인후과를 방문하셨고 점막이 부어있다는 설명과 함께 약을 받았으며 3일간 복용 후에도 통증이 나아지지 않은 상태라 이해됩니다. 약을 복용해도 나아지지 않는 증상이 있다면 진료를 다시 받아보셔야 하는 상황이라고 판단할 수 있으므로 해당 이비인후과를 다시 방문해보시기를 권해드립니다.

남자 오른쪽 아랫배 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 무거운 짐을 지고 다닌후에 나타난 증상이고 특정자세에서는 심해지거나 좋아지는 것으로 미루어 근육통으로 생각됩니다

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황으로 인해 건강에 위중한 영향을 미치거나 건강이 위협되는 일은 발생하지 않습니다. 너무 걱정하지 않기 바랍니다.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요 요약 1. 치석도 먹으면 결국 변으로 같이 나오게 됩니다. 2. 나도 모르게 먹는 치석도 있을 겁니다. 3. 나도 모르게 먹을때랑 알고 먹을때랑 몸에서 달라진 건 없으니 4. 심리적 요인이 많이 작용한 겁니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다,안녕하세요 요약 1. 치석도 먹으면 결국 변으로 같이 나오게 됩니다. 2. 나도 모르게 먹는 치석도 있을 겁니다. 3. 나도 모르게 먹을때랑 알고 먹을때랑 몸에서 달라진 건 없으니 4. 심리적 요인이 많이 작용한 겁니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입안에 있던 것들이라 그것으로 문제가 되지는 않을듯합니다. 뭔가 과도하게 걱정을 하고 계신듯합니다. 걱정하실 필요 없어보입니다

궁금한것이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 안한 상태에서 물을 마시면 치석과 세균이 섞인 물이 몸에 들어가게 됩니다. 이는 몸에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 치석과 세균이 섞인 물이 잇몸에 들어가면 잇몸염증을 유발할 수 있습니다. 또한 물이 혈관을 통해 뇌로 들어가면 뇌졸중을 유발할 수 있습니다. 따라서 양치를 안한 상태에서는 물을 마시지 않는 것이 좋습니다. 갑자기 양손과 발 한쪽이 저리는 증상은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 혈액순환 장애입니다. 혈액순환 장애가 발생하면 혈액이 손과 발로 잘 공급되지 않아 저림 증상이 나타날 수 있습니다. 또한 뇌졸중이나 심장마비와 같은 질환이 발생하면 혈액순환 장애가 발생할 수 있습니다. 따라서 갑자기 양손과 발 한쪽이 저리면 뇌졸중이나 심장마비를 의심해 볼 필요가 있습니다. 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 심하지 않고 위치로 심박수를 재보니 심박수가 괜찮게 나온다면 자다가 잘못될 가능성은 낮습니다. 하지만 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 심하고 심박수가 불규칙하다면 뇌졸중이나 심장마비를 의심해 볼 필요가 있습니다. 따라서 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 불안장애 약을 먹고 있다면 약을 먹는 동안에는 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나더라도 심각한 질환이 아닐 가능성이 높습니다. 하지만 불안장애 약을 먹고 있는데도 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나고 증상이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

침샘쪽 멍울이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련은 없습니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

불안해요,안녕하세요 요약 1. 동네병원에서 Xray라도 찍어 보세요 2. 재발여부를 확인해 보세요 자연기흉의 경우 환자의 4050가 재발을 하며 이중 상당수가 2차 3차의 재발을 일으킵니다. 건승하세요

속쓰림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 초음파 검사도 해보셨나요? 헬리코 박터 검사도 해서 혹시 양성이면 치료 고려해볼 수있을 것으로 생각됩니다

엉덩이 꼬리뼈 딱딱한 무언가 만져집니다,안녕하세요 요약 1. 초음파 검사나 MRI 검사를 통해 2. 거기 있는게 과연 먼지 확인하고 감별을 해 보세요 3. 언급한 증상들은 검사를 해달라는 신호입니다. 건승하세요

첨부파일 안보이나요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 검고 흰 무언가가 보이는데 아마 영상 사진을 첨부하신 것 같습니다. 형태를 알아보기가 어려워서 답변드리기가 어렵네요.

곰팡이 핀 호두를 먹었는데요 괜찮을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에 가셔도 검사를 하거나 치료를 할것은 없는 것 같습니다. 불편한 증상이없으면 그냥 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다

귀안 종기가 터져서 피나는데 병원 가야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변의 크기가 작고 염증이 심해 보이지 않아 항생제 연고를 사용했다면 좀 더 지켜보셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

발가락 부딪힌 후로 통증 많이 꺾임,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 있으면 병원을 가보셔야 합니다. 엑스레이만 확인하시고 골절선만 없다면 부목고정이 필요한지 상의하시고 소염제를 복용하게 됩니다. 이틀정도 안에 새로운 불편감이 더해지는 경우도 있습니다.

남성성기 종기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

호흡기에 문제가 생긴 걸 까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 심부전과 같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

스케일링 받고 잇몸치료 받으려고 하는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 하시는 병원에서 하시는걸 추천드립니다만 병원에 방문해서 상의해 보시고 치료를 받으셔도 되겠습니다. 감사합니다.

걷기운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 있으신 상황이 아니라면 걷는 양은 많을 수록 좋습니다. 걷기는 유산소운동으로 전신혈행을 좋게 하려는 목적이므로 한번에 오래 걸어 주시는게 좋으며 20분 두번 걷는게 무릎에는 더 안전합니다.

소변보는순간 왼쪽가슴 왼쪽 손목동맥쪽 짜한감각...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 이러한 경우 기질적인 이상보다는 심리적인 요인인 경우가 많습니다. 많은과에서 충분한 검사를 하신것으로 판단되어 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

화상 병원 가야하는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증이 생긴것으로 보여집니다. 가까운 병원에서 항생제 및 진찰이 필요할 것으로 판단되어 집니다. 화상병원이나 가까운 병원에 내원해 보시기 바랍니다.

지방종 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지방종은 대부분 경과를 지켜 보지만 미용상의 이유라던지 크기의 변화가 있는 경우 제거를 하기도 합니다. 외과에 방문하셔서 상담해 보시기 바랍니다.

두통이 계속 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스를 피하기는 어려우며 병원에서는 통증에 대한 조절을 우선적으로 하고 보통은 약 복용을 기반으로 주사치료를 포함해서 물리치료도수치료 등을 흔하게 합니다. 목 주변 경직에 초점을 맞추어 진찰과 치료를 하게 됩니다

모소동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로 관찰되는 피부의 변화를 보면 수술한 부위 옆으로 또 다른 피부병변이 발생한 상태라 판단됩니다. 다만 모낭염일 가능성도 있으니 가까운 외과를 방문하여 정밀한 진찰을 받아보시기 바랍니다.

지방종 만지면 커지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지방종의 크기가 증가한다면 수술적으로 제거가 필요하며 손으로 만진다고 해서 크기가 커지거나 모양이 변화하지는 않습니다.

인공눈물 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일회용 인공눈물이든지 병에 들어 있는 인공눈물이든지 굳이 첫 한두 방울을 버리고 넣을 이유는 없는데요 전혀 걱정하실 내용은 아닌 듯 합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

복부대동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파로는 복부 대동맥류를 정확하게 판단하기 어려워 보통 CT로 추적검사를 하게 됩니다. 크기가 크지 않다면 매년 검사를 하면 됩니다.

수액 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 문제 전혀 없는 분이 수액 500ml 가 짧은 시간에 급격하게 들어간다고 해서 폐부종이 생길 가능성은 없어보입니다.

Hpv 추가질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 비뇨기과 갔다왔고 육안관찰로 소견 보이지 않는다 하셨고 브러쉬검사와 소변검사 하였고 다음주 월요일에 결과 보기로 하였고요. 크게 걱정하지 마시고 다음주 월요일 정확한 결과 설명후 주치의로부터 확실한 상담을 받도록 하십시오.

수액 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 문제 전혀 없는 분이 수액 500ml 가 짧은 시간에 급격하게 들어간다고 해서 폐부종이 생길 가능성은 없어보입니다.

혀 반쪽이 미각이 느껴지지 않는 마취 증상이 있는데 어디 병원 가야하고 어떻게 해야하나요,

안녕하세요. 메디이즈입니다. 감각 이상이 있다면 해당 부위를 지배하는 감각 신경의 이상 가능성이 있습니다. 허의 문제라면 이비인후과나 신경과 진료를 권해드립니다.

손목통증 tfcc 질문이요,안녕하세요. 메디이즈입니다. TFCC 손상은 초음파 검사만으로는 알기 어렵습니다. 따라서 약물 치료에도 통증이 지속된다면 손목에 대한 MRI 검사가 필요합니다.

살짝 우울하고 집중이 잘 안됩니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 우울감으로 인해 집중력이 저하되고 일상생활에서 성과를 내기가 어려워지는 것 같다면 우울증과 같은 정신건강의학적인 질환을 의심해보아야 하는 상황일 수 있겠습니다. 질환에 대한 정확한 진단과 치료가 증상의 호전을 가져올 수 있을 것이므로 병원을 방문해보시는 것이 좋겠습니다. 정확한 진단 없이는 어떤 약이 현 상황에서 도움이 될 지도 알기 어렵습니다.

입술 부분적 부음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 흐려서 병변이 잘 보이지는 않지만 국소적으로 부어오르고 해당 부위에 통증이나 가려움증과 같은 불편한 증상이 동반되었다면 구순염을 의심할 수 있습니다. 시간이 지나도 나아지지 않고 더 심해지는 등의 반응을 보인다면 피부과 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다.

귀두 끝 부분 병변 상태,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고름이 의심됩니다. 항생제 연고 바르는 게 좋습니다. 비뇨기와 병원에 가서 먹는 항생제랑 바르는 항생제 연고 처방 받으세요..

요로결석은 오른쪽인데 왼쪽 하복부 고환의 빠근함?? 통증?이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사를 한다고 해서 고환염을 알아차리지 못하는 경우도 있습니다. 계속되면 다시 진료 받아보श्य요 작은 발견되지 않은 결석이 왼쪽에 있을 수도 있어요

걷기운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 있으신 상황이 아니라면 걷는 양은 많을 수록 좋습니다. 걷기는 유산소운동으로 전신혈행을 좋게 하려는 목적이므로 한번에 오래 걸어주시는게 좋으며 20분 두번 걷는게 무릎에는 더 안전합니다.

인공눈물 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일회용 인공눈물이든지 병에 들어 있는 인공눈물이든지 굳이 첫 한두 방울을 버리고 넣을 이유는 없는데요 전혀 걱정하실 내용은 아닌 듯 합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

수액 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 문제 전혀 없는 분이 수액 500ml 가 짧은 시간에 급격하게 들어간다고 해서 폐부종이 생길 가능성은 없어보입니다.

인공눈물 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일회용 인공눈물이든지 병에 들어 있는 인공눈물이든지 굳이 첫 한두 방울을 버리고 넣을 이유는 없는데요 전혀 걱정하실 내용은 아닌 듯 합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

궁금한것이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 안한 상태에서 물을 마시면 치석과 세균이 섞인 물이 몸에 들어가게 됩니다. 이는 몸에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 치석과 세균이 섞인 물이 잇몸에 들어가면 잇몸염증을 유발할 수 있습니다. 또한 물이 혈관을 통해 뇌로 들어가면 뇌졸중을 유발할 수 있습니다. 따라서 양치를 안한 상태에서는 물을 마시지 않는 것이 좋습니다. 갑자기 양손과 발 한쪽이 저리는 증상은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 혈액순환 장애입니다. 혈액순환 장애가 발생하면 혈액이 손과 발로 잘 공급되지 않아 저림 증상이 나타날 수 있습니다. 또한 뇌졸중이나 심장마비와 같은 질환이 발생하면 혈액순환 장애가 발생할 수 있습니다. 따라서 갑자기 양손과 발 한쪽이 저리면 뇌졸중이나 심장마비를 의심해 볼 필요가 있습니다. 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 심하지 않고 위치로 심박수를 재보니 심박수가 괜찮게 나온다면 자다가 잘못될 가능성은 낮습니다. 하지만 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 심하고 심박수가 불규칙하다면 뇌졸중이나 심장마비를 의심해 볼 필요가 있습니다. 따라서 갑자기 양손과 발 한쪽이 저

린 증상이 나타나면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 불안장애 약을 먹고 있다면 약을 먹는 동안에는 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나더라도 심각한 질환이 아닐 가능성이 높습니다. 하지만 불안장애 약을 먹고 있는데도 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나고 증상이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

인공눈물 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일회용 인공눈물이든지 병에 들어 있는 인공눈물이든지 굳이 첫 한두 방울을 버리고 넣을 이유는 없는데요 전혀 걱정하실 내용은 아닌 듯 합니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

Hpv 추가질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오늘 비뇨기과 갔다왔고 육안관찰로 소견 보이지 않는다 하셨고 브러쉬검사와 소변검사 하였고 다음주 월요일에 결과 보기로 하였고요. 크게 걱정하지 마시고 다음주 월요일 정확한 결과 설명후 주치의로부터 확실한 상담을 받도록 하십시오.

남성성기 종기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

살짝 우울하고 집중이 잘 안됩니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 우울감으로 인해 집중력이 저하되고 일상생활에서 성과를 내기가 어려워지는 것 같다면 우울증과 같은 정신건강의학적인 질환을 의심해보아야 하는 상황일 수 있습니다. 질환에 대한 정확한 진단과 치료가 증상의 호전을 가져올 수 있을 것이므로 병원을 방문해보시는 것이 좋겠습니다. 정확한 진단 없이 어떤 약이 현 상황에서 도움이 될 지도 알기 어렵습니다.

근막통증 주사치료 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 경우에만 TPI를 해야한다 이런것은 없습니다. 단 현재 정보만으로 정확하게 환자 상태를 파악할 수는 없어 TPI 가능한 병원에 가서 진료 이후 TPI 여부 결정하시면 될듯합니다

손목통증 tfcc 질문이요,안녕하세요. 메디이즈입니다. TFCC 손상은 초음파 검사만으로는 알기 어렵습니다. 따라서 약물 치료에도 통증이 지속된다면 손목에 대한 MRI 검사가 필요합니다.

수액 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다른 문제 전혀 없는 분이 수액 500ml 가 짧은 시간에 급격하게 들어간다고 해서 폐부종이 생길 가능성은 없어보입니다.

요로결석은 오른쪽인데 왼쪽 하복부 고회의 빠근함?? 통증?이 있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액검사를 한다고 해서 고회염을 알아차리지 못하는 경우도 있습니다. 계속되면 다시 진료 받아보셔요 작은 발견되지 않은 결석이 왼쪽에 있을 수도 있어요

손목통증 tfcc 질문이요,안녕하세요. 메디이즈입니다. TFCC 손상은 초음파 검사만으로는 알기 어렵습니다. 따라서 약물 치료에도 통증이 지속된다면 손목에 대한 MRI 검사가 필요합니다.

경구피임약 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오일 정도 드시면 피임효과를 기대할 수 없으니 다른 피임방법을 사용하시면서 생리가 시작되면 다시 피임약을 시작하시는 것을 권합니다

남자 오른쪽 아랫배 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 무거운 짐을 지고 다닌후에 나타난 증상이고 특정자세에서는 심해지거나 좋아지는 것으로 미루어 근육통으로 생각됩니다

에이즈검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 4월16일 외국인하고 관계를 했는데 술취해 노콘으로하여서 괜시리 불안해서 5월8일 비뇨기과 방문후 에이즈관련 상담받고 검사 진행했군요. 검사 받은 병원에 다시 내원하셔서 에이즈 검사에 대한 상담후 필요한 검사를 받도록 하십시오. 조직검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비특이적이라는 이야기는 어떤 특정질환을 의심하

기는 어렵다는 이야기 입니다. 증상이 지속되거나 하여 나중에 검사해서 진행하면 진단명이 바뀌는 경우도 있습니다

사시때문에 눈이 쉽게 피로합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러가지 원인으로 근거리 작업 후 눈 주위 통증과 시야가 흐리게 되는 증상을 안정피로라고 하는데요 안정피로의 흔한 원인 중 하나가 외사시 입니다. 사시 각도가 1020도라도 안정피로가 심하면 수술을 고려할 수 있겠습니다. 수술 외엔 프리즘 안경을 착용하면 증상은 조금 나아질 수 있는데요 근본적인 치료는 되지 않습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

침샘쪽 멍울이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련은 없습니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

속쓰림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 초음파 검사도 해보셨나요? 헬리코 박터 검사도 해서 혹시 양성이면 치료 고려해볼 수있을 것으로 생각됩니다

녹내장 대학병원 꼭 가야하나요?,안녕하세요. 요약 1. 네 안과 전문병원에서 주기적인 안압 측정과 시신경을 자주 들여다 보세요 2. 당장 수술할 질환이 아니면 주기적인 체크를 하면서 3. 현재 상태가 어떤지 확인하는게 중요합니다. 건승하세요.

코 시술 시 뇌 mri,안녕하세요. 메디이즈입니다. 금속재질이 아니라면 mri 촬영하는 것에 큰 문제는 없을 것으로 생각합니다. 시행 병원에서 금속재질인지 아닌지 확인해보시길 바랍니다.

속쓰림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 초음파 검사도 해보셨나요? 헬리코 박터 검사도 해서 혹시 양성이면 치료 고려해볼 수있을 것으로 생각됩니다

걷기운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 통증이 있으신 상황이 아니라면 걷는 양은 많을 수록 좋습니다. 걷기는 유산소운동으로 전신혈행을 좋게 하려는 목적이므로 한번에 오래 걸어 주시는게 좋으며 20분 두번 걷는게 무릎에는 더 안전합니다.

엉덩이 꼬리뼈 딱딱한 무언가 만져집니다,안녕하세요 요약 1. 초음파 검사나 MRI 검사를 통해 2. 거기 있는게 과연 먼지 확인하고 감별을 해 보세요 3. 언급한 증상들은 검사를 해달라는 신호입니다. 건승하세요

자궁탈출증 비수술적 치료 문의드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자궁탈출증이 3기정도 진행되면 폐사리외에는 비수술적인 방법은 없답니다. 다만 자궁에 근종이 없고 문제가 없다면 자궁을 보존하고 질전후벽 봉합수술을 통해서 복원이 가능합니다. 문의에 도움이 되셨기를 바랍니다.

헛바닥통증과 뭐가생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진은 뚜렷하지 않아서 정확한 답변은 어렵습니다. 구내염의 한 증상이 헛바늘이라고 보시면 됩니다. 요즘 많이 피곤 하셨나요? 불편하시면 진료 받아보셔요

복용중인 감기약과 아빌리파이,안녕하세요. 메디이즈입니다. 같이 드실수 있는약입니다 상충되는약은 없습니다 다만 젤아래 타원2회 알려지약정 코정황색 원형이 졸음이 오는데 함께드시면 졸음이 더 심해질 수 있습니다 건강하세요

손가락에 뭐가 났습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 켈로이드로 보여집니다. 켈로이드는 진피 내 섬유성 조직이 과성장으로 인해 발생하는것으로 일단은 경과를 지켜 보시고 지속적이면 피부과를 방문해 보세요

슬개건염 걸리면 원래 걷지도 못할 정도로 아픈가요..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 슬개건염의 대부분의 공통적 활동은 너무 많은 점프로 인한 것으로 다른 이유로는 러닝 걷기 또는 자전거타기등 반복적인 활동으로 슬개건염에 이르게 되고 모든 이런 활동이 슬개건에 자극을

반복하고 통증을 불러일으키는 원인이 됩니다. 건승하세요.

곰팡이 핀 호두를 먹었는데요 괜찮을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에 가서도 검사를 하거나 치료를 할것은 없는 것 같습니다. 불편한 증상이없으면 그냥 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다

헛바닥통증과 뭐가생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진은 뚜렷하지 않아서 정확한 답변은 어렵습니다. 구내염의 한 증상이 헛바늘이라고 보시면 됩니다. 요즘 많이 피곤 하셨나요? 불편하시면 진료 받아보श्य

곰팡이 핀 호두를 먹었는데요 괜찮을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에 가서도 검사를 하거나 치료를 할것은 없는 것 같습니다. 불편한 증상이없으면 그냥 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다

사랑니 뽑고 키스,안녕하세요 요약 1. 본인 입에도 균들이 있지만 2. 행여나 남의 균이 들어와 콜라보 되는 상황에서는 더 심해질 수도 있으니 3. 다 나으면 몰아서 하세요 건승하세요 화상 병원 가야하는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증이 생긴것으로 보여집니다. 가까운 병원에서 항생제 및 진찰이 필요할 것으로 판단되어 집니다. 화상병원이나 가까운 병원에 내원해 보시기 바랍니다.

아기집이 안보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신초기에는 안 보이는 경우도 있을 수 있습니다. 산부인과에서 초음파를 정기적으로 임신 수치와 함께 체크하므로 일단은 기다려 보시기 바랍니다.

두통이 계속 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스를 피하기는 어려우며 병원에서는 통증에 대한 조절을 우선적으로 하고 보통은 약 복용을 기반으로 주사치료를 포함해서 물리치료도수치료 등을 흔하게 합니다. 목 주변 경직에 초점을 맞추어 진찰과 치료를 하게 됩니다 경구피임약 재질문합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피임 목적의 경구 피임약 복용이라면 시작 시기에 상관 없이 복용 1주일 후부터 피임 효과가 나타납니다. 따라서 반드시 복용시기를 생리 주기에 맞추어야 하는 것은 아닙니다.

발가락 부딪힌 후로 통증 많이 꺾임,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 있으면 병원을 가보셔야 합니다. 엑스레이만 확인하시고 골절선만 없다면 부목고정이 필요한지 상의하시고 소염제를 복용하게 됩니다. 이틀정도 안에 새로운 불편감이 더해지는 경우도 있습니다.

귀안 종기가 터져서 피나는데 병원 가야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변의 크기가 작고 염증이 심해 보이지 않아 항생제 연고를 사용했다면 좀 더 지켜보셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

공황장애약을 복용하고 있는데 발기와 성욕이 줄까봐 걱정입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발기부전제는 혈관에 작용하는 약이기 때문에 기존 정신과약과 충돌하는 경우는 거의 없습니다. 정신과 약에 의해서 발기능 저하가 유발될 수는 있으나 발기부전제를 복용하면 어느정도는 정상 기능을 유지할 수 있으므로 가까운 비뇨의학과 방문하셔서 진료후 약 처방 받아보시기 바랍니다.

고환에 신경이 쓰여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변검사를 해봤다면 성병 가능성은 떨어지고 만성 부고환염이나 만성 골반 통증증후군으로 생각됩니다. 통증이 지속된다면 비뇨의학과에서 전립선 검사와 음낭 초음파를 살펴 봐야 합니다. 일단 미미한 증상은 신경성일 가능성이 제일 크므로 신경을 안쓰시는게 좋을것 같습니다.

귀옆에 작은 게 나왔는데 뭘까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수포로 보여지지는 않아 일단은 경과를 지켜 보시고 커진다면지 없어지지 않는 경우 근처의 피부과에 방문해 보시는걸 추천합니다.

천 드립니다. 감사합니다.

지방종 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지방종은 대부분 경과를 지켜 보지만 미용상의 이 유라던지 크기의 변화가 있는 경우 제거를 하기도 합니다. 외과에 방문하셔서 상담해 보시기 바랍니다.

ADHD가 맞는걸까요? 약을 계속 복용해도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 너무 성급하게 생각하지 마시고 일단 약을 꾸준히 복용해 보시기 바랍니다. 대부분은 약효가 나타날때까지 시간이 필요합니다. 감사합니다.

두통이 계속 생깁니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스를 피하기는 어려우며 병원에서는 통증에 대한 조절을 우선적으로 하고 보통은 약 복용을 기반으로 주사치료를 포함해서 물리치 료도수치료 등을 흔하게 합니다. 목주변 경직에 초점을 맞추어 진찰과 치료를 하게 됩니다

Hpv 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마지막 성관계가 2년 4개월 정도 되고 당시 클 라미디아 판정을 받고 헤어졌군요. Hpv는 잠복기는 대단히 다양하며 2년내에 자연소멸이 될 수도 있고 더욱 지속되는 경우도 있습니다. 비뇨기와 내원하셔서 가다실 접종에 대한 상담을 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v13kqPwRk5A>

ㄱ ㅎ 부정출혈 임신가능성?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사후 피임약 복용 후 1주일 간은 임 신 가능성이 있어 이중 피임을 권고합니다. 따라서 추후 임신 여부에 대한 검사가 필요합니 다.

에이즈검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 4월16일 외국인하고 관계를 했는데 술취해 노콘으 로하여서 괜시리 불안해서 5월8일 비뇨기와 방문후 에이즈관련 상담받고 검사 진행했군요. 검 사 받은 병원에 다시 내원하셔서 에이즈 검사에 대한 상담후 필요한 검사를 받도록 하십시오. 복부대동맥류,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파로는 복부 대동맥류를 정확하게 판단하기 어 려워 보통 CT로 추적검사를 하게 됩니다. 크기가 크지 않다면 매년 검사를 하면 됩니다.

혀 반쪽이 미각이 느껴지지 않는 마취 증상이 있는데 어디 병원 가야하고 어떻게 해야하나요, 안녕하세요. 메디이즈입니다. 감각 이상이 있다면 해당 부위를 지배하는 감각 신경의 이상 가 능성이 있습니다. 혀의 문제라면 이비인후과나 신경과 진료를 권해드립니다.

남성성기 종기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성병의 가능성은 낮으므로 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

지방종 만지면 커지나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지방종의 크기가 증가한다면 수술적으 로 제거가 필요하며 손으로 만진다고 해서 크기가 커지거나 모양이 변화하지는 않습니다.

소변검사 결과 이상소견에 관하여 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 복용약이 혈뇨 를 유발할 가능성은 낮습니다. 혈압은 수시로 재보고 다시 복용하는 것을 항상 고려하시기 바랍니다. 고혈압은 질병이고 높은 혈압은 소견 자체여서 질병은 아니지만 고혈압인데도 치료 를 받지 않는 문제가 생길 수 있습니다. 혈뇨와 단백뇨는 정성검사 뿐 아니라 정량검사를 받 아서 어느 정도 심한지 알아보는 것이 좋겠습니다. 또한 신장 초음파검사나 CT 검사도 필요 해 보입니다. 위의 검사에서 우려할만한 것이 없으면 권고대로 정기검사를 받는 것으로 충분 하고 양이 많거나 다른 소견이 있을 때에는 조직검사도 필요합니다.

왼쪽 다리에서 원인불명의 열감,안녕하세요. 메디이즈입니다. 특별한 외상 없이 다리 외측으로 이상감각이 느껴지신다면 신경과 또는 신경외과 재활의학과 진료해보시기 바랍니다. 감사합니 다.

Hpv 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 마지막 성관계가 2년 4개월 정도 되고 당시 클라미디아 판정을 받고 헤어졌군요. Hpv는 잠복기는 대단히 다양하며 2년내에 자연소멸이 될 수도 있고 더욱 지속되는 경우도 있습니다. 비뇨기와 내원하셔서 가다실 접종에 대한 상담을 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=13kqPwRk5A>

침샘쪽 멍울이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련은 없습니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

손가락에 뭐가 났습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 켈로이드로 보여집니다. 켈로이드는 진피 내 섬유성 조직이 과성장으로 인해 발생하는것으로 일단은 경과를 지켜 보시고 지속적이면 피부과를 방문해 보세요

에이즈검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 4월16일 외국인하고 관계를 했는데 술취해 노콘으로하여서 팬시리 불안해서 5월8일 비뇨기와 방문후 에이즈관련 상담받고 검사 진행했군요. 검사 받은 병원에 다시 내원하셔서 에이즈 검사에 대한 상담후 필요한 검사를 받도록 하십시오. 귀안 종기가 터져서 피나는데 병원 가야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변의 크기가 작고 염증이 심해 보이지 않아 항생제 연고를 사용했다면 좀 더 지켜보셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

곰팡이 핀 호두를 먹었는데요 괜찮을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에 가셔도 검사를 하거나 치료를 할것은 없는 것 같습니다. 불편한 증상이없으면 그냥 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다

사랑니 뽑고 키스,안녕하세요 요약 1. 본인 입에도 균들이 있지만 2. 행여나 남의 균이 들어와 콜라보 되는 상황에서는 더 심해질 수도 있으니 3. 다 나으면 몰아서 하세요 건승하세요 아기집이 안보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신초기에는 안 보이는 경우도 있을 수 있습니다. 산부인과에서 초음파를 정기적으로 임신 수치와 함께 체크하므로 일단은 기다려 보시기 바랍니다.

지방종 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지방종은 대부분 경과를 지켜 보지만 미용상의 이유라던지 크기의 변화가 있는 경우 제거를 하기도 합니다. 외과에 방문하셔서 상담해 보시기 바랍니다.

화상 병원 가야하는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증이 생긴것으로 보여집니다. 가까운 병원에서 항생제 및 진찰이 필요할 것으로 판단되어 집니다. 화상병원이나 가까운 병원에 내원해 보시기 바랍니다.

귀옆에 작은 게 나왔는데 뭘까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수포로 보여지지는 않아 일단은 경과를 지켜 보시고 커진다면 없애지 않는 경우 근처의 피부과에 방문해 보시는걸 추천 드립니다. 감사합니다.

소변보는순간 왼쪽가슴 왼쪽 손목동맥쪽 짜한감각...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 이러한 경우 기질적인 이상보다는 심리적인 요인인 경우가 많습니다. 많은과에서 충분한 검사를 하신것으로 판단되어 경과를 지켜 보시기 바랍니다.

스케일링 받고 잇몸치료 받으려고 하는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대부분은 하시는 병원에서 하시는걸 추천드립니다만 병원에 방문해서 상의해 보시고 치료를 받으셔도 되겠습니다. 감사합니다.

호흡기에 문제가 생긴 걸 까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 심부전과

같은 심장 질환이나 폐질환에 대한 감별이 필요합니다. 내과 진료를 권해드립니다. 만약 검사상 이상이 없다면 심리적인 문제일 수 있어 정신건강의학과 진료가 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

두통이 계속 생깁니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스를 피하기는 어려우며 병원에서는 통증에 대한 조절을 우선적으로 하고 보통은 약 복용을 기반으로 주사치료를 포함해서 물리치료도수치료 등을 흔하게 합니다. 목주변 경직에 초점을 맞추어 진찰과 치료를 하게 됩니다 ADHD가 맞는걸까요? 약을 계속 복용해도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 너무 성급하게 생각하지 마시고 일단 약을 꾸준히 복용해 보시기 바랍니다. 대부분은 약효과가 나타날때까지 시간이 필요합니다. 감사합니다.

Hpv 관련 질문.안녕하세요. 메디이즈입니다. 마지막 성관계가 2년 4개월 정도 되고 당시 클라미디아 판정을 받고 헤어졌군요. Hpv는 잠복기는 대단히 다양하며 2년내에 자연소멸이 될 수도 있고 더욱 지속되는 경우도 있습니다. 비뇨기와 내원하셔서 가다실 접종에 대한 상담을 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=13kqPwRk5A>

에이즈검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 4월16일 외국인하고 관계를 했는데 술취해 노콘으로하여서 팬시리 불안해서 5월8일 비뇨기와 방문후 에이즈관련 상담받고 검사 진행했군요. 검사 받은 병원에 다시 내원하셔서 에이즈 검사에 대한 상담후 필요한 검사를 받도록 하십시오. 발가락 부딪힌 후로 통증 많이 꺾임,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 있으면 병원을 가보셔야 합니다. 엑스레이만 확인하시고 골절선만 없다면 부목고정이 필요한지 상의하시고 소염제를 복용하게 됩니다. 이틀정도 안에 새로운 불편감이 더해지는 경우도 있습니다.

고환염전 한쪽 고환 제거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고환 하나를 제거하더라도 호르몬테스토스테론분비에 영향을 주지는 않습니다. 남은 고환의 기능이 잘하는지 궁금하시면 호르몬수치를 검사 받아보시기 바랍니다.

스테로이드 복용과 배란일 변화 연관성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스테로이드 복용으로 호르몬의 변화로 인해 생리가 불규칙해지거나 생리지연 될 수 있습니다. 스테로이드 복용으로 인해 배란 자체를 유발하지는 않습니다. 확실치는 않지만 추가 배란으로 인해 임신가능성은 낮아보입니다. 생리지연으로 임신이 걱정되시면 임신테스트기로 자주 체크해보시고 산부인과 전문의와 상담받으시기 바랍니다.

표피낭종?피지낭종?종기가 바깥으로 터졌습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원을 방문하기 전까지 상처부위 관리만 잘 하시면 되는 상황으로 보입니다. 지금처럼 포비돈으로 하루 두 번 소독하며 관리하시고 추후 병원 방문하셔서 치료적 처치를 받으시기 바랍니다. 방치하시면 감염증이 악화될 수 있습니다.

성기에 상처가 났는데 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 곤지름헤르페스매독 HIV 감염과 같은 성병의 특징적인 병변이 관찰되지 않으므로 성병의 가능성은 낮습니다. 하지만 시간이 지나면서 궤양의 형태로 변한다면 진료를 보시기 바랍니다.

무릎 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적으로 우측 무릎에 어긋나는 느낌의 통증이 있었지만 하루 뒤 전혀 불편하지 않은 상태로 회복되었다면 치료가 필요할 정도의 큰 부상은 아니었다고 보아도 됩니다. 다친 부위가 계속 아프다거나 부어오르고 멍이드는 등의 반응을 보일 땐 진료를 받으시면 됩니다.

가끔 뜬금 없이 발생하는 왼쪽 가슴 통증이 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기흉이 잘생길 수있는 마른체형을 가지고 계시는 군요 자발성 기흉인경우 저절로 완치되는 경우가 많

지만.. 재발하는 경우도 많습니다. 현재 증상으로 봤을때 기흉이 재발한 것으로 보이니 빨리 호흡기내과 진료를 보시고 재발하지 않도록 처치를 받는게 좋겠습니다. 몸이 한쪽으로 기울이는 자세를 취하거나 같은자세를 오래 유지하면 증상이 악화될 수 있으니 주기적으로 자세를 바꿔주는게 좋겠습니다.

림프종인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프종의 증상과 진단 방법은 다음과 같습니다. 증상 림프절의 비대 림프절이 커져서 만져지거나 통증이 동반될 수 있습니다. 발열 림프종의 종류에 따라 발열이 동반될 수 있습니다. 체중 감소 식욕이 감소하거나 체중이 감소할 수 있습니다. 피부 발진 피부에 발진이 생길 수 있습니다. 야간 발한 밤에 땀이 많이 나는 증상이 나타날 수 있습니다. 진단 림프종의 진단은 종양이 발생한 부위의 조직검사를 통해 이루어집니다. 일반적으로 림프종은 생검을 통해 조직을 채취하여 형태학적 면역조직학적 분자유전학적 검사를 실시합니다. 림프종의 세부 유형을 분류하기 위해 혈액검사 방사선검사 초음파 및 CT MRI 등의 영상진단도 사용됩니다. 아닌것 같은데 진료는 받아보셔요

슬개건염 걸리면 원래 걷지도 못할 정도로 아픈가요..?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 슬개건염의 대부분의 공통적 활동은 너무 많은 점프로 인한 것으로 다른 이유로는 러닝 걷기 또는 자전거타기등 반복적인 활동으로 슬개건염에 이르게 되고 모든 이런 활동이 슬개건에 자극을 반복하고 통증을 불러일으키는 원인이 됩니다. 건승하세요.

여드름? 모낭염?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제로 제대로 말려서 없애는게 좋을 겁니다. 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 종기는 모낭이 있는 부위라면 어디든지 발생할 수 있지만 주로 얼굴 목 겨드랑이 엉덩이 허벅지 살고랑 부분에 잘 발생합니다. 건승하세요.

입 안에 허물,안녕하세요 요약 1. 칸디다 구내염 입니다. 2. 내일도 모레도 계속 생기거나 볼 안쪽까지 번지면 제대로 치료가 필요합니다. 3. 면역이 정상화되면 그냥 없어지기도 합니다. 칸디다성 구내염이란 곰팡이균 칸디다 의해 발생하는 구내염으로 혀 볼 안쪽 그리고 가끔 입 천장이나 편도선에 융기되고 설태가 긴 하얀 반점이 나타나며 이 부위에 통증이 있고 입 안이 꺼끌꺼끌한 느낌이 들어 입맛이 떨어지기도 하는데 건강한 상태일 때에 칸디다성 구내염은 큰 문제가 아니지만 면역체계가 약해졌을 때에는 증상이 심각하고 조절하기 어려울 수 있습니다. 건승하세요

헛바닥통증과 뭐가생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진은 뚜렷하지 않아서 정확한 답변은 어렵습니다. 구내염의 한 증상이 헛바늘이라고 보시면 됩니다. 요즘 많이 피곤 하셨나요? 불편하시면 진료 받아보셔요

사랑니 뽑고 키스,안녕하세요 요약 1. 본인 입에도 균들이 있지만 2. 행여나 남의 균이 들어와 콜라보 되는 상황에서는 더 심해질 수도 있으니 3. 다 나으면 몰아서 하세요 건승하세요
엉덩이 꼬리뼈 딱딱한 무언가 만져집니다,안녕하세요 요약 1. 초음파 검사나 MRI 검사를 통해 2. 거기 있는게 과연 먼지 확인하고 감별을 해 보세요 3. 언급한 증상들은 검사를 해달라는 신호입니다. 건승하세요

곰팡이 핀 호두를 먹었는데요 괜챤을까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원에 가서도 검사를 하거나 치료를 할것은 없는 것 같습니다. 불편한 증상이없으면 그냥 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다

엉덩이 꼬리뼈 명울,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둔부 중앙에 무언가 덩이가 만져지는 상황으로 이해됩니다. 정상적으로 덩이가 만져질만한 위치는 아니기때문에 해당 병변의 정체에 대한

파악이 필요합니다. 위치상으로는 신경외과 진료나 항문외과 진료가 가장 적절할 것으로 보이니 진료를 받아보시기 바랍니다.

다리가 빨갛게 붓고 노란 염증이 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염이 넓게 발생하였고 주변 피부와 피하 조직에도 염증이 발생한 연조직염으로 판단됩니다. 항생제 치료가 필요하니 진료를 보시기 바랍니다.

항문찢어짐 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵을 앓고 계신 상황인데 찢어지는 느낌 많은 양의 출혈이 나온 상황이라 이해됩니다. 치열이 동반되었을 수 있겠고 푸레파인은 질환의 증상 조절을 위한 약 통증 완화이므로 근본적인 치료를 위해서는 항문외과 진료가 필요합니다. 약을 주입하기가 어려운 정도의 통증이 나타나고 있으니 진료를 받아보시기 바랍니다.

고환쪽 피부가 껍질이 벗겨짐사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

고환쪽 피부 껍질 벗겨짐사진있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 습진성 피부병변이라 보이고 헤르페스 병변은 아니겠고 이외 성병을 특정하여 의심하기는 어려울 것 같습니다. 잘 나아지지 않는다면 비뇨의학과를 다시 방문하여 진료받아보실 필요가 있습니다.

눈밑지방재배치 수술에 관하여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 수술 후 일상생활을 하기까지 어느정도 기간이 걸리나요? 사람마다 약간의 차이가 있겠지만 일반적으로 이 정도는 돼야 일상생활을 하는데 아무 문제가 없다는 판정을 할 수 있는 기간이 있잖아요. 수술 후 다음 날 부터 일상생활은 가능 합니다. 수술 후 3일 까지는 출혈 가능성이 있어서 힘을 주거나 많이 움직이거나 하는 것을 조심하시는 정도 입니다. 피부를 절개해서 수술 하는 경우 실밥 제거 할 때까지는 불편 할 수 있는데요 봉합사 제거 까지 보통 5일에서 7일 정도 걸리게 됩니다. 결막 쪽으로 수술 하는 경우는 겉으로는 표시가 없습니다. 2. 수술 후 금주기간은 어떻게 되나요? 다르게 말씀드려서 적어도 이정도 기간은 지나야 술을 마셔도 상관없다 하는 기간을 여쭙습니다. 일주일엔 금주하셔야 하고 그 이후는 수술 경과에 따라 조금씩 다릅니다. 3. 수술 후 수술을 했던 부위가 거의 보이지 않게 아물게 되려면 얼마나 지나야 할까요? 피부로 하면 3개월이 지나야 수술 부위가 열어지기 시작하고 보통 6개월 정도는 지나야 보이지 않게 됩니다. 결막으로 하면 피부쪽에 흉터는 생기지 않습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

눈에 이상한게 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 나이가 많지 않아서 질환과 연관된 비문증 같아 보이지는 않습니다. 크게 신경 쓰지 않아도 될 거예요. 박테리아 같은게 보이는 것 말고 다른 증상이 생기면 안과 진료 받아보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

혹시 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 채널수가 많아지면 CT의 해상도가 좋아지는 것은 사실이므로 아주 작은 병변이라면 차이가 있을 수 있지만 일반적으로 진단에는 영향을 미치지 않습니다.

심전도 빨간부분 해석요청입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기저선이 일시적으로 흔들리는 현상이 발생한 것으로 보입니다. 앞뒤 연결된 심전도가 모두 정상 소견이므로 실제 이상일 가능성은 매우 낮습니다.

에이즈 검사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 10주째 검사 받으시면 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

자위를 하고나서 소변을 보면 휴지에 피가 묻어서 나옵니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 자위행위 후 출혈이 반복적으로 나타나는 경우 단순히 자극으로 인한 출혈이 아닐 가능성에 대해서도 확인이 필요하겠습니다. 부인과적 질환이 있다면 가벼운 자극에도 출혈이 보일 수 있어 이에 대한 진료가 필요하겠으니 가까운 산부인과를 방문해보시기를 권해드립니다.

추가 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 타박상이 심하면 근육손상으로 근육기능의 약화가 나타날 수 있습니다 1주일 지나서 좋아지면 괜찮다고 생각하셔도 됩니다

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥 가능성이 높기 때문에 홀터 검사를 제외하고 정확한 진단을 하는 것은 매우 어렵습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

과민성 대장 증후군 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상이 반복되었다면 과민성 대장 증후군 가능성이 가장 높습니다. 과민성 대장 증후군은 다른 질환이 원인을 아님을 감별한 후 진단이 가능하므로 소화기내과 내원하여 진료를 보는 것이 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

콘돔 임신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 29일 자나고 임태기 해서 임신이 아니면 걱정은 안하셔도 괜찮을 듯 한데 생리가 불규칙하면 정확한 예측은 어렵습니다.

소화불량 인데 자꾸 식욕이 땡기는 이유???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 위염 식도염 위궤양과 같은 위장관 질환과 담낭 질환에 대한 평가가 필요하므로 위내시경과 복부 초음파 검사가 도움이 되니 소화기 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

독시사이클린레보플록사신 같이 복용해도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

화학적 유산을 예상했고 생리를 했는데도 불구하고 피검수치HCG수치가 올라갔습니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. hcg수치가 줄은것은 비정상적인 조직이 남아있을 가능성이 있어 초음파 검사를 같이 해보는것이 좋겠습니다. hcg 수치를 지속적으로 모니터링하면서 잔류조직 여부를 확인하기 위해 초음파검사를 받아보세요

뇌하수,안녕하세요 요약 1. 뇌하수체 미세선종이 있는지 확인해 보세요 2. 크기가 작은 경우 그리고 뇌하수체와 연관된 증상이 없으면 주기적인 검사만 하면서 지켜 보게 됩니다. 뇌하수체 선종은 뇌하수체에 발생하는 양성 종양으로 호르몬 분비성 뇌하수체 선종 호르몬 비분비성 뇌하수체 선종으로 구분하게 됩니다. 현재 명확히 밝혀진 원인은 없습니다. 원인불명 건승하세요

가다실,안녕하세요. 요약 1. 가다실접종 이후 언급한 약은 잡수셔야 한다면 그냥 잡수셔도 됩니다. 2. 언급한 약을 먹는다고 가다실 접종의 효과는 떨어지지 않습니다. 3. 그냥 먹어도 됩니다. 건승하세요.

하안검 지방이식 관련입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈종은 시간이 지나면 자연 흡수되고 분해될수가 있는데 굳어져 자리를 잡은 상태라면 시간이 좀 많이 필요할 수 있습니다. 의사 말대로 상황을 지켜보고 기다려봐야겠네요

몸이 무기력하고 숨이 차고 불편합니다.증상좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상을 보면 족저근막염으로 인한 활동부족으로 운동부족과 근력저하 때문인거 같아요 특히 수면부족으로 인한 피로감은 스트레스와 신경과민반응을 유발할 수 도 있어요. 먼저 휴식을 충분히 하시고.. 가벼운 운동을 하면서 체중조절하는게 도움이 될 것 같습니다. 그전에 혹시 폐색전증과거력이 있으니.. 다시 호흡기내과에서 검사를 받아보는 것이 좋겠습니다.

사랑니 발치 후 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약은 작용기간이 있기에 하루 2번 복용하는 약은 아침 저녁으로 복용하느게 가장 좋습니다. 만약 점심식후에 복용한다면.. 저녁약을 조금 늦게 늦추는 방법이 있겠네요. 위장약이 있어서 아침 공복시에 먹어도 크게 문제는 없겠지만 되도록이면 식후에 복용하는게 좋겠습니다.

경구피임약 복용 질문합니다.,안녕하세요 요약 1. 1번에 제일 확실하고 정확한 방법입니다. 2. 2번처럼 하지는 않습니다. 3. 6월 중순이라면 시간이 꽤 남아 있으니 생리일을 기다렸다가 복용하는게 제일 정확합니다. 4. 다만 복용 일주일 동안은 다른 피임방법을 병행해야 합니다. 건승하세요

불안해요,안녕하세요 요약 1. 동네병원에서 Xray라도 찍어 보세요 2. 재발여부를 확인해 보세요 자연기흉의 경우 환자의 4050가 재발을 하며 이중 상당수가 2차 3차의 재발을 일으킵니다. 건승하세요

사후피임약 실패확률...,안녕하세요 사후피임약응급피임약의 복용시점이 빠를수록 성공 확률이 높으며 평균적으로 85의 피임 성공률을 보입니다. 관계 후 24시간 이내에 사후피임약응급피임약을 복용할 경우 피임 실패율은 5 정도 됩니다. 건승하세요

항문 고환 귀두 통증 중첩적인 통증 인데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문통증이 심한경우 치질에다가 치열이 같이 있을때 오게 되는데요. 일단 항문외과에 방문하여 상태를 확인해보시는게 좋겠습니다. 전립선염도 성기 주변에 불편감을 주고 배뇨 불편감도 발생하는데 성기쪽 통증이 있다면 비뇨기과에 다시 방문하여 진찰받아보세요.

소변보고 나서 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변을 자주보고 소변볼때 하복부 통증이 느껴진다면 방광염이 의심되네요 방광염으로 경구항생제 복용하는게 좋겠네요.

성병 검사 하고 난 뒤 성기에 물집 생김,안녕하세요 요약 1. 헤르페스는 궤양이 생기고 진물이 나는 습진 양상으로 생깁니다. 2. 그리고 까지기 때문에 통증도 동반하게 되며 3. 헤르페스 2형의 증상은 보통 12주 안에 나오는 것이 보통입니다. 4. 치료 잘 받으세요 건승하세요

피부 발진습진?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 카텐 연고는 항진균제로 곰팡이 습진이 아니라서 효과가 없는거 같네요 다른 원인으로 알레르기성 피부염일 가능성이 있어보입니다. 자세한 것은 피부과 진료를 보시고 알맞은 약을 처방받는게 좋겠어요.

뇌하수체 질문 드립니다.,안녕하세요 요약 뇌하수체 미세선종이 있는지 확인해 보세요 뇌하수체 선종은 뇌하수체에 발생하는 양성 종양으로 호르몬 분비성 뇌하수체 선종 호르몬 비분비성 뇌하수체 선종으로 구분하게 됩니다. 현재 명확히 밝혀진 원인은 없습니다. 원인불명 건승하세요

성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성접촉으로 인한 헤르페스 감염이 의심됩니다. 감염내과 진료를 보시고 항바이러스제를 처방받아 치료해보시는게 좋겠습니다.

치과 신경치료 관련 문의입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 그전에 아말감으로 떼운 부위가 좀 넓고 크게 있었는데 떨어져 나갔고 5개월쯤 지나 새로운 치과를 내원하였습니다. 그 부위가 아프진 않았고 씹을 때 음식물이 그 구멍으로 확 밀려가면 그 압력 때문에 잠시 아팠지 치통은 없었습니다. 오늘 치과에선 신경과 가깝게 있다고 신경치료를 하자고 하였고 이미 진행은 했지만 그 전까지 다니던 치과에선 떼워주었고 떼운 부분만 떨어져 나갔고 그 후에도 썩은 흔적과 통증도 없이 수개월을 지냈는데 신경과 근접하다고 신경치료를 할 수 있나요..? 이미 치료도 1차로 진행하였고 못믿는것도 아니지만 그래도 신경치료를 이를 죽여야 한다는 걱정과 불안함으로 여쭙어봅니다... 감사합니다. 이유없이 신경치료를 하지는 않습니다. 아마도 신경치료를 해야할 만큼 치아 상태가 좋지 않을듯 하구요 1차로 진행을 하셨

으니 믿고 나머지 치료도 진행해보시는게 좋을 듯 합니다.

혈액검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신성 당뇨의 위험성이 있을수 있어 식단관리가 중요해보입니다. 대부분은 검사에 이상이 없어보이는데.. CRP 염증수치가 높은게 몸에 염증이나 감염이 있다는 뜻이므로 이에 대한 추가적인 검사나 치료가 필요해보입니다.

코 연골? 부분 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부에 붙어지고 부어오른 병변이 보인다면 말씀하신대로 피부염과 같은 피부질환일테고 그렇지 않다면 연골이나 연조직에 발생한 염증반응을 의심할 수 있을텐데 원인을 알아내려면 진찰이 필요한 상황으로 보입니다. 무언가 보이지 않는다고 하셨으니 우선은 이비인후과를 방문해보시기 바랍니다.

피임약 중단 후 생리 주기는 어떻게 되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약을 중단하게 되면 다시 생리가 발생하게 되고 이후 일시적으로 생리 주기가 불규칙할 수 있습니다. 이후 시간이 지나면 이전의 생리주기로 돌아오게 됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

일광화상췌변 딱지인지 대상포진인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일광화상으로 도 저런 병변이 가능합니다. 일광화상은 햇빛에 과도하게 노출되었을 때 피부가 붉어지고 따끔거리는 증상이 나타나는 질환입니다. 일광화상이 심해지면 물집이 생기고 물집이 터지면서 딱지가 생길 수 있습니다. 딱지는 보통 23주 정도 지나면 자연스럽게 떨어집니다. 대상포진은 수두 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 피부에 물집이 생기고 통증이 동반됩니다. 대상포진은 면역력이 떨어진 사람에게 주로 발생합니다. 대상포진은 피부뿐만 아니라 신경에도 영향을 미칠 수 있습니다. 대상포진이 의심되는 경우 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

보건증 발급 항문 검사 과정에서,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문에 면봉을 넣는 과정에서 무서워가지고 좀 비비면서 면봉을 넣었는데 그때 이후부터 좀 아프군요. 항문외과 내원하셔서 정확한 진료를 한번 받도록 하십시오.

피검사 한거좀 전체적으로 봐주세요,안녕하세요 요약 1. hsCRP는 심혈관질환 예측인자입니다. 2. 심혈관질환이나 뇌졸중 등의 위험인자가 있는지 정밀검사가 필요합니다. 3. 0.3 mgdL 고위험군 입니다. hsCRP는 심혈관질환의 위험도를 예측하는 지표로서 hsCRP는 심혈관질환 심장마비 뇌졸중의 잠재적 위험수준을 확인하는 검사로입니다. 건승하세요

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 흐리지만 설염이 발생한 상태라 보입니다. 구내염이라 생각하시면 되겠고 시간이 지나면 호전될 것으로 예상되나 잘 나아지지 않고 지속되는 경우에는 진료가 필요합니다. 이 때는 이비인후과를 방문해보시기 바랍니다. 통증 조절이 필요하다면 약국에서 가글을 사서 사용해보시면 되겠습니다.

산부인과 의사분들은 배란이 언제 된 건지 알 수 있나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 산부인과 의사들은 여성의 배란일을 몇 가지 방법으로 판단할 수 있습니다. 월경 주기 관찰 일반적으로 월경 주기의 14일 전후로 배란이 일어납니다. 규칙적인 주기를 가진 경우 이를 토대로 대략적인 배란일을 예측할 수 있습니다. 기초체온 측정 배란 후 체온이 약간 상승하므로 매일 아침 체온을 측정하여 체온 상승 시점으로 배란일을 판단합니다. 자궁경부 점액 관찰 배란 무렵에는 자궁경부에서 액체 점액이 분비되는데 이를 관찰하여 배란일을 추정합니다. 호르몬 검사 배란 시기에 에스트로겐 LH황체화호르몬 수치가 변하므로 이를 측정하여 배란일을 확인합니다. 초음파 검사 난소의 성숙 난포 크기 변화와 배란 과정을 초음파로 직접 관찰할 수 있습니다. 이러한 방법들을 종합적으로 활용하여 산부인과 의사들은 환자 개인의 배란일을 비교적 정확히 판단할 수 있습니다

에피네프린이 없으면 어떻게되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서

에피네프린에피네프린 자가주사기이 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야 합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 비급여로 처방받으실 수 있습니다

질문드립니다... 물어볼 곳이 없어 꼭 부탁드립니다..안녕하세요 요약 뇌하수체 미세선종이 있는지 확인해 보세요 뇌하수체 선종은 뇌하수체에 발생하는 양성 종양으로 호르몬 분비성 뇌하수체 선종 호르몬 비분비성 뇌하수체 선종으로 구분하게 됩니다. 현재 명확히 밝혀진 원인은 없습니다. 원인불명 건승하세요

피임약 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약 복용 여부가 명확하지 않다면 2정을 복용한 것은 문제가 되지 않습니다. 피임 효과는 유지가 되므로 걱정하지 않아도 됩니다.

조루증 스프레이 사용 후 극치감 감소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문하신 내용을 종합적으로 판단하면 비뇨기과에 방문해서 조루증을 다른 방식으로 치료하는 것이 좋습니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=bshA69sSU>

탈모약 부작용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 지금 상태를 파악하기 위해서 탈모 치료 병원을 방문해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 거기서 상태에 맞게 처방해주실 겁니다

커피는 빈속만 피하면 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소에 그렇게 커피 드셔서 큰 문제가 없다고 하면 식후 커피는 위장에 무리를 주거나 하지는 않을 것으로 생각됩니다.

임신가능성이나 임신인가요,안녕하세요 요약 1. 임신테스트기로 검사를 해보세요 2. 백문이 불여일견입니다. 3. 부정출혈일 가능성이 많으며 4. 냉에서 냄새가 나거나 색이 변하면 질염인지도 확인이 필요합니다. 건승하세요

눈꼽새 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연한 노랑색 눈꼽이 건조 되면 진한 노랑이나 녹색을 띠는경우도 있습니다. 충혈이 되고 그러면 항생제 점안액이 필요할 수 있습니다

몇년 전부터 다리에 가렵지는 않는데 붉은 무언가가 계속나요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 모공에 두드러지게 보이는 모공각화증은 아닌가 싶은데요. 계속 심해지면 진료 한번 받아보시는 것을 권해드립니다.

손에 약간 상처났는데 생고기를 만졌어요..안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황상 걱정하는 일은 벌어지지 않으니 안심하셔도 됩니다. 당뇨병과 같은 질환은 감염성 질환이 아닙니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손에 상처 난 부분 생고기 만졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병은 감기처럼 옮는 병이 아닙니다. 따라서 상처로 돼지 당노가 절대로 옮겨나 하지 않으니 안심하시기 바랍니다.

피임약 부정출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양이 많지 않으면 그냥 좀더 드셔보세요. 야스민을 드실때 잊지말고 매일 정해진 시간에 복용하시는것이 필요합니다

조직검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비특이적이라는 이야기는 어떤 특정질환을 의심하기는 어렵다는 이야기 입니다. 증상이 지속되거나 하여 나중에 검사해서 진행하면 진단명이 바뀌는 경우도 있습니다

뿌리 잇몸 안에 큰 물혹 염증 어떻게 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크라운 씌운 치아 잇몸에 농양 같은 게 생기고 통증이 심해서 치과에 갔는데 사진 찍고 진료받아보니 뿌리 쪽 잇몸 안에 큰 물혹 염증 같은 게 가득 차 있다고 크기도 많이 크고 상태가 만히 안 좋다 하셔서 일반 치과에서는 치료 못하고 대학병원을 가라고 하셔서요 이게 크라운 교체 전에는 없었는데 교체 후에 생긴 거 같다고 3년 전 사진이랑 비교해 주시면서 알려주셨는데 많이 심각한 거라고도 얘기를 하셔서 양성종양 같은 거라고도 하시던데 저는 어떤 치료를 받아야 하나요? 예고 걱정이 많으시겠어요 일단 치과대학병원 구강외과로 가보시고 검사를 받아보세요 아

마도 물혹 제거 수술을 하게되실 거 같습니다 수술 후 차도에 따라서 그 치아를 어떻게 치료 할 지 결정될거 같아요

조직검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 상행 하행 s자 대장부위에서 조직 검사를 하여 검사 소견을 보면 비특이적인 만성 염증소견으로 나왔습니다. 지금 결과로는 장염으로 생각됩니다

치루 수술 후 좌욕 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치루 수술 후 좌욕 시 통증이 있는 것은 정상적인 반응입니다. 수술 부위의 상처가 아물기 전이기 때문에 통증이 발생할 수 있습니다. 성장기 코파면 콧구멍 넓어지나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코를 한번 파서 그것으로 인하여 콧구멍이 넓어질 수 있다고 보기는 어렵습니다. 일반적으로 코파기로 넓어지기는 어렵습니다

가만히 서있는데 항문 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵이나 치열이 있을 때 출혈이 있을 수 있습니다. 만약 증상이 반복된다면 진료를 받아 보시기 바랍니다. 2년 전에 문제는 정확한 원인을 짐작하기는 어렵습니다. 감사합니다.

남자 오른쪽 아랫배 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시겠네요. 무거운 짐을 지고 다닌후에 나타난 증상이고 특정자세에서는 심해지거나 좋아지는 것으로 미루어 근육통으로 생각됩니다

경구피임약 질문 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오일 정도 드시면 피임효과를 기대할 수 없으니 다른 피임방법을 사용하시면서 생리가 시작되면 다시 피임약을 시작하시는 것을 권합니다

궁금한것이 있습니다,안녕하세요 요약 1. 치석도 먹으면 결국 변으로 같이 나오게 됩니다. 2. 나도 모르게 먹는 치석도 있을 겁니다. 3. 나도 모르게 먹을때랑 알고 먹을때랑 몸에서 달라진 건 없으니 4. 심리적 요인이 많이 작용한 겁니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양치를 안한 상태에서 물을 마시면 치석과 세균이 섞인 물이 몸에 들어가게 됩니다. 이는 몸에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 치석과 세균이 섞인 물이 잇몸에 들어가면 잇몸염증을 유발할 수 있습니다. 또한 물이 혈관을 통해 뇌로 들어가면 뇌졸중을 유발할 수 있습니다. 따라서 양치를 안한 상태에서는 물을 마시지 않는 것이 좋습니다. 갑자기 양손과 발 한쪽이 저리는 증상은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 혈액순환 장애입니다. 혈액순환 장애가 발생하면 혈액이 손과 발로 잘 공급되지 않아 저림 증상이 나타날 수 있습니다. 또한 뇌졸중이나 심장마비와 같은 질환이 발생하면 혈액순환 장애가 발생할 수 있습니다. 따라서 갑자기 양손과 발 한쪽이 저리면 뇌졸중이나 심장마비를 의심해 볼 필요가 있습니다. 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 심하지 않고 위치로 심박수를 재보니 심박수가 괜찮게 나온다면 자다가 잘못될 가능성은 낮습니다. 하지만 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 심하고 심박수가 불규칙하다면 뇌졸중이나 심장마비를 의심해 볼 필요가 있습니다. 따라서 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 불안장애 약을 먹고 있다면 약을 먹는 동안에는 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나더라도 심각한 질환이 아닐 가능성이 높습니다. 하지만 불안장애 약을 먹고 있는데도 갑자기 양손과 발 한쪽이 저린 증상이 나타나고 증상이 심하다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

궁금한것이 있습니다,안녕하세요 요약 1. 치석도 먹으면 결국 변으로 같이 나오게 됩니다. 2. 나도 모르게 먹는 치석도 있을 겁니다. 3. 나도 모르게 먹을때랑 알고 먹을때랑 몸에서 달라진 건 없으니 4. 심리적 요인이 많이 작용한 겁니다. 건승하세요

궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 입안에 있던 것들이라 그것으로 문제가 되지는 않을듯합니다. 뭔가 과도하게 걱정을 하고 계신듯합니다. 걱정하실 필요 없어보입니다
궁금한것이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황으로 인해 건강에 위중한 영향을 미치거나 건강이 위협되는 일은 발생하지 않습니다. 너무 걱정하지 않기 바랍니다.

접촉성? 알레르기성 피부염...,안녕하세요 요약 물리적 두드러기인지도 확인이 필요합니다. 물리적 두드러기는 물리적 자극에 의한 알레르기 반응으로 발생하는 피부요기증 콜린성두드러기 한랭두드러기 일광 두드러기 등이 있습니다. 급성 두드러기의 경우 짧은 기간에 치료가 끝나지만 만성 두드러기의 경우에는 항히스타민제를 포함한 여러 종류의 약제를 장기간 사용해야 합니다. 건승하세요

녹내장 대학병원 꼭 가야하나요?,안녕하세요. 요약 1. 네 안과 전문병원에서 주기적인 안압 측정과 시신경을 자주 들여다 보세요 2. 당장 수술할 질환이 아니면 주기적인 체크를 하면서 3. 현재 상태가 어떤지 확인하는게 중요합니다. 건승하세요.

침샘쪽 멍울이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련은 없습니다 너무 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

피검사 농도에 대해서 질의드립니다.,안녕하세요 요약 유닛 IU International Unit은 국제단위 표준으로서 IUmL 또는 U/mL을 쓰게 됩니다. U와 IU는 같은 단위입니다. IU는 international unit의 약자이며 특별한 언급이 없을 경우엔 U와 IU는 같습니다. 건승하세요
조루증 스프레이 사용 후 극치감 감소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문하신 내용을 종합적으로 판단하면 비뇨기과에 방문해서 조루증을 다른 방식으로 치료하는 것이 좋습니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?vbshA69sSU>
성병인가가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도앞부분에 덩어리진게 있어서 짜봤는데 피가 나오진않고 하얀색 찌꺼기만 나왔군요. 다양한 가능성으로 피부과 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

보건증 발급 항문 검사 과정에서,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문에 면봉을 넣는 과정에서 무서워가지고 좀 비비면서 면봉을 넣었는데 그때 이후부터 좀 아프군요. 항문외과 내원하셔서 정확한 진료를 한번 받도록 하십시오.

손에 상처 난 부분 생고기 만졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병은 감기처럼 옮는 병이 아닙니다. 따라서 상처로 돼지 당뇨가 절대로 옮거나 하지 않으니 안심하시기 바랍니다.

선생님 체외충격파 치러 후 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체외충격파 받으신 병원에 방문하셔서 다시 다친 사실을 말씀드리고 그에 맞게 진료 및 치료받으시는 것을 권장드립니다. 질문자님의 빠른 쾌유를 바랍니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전기 통했다는게 어느정도로 전기에 의한 손상을 받았다는건지 알 수는 없지만 증상이 지속된다면 가까운 정형외과 병원 방문하셔서 진료보시기를 바랍니다. 질문자님의 빠른 쾌유를 바랍니다.

자세를 불편하게 있다가 일어났는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 자세를 취했는지 알 수 없지만 부자연스러운 자세로 장시간 있을 경우 발목의 힘줄에 무리가 가게 되어 통증을 유발할 수 있습니다. 정형외과 병원 방문하셔서 진료보시기를 바랍니다. 질문자님의 빠른 쾌유를 바랍니다.

성병인가가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도앞부분에 덩어리진게 있어서 짜봤는데 피가

나오진않고 하얀색 찌꺼기만 나왔군요. 다양한 가능성으로 피부과 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

감기약 부작용 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러 감기약을 처방받으셨고 약 복용 후 부터 두근거림과 숨찬 증상이 나타났다면 우선 약을 중단하시고 병원을 바로 방문하여 확인하시는 것이 안전합니다. 진료가 끝나기 전 방문해보시기 바랍니다.

매독 판독결과 질문 드립니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. RPR 검사는 매독을 스크리닝할때 하는 대표적인 검사로 non reactive로나왔는데 매독 판결 결과는 음성을의미합니다.

가만히 서있는데 항문 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵이나 치열이 있을 때 출혈이 있을 수 있습니다. 만약 증상이 반복된다면 진료를 받아 보시기 바랍니다. 2년 전에 문제는 정확한 원인을 짐작하기는 어렵습니다. 감사합니다.

난소 물혹,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액이 찬 물혹일 수 있습니다. 많이 걱정되고 불안 할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

커피는 빈속만 피하면 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소에 그렇게 커피 드셔서 큰 문제가 없다고 하면 식후 커피는 위장에 무리를 주거나 하지는 않을 것으로 생각됩니다.

뿌리 잇몸 안에 큰 물혹 염증 어떻게 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크라운 씌운 치아 잇몸에 농양 같은 게 생기고 통증이 심해서 치과에 갔는데 사진 찍고 진료받아보니 뿌리 쪽 잇몸 안에 큰 물혹 염증 같은 게 가득 차 있다고 크기도 많이 크고 상태가 만히 안 좋다 하셔서 일반 치과에서는 치료 못하고 대학병원을 가라고 하셔서요 이게 크라운 교체 전에는 없었는데 교체 후에 생긴 거 같다고 3년 전 사진이랑 비교해 주시면서 알려주셨는데 많이 심각한 거라고도 얘기를 하셔서 양성종양 같은 거라고도 하시던데 저는 어떤 치료를 받아야 하나요? 예고 걱정이 많으시겠어요 일단 치과대학병원 구강외과로 가보시고 검사를 받아보세요 아마도 물혹 제거 수술을 하게되실 거 같습니다 수술 후 차도에 따라서 그 치아를 어떻게 치료 할 지 결정될거 같아요

피임약 부정출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양이 많지 않으면 그냥 좀더 드셔보세요. 야스민을 드실때 잊지말고 매일 정해진 시간에 복용하시는것이 필요합니다

손에 상처 난 부분 생고기 만졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 당뇨병은 감기처럼 옮는 병이 아닙니다. 따라서 상처로 돼지 당뇨가 절대로 옮거나 하지 않으니 안심하시기 바랍니다.

손에 약간 상처났는데 생고기를 만졌어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황상 걱정하는 일은 벌어지지 않으니 안심하셔도 됩니다. 당뇨병과 같은 질환은 감염성 질환이 아닙니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

몇년 전부터 다리에 가렵지는 않는데 붉은 무언가가 계속나요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모공에 두드러지게 보이는 모공각화증은 아닌가 싶은데요. 계속 심해지면 진료 한번 받아보시는 것을 권해드립니다.

조직검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 상행 하행 s자 대장부위에서 조직 검사를 하여 검사 소견을 보면 비특이적인 만성 염증소견으로 나왔습니다. 지금 결과로는 장염으로 생각됩니다

치루 수술 후 좌욕 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치루 수술 후 좌욕 시 통증이 있는 것은 정상적인 반응입니다. 수술 부위의 상처가 아물기 전이기 때문에 통증이 발생할 수 있습니다.

성장기 코파면 콧구멍 넓어지나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코를 한번 파서 그것으로 인하여 콧구멍이 넓어질 수 있다고 보기는 어렵습니다. 일반적으로 코파기로 넓어지기는 어렵습니다

피임약 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약 복용 여부가 명확하지 않다면 2정을 복용한 것은 문제가 되지 않습니다. 피임 효과는 유지가 되므로 걱정하지 않아도 됩니다.

성장기 코파면 콧구멍 넓어지나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 코를 한번 파서 그것으로 인하여 콧구멍이 넓어질 수 있다고 보기는 어렵습니다. 일반적으로 코파기로 넓어지기는 어렵습니다

성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도앞부분에 덩어리진게 있어서 짜봤는데 피가 나오진않고 하얀색 찌꺼기만 나왔군요. 다양한 가능성으로 피부과 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

경구피임약 먹고 여드름이 심해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약은 여성호르몬을 조절하여 다낭성난소증후군의 증상을 완화시키는 효과가 있습니다. 하지만 경구피임약은 사람마다 반응이 다르기 때문에 일부에서는 여드름이 심해질 수 있습니다. 만약 야를 먹고 여드름이 심해졌다면 다른 경구피임약을 처방받거나 경구피임약을 끊고 다른 방법으로 다낭성난소증후군을 치료하는 것이 좋습니다.

두개골 뼈가 튀어나왔는데 말랑해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문 감사합니다. 두개골 모양의 이상이 의심된다면 반드시 머리 영상 검사를 해 보시는 것이 좋겠습니다. CT 검사가 가능한 병원의 신경외과 진료를 보시고 대부분 CT 검사는 당일 촬영이 가능하고 당일 검사 결과를 확인할 수가 있습니다. 참고해서 진료받으시기 바랍니다. 감사합니다.

조직검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 상행 하행 s자 대장부위에서 조직 검사를 하여 검사 소견을 보면 비특이적인 만성 염증소견으로 나왔습니다. 지금 결과로는 장염으로 생각됩니다

가만히 서있는데 항문 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵이나 치열이 있을 때 출혈이 있을 수 있습니다. 만약 증상이 반복된다면 진료를 받아 보시기 바랍니다. 2년 전에 문제는 정확한 원인을 짐작하기는 어렵습니다. 감사합니다.

가만히 서있는데 항문 피,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵이나 치열이 있을 때 출혈이 있을 수 있습니다. 만약 증상이 반복된다면 진료를 받아 보시기 바랍니다. 2년 전에 문제는 정확한 원인을 짐작하기는 어렵습니다. 감사합니다.

치루 수술 후 좌욕 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치루 수술 후 좌욕 시 통증이 있는 것은 정상적인 반응입니다. 수술 부위의 상처가 아물기 전이기 때문에 통증이 발생할 수 있습니다.

조루증 스프레이 사용 후 극치감 감소,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질문하신 내용을 종합적으로 판단하면 비뇨기과에 방문해서 조루증을 다른 방식으로 치료하는 것이 좋습니다. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?vbshA69sSU>

심실조기탈분극 부정맥 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심실조기탈분극 부정맥은 심장 박동이 불규칙하게 뛰는 증상입니다. 보통은 심각한 증상을 유발하지 않지만 심한 경우 심장마비나 돌연사를 일으킬 수 있습니다. 심실조기탈분극 부정맥은 약물치로나 수술로 치료할 수 있습니다. 올초 홀터 2회각 3박4일 시 0.1 미만으로 진단받았다면 심실조기탈분극 부정맥의 증상이 심하지 않은 것으로 보입니다. 하지만 증상이 심해졌다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 심전도 검사를 통해 심실조기탈분극 부정맥의 정도를

확인하고 약물치료나 수술이 필요한지 결정할 것입니다. 심실조기탈분극 부정맥은 심각한 질환이 아니지만 증상이 심해진다면 심장마비나 돌연사를 일으킬 수 있습니다. 따라서 증상이 심해지거나 걱정되는 경우에는 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

뿌리 잇몸 안에 큰 물혹 염증 어떻게 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크라운 씌운 치아 잇몸에 농양 같은 게 생기고 통증이 심해서 치과에 갔는데 사진 찍고 진료받아보니 뿌리 쪽 잇몸 안에 큰 물혹 염증 같은 게 가득 차 있다고 크기도 많이 크고 상태가 만히 안 좋다 하셔서 일반 치과에서는 치료 못하고 대학병원을 가라고 하셔서요 이게 크라운 교체 전에는 없었는데 교체 후에 생긴 거 같다고 3년 전 사진이랑 비교해 주시면서 알려주셨는데 많이 심각한 거라고도 얘기를 하셔서 양성종양 같은 거라고도 하시던데 저는 어떤 치료를 받아야 하나요? 예고 걱정이 많으시겠어요 일단 치과대학병원 구강외과로 가보시고 검사를 받아보세요 아마도 물혹 제거 수술을 하게되실 거 같습니다 수술 후 차도에 따라서 그 치아를 어떻게 치료할 지 결정될거 같아요

감기약 부작용 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러 감기약을 처방받으셨고 약 복용 후 부터 두근거림과 숨찬 증상이 나타났다면 우선 약을 중단하시고 병원을 바로 방문하여 확인하시는 것이 안전합니다. 진료가 끝나기 전 방문해보시기 바랍니다.

단순히 조금 다른 생리일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콘돔을 확실하게 사용하셨다면 임신에 대한 걱정은 크게 안하셔도 되겠습니다. 생리가 규칙적이다가도 한번씩 다양한 요인에 의해서 생리주기나 양상이 변하는 것은 있을 수 있습니다. 부정출혈이 지속되거나 다음 생리 때에도 생리통이 심하고 평소와 다른 양상이라면 진료를 받아보시는 것을 권유드립니다.

피임약 부정출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 양이 많지 않으면 그냥 좀더 드셔보셔요. 야스민을 드실때 잊지말고 매일 정해진 시간에 복용하시는것이 필요합니다

피검사 결과와 몇몇 궁금한 점들이 있습니다 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스트레스가 심하거나 다이어트를 격하게 하거나 운동을 많이 하다보면 시상하부성 무월경이 나타나게 됩니다. FSH와 LH의 분비가 줄어들면서 난소에 대한 자극이 떨어져 여성호르몬 분비 자체가 줄어들어 생리가 안나오게 되는 것이죠. 이럴 때는 FSH와 LH 모두 낮은 수치를 보일 수 있으며 정상범위 안이더라도 낮은 경계선 부근에 나타날 수 있습니다. 또한 초음파를 같이 보셨다면 시상하부성 무월경에 부합하는 소견이 관찰되어 그렇게 설명을 들으셨을것으로 생각됩니다. 만약 prolactin 수치가 과도하게 높았다면 뇌MRI 검사가 의미가 있겠지만 현재 상황에서는 과한 검사라고 생각됩니다. 편두통은 뇌 MRI로 검사하는 것은 아닙니다.

손에 약간 상처났는데 생고기를 만졌어요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황상 걱정하는 일은 벌어지지 않으니 안심하셔도 됩니다. 당뇨병과 같은 질환은 감염성 질환이 아닙니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

몇년 전부터 다리에 가렵지는 않은데 붉은 무언가가 계속나요.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모공에 두드러지게 보이는 모공각화증은 아닌가 싶은데요. 계속 심해지면 진료 한번 받아보시는 것을 권해드립니다.

난소 물혹,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액이 찬 물혹일 수 있습니다. 많이 걱정되고 불안할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하답니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

매독 판독결과 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. RPR 검사는 매독을 스크리닝할때 하는 대표적인 검사로 non reactive로나왔는데 매독 판결 결과는 음성을의미합니다.

탈모약 부작용 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 지금 상태를 파악하기 위해서 탈모 치료 병원을 방문해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 거기서 상태에 맞게 처방해주실 겁니다

커피는 빈속만 피하면 되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 평소에 그렇게 커피 드셔서 큰 문제가 없다고 하면 식후 커피는 위장에 무리를 주거나 하지는 않을 것으로 생각됩니다.

눈곱색 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연한 노랑색 눈곱이 건조 되면 진한 노랑이나 녹색을 띠는경우도 있습니다. 충혈이 되고 그러면 항생제 점안액이 필요할 수 있습니다

HIV 검사 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. hiv때문에 걱정이 많으시군요. 앞으로는 위험한 관계는 피하시는 것이 좋겠습니다. 기준이 많다는 것은 절대적인 기준은 없다 이렇게 생각하시면됩니다. 지금 주치의 선생님의 지시를 잘 따라서 검사 받으시면 될것 같습니다

발목 인대에 살짝 스케리치가 났다는데...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발목을 다치셨군요. 인대의 파열은 심하게 찢어진 것부터 미세 파열까지 여러 단계가 있습니다. 눈에는 보이지않아도 파열의 소견이 있으면 주사치료를 사용하기도 합니다. 충격파는 손상된 인대와 힘줄을 회복시키는 효과가 있습니다. 감사합니다.

척추측만증 척추분리증에 다리베개 허리베개하고자면 효과가있을까요?.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리가 불편하시군요. 주무실 때 베개를 사용하시면 허리와 골반에 가해지는 근육긴장이 감소합니다. 바로 누우면 허리 무릎 아래에 두고 옆으로 누우면 옆구리 아래나 무릎사이에 베개를 사용하는 것이 좋습니다. 감사합니다.

피임약 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약 복용 여부가 명확하지 않다면 2정을 복용한 것은 문제가 되지 않습니다. 피임 효과는 유지가 되므로 걱정하지 않아도 됩니다.

심실조기탈분극 부정맥 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심실조기탈분극 부정맥은 심장 박동이 불규칙하게 뛰는 증상입니다. 보통은 심각한 증상을 유발하지 않지만 심한 경우 심장마비나 돌연사를 일으킬 수 있습니다. 심실조기탈분극 부정맥은 약물치로나 수술로 치료할 수 있습니다. 올초 홀터 2회각 3박4일 시 0.1 미만으로 진단받았다면 심실조기탈분극 부정맥의 증상이 심하지 않은 것으로 보입니다. 하지만 증상이 심해졌다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 심전도 검사를 통해 심실조기탈분극 부정맥의 정도를 확인하고 약물치로나 수술이 필요한지 결정할 것입니다. 심실조기탈분극 부정맥은 심각한 질환이 아니지만 증상이 심해진다면 심장마비나 돌연사를 일으킬 수 있습니다. 따라서 증상이 심해지거나 걱정되는 경우에는 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

감기약 부작용 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러 감기약을 처방받으셨고 약 복용 후부터 두근거림과 숨찬 증상이 나타났다면 우선 약을 중단하시고 병원을 바로 방문하여 확인하시는 것이 안전합니다. 진료가 끝나기 전 방문해보시기 바랍니다.

심장초음파,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장초음파 소견이군요. 정상적인 심장의 크기를 가지고 있으며 심장 벽의 두께도 정상입니다. 좌심실의 수축 기능도 정상적이지만 좌심실의 이완기능에 이상이 발견되었습니다. 우심실이나 심방은 정상이고 판막 기능도 거의 정상적이라 보입니다. 따라서 좌심실의 이완기능 문제에 대한 추가적인 상담이 필요할 것이니 내과를 방문해보시면 되겠습니다.

매독 판독결과 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. RPR 검사는 매독을 스크리닝할때 하는 대표적인 검사로 non reactive로나왔는데 매독 판결 결과는 음성을의미합니다.

HIV 초기증상 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. HIV는 혈액이나 체액을 통해 전염되는 질환입니다. 성관계를 통해 HIV에 감염되면 보통 24주 후에 초기증상이 나타납니다. 초기증상은 발열 기침 인후통 근육통 피로감 두통 설사 구토 피부발진 등이 있습니다. 하지만

HIV 초기증상은 감기나 독감과 비슷한 증상이어서 HIV에 감염되었다는 것을 알아차리기가 어렵습니다. HIV에 감염되었다면 4주 6주 12주 간격으로 항원항체 검사를 받아야 합니다. PEP는 HIV 감염을 예방하기 위한 약물입니다. PEP는 관계 후 72시간 이내에 복용해야 효과가 있습니다. PEP를 복용하면 HIV 감염을 예방할 수 있지만 100% 효과가 있는 것은 아닙니다. PEP를 복용한 후에도 4주 6주 12주 간격으로 항원항체 검사를 받아야 합니다.

경구피임약 먹고 여드름이 심해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약은 여성호르몬을 조절하여 다낭성난소증후군의 증상을 완화시키는 효과가 있습니다. 하지만 경구피임약은 사람마다 반응이 다르기 때문에 일부에서는 여드름이 심해질 수 있습니다. 만약 야를 먹고 여드름이 심해졌다면 다른 경구피임약을 처방받거나 경구피임약을 끊고 다른 방법으로 다낭성난소증후군을 치료하는 것이 좋습니다.

성형수술 후 신경회복 엠코발,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약전을 보시면 메코발라민은 말초성 신경장애 치료에 사용하는 약물입니다. 또한 손상된 신경을 재생하여 저하된 신경기능을 정상화시켜주는 비타민 B12제입니다. 라고 써 있습니다. 그러므로 도움이 될수 있습니다.

입방골 발목 미세골절 붓기가 안빠져요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지에 골절이 생기게 되면 반깁스 등으로 고정을 한 이후에 근육이 약해지게 됩니다. 심장에서 다리로 내려온 피가 다시 올라가기 위해서는 근육 수축 중요한데요. 다리에 골절이 있으면 바로 이 부분이 잘 되지 않습니다. 그래서 하지에 골절이 생기면 몇개월간 붓는 것 때문에 고생을 하시는데요. 일단 다리를 올려놓는 것이 도움이 되며 골절이 유합이 되었다면 걷기 등을 통해서 꾸준히 근육이 회복 될 수 있도록 운동을 하시는 것이 좋습니다.

난소 물혹,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액이 찬 물혹일 수 있습니다. 많이 걱정되고 불안할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하답니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

항정신약물인 환인벤트로핀정 리페리돈정을 복약중입니다. 따른 약물과 같이 먹어도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심리적 안정을 위해 쓰는 약들과 항생제는 시간을 기본 1시간 이상 간격을 띄워서 복용해야 합니다 벤로핀도 1 2 로 용량이 나뉘고 리돈은 1 2 3 으로 용량이 다양한데 어떤 용량을 드시고 계실까요? 같이 복용하는 것은 권하지 않습니다 감사합니다

로제듀오 아스피린 비타민 K,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 며칠전에 답변 드린 기억이 납니다 질문이 약간 달라졌네요 다른 약사님들의 답변을 더 받아보심이 좋겠습니다 전문약의 경우는 꼭 드시도록 하십시오 뇌혈관의 영양제는 노진생 전철삼을 드셔야 합니다

복용 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위 순서대로 몬테루카스트 페라민 페레프린 복합 시럽 암록솔 케티펜 펠움고니움시도 ... 항생제 시럽 클래리트로마이신 호흡기 패취 입니다 성분이 겹치지는 않으나 워낙 다양한 약이 있어서 저의 아이라면 더 안 먹일거 같습니다 다양한 성분의 약을 먹이는 것이 중요한 것이 아니라 아이의 면역력 특히 폐의 기능을 올리는 약을 써야 하는데 양약은 생각외로 기능만 제어하는 효과가 있기에 저는 추천드리지 않습니다 프로폴리스 시아플렉스 키즈 시럽 경옥고 등으로 보조요법을 사용해보심을 추천드립니다 저희아이는 이렇게 먹입니다 그리고 무조건 따뜻한 물에 목에 손수건 둘러주고 중간중간 목에 스프레이 뿌려주고 소금물고 가글 시킵니다 더욱 건강을 챙겨주시길 바랍니다 감사합니다

알러지 색소침착 노스카나,안녕하세요. 메디이즈입니다. 몸속 멜라닌이라는 색소침착 물질과 염증물질의 콜라보로 만들어지는데 색소를 녹이는 연고를 바르시는 것이 맞습니다 피부과에

가서서 처방을 받으셔도 되고 약국에서 색소제거 기미제거 연고 달라고 하시면 자세히 알려주실 것으로 예상합니다. 노카나는 여드름 뿐만 아니라 흉터를 재생하고 흉터를 열게 만들어주는 역할을 하는 흉터치료제 입니다

약 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오메가3 입니다 1일 2회 1정씩 복용해야 효과가 있는 건강기능식품입니다 혈행개선과 염증수치완화를 목적으로 정제된 좋은 기름이라고 생각하시면 되겠습니다. 사실 한국인은 들기름과 참기름 그리고 올리브유 엑스트라버진 1숟가락씩 먹는게 제일 효과가 좋기는 합니다

스피콜드 인팩신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두가지약을 세트로 같이 복용하십시오. 식후 1알씩 입니다. 선생님은 몸무게가 적으셔서 2알이면 너무 셀 것 같습니다. 따뜻한 물도 많이 드시고 커피는 평소보다 줄이시길 바라겠습니다

복용 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 위 순서대로 몬테루카스트 페라민 페레프린 복합 시럽 암록솔 케티펜 펠움고니움시도 ... 항생제 시럽 클라리트로마이신 호흡기 패취 입니다. 성분이 겹치지는 않으나 워낙 다양한 약이 있어서 저의 아이라면 더 안 먹일거 같습니다. 다양한 성분의 약을 먹이는 것이 중요한 것이 아니라 아이의 면역력 특히 폐의 기능을 올리는 약을 써야 하는데 양약은 생각외로 기능만 제어하는 효과가 있기에 저는 추천드리지 않습니다. 프로폴리스 시아플렉스 키즈 시럽 경옥고 등으로 보조요법을 사용해보심을 추천드립니다. 저희아이는 이렇게 먹입니다. 그리고 무조건 따뜻한 물에 목에 손수건 둘러주고 중간중간 목에 스프레이 뿌려주고 소금물고 가글 시킵니다. 더욱 건강을 챙겨주시길 바랍니다. 감사합니다

항문 무슨 증상인가요?,안녕하세요. 요약 1. 연조직염입니다. 2. 발적 발열 부종을 특징으로하는 연조직염이라는 병이 있습니다. 3. 항문주변조직이 염증으로 부었으니 항문외과에서 치료 잘 받으세요. 연조직염은 피부표면의 작은 상처를 통해 세균 침투로 진피와 피하조직에 일어나는 세균 감염증이며 봉소염 봉과직염 봉와직염이라고도 합니다. 연조직염의 증상은 발생한 부위에 홍반 열감 부종 압통을 동반하며 질병이 진행되면 물집과 고름이 생기기도 하며 단순염증으로 보이나 초기에 치료가 되지 않을 경우 피부괴사 패혈증 화농관절염 골수염 등의 합병증과 심한 경우 사망에 이를 수도 있습니다. 건승하세요

오른쪽 눈의 시력 저하,안녕하세요. 메디이즈입니다. 황반변성이 의심된다면 보통 빛간섭단층촬영 형광안저촬영 등을 통해서 확진하게 됩니다. 안저검사로 의심은 할 수 있지만 확진을 위해서는 추가적인 검사를 시행하게 됩니다.

콘돔 찢어짐,안녕하세요. 요약 1. 콘돔이 찢어졌다면 임신 가능성이 조금이라도 있으니 2. 피임을 원한다면 사후피임약을 처방받으세요 3. 처방받을때 한번더 물어 보세요. 건승하세요

한쪽 눈 시야 장애 관련 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마 진료의뢰서 상의 상병명을 적어주신 거 같은데 저 상병은 검사 처방을 내기 위해서 내는 기본적인 상병? 들입니다. 진단이 명확해지면 보통 해당 진단명으로 바꾸게 되는데 검사상으로 명확하게 나온 것이 없었나봅니다. 저것만 보고 정확히 말씀드리기는 힘들 듯 합니다.

오늘 언제부터인제는 모르겠는데요...,안녕하세요. 요약 1. 자다가도 증상이 생기는지 확인해 보세요 2. 반복성과 재현성이 중요합니다. 3. 증상이 지속되거나 증상이 악화되면 다시 확인 할 필요가 있습니다. 건승하세요

안과 진료 때 선생님이 눈 위쪽을 눌렀는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 위 눈꺼풀을 뒤집어 까면서 나타난 증상이 아닌가 생각됩니다. 그정도로 망막에 무리가 가지는 않을테니 너무 걱정하지마세요

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 종합할 때 건

강에 영향을 미칠만한 문제는 없는 것으로 판단됩니다. 너무 걱정하지 말고 다른 증상이 나타나는지 확인하기 바랍니다.

심장초음파,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장초음파 소견이군요. 정상적인 심장의 크기를 가지고 있으며 심장 벽의 두께도 정상입니다. 좌심실의 수축 기능도 정상적이지만 좌심실의 이완기능에 이상이 발견되었습니다. 우심실이나 심방은 정상이고 판막 기능도 거의 정상적이라 보입니다. 따라서 좌심실의 이완기능 문제에 대한 추가적인 상담이 필요할 것이니 내과를 방문해보시면 되겠습니다.

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단은 증상이 심하지 않으니 증상에 너무 민감하게 반응하지 않으시고 무시하시는 것이 좋을것 같습니다. 증상이 심해지면 진료 받아보셔요

난소 물혹,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈액이 찬 물혹일 수 있습니다. 많이 걱정되고 불안할 수 밖에 없는 상황이지만 이럴수록 객관적인 접근이 중요하합니다. 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식을 한것으로 인해 샤워하고 못 주무실 이유가 없습니다. 단 과식을 하셨다면 위식도 역류등의 가능성이 있어 최소한 23시간 후 주무시기를 권유합니다

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요...,안녕하세요 요약 1. 자다가도 증상이 생기는지 확인해 보세요 2. 반복성과 재현성이 중요합니다. 3. 증상이 지속되거나 증상이 악화되면 다시 확인할 필요가 있습니다. 건승하세요

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 종합할 때 건강에 영향을 미칠만한 문제는 없는 것으로 판단됩니다. 너무 걱정하지 말고 다른 증상이 나타나는지 확인하기 바랍니다.

응고된 혈액의 통한 감염여부 문의입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이미 공기중에 오래 노출되어 제대로 응고된 혈액을 통한 혈액매개감염의 가능성은 없다고 보셔도 될듯합니다. 과한 걱정인듯합니다

울대 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연부조직의 손상과 부종이 있을 수 있습니다. 우선은 소염제를 복용하시면서 이비인후과에서 비용이 비싸지 않은 후두경 검사를 확인하시면 좋겠습니다.

복부 mri 결과지 판독 부탁드립니다 .,안녕하세요 요약 1. 췌장 두부에 종양이 있습니다. 2. 췌장암 신경내분비 종양 3. 복강 주변부에 1cm 미만의 임파선병변들이 있습니다. 4. 신장은 괜찮습니다. 5. 담낭도 괜찮습니다. 6. 간과 담도계에도 이상 소견은 없습니다. 건승하세요

약 복용기간 질문 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약을 처방받으신지 오랜시간이 지난 약이 아니라면 약 자체는 복용이 가능한 상황이라고 볼 수 있습니다. 다만 약을 임의로 시작하고 중단하는 것은 치료에 도움이 되지 않기 때문에 의사의 지시에 따라 약을 중단하는 상황이 아니라면 가급적 처방대로 복용하시기를 권해드립니다.

입안 볼쪽에 오돌토돌한게 났어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베체트병으로 진료를 받고 계신 상황이므로 구강 내 병변이 사라지지 않고 2개월 넘게 지속되는 상황도 해당 병원을 방문하여 추가진료를 받아보시기를 권해드리고 싶습니다. 희귀질환이다보니 이비인후과보다는 베체트병을 보시던 병원이 더 정확할 것이라 예상됩니다.

겨드랑이 옆 양쪽팔뚝에 이유를 알 수 없는 빨간선이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다.

피부병변부위에 스테로이드 연고를 바르면서 경과를 지켜보셔도 괜찮을 것으로 생각합니다.그러면 없어질것 같습니다

스테로이드 말고 어땀한 주사 있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의사마다 경험치가 다르니 그 선생님이 어떤 주사까지 가능하실 지 모릅니다. 집 근처에서 다른 병원들을 찾아서 다른 치료들을 해보시는 것도 좋습니다.

진료과 문의드려요 그리고 상담 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장은 검사를 이전에 받지 않으셨다고 하면 전립선과 함께 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 신경과도 진료 받아보셔요

고환 피지낭종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자꾸 손대지 않으시는것이 좋겠습니다. 손대면 염증이 생겨서 커지기도 합니다. 그냥 그대로 있거나 작아지기도 합니다

배변후 변 새어나옴,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변실금이나 변비로 인한 잔변이 남아 있을 가능성이 있습니다. 항문외과 진료를 보고 있다면 소화기내과 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

발쪽에 모세혈관들이 빨갛게 보이는데 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모세혈관이라고 합니다. 이 정도는 정상적인 소견이 맞습니다. 이번에 사진을 찍어놓으셨으니 나중에 혹시 더 두드러지는지는 비교해 보시면 좋겠습니다.

충수염 수술후 통증은 어느정도인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 직후에는 통증이 심하므로 무통 주사 등을 사용하기도 하고 진통제를 사용하여 적극적으로 조절합니다. 24시간 이후부터는 통증이 많이 사라집니다.

선생님질문있습니다.,안녕하세요 요약 1. 식도궤양이 아니라 항문궤양인가요? 2. 좌욕을 한다고 오랜 시간 쪼그려 앉아 있을 경우 3. 오히려 항문 혈관의 압력이 증가하거나 치열 부위 상처가 덧날 수 있습니다. 좌욕을 하면 항문 조임근이 이완돼 항문압이 낮아지고 괄약근 주변 혈액순환이 활발해져서 치질 증상 완화에 도움이 되지만 따뜻한 물을 받아 엉덩이를 오래 담그는 행위로는 치질 질환 예방에 전혀 도움이 되지 않습니다. 오랜 시간 쪼그려 앉아 있을 경우 항문 혈관의 압력이 증가하거나 치열 부위 상처가 덧날 수 있습니다. 일반 샤워기를 이용해 물살이 세지 않게 조정한 다음 체온과 비슷한 37.3도의 온도로 항문 주변을 마사지해주는 것이 좋으며 좌욕 후에는 물기가 남아있지 않도록 완벽하게 건조해야 항문소양증 같은 2차 항문질환을 예방할 수 있습니다. 건승하세요

피임약 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약 복용 여부가 명확하지 않다면 2정을 복용한 것은 문제가 되지 않습니다. 피임 효과는 유지가 되므로 걱정하지 않아도 됩니다.

피임약 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약 복용 여부가 명확하지 않다면 2정을 복용한 것은 문제가 되지 않습니다. 피임 효과는 유지가 되므로 걱정하지 않아도 됩니다.

심장초음파,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장초음파 소견이군요. 정상적인 심장의 크기를 가지고 있으며 심장 벽의 두께도 정상입니다. 좌심실의 수축 기능도 정상적이지만 좌심실의 이완기능에 이상이 발견되었습니다. 우심실이나 심방은 정상이고 판막 기능도 거의 정상적이라 보입니다. 따라서 좌심실의 이완기능 문제에 대한 추가적인 상담이 필요할 것이니 내과를 방문해보시면 되겠습니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 탈장 수술로 인해 정관이 손상이 되었을 가능성 은 없어 보입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

경구피임약 먹고 여드름이 심해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약은 여성호르몬

을 조절하여 다낭성난소증후군의 증상을 완화시키는 효과가 있습니다. 하지만 경구피임약은 사람마다 반응이 다르기 때문에 일부에서는 여드름이 심해질 수 있습니다. 만약 야를 먹고 여드름이 심해졌다면 다른 경구피임약을 처방받거나 경구피임약을 끊고 다른 방법으로 다낭성난소증후군을 치료하는 것이 좋습니다.

아스퍼질러스 알려지가 뭔가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아스퍼질러스는 일종의 곰팡이균입니다. 아스퍼질루스는 어디에나 존재할 수 있어 이에 대한 알러지 반응이 있다면 회피 요법이 가장 도움이 됩니다.

당뇨약 저혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복용 중인 당뇨약은 저혈당은 흔히 유발하지 않는 약입니다. 하지만 명확한 저혈당이 있다면 약제 복용을 중단하고 담당의와 상의하기 바랍니다.

사신의 부위에 찌릿한 통증이 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육통 가능성이 높습니다. 충분한 휴식을 취하고 진통소염제를 복용해 보시기 바랍니다. 만약 호전이 없다면 진료가 필요합니다.

Nsaid 계열이 아닌 생리통 약을 찾아요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 그 두성분은 엔세이드성분이 없습니다. 아세트아미노펜 계열은 상관 없으니 드시면 될 것 같습니다. 이상입니다 .안녕하세요. 메디이즈입니다. 12346789111314 같이 드시고요 나머지는 중복되는것이 너무 많습니다. 멀티 비타민은 지금 겹칩니다. 철분과 아연도 다른것에 포함되어 있으니 안드셔도 될 것 같습니다. 이상입니다.

약간 불안장애? 강박증 같은게 있는거같은데 이게 좀 심해져요 ...안녕하세요. 메디이즈입니다. 본인이 불편감을 자각하고 있고 일상생활에 지장이 있다면 정신건강의학과 진료를 보는 것이 바람직한 판단으로 생각됩니다. 예정대로 진료를 보시기 바랍니다

약간 불안장애? 강박증 같은게 있는거같은데 이게 좀 심해져요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 본인이 불편감을 자각하고 있고 일상생활에 지장이 있다면 정신건강의학과 진료를 보는 것이 바람직한 판단으로 생각됩니다. 예정대로 진료를 보시기 바랍니다.

오늘 갑자기 피부가 간지럽고 이렇게 되었어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 접촉성 피부염 또는 급성 두드러기로 보입니다. 항히스타민제 복용이 도움이 되므로 진료를 보거나 약국에서 구매하여 복용하기 바랍니다.

심실조기탈분극 부정맥 문의 드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심실조기탈분극 부정맥은 심장 박동이 불규칙하게 뛰는 증상입니다. 보통은 심각한 증상을 유발하지 않지만 심한 경우 심장마비나 돌연사를 일으킬 수 있습니다. 심실조기탈분극 부정맥은 약물치로나 수술로 치료할 수 있습니다. 올초 홀터 2회각 3박4일 시 0.1 미만으로 진단받았다면 심실조기탈분극 부정맥의 증상이 심하지 않은 것으로 보입니다. 하지만 증상이 심해졌다면 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 의사는 심전도 검사를 통해 심실조기탈분극 부정맥의 정도를 확인하고 약물치로나 수술이 필요한지 결정할 것입니다. 심실조기탈분극 부정맥은 심각한 질환이 아니지만 증상이 심해진다면 심장마비나 돌연사를 일으킬 수 있습니다. 따라서 증상이 심해지거나 걱정되는 경우에는 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

약성분 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실제 진료를 보지 않고 의약품을 복용하는 것은 매우 위험한 행위입니다. 따라서 상기 약들은 복용하지 않기를 강력히 권고합니다.

자다가 일어났는데 복부 통증이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 원인을 알기 어렵지만 치킨을 많이 먹었다면 그것이 원인일 수 있습니다. 일단 금식하시고 좋아질때까지 기다려야 하는데 심하면 진료받아보셔야 합니다

감기약 부작용 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러 감기약을 처방받으셨고 약 복용 후 부터 두근거림과 숨찬 증상이 나타났다면 우선 약을 중단하시고 병원을 바로 방문하여 확인하시는 것이 안전합니다. 진료가 끝나기 전 방문해보시기 바랍니다.

가슴 통증흉통이 지속되고 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기침하다가 생긴 통증이 있으시고 엑스레이에서 이상이 없고 하면 추가적으로 검사는 더 필요할 것 같지는 않습니다.

심장초음파,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장초음파 소견이군요. 정상적인 심장의 크기를 가지고 있으며 심장 벽의 두께도 정상입니다. 좌심실의 수축 기능도 정상적이지만 좌심실의 이완기능에 이상이 발견되었습니다. 우심실이나 심방은 정상이고 판막 기능도 거의 정상적이라 보입니다. 따라서 좌심실의 이완기능 문제에 대한 추가적인 상담이 필요할 것이니 내과를 방문해보시면 되겠습니다.

이거 켈로이드인가요 라는 질문을 보낸 사람입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 좀 지켜보셔야 할 것 같습니다. 원래 켈로이드가 생기는 체질이 아니라면 크게 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다. 좋아지는데 시간이 좀 걸릴것 같습니다

매독 판독결과 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. RPR 검사는 매독을 스크리닝할때 하는 대표적인 검사로 non reactive로나왔는데 매독 판결 결과는 음성을의미합니다.

이거 켈로이드 된건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에 아직 켈로이드라고 이야기하기는 어려울 것 같습니다. 부위는 어디인가요? 찢것은 얼마나 오래되었나요?

고,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치매일 가능성은 없습니다. 아마도 다른 것에 더 집중하다가 보니 덜 중요하다고 생각되는 부분은 놓친것이 아닌가 싶습니다 계속되거나 더 심해지면 진료 받아보셔요

HIV 초기증상 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. HIV는 혈액이나 체액을 통해 전염되는 질환입니다. 성관계를 통해 HIV에 감염되면 보통 24주 후에 초기증상이 나타납니다. 초기증상은 발열 기침 인후통 근육통 피로감 두통 설사 구토 피부발진 등이 있습니다. 하지만 HIV 초기증상은 감기나 독감과 비슷한 증상이어서 HIV에 감염되었다는 것을 알아차리기가 어렵습니다. HIV에 감염되었다면 4주 6주 12주 간격으로 항원항체 검사를 받아야 합니다. PEP는 HIV 감염을 예방하기 위한 약물입니다. PEP는 관계 후 72시간 이내에 복용해야 효과가 있습니다. PEP를 복용하면 HIV 감염을 예방할 수 있지만 100 효과가 있는 것은 아닙니다. PEP를 복용한 후에도 4주 6주 12주 간격으로 항원항체 검사를 받아야 합니다.

채용 신체검사에 관련하여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 이 사실을 신검전에 이야기 해보세요. 신검시 하는 검사는 정밀검사가 아닌 rpr검사를 하게 되는데 완치되었으면 여기서 음성으로 나올 수도 있어요. 정밀검사에서는 양성으로 나올겁니다

경구피임약 먹고 여드름이 심해졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구피임약은 여성호르몬을 조절하여 다낭성난소증후군의 증상을 완화시키는 효과가 있습니다. 하지만 경구피임약은 사람마다 반응이 다르기 때문에 일부에서는 여드름이 심해질 수 있습니다. 만약 야를 먹고 여드름이 심해졌다면 다른 경구피임약을 처방받거나 경구피임약을 끊고 다른 방법으로 다낭성난소증후군을 치료하는 것이 좋습니다.

정신과 약때문에 성관계시 쾌감이 안느껴지는걸까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정말 고민 많으시지요? 약에 대한 부작용은 개인차가 심합니다. 약의 영향이 있을 수도 있는데 주치의 선생님과 약 변경에 대하여 상의 가 필요할 것 같습니다

무릎관절염 운동,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인터넷에 QSE라고 찾아보시면 되겠습니다. 기본적으로 하실 운동입니다. 그리고 쉽게 생각하셔서 좀 불편하시면 운동량을 줄이고 괜찮을

때는 늘려서 근력을 키우시면 되겠습니다. 감사합니다.

임태기 내일 써도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리임태기는 보통 열흘정도는 지난 다음에 사용하는 것이 원칙입니다. 너무 일찍하시는 것은 별 도움이 되지 않을 수 있습니다 발목 뼈 소리 후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절보다는 힘줄의 문제로 소리가 나는 경우가 많으며 인대가 파열되거나 하는 경우는 드뭅니다. 통증이 오랜 기간 지속되면 인대 손상의 가능성도 있습니다.

감기약 부작용 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러 감기약을 처방받으셨고 약 복용 후 부터 두근거림과 숨찬 증상이 나타났다면 우선 약을 중단하시고 병원을 바로 방문하여 확인하시는 것이 안전합니다. 진료가 끝나기 전 방문해보시기 바랍니다.

심장초음파,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장초음파 소견이군요. 정상적인 심장의 크기를 가지고 있으며 심장 벽의 두께도 정상입니다. 좌심실의 수축 기능도 정상적이지만 좌심실의 이완기능에 이상이 발견되었습니다. 우심실이나 심방은 정상이고 판막 기능도 거의 정상적이라 보입니다. 따라서 좌심실의 이완기능 문제에 대한 추가적인 상담이 필요할 것이니 내과를 방문해보시면 되겠습니다.

남성기 붓기 심해지고 가렵습니다 제발 답변부탁 드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로 볼 때 상세불명 원인의 알려지로 보여집니다. 물론 판단이 틀릴 수는 있습니다. 알러지의 경우 약물이나 평소 잘못된 습관 또는 다른 수만가지의 원인이 있기에 상태를 보고 원인을 추정하기는 힘들며 일단은 GP 선생님과 의논하여 항히스타민이나 필요시 스테로이드 제제 사용에 대해서 의논을 해보시기 바랍니다. 참고 하십시오.

자궁 하수 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 진단은 직접진료를 해야 내려집니다만 자궁하수 3기이면 수술을 원치않고 폐사리를 넣는 방법도 있습니다. 하지만 이것은 수술이 불가능한 경우노령이라든지 이러한경우에 적응증이 됩니다. 주기적으로 꺼내서 소독도 해야되며 불편한 점이 많다는 사실을 아셔야 합니다. 수술이 꺼려진다면 이런 방법도 있습니다.

귀 통증 먹먹함 이명 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀가 먹먹한 원인은 굉장히 다양하기 때문에 증상만 가지고서는 판단이 어렵습니다. 가까운 이비인후과 방문하셔서 귀 상태 확인하고 필요하면 청력검사 등 다른 검사들을 해보고 판단 받아 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 산부인과 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자세한진단은 병원에 내원하셔서 std검사를 받아보세요.. 정확한 진단이 나와야 치료가 가능합니다. 질염일 가능성이 높아보입니다.

콧대와 콧볼이 너무 넓어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 코볼이 넓은 거도 하나의 개성입니다 그러나 그 점이 너무 스트레스가 된다면 수술받는 것도 좋을 듯 합니다. 수술 후 코막힘이 더 심해질 수 있으니 술 전 이비인후과 의사와 상의하세요

편도 종물 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 크게 걱정할 필요가 없습니다 단지 걱정이 너무 커지면 그 자체로 스트레스가 많이 될 수 있으니 수술로 그 부위를 제거하는 것도 고려해보세요

코막힘,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 답답함이 전해집니다. 제일 좋은 방법은 사시사철 따뜻한 동남아시아로 가는 방법입니다. 에어컨바람을 피하고요 따뜻한 물로 코세척을 하루에 3번이상하는 것도 추천드립니다.

항문 안쪽에 뭐가 났습니다..사진,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원 안에 보이는 부분은 그냥 늘어진 섬유화된 조직으로 치핵치질은 아닙니다. 다만 나이들어감에 따라 조금씩 더 늘어질 수는 있습니다. 밖으로 돌출되는 정도가 된다면 제거를 고려해 보시기 바랍니다. 감사합니다.

치루절개술 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료 했던 의사가 아니라고 했다면 아닐 가능성이

높지만 만약 농양이라면 며칠 내로 점차 통증과 부종이 심해지게 될 것이므로 만약 증상이 심해진다면 다시 진료를 받아 보시기 바랍니다. 감사합니다.

저기 머하나 여쭙볼게요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 소변보면서 불편한 증상 통증 잔뇨감 빈뇨가 동반되면 방광염의 가능성이 높으니 가정의학과 방문하셔도 되고 배뇨 증상이 없으면 비뇨의학과 방문해보셔요

여기저기 염증이 생겼는데 어느과를 가야 하나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알레르기에 의해 결막염 비염 피부염이 발생한것으로 생각됩니다. 여러 과를 보기 어려우면 내과나 가정의학과를 방문하세요. 전체적으로 함께 진료가 가능합니다.

서해부 감각 이상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리의 문제와 살인대 주변의 진찰소견이 중요합니다 이상지각성대퇴신경통이라는 질환이 있으니 검색해서 증상을 느끼는 부위가 비슷한지 확인해 보시기 바랍니다. 가까운 곳의 신경통증관련 병원을 가시면 됩니다.

고,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흡연한지는 얼마나 되셨나요? 이제 부터라도 금연하시는 것이 좋을 것 같습니다. 폐렴에서 폐암으로 발전되지는 않습니다.

코콜이를 고칠수 있는 방법이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 상태를 알기위해서는 수면 다원 검사가 필요합니다. 검사 결과에 맞추어서 어떤치료가 필요할지 결정하시는 것이 좋겠습니다

조영제가 몸에 쌓였는지 검사받을수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제는 영상진단 검사 시 특정 조직이나 혈관이 잘 보이도록 인체에 투여하는 약물로 MRI에는 가돌리늄을 CT에서는 요오드화물을 주로 사용합니다. 조영제 배출 시간은 다음과 같습니다. 대부분의 조영제는 24시간 이내에 90 이상이 소변으로 배출됩니다. 조영제 검사 후에는 물을 많이 마시는 것이 조영제의 배출에 도움이 됩니다. 검사하는 방법은 따로 없는것 같습니다

뇌mri 뇌ct 뇌mra,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌 MRI가 기본이 됩니다. 기억력의 저하는 대부분 뇌검사상 정상이 나오는 경우가 많으며 다른 검사보다 뇌 MRI의 가성비가 가장 좋다고 할 수 있습니다.

무통증 협심증도 존재하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없는협심증 경우도 있을 수는 있지만 비교적 드문일이고 심전도상 정상이고 지금 나이가 젊으니 가능성은 떨어져 보입니다 스트레스 같은 심리적인 이유일 수도 있습니다. 소화기 질환일수도 있구요

눈주변근육 조임,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자율신경 기능이상에 의한 증상이 맞습니다. 뒷목과 옆목 등 척추 주변 조직들이 교감신경을 쉽게 압박하며 자극된 교감신경의 기능이상으로 증상을 느끼는 표정근이나 눈 주변의 순환장애로 근육이 수축됩니다. 정확히는 뒷목의 두판상근이라는 근육에 대한 치료를 하게되고 저희 경우는 주사치료를 기본으로 도수치료 등을 병행하는 경우가 많습니다.

허리디스크 주사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 증상이 없고 괜찮으시다고 하면 이전에 한번밖에 맞지 않은것이 문제가 되지는 않습니다. 다시 증상이 나타날 수 있으니 체중은 좀 줄이시는 것이 좋겠습니다

심장이 꿀렁거립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장이 꿀렁거림 증상이 반복되고 지속되거나 악화 된다고 하면 이것은 스트레스 때문에 나타나는 경우도 있지만 부정맥은 없는지 진료가 필요할 수 있습니다

협심증이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생활 습관이 불량했다고 해도 2년만에 협심증이 발생할 정도의 동맥경화가 진행되는 경우는 흔하지 않습니다. 증상이 없다면 너무 걱정하지 않아도 됩니다.

건강 악화?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두통과 동반되어 호흡의 불편 목 이물감 손발저림 모두 해당 기관의 순환장애에 기인하는 것으로 짐작됩니다. 자율신경계치료 또는 스넬피치료 등을 표방하는 병원을 찾으시면 쉽게 같이 치료될 수 있습니다.

위내시경 결과에 따른 질문이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로 암으로 진행할 가능성이 없는 위저선 용종일 경우 조직검사를 하지 않는 경우가 많습니다. 검사 결과에 대하여 담당의에게 문의를 하기 바랍니다.

피지낭종 짜낸 환자,안녕하세요. 메디이즈입니다. 7월까지 버티실수 있으면 버티셔도 되지만 염증이 생기면서 붓고 많이아프면 항생제 복용이 필요할 수 있습니다. 학교병원이라도 가보시는 것이 좋을 것 같습니다

코에 뭐가 올라왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 함께 농양이 합병된 것인데 항생제 복용 및 배농이 필요할 수 있습니다. 손으로 만지지 말고 진료를 보시기 바랍니다.

기운빠지고 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럽고 쓰러질것 같은 느낌이 들는 것은 미주신경성 실신일 가능성이 있습니다. 오래 섰었거나 답답한 상황에서 나타날 수 있는데요 그런 전조증상이 있으면 최대한 자세를 낮추고 머리에 혈액순환이 돌게 해줘야 호전됩니다. 만약 이런 증상과 거리가 멀고 기운빠지고 어지러운 증상이 지속된다면 신경과 진료를 보시는 게 좋겠습니다.

흉부 답답함과 소화불량 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 통증일 수도 있지만 증상이 지속된다면 협심증이나 역류성 식도염과 같은 질환에 대한 평가가 필요하므로 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

역류성 식도염이 잘 개선되고 있는 지 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 식도염의 증상이 없다면 약물 치료는 필요하지 않습니다. 경미한 증상이 있다면 약물 치료 효과가 크지 않으므로 현재처럼 생활 습관 조절을 하면서 좀 더 지켜보아도 됩니다.

성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도앞부분에 덩어리진게 있어서 짜봤는데 피가 나오진않고 하얀색 찌꺼기만 나왔군요. 다양한 가능성으로 피부과 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

외측복사의 골절진단을받았습니,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 어느 정도인지는 모르나 피명이 들 수 있으며 자세한 건 CT 찍어보시는 걸 추천드립니다. 확실한 진단 후에 운동 여부는 정해야 하지 않을까 싶습니다. 부족한 답변 송구합니다.

비뇨기과 선생님 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀드리기 조심 스럽지만 보기로는 성기 사마귀가 의심됩니다. 비뇨기과 진료 받아보श्य. 암은 아닌것 같습니다

콘돔 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 걱정이 된다면 24시간 이내 사후 피임약을 복용하는 것이 가장 효과적입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

피부질환 연구사용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변이 완전히 없어지고 하루이틀 더 발라주 시면됩니다. 약은 많이 바르면 효과는 더 올라가지않고 부작용의 가능성이 높아집니다

사타구니 가려움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사타구니의 가려움이 만성적인 가려움이 있다면 습진일 수도 있지만 사타구니 백선 가능성을 고려해야 합니다. KOH 등 검사를 받아 보시기 바랍니다.

허벅지 뒤편 안쪽에 뭐가 뿔룩 튀어 나왔습니.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프절 가능성

이 높지만 피하 결절 등이 다른 질환에 대한 감별이 필요하므로 상기 병변에 대하여 초음파 검사가 필요합니다.

뇌mri 뇌ct 뇌mra,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌 MRI가 기본이 됩니다. 기억력의 저하는 대부분 뇌검사상 정상이 나오는 경우가 많으며 다른 검사보다 뇌 MRI의 가성비가 가장 좋고 할 수 있습니다.

피임약 중단 후 생리 주기는 어떻게 되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약을 중단 하게 되면 다시 생리가 발생하게 되고 이후 일시적으로 생리 주기가 불규칙할 수 있습니다. 이후 시간이 지나면 이전의 생리주기로 돌아오게 됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

몸이 무기력하고 숨이 차고 불편합니다.증상좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상을 보면 족저근막염으로 인한 활동부족으로 운동부족과 근력저하 때문인거 같아요 특히 수면부족으로 인한 피로감은 스트레스와 신경과민반응을 유발할 수 도 있어요. 먼저 휴식을 충분히 하시고.. 가벼운 운동을 하면서 체중조절하는게 도움이 될 것 같습니다. 그전에 혹시 폐색전증과거력이 있으니.. 다시 호흡기내과에서 검사를 받아보는 것이 좋겠습니다.

성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요도앞부분에 덩어리진게 있어서 짜봤는데 피가 나오진않고 하얀색 찌꺼기만 나왔군요. 다양한 가능성으로 피부과 내원하셔서 정확한 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

서혜부 감각 이상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리의 문제와 살인대 주변의 진찰소견이 중요합니다 이상지각성대퇴신경통이라는 질환이 있으니 검색해서 증상을 느끼는 부위가 비슷한지 확인해 보시기 바랍니다. 가까운 곳의 신경통증관련 병원을 가시면 됩니다.

사랑니 발치 후 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약은 작용기간이 있기에 하루 2번 복용하는 약은 아침 저녁으로 복용하느게 가장 좋습니다. 만약 점심식후에 복용한다면.. 저녁약을 조금 늦게 늦추는 방법이 있겠네요. 위장약이 있어서 아침 공복시에 먹어도 크게 문제는 없겠지만 되도록이면 식후에 복용하는게 좋겠습니다.

손톱 쪽 살 붓고 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 정보만으로 환자 상태를 객관적으로 평가할 수 없지만 손톱 주변 염증 가능성이 높아보입니다. 증상 지속시 피부과 진료 권유합니다.

인중 봉합 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증 여부와 염증 상태에 따라 달라질 수 있는 부분입니다. 실제 염증이 심하다면 봉합사 제거가 늦어질 수 있습니다

오늘 너무 배부르게 먹고나서요...,안녕하세요. 과식을 하게되면 위가 팽창되면서 상부에 있는 폐를 누르기 때문에 숨을 쉬는것이 불편할수 있습니다. 게다가 과식을 하면 위장계에 무리를 주어 소화불량 복부팽만 등의 증상이 나타날수 있습니다. 과식을 하는 습관을 줄이는것이 좋고 게다가 야식은 더더욱 증상을 악화시킵니다. 반복되면 역류성식도염을 유발하게 될 겁니다. 건승하세요

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식을 한것으로 인해 샤워하고 못 주무실 이유가 없습니다. 단 과식을 하셨다면 위식도 역류등의 가능성이 있어 최소한 23시간 후 주무시기를 권유합니다

손톱 끝 살이 붓고 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조갑주위에 자극성 피부염이 생기는 것 같습니다. 손대지말고 스테로이드 연고 발라주세요. 시간이 지나면서 더 붓고 고름이 잡히면 조갑주위염을 의심할 수 있습니다.

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 많은 양으로 과식을 하다

보니 위가 늘어나며 불편함을 느꼈을 가능성이 높아보입니다. 단 크게 문제되지는 않을듯합니다

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 과식을 하게되면 위가 팽창되면서 상부에 있는 폐를 누르기 때문에 숨을 쉬는것이 불편할수 있습니다. 게다가 과식을 하면 위장계에 무리를 주어 소화불량 복부팽만 등의 증상이 나타날수 있습니다. 과식을 하는 습관을 줄이는것이 좋고 게다가 야식은 더더욱 증상을 악화시킵니다. 반복되면 역류성식도염을 유발하게 될겁니다. 건승하세요

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배가 너무 부르면 숨이 차고 심장도 아플 수 있습니다. 이는 배에 가스가 차서 압박을 받기 때문입니다. 대변을 보면서 가스를 배출하고 나면 증상이 나아질 것입니다. 불안장애로 인해 걱정되는 것은 충분히 이해합니다. 하지만 너무 걱정할 필요는 없습니다. 위치로 심박수를 재보면 괜찮게 나오는 것을 보니 건강에 문제가 없다는 것을 알 수 있습니다. 이따가 샤워를 하고 자도 괜찮습니다. 다만 샤워를 너무 오래 하지 않도록 주의하세요. 그리고 샤워 후에는 따뜻한 차를 마시고 푹 쉬면 됩니다. 불안장애가 심한 경우에는 약을 늘리는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 하지만 약을 늘리기 전에 의사와 상담을 하는 것이 좋습니다. 건강을 잘 챙기시길 바랍니다.

광대핀은 시간이 지나도 계속 ct에 보이나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. CT컴퓨터 단층촬영 영상에서 금속 핀은 시간이 지나도 계속 선명하게 보입니다. 핀 주변에 뼈가 자라는 과정은 CT 영상에 큰 영향을 미치지 않습니다.

소변보고 나서 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변을 자주보고 소변볼때 하복부 통증이 느껴진다면 방광염이 의심되네요 방광염으로 경구항생제 복용하는게 좋겠네요.

피부 발진습진?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 카텐 연고는 항진균제로 곰팡이 습진이 아니라서 효과가 없는거 같네요 다른 원인으로 알레르기성 피부염일 가능성이 있어보입니다. 자세한 것은 피부과 진료를 보시고 알맞은 약을 처방받는게 좋겠어요.

일광화상썬변 딱지인지 대상포진인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일광화상으로든 저런 병변이 가능합니다. 일광화상은 햇빛에 과도하게 노출되었을 때 피부가 붉어지고 따끔거리는 증상이 나타나는 질환입니다. 일광화상이 심해지면 물집이 생기고 물집이 터지면서 딱지가 생길 수 있습니다. 딱지는 보통 23주 정도 지나면 자연스럽게 떨어집니다. 대상포진은 수두 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 피부에 물집이 생기고 통증이 동반됩니다. 대상포진은 면역력이 떨어진 사람에게 주로 발생합니다. 대상포진은 피부뿐만 아니라 신경에도 영향을 미칠 수 있습니다. 대상포진이 의심되는 경우 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

음낭 습진 때문에 너무 괴롭습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음낭 습진은 피부염의 일종으로 피부가 붉어지고 가렵고 진물이 나며 딱딱해지는 증상을 보입니다. 음낭 습진은 원인이 다양하며 치료는 원인에 따라 다르게 진행됩니다. 비뇨기과에서 진료를 받았는데 성병이나 균이 없고 습진이라고 진단을 받았다면 피부과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 피부과에서 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받으면 음낭 습진을 완치할 수 있습니다. 또한 음낭 습진은 생활습관을 개선하는 것도 도움이 됩니다. 습한 환경을 피하고 짝 끼는 옷을 피하며 자극적인 음식을 피하는 것이 좋습니다.

보건증 발급 항문 검사 과정에서,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문에 면봉을 넣는 과정에서 무서워가지고 좀 비비면서 면봉을 넣었는데 그때 이후부터 좀 아프군요. 항문외과 내원하셔서 정확한 진료를 한번 받도록 하십시오.

아나필락시스도 가족력을 타나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스는 특정 물질에 대해 몸에서 과민 반응을 일으키는 것으로 유전적인 요소가 있을 수 있으며 가족력이 있는 경우 발병 가능성이 높아질 수 있습니다. 아나필락시스 발생 확률을 정확히 제시하기는 어려운데 그 이유는 다음과 같습니다. 가족력 외에도 알레르기 항원의 종류 노출 경로 개인의 면역 상태 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 아나필락시스 발생률에 대한 대규모 역학 연구 자체가 부족합니다. 가족력이 있더라도 표현형발현 여부에 차이가 있어 정확한 위험도 산출이 어렵습니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서 에피네프린에피네프린 자가주사기이 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야 합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 빨리 응급실로 가야 합니다 에피네프린 주사를 비급여로 처방받으실 수 있습니다 에피네프린을 투여했을 때 치명률은 0.25 미만이지만 투여하지 않으면 35의 높은 치명률을 보입니다. 따라서 에피네프린 주사는 생명을 구할 수 있는 가장 중요한 응급치료입니다.

코 연골? 부분 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부에 붙어지고 부어오른 병변이 보인다면 말씀하신대로 피부염과 같은 피부질환일테고 그렇지 않다면 연골이나 연조직에 발생한 염증반응을 의심할 수 있을텐데 원인을 알아내려면 진찰이 필요한 상황으로 보입니다. 무언가 보이지 않는다고 하셨으니 우선은 이비인후과를 방문해보시기 바랍니다.

에피네프린이 없으면 어떻게되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서 에피네프린에피네프린 자가주사기이 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야 합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 비급여로 처방받으실 수 있습니다

항문 고환 귀두 통증 중첩적인 통증 인데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문통증이 심한경우 치질에다가 치열이 같이 있을때 오게 되는데요. 일단 항문외과에 방문하여 상태를 확인해보시는게 좋겠습니다. 전립선염도 성기 주변에 불편감을 주고 배뇨 불편감도 발생하는데 성기쪽 통증이 있다면 비뇨기과에 다시 방문하여 진찰받아보세요.

소변보고 나서 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 소변을 자주보고 소변볼때 하복부 통증이 느껴진다면 방광염이 의심되네요 방광염으로 경구항생제 복용하는게 좋겠네요.

하안검 지방이식 관련입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈종은 시간이 지나면 자연 흡수되고 분해될수가 있는데 굳어져 자리를 잡은 상태라면 시간이 좀 많이 필요할 수 있습니다. 의사 말대로 상황을 지켜보고 기다려봐야겠네요

일광화상췌변 딱지인지 대상포진인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일광화상으로든 저런 병변이 가능합니다. 일광화상은 햇빛에 과도하게 노출되었을 때 피부가 붉어지고 따끔거리는 증상이 나타나는 질환입니다. 일광화상이 심해지면 물집이 생기고 물집이 터지면서 딱지가 생길 수 있습니다. 딱지는 보통 23주 정도 지나면 자연스럽게 떨어집니다. 대상포진은 수두 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 피부에 물집이 생기고 통증이 동반됩니다. 대상포진은 면역력이 떨어진 사람에게 주로 발생합니다. 대상포진은 피부뿐만 아니라 신경에도 영향을 미칠 수 있습니다. 대상포진이 의심되는 경우 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

견과류 칼륨수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 견과류를 물에 불려 삶아내면 칼륨이 물에 씻겨 나갈 수 있는데요 아몬드의 삶기 전 후의 칼륨 수치에 대한 정확한 자료가 나와 있지 않아 땅콩과 은행을 기준으로 공유드리오니 참고부탁드리겠습니다. 땅콩 100g 볶은것 799mg 말린것 746mg 소금첨가삶은것 180mg 칼륨 양 볶은것 대비 22 수준. 은행 100g 생것

684mg 삶은것 442mg 생것 대비 64 수준 삶은 후 35 감소 출처 농식품 올바로 감사합니다. 김혜경 드림

사랑니 발치 후 약,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약은 작용기간이 있기에 하루 2번 복용하는 약은 아침 저녁으로 복용하느게 가장 좋습니다. 만약 점심식후에 복용한다면.. 저녁약을 조금 늦게 늦추는 방법이 있겠네요. 위장약이 있어서 아침 공복시에 먹어도 크게 문제는 없겠지만 되도록이면 식후에 복용하는게 좋겠습니다.

에피네프린이 없으면 어떻게되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서 에피네프린에피네프린 자가주사기이 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야 합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 비급여로 처방받으실 수 있습니다

산부인과 의사분들은 배란이 언제 된 건지 알 수 있나요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 산부인과 의사들은 여성의 배란일을 몇 가지 방법으로 판단할 수 있습니다. 월경 주기 관찰 일반적으로 월경 주기의 14일 전후로 배란이 일어납니다. 규칙적인 주기를 가진 경우 이를 토대로 대략적인 배란일을 예측할 수 있습니다. 기초체온 측정 배란 후 체온이 약간 상승하므로 매일 아침 체온을 측정하여 체온 상승 시점으로 배란일을 판단합니다. 자궁경부 점액 관찰 배란 무렵에는 자궁경부에서 액체 점액이 분비되는데 이를 관찰하여 배란일을 추정합니다. 호르몬 검사 배란 시기에 에스트로겐 LH황체화호르몬 수치가 변하므로 이를 측정하여 배란일을 확인합니다. 초음파 검사 난소의 성숙 난포 크기 변화와 배란 과정을 초음파로 직접 관찰할 수 있습니다. 이러한 방법들을 종합적으로 활용하여 산부인과 의사들은 환자 개인의 배란일을 비교적 정확히 판단할 수 있습니다

에피네프린이 없으면 어떻게되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서 에피네프린에피네프린 자가주사기이 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야 합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 비급여로 처방받으실 수 있습니다

안와골절 수술 후 복시,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하벽과 내벽 동시 골절이면 수술은 꼭 하셔야 하는 게 맞습니다. 안와 골절 수술 후 복시가 새로 생기는 경우가 드물기는 하지만 있는데요 부은 외안근 때문 인듯 하네요. 지금은 별다른 치료나 처치가 경과를 바꿀수는 없고 그냥 기다려야 하는 수 밖에 없습니다. 수술 후 생긴 복시는 3달 까지는 회복이 되니까 조금 더 기다려 보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

알리오 올리오 다이어트중 먹어도 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 14kg 감량하시느라 정말 고생많으셨습니다. 파스타는 듀럼밀을 사용해 상대적으로 단백질이 높고 느끼게 흡수돼 혈당을 천천히 높인다고 알려져 있습니다. 평소에 어떤 식단을 드시며 다이어트를 하는지 몰라 정확한 답변은 어려우나 잡곡밥단백질 식단 정도로 한 끼를 구성하셨다면 한 끼정도 파스타로 대체해도 무리 없어보입니다.

요새 이런 뽀루지?비슷한게 피부에 많이 나는데 뭘까요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으로 보여주신 병변들은 피부묘기증과는 별개의 것이라 보입니다. 모낭염과 같은 피부염이 다수 관찰되는 상황이고 이것이 통증이나 미용적 불편감을 유발한다면 치료를 요한다고 볼 수 있습니다. 치료가 필요하시다면 가까운 피부과를 방문해 관리받아보시기를 권해드립니다.

망고알러지가 없는데 알러지가 있는것같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음식 알러지는 소화가 되면서 항원 단백질이 변성이 되므로 혈액검사 등을 통한 알러지 검사와 일치 하지 않을 수 있습니다.

hiv 키트로 자가 검사했는데 검사 시간이 지나서 나오는것도 양성반응인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. HIV 키트로 자가 검사를 했을 때 검사 시간이 지나서 나오는 선은 양성 반응이 아닙니다. HIV 검사 키트는 바이러스 항체를 검출하는 방식으로 검사 시간이 지나면 항체가 희석되어서 선이 약해질 수 있습니다. 따라서 HIV 검사 키트로 자가 검사를 했을 때 검사 시간이 지나서 나오는 선은 음성이라고 생각해도 됩니다. 다만 HIV 검사 키트는 정확도가 100가 아니기 때문에 정확한 검사 결과를 위해서는 병원에서 정밀 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

살인 안빠지는 체질 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다시 한번 전체적인 운동 프로그램이나 식단을 점검할 필요가 있겠습니다. 보통 식단에서 나타나는 문제가 많기 때문에 소스나 당이 높은 과일등도 조심해 주는것이 좋습니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육량 대비 체지방이 높으면 배 쪽으로 체지방이 쌓이는 경우도 있습니다. 아직 나이가 어리시기 때문에 운동을 꾸준히 하신다면 금방 뺄 수 있으니 크게 걱정 안 하셔도 될 거 같습니다

피임약 중단 후 생리 주기는 어떻게 되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약을 중단하게 되면 다시 생리가 발생하게 되고 이후 일시적으로 생리 주기가 불규칙할 수 있습니다. 이후 시간이 지나면 이전의 생리주기로 돌아오게 됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성접촉으로 인한 헤르페스 감염이 의심됩니다. 감염내과 진료를 보시고 항바이러스제를 처방받아 치료해보시는게 좋겠습니다.

보건증 발급 항문 검사 과정에서,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문에 면봉을 넣는 과정에서 무서워가지고 좀 비비면서 면봉을 넣었는데 그때 이후부터 좀 아프군요. 항문외과 내원하셔서 정확한 진료를 한번 받도록 하십시오.

hiv 키트로 자가 검사했는데 검사 시간이 지나서 나오는것도 양성반응인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. HIV 키트로 자가 검사를 했을 때 검사 시간이 지나서 나오는 선은 양성 반응이 아닙니다. HIV 검사 키트는 바이러스 항체를 검출하는 방식으로 검사 시간이 지나면 항체가 희석되어서 선이 약해질 수 있습니다. 따라서 HIV 검사 키트로 자가 검사를 했을 때 검사 시간이 지나서 나오는 선은 음성이라고 생각해도 됩니다. 다만 HIV 검사 키트는 정확도가 100가 아니기 때문에 정확한 검사 결과를 위해서는 병원에서 정밀 검사를 받아보는 것이 좋습니다.

안와골절 수술 후 복시,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하벽과 내벽 동시 골절이면 수술은 꼭 하셔야 하는 게 맞습니다. 안와 골절 수술 후 복시가 새로 생기는 경우가 드물기는 하지만 있는데요 부은 외안근 때문 인듯 하네요. 지금은 별다른 치료나 처치가 경과를 바꿀수는 없고 그냥 기다려야 하는 수 밖에 없습니다. 수술 후 생긴 복시는 3달 까지는 회복이 되니까 조금 더 기다려 보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

아나필락시스도 가족력을 타나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스는 특정 물질에 대해 몸에서 과민 반응을 일으키는 것으로 유전적인 요소가 있을 수 있으며 가족력이 있는 경우 발병 가능성이 높아질 수 있습니다. 아나필락시스 발생 확률을 정확히 제시하기는 어렵는데 그 이유는 다음과 같습니다. 가족력 외에도 알레르기 항원의 종류 노출 경로 개인의 면역 상태 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 아나필락시스 발생률에 대한 대규모 역학 연구 자체가 부족합니다. 가족력이 있더라도 표현형발현 여부에 차이가 있어 정확한 위험도 산출이 어렵습니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서 에피네프린에피네프린 자가주사기 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야

합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 빨리 응급실로 가야 합니다
에피네프린 주사를 비급여로 처방받으실 수 있습니다 에피네프린을 투여했을 때 치명률은
0.25 미만이지만 투여하지 않으면 35의 높은 치명률을 보입니다. 따라서 에피네프린 주사는
생명을 구할 수 있는 가장 중요한 응급치료입니다.

에이즈검사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나
관련없으니 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있
으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

요새 이런 뽀루지?비슷한게 피부에 많이 나는데 뭘까요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으
로 보여주신 병변들은 피부묘기증과는 별개의 것이라 보입니다. 모낭염과 같은 피부염이 다수
관찰되는 상황이고 이것이 통증이나 미용적 불편감을 유발한다면 치료를 요한다고 볼 수 있습
니다. 치료가 필요하시다면 가까운 피부과를 방문해 관리받아보시기를 권해드립니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진이 흐리지만 설염이 발생한 상태라 보입니다. 구내염이라
생각하시면 되겠고 시간이 지나면 호전될 것으로 예상되나 잘 나아지지 않고 지속되는 경우에
는 진료가 필요합니다. 이 때는 이비인후과를 방문해보시기 바랍니다. 통증 조절이 필요하다
면 약국에서 가글을 사서 사용해보시면 되겠습니다.

그러면 여성호르몬 분비가 안되는건가용?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 가지고 여
성 호르몬의 과분비를 의심하거나 할 수는 없습니다. 따라서 너무 걱정하지 않아도 되겠습니
다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

그러면 여성호르몬 분비는 안되는거죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 가지고 여
성 호르몬의 과분비를 의심하거나 할 수는 없습니다. 따라서 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다.
답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

요새 이런 뽀루지?비슷한게 피부에 많이 나는데 뭘까요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진으
로 보여주신 병변들은 피부묘기증과는 별개의 것이라 보입니다. 모낭염과 같은 피부염이 다수
관찰되는 상황이고 이것이 통증이나 미용적 불편감을 유발한다면 치료를 요한다고 볼 수 있습
니다. 치료가 필요하시다면 가까운 피부과를 방문해 관리받아보시기를 권해드립니다.

망고알러지가 없는데 알러지가 있는것같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음식 알러지는 소
화가 되면서 항원 단백질이 변성이 되므로 혈액검사 등을 통한 알러지 검사와 일치 하지 않을
수 있습니다.

망고알러지가 없는데 알러지가 있는것같습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음식 알러지는 소
화가 되면서 항원 단백질이 변성이 되므로 혈액검사 등을 통한 알러지 검사와 일치 하지 않을
수 있습니다.

안와골절 수술 후 복시,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하벽과 내벽 동시 골절이면 수술은 꼭
하셔야 하는 게 맞습니다. 안와 골절 수술 후 복시가 새로 생기는 경우가 드물기는 하지만 있
는데요 부은 외안근 때문 인듯 하네요. 지금은 별다른 치료나 처치가 경과를 바꿀수는 없고
그냥 기다려야 하는 수 밖에 없습니다. 수술 후 생긴 복시는 3달 까지는 회복이 되니까 조금
더 기다려 보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

아나필락시스도 가족력을 타나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스는 특정 물질에
대해 몸에서 과민 반응을 일으키는 것으로 유전적인 요소가 있을 수 있으며 가족력이 있는 경
우 발병 가능성이 높아질 수 있습니다. 아나필락시스 발생 확률을 정확히 제시하기는 어려운
데 그 이유는 다음과 같습니다. 가족력 외에도 알레르기 항원의 종류 노출 경로 개인의 면역
상태 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 아나필락시스 발생률에 대한 대규

모 역학 연구 자체가 부족합니다. 가족력이 있더라도 표현형발현 여부에 차이가 있어 정확한 위험도 산출이 어렵습니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서 에피네프린에피네프린 자가주사기 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야 합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 빨리 응급실로 가야 합니다 에피네프린 주사를 비급여로 처방받으실 수 있습니다 에피네프린을 투여했을 때 치명률은 0.25 미만이지만 투여하지 않으면 35의 높은 치명률을 보입니다. 따라서 에피네프린 주사는 생명을 구할 수 있는 가장 중요한 응급치료입니다.

에이즈검사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련없으니 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

음낭 습진 때문에 너무 괴롭습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음낭 습진은 피부염의 일종으로 피부가 붉어지고 가렵고 진물이 나며 딱딱해지는 증상을 보입니다. 음낭 습진은 원인이 다양하며 치료는 원인에 따라 다르게 진행됩니다. 비뇨기과에서 진료를 받았는데 성병이나 균이 없고 습진이라고 진단을 받았다면 피부과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 피부과에서 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받으면 음낭 습진을 완치할 수 있습니다. 또한 음낭 습진은 생활습관을 개선하는 것도 도움이 됩니다. 습한 환경을 피하고 꽉 끼는 옷을 피하며 자극적인 음식을 피하는 것이 좋습니다.

치과 신경치료 관련 문의입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 제가 그전에 아말감으로 떼운 부위가 좀 넓고 크게 있었는데 떨어져 나갔고 5개월쯤 지나 새로운 치과를 내원하였습니다. 그 부위가 아프진 않았고 씹을 때 음식물이 그 구멍으로 확 밀려가면 그 압력 때문에 잠시 아팠지 치통은 없었습니다. 오늘 치과에선 신경과 가깝게 있다고 신경치료를 하자고 하였고 이미 진행은 했지만 그 전까지 다니던 치과에선 떼워주었고 떼운 부분만 떨어져 나갔고 그 후에도 썩은 흔적과 통증도 없이 수개월을 지냈는데 신경과 근접하다고 신경치료를 할 수 있나요..? 이미 치료도 1차로 진행하였고 못믿는것도 아니지만 그래도 신경치료는 이를 죽여야 한다는 걱정과 불안함으로 여쭙어봅니다... 감사합니다. 이유없이 신경치료를 하지는 않습니다. 아마도 신경치료를 해야할 만큼 치아 상태가 좋지 않을듯 하구요 1차로 진행을 하셨으니 믿고 나머지 치료도 진행해보시는게 좋을 듯 합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 1형과 2형의 구분은 정확한 검사로 보통 몇만원할 것으로 사료됨 알 수 있고 1형 2형의 발생 부위의 경계는 이미 무너졌습니다. 포진은 피부에 물집이 생기는 병이고 때로는 세균으로도 가능합니다. 성적 접촉없이 발생하는 질환일 것이며 면역이 떨어졌을 때 환절기 특히 봄에는 포진이 좀 증가하는 경향입니다. 그래서 저는 증상에 따라 포진의 치료를 합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육량 대비 체지방이 높으면 배 쪽으로 체지방이 쌓이는 경우도 있습니다. 아직 나이가 어리시기 때문에 운동을 꾸준히 하신다면 금방 뺄 수 있으니 크게 걱정 안 하셔도 될 거 같습니다

다이어트 식단 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다이어트 목적의 식단이신 거 같네요. 식단의 경우 약간 공복감이 있을 것으로 보이기 때문에 식단 사이에 에너지를 채울 수 있는 바나나 견과류 등을 섭취해 주시는 것이 좋고 비타민이나 오메가3 수분 섭취도 충분히 해주시면 좋을 거 같습니다

운동직후 물을마시면 메스꺼워요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 순간적인 운동으로 인해서 일시적으로 메스꺼운 증상이 나타날 수 있습니다. 1015분 휴식을 취하신 뒤에 천천히 물을 섭취

하시는 것을 추천드립니다

요즘 웨이트 하는데 근육이 아파야 운동이 잘 된건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 운동 후 통증이 나타나는 것을 지연성근육통이라고 합니다. 근육이 성장하는 과정중 하나이기 때문에 운동에 적응 하시다보면 괜찮아 지실겁니다. 그리고 식단도 같이 병행해 주시면은 충분히 좋아질 수 있습니다

에이즈검사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 관련없으니 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

어머니 두드러기 쇼크 왜생긴걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인을 찾아보는 검사가 필요할 것 같습니다. 원인은 찾기 어렵습니다. 에피네프린 주사를 구비하고 계시는 것이 좋아요 아나필락시스는 급격하고 심각한 전신 알레르기 반응입니다. 주요 원인들은 다음과 같습니다 식품 알레르기 견과류 조개류 우유 달걀 등이 가장 흔한 원인입니다. 약물 알레르기 항생제 아스피린 진통제 등 다양한 약물이 원인이 될 수 있습니다. 곤충 독 벌 꿀벌 등의 독액에 과민반응이 생길 수 있습니다. 운동 운동유발 아나필락시스라고 하며 드물지만 격렬한 운동 중에 발생할 수 있습니다. 기타 원인 박테리아 감염 라텍스 한랭 등도 원인이 될 수 있습니다. 아나필락시스 발생 위험을 높이는 요인으로는 해당 알레르기 항원에 과거 노출된 적이 있는 경우 천식 등 알레르기 질환 병력 약물 복용 중인 경우 등이 있습니다. 또한 가족력이 있으면 유전적 소인으로 인해 발생 위험이 높아집니다.

망막박리 질문 몇 개,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 망막 박리 수술 하고 좌안 gas 넣었다는 말씀이신 듯 하네요. gas는 자연히 흡수 되니 후낭레이저 절개술 하자고 설명들었다는 말씀은 gas는 다 흡수되었다는 거 같습니다. 그리고 현재 유리체가 없는 상태이기 때문에 눈 앞 뒤쪽 모두 같은 액체로 차있기 때문에 별 상관 없습니다. 2. 유리체 건인력이 없어진 상태이기 때문에 웬만하면 열공이나 박리가 재발하진 않습니다 확률이 0은 아니지만 기름을 오래 눈에 두게 되면 물론 박리 발생 확률이 낮아지지만 그에 따른 합병증도 발생 가능하기에 보통은 적절한 시점에 제거수술을 받게 됩니다. 3. 심하지 않은 장애는 가능할 것도 같네요. 다만 좌안은 수술 받은 지 얼마 안되셔서 아직은 장애 판정이 힘들 거 같습니다. 보통 6개월 이상은 안정된 상태 유지 후 다시 한번 장애진단을 상의해보시는 게 좋겠습니다. 그 후에도 타 병원에서 받고 싶으시면 진료기록은 당연히 챙겨가시는 게 좋겠습니다.

아나필락시스도 가족력을 타나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스는 특정 물질에 대해 몸에서 과민 반응을 일으키는 것으로 유전적인 요소가 있을 수 있으며 가족력이 있는 경우 발병 가능성이 높아질 수 있습니다. 아나필락시스 발생 확률을 정확히 제시하기는 어려운데 그 이유는 다음과 같습니다. 가족력 외에도 알레르기 항원의 종류 노출 경로 개인의 면역 상태 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 아나필락시스 발생률에 대한 대규모 역학 연구 자체가 부족합니다. 가족력이 있더라도 표현형발현 여부에 차이가 있어 정확한 위험도 산출이 어렵습니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서 에피네프린에피네프린 자가주사기이 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야 합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 빨리 응급실로 가야 합니다 에피네프린 주사를 비급여로 처방받으실 수 있습니다 에피네프린을 투여했을 때 치명률은 0.25 미만이지만 투여하지 않으면 35의 높은 치명률을 보입니다. 따라서 에피네프린 주사는 생명을 구할 수 있는 가장 중요한 응급치료입니다.

아랫배 음부 쪽 흰색 물질같은게 났는데 뭘가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염이나 상

쳐 흉터로 보입니다. 가까운 피부과나 비뇨의학과 방문하여 진료보고 연고 도포하면서 지켜보
시고 자꾸 만지지 마십시오.

음경피부 염증질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 포경수술 봉합부위에 염증이 있는것 같습니
다. 성병검사에 이상 없다면 더튼 바르면서 경구약 복용하면 호전될겁니다.

에이즈검사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나
관련없으니 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있
으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

피부 발진습진?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 카텐 연고는 항진균제로 곰팡이 습진이 아니라
서 효과가 없는거 같네요 다른 원인으로 알레르기성 피부염일 가능성이 있어보입니다. 자세한
것은 피부과 진료를 보시고 알맞은 약을 처방받는게 좋겠어요.

성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성접촉으로 인한 헤르페스 감염이 의심됩니다. 감
염내과 진료를 보시고 항바이러스제를 처방받아 치료해보시는게 좋겠습니다.

혈액검사 결과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신성 당뇨의 위험성이 있을수 있어 식단관리가
중요해보입니다. 대부분은 검사에 이상이 없어보이는데.. CRP 염증수치가 높은게 몸에 염증
이나 감염이 있다는 뜻이므로 이에 대한 추가적인 검사나 치료가 필요해보입니다.

관계 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. HIV에 의한 초기 에이즈 증상은 36주 사이에 독감 증상
과 비슷하게 나타나게 됩니다. 발열 림프절비대 인후통 근육통 등등.. 림프절 비대로 목에 멍
울이 만져질수도 있습니다. 멍울이 생기는 원인은 일반감기로도 흔하게 나타나는 증상이라서
감염내과 방문하여 빨리 혈액검사를 받아보시는게 좋겠습니다. 참고로 에이즈 초기증상은 저
절로 호전될수도 있고 무증상기간도 있기 때문에 안심하지 마시고 꼭 검사를 받아보시기 바랍
니다.

hiv 키트로 자가 검사했는데 검사 시간이 지나서 나오는것도 양성반응인가요?,안녕하세요. 메
디이즈입니다. HIV 키트로 자가 검사를 했을 때 검사 시간이 지나서 나오는 선은 양성 반응
이 아닙니다. HIV 검사 키트는 바이러스 항체를 검출하는 방식으로 검사 시간이 지나면 항체
가 희석되어서 선이 약해질 수 있습니다. 따라서 HIV 검사 키트로 자가 검사를 했을 때 검사
시간이 지나서 나오는 선은 음성이라고 생각해도 됩니다. 다만 HIV 검사 키트는 정확도가
100가 아니기 때문에 정확한 검사 결과를 위해서는 병원에서 정밀 검사를 받아보는 것이 좋
습니다.

일광화상췌변 딱지인지 대상포진인지 궁금합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일광화상으로
도 저런 병변이 가능합니다. 일광화상은 햇빛에 과도하게 노출되었을 때 피부가 붉어지고 따
끔거리는 증상이 나타나는 질환입니다. 일광화상이 심해지면 물집이 생기고 물집이 터지면서
딱지가 생길 수 있습니다. 딱지는 보통 23주 정도 지나면 자연스럽게 떨어집니다. 대상포진은
수두 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 피부에 물집이 생기고 통증이 동반됩니다. 대상포진
은 면역력이 떨어진 사람에게 주로 발생합니다. 대상포진은 피부뿐만 아니라 신경에도 영향을
미칠 수 있습니다. 대상포진이 의심되는 경우 병원에 방문하여 진료를 받아보는 것이 좋습니
다.

음낭 습진 때문에 너무 괴롭습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음낭 습진은 피부염의 일
종으로 피부가 붉어지고 가렵고 진물이 나며 딱딱해지는 증상을 보입니다. 음낭 습진은 원인
이 다양하며 치료는 원인에 따라 다르게 진행됩니다. 비뇨기과에서 진료를 받았는데 성병이나
균이 없고 습진이라고 진단을 받았다면 피부과에서 진료를 받아보는 것이 좋습니다. 피부과에
서 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받으면 음낭 습진을 완치할 수 있습니다. 또한 음낭 습

진은 생활습관을 개선하는 것도 도움이 됩니다. 습한 환경을 피하고 꽉 끼는 옷을 피하며 자극적인 음식을 피하는 것이 좋습니다.

보건증 발급 항문 검사 과정에서,안녕하세요. 메디이즈입니다. 항문에 면봉을 넣는 과정에서 무서워가지고 좀 비비면서 면봉을 넣었는데 그때 이후부터 좀 아프군요. 항문외과 내원하셔서 정확한 진료를 한번 받도록 하십시오.

안와골절 수술 후 복시,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하벽과 내벽 동시 골절이면 수술은 꼭 하셔야 하는 게 맞습니다. 안와 골절 수술 후 복시가 새로 생기는 경우가 드물기는 하지만 있는데요 부은 외안근 때문 인듯 하네요. 지금은 별다른 치료나 처치가 경과를 바꿀수는 없고 그냥 기다려야 하는 수 밖에 없습니다. 수술 후 생긴 복시는 3달 까지는 회복이 되니까 조금 더 기다려 보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

아나필락시스도 가족력을 타나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아나필락시스는 특정 물질에 대해 몸에서 과민 반응을 일으키는 것으로 유전적인 요소가 있을 수 있으며 가족력이 있는 경우 발병 가능성이 높아질 수 있습니다. 아나필락시스 발생 확률을 정확히 제시하기는 어려운데 그 이유는 다음과 같습니다. 가족력 외에도 알레르기 항원의 종류 노출 경로 개인의 면역 상태 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 아나필락시스 발생률에 대한 대규모 역학 연구 자체가 부족합니다. 가족력이 있더라도 표현형발현 여부에 차이가 있어 정확한 위험도 산출이 어렵습니다. 아나필락시스 쇼크 상황에서 에피네프린에피네프린 자가주사기 없다면 다음과 같은 응급조치를 취해야 합니다. 119에 즉시 신고하여 응급구조대를 불러야 합니다. 환자를 바로 누인 자세로 해서 기도를 확보해야 합니다. 빨리 응급실로 가야 합니다 에피네프린 주사를 비급여로 처방받으실 수 있습니다 에피네프린을 투여했을 때 치명률은 0.25 미만이지만 투여하지 않으면 35의 높은 치명률을 보입니다. 따라서 에피네프린 주사는 생명을 구할 수 있는 가장 중요한 응급치료입니다.

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배가 너무 부르면 숨이 차고 심장도 아플 수 있습니다. 이는 배에 가스가 차서 압박을 받기 때문입니다. 대변을 보면서 가스를 배출하고 나면 증상이 나아질 것입니다. 불안장애로 인해 걱정되는 것은 충분히 이해합니다. 하지만 너무 걱정할 필요는 없습니다. 위치로 심박수를 재보면 괜찮게 나오는 것을 보니 건강에 문제가 없다는 것을 알 수 있습니다. 이따가 샤워를 하고 자도 괜찮습니다. 다만 샤워를 너무 오래 하지 않도록 주의하세요. 그리고 샤워 후에는 따뜻한 차를 마시고 푹 쉬면 됩니다. 불안장애가 심한 경우에는 약을 늘리는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 하지만 약을 늘리기 전에 의사와 상담을 하는 것이 좋습니다. 건강을 잘 챙기시길 바랍니다.

비폐쇄성 무정자증 치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비폐쇄성 무정자증의 원인은 다양한데요 그 원인에 따라 치료방법이 달라집니다. 호르몬 치료를 통해 정자를 다시 생성시킬 수 있는 경우도 있고 고환절개 시험관아기를 통해 아이를 가질 수 있는 경우도 있습니다. 비폐쇄성 무정자증이라도 고환절개 시험관아기를 통해 아이를 가질 수 있는 경우도 있습니다. 고환절개 시험관아기는 고환에서 정자를 채취한 후 난자를 수정하여 수정란을 자궁에 착상시키는 방법입니다. 비폐쇄성인지 폐쇄성인지 한번의 검사로 확실히 알 수 있는 것은 아니고 여러 번의 검사를 통해 확인할 수 있습니다. 비폐쇄성 무정자증은 정액 검사에서 정자가 발견되지 않는 경우지만 폐쇄성 무정자증은 정액 검사에서 정자가 발견되지 않는 것은 물론이고 고환에서도 정자를 채취할 수 없는 경우입니다. 재검시 정자가 발견될 확률은 아예 없지는 않습니다. 하지만 정액 검사에서 정자가 발견되지 않았다면 재검시 정자가 발견될 가능성은 낮습니다. 비폐쇄성 무정자증의 치료는 원인에 따라 달라지기 때문에 정확한 진단을 위해 비뇨기와

전문의와 상담을 받아보시기 바랍니다.

매독 자가 진단 키트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 20주면 정확하다고 보시면 됩니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

호르몬 성 여드름 어떻게 대처해야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 경구 피임약 호르몬제가 반 이상은 차지합니다 안타깝게도 호르몬제 복용을 끊는다고 피부가 바로 올라오지는 않습니다 그리고 해외의 물과 음식에도 영향이 있습니다 최대한 한식으로 먹어보세요 특히 들기름과 참기름 위주로 육식과 밀가루를 많이 드시지는 않는지 궁금하네요 모낭이라고 불리는 피부 속 염증이 피부까지 올라온 상태입니다 계면활성제 없는 세안제나 천연비누로 세안을 약하게 최대한 물로만 10분 이상 세안하는 것도 좋은 방법입니다 화장을 안하시는게 사실 제일 좋습니다. 평소의 아이같은 꿀피부로 돌리는데는 6개월 이상의 노력이 필요합니다

코샴을 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안약을 핸드폰 알람을 설정하고 써보세요 아니면 카카오톡 본인에게 채팅으로 메모해서 언제 넣었는지를 기록해보세요 메모와 기록 그리고 알람 3가지 잘 활용해보시길 바라겠습니다 더욱 건강하세요

배에 거뭇거뭇한 것이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자극성 접촉 피부염이 생기고 그 후유증으로 염증후 색소침착이 생긴 것으로 판단됩니다. 1년이 넘었다면 치료를 해도 색을 빼기가 쉽지 않습니다. 레이저토닝으로 치료를 시도할 수 있습니다. 23주 간격으로 반복적인 치료가 필요하며 1520회 이상의 치료가 필요할 것으로 판단됩니다. 문의에 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.

엄지손가락 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동그라미 치신 부분은 엄지손가락의 관절이 위치하는 부분이라 보입니다. 손바닥뼈와 손가락뼈가 만나는 부위이고 엑스레이에서 뼈의 이상이 보이지는 않았으니 아마 이 부분을 유지하는 인대에 손상이 있었을 것이라 예상됩니다. 손의 사용을 제한하며 24주 정도 기다려볼만한텐데 이미 4주가 지난 상황이니 통증이 지속되는 상태에 대해 추가적인 진료를 고민해보시는 것이 좋겠습니다. 정형외과를 다시 방문해보시길 권해드립니다.

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 과식을 하게되면 위가 팽창되면서 상부에 있는 폐를 누르기 때문에 숨을 쉬는것이 불편할수 있습니다. 게다가 과식을 하면 위장계에 무리를 주어 소화불량 복부팽만 등의 증상이 나타날수 있습니다. 과식을 하는 습관을 줄이는것이 좋고 게다가 야식은 더더욱 증상을 악화시킵니다. 반복되면 역류성식도염을 유발하게 될겁니다. 건승하세요

레보플록사신 독시사이클린 같이 복용해도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

소화불량 인데 자꾸 식욕이 땡기는 이유는 무엇일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 그래도 식욕이 있으시다는것은 없는것보다는 좋은 것 같습니다. 소화 잘되는 것을 찾아서 소량씩 드셔보세요. 밀가루 우유 커피 이런것은 소화가 잘안될수 있어요

목에서 소리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뒷목에서 푹 하는 소리가 들렸지만 통증이나 불편감은 없었다면 경추의 관절에서 보인 일시적인 증상일 것이라 예상됩니다. 통증이 동반되는 경우에는 진료가 필요하므로 경과를 관찰하시다가 불편해지시면 정형외과 신경외과와 같은 진료과를 찾아가보시기 바랍니다.

불안해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질

외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

피부질환 연구사용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변이 완전히 없어지고 하루이틀 더 발라주시면됩니다. 약은 많이 바르면 효과는 더 올라가지않고 부작용의 가능성이 높아집니다

생리 끝나고 콘돔 찢어짐 임신 가능성 있을까요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

마약 테러에 노출되어 죽으면 어떡하죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 펜타닐과 같은 강력한 합성 오피오이드 마약에 비의도적으로 노출될 경우 매우 위험할 수 있습니다. 그러나 일반적인 상황에서 공기 중 가루 형태로 전파되어 중독되는 일은 거의 없습니다. 펜타닐은 피부나 눈 코 등의 점막을 통해 흡수될 수 있으므로 우발적 접촉 시 주의가 필요합니다. 그러나 공기 중 미량의 가루를 실수로 흡입했다고 해서 바로 중독 증상이 나타나지는 않습니다.

피부질환 연구사용,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병변이 완전히 없어지고 하루이틀 더 발라주시면됩니다. 약은 많이 바르면 효과는 더 올라가지않고 부작용의 가능성이 높아집니다

허벅지 뒤편 안쪽에 뭐가 뿔록 튀어 나왔습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프절 가능성이 높지만 피하 결절 등이 다른 질환에 대한 감별이 필요하므로 상기 병변에 대하여 초음파 검사가 필요합니다.

뇌mri 뇌ct 뇌mra,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌 MRI가 기본이 됩니다. 기억력의 저하는 대부분 뇌검사상 정상이 나오는 경우가 많으며 다른 검사보다 뇌 MRI의 가성비가 가장 좋다고 할 수 있습니다.

안압과 망막의 연관성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안압과 망막 및 황반 질환은 아무런 연관이 없습니다. 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

수두 예방 주사 후 바로 결핵 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수두 접종당일에 결핵검사는 것은 큰 문제는 없을것 같긴 한데 검색해보니 주사 맞고 4주이내에 검사하지 않는 것이 좋다고 합니다

음식이 뜨겁거나 매우면 어지러워요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매겁나 뜨거운 음식을 복용하면 일시적으로 교감 신경이 자극되면서 반대 급부로 부교감 신경이 과도하게 항진되면서 상기 증상이 나타나는 것으로 보입니다. 신경과에서 검사를 받아 보시기 바랍니다.

뇌이상일까요??.안녕하세요. 메디이즈입니다. 차가운 음식을 먹으면 일시적으로 혈관 수축이 생기면서 상기 증상이 발생할 수 있습니다. 뇌이상 가능성은 매우 낮습니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌압상승으로 인해 두통이나 실신을 유발할 수 있습니다. 말초 신경장애가 있는 것으로 보아 신경전도검사나 신경학적 평가가 필요합니다. 구음장애 같은 경우도 신경학적 문제와 많이 연관이 있어보입니다. 빨리 신경과 진료를 받으시기 바랍니다.

건강한 자신에게 맞는 소식방법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 밀가루를 피하시는건 잘하셨고 기름진 음식도 되도록 피하시는게 좋겠습니다. 대식을 하다 소식으로 바꾸려면 하루에 여러번 식사횟수를 늘리는게 좋겠습니다. 섬유질이 많은 음식을 찾아서 드시는게 좋겠어요. 유산균도 복용하고 있는데 추가로 프리바이오틱스유산균먹이도 드시는걸 추천드립니다. 자세한것은 소화기내과 전문의와 상담받으시기 바랍니다.

주방세제를 실수로 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 문제가 될 가능성은 적습니다. 딱히 불편한 점이 없다면 경과관찰하시면 됩니다. 너무 걱정할 필요 없을듯합니다

텍 켈로이드,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비후성 반흔과 켈로이드 반흔은 사실상 구분이 어렵고 치료가 동일하므로 구분이 의미가 없습니다. 따라서 반흔이 사라지지 않는다면 피부과에서 조치가 필요합니다.

남선 지루증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자위를 평소에 강하게 한다면.. 진짜 성관계시에는 자극을 느끼지 못할수 있습니다. 자위방식을 부드럽고 천천히 하는 방향으로 변경해보세요 지루증은 신체적문제가 있거나 심리적인 원인으로도 나타날 수 있습니다. 지루증인지 여부는 비뇨기와 전문의와 상담받으시기 바랍니다.

단순치루수술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 부위 바로 옆 부분은 일시적으로 부을 수 있습니다. 시간 지나면서 상처가 아물면 점차 가라앉을 것이므로 크게 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 일시적으로 소량의 출혈은 있을 수 있으나 양이 많으면 수술 받으셨던 병원으로 문의 하시기 바랍니다. 감사합니다.

왼쪽 엉덩이 찌릿,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리가 불편하시군요. 해당 증상은 허리디스크 질환으로 의심됩니다. 가까운 정형외과를 방문하시기 바랍니다. 감사합니다.

사마귀 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 병변이 이전에 사마귀가 맞다면 피부과에서 완전히 제거하는 것을 권합니다. 다른 부위로 감염이 될 수 있기 때문입니다.

사마귀 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 병변이 이전에 사마귀가 맞다면 피부과에서 완전히 제거하는 것을 권합니다. 다른 부위로 감염이 될 수 있기 때문입니다.

헬리코박터균 치료후 재감염 확률,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연구마다 다르지만 보통 1년에 25 정도 재감염이 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 식생활을 공유하지 않는 문화로 인해 최근 재감염율은 감소하고 있습니다.

두번의 위내시경동안 용종을 놓칠 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 작은 양성 용종은 발견이 되지 않았을 수도 있습니다. 위저선 용종이 육안상 명확하다면 조직검사를 하지 않는 경우도 있습니다.

매독 자가 진단 키트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 20주면 정확하다고 보시면 됩니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

두번의 위내시경동안 용종을 놓칠 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 작은 양성 용종은 발견이 되지 않았을 수도 있습니다. 위저선 용종이 육안상 명확하다면 조직검사를 하지 않는 경우도 있습니다.

매독 자가 진단 키트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 20주면 정확하다고 보시면 됩니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

부모님이 녹내장인데 영양제먹어도되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 루테인 성분은 황반변성에는 도움이 되지만 녹내장에는 큰 도움이 되지 않습니다. 담당의와 상의 후 복용하는 것이 좋겠습니다.

간이식 사례 있을까요선생님 이식 수술을 안해주십니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간이식을 고려할때 가장 중요한 것이 환자의 전반적인 건강상태입니다. 정말 마음이 아프겠지만.. 지금 상태에서는 간이식하기에는 위험해 보입니다.

파상풍 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감염의 가능성은 높지 않지만 만약 걱정이 되신다면 파상풍 예방 접종을 권해드리며 파상풍 예방 접종은 10년 간격으로 접종을 권고하고 있어 접종한지 10년 이후라면 접종하면 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

곤지름일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮습니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

ITP 리툽시맵과 약물 내성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 리툽시맵 재치료시에 대부분은 전과 같은 유사한 반응을 보이는 경우가 많고 소수에서 내성이 발생한다고 보고된다고 되어있습니다. 대부분은 리툽시맵 재치료시에도 처음과 같은 효과가 있다고 보시면 되겠습니다. 혈액종양내과 전문의는 아니여서.. 직접 담당의사와 상의해보는게 좋겠습니다.

남자인데 음모 왼쪽부분이 가렵습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

손톱 끝 살이 붓고 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조갑주위에 자극성 피부염이 생기는 것 같습니다. 손대지말고 스테로이드 연고 발라주세요. 시간이 지나면서 더 붓고 고름이 잡히면 조갑주위염을 의심할 수 있습니다.

광대편은 시간이 지나도 계속 ct에 보이나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. CT컴퓨터 단층촬영 영상에서 금속 핀은 시간이 지나도 계속 선명하게 보입니다. 핀 주변에 뼈가 자라는 과정은 CT 영상에 큰 영향을 미치지 않습니다.

손톱 끝 살이 붓고 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조갑주위에 자극성 피부염이 생기는 것 같습니다. 손대지말고 스테로이드 연고 발라주세요. 시간이 지나면서 더 붓고 고름이 잡히면 조갑주위염을 의심할 수 있습니다.

Itp혈소판감소증과 리툽시맵 약물 내성,안녕하세요. 메디이즈입니다. ITP 치료에서 리툽시맵에 효과가 있었다면.. 재치료시에도 비슷한 효과가 나타날 것입니다. 리툽시맵의 내성은 드물기 때문에 크게 걱정은 안하셔도 될거 같네요. 자세한것은 혈액종양내과 담당의사와 상의해보는게 좋겠습니다.

광대편은 시간이 지나도 계속 ct에 보이나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. CT컴퓨터 단층촬영 영상에서 금속 핀은 시간이 지나도 계속 선명하게 보입니다. 핀 주변에 뼈가 자라는 과정은 CT 영상에 큰 영향을 미치지 않습니다.

생리 끝나고 콘돔 찢어짐 임신 가능성 있을까요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

엄지손가락 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동그라미 치신 부분은 엄지손가락의 관절이 위치하는 부분이라 보입니다. 손바닥뼈와 손가락뼈가 만나는 부위이고 엑스레이에서 뼈의 이상이 보이지는 않았으니 아마 이 부분을 유지하는 인대에 손상이 있었을 것이라 예상됩니다. 손의 사용을 제한하며 24주 정도 기다려볼만한텐데 이미 4주가 지난 상황이니 통증이 지속되는 상태에 대해 추가적인 진료를 고민해보시는 것이 좋겠습니다. 정형외과를 다시 방문해보시길 권해드립니다.

입술 각질 매일 생김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각질이 지속적으로 일어나는 상황도 구순염의 증상이라 볼만한데 아직 증상이 지속된다고 볼 여지가 있으므로 추가적인 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 일반적으로는 바세린과 같은 보습제가 피부염 호전에 도움이 되므로 잘 낫지 않는 상황은 피부과 진료가 필요하다고 판단해야 하겠습니다.

생리불순 임신확인혈액검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정으로 관계한 후 25일 이내

에 임신 확인 혈액검사를 받으면 결과가 정확합니다. 생리불순이더라도 혈액검사를 통해 임신이 확인될 수 있습니다. 다만 생리불순이라면 초음파 검사를 통해 임신 여부를 확인하기 어려울 수 있습니다. 초음파 검사는 임신 6주 이후에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 따라서 질외사정으로 관계한 후 25일이 지났고 임신 여부를 확인하고 싶다면 혈액검사를 받으시기를 권장합니다.

필러맞고 콜라겐주사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두가지 시술을 동시에 하거나 순차적으로 해도 큰 상관은 없습니다. 시술 받은 병원에서 상담 후 일정을 잡으시면 되겠습니다.

손에 묻은 정액으로 임신이 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 적어주신 상황만으로 임신이 될 가능성은 걱정하지 않으셔도 됩니다. 공기중에 노출된 정액을 시간이 지나 질속으로 삽입해서 임신 안 됩니다

항문농양인가요 뽀루지일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제 연고라도 발라보면서 경과를 보세요 3. 심해지면 가는겁니다. 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 건승하세요.

지루 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료방법은 원인에따라 다를 수 있습니다. 그래서 먼저 원인이 무엇인지 알아보는게 중요합니다. 신체적으로 이상은 없는지 혈액검사로 확인해볼수가 있고 약물 부작용 때문인지 약복용력도 알아볼 필요가 있고요. 특히 심리적인 요인이라고 할때는 불안 스트레스를 해소하는 방법이 있겠죠 일단 전문 의료인을 만나 상담을하고 결정하시는게 좋겠습니다.

자다가 코파는 버릇,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콧구멍에 지속적으로 손가락이 들어가다보면 콧구멍이 늘어날 수 있습니다. 가능한 콧구멍에 무엇인가 넣지 않도록 조심하세요

무병변일시 성병 전염율,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 증상이 없다면 감염될 확률은없다고 보셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

손톱 쪽 살 붓고 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 정보만으로 환자 상태를 객관적으로 평가할 수 없지만 손톱 주변 염증 가능성이 높아보입니다. 증상 지속시 피부과 진료 권유합니다.

비폐쇄성 무정자증 치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비폐쇄성 무정자증의 원인은 다양한데요 그 원인에 따라 치료방법이 달라집니다. 호르몬 치료를 통해 정자를 다시 생성시킬 수 있는 경우도 있고 고환절개 시험관아기를 통해 아이를 가질 수 있는 경우도 있습니다. 비폐쇄성 무정자증이라도 고환절개 시험관아기를 통해 아이를 가질 수 있는 경우도 있습니다. 고환절개 시험관아기는 고환에서 정자를 채취한 후 난자를 수정하여 수정란을 자궁에 착상시키는 방법입니다. 비폐쇄성인지 폐쇄성인지 한번의 검사로 확실히 알 수 있는 것은 아니고 여러번의 검사를 통해 확인할 수 있습니다. 비폐쇄성 무정자증은 정액 검사에서 정자가 발견되지 않는 경우지만 폐쇄성 무정자증은 정액 검사에서 정자가 발견되지 않는 것은 물론이고 고환에서도 정자를 채취할 수 없는 경우입니다. 재검시 정자가 발견될 확률은 아예 없지는 않습니다. 하지만 정액 검사에서 정자가 발견되지 않았다면 재검시 정자가 발견될 가능성은 낮습니다. 비폐쇄성 무정자증의 치료는 원인에 따라 달라지기 때문에 정확한 진단을 위해 비뇨기와 전문의와 상담을 받아보시기 바랍니다.

손톱 쪽 살 붓고 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 정보만으로 환자 상태를 객관적으로 평가할 수 없지만 손톱 주변 염증 가능성이 높아보입니다. 증상 지속시 피부과 진료 권

유합니다.

물결명자차만 먹어도 충치 생기나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 충치를 유발하는 원인균은 당분을 섭취하며 성장하므로 당분이 전혀 없는 차 종류를 드시는 것이 충치 위험을 높인다고 보기는 어렵겠습니다. 따라서 걱정하지 않아도 괜찮습니다.

생식기쪽 피부에 혹처럼 난걸 짜버렸어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종에 염증이 생겨서 커진것을 그냥 짜신것이 아닌가 싶습니다. 그리고 커졌다면 진료를 받고 항생제 복용이 필요해 보입니다

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배가 너무 부르면 숨이 차고 심장도 아플 수 있습니다. 이는 배에 가스가 차서 압박을 받기 때문입니다. 대변을 보면서 가스를 배출하고 나면 증상이 나아질 것입니다. 불안장애로 인해 걱정되는 것은 충분히 이해합니다. 하지만 너무 걱정할 필요는 없습니다. 위치로 심박수를 재보면 괜찮게 나오는 것을 보니 건강에 문제가 없다는 것을 알 수 있습니다. 이따가 샤워를 하고 자도 괜찮습니다. 다만 샤워를 너무 오래 하지 않도록 주의하세요. 그리고 샤워 후에는 따뜻한 차를 마시고 푹 쉬면 됩니다. 불안장애가 심한 경우에는 약을 늘리는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 하지만 약을 늘리기 전에 의사와 상담을 하는 것이 좋습니다. 건강을 잘 챙기시길 바랍니다.

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배가 너무 부르면 숨이 차고 심장도 아플 수 있습니다. 이는 배에 가스가 차서 압박을 받기 때문입니다. 대변을 보면서 가스를 배출하고 나면 증상이 나아질 것입니다. 불안장애로 인해 걱정되는 것은 충분히 이해합니다. 하지만 너무 걱정할 필요는 없습니다. 위치로 심박수를 재보면 괜찮게 나오는 것을 보니 건강에 문제가 없다는 것을 알 수 있습니다. 이따가 샤워를 하고 자도 괜찮습니다. 다만 샤워를 너무 오래 하지 않도록 주의하세요. 그리고 샤워 후에는 따뜻한 차를 마시고 푹 쉬면 됩니다. 불안장애가 심한 경우에는 약을 늘리는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 하지만 약을 늘리기 전에 의사와 상담을 하는 것이 좋습니다. 건강을 잘 챙기시길 바랍니다.

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 과식을 한것으로 인해 샤워하고 못 주무실 이유가 없습니다. 단 과식을 하셨다면 위식도 역류등의 가능성이 있어 최소한 23시간 후 주무시기를 권유합니다

오늘 너무 배부르게 먹고나서요...,안녕하세요. 과식을 하게되면 위가 팽창되면서 상부에 있는 폐를 누르기 때문에 숨을 쉬는것이 불편할수 있습니다. 게다가 과식을 하면 위장계에 무리를 주어 소화불량 복부팽만 등의 증상이 나타날수 있습니다. 과식을 하는 습관을 줄이는것이 좋고 게다가 야식은 더더욱 증상을 악화시킵니다. 반복되면 역류성식도염을 유발하게 됩니다. 건승하세요

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 많은 양으로 과식을 하다 보니 위가 늘어나며 불편함을 느꼈을 가능성이 높아보입니다. 단 크게 문제되지는 않을듯합니다

손톱 쪽 살 붓고 간지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 정보만으로 환자 상태를 객관적으로 평가할 수 없지만 손톱 주변 염증 가능성이 높아보입니다. 증상 지속시 피부과 진료 권유합니다.

Hpv 구강유두종일 가능성,안녕하세요 요약 1. 잠복기는 18개월이기 때문에 2. 가능성이 떨어집니다. 3. 그냥 구강외과에서 무언지는 확인해 보세요 생식기 나타나는 HPV 감염은 흔한 성 매개 감염 질환 중 하나이며 잠복기는 1개월에서 8개월이나 HPV에 감염된 상대와 성 접촉한 지 수년이 지난 후에 발병하는 경우도 있습니다. 건승하세요

어머니 두드러기 쇼크 왜생긴걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인을 찾아보는 검사가 필요할 것 같습니다. 원인은 찾기 어렵습니다. 에피네프린 주사를 구비하고 계시는 것이 좋아요 아나필락시스는 급격하고 심각한 전신 알레르기 반응입니다. 주요 원인들은 다음과 같습니다 식품 알레르기 견과류 조개류 우유 달걀 등이 가장 흔한 원인입니다. 약물 알레르기 항생제 아스피린 진통제 등 다양한 약물이 원인이 될 수 있습니다. 곤충 독 벌 꿀벌 등의 독액에 과민반응이 생길 수 있습니다. 운동 운동유발 아나필락시스라고 하며 드물지만 격렬한 운동 중에 발생할 수 있습니다. 기타 원인 박테리아 감염 라텍스 한랭 등도 원인이 될 수 있습니다. 아나필락시스 발생 위험을 높이는 요인으로는 해당 알레르기 항원에 과거 노출된 적이 있는 경우 천식 등 알레르기 질환 병력 약물 복용 중인 경우 등이 있습니다. 또한 가족력이 있으면 유전적 소인으로 인해 발생 위험이 높아집니다.

어머니 두드러기 쇼크 왜생긴걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인을 찾아보는 검사가 필요할 것 같습니다. 원인은 찾기 어렵습니다. 에피네프린 주사를 구비하고 계시는 것이 좋아요 아나필락시스는 급격하고 심각한 전신 알레르기 반응입니다. 주요 원인들은 다음과 같습니다 식품 알레르기 견과류 조개류 우유 달걀 등이 가장 흔한 원인입니다. 약물 알레르기 항생제 아스피린 진통제 등 다양한 약물이 원인이 될 수 있습니다. 곤충 독 벌 꿀벌 등의 독액에 과민반응이 생길 수 있습니다. 운동 운동유발 아나필락시스라고 하며 드물지만 격렬한 운동 중에 발생할 수 있습니다. 기타 원인 박테리아 감염 라텍스 한랭 등도 원인이 될 수 있습니다. 아나필락시스 발생 위험을 높이는 요인으로는 해당 알레르기 항원에 과거 노출된 적이 있는 경우 천식 등 알레르기 질환 병력 약물 복용 중인 경우 등이 있습니다. 또한 가족력이 있으면 유전적 소인으로 인해 발생 위험이 높아집니다.

오늘 너무 배부르게 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 많은 양으로 과식을 하다 보니 위가 늘어나며 불편함을 느꼈을 가능성이 높아보입니다. 단 크게 문제되지는 않을듯합니다

피지낭종 짜낸 환자,안녕하세요. 메디이즈입니다. 7월까지 버티실수 있으면 버티셔도 되지만 염증이 생기면서 붓고 많이아프면 항생제 복용이 필요할 수 있습니다. 학교병원이라도 가보시는 것이 좋을 것 같습니다

비폐쇄성 무정자증 치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비폐쇄성 무정자증의 원인은 다양한데요 그 원인에 따라 치료방법이 달라집니다. 호르몬 치료를 통해 정자를 다시 생성시킬 수 있는 경우도 있고 고환절개 시험관아기를 통해 아이를 가질 수 있는 경우도 있습니다. 비폐쇄성 무정자증이라도 고환절개 시험관아기를 통해 아이를 가질 수 있는 경우도 있습니다. 고환절개 시험관아기는 고환에서 정자를 채취한 후 난자를 수정하여 수정란을 자궁에 착상시키는 방법입니다. 비폐쇄성인지 폐쇄성인지 한번의 검사로 확실히 알 수 있는 것은 아니고 여러번의 검사를 통해 확인할 수 있습니다. 비폐쇄성 무정자증은 정액 검사에서 정자가 발견되지 않는 경우지만 폐쇄성 무정자증은 정액 검사에서 정자가 발견되지 않는 것은 물론이고 고환에서도 정자를 채취할 수 없는 경우입니다. 재검시 정자가 발견될 확률은 아예 없지는 않습니다. 하지만 정액 검사에서 정자가 발견되지 않았다면 재검시 정자가 발견될 가능성은 낮습니다. 비폐쇄성 무정자증의 치료는 원인에 따라 달라지기 때문에 정확한 진단을 위해 비뇨기과 전문의와 상담을 받아보시기 바랍니다.

인중 봉합 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증 여부와 염증 상태에 따라 달라질 수 있는 부분입니다. 실제 염증이 심하다면 봉합사 제거가 늦어질 수 있습니다

위내시경 결과에 따른 질문이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로 암으로 진행

할 가능성이 없는 위저선 용종일 경우 조직검사를 하지 않는 경우가 많습니다. 검사 결과에 대하여 담당의에게 문의를 하기 바랍니다.

코에 뭐가 올라왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 함께 농양이 합병된 것인데 항생제 복용 및 배농이 필요할 수 있습니다. 손으로 만지지 말고 진료를 보시기 바랍니다.

임신 확인 초음파 검사 관계 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파 검사 받으러 가셔도 됩니다. 혈액검사 까지 같이 하시면 좀 더 확실하게 확인하실 수 있을 것으로 생각됩니다

PEP복용 후 HIV 검사 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대략 12주후 최종적으로 HIV 항체 검사를 받아보시고 음성으로 확인된다면 크게 걱정하지 않아도 될 것으로 생각됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

기운빠지고 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럽고 쓰러질것 같은 느낌이 들는 것은 미주신경성 실신일 가능성이 있습니다. 오래 섰있거나 답답한 상황에서 나타날 수 있는데요 그런 전조증상이 있으면 최대한 자세를 낮추고 머리에 혈액순환이 돌게 해줘야 호전됩니다. 만약 이런 증상과 거리가 멀고 기운빠지고 어지러운 증상이 지속된다면 신경과 진료를 보시는 게 좋겠습니다.

라섹 후에 난시가 더 심해졌습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직은 좀 더 지켜봐도 될듯 합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

역류성 식도염이 잘 개선되고 있는 지 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 식도염의 증상이 없다면 약물 치료는 필요하지 않습니다. 경미한 증상이 있다면 약물 치료 효과가 크지 않으므로 현재처럼 생활 습관 조절을 하면서 좀 더 지켜보아도 됩니다.

비폐쇄성 무정자증 치료,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비폐쇄성 무정자증의 원인은 다양한데요 그 원인에 따라 치료방법이 달라집니다. 호르몬 치료를 통해 정자를 다시 생성시킬 수 있는 경우도 있고 고환절개 시험관아기를 통해 아이를 가질 수 있는 경우도 있습니다. 비폐쇄성 무정자증이라도 고환절개 시험관아기를 통해 아이를 가질 수 있는 경우도 있습니다. 고환절개 시험관아기는 고환에서 정자를 채취한 후 난자를 수정하여 수정란을 자궁에 착상시키는 방법입니다. 비폐쇄성인지 폐쇄성인지 한번의 검사로 확실히 알 수 있는 것은 아니고 여러 번의 검사를 통해 확인할 수 있습니다. 비폐쇄성 무정자증은 정액 검사에서 정자가 발견되지 않는 경우지만 폐쇄성 무정자증은 정액 검사에서 정자가 발견되지 않는 것은 물론이고 고환에서도 정자를 채취할 수 없는 경우입니다. 재검시 정자가 발견될 확률은 아예 없지는 않습니다. 하지만 정액 검사에서 정자가 발견되지 않았다면 재검시 정자가 발견될 가능성은 낮습니다. 비폐쇄성 무정자증의 치료는 원인에 따라 달라지기 때문에 정확한 진단을 위해 비뇨기와 전문의와 상담을 받아보시기 바랍니다.

외측복사의골절진단받았습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 생기면 멍이 심하게 들고 붓기도 심한것이 일반적입니다. 깁스를 제거 하기 전까지는 물리치료는 안합니다. 깁스제거후 보행이 어느정도 가능하면 실내자전거 타셔도 됩니다

흉부 답답함과 소화불량 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 통증일 수도 있지만 증상이 지속된다면 협심증이나 역류성 식도염과 같은 질환에 대한 평가가 필요하므로 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

외측복사의 골절진단을받았습니,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 어느 정도인지는 모르나 피멍이 들 수 있으며 자세한 건 CT 찍어보시는 걸 추천드립니다. 확실한 진단 후에 운동 여부는 정해야 하지 않을까 싶습니다. 부족한 답변 송구합니다.

콘돔 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 걱정이 된다면 24시간 이내 사후 피임약을 복용하는 것이 가장 효과적입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

비뇨기와 선생님 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀드리기 조심스럽지만 보기로는 성기 사마귀가 의심됩니다. 비뇨기와 진료 받아보श्य. 암은 아닌것 같습니다

생리 정상일까요?,안녕하세요 요약 1. 아래 기준에 부합되면 정상 생리 주기입니다. 2. 사람마다 그리고 개인에게도 컨디션에 따라 주기는 약간 차이가 날 수 있습니다. 정상적인 생리 주기는 21-38일 기간은 38일 하루 생리량은 20-80ml입니다. 이 범위를 벗어나면 생리 불순이라고 합니다. 스트레스 갑작스러운 체중 증가감소 고강도의 과한 운동 신경성 식욕 부진 같은 섭식장애는 호르몬 분비에 영향을 줘 생리 주기를 변화시킬수 있는데 무배란자궁근종자궁내막암과 자궁경부암 같은 질환 갑상샘 기능 이상 같은 내분비계 장애가 원인이 될 수도 있습니다. 건승하세요

사타구니 가려움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사타구니의 가려움이 만성적인 가려움이 있다면 습진일 수도 있지만 사타구니 백선 가능성을 고려해야 합니다. KOH 등 검사를 받아 보시기 바랍니다.

프로폴리스를 장복해도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프로폴리스는 일종의 건강 보조 식품으로 장기간 복용시 중대한 이상 반응은 없습니다. 도움이 된다면 복용해도 되겠습니다.

서혜부 감각 이상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리의 문제와 살인대 주변의 진찰소견이 중요합니다 이상지각성대퇴신경통이라는 질환이 있으니 검색해서 증상을 느끼는 부위가 비슷한지 확인해 보시기 바랍니다. 가까운 곳의 신경통증관련 병원을 가시면 됩니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 부위에 발생한 헤르페스 감염은 대부분 1형 헤르페스입니다. 성접촉을 한 적이 없다면 2형 헤르페스가 감염될 위가능성은 없다고 봐도 무방합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 부위에 발생한 헤르페스 감염은 대부분 1형 헤르페스입니다. 성접촉을 한 적이 없다면 2형 헤르페스가 감염될 위가능성은 없다고 봐도 무방합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 부위에 발생한 헤르페스 감염은 대부분 1형 헤르페스입니다. 성접촉을 한 적이 없다면 2형 헤르페스가 감염될 위가능성은 없다고 봐도 무방합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 1형과 2형의 구분은 정확한 검사로 보통 몇 만원할 것으로 사료됨 알 수 있고 1형 2형의 발생 부위의 경계는 이미 무너졌습니다. 포진은 피부에 물집이 생기는 병이고 때로는 세균으로도 가능합니다. 성적 접촉없이 발생하는 질환일 것이며 면역이 떨어졌을 때 환절기 특히 봄에는 포진이 좀 증가하는 경향입니다. 그래서 저는 증상에 따라 포진의 치료를 합니다.

간이식 사례 있을까요선생님 이식 수술을 안해주십니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간이식을 고려할때 가장 중요한 것이 환자의 전반적인 건강상태입니다. 정말 마음이 아프겠지만.. 지금 상태에서는 간이식하기에는 위험해 보입니다.

허벅지 뒤편 안쪽에 뭐가 뿔록 튀어 나왔습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프절 가능성이 높지만 피하 결절 등이 다른 질환에 대한 감별이 필요하므로 상기 병변에 대하여 초음파

검사가 필요합니다.

뇌mri 뇌ct 뇌mra,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌 MRI가 기본이 됩니다. 기억력의 저하는 대부분 뇌검사상 정상이 나오는 경우가 많으며 다른 검사보다 뇌 MRI의 가성비가 가장 좋다고 할 수 있습니다.

손에 묻은 정액으로 임신이 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 적어주신 상황만으로 임신이 될 가능성은 걱정하지 않으셔도 됩니다. 공기중에 노출된 정액을 시간이 지나 질속으로 삽입해서 임신 안 됩니다

그러면 여성호르몬 분비는 안되는거죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 가지고 여성호르몬의 과분비를 의심하거나 할 수는 없습니다. 따라서 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

그러면 여성호르몬 분비가 안되는건가용?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 가지고 여성호르몬의 과분비를 의심하거나 할 수는 없습니다. 따라서 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

손에 묻은 정액으로 임신이 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 적어주신 상황만으로 임신이 될 가능성은 걱정하지 않으셔도 됩니다. 공기중에 노출된 정액을 시간이 지나 질속으로 삽입해서 임신 안 됩니다

인중 봉합 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증 여부와 염증 상태에 따라 달라질 수 있는 부분입니다. 실제 염증이 심하다면 봉합사 제거가 늦어질 수 있습니다

헬리코박터균 치료후 재감염 확률,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연구마다 다르지만 보통 1년에 25 정도 재감염이 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 식생활을 공유하지 않는 문화로 인해 최근 재감염율은 감소하고 있습니다.

먹어도 배가 안불러요 호르몬 문제 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식욕이 왕성하고 소화기능이 좋은 시기이기 때문에 식후에도 포만감이 크게 느껴지지 않는 것으로 보입니다. 여성호르몬 문제도 아니고 걱정할 문제도 아닙니다.

인중 봉합 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 염증 여부와 염증 상태에 따라 달라질 수 있는 부분입니다. 실제 염증이 심하다면 봉합사 제거가 늦어질 수 있습니다

항문농양인가요 뽀루지일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제 연고라도 발라보면서 경과를 보세요 3. 심해지면 가는겁니다. 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 건승하세요.

Hpv 구강유두종일 가능성,안녕하세요 요약 1. 잠복기는 18개월이기 때문에 2. 가능성이 떨어집니다. 3. 그냥 구강외과에서 무언지는 확인해 보세요 생식기 나타나는 HPV 감염은 흔한 성 매개 감염 질환 중 하나이며 잠복기는 1개월에서 8개월이나 HPV에 감염된 상대와 성 접촉한 지 수년이 지난 후에 발병하는 경우도 있습니다. 건승하세요

매독 자가 진단 키트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 20주면 정확하다고 보시면 됩니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

서혜부 감각 이상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리의 문제와 살인대 주변의 진찰소견이 중요합니다 이상지각성대퇴신경통이라는 질환이 있으니 검색해서 증상을 느끼는 부위가 비슷한지 확인해 보시기 바랍니다. 가까운 곳의 신경통증관련 병원을 가시면 됩니다.

자다가 코파는 버릇,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콧구멍에 지속적으로 손가락이 들어가다보

면 콧구멍이 늘어날 수 있습니다. 가능한 콧구멍에 무엇인가 넣지 않도록 조심하세요
손에 묻은 정액으로 임신이 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황으로 인해 수정과 착상이 이루어져 임신이 될 확률은 없다고 봐도 무방합니다. 너무 걱정하지 않아도 되겠습니다.

자다가 코파는 버릇,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콧구멍에 지속적으로 손가락이 들어가다보면 콧구멍이 늘어날 수 있습니다. 가능한 콧구멍에 무엇인가 넣지 않도록 조심하세요

왼쪽 엉덩이 찌릿,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리가 불편하시군요. 해당 증상은 허리디스크 질환으로 의심됩니다. 가까운 정형외과를 방문하시기 바랍니다. 감사합니다.

생리 정상일까요?,안녕하세요 요약 1. 아래 기준에 부합되면 정상 생리 주기입니다. 2. 사람마다 그리고 개인에게도 컨디션에 따라 주기는 약간 차이가 날 수 있습니다. 정상적인 생리 주기는 21-38일 기간은 38일 하루 생리량은 20-80ml입니다. 이 범위를 벗어나면 생리 불순이라고 합니다. 스트레스 갑작스러운 체중 증가감소 고강도의 과한 운동 신경성 식욕 부진 같은 섭식장애는 호르몬 분비에 영향을 줘 생리 주기를 변화시킬수 있는데 무배란자궁근종자궁내막암과 자궁경부암 같은 질환 갑상샘 기능 이상 같은 내분비계 장애가 원인이 될 수도 있습니다. 건승하세요

뇌mri 뇌ct 뇌mra,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌 MRI가 기본이 됩니다. 기억력의 저하는 대부분 뇌검사상 정상이 나오는 경우가 많으며 다른 검사보다 뇌 MRI의 가성비가 가장 좋다고 할 수 있습니다.

몸이 무기력하고 숨이 차고 불편합니다.증상좀 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상을 보면 족저근막염으로 인한 활동부족으로 운동부족과 근력저하 때문인거 같아요 특히 수면부족으로 인한 피로감은 스트레스와 신경과민반응을 유발할 수 도 있어요. 먼저 휴식을 충분히 하시고.. 가벼운 운동을 하면서 체중조절하는게 도움이 될 것 같습니다. 그전에 혹시 폐색전증 과거력이 있으니.. 다시 호흡기내과에서 검사를 받아보는 것이 좋겠습니다.

발쪽에 모세혈관들이 빨갛게 보이는데 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모세혈관이라고 합니다. 이 정도는 정상적인 소견이 맞습니다. 이번에 사진을 찍어놓으셨으니 나중에 혹시 더 두드러지는지는 비교해 보시면 좋겠습니다.

피임약 복용 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하루 약을 빼 먹고 복용했다면 다음날 2알을 복용하는 것을 권합니다. 하지만 꾸준히 피임약을 복용해 왔다면 하루 복용하지 않았다고 하여 피임 효과가 사라지지는 않습니다.

경구피임약 휴약기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 휴약기가 길어졌으므로 배란이 이루어졌을 가능성이 있습니다. 따라서 1주일 간은 이중피임을 하는 것이 안전합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

약성분 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 실제 진료를 보지 않고 의약품을 복용하는 것은 매우 위험한 행위입니다. 따라서 상기 약들은 복용하지 않기를 강력히 권고합니다.

빵을 자르다가 베었는데 파상풍 위험이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 얕아서 파상풍 감염의 위험을 걱정하지는 않아도 괜찮습니다. 또한 가정에서 일상적으로 사용되는 식기에서는 파상풍 균이 존재하기가 어려우니 너무 염려하지 마세요. 추가로 파상풍 균은 포유류의 장에 서식하므로 야외에서 발생한 지저분한 상처에 감염될 위험이 존재합니다. 접종은 10년간 유효하니 추후 10년이 되는 해에 추가접종을 받으시기를 권해드립니다.

이거 수포 포진인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상포진의 특징적인 수포성 병변이 아니며 신경절을 따라 분포하고 있지 않아 대상 포진 가능성은 낮습니다. 병변이 변하는지 수일

간 관찰하기 바랍니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

뱃속에서 콩닥콩닥,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배를 꼭 누르면 콩닥콩닥 하는 소리는 심장 박동이 아니라 장기의 움직임입니다. 장기는 끊임없이 움직이면서 소화 배설 호흡 등 다양한 활동을 합니다. 따라서 배를 누르면 장기의 움직임이 느껴질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서는 긁어서난 상처같아 보이기는 한데요. 1년동안 지속되고 피부 겉이 매끄럽다면.. 피부밑에 있는 작은 혈관때문일수가 있는데요. 혹시 모르니 소아과진료와 혈액검사를 통해 혈소판 응고인자에 이상이 있는지 여부를 확인해보세요. 잇몸이나 다른 피부에도 멍자국이나 출혈병변이 있는지 확인해보시고 가까운 소아과 진료 받아보시기 바랍니다.

이갈이 얼굴변화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안면비대칭이나 얼굴 변화가 심하게 생길 가능성은 낮습니다. 그러나 이갈이는 치아와 턱관절에 손상을 줄 수 있으므로 치료를 받는 것이 좋습니다.

공복에 약을 먹어도 되는지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베타정과 헤에프정은 공복에 복용하면 위장 장애가 발생할 가능성이 높으므로 식후 30분 정도 복용하는 것을 권장합니다.

음경이 간지러워요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계 후 음경이 간지러운 증상은 포경수술을 하지 않은 경우 귀두가 덮여 있는 부분이 간지러운 포경낭염일 가능성이 있습니다. 포경낭염은 귀두를 덮고 있는 포피가 염증을 일으키는 질환으로 성관계 후 면역력이 떨어지면서 발생할 수 있습니다. 포경낭염은 항생제 처방으로 치료할 수 있으며 성관계 후에는 깨끗한 물로 음경을 씻어주는 것이 좋습니다. 성병 검사를 받아야 하는지는 병원에 방문하여 진료를 받아보셔야 합니다.

스테로이드 복용과 배란일 변화 연관성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스테로이드 복용으로 호르몬의 변화로 인해 생리가 불규칙해지거나 생리지연 될 수 있습니다. 스테로이드 복용으로 인해 배란 자체를 유발하지는 않습니다. 확실치는 않지만 추가 배란으로 인해 임신가능성은 낮아보입니다. 생리지연으로 임신이 걱정되시면 임신테스트기로 자주 체크해보시고 산부인과 전문의와 상담받으시기 바랍니다.

피부병 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콜린성 두드러기와 피부 묘기증이 동반된 것으로 보입니다. 만성 두드러기의 일종인데 지속적인 치료가 필요하니 진료를 보시기 바랍니다.

건강한 자신에게 맞는 소식방법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 밀가루를 피하시는건 잘하셨고 기름진 음식도 되도록 피하시는게 좋겠습니다. 대식을 하다 소식으로 바꾸려면 하루에 여러번 식사횟수를 늘리는게 좋겠습니다. 섬유질이 많은 음식을 찾아서 드시는게 좋겠어요. 유산균도 복용하고 있는데 추가로 프리바이오틱스유산균먹어도 드시는걸 추천드립니다. 자세한것은 소화기내과 전문의와 상담받으시기 바랍니다.

기운빠지고 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럽고 쓰러질것 같은 느낌이 들는 것은 미주신경성 실신일 가능성이 있습니다. 오래 섰거나 답답한 상황에서 나타날 수 있는데요 그런 전조증상이 있으면 최대한 자세를 낮추고 머리에 혈액순환이 돌게 해줘야 호전됩니다. 만약 이런 증상과 거리가 멀고 기운빠지고 어지러운 증상이 지속된다면 신경과 진료를 보시는게 좋겠습니다.

손에 묻은 정액으로 임신이 가능한가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 상황으로 인해 수정과 착상이 이루어져 임신이 될 확률은 없다고 봐도 무방합니다. 너무 걱정하지 않아도 되겠

습니다.

먹어도 배가 안불러요 호르몬 문제 인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 식욕이 왕성하고 소화기능이 좋은 시기이기 때문에 식후에도 포만감이 크게 느껴지지 않는 것으로 보입니다. 여성호르몬 문제도 아니고 걱정할 문제도 아닙니다.

매독 자가 진단 키트,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 20주면 정확하다고 보시면 됩니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

서혜부 감각 이상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 허리의 문제와 살인대 주변의 진찰소견이 중요합니다 이상지각성대퇴신경통이라는 질환이 있으니 검색해서 증상을 느끼는 부위가 비슷한지 확인해 보시기 바랍니다. 가까운 곳의 신경통증관련 병원을 가시면 됩니다.

고환염전 한쪽 고환 제거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고환 하나를 제거하더라도 호르몬테스토스테론분비에 영향을 주지는 않습니다. 남은 고환의 기능이 잘하는지 궁금하시면 호르몬수치를 검사 받아보시기 바랍니다.

표피낭종?피지낭종?종기가 바깥으로 터졌습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원을 방문하기 전까지 상처부위 관리만 잘 하시면 되는 상황으로 보입니다. 지금처럼 포비돈으로 하루 두 번 소독하며 관리하시고 추후 병원 방문하셔서 치료적 처치를 받으시기 바랍니다. 방치하시면 감염증이 악화될 수 있습니다.

가끔 뜬금 없이 발생하는 왼쪽 가슴 통증이 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기흉이 잘생길 수있는 마른체형을 가지고 계시는 군요 자발성 기흉인경우 저절로 완치되는 경우가 많지만.. 재발하는 경우도 많습니다. 현재 증상으로 봤을때 기흉이 재발한 것으로 보이니 빨리 호흡기내과 진료를 보시고 재발하지 않도록 처치를 받는데 좋겠습니다. 몸이 한쪽으로 기울이는 자세를 취하거나 같은자세를 오래 유지하면 증상이 악화될 수 있으니 주기적으로 자세를 바꿔주는게 좋겠습니다.

성기에 상처가 났는데 성병인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 곤지름헤르페스매독 HIV 감염과 같은 성병의 특징적인 병변이 관찰되지 않으므로 성병의 가능성은 낮습니다. 하지만 시간이 지나면서 궤양의 형태로 변한다면 진료를 보시기 바랍니다.

림프종인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프종의 증상과 진단 방법은 다음과 같습니다. 증상 림프절의 비대 림프절이 커져서 만져지거나 통증이 동반될 수 있습니다. 발열 림프종의 종류에 따라 발열이 동반될 수 있습니다. 체중 감소 식욕이 감소하거나 체중이 감소할 수 있습니다. 피부 발진 피부에 발진이 생길 수 있습니다. 야간 발한 밤에 땀이 많이 나는 증상이 나타날 수 있습니다. 진단 림프종의 진단은 종양이 발생한 부위의 조직검사를 통해 이루어집니다. 일반적으로 림프종은 생검을 통해 조직을 채취하여 형태학적 면역조직학적 분자유전학적 검사를 실시합니다. 림프종의 세부 유형을 분류하기 위해 혈액검사 방사선검사 초음파 및 CT MRI 등의 영상진단도 사용됩니다. 아닌것 같은데 진료는 받아보셔요

다리가 빨갛게 붓고 노란 염증이 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염이 넓게 발생하였고 주변 피부와 피하 조직에도 염증이 발생한 연조직염으로 판단됩니다. 항생제 치료가 필요하니 진료를 보시기 바랍니다.

추가 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 타박상이 심하면 근육손상으로 근육기능의 약화가 나타날 수 있습니다 1주일 지나서 좋아지면 괜찮다고 생각하셔도 됩니다

항문찢어짐 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵을 앓고 계신 상황인데 찢어지는 느낌 많은 양의 출혈이 나온 상황이라 이해됩니다. 치열이 동반되었을 수 있겠고 푸레파인은 질환의 증

상 조절을 위한 약 통증 완화이므로 근본적인 치료를 위해서는 항문외과 진료가 필요합니다. 약을 주입하기가 어려운 정도의 통증이 나타나고 있으니 진료를 받아보시기 바랍니다.

고환쪽 피부가 껍질이 벗겨짐사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

고환쪽 피부 껍질 벗겨짐사진있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 습진성 피부병변이라 보이고 헤르페스 병변은 아니겠고 이외 성병을 특정하여 의심하기는 어려울 것 같습니다. 잘 나아지지 않는다면 비뇨의학과를 다시 방문하여 진료받아보실 필요가 있습니다.

목에서 소리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뒷목에서 푹 하는 소리가 들렸지만 통증이나 불편감은 없었다면 경추의 관절에서 보인 일시적인 증상일 것이라 예상됩니다. 통증이 동반되는 경우에는 진료가 필요하므로 경과를 관찰하시다가 불편해지시면 정형외과 신경외과와 같은 진료를 찾아가보시기 바랍니다.

마약 테러에 노출되어 죽으면 어떡하죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 펜타닐과 같은 강력한 합성 오피오이드 마약에 비의도적으로 노출될 경우 매우 위험할 수 있습니다. 그러나 일반적인 상황에서 공기 중 가루 형태로 전파되어 중독되는 일은 거의 없습니다. 펜타닐은 피부나 눈 코 등의 점막을 통해 흡수될 수 있으므로 우발적 접촉 시 주의가 필요합니다. 그러나 공기 중 미량의 가루를 실수로 흡입했다고 해서 바로 중독 증상이 나타나지는 않습니다.

눈에 이상한게 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 나이가 많지 않아서 질환과 연관된 비문증 같아 보이지는 않습니다. 크게 신경 쓰지 않아도 될 거예요. 박테리아 같은게 보이는 것 말고 다른 증상이 생기면 안과 진료 받아보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

화학적 유산을 예상했고 생리를 했는데도 불구하고 피검수치HCG수치가 올라갔습니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. hcg수치가 높은것은 비정상적인 조직이 남아있을 가능성이 있어 초음파 검사를 같이 해보는것이 좋겠습니다. hcg 수치를 지속적으로 모니터링하면서 잔류조직 여부를 확인하기 위해 초음파검사를 받아보세요

혹시 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 채널수가 많아지면 CT의 해상도가 좋아지는 것은 사실이므로 아주 작은 병변이라면 차이가 있을 수 있지만 일반적으로 진단에는 영향을 미치지 않습니다.

심전도 빨간부분 해석요청입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기저선이 일시적으로 흔들리는 현상이 발생한 것으로 보입니다. 앞뒤 연결된 심전도가 모두 정상 소견이므로 실제 이상일 가능성은 매우 낮습니다.

자위를 하고나서 소변을 보면 휴지에 피가 묻어서 나옵니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자위행위 후 출혈이 반복적으로 나타나는 경우 단순히 자극으로 인한 출혈이 아닐 가능성에 대해서도 확인이 필요하겠습니다. 부인과적 질환이 있다면 가벼운 자극에도 출혈이 보일 수 있어 이에 대한 진료가 필요하겠으니 가까운 산부인과를 방문해보시기를 권해드립니다.

에이즈 검사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 10주째 검사 받으시면 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요약 1. 대장암보다는 위장염이나 2. 감염 후에 생긴 과민성대장증후군에 준해 치료를 해야 할겁니다. 3. 전문약 복용하면서 식이 조절하면서 치료 경과를 봐주세요 4. 대장암은 아래와 같은 증상이 생깁니다. 대장암의 주된 증상으로는 배변습관

변화갑자기 변을 보기 힘들어지거나변 보는 횟수가 변하는 등 설사 변비 또는 배변 후 후중기 혈변 점액변 예전보다 가늘어진 변 복부불편감복통 복부팽만 체중 근력의감소 피로감 식욕부진 소화불량 오심과 구토 복부 종물 등이 있습니다. 건승하세요

사마귀 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 병변이 이전에 사마귀가 맞다면 피부과에서 완전히 제거하는 것을 권합니다. 다른 부위로 감염이 될 수 있기 때문입니다.

두번의 위내시경동안 용종을 놓칠 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 작은 양성 용종은 발견이 되지 않았을 수도 있습니다. 위저선 용종이 육안상 명확하다면 조직검사를 하지 않는 경우도 있습니다.

허벅지 뒤편 안쪽에 뭐가 뿔록 튀어 나왔습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프절 가능성이 높지만 피하 결절 등이 다른 질환에 대한 감별이 필요하므로 상기 병변에 대하여 초음파검사가 필요합니다.

헬리코박터균 치료후 재감염 확률,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연구마다 다르지만 보통 1년에 25 정도 재감염이 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 식생활을 공유하지 않는 문화로 인해 최근 재감염율은 감소하고 있습니다.

부모님이 녹내장인데 영양제먹어도되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 루테인 성분은 황반변성에는 도움이 되지만 녹내장에는 큰 도움이 되지 않습니다. 담당의와 상의 후 복용하는 것이 좋겠습니다.

파상풍 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감염의 가능성은 높지 않지만 만약 걱정이 되신다면 파상풍 예방 접종을 권해드리며 파상풍 예방 접종은 10년 간격으로 접종을 권고하고 있어 접종한지 10년 이후라면 접종하면 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

남자인데 음모 왼쪽부분이 가렵습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

생리 끝나고 콘돔 찢어짐 임신 가능성 있을까요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

엄지손가락 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동그라미 치신 부분은 엄지손가락의 관절이 위치하는 부분이라 보입니다. 손바닥뼈와 손가락뼈가 만나는 부위이고 엑스레이에서 뼈의 이상이 보이지는 않았으니 아마 이 부분을 유지하는 인대에 손상이 있었을 것이라 예상됩니다. 손의 사용을 제한하며 24주 정도 기다려볼만한텐데 이미 4주가 지난 상황이니 통증이 지속되는 상태에 대해 추가적인 진료를 고민해보시는 것이 좋겠습니다. 정형외과를 다시 방문해보시길 권해드립니다.

생리불순 임신확인혈액검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정으로 관계한 후 25일 이내에 임신 확인 혈액검사를 받으면 결과가 정확합니다. 생리불순이더라도 혈액검사를 통해 임신이 확인될 수 있습니다. 다만 생리불순이라면 초음파 검사를 통해 임신 여부를 확인하기 어려울 수 있습니다. 초음파 검사는 임신 6주 이후에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 따라서 질외사정으로 관계한 후 25일이 지났고 임신 여부를 확인하고 싶다면 혈액검사를 받으시기를 권장합니다.

입술 각질 매일 생김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각질이 지속적으로 일어나는 상황도 구순염의 증상이라 볼만한데 아직 증상이 지속된다고 볼 여지가 있으므로 추가적인 진료를 받아보시

는 것이 좋겠습니다. 일반적으로는 바세린과 같은 보습제가 피부염 호전에 도움이 되므로 잘 낫지 않는 상황은 피부과 진료가 필요하다고 판단해야 하겠습니다.

생식기쪽 피부에 혹처럼 난결 짜버렸어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종에 염증이 생겨서 커진것을 그냥 짜신것이 아닌가 싶습니다. 그리고 커졌다면 진료를 받고 항생제 복용이 필요해 보입니다

외측복사의 골절진단을받았습니,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 어느 정도인지는 모르나 피멍이 들 수 있으며 자세한 건 CT 찍어보시는 걸 추천드립니다. 확실한 진단 후에 운동 여부는 정해야 하지 않을까 싶습니다. 부족한 답변 송구합니다.

필러맞고 콜라겐주사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두가지 시술을 동시에 하거나 순차적으로 해도 큰 상관은 없습니다. 시술 받은 병원에서 상담 후 일정을 잡으시면 되겠습니다.

지루 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료방법은 원인에따라 다를 수 있습니다. 그래서 먼저 원인이 무엇인지 알아보는게 중요합니다. 신체적으로 이상은 없는지 혈액검사로 확인해볼수가 있고 약물 부작용 때문인지 약복용력도 알아볼 필요가 있고요. 특히 심리적인 요인이라고 할때는 불안 스트레스를 해소하는 방법이 있겠죠 일단 전문 의료인을 만나 상담을하고 결정하시는게 좋겠습니다.

사타구니 가려움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사타구니의 가려움이 만성적인 가려움이 있다면 습진일 수도 있지만 사타구니 백선 가능성을 고려해야 합니다. KOH 등 검사를 받아 보시기 바랍니다.

물결명자차만 먹어도 충치 생기나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 충치를 유발하는 원인균은 당분을 섭취하며 성장하므로 당분이 전혀 없는 차 종류를 드시는 것이 충치 위험을 높인다고 보기는 어렵겠습니다. 따라서 걱정하지 않아도 괜찮습니다.

비뇨기과 선생님 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀드리기 조심스럽지만 보기로는 성기 사마귀가 의심됩니다. 비뇨기과 진료 받아보셔요. 암은 아닌것 같습니다

피지낭종 짜낸 환자,안녕하세요. 메디이즈입니다. 7월까지 버티실수 있으면 버티셔도 되지만 염증이 생기면서 붓고 많이아프면 항생제 복용이 필요할 수 있습니다. 학교병원이라도 가보시는 것이 좋을 것 같습니다

무병변일시 성병 전염율,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 증상이 없다면 감염될 확률은없다고 보셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

기운빠지고 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럽고 쓰러질것 같은 느낌이 들는 것은 미주신경성 실신일 가능성이 있습니다. 오래 섰었거나 답답한 상황에서 나타날 수 있는데요 그런 전조증상이 있으면 최대한 자세를 낮추고 머리에 혈액순환이 돌게 해줘야 호전됩니다. 만약 이런 증상과 거리가 멀고 기운빠지고 어지러운 증상이 지속된다면 신경과 진료를 보시는게 좋겠습니다.

코에 뭐가 올라왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 함께 농양이 합병된 것인데 항생제 복용 및 배농이 필요할 수 있습니다. 손으로 만지지 말고 진료를 보시기 바랍니다.

화학적 유산을 예상했고 생리를 했는데도 불구하고 피검수치HCG수치가 올라갔습니다...,안녕하세요. 메디이즈입니다. hcg수치가 줄은것은 비정상적인 조직이 남아있을 가능성이 있어 초음파 검사를 같이 해보는것이 좋겠습니다. hcg 수치를 지속적으로 모니터링하면서 잔류조직 여부를 확인하기 위해 초음파검사를 받아보세요

위내시경 결과에 따른 질문이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로 암으로 진행

할 가능성이 없는 위저선 용종일 경우 조직검사를 하지 않는 경우가 많습니다. 검사 결과에 대하여 담당의에게 문의를 하기 바랍니다.

임신 확인 초음파 검사 관계 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파 검사 받으러 가셔도 됩니다. 혈액검사 까지 같이 하시면 좀 더 확실하게 확인하실 수 있을 것으로 생각됩니다

역류성 식도염이 잘 개선되고 있는 지 궁금합니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 식도염의 증상이 없다면 약물 치료는 필요하지 않습니다. 경미한 증상이 있다면 약물 치료 효과가 크지 않으므로 현재처럼 생활 습관 조절을 하면서 좀 더 지켜보아도 됩니다.

외측복사의 골절진단을받았습니,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 어느 정도인지는 모르나 피명이 들 수 있으며 자세한 건 CT 찍어보시는 걸 추천드립니다. 확실한 진단 후에 운동 여부는 정해야 하지 않을까 싶습니다. 부족한 답변 송구합니다.

흉부 답답함과 소화불량 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 통증일 수도 있지만 증상이 지속된다면 협심증이나 역류성 식도염과 같은 질환에 대한 평가가 필요하므로 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

콘돔 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 걱정이 된다면 24시간 이내 사후 피임약을 복용하는 것이 가장 효과적입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

비뇨기와 선생님 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀드리기 조심 스럽지만 보기로는 성기 사마귀가 의심됩니다. 비뇨기와 진료 받아보셔요. 암은 아닌것 같습니다

프로폴리스를 장복해도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프로폴리스는 일종의 건강 보조 식품으로 장기간 복용시 중대한 이상 반응은 없습니다. 도움이 된다면 복용해도 되겠습니다.

라섹 후에 난시가 더 심해졌습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직은 좀 더 지켜봐도 될듯 합니다만 현재 정보만으로는 환자 상태에 대한 객관적인 평가가 불가하기에 담당 선생님과 상의를 해 보시는게 좋을듯합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 1형과 2형의 구분은 정확한 검사로 보통 몇 만원할 것으로 사료됨 알 수 있고 1형 2형의 발생 부위의 경계는 이미 무너졌습니다. 포진은 피부에 물집이 생기는 병이고 때로는 세균으로도 가능합니다. 성적 접촉없이 발생하는 질환일 것이며 면역이 떨어졌을 때 환절기 특히 봄에는 포진이 좀 증가하는 경향입니다. 그래서 저는 증상에 따라 포진의 치료를 합니다.

간이식 사례 있을까요선생님 이식 수술을 안해주십니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 간이식을 고려할때 가장 중요한 것이 환자의 전반적인 건강상태입니다. 정말 마음이 아프겠지만.. 지금 상태에서는 간이식하기에는 위험해 보입니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 부위에 발생한 헤르페스 감염은 대부분 1형 헤르페스입니다. 성접촉을 한 적이 없다면 2형 헤르페스가 감염될 위가능성은 없다고 봐도 무방합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 부위에 발생한 헤르페스 감염은 대부분 1형 헤르페스입니다. 성접촉을 한 적이 없다면 2형 헤르페스가 감염될 위가능성은 없다고 봐도 무방합니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 헤르페스 1형과 2형의 구분은 정확한 검사로 보통 몇 만원할 것으로 사료됨 알 수 있고 1형 2형의 발생 부위의 경계는 이미 무너졌습니다. 포진은

피부에 물집이 생기는 병이고 때로는 세균으로도 가능합니다. 성적 접촉없이 발생하는 질환일 것이며 면역이 떨어졌을 때 환절기 특히 봄에는 포진이 좀 증가하는 경향입니다. 그래서 저는 증상에 따라 포진의 치료를 합니다.

주방세제를 실수로 먹었습니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 문제가 될 가능성은 적습니다. 딱히 불편한 점이 없다면 경과관찰하시면 됩니다. 너무 걱정할 필요 없을듯합니다

간이식 사례 있을까요선생님 이식 수술을 안해주십니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 간이식을 고려할때 가장 중요한 것이 환자의 전반적인 건강상태입니다. 정말 마음이 아프겠지만.. 지금 상태에서는 간이식하기에는 위험해 보입니다.

간이식 사례 있을까요선생님 이식 수술을 안해주십니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 간이식을 고려할때 가장 중요한 것이 환자의 전반적인 건강상태입니다. 정말 마음이 아프겠지만.. 지금 상태에서는 간이식하기에는 위험해 보입니다.

PEP복용 후 HIV 검사 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 대략 12주후 최종적으로 HIV 항체 검사를 받아보시고 음성으로 확인된다면 크게 걱정하지 않아도 될 것으로 생각됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

프로폴리스를 장복해도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프로폴리스는 일종의 건강 보조 식품으로 장기간 복용시 중대한 이상 반응은 없습니다. 도움이 된다면 복용해도 되겠습니다.

헤르페스 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 부위에 발생한 헤르페스 감염은 대부분 1형 헤르페스입니다. 성접촉을 한 적이 없다면 2형 헤르페스가 감염될 위가능성은 없다고 봐도 무방합니다.

비뇨기과 선생님 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀드리기 조심스럽지만 보기로는 성기 사마귀가 의심됩니다. 비뇨기과 진료 받아보셔요. 암은 아닌것 같습니다

프로폴리스를 장복해도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 프로폴리스는 일종의 건강 보조 식품으로 장기간 복용시 중대한 이상 반응은 없습니다. 도움이 된다면 복용해도 되겠습니다.

역류성 식도염이 잘 개선되고 있는 지 궁금합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 식도염의 증상이 없다면 약물 치료는 필요하지 않습니다. 경미한 증상이 있다면 약물 치료 효과가 크지 않으므로 현재처럼 생활 습관 조절을 하면서 좀 더 지켜보아도 됩니다.

필러맞고 콜라겐주사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두가지 시술을 동시에 하거나 순차적으로 해도 큰 상관은 없습니다. 시술 받은 병원에서 상담 후 일정을 잡으시면 되겠습니다.

외측복사의 골절진단을받았습니,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 어느 정도인지는 모르나 피명이 들 수 있으며 자세한 건 CT 찍어보시는 걸 추천드립니다. 확실한 진단 후에 운동 여부는 정해야 하지 않을까 싶습니다. 부족한 답변 송구합니다.

외측복사의골절진단받았습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 생기면 멍이 심하게 들고 붓기도 심한것이 일반적입니다. 깁스를 제거 하기 전까지는 물리치료는 안합니다. 깁스제거후 보행이 어느정도 가능하면 실내자전거 타셔도 됩니다

생리불순 임신확인혈액검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정으로 관계한 후 25일 이내에 임신 확인 혈액검사를 받으면 결과가 정확합니다. 생리불순이라든가 혈액검사를 통해 임신이 확인될 수 있습니다. 다만 생리불순이라면 초음파 검사를 통해 임신 여부를 확인하기 어려울 수 있습니다. 초음파 검사는 임신 6주 이후에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 따라서 질외사정으로 관계한 후 25일이 지났고 임신 여부를 확인하고 싶다면 혈액검사를 받으시기를

권장합니다.

콘돔 찢어짐,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 걱정이 된다면 24시간 이내 사후 피임약을 복용하는 것이 가장 효과적입니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

팔다리 힘빠짐 및 발 근육떨림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 루게릭은 중년남성에게 많이 발생하므로.. 가능성은 떨어져보입니다. 힘이 빠지고 근육이 떨리는 증상에 대해서 일단은 신경과 방문하여 신경학적 검사신경전도 근전도 검사 등등.. 를 먼저 받아보시기 바랍니다. 신경학적 문제가 없다면.. 전해질 불균형같은 내과적 문제와 스트레스에 의한 것인지 여부도 확인해보시기 바랍니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진에서는 굵어서난 상처같아 보이기는 한데요. 1년동안 지속되고 피부 겉이 매끄럽다면.. 피부밑에 있는 작은 혈관때문일수가 있는데요. 혹시 모르니 소아과진료와 혈액검사를 통해 혈소판 응고인자에 이상이 있는지 여부를 확인해보세요. 잇몸이나 다른 피부에도 멍자국이나 출혈병변이 있는지 확인해보시고 가까운 소아과 진료 받아보시기 바랍니다.

노안과 어지러움 그리고 안경에관해서 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 무도수 안경을 써서 눈의 피로도를 감소시키고 눈의 긴장도를 낮추어서 일시적으로 어지럼증이 개선될 수는 있습니다. 그래도 장기적으로 봤을때는 안과에서 정밀검사를 받아 눈의 상태를 체크해보는게 좋겠네요.

고환염전 한쪽 고환 제거,안녕하세요. 메디이즈입니다. 고환 하나를 제거하더라도 호르몬테스토스테론분비에 영향을 주지는 않습니다. 남은 고환의 기능이 잘하는지 궁금하시면 호르몬수치를 검사 받아보시기 바랍니다.

수두 예방 주사 후 바로 결핵 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수두 접종당일에 결핵검사하는 것은 큰 문제는 없을것 같긴 한데 검색해보니 주사 맞고 4주이내에 검사하지 않는 것이 좋다고 합니다

흉부 답답함과 소화불량 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 통증일 수도 있지만 증상이 지속된다면 협심증이나 역류성 식도염과 같은 질환에 대한 평가가 필요하므로 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

곤지름일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮습니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

기운빠지고 어지러움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어지럽고 쓰러질것 같은 느낌이 들는 것은 미주신경성 실신일 가능성이 있습니다. 오래 섰었거나 답답한 상황에서 나타날 수 있는데요. 그런 전조증상이 있으면 최대한 자세를 낮추고 머리에 혈액순환이 돌게 해줘야 호전됩니다. 만약 이런 증상과 거리가 멀고 기운빠지고 어지러운 증상이 지속된다면 신경과 진료를 보시는게 좋겠습니다.

남자인데 음모 왼쪽부분이 가렵습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

고환쪽 피부가 껍질이 벗겨짐사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.

<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

역류성 식도염이 잘 개선되고 있는 지 궁금합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 식도염의 증상이 없다면 약물 치료는 필요하지 않습니다. 경미한 증상이 있다면 약물 치료 효과가 크지 않으므로 현재처럼 생활 습관 조절을 하면서 좀 더 지켜보아도 됩니다.

흉부 답답함과 소화불량 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 통증일 수도 있지만 증상이 지속된다면 협심증이나 역류성 식도염과 같은 질환에 대한 평가가 필요하므로 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

외측복사의골절진단받았습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절이 생기면 멍이 심하게 들고 붓기도 심한것이 일반적입니다. гип스를 제거 하기 전까지는 물리치료는 안합니다. гип스제거후 보행이 어느정도 가능하면 실내자전거 타셔도 됩니다

임신 확인 초음파 검사 관계 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파 검사 받으러 가셔도 됩니다. 혈액검사 까지 같이 하시면 좀 더 확실하게 확인하실 수 있을 것으로 생각됩니다

흉부 답답함과 소화불량 질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적인 통증일 수도 있지만 증상이 지속된다면 협심증이나 역류성 식도염과 같은 질환에 대한 평가가 필요하므로 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

코에 뭐가 올라왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 함께 농양이 합병된 것인데 항생제 복용 및 배농이 필요할 수 있습니다. 손으로 만지지 말고 진료를 보시기 바랍니다.

눈에 이상한게 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 나이가 많지 않아서 질환과 연관된 비문증 같아 보이지는 않습니다. 크게 신경 쓰지 않아도 될 거예요. 박테리아 같은게 보이는 것 말고 다른 증상이 생기면 안과 진료 받아보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

임신 확인 초음파 검사 관계 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 초음파 검사 받으러 가셔도 됩니다. 혈액검사 까지 같이 하시면 좀 더 확실하게 확인하실 수 있을 것으로 생각됩니다

PEP복용 후 HIV 검사 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 대략 12주후 최종적으로 HIV 항체 검사를 받아보시고 음성으로 확인된다면 크게 걱정하지 않아도 될 것으로 생각됩니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

눈밑지방재배치 수술에 관하여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 수술 후 일상생활을 하기까지 어느정도 기간이 걸리나요? 사람마다 약간의 차이가 있겠지만 일반적으로 이 정도는 돼야 일상생활을 하는데 아무 문제가 없다는 판정을 할 수 있는 기간이 있잖아요. 수술 후 다음 날 부터 일상생활은 가능 합니다. 수술 후 3일 까지는 출혈 가능성이 있어서 힘을 주거나 많이 움직이거나 하는 것을 조심하시는 정도 입니다. 피부를 절개해서 수술 하는 경우 실밥 제거 할 때까지는 불편 할 수 있는데요 봉합사 제거 까지 보통 5일에서 7일 정도 걸리게 됩니다. 결막 쪽으로 수술 하는 경우는 겉으로는 표시가 없습니다. 2. 수술 후 금주기간은 어떻게 되나요? 다르게 말씀드려서 적어도 이정도 기간은 지나야 술을 마셔도 상관이 없다 하는 기간을 여쭙 봅니다. 일주일 은 금주하셔야 하고 그 이후는 수술 경과에 따라 조금씩 다릅니다. 3. 수술 후 수술을 했던 부위가 거의 보이지 않게 아물게 되려면 얼마나 지나야 할까요? 피부로 하면 3개월이 지나야 수술 부위가 열어지기 시작하고 보통 6개월 정도는 지나야 보이지 않게 됩니다. 결막으로 하면 피부쪽에 흉터는 생기지 않습니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

주걱턱 교정 마무리단계 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비대칭이 약간 있는데 교합이 잘 맞춰진 상태고 주걱턱도 많이 완화돼서 마무리하자고 하시는데 왼쪽 얼굴은 딱 좋은데

오른쪽 얼굴 턱이 조금 아직 튀어나온 거 같은데 교합이 맞춰진 상태면 오른쪽 턱을 더 넣을 방법은 없는건가요? 아니면 아직 교정기를 떼지 않았는데 진료때 말씀드리면 어떤 방법으로든 시도해보긴 하시나요? 설명해주신 내용 만으로는 정확한 판단이 어렵지만 말씀해주신 내용은 턱 자체 모양에 의한 것으로보여집니다. 이 경우는 교정치료로 해결 할 수는 없는 것이구요 씹는 근육 때문이라면 보톡스 치료가 효과가 있을 수 있습니다.

피지낭종 짜낸 환자,안녕하세요. 메디이즈입니다. 7월까지 버티실수 있으면 버티셔도 되지만 염증이 생기면서 붓고 많이아프면 항생제 복용이 필요할 수 있습니다. 학교병원이라도 가보시는 것이 좋을 것 같습니다

엄지손가락 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동그라미 치신 부분은 엄지손가락의 관절이 위치하는 부분이라 보입니다. 손바닥뼈와 손가락뼈가 만나는 부위이고 엑스레이에서 뼈의 이상이 보이지는 않았으니 아마 이 부분을 유지하는 인대에 손상이 있었을 것이라 예상됩니다. 손의 사용을 제한하며 24주 정도 기다려볼만한텐데 이미 4주가 지난 상황이니 통증이 지속되는 상태에 대해 추가적인 진료를 고민해보시는 것이 좋겠습니다. 정형외과를 다시 방문해보시길 권해드립니다.

입술 각질 매일 생김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각질이 지속적으로 일어나는 상황도 구순염의 증상이라 볼만한데 아직 증상이 지속된다고 볼 여지가 있으므로 추가적인 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 일반적으로는 바세린과 같은 보습제가 피부염 호전에 도움이 되므로 잘 낫지 않는 상황은 피부과 진료가 필요하다고 판단해야 하겠습니다.

물결명자차만 먹어도 충치 생기나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 충치를 유발하는 원인균은 당분을 섭취하며 성장하므로 당분이 전혀 없는 차 종류를 드시는 것이 충치 위험을 높인다고 보기는 어렵겠습니다. 따라서 걱정하시지 않아도 괜찮습니다.

무병변일시 성병 전염율,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 증상이 없다면 감염될 확률은없다고 보셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

위내시경 결과에 따른 질문이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 육안적으로 암으로 진행할 가능성이 없는 위저선 용종일 경우 조직검사를 하지 않는 경우가 많습니다. 검사 결과에 대하여 담당의에게 문의를 하기 바랍니다.

안압과 망막의 연관성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안압과 망막 및 황반 질환은 아무런 연관이 없습니다. 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

생식기쪽 피부에 혹처럼 난결 짜버렸어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종에 염증이 생겨서 커진것을 그냥 짜신것이 아닌가 싶습니다. 그리고 커졌다면 진료를 받고 항생제 복용이 필요해 보입니다

피지낭종 짜낸 환자,안녕하세요. 메디이즈입니다. 7월까지 버티실수 있으면 버티셔도 되지만 염증이 생기면서 붓고 많이아프면 항생제 복용이 필요할 수 있습니다. 학교병원이라도 가보시는 것이 좋을 것 같습니다

코에 뭐가 올라왔습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 함께 농양이 합병된 것인데 항생제 복용 및 배농이 필요할 수 있습니다. 손으로 만지지 말고 진료를 보시기 바랍니다.

마그네슘,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네. 변비약으로 사용하는 마그네슘 제제는 보통 산화 마그네슘입니다. 변비해소용으로는 산화마그네슘을 드시는것을 추천드립니다.

피부에 검갈색 원 모양이 생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 색소성 병변이라 보이고 모양이나 색을 보아 악성을 의심할만한 상태는 아니라고 보여집니다. 다만 걱정스럽거나 변화를

느끼시는 상황이라면 피부과 전문의를 찾아가 정확한 진단을 받아보시기 바랍니다.

곤지름인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 귀두 아랫부분에 다수의 구진이 관찰됩니다. 진주 양구진의 모습이라 보이며 양성병변이고 미용적 목적으로 제거를 시도하기도 합니다. 필요하다면 가까운 비뇨의학과를 방문해 진료받아보시면 되겠습니다.

코 푸는방법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 콧구멍의 변형을 유발하지는 않지만 수돗물이 코 점막을 자극할 가능성은 있습니다. 코 점막이 자극되면 콧물 분비가 또 늘어난다거나 점막이 부어오를 수 있겠습니다. 비염 증상의 관리를 위한 행위이므로 대신하여 생리식염수 코세척을 시도해보시는 것이 좋겠습니다.

치질인지.. 피.. 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 핏덩이는 출혈된 혈액이 고여있다가 나올 때 관찰되는 것이고 상당한 양의 출혈이 지속되는 상황으로 보입니다. 항문외과에서의 진료가 필요한 상태이고 수술까지도 고려해야 할 가능성이 있습니다. 반드시 병원을 방문하시기 바랍니다.

가슴에 이상한게 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이와 증상을 고려하면 여성형유방 여유증일 가능성이 가장 높습니다. 사춘기에 발병하는 경우가 흔하고 시간이 지나 자연히 사라질수도 있지만 영구적으로 유지되는 경우 수술적 제거가 필요하기도 합니다. 유방외과를 방문하여 진찰받고 확인해보시기를 권해드립니다.

바디워시 모르고 섭취?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 바디워시를 일부 삼켰을 가능성은 존재합니다만 그 양이 극히 적을 것으로 보입니다. 일부 섭취하게 되더라도 문제가 발생하지는 않는 편입니다. 만약 배가 아프다거나 구역질이 나고 설사를 하는 등의 소화기증상이 나타나면 그때 진료를 받아보시면 되고 괜찮다면 신경쓰지 않고 지내셔도 괜찮습니다.

새끼손가락 밑에가 부은거같아요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 외상으로 인한 혈종이 아닐까 추정됩니다만 진료를 통해 구체적인 정체에 대해 알아보아야 할 것이라 보입니다. 손가락의 감각이상도 동반한 상황이라 정형외과 진료가 필요하다고 볼 수 있습니다. 가까운 의원을 방문해보시기 바랍니다.

배꼽 윗배 튀어나옴,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신 증상으로 특정한 질환을 의심하기는 어렵겠습니다. 3년 전 심한 외상을 입은 적이 있었다면 당시 명이 든다거나 내장기관의 손상을 유발했을 것인데 그러한 질환에 대해 치료받은 기억이 없다면 딱히 원인으로 지목하기 어렵겠습니다.

옆 허벅지영덩이쪽에 빨간게생겼어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 같은 피부병변으로 인한 염증반응이 추정됩니다. 몸 여기저기에 비슷한 병변이 많이 발생한다면 치료를 통해 증상 호전을 기대할 여지가 있으므로 가까운 피부과를 방문해 진료받아보시기를 권해드립니다.

코 연골 푹소리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 외상을 입으면서 코가 붉어지고 부어오르며 명이 드는 등의 변화를 유발한다면 영구적인 변형을 유발할만한 가능성이 있는 상황이라고 볼 수 있겠습니다. 하지만 질문자님의 말씀으로는 이러한 변화가 보이지 않는다는 것으로 이해되어 코의 형태 변화는 없을 것이라 추정됩니다.

지루 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료방법은 원인에따라 다를 수 있습니다. 그래서 먼저 원인이 무엇인지 알아보는게 중요합니다. 신체적으로 이상은 없는지 혈액검사로 확인해볼수가 있고 약물 부작용 때문인지 약복용력도 알아볼 필요가 있고요. 특히 심리적인 요인이라고 할때는 불안 스트레스를 해소하는 방법이 있겠죠 일단 전문 의료인을 만나 상담을 하고 결정하시는게 좋겠습니다.

피부염,안녕하세요. 메디이즈입니다. 알레르기 반응에 의한 두드러기성 병변이거나 진균에 의한 피부감염증을 의심해보아야 하는 상태로 추정됩니다. 1주일째 나아지지 않는 상황이니 가까운 피부과를 방문해 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다.

잠 잘때 가슴답답 호흡의식 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀하신대로 고양이 털에 알레르기가 있는데 고양이를 기르고 계시니 털이 많이 날리는 시기에 호흡곤란이나 기침 가슴 갑갑함 등의 증상이 심해질 여지는 있을 것이라 보입니다. 우선은 내과를 방문해 의견을 들어보시고 필요하다면 반려묘와 한동안 격리생활을 해보시는 것이 필요할 수 있겠습니다. 또 내과적 문제가 아닌 경우에는 불안감이 갑갑함이나 호흡곤란을 유발했을 가능성도 있습니다. 이 경우 정신건강의학과에서 불안에 대한 진료를 받아보시는 것이 도움이 되겠습니다.

가끔 뜬금 없이 발생하는 왼쪽 가슴 통증이 궁금합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 기흉이 잘생길 수있는 마른체형을 가지고 계시는 군요 자발성 기흉인경우 저절로 완치되는 경우가 많지만.. 재발하는 경우도 많습니다. 현재 증상으로 봤을때 기흉이 재발한 것으로 보이니 빨리 호흡기내과 진료를 보시고 재발하지 않도록 처치를 받는게 좋겠습니다. 몸이 한쪽으로 기울이는 자세를 취하거나 같은자세를 오래 유지하면 증상이 악화될 수 있으니 주기적으로 자세를 바꿔주는게 좋겠습니다.

배속에서 쿵닥쿵닥,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배를 꼭 누르면 쿵닥쿵닥 하는 소리는 심장 박동이 아니라 장기의 움직임입니다. 장기는 끊임없이 움직이면서 소화 배설 호흡 등 다양한 활동을 합니다. 따라서 배를 누르면 장기의 움직임이 느껴질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

빵을 자르다가 베였는데 파상풍 위험이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 얇아서 파상풍 감염의 위험을 걱정하지는 않아도 괜찮습니다. 또한 가정에서 일상적으로 사용되는 식기에서는 파상풍 균이 존재하기가 어려우니 너무 염려하지 마세요. 추가로 파상풍 균은 포유류의 장에 서식하므로 야외에서 발생한 지저분한 상처에 감염될 위험이 존재합니다. 접종은 10년간 유효하니 추후 10년이 되는 해에 추가접종을 받으시기를 권해드립니다.

지루 추가 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치료방법은 원인에따라 다를 수 있습니다. 그래서 먼저 원인이 무엇인지 알아보는게 중요합니다. 신체적으로 이상은 없는지 혈액검사로 확인해볼수가 있고 약물 부작용 때문인지 약복용력도 알아볼 필요가 있고요. 특히 심리적인 요인이라고 할때는 불안 스트레스를 해소하는 방법이 있겠죠 일단 전문 의료인을 만나 상담을하고 결정하시는게 좋겠습니다.

공복에 약을 먹어도 되는지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베타정과 헤에프정은 공복에 복용하면 위장 장애가 발생할 가능성이 높으므로 식후 30분 정도 복용하는 것을 권장합니다.

물결명자차만 먹어도 충치 생기나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 충치를 유발하는 원인균은 당분을 섭취하며 성장하므로 당분이 전혀 없는 차 종류를 드시는 것이 충치 위험을 높인다고 보기는 어렵겠습니다. 따라서 걱정하시지 않아도 괜찮습니다.

음경이 간지러워요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계 후 음경이 간지러운 증상은 포경수술을 하지 않은 경우 귀두가 덮여 있는 부분이 간지러운 포경낭염일 가능성이 있습니다. 포경낭염은 귀두를 덮고 있는 포피가 염증을 일으키는 질환으로 성관계 후 면역력이 떨어지면서 발생할 수 있습니다. 포경낭염은 항생제 처방으로 치료할 수 있으며 성관계 후에는 깨끗한 물로 음경을 씻어주는 것이 좋습니다. 성병 검사를 받아야 하는지는 병원에 방문하여 진료를 받아보셔야 합니다.

손가락 염증의 원인과 치료법 문의드려요 감염내과외과피부과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 염증의 원인은 다양합니다. 감염 외상 자가면역질환 피부질환 종양 등이 원인이 될 수 있습니다. 따라서 손가락 염증이 생겼다면 정확한 원인을 파악하기 위해 병원에 방문하여 진료를 받아보시는 것이 좋습니다. 감염내과 외과 피부과를 모두 방문하여 진료를 받아보실 수 있습니다.

표피낭종?피지낭종?종기가 바깥으로 터졌습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 병원을 방문하기 전까지 상처부위 관리만 잘 하시면 되는 상황으로 보입니다. 지금처럼 포비돈으로 하루 두 번 소독하며 관리하시고 추후 병원 방문하셔서 치료적 처치를 받으시기 바랍니다. 방치하시면 감염증이 악화될 수 있습니다.

물결명자차만 먹어도 충치 생기나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 충치를 유발하는 원인균은 당분을 섭취하며 성장하므로 당분이 전혀 없는 차 종류를 드시는 것이 충치 위험을 높인다고 보기는 어렵겠습니다. 따라서 걱정하지 않아도 괜찮습니다.

생식기쪽 피부에 혹처럼 난걸 짜버렸어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종에 염증이 생겨서 커진것을 그냥 짜신것이 아닌가 싶습니다. 그리고 커졌다면 진료를 받고 항생제 복용이 필요해 보입니다

무병변일시 성병 전염율,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 증상이 없다면 감염될 확률은없다고 보셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

고환쪽 피부가 껍질이 벗겨짐사진있음,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

눈에 이상한게 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 나이가 많지 않아서 질환과 연관된 비문증 같아 보이지는 않습니다. 크게 신경 쓰지 않아도 될 거예요. 박테리아 같은게 보이는 것 말고 다른 증상이 생기면 안과 진료 받아보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

스테로이드 복용과 배란일 변화 연관성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 스테로이드 복용으로 호르몬의 변화로 인해 생리가 불규칙해지거나 생리지연 될 수 있습니다. 스테로이드 복용으로 인해 배란 자체를 유발하지는 않습니다. 확실치는 않지만 추가 배란으로 인해 임신가능성은 낮아보입니다. 생리지연으로 임신이 걱정되시면 임신테스트기로 자주 체크해보시고 산부인과 전문의와 상담받으시기 바랍니다.

생식기쪽 피부에 혹처럼 난걸 짜버렸어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피지낭종에 염증이 생겨서 커진것을 그냥 짜신것이 아닌가 싶습니다. 그리고 커졌다면 진료를 받고 항생제 복용이 필요해 보입니다

생리불순 임신확인혈액검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정으로 관계한 후 25일 이내에 임신 확인 혈액검사를 받으면 결과가 정확합니다. 생리불순이더라도 혈액검사를 통해 임신이 확인될 수 있습니다. 다만 생리불순이라면 초음파 검사를 통해 임신 여부를 확인하기 어려울 수 있습니다. 초음파 검사는 임신 6주 이후에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 따라서 질외사정으로 관계한 후 25일이 지났고 임신 여부를 확인하고 싶다면 혈액검사를 받으시기를 권장합니다.

무병변일시 성병 전염율,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 증상이 없다면 감염될 확률은없다고 보셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠

네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

항문찢어짐 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵을 앓고 계신 상황인데 찢어지는 느낌 많은 양의 출혈이 나온 상황이라 이해됩니다. 치열이 동반되었을 수 있겠고 푸레파인은 질환의 증상 조절을 위한 약 통증 완화이므로 근본적인 치료를 위해서는 항문외과 진료가 필요합니다. 약을 주입하기가 어려운 정도의 통증이 나타나고 있으니 진료를 받아보시기 바랍니다.

무릎 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적으로 우측 무릎에 어긋나는 느낌의 통증이 있었지만 하루 뒤 전혀 불편하지 않은 상태로 회복되었다면 치료가 필요할 정도의 큰 부상은 아니었다고 보아도 됩니다. 다친 부위가 계속 아프다거나 부어오르고 멍이드는 등의 반응을 보일 땐 진료를 받으시면 됩니다.

항문찢어짐 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치핵을 앓고 계신 상황인데 찢어지는 느낌 많은 양의 출혈이 나온 상황이라 이해됩니다. 치열이 동반되었을 수 있겠고 푸레파인은 질환의 증상 조절을 위한 약 통증 완화이므로 근본적인 치료를 위해서는 항문외과 진료가 필요합니다. 약을 주입하기가 어려운 정도의 통증이 나타나고 있으니 진료를 받아보시기 바랍니다.

눈에 이상한게 보여요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아직 나이가 많지 않아서 질환과 연관된 비문증 같아 보이지는 않습니다. 크게 신경 쓰지 않아도 될 거예요. 박테리아 같은게 보이는 것 말고 다른 증상이 생기면 안과 진료 받아보세요. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

고환쪽 피부 껍질 벗겨짐사진있어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 습진성 피부병변이라 보이고 헤르페스 병변은 아니겠고 이외 성병을 특정하여 의심하기는 어려울 것 같습니다. 잘 나아지지 않는다면 비뇨의학과를 다시 방문하여 진료받아보실 필요가 있습니다.

엉덩이 꼬리뼈 멍울,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둔부 중앙에 무언가 덩이가 만져지는 상황으로 이해됩니다. 정상적으로 덩이가 만져질만한 위치는 아니기때문에 해당 병변의 정체에 대한 파악이 필요합니다. 위치상으로는 신경외과 진료나 항문외과 진료가 가장 적절할 것으로 보이니 진료를 받아보시기 바랍니다.

추가 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 타박상이 심하면 근육손상으로 근육기능의 약화가 나타날 수 있습니다 1주일 지나서 좋아지면 괜찮다고 생각하셔도 됩니다

자위를 하고나서 소변을 보면 휴지에 피가 묻어서 나옵니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자위행위 후 출혈이 반복적으로 나타나는 경우 단순히 자극으로 인한 출혈이 아닐 가능성에 대해서도 확인이 필요하겠습니다. 부인과적 질환이 있다면 가벼운 자극에도 출혈이 보일 수 있어 이에 대한 진료가 필요하겠으니 가까운 산부인과를 방문해보시기를 권해드립니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥 가능성이 높기 때문에 홀터 검사를 제외하고 정확한 진단을 하는 것은 매우 어렵습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

자위를 하고나서 소변을 보면 휴지에 피가 묻어서 나옵니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자위행위 후 출혈이 반복적으로 나타나는 경우 단순히 자극으로 인한 출혈이 아닐 가능성에 대해서도 확인이 필요하겠습니다. 부인과적 질환이 있다면 가벼운 자극에도 출혈이 보일 수 있어 이에 대한 진료가 필요하겠으니 가까운 산부인과를 방문해보시기를 권해드립니다.

안압과 망막의 연관성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안압과 망막 및 황반 질환은 아무런 연관이 없습니다. 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 답변이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

소화불량 인데 자꾸 식욕이 땡기는 이유는 무엇일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 그래도 식욕이 있으시다는것은 없는것보다는 좋은 것 같습니다. 소화 잘되는 것을 찾아서 소량씩 드셔보세요. 밀가루 우유 커피 이런것은 소화가 잘안될수 있어요

과민성 대장 증후군 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상이 반복되었다면 과민성 대장 증후군 가능성이 가장 높습니다. 과민성 대장 증후군은 다른 질환이 원인을 아님을 감별한 후 진단이 가능하므로 소화기내과 내원하여 진료를 보는 것이 필요합니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

소화불량 인데 자꾸 식욕이 땡기는 이유???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 위염 식도염 위궤양과 같은 위장관 질환과 담낭 질환에 대한 평가가 필요하므로 위내시경과 복부 초음파 검사가 도움이 되니 소화기 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

목에서 소리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뒷목에서 푹 하는 소리가 들렸지만 통증이나 불편감은 없었다면 경추의 관절에서 보인 일시적인 증상일 것이라 예상됩니다. 통증이 동반되는 경우에는 진료가 필요하므로 경과를 관찰하시다가 불편해지시면 정형외과 신경외과와 같은 진료과를 찾아가보시기 바랍니다.

불안해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

남선 지루증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자위를 평소에 강하게 한다면.. 진짜 성관계시에는 자극을 느끼지 못할수 있습니다. 자위방식을 부드럽고 천천히 하는 방향으로 변경해보세요 지루증은 신체적문제가 있거나 심리적인 원인으로도 나타날 수 있습니다. 지루증인지 여부는 비뇨기와 전문의와 상담받으시기 바랍니다.

음식이 뜨겁거나 매우면 어지러워요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매겁나 뜨거운 음식을 복용하면 일시적으로 교감 신경이 자극되면서 반대 급부로 부교감 신경이 과도하게 항진되면서 상기 증상이 나타나는 것으로 보입니다. 신경과에서 검사를 받아 보시기 바랍니다.

뇌이상일까요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 차가운 음식을 먹으면 일시적으로 혈관 수축이 생기면서 상기 증상이 발생할 수 있습니다. 뇌이상 가능성은 매우 낮습니다.

아침에 허리통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육의 경직으로 인한 증상으로 보입니다. 특정 질환과 연관해서는 강직성척추염이나 섬유근통의 가능성을 고려해야 하므로 류마티스 내과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋을 것 같습니다.

주방세제를 실수로 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 문제가 될 가능성은 적습니다. 딱히 불편한 점이 없다면 경과관찰하시면 됩니다. 너무 걱정할 필요 없을듯합니다

단순지루수술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 부위 바로 옆 부분은 일시적으로 부을 수 있습니다. 시간 지나면서 상처가 아물면 점차 가라앉을 것이므로 크게 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 일시적으로 소량의 출혈은 있을 수 있으나 양이 많으면 수술 받으셨던 병원으로 문의 하시기 바랍니다. 감사합니다.

입술 각질 매일 생김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 각질이 지속적으로 일어나는 상황도 구순염의 증상이라 볼만한데 아직 증상이 지속된다고 볼 여지가 있으므로 추가적인 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 일반적으로는 바세린과 같은 보습제가 피부염 호전에 도움이 되므로 잘 낫지 않는 상황은 피부과 진료가 필요하다고 판단해야 하겠습니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요약 1. 대장암보다는 위장염이나 2. 감염 후에 생긴 과민성대장증후군에 준해 치료를 해야 할겁니다. 3. 전문약 복용하면서 식이 조절하면서 치료 경과를 봐주세요 4. 대장암은 아래와 같은 증상이 생깁니다. 대장암의 주된 증상으로는 배변습관 변화갑자기 변을 보기 힘들어지거나변 보는 횟수가 변하는 등 설사 변비 또는 배변 후 후중기

혈변 점액변 예전보다 가늘어진 변 복부불편감복통 복부팽만 체중 근육의감소 피로감 식욕부진 소화불량 오심과 구토 복부 종물 등이 있습니다. 건승하세요

황반원공 수술후 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2달째인데도 아직 원공이 닫히지 않았다면 경과가 양호하다가 말씀드리기는 조금 어려울 듯 합니다. 추가 주입도 많이 하셨네요. 위험하다고까지는 할 수 없겠지만 경과를 잘 보시는 게 좋을 거 같고 추가적인 치료 부분에 대해서는 수술 받으신 안과에서 잘 상의하시는 게 좋을 듯 합니다.

아벨리노 각막 이영양증이 있는데 드림렌즈 착용을 해도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아벨리노 환자에서 장기간 드림렌즈 착용시의 변화에 대해서는 아직 연구가 없는 걸로 알고 있습니다. 보통 단기간은 렌즈 잘 착용하고 세척하면 괜찮기는 합니다. 다만 1주일째 되었는데도 눈을 뜨고 있기 힘든 것은 정상적인 반응은 아니니 드림렌즈 처방 받은 안과에서 상의해 보시는 걸 추천드립니다.

음식이 뜨겁거나 매우면 어지러워요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매겁나 뜨거운 음식을 복용하면 일시적으로 교감 신경이 자극되면서 반대 급부로 부교감 신경이 과도하게 항진되면서 상기 증상이 나타나는 것으로 보입니다. 신경과에서 검사를 받아 보시기 바랍니다.

시신경유두부종 검사방법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 네 심한 경우 세극등 현미경을 통해 의사 육안으로도 시신경유두부종 확인이 가능하구요. OCT 안구광학단층촬영 를 통해 시신경을 검사 하는 경우 더 정확히 알 수 있습니다. 다만 광각안저촬영이랑 OCT 검사를 하셨다면 시신경유두부종이 의심되는 경우 추가 검사도 했을 거고 설명도 드리지 않았을 까 싶습니다. 너무 심려치 않으셔도 될 듯 합니다.

소화불량 인데 자꾸 식욕이 땡기는 이유는 무엇일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 그래도 식욕이 있으시다는것은 없는것보다는 좋은 것 같습니다. 소화 잘되는 것을 찾아서 소량씩 드셔보세요. 밀가루 우유 커피 이런것은 소화가 잘안될수 있어요

소화불량 인데 자꾸 식욕이 땡기는 이유???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기증상이 지속된다면 위염 식도염 위궤양과 같은 위장관 질환과 담낭 질환에 대한 평가가 필요하므로 위내시경과 복부 초음파 검사가 도움이 되니 소화기 내과 진료를 보실 것을 권해드립니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

질문드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 눈에는 큰 차이는 없겠습니다. 그리고 빛이 전부 차단되는게 속면에 조금 더 나을 수도 있겠지만 검정 시트 잘 붙이셨다면 살짝 비추는 정도는 크게 영향을 미치지 않는 듯 합니다. 감사합니다.

왼쪽 엉덩이 찌릿,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리가 불편하시군요. 해당 증상은 허리디스크 질환으로 의심됩니다. 가까운 정형외과를 방문하시기 바랍니다. 감사합니다.

수두 예방 주사 후 바로 결핵 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수두 접종당일에 결핵검사는 것은 큰 문제는 없을것 같긴 한데 검색해보니 주사 맞고 4주이내에 검사하지 않는 것이 좋다고 합니다

사마귀 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 병변이 이전에 사마귀가 맞다면 피부과에서 완전히 제거하는 것을 권합니다. 다른 부위로 감염이 될 수 있기 때문입니다.

사마귀 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 병변이 이전에 사마귀가 맞다면 피부과에서 완전히 제거하는 것을 권합니다. 다른 부위로 감염이 될 수 있기 때문입니다.

생리불순 임신확인혈액검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정으로 관계한 후 25일 이내에 임신 확인 혈액검사를 받으면 결과가 정확합니다. 생리불순이더라도 혈액검사를 통해 임신이 확인될 수 있습니다. 다만 생리불순이라면 초음파 검사를 통해 임신 여부를 확인하기 어려

을 수 있습니다. 초음파 검사는 임신 6주 이후에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 따라서 질외사정으로 관계한 후 25일이 지났고 임신 여부를 확인하고 싶다면 혈액검사를 받으시기를 권장합니다.

파상풍 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감염의 가능성은 높지 않지만 만약 걱정이 되신다면 파상풍 예방 접종을 권해드리며 파상풍 예방 접종은 10년 간격으로 접종을 권고하고 있어 접종한지 10년 이후라면 접종하면 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

엄지손가락 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동그라미 치신 부분은 엄지손가락의 관절이 위치하는 부분이라 보입니다. 손바닥뼈와 손가락뼈가 만나는 부위이고 엑스레이에서 뼈의 이상이 보이지는 않았으니 아마 이 부분을 유지하는 인대에 손상이 있었을 것이라 예상됩니다. 손의 사용을 제한하며 24주 정도 기다려볼만한텐데 이미 4주가 지난 상황이니 통증이 지속되는 상태에 대해 추가적인 진료를 고민해보시는 것이 좋겠습니다. 정형외과를 다시 방문해보시길 권해드립니다.

남자인데 음모 왼쪽부분이 가렵습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다. <https://www.youtube.com/watch?v=9Y8b6NwcbY>

주걱턱 교정 마무리단계 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비대칭이 약간 있는데 교합이 잘 맞춰진 상태고 주걱턱도 많이 완화돼서 마무리하자고 하시는데 왼쪽 얼굴은 딱 좋은데 오른쪽 얼굴 턱이 조금 아직 튀어나온 거 같은데 교합이 맞춰진 상태면 오른쪽 턱을 더 넣을 방법은 없는건가요? 아니면 아직 교정기를 떼지 않았는데 진료때 말씀드리면 어떤 방법으로든 시도해보긴 하시나요? 설명해주신 내용 만으로는 정확한 판단이 어렵지만 말씀해주신 내용은 턱 자체 모양에 의한 것으로보여집니다. 이 경우는 교정치료로 해결 할 수는 없는 것이구요 씹는 근육 때문이라면 보톡스 치료가 효과가 있을 수 있습니다.

엄지손가락 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 동그라미 치신 부분은 엄지손가락의 관절이 위치하는 부분이라 보입니다. 손바닥뼈와 손가락뼈가 만나는 부위이고 엑스레이에서 뼈의 이상이 보이지는 않았으니 아마 이 부분을 유지하는 인대에 손상이 있었을 것이라 예상됩니다. 손의 사용을 제한하며 24주 정도 기다려볼만한텐데 이미 4주가 지난 상황이니 통증이 지속되는 상태에 대해 추가적인 진료를 고민해보시는 것이 좋겠습니다. 정형외과를 다시 방문해보시길 권해드립니다.

생리불순 임신확인혈액검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 질외사정으로 관계한 후 25일 이내에 임신 확인 혈액검사를 받으면 결과가 정확합니다. 생리불순이더라도 혈액검사를 통해 임신이 확인될 수 있습니다. 다만 생리불순이라면 초음파 검사를 통해 임신 여부를 확인하기 어려울 수 있습니다. 초음파 검사는 임신 6주 이후에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 따라서 질외사정으로 관계한 후 25일이 지났고 임신 여부를 확인하고 싶다면 혈액검사를 받으시기를 권장합니다.

치근단절제술 이후 치아 흔들림 개선 가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치과 치료는 특성상 아무래도 임상증상 즉 환자분이 불편함을 느끼는 정도가 치료에 중요할 수 밖에 없습니다. 흔들리것 자체는 6 1년이 지나도 흔들리것은 개선이 쉽지 않을 가능성이 높습니다. 당장 아프거나 하신게 아니면 기다려 보신 후 생각해보십시오.

생리 끝나고 콘돔 찢어짐 임신 가능성 있을까요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를

바랍니다.

마약 테러에 노출되어 죽으면 어떡하죠?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 펜타닐과 같은 강력한 합성 오피오이드 마약에 비의도적으로 노출될 경우 매우 위험할 수 있습니다. 그러나 일반적인 상황에서 공기 중 가루 형태로 전파되어 중독되는 일은 거의 없습니다. 펜타닐은 피부나 눈 코 등의 점막을 통해 흡수될 수 있으므로 우발적 접촉 시 주의가 필요합니다. 그러나 공기 중 미량의 가루를 실수로 흡입했다고 해서 바로 중독 증상이 나타나지는 않습니다.

후라시닐정 부작용 항문 소양증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 후시닐정의 이상반응 중 피부발진이나 가려움증 생식기의 균주 변화와 같은 문제가 보고된 바있습니다. 항문에만 나타나는 반응이라 피부에 나타난 부작용이라고 해석하기는 어려울 것 같지만 같은 약을 복용할 때마다 같은 불편감을 느끼신다면 약물에 의한 이상반응을 추정해볼만합니다. 약을 처방받으신 병원에 한 번 더 문의해보시는 것이 좋겠고 약 중단이나 교체 등에 대해서도 고민해보실만한 상태로 보입니다.

콘돔 임신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 29일 자나고 임태기 해서 임신이 아니면 걱정은 안하셔도 괜찮을 듯 한데 생리가 불규칙하면 정확한 예측은 어렵습니다.

소화불량 인데 자꾸 식욕이 땡기는 이유는 무엇일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 너무 힘드시겠네요. 그래도 식욕이 있으시다는것은 없는것보다는 좋은 것 같습니다. 소화 잘되는 것을 찾아서 소량씩 드셔보श्य. 밀가루 우유 커피 이런것은 소화가 잘안될수 있어요

추가 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 타박상이 심하면 근육손상으로 근육기능의 약화가 나타날 수 있습니다 1주일 지나서 좋아지면 괜찮다고 생각하셔도 됩니다

림프종인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 림프종의 증상과 진단 방법은 다음과 같습니다. 증상 림프절의 비대 림프절이 커져서 만져지거나 통증이 동반될 수 있습니다. 발열 림프종의 종류에 따라 발열이 동반될 수 있습니다. 체중 감소 식욕이 감소하거나 체중이 감소할 수 있습니다. 피부 발진 피부에 발진이 생길 수 있습니다. 야간 발한 밤에 땀이 많이 나는 증상이 나타날 수 있습니다. 진단 림프종의 진단은 종양이 발생한 부위의 조직검사를 통해 이루어집니다. 일반적으로 림프종은 생검을 통해 조직을 채취하여 형태학적 면역조직학적 분자유전학적 검사를 실시합니다. 림프종의 세부 유형을 분류하기 위해 혈액검사 방사선검사 초음파 및 CT MRI 등의 영상진단도 사용됩니다. 아닌것 같은데 진료는 받아보श्य

Itp혈소판감소증과 리튬시럽 약물 내성,안녕하세요. 메디이즈입니다. ITP 치료에서 리튬시럽에 효과가 있었다면.. 재치료시에도 비슷한 효과가 나타날 것입니다. 리튬시럽의 내성은 드물기 때문에 크게 걱정은 안하셔도 될거 같네요. 자세한것은 혈액종양내과 담당의사와 상의해보는게 좋겠습니다.

건강한 자신에게 맞는 소식방법,안녕하세요. 메디이즈입니다. 밀가루를 피하시는건 잘하셨고 기름진 음식도 되도록 피하시는게 좋겠습니다. 대식을 하다 소식으로 바꾸려면 하루에 여러번 식사횟수를 늘리는게 좋겠습니다. 섬유질이 많은 음식을 찾아서 드시는게 좋겠어요. 유산균도 복용하고 있는데 추가로 프리바이오틱스유산균먹이도 드시는걸 추천드립니다. 자세한것은 소화기내과 전문의와 상담받으시기 바랍니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뇌압상승으로 인해 두통이나 실신을 유발할 수 있습니다. 말초신경장애가 있는 것으로 보아 신경전도검사나 신경학적 평가가 필요합니다. 구음장애 같은 경우도 신경학적 문제와 많이 연관이 있어보입니다. 빨리 신경과 진료를 받으시기 바랍니다.

ITP 리튬시럽과 약물 내성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 리튬시럽 재치료시에 대부분은 전과 같은 유사한 반응을 보이는 경우가 많고 소수에서 내성이 발생한다고 보고된다고 되어있습니

다. 대부분은 리튬시럽 재치료시에도 처음과 같은 효과가 있다고 보시면 되겠습니다. 혈액
종양내과 전문의는 아니여서.. 직접 담당의사와 상의해보는게 좋겠습니다.

콘돔 임신,안녕하세요. 메디이즈입니다. 29일 자나고 임태기 해서 임신이 아니면 걱정은 안하
셔도 괜찮을 듯 한데 생리가 불규칙하면 정확한 예측은 어렵습니다.

과민성 대장 증후군 일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상이 반복되었다면 과민성
대장 증후군 가능성이 가장 높습니다. 과민성 대장 증후군은 다른 질환이 원인을 아님을 감별
한 후 진단이 가능하므로 소화기내과 내원하여 진료를 보는 것이 필요합니다. 답변이 도움이
되었기를 바랍니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 부정맥 가능성이 높기 때문에 홀터 검사를 제외하고 정확한 진
단을 하는 것은 매우 어렵습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

불안해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우 정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질
외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내
외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

레보플록사신 독시사이클린 같이 복용해도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서
로 성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하
셔도 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

독시사이클린레보플록사신 같이 복용해도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기약은 서로
성분이 중복되거나 상호 작용이 없어 함께 복용해도 되겠습니다. 필요하다면 같이 복용하셔도
되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

수두 예방 주사 후 바로 결핵 검사,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수두 접종당일에 결핵검사하
는 것은 큰 문제는 없을것 같긴 한데 검색해보니 주사 맞고 4주이내에 검사하지 않는 것이
좋다고 합니다

여기저기 염증이 생겼는데 어느과를 가야할지 모르겠습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단
이비인후과 가십시오 코와 눈이 연결되어서 알려지 증상 후 생긴 경우도 많습니다. 먼저 가서
진료 후 다른 과 추천받는게 추천합니다.

왼쪽 엉덩이 찌릿,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리가 불편하시군요. 해당 증상은 허리디스
크 질환으로 의심됩니다. 가까운 정형외과를 방문하시기 바랍니다. 감사합니다.

자궁적출 여부 및 치료 방법 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술하시는 선생님께 따라 선
호하는 방법이 다른 것 같습니다. 자궁이 커서 무게가 있는 경우엔 2번 수술이 선호됩니다. 1
번 수술의 경우 메쉬를 걸어줄 인대가 충분하다는 장점이 있습니다. 수술자 환자분 상태에 따
라 수술 방법은 결정되니 진료 받으신 선생님과 충분한 상의를 통해 결정하시는 것이 좋을 듯
합니다. 감사합니다.

비중격 만곡증 질문 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아닙니다. 안경때문에 이런 경우
는 거의 없습니다. 오히려 이전에 기억이 안 나겠지만 주먹이나 공으로 코를 다친 후 생긴 비
중격만곡증은 흔합니다.

생리 끝나고 콘돔 찢어짐 임신 가능성 있을까요 ??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이런 경우
정확한 임신 가능성은 추정하기 어렵지만 질외 사정을 하더라도 쿠퍼액에 활동성 정자가 존재
하므로 연구에 따르면 임신 가능성을 20 내외로 보고하고 있습니다. 답변이 도움이 되었기를
바랍니다.

왼쪽 엉덩이 찌릿,안녕하세요. 메디이즈입니다. 다리가 불편하시군요. 해당 증상은 허리디스
크 질환으로 의심됩니다. 가까운 정형외과를 방문하시기 바랍니다. 감사합니다.

텍 켈로이드,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비후성 반흔과 켈로이드 반흔은 사실상 구분이 어렵고 치료가 동일하므로 구분이 의미가 없습니다. 따라서 반흔이 사라지지 않는다면 피부과에서 조치가 필요합니다.

뇌이상일까요??,안녕하세요. 메디이즈입니다. 차가운 음식을 먹으면 일시적으로 혈관 수축이 생기면서 상기 증상이 발생할 수 있습니다. 뇌이상 가능성은 매우 낮습니다.

아침에 허리통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육의 경직으로 인한 증상으로 보입니다. 특정 질환과 연관해서는 강직성척추염이나 섬유근통의 가능성을 고려해야 하므로 류마티스 내과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋을 것 같습니다.

주방세제를 실수로 먹었습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 문제가 될 가능성은 적습니다. 딱히 불편한 점이 없다면 경과관찰하시면 됩니다. 너무 걱정할 필요 없을듯합니다

단순치루수술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 부위 바로 옆 부분은 일시적으로 부을 수 있습니다. 시간 지나면서 상처가 아물면 점차 가라앉을 것이므로 크게 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 일시적으로 소량의 출혈은 있을 수 있으나 양이 많으면 수술 받으셨던 병원으로 문의 하시기 바랍니다. 감사합니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요약 1. 대장암보다는 위장염이나 2. 감염 후에 생긴 과민성대장증후군에 준해 치료를 해야 할겁니다. 3. 전문약 복용하면서 식이 조절하면서 치료 경과를 봐보세요 4. 대장암은 아래와 같은 증상이 생깁니다. 대장암의 주된 증상으로는 배변습관 변화갑자기 변을 보기 힘들어지거나변 보는 횟수가 변하는 등 설사 변비 또는 배변 후 후중기 혈변 점액변 예전보다 가늘어진 변 복부불편감복통 복부팽만 체중 근력의감소 피로감 식욕부진 소화불량 오심과 구토 복부 종물 등이 있습니다. 건승하세요

부모님이 녹내장인데 영양제먹어도되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 루테인 성분은 황반변성에는 도움이 되지만 녹내장에는 큰 도움이 되지 않습니다. 담당의와 상의 후 복용하는 것이 좋겠습니다.

사마귀 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 병변이 이전에 사마귀가 맞다면 피부과에서 완전히 제거하는 것을 권합니다. 다른 부위로 감염이 될 수 있기 때문입니다.

사마귀 출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 병변이 이전에 사마귀가 맞다면 피부과에서 완전히 제거하는 것을 권합니다. 다른 부위로 감염이 될 수 있기 때문입니다.

두번의 위내시경동안 용종을 놓칠 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 작은 양성 용종은 발견이 되지 않았을 수도 있습니다. 위저선 용종이 육안상 명확하다면 조직검사를 하지 않는 경우도 있습니다.

파상풍 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 감염의 가능성은 높지 않지만 만약 걱정이 되신다면 파상풍 예방 접종을 권해드리며 파상풍 예방 접종은 10년 간격으로 접종을 권고하고 있어 접종한지 10년 이후라면 접종하면 되겠습니다. 답변이 도움이 되었기를 바랍니다.

곤지름일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 곤지름의 가능성은 낮습니다. 크게 걱정하지 마시고 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

남자인데 음모 왼쪽부분이 가렵습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 크게 걱정하지 마시고 우선 피부과 진료를 받도록 하십시오. 링크된 동영상에서 추가 설명 드리겠습니다.
<https://www.youtube.com/watch?v9Y8b6NwcbY>

매독,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 보통은 직접 접촉에 의해서 감염이 됩니다 하지만 본인도모르게 접촉이 되었을수도 있기 때문에 증상만

으로진단은 어렵습니다 검사를 통해서 확인하시는 것이 최선입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

로제듀오 아스피린 비타민 K,안녕하세요. 메디이즈입니다. 받으신 전문약은 고지혈약 복합제 그리고 저용량 아스피린 입니다 비타민 D K2 그리고 마그네슘 같이 복용 가능합니다 같이 복용하지는 마시고 전문약은 아침에 영양제는 점심에 드시면 더 안전하겠습니다

미오 이노시톨분말형을 선물 받아서 한달 넘게 복용 중인데요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이톨이 호르몬 관련 성분이기때문에 체중증가에도 영향이 있을 수 있고 갑상선에도 영향을 줄 수 있습니다 뿐만 아니라 여드름 양이 많아지거나 생리가 늦춰지는 영향도 있습니다 본인에게 안 맞다는 판단이 들었다면 복용을 중단하는 것이 맞습니다

영양제 복용법에 관해서 질문 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 음 일단 종류가 너무나 다양합니다 그리고 NOW 제품이 단일 제제로 많이 나오기는 하는데 서양사람들 기준이라서 함량이 높습니다 저는 직구를 추천드리지 않는 편입니다 그 이유로는 처음에는 효과가 있는 듯 느껴지겠지만 장기적으로 봤을때는 간과 신장에 무리가 옵니다 국내 제품으로 드셨으면 합니다

센시리베 복용 후 디어미순,안녕하세요. 메디이즈입니다. 센베 보다 디미 순이 조금더 함량이 낮기는 합니다 그러나 기대하는 피임의 효과는 거의 같기에 휴약기간 없이 쭉 복용하여도 괜찮습니다 간접과 직접 흡연 피해주시고 건강하세요

단순치루수술후,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 부위 바로 옆 부분은 일시적으로 부을 수 있습니다. 시간 지나면서 상처가 아물면 점차 가라앉을 것이므로 크게 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 일시적으로 소량의 출혈은 있을 수 있으나 양이 많으면 수술 받으셨던 병원으로 문의 하시기 바랍니다. 감사합니다.

피부의 붉은 반점과 가려움,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진만으로 진단할 수는 없지만 두드러기 증상으로 생각됩니다. 두드러기는 피부과에서 진료를 하고 있습니다. 다만 두드러기의 경우 자주 재발 할 수 있으며 경우에 따라서는 몇달간 지속되기도 합니다. 피부과에서 치료 후 호전이 있다면 지속적으로 치료 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다. 감사합니다.

갑작스러운 두드러기,안녕하세요. 메디이즈입니다. 두드러기 증상은 누구나 생길 수 있으며 원인은 음식 옷 먼지 등등 매우 다양하고 특정 원인을 찾지 못하는 경우도 있습니다. 두드러기는 자연적으로 시간이 지나면 가라앉지만 경우에 따라서는 며칠간 반복적으로 생길 수 있고 드물게는 3개월 이상 만성으로 진행하기도 합니다. 증상이 심한 혹은 일상 생활에 지장이 있는 경우 항히스타민을 복용하면서 경과를 지켜볼 수 있습니다. 감사합니다.

두피에도 굳은 살이 생길 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 장시간 압박이나 자극을 받는 부위는 피부가 두꺼워질 수 있습니다. 두피에 굳은 살이 생기는 경우는 매우 드문 현상입니다. 굳은 살은 한 번 생기면 잘 사라지지 않지만 압박이나 자극을 피하는 것이 중요합니다. 감사합니다.

매독,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 보통은 직접 접촉에 의해서 감염이 됩니다 하지만 본인도모르게 접촉이 되었을수도 있기 때문에 증상만으로진단은 어렵습니다 검사를 통해서 확인하시는 것이 최선입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

아침에 허리통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육의 경직으로 인한 증상으로 보입니다. 특정 질환과 연관해서는 강직성척추염이나 섬유근통의 가능성을 고려해야 하므로 류마티스 내과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋을 것 같습니다.

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 요약 1. 대장암보다는 위장염이나 2. 감염 후에 생긴 과민성대장증후군에 준해 치료를 해야 할겁니다. 3. 전문약 복용하면서 식이 조절하면서 치료 경과를 봐보세요 4. 대장암은 아래와 같은 증상이 생깁니다. 대장암의 주된 증상으로는 배변습관 변화갑자기 변을 보기 힘들어지거나변 보는 횟수가 변하는 등 설사 변비 또는 배변 후 후중기 혈변 점액변 예전보다 가늘어진 변 복부불편감복통 복부팽만 체중 근력의감소 피로감 식욕부진 소화불량 오심과 구토 복부 종물 등이 있습니다. 건승하세요

아침에 허리통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육의 경직으로 인한 증상으로 보입니다. 특정 질환과 연관해서는 강직성척추염이나 섬유근통의 가능성을 고려해야 하므로 류마티스 내과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋을 것 같습니다.

매독,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 보통은 직접 접촉에 의해서 감염이 됩니다 하지만 본인도모르게 접촉이 되었을수도 있기 때문에 증상만으로는진단은 어렵습니다 검사를 통해서 확인하시는 것이 최선입니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

팔꿈치 힘줄 튕김,안녕하세요. 메디이즈입니다. 힘줄이 아니라 척골신경이 아닐까 생각이 됩니다. 우선은 본인의 병명이 어떤 것인지를 명확히 알고 상담을 하신다면 더 좋은 결과가 있을 듯 하니 방문하셨던 신경외과를 재방문 하시어 자세한 상담을 받아보시면 좋겠습니다. 감사합니다.

일주일 전 부터 생긴 손가락 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정전기 때문이라 단정하기는 어려울 것 같습니다. 다른 원인도 생각해봐야 하니 가까운 정형외과를 방문하시어 진찰을 받아보시는 것이 좋겠습니다. 감사합니다.

에이즈 검사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 10주째 검사 받으시면 정확한 결과를 얻을 수 있습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

임신 가능성 사핍약 복용 관련,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가임기여부가 불확실하다면 가임기라고 생각하고 임신을 원하지 않는다면 사후 피임약을 3일 이내 복용해야 합니다. 질외 사정을 했다고 하지만 사정전에 남성 성기에서 나오는 쿠퍼액에도 정자가 포함되어 있습니다. 이로인해 임신의 가능성이 있습니다. 사후 피임약을 복용해도 피임율이 100는 아니라서 2주후에도 생리를 하지 않는다면 임신테스트를 해보아야 합니다.

잠꼬대 치매 전조증상 범위,안녕하세요. 메디이즈입니다. 잠꼬대 및 수면 중 동반되는 움직임 연관되어서 치매가 우려되시는 것 같네요. 기재해주신 증상과 나이 등을 미루어서 판단해볼 때 치매를 우선적으로 의심할 만한 개연성은 높아보이지 않습니다. 치매를 우려하시는 또 다른 이유 있으신지도 들어볼 필요가 있어 보입니다. 수면의 질과 유지시간 등에 대한 우선적인 평가가 필요해 보이고 하지불안증후군과 주기성 운동장애 등 수면운동장애 등을 진단하기 위해서 수면다원검사 등이 도움되리라 생각됩니다. 일상생활에서의 우울불안 평가 기타 스트레스 상황 기저의 성격 및 성향 등 종합적인 평가도 도움되리라 생각됩니다. 빠른 쾌유바랍니다. 문의주셔서 감사합니다.

뇌졸중이나 뇌경색일까 우려됩니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러가지 신체증상과 함께 심리적 불안감도 지속되시는 상황이시군요. 신체증상들에 대해 우선적인 검사와 진료들이 필요하시겠지만 아마도 여러 해당과들의 검사와 진료들은 이미 받으셨으리라 생각됩니다. 그럼에도 불구하고도 검사에서 보여지는 소견 이상으로 불안감과 신체증상이 지속된다면 심리적인 영향도 상당 부분 고려해볼 수 있겠습니다. 또한 응급실 방문할 정도의 두드러진 불안상황에

서 CT나 MRI 및 기타검사에서도 별다른 소견이 발견되지 않으셨고 공황증상에 대한 치료 후 다소 호전양상이 있으셨고 현재 공황치료를 받지 않는 상황에서 다시 악화되는 불안증상이 있으시다면 다시 한번 정신과적 평가 및 진료를 받아보시는 것이 도움되시리라 생각합니다. 현재 스트레스 상황들에 대한 객관적, 주관적 평가와 함께, 스트레스 관리방법 기저 성격 및 성향들에 대한 종합적인 평가도 도움되시리라 생각합니다. 빠른 쾌유바랍니다. 문의주셔서 감사합니다.

알 수 없는 증상때문에 답답합니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 정신과치료를 받고 계심에도 불구하고 여러가지 불편감이 지속되시나보네요. 알콜이나 기타 물질사용 없이도 기억이 끊기며 두통이 지속되는 등의 증상이 있다면 CT나 MRI등의 뇌영상검사 및 뇌파검사 등의 검사도 우선적으로 진행하시는 것이 좋을 듯합니다. 또한 정동기복과 함께 동반된 환청 및 충동조절상의 어려움 등의 증상이 지속된다면 양극성 정동장애 등에 대한 치료와 함께 추후 증상 호전 후 기타 ADHD 성향 등에 대한 평가도 고려해볼 수 있겠습니다. 빠른 쾌유바랍니다. 문의주셔서 감사합니다.

ssri증량 적응기,안녕하세요. 메디이즈입니다. SSRI 계통의 약물을 복용하고 계시는군요. 뉴람 5mg을 5주가량 복용하시고 10mg으로 증량하셨다면 통상적인 조절범주에 해당된다고 보여지지만 때로는 10mg에서도 용량변경 후 초기에 부작용으로 인해 불편하시는 경우도 있을 수 있습니다. 12주일 가량 10mg으로 더 복용해보시고 불편감 지속 시 다시 5mg이나 7.5mg으로 용량 감량하여 경과보시다가 다시 용량증량하시는 것도 가능하리라 보여집니다. 빠른 쾌유바랍니다. 문의주셔서 감사합니다.

크라운 치아 뿌리 염증 질문드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 옛날에 치아에 포스트를 세우고 크라운을 씌운 치아가 크라운 씌운지 오래돼서 교체를 하였습니다 지르코니아로 포스트 기둥은 그대로 두고 크라운만 교체를 하였는데 크라운 교체할 때 망치 같은 걸로 뽑고 교체 르루 했는데 그 이후부터 잇몸이랑 주변 부위에 통증이 너무 심합니다 그래서 치과를 방문하니 치아 뿌리 쪽에 염증이 생겼다고 했는데 교체하기가 충격으로 인해 생긴 건가요? 그래서 어떻게 해야 하나 여쭙보니 여기서 손을 더 대면 임플란트를 할 수 있으니 그대로 두 자고 하시더라고요 근데 제가 치아 뿌리 염증에 대해서 찾아보니 치근 단 절제술도 있고 잇몸을 열어서 염증을 긁어내는 치료방법도 있던데 왜 안 해주시고 그냥 쓰라고 하시는 건지 궁금합니다 그리고 무조건 임플란트밖에 방법이 없다고 하셔서 정말 그런 건가요 그대로 두고 더 써보자고 하시는데 점점 염증도 커지고 나중에는 더 심해져서 위에 치근단 치료 같은 것도 못 받는게 아닌지 궁금합니다 통증도 점점 심해지고 주변 치아까지 망가지는 게 아닌지 걱정됩니다 어떤 치료를 받아야 할까요 사진 첨부합니다 대학병원 치과보존과에 한번 가셔서 검사를 받아보세요. 진단을 하는 치과의사 마다 보는 관점과 역량이 다를 수 있습니다. 잘 치료 되실 수 있음 좋겠습니다.

치루절개술 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 진료를 직접했던 의사가 이상이 없다고 했는데 진료를 보지도 않고서 의견을 드리는 것은 적절치 않다고 생각합니다. 만약 문제가 된다면 다른 의사에게 직접 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 그렇지 않다면 진료 했던 의사의 소견을 믿고 며칠 경과를 지켜 보시다가 점차 심해지는 듯 하면 다시 진료를 받아 보시길 권유드립니다. 감사합니다.

항문 국소마취 항문샘,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사기로 인하여 항문샘에 손상이 될 가능성은 거의 없습니다. 항문샘 손상 여부는 물리적으로 확인 할 수 있는 특별한 방법이 있지도 않습니다. 감사합니다.

항문 주변 빨간원형,안녕하세요. 메디이즈입니다. 후날의 일반적인 부작용은 아니지만 약을 드신 후에 발생하는 것이라면 약이 원인일 수 있습니다. 약이 원인이라면 약 중단 후 증상이 좋아지게 되지만 다른 원인이라면 좋아지지 않을 것입니다. 그렇다면 진료를 받아 보시고 원인을 찾아 보시기 바랍니다. 감사합니다.

아기 감기약 관련 복약상담부탁드려요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 우선 진료후 기침의 원인을 알아야 답이 가능한 부분입니다 알려지에 의한 기침인지? 인후염등 상기도 감염에 대한 기침인지? 천식이나 기관지폐렴에 의한 것인지? 그 진단에 따라 약복용이 달라질 부분이라 일괄 답변은 어려우나 헤스를 복용한다면 2.5cc전후를 하루 34회주면 될 것입니다

뱃속에서 쿵닥쿵닥,안녕하세요. 메디이즈입니다. 배를 꼭 누르면 쿵닥쿵닥 하는 소리는 심장 박동이 아니라 장기의 움직임입니다. 장기는 끊임없이 움직이면서 소화 배설 호흡 등 다양한 활동을 합니다. 따라서 배를 누르면 장기의 움직임이 느껴질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

빵을 자르다가 베었는데 파상풍 위험이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상처가 얇아서 파상풍 감염의 위험을 걱정하지는 않아도 괜찮습니다. 또한 가정에서 일상적으로 사용되는 식기에서는 파상풍 균이 존재하기가 어려우니 너무 염려하지 마세요. 추가로 파상풍 균은 포유류의 장에 서식하므로 야외에서 발생한 지저분한 상처에 감염될 위험이 존재합니다. 접종은 10년간 유효하니 추후 10년이 되는 해에 추가접종을 받으시기를 권해드립니다.

공복에 약을 먹어도 되는지 궁금해요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 베타정과 헤에프정은 공복에 복용하면 위장 장애가 발생할 가능성이 높으므로 식후 30분 정도 복용하는 것을 권장합니다.

음경이 간지러워요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 성관계 후 음경이 간지러운 증상은 포경수술을 하지 않은 경우 귀두가 덮여 있는 부분이 간지러운 포경낭염일 가능성이 있습니다. 포경낭염은 귀두를 덮고 있는 포피가 염증을 일으키는 질환으로 성관계 후 면역력이 떨어지면서 발생할 수 있습니다. 포경낭염은 항생제 처방으로 치료할 수 있으며 성관계 후에는 깨끗한 물로 음경을 씻어주는 것이 좋습니다. 성병 검사를 받아야 하는지는 병원에 방문하여 진료를 받아보셔야 합니다.

손가락 염증의 원인과 치료법 문의드려요 감염내과외과피부과,안녕하세요. 메디이즈입니다. 손가락 염증의 원인은 다양합니다. 감염 외상 자가면역질환 피부질환 종양 등이 원인이 될 수 있습니다. 따라서 손가락 염증이 생겼다면 정확한 원인을 파악하기 위해 병원에 방문하여 진료를 받아보시는 것이 좋습니다. 감염내과 외과 피부과를 모두 방문하여 진료를 받아보실 수 있습니다.

이갈이 얼굴변화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 안면비대칭이나 얼굴 변화가 심하게 생길 가능성은 낮습니다. 그러나 이갈이는 치아와 턱관절에 손상을 줄 수 있으므로 치료를 받는 것이 좋습니다.

머리가 멍한거질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 괜찮습니다. 뒷목과 등부분의 긴장과 심리적 흥분에 의해 촉발된 교감신경 압박 또는 과흥분으로 해석합니다. 어찌면 만성적인 뒷목긴장이나 무리하지 않아도 지속되는 피로감 등이 있을 수 있습니다.

두통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 편두통으로도 모두 가능한 증상입니다. 다른 약을 복용해 보시고 해결되지 않으면 신경과에서 편두통에 특화된 트립탄 계열의 약처방이 필요할 수 있습니다.

얼음을 만지면 팔꿈치가 시럽고 아파요,안녕하세요. 메디이즈입니다.무지대립근도 척골신경의

지배 근육이며 팔꿈치 내측 주변도 척골신경 지배 영역입니다. 척골신경의 압박 병소 또는 7번 경추 신경 주변의 신경압박 또는 그 주변의 교감신경 압박 등이 가능합니다.

발목 뼈 소리 후 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 골절보다는 힘줄의 문제로 소리가 나는 경우가 많으며 인대가 파열되거나 하는 경우는 드뭅니다. 통증이 오랜 기간 지속되면 인대 손상의 가능성도 있습니다.

술마시고 팔저림 마비 근육떨림,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일시적일 가능성이 많습니다. 일단 술이 다 깨신후 하루이틀정도 증상이 더 지속된다면 병원 방문하셔서 상담을 받아보시는게 좋을것 같습니다만.. 증상 없어지신다면 술은 안드시는게 좋을것 같습니다. 감사합니다.

전립샘 마사지 걱정 불안,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 네 2. 그냥 가시면 됩니다 3. 아닙니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

현재 제가 처한 상황이 요도염에서 전립선염으로 넘어간 것이 맞나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 가능성은 있습니다 꾸준한 관리와 치료가 필요합니다 병원 지침대로 잘 관리받으시면 좋아질 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

Hiv 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 핸플이나 마사지는 감염 경로가 아니니 걱정안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

대상포진의 초기증상이 전혀 나타나지 않았는데 대상포진으로 볼 수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모낭염과 같은 피부질환은 단독의 병변이 부어오르는 모습을 보이므로 질문자님의 피부병변과는 거리가 있습니다. 또한 대상포진이 반드시 전신증상을 동반하는 것도 아닙니다. 물론 이러한 증상이 없었다는 점이 가능성을 떨어뜨리는 것은 맞습니다. 그럼에도 의심은 필요하며 말씀대로 가까운 피부과 의원에서도 진료가 가능합니다.

두통,안녕하세요. 메디이즈입니다. 편두통으로도 모두 가능한 증상입니다. 다른 약을 복용해보시고 해결되지 않으면 신경과에서 편두통에 특화된 트립탄 계열의 약처방이 필요할 수 있습니다.

위내시경 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 젊으시고 1년전 검사하셨고 증상이 3주 정도 되셨으니 일단 약물 치료를 먼저 받아보시고 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다

초,안녕하세요. 메디이즈입니다. 덩이의 경계가 비교적 뚜렷해보이고 모양새가 균일하여 양성 종양을 추정해볼 수 있겠지만 진료를 통해 확인해보셔야 할 것입니다. 가까운 정형외과를 방문하여 진료를 받아보시고 필요한 검사가 있을 수 있으니 보호자와 함께 방문하시는 것을 권해드립니다.

엉덩이 뻘루지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 둔부에 군집을 이룬 수포성 병변이 관찰되는 상태로 보이며 통증을 동반한 상황입니다. 이는 대상포진을 의심해보아야 하는 상황이라 보이므로 가까운 피부과나 신경과를 방문해 진료받아보시는 것이 좋겠습니다. 대상포진인 경우 항바이러스제 치료가 필요하겠습니다.

선생님 입원 치료라면 어느과로 가야하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 전신 두드러기가 심한 상황이라 추정됩니다. 일차적으로는 피부과가 가장 적합한 진료과이고 타 진료과의 추가진료가 필요할 시 진료본 의사가 진료의뢰서를 작성해줄 것이라 예상됩니다. 우선 피부과를 방문해보시기 바랍니다.

인데놀 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 인놀 propranolol과 이부프로펜은 특별한 상호작용이 보고되지 않은 약이므로 함께 복용하셔도 괜찮습니다. 다만 약 복용 후에도 증상 조절이 되지 않으면 추후 진료를 받아보시기 바랍니다.

겨드랑이 옆 양쪽팔뚝에 이유를 알 수 없는 빨간선이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 피부병변부위에 스테로이드 연고를 바르면서 경과를 지켜보셔도 괜찮을 것으로 생각됩니다.그러면 없어질것 같습니다

퇴행성 관절염 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 퇴행성 관절염 골관절염이 의심스러운 상황이라 고민스러우시군요. 해당 질환을 진단할 때 반드시 일어서서 엑스레이를 촬영해야 하는 것은 아닙니다. 구체적으로 어떤 방식의 촬영이 있었는지는 알 수 없으나 일반적으로 무릎 관절을 촬영하는 방식을 사용했을 것이므로 질문자님께서 찍은 촬영 사진에서도 퇴행성 관절염의 소견인 좁아진 관절 공간 뼈돌기 osteophyte의 형성 등이 관찰될 수 있을 것이고 이를 통해 질환을 추정할 수 있습니다. 물론 초기 퇴행성 관절염인 경우에 엑스레이가 정상처럼 보이는 경우도 있습니다. 따라서 질문자님께서 검사받으실 때 정상적인 소견을 보였으나 의심스러운 증상이 지속되면 재방문을 권해드릴 수 있습니다. 다만 질문자님께서 호소하시는 증상인 무릎 관절 움직임 시 소리가 들리는 문제는 퇴행성관절염을 의심할만한 증상이라 보긴 어렵습니다. 주된 증상이 통증이고 무릎 관절을 제대로 굽히지 못하게 된다면 부어오르는 증상 등이 동반될 수 있습니다. 따라서 이러한 증상이 없다면 너무 신경쓰지 마시고 근육운동을 저강도부터 천천히 시도해보시기 바랍니다.

페인트 성분이 묻은 손으로 직접 음식을 먹으면 몸에 많이 나쁠까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 페인트를 일부 섭취하신 것 같아서 걱정스러우시군요. 상당한 양의 페인트를 섭취한다면 당연히 문제가 발생하겠지만 질문자님의 상황은 손에 묻어있는 정도의 적은 양을 섭취한 상황이므로 그리 문제가 되지 않을 것입니다. 그럼에도 이물질을 섭취했을 때 복통 구토 설사 혈변 발열 등의 증상이 나타나는 경우에는 반드시 진료가 필요하니 23일 경과를 살피시고 문제가 있다고 생각되시면 꼭 병원을 방문하시기 바랍니다.

수분섭취를 많이 했을때 눈에 안좋은경우가 있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수분 섭취를 한다고 눈에 문제가 발생하지는 않습니다. 개별적인 특수한 상황이 있을 수 있지만 일반적으로는 문제가 없습니다.

피부 두드러기 간지러움 증상 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인은 정확하게 알기는 어렵습니다. 혈관염의 형태로 나타나는 알러지 반응이 아닌가 의심스럽습니다. 항히스타민 스테로이드로 치료가 필요해보입니다

뼈이식 임플란트 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 뼈이식이 일반 임플란트와 비교하여 통증이 심한 것은 아닙니다. 하지만 이식뼈가 자리 잡을 때까지 시간이 걸리므로 일반 임플란트에 비해 시간이 더 많이 소요될 뿐입니다.

수술 공포증 원인을 알면 해소할수있을까요?,안녕하세요. 요약 정신의학과에서 불안장애에 대한 조언을 얻으세요. 불안장애는 다양한 형태의 비정상적 병적인 불안과 공포로 인하여 일상생활에 장애를 일으키는 질환입니다. 불안장애에 해당하는 질환으로는 공황 장애광장공포증을 동반하거나 하지 않는 특정 공포증고소 공포증 혈액 공포증 뱀 공포증 등 사회 공포증 강박 장애 외상 후 스트레스 장애 범불안장애 급성 스트레스 장애 등이 있습니다. 건승하세요 입술이 안 다물어져도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비발치로 교정 중인데 비발치의 한계 때문인지 제 골격 때문인지 마무리 단계임에도 입술이 많이 다물어지지 않습니다. 입을 꼭 다물면 주변 근육이 긴장해있고 호두턱이 돼요. 발치교정으로 바꾸지 않고 그냥 이대

로 마무리 하려고 하는데 앞으로 이 상태로 살아도 괜찮을까요...? 항상 입이 열려있어 둔해 보이는 심미적인 문제 외에 기능적으로 구강 건강에 문제가 생길 수 있는지 궁금합니다 설명해주신 내용 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다. 맨뒤쪽 사랑니를 빼고 전체 치아를 뒤쪽으로 넣는 방법도 있습니다

입벌릴 때 과두가 한쪽만 더 튀어나오는 것도 턱관절 장애의 증상인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 턱관절 장애라고 하기는 어렵지만 부정 교합 등이 있을 수 있어 구강내과나 교정과 진료를 보시는 것이 도움이 될 것으로 판단됩니다.

손목 손가락 목이 자주 아픕니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자세하게 진찰이 필요할 것 같습니다. 증상으로만 보면 크게 우려할 만한 일은 아닌것 같습니다. 빨리 회복하시길 바랍니다 철봉 매달리기를 할 때 몸을 완전히 이완시키나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 목적에 따라 다를 수 있는데 아무래도 등 근육에 적당하게 힘을 주고 매달리는 것이 좀더 도움이 될것 같다고 생각합니다.

피부가 너무나도 갑작스럽게 이상해져서 질문을 드립니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 체리혈관종의 정확한 원인은 밝혀진 바 없습니다. 하지만 자외선에 노출 임신 등의 이유로 모세혈관이 정상적이지 않게 확장되면 발생할 가능성이 높고 30대 이후 주로 생기는 것으로 볼때 노화현상과 관련이 있을 것으로 생각합니다. 체리혈관종은 유전 경향이 있는데 부모님이 체리혈관종이 많다면 자녀들도 많을 가능성이 높은 것이지요.

원판형 반월상 연골 만,안녕하세요. 메디이즈입니다. 웨이트를 적당하게 해서 관절 주변의 근육들을 조화롭게 강화시키면 아마도 문제없이 파열없이 유지할 수 있습니다.

이거 켈로이드 된건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에 아직 켈로이드라고 이야기 하기는 어려울 것 같습니다. 부위는 어디인가요? 찔것은 얼마나 오래되었나요?

이거 켈로이드인가요 라는 질문을 보낸 사람입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 좀 지켜보셔야 할 것 같습니다. 원래 켈로이드가 생기는 체질이 아니라면 크게 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다. 좋아지는데 시간이 좀 걸릴것 같습니다

임산부는 레진아트 하면 안되나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀 드리기 어려운 문제이며 이에 대한 정확한 연구가 있는 것은 아닙니다. 하지만 일반적으로 위와 같은 환경은 태아와 임산부에게 좋지 않은 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다.

목을 돌릴때 승모근과 어깨가 연결된 부분이 바늘찌르는 고통이 생깁니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 목을 돌릴때 사용하는 근육에 손상이 있었던 것으로 생각합니다. 진찰검사를 통해 문제증상을 일으키는 곳을 치료 받아보셔요

이거 혹시 성병일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 곤지름헤르페스매독HIV 감염과 같은 성병의 특징적인 병변이 관찰되지 않으므로 성병의 가능성은 낮습니다. 작은 피부 병변으로 생각되는데 크기 변화가 있다면 진료를 보시기 바랍니다.

가슴 통증흉통이 지속되고 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기침하다가 생긴 통증이 있으시고 엑스레이에서 이상이 없고 하면 추가적으로 검사는 더 필요할 것 같지는 않습니다.

고,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치매일 가능성은 없습니다. 아마도 다른 것에 더 집중하다가 보니 덜 중요하다고 생각되는 부분은 놓친것이 아닌가 싶습니다 계속되거나 더 심해지면 진료 받아보셔요

Hiv 관련 질문입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 핸플이나 마사지는 감염 경로가 아니니 불안하셔도 될 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다

다.

협심증이 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생활 습관이 불량했다고 해도 2년만에 협심증이 발생할 정도의 동맥경화가 진행되는 경우는 흔하지 않습니다. 증상이 없다면 너무 걱정하지 않아도 됩니다.

채용 신체검사에 관련하여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 이 사실을 신검전에 이야기 해보세요. 신검시 하는 검사는 정밀검사가 아닌 rpr검사를 하게 되는데 완치되었으면 여기서 음성으로 나올 수도 있어요. 정밀검사에서는 양성으로 나올겁니다

후두염에 역류성 식도염 약을 계속 먹어야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 후두염에도 역류성 식도염 약을 복용합니다 지금 증상이 별로 없으시다고 하면 약물사용을 중단해볼 수 있습니다. 지금 불편한 증상은 무엇인가요?

크레아티닌수치 신사구체여과율 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 근육운동후에 creatinine수치가 좀 오를 수 있습니다. 운동하지말고 검사 한번 받아보श्य Cr 수치는 검사 때마다 좀 차이가 있을 수 있습니다 cystatin c는 초기 신장질환 발견에 유용하다고 합니다 2. 다음은 EGFR에 따른 만성 신장병 단계 분류입니다. 1.1단계 EGFR 90mL분1.73m2 이상 신장 기능이 정상이거나 약간 저하된 상태입니다. 대부분의 경우 증상이 나타나지 않습니다. 2.2단계 EGFR 60-89mL분1.73m2 신장 기능이 다소 저하된 상태입니다. 증상이 나타날 수 있으나 대부분의 경우 일상생활에 지장이 없습니다. 3.3단계 EGFR 30-59mL분1.73m2 신장 기능이 중등도 저하된 상태입니다. 증상이 뚜렷해지며 적극적인 치료가 필요합니다. 4.4단계 EGFR 15-29mL분1.73m2 신장 기능이 심하게 저하된 상태입니다. 혈액투석이나 복막투석 등의 신대체요법이 필요합니다. 5.5단계 EGFR 15mL분1.73m2 미만 신장 기능이 완전히 저하된 상태입니다. 신대체요법이 필수적입니다. 3. 근육사용량이 너무 많으면 횡문근 용해증으로 신기능악화가 나타날 수 있습니다 4.. 사안별로 판단해야 하는데 운동이 신기능을 나쁘게 할 가능성은 거의 없다고 생각합니다

글 읽기가 힘듭니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시죠?난독증이라는 상태가 아닌가 싶은데요. 정확한것은 진료를 통해 확인받아보시는 것이 필요하다고 판단됩니다.

하지불안증후군이 몸통에도 나타나나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지불안증후군은 주로 다리에 불편한 느낌이 나타나지만 몸통에도 나타날 수 있습니다. 하지만 이증상이 하지불안증후군때문인지는 확실하지 않으니 진료 받아보श्य

질문이거 곤지름인가요 뽀루지인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 캔디다 질염이 있는 경우에 하얀색 치즈 같은 분비물이 있을 수 있습니다. 치료가 다 종료된다음 다시 진료 받아보श्य

고,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흡연한지는 얼마나 되셨나요? 이제 부터라도 금연하시는 것이 좋을 것 같습니다. 폐렴에서 폐암으로 발전되지는 않습니다.

임태기 내일 써도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리임태기는 보통 열흘정도는 지난 다음에 사용하는 것이 원칙입니다. 너무 일찍하시는 것은 별 도움이 되지 않을 수 있습니다

저기 머하나 여쭙볼게요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 소변보면서 불편한 증상 통증 잔뇨감 빈뇨 가 동반되면 방광염의 가능성이 높으니 가정의학과 방문하셔도 되고 배뇨 증상이 없으면 비뇨의학과 방문해보श्य

코콜이를 고칠수 있는 방법이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 상태를 알기위해서는 수면 다원 검사가 필요합니다. 검사 결과에 맞추어서 어떤치료가 필요할지 결정하시는 것이 좋겠습니다

조영제가 몸에 쌓였는지 검사받을수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제는 영상진단 검사 시 특정 조직이나 혈관이 잘 보이도록 인체에 투여하는 약물로 MRI에는 가돌리늄을 CT에서는 요오드화물을 주로 사용합니다. 조영제 배출 시간은 다음과 같습니다. 대부분의 조영제는 24시간 이내에 90 이상이 소변으로 배출됩니다. 조영제 검사 후에는 물을 많이 마시는 것이 조영제의 배출에 도움이 됩니다. 검사하는 방법은 따로 없는것 같습니다

정신과 약때문에 성관계시 쾌감이 안느껴지는걸까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정말 고민 많으시지요? 약에 대한 부작용은 개인차가 심합니다. 약의 영향이 있을 수도 있는데 주치의 선생님과 약 변경에 대하여 상의 가 필요할 것 같습니다

치주염일까요? 치은염인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 22세 남성이고요 최근 치실질을 하면 잇몸에서 피가 나옵니다. 2달전 치과에서 명백한 치은염이라 하여 열심히 관리중인데요 문제는 열심히 관리해서 보통 치주염증이 가라앉고 치실까지쓰면 확실히 피가안나고 빨리 개선되는걸 느끼긴하지만 가끔 구내염으로 귀찮다고 23일정도 양치질을 안했을때 금방 다시 치실질때 피가 나더라구요. 다행히 구취가 시림통증등은 일절없어 다음주에 스케일링하러갈예정인데 지금도 이상황이라면 치은염이 완치되지않은건지 아님 치주염으로 더 진행되어서 그런건지 궁금합니다. 그리고 치주염은 반드시 잇몸치료가필요한지 아님 스케일링과 관리여하에따라 달라지는지 알고싶습니다. 치주염인지 치은염인지 상태가 중요하다기 보다는 지금 현재 상태를 어떻게 좋아지게 할 것인가를 고민하는게 중요합니다. 치과에서 스케일링 잇몸 치료를 받으시고 올바른 양치질 방법도배우시는게 좋을 듯 합니다

전거근 약화 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 압박에의한 일시적인 타박상? 근육손상일 가능성이 높습니다. 어떤근육인지는 자세한 진찰이 필요합니다. 시간이 지나면서 저절로 좋아지실 것 같습니다

허리디스크 주사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 증상이 없고 괜찮으시다고 하면 이전에 한번밖에 맞지 않은것이 문제가 되지는 않습니다. 다시 증상이 나타날 수 있으니 체중은 좀 줄이시는 것이 좋겠습니다

입술이 안 다물어져도 괜찮은가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 비발치로 교정 중인데 비발치의 한계 때문인지 제 골격 때문인지 마무리 단계임에도 입술이 많이 다물어지지 않습니다. 입을 꼭 다물면 주변 근육이 긴장해있고 호두턱이 돼요. 발치교정으로 바꾸지 않고 그냥 이대로 마무리 하려고 하는데 앞으로 이 상태로 살아도 괜찮을까요...? 항상 입이 열려있어 둔해 보이는 심미적인 문제 외에 기능적으로 구강 건강에 문제가 생길 수 있는지 궁금합니다 설명해주신 내용 만으로는 정확한 판단이 어렵습니다. 맨뒤쪽 사랑니를 빼고 전체 치아를 뒤쪽으로 넣는 방법도 있습니다

소음순 수포,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생긴지는 얼마나 오래 되었나요? 혹시 성 매개성 질환일 가능성도 있으니 비뇨의학과 진료 받아보시는 것을 권합니다

위내시경 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 젊으시고 1년전 검사하셨고 증상이 3주 정도 되셨으니 일단 약물 치료를 먼저 받아보시고 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다

무통증 협심증도 존재하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없는협심증 경우도 있을 수는 있지만 비교적 드문일이고 심전도상 정상이고 지금 나이가 젊으니 가능성은 떨어져 보입니다 스트레스 같은 심리적인 이유일 수도 있습니다. 소화기 질환일수도 있구요

무통증 협심증도 존재하나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통증이 없는협심증 경우도 있을 수는 있지만 비교적 드문일이고 심전도상 정상이고 지금 나이가 젊으니 가능성은 떨어져 보입니다 스트레스 같은 심리적인 이유일 수도 있습니다. 소화기 질환일수도 있구요

심장이 쿵쿵거립니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장이 쿵쿵거림 증상이 반복되고 지속되거나 악화 된다고 하면 이것은 스트레스 때문에 나타나는 경우도 있지만 부정맥은 없는지 진료가 필요할 수 있습니다

위내시경 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 나이가 젊으시고 1년전 검사하셨고 증상이 3주 정도 되셨으니 일단 약물 치료를 먼저 받아보시고 경과를 지켜보셔도 될것 같습니다

약간 불안장애? 강박증 같은게 있는거같은데 이게 좀 심해져요 ...안녕하세요. 메디이즈입니다. 본인이 불편감을 자각하고 있고 일상생활에 지장이 있다면 정신건강의학과 진료를 보는 것이 바람직한 판단으로 생각합니다. 예정대로 진료를 보시기 바랍니다

목을 돌릴때 승모근과 어깨가 연결된 부분이 바늘찌르는 고통이 생깁니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 목을 돌릴때 사용하는 근육에 손상이 있었던 것으로 생각합니다. 진찰검사를 통해 문제증상을 일으키는 곳을 치료 받아보셔요

고,안녕하세요. 메디이즈입니다. 치매일 가능성은 없습니다. 아마도 다른 것에 더 집중하다가 보니 덜 중요하다고 생각되는 부분은 놓친것이 아닌가 싶습니다 계속되거나 더 심해지면 진료 받아보셔요

선생님 급성 두드러기의 원인이 무엇일까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 두드러기는 다양한 원인으로 인해 발생할 수 있습니다. 1.음식물 새우 조개 견과류 계란 등의 음식물이 원인이 될 수 있습니다. 2.약물 항생제 진통제 소염제 등의 약물이 원인이 될 수 있습니다. 3.감염 바이러스나 세균 등의 감염이 원인이 될 수 있습니다. 4.스트레스 스트레스가 원인이 될 수 있습니다. 5.기타 온도 변화 햇빛 알레르기 등이 원인이 될 수 있습니다. 검사를 해도 정확한 원인을 찾는 것은 어려운 경우가 흔합니다

채용 신체검사에 관련하여,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단 이 사실을 신검전에 이야기 해보세요. 신검시 하는 검사는 정밀검사가 아닌 rpr검사를 하게 되는데 완치되었으면 여기서 음성으로 나올 수도 있어요. 정밀검사에서는 양성으로 나올겁니다

심장이 쿵쿵거립니다.안녕하세요. 메디이즈입니다. 심장이 쿵쿵거림 증상이 반복되고 지속되거나 악화 된다고 하면 이것은 스트레스 때문에 나타나는 경우도 있지만 부정맥은 없는지 진료가 필요할 수 있습니다

후두염에 역류성 식도염 약을 계속 먹어야 할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 역류성 후두염에도 역류성 식도염 약을 복용합니다 지금 증상이 별로 없으시다고 하면 약물사용을 중단해볼 수 있습니다. 지금 불편한 증상은 무엇인가요?

크레아티닌수치 신사구체여과율 관련 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 1. 근육운동후에 creatinine수치가 좀 오를 수 있습니다. 운동하지말고 검사 한번 받아보셔요 Cr 수치는 검사 때마다 좀 차이가 있을 수 있습니다 cystatin c는 초기 신장질환 발견에 유용하다고 합니다 2. 다음은 EGFR에 따른 만성 신장병 단계 분류입니다. 1.1단계 EGFR 90mL분1.73m2 이상 신장 기능이 정상이거나 약간 저하된 상태입니다. 대부분의 경우 증상이 나타나지 않습니다. 2.2단계 EGFR 6089mL분1.73m2 신장 기능이 다소 저하된 상태입니다. 증상이 나타날 수 있으나 대부분의 경우 일상생활에 지장이 없습니다. 3.3단계 EGFR 3059mL분1.73m2 신장 기능이 중등도 저하된 상태입니다. 증상이 뚜렷해지며 적극적인 치료가 필요합니다. 4.4단계 EGFR 1529mL분1.73m2 신장 기능이 심하게 저하된 상태입니다. 혈액투석이나 복막투석 등의 신대체요법이 필요합니다. 5.5단계 EGFR 15mL분1.73m2 미만 신장 기능이 완전히 저하된 상태입니다. 신대체요법이 필수적입니다. 3. 근육사용량이 너무 많으면 횡문근 용해증으로 신기능악화가 나타날 수 있습니다 4.. 사안별로 판단해야 하는데 운동이 신기능을 나쁘게 할

가능성은 거의 없다고 생각합니다

글 읽기가 힘듭니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 불편하시죠?난독증이라는 상태가 아닌가 싶은데요. 정확한것은 진료를 통해 확인받아보시는 것이 필요하다고 판단됩니다.

하지불안증후군이 몸통에도 나타나나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 하지불안증후군은 주로 다리에 불편한 느낌이 나타나지만 몸통에도 나타날 수 있습니다. 하지만 이증상이 하지불안증후군때문인지는 확실하지 않으니 진료 받아보श्य

질문이거 곤지름인가요 뽀루지인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 캔디다 질염이 있는 경우에 하얀색 치즈 같은 분비물이 있을 수 있습니다. 치료가 다 종료된다음 다시 진료 받아보श्य

고,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흡연한지는 얼마나 되셨나요? 이제 부터라도 금연하시는 것이 좋을 것 같습니다. 폐렴에서 폐암으로 발전되지는 않습니다.

임태기 내일 써도 될까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 얼리임태기는 보통 열흘정도는 지난 다음에 사용하는 것이 원칙입니다. 너무 일찍하시는 것은 별 도움이 되지 않을 수 있습니다

코콜이를 고칠수 있는 방법이 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 상태를 알기위해서는 수면 다원 검사가 필요합니다. 검사 결과에 맞추어서 어떤치료가 필요할지 결정하시는 것이 좋겠습니다

전거근 약화 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 압박에의한 일시적인 타박상? 근육손상일 가능성이 높습니다. 어떤근육인지는 자세한 진찰이 필요합니다. 시간이 지나면서 저절로 좋아지실 것 같습니다

허리디스크 주사 질문,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 증상이 없고 괜찮으시다고 하면 이전에 한번밖에 맞지 않은것이 문제가 되지는 않습니다. 다시 증상이 나타날 수 있으니 체중은 좀 줄이시는 것이 좋겠습니다

소음순 수포,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생긴지는 얼마나 오래 되었나요? 혹시 성 매개성 질환일 가능성도 있으니 비뇨의학과 진료 받아보시는 것을 권합니다

조영제가 몸에 쌓였는지 검사받을수 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 조영제는 영상진단 검사 시 특정 조직이나 혈관이 잘 보이도록 인체에 투여하는 약물로 MRI에는 가돌리늄을 CT에서는 요오드화물을 주로 사용합니다. 조영제 배출 시간은 다음과 같습니다. 대부분의 조영제는 24시간 이내에 90 이상이 소변으로 배출됩니다. 조영제 검사 후에는 물을 많이 마시는 것이 조영제의 배출에 도움이 됩니다. 검사하는 방법은 따로 없는것 같습니다

정신과 약때문에 성관계시 쾌감이 안느껴지는걸까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정말 고민 많으시지요? 약에 대한 부작용은 개인차가 심합니다. 약의 영향이 있을 수도 있는데 주치의 선생님과 약 변경에 대하여 상의 가 필요할 것 같습니다

저기 머하나 여쭙볼게요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혹시 소변보면서 불편한 증상 통증 잔뇨감 빈뇨 가 동반되면 방광염의 가능성이 높으니 가정의학과 방문하셔도 되고 배뇨 증상이 없으면 비뇨의학과 방문해보श्य

관계 후 임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 가임기가 아니어서 임신가능성은 없는시기로 생각되고 또 피임에도 문제는 없었던것으로 생각되니 임신가능성은 희박할 것 같습니다

손목 손가락 목이 자꾸 아픕니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자세하게 진찰이 필요할 것 같습니다. 증상으로만 보면 크게 우려할 만한 일은 아닌것 같습니다. 빨리 회복하시길 바랍니다
임신 증상이 이렇게 빨리 나타날 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 관련 증상은

보통 임신 3주 이후에 나타나므로 상기 증상이 임신 관련 증상이라고 하기는 어렵습니다. 하지만 증상만으로는 알 수 없어 임신테스트기 검사가 필요합니다.

자궁내막 조직검사 후 생리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 기간 동안 과다 출혈이 없다면 지켜 보셔도 되겠습니다. 폴립 제거 후 생리량이 줄어들지 않는 경우도 있기 때문입니다.

이거 켈로이드인가요 라는 질문을 보낸 사람입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 좀 지켜보셔야 할 것 같습니다. 원래 켈로이드가 생기는 체질이 아니라면 크게 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다. 좋아지는데 시간이 좀 걸릴것 같습니다

에이즈 검사와 HIV 검사 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. HIV 감염에 의해 나타나는 질환이 에이즈 입니다. 따라서 에이즈 검사가 음성이라는 것은 HIV 감염이 없음을 의미하는 것입니다.

쿠퍼액과 전립선액이 같은건지 등,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 다르기 때문에 도움이 되지 않는 것 같습니다 2. 다르기 때문에 비뇨 의학과를 방문하셔서 정확한 검사를.받고 원인에 따라 치료를.받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

약간 불안장애? 강박증 같은게 있는거같은데 이게 좀 심해져요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 본인이 불편감을 자각하고 있고 일상생활에 지장이 있다면 정신건강의학과 진료를 보는 것이 바람직한 판단으로 생각됩니다. 예정대로 진료를 보시기 바랍니다.

피부가 너무나도 갑작스럽게 이상해져서 질문을 드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 체리혈관종의 정확한 원인은 밝혀진 바 없습니다. 하지만 자외선에 노출 임신 등의 이유로 모세혈관이 정상적이지 않게 확장되면 발생할 가능성이 높고 30대 이후 주로 생기는 것으로 볼때 노화현상과 관련이 있을 것으로 생각됩니다. 체리혈관종은 유전 경향이 있는데 부모님이 체리혈관종이 많다면 자녀들도 많을 가능성이 높은 것이지요.

원판형 반월상 연골 만,안녕하세요. 메디이즈입니다. 웨이트를 적당하게 해서 관절 주변의 근육들을 조화롭게 강화시키면 아마도 문제없이 파열없이 유지할 수 있습니다.

오늘 갑자기 피부가 간지럽고 이렇게 되었어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 접촉성 피부염 또는 급성 두드러기로 보입니다. 항히스타민제 복용이 도움이 되므로 진료를 보거나 약국에서 구매하여 복용하기 바랍니다.

이거 켈로이드 된건가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 보기에 아직 켈로이드라고 이야기 하기는 어려울 것 같습니다. 부위는 어디인가요? 찔것은 얼마나 오래되었나요?

가슴 통증흉통이 지속되고 있습니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 기침하다가 생긴 통증이 있으시고 엑스레이에서 이상이 없고 하면 추가적으로 검사는 더 필요할 것 같지는 않습니다.

철봉 매달리기를 할 때 몸을 완전히 이완시키나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 목적에 따라 다를 수 있는데 아무래도 등 근육에 적당하게 힘을 주고 매달리는 것이 좀더 도움이 될것 같다고 생각합니다.

자다가 일어났는데 복부 통증이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 원인을 알기 어렵지만 치킨을 많이 먹었다면 그것이 원인일 수 있습니다. 일단 금식하시고 좋아질때까지 기다려야 하는데 심하면 진료받아보셔야 합니다

대장게실염 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 게실염이 확인되어 치료하고 난 후 게실염이 호전되고 12개월 후 대장내시경을 시행하여 실제 게실이 있는지 다른 병변이 있는 것은 아닌지 확인하게 됩니다.

센스리베에서 디어미순 피임약 변경,안녕하세요. 메디이즈입니다. 교차 복용을 해도 피임 효과는 유지되는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 걱정이 된다면 이중 피임을 일주일 간 하기 바랍니다.

영양제 녹은 거 먹어도 되나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 흡습이 된 상태라면 이미 오염이나 산패가 되었을 가능성이 높습니다. 특히 오메가3는 산패가 잘되므로 복용하지 말 것을 권합니다.

대상포진인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대상 포진의 전형적인 수포성 병변이 아니고 신경절을 따라 분포되어 있지 않아 가능성이 낮습니다. 좀 더 병변의 변화를 지켜보시기 바랍니다.

콘돔 찢어짐,안녕하세요 요약 1. 콘돔이 찢어졌다면 임신 가능성이 조금이라도 있으니 2. 피임을 원한다면 사후피임약을 처방받으세요 3. 처방받을때 한번더 물어 보세요 건승하세요 자궁내막 조직검사 후 생리,안녕하세요. 메디이즈입니다. 생리 기간 동안 과다 출혈이 없다면 지켜 보셔도 되겠습니다. 폴립 제거 후 생리량이 줄어들지 않는 경우도 있기 때문입니다.

배변후 변 새어나옴,안녕하세요. 메디이즈입니다. 변실금이나 변비로 인한 잔변이 남아 있을 가능성이 있습니다. 항문외과 진료를 보고 있다면 소화기내과 진료를 보시는 것을 권해드립니다.

전립샘액 검체를 채취하는 방법 중 이런 방법도 되는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 사정액을 받아주시면 비슷한 효과를 볼 수 있을 것 같습니다 쿠퍼액은 약간 적절하지는 않을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

임신 증상이 이렇게 빨리 나타날 수도 있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신 관련 증상은 보통 임신 3주 이후에 나타나므로 상기 증상이 임신 관련 증상이라고 하기는 어렵습니다. 하지만 증상만으로는 알 수 없어 임신테스트기 검사가 필요합니다.

임신준비중 고관절통증 어디병원을 가야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신을 준비중인 상황인데 고관절을 포함한 다리에 통증이 나타나 걱정스러우시군요. 말씀하신 통증의 양상이 주로는 왼쪽으로 나타나는 것 같습니다. 하지만 동시에 양쪽 둔부에도 통증이 나타나고 있습니다. 한 쪽으로만 나타나는 고관절이나 둔부 부근의 통증은 척추질환 고관절질환을 의심해야 하겠지만 양쪽 모두에게 나타나는 경우 척추질환의 가능성이 떨어지겠습니다. 어느 부위의 문제로 통증이 발생하는 것인지는 반드시 엑스레이와 같은 영상 촬영으로 알아내야만 하는 것은 아니고 신체진찰을 통해서도 유추할 수 있습니다. 이러한 진찰을 가장 잘 할 수 있는 전문가는 정형외과 의사이므로 가까운 정형외과를 우선 방문해보시기 바랍니다. 또한 현재 임신이 되었는지 알 수 없는 상황이라서 엑스레이 촬영이 부담스럽다는 말씀도 함께 해보시면 진료에 도움이 되겠습니다. 다만 1회의 엑스레이 촬영으로 노출되는 방사선량의 영향력은 미미하므로 꼭 필요한 검사라면 촬영을 고려해보실수도 있겠습니다.

흑변에 이어 혈변까지 나왔습니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 흑변으로 위내시경 검사를 진행했고 식도궤양을 진단받으신 상황에서 단단한 변을 보다가 항문의 통증과 함께 출혈을 경험하신 상태로 이해됩니다. 정황상 치열에 의한 항문의 출혈이 가장 의심스럽지만 최근 식도궤양을 진단받으셨으므로 확인 없이 온수좌욕만 하며 관리하시기엔 위험한 상태라고 생각합니다. 따라서 가까운 외과에서 치열에 의한 출혈이 맞는지에 대해 확인해보시기 바라며 항문에 통증이 있었던 것과 달리 치열은 미미하고 대장에서의 출혈이 의심된다는 소견이 있다면 추가적인 대장내시경도 고려해보아야 하겠습니다. 질문자님의 쾌유를 빕니다.

에이즈 일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 에이즈의 가능성은 없으니 걱정안하셔도 될 것 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

,안녕하세요 요약 1. 음성입니다. 2. 키트에 음성예측도 민감도 특이도 등이 어떻게 되는지 확인해 보세요 3. 정확도가 높은지 확인해 보시고 그래도 걱정되면 4. 보건소에서든 검사를 해보세요. 무료입니다. 보건소 가면 아래 성병들은 무료로 검사 가능합니다 남자 에이즈 매독 임질 클라미디아 여자 에이즈 매독 건승하세요

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 철회암을 의심하는 것은 말도 안됩니다. 걱정되면 검사를 통해서 확인해보세요. 기본적으로 불안 근심걱정이 많은 분 같은데 이런분들은 검색을 안하시는 것이 도움이될 것 같습니다

자궁경부암 건강검진 후 산부인과에서 조직검사 했어요,안녕하세요 인유두종 바이러스HPV에 감염이 되면 매우 드물게 감염이 몇 년간 지속될 수 있으며 이러한 경우 자궁 경부나 생식기 부위에 병변을 발생시킬 수 있습니다. 자궁경부이형성증은 자궁경부가 HPV바이러스에 감염되어 자궁경부세포와 조직이 비정상적인 형태로 변형되는 질환으로 1단계에서 3단계까지 있는데 LSIL저등급 편평상피내병변는 자궁경부이형성증 1단계로 경증에 해당됩니다. 3개월 후 더 진행하는지를 봐야 합니다. 건승하세요

성기 기둥쪽 빠루지? 같은게 났는데 헤르페스나 성병인가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원으로 오세요 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 건승하세요.

입술에 이거 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에도 이런적 있으셨나요? 지금보기에는 헤르페스1형단순포진으로 인한 피부병변으로 생각됩니다. 항바이러스 약을드시면 좀 빨리회복됩니다

입술 관련 질문한 사람입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그러시군요. 임상적으로는 헤르페스 1형 단순포진 이 의심되고 다음부터 피곤하거나 잠못자거나 스트레스 많으면 다시 올라올 가능성이 높습니다

선생님질문있습니다.,안녕하세요 요약 1. 식도궤양이 아니라 항문궤양인가요? 2. 좌욕을 한다고 오랜 시간 쪼그려 앉아 있을 경우 3. 오히려 항문 혈관의 압력이 증가하거나 치열 부위 상처가 덧날 수 있습니다. 좌욕을 하면 항문 조임근이 이완돼 항문압이 낮아지고 괄약근 주변 혈액순환이 활발해져서 치질 증상 완화에 도움이 되지만 따뜻한 물을 받아 엉덩이를 오래 담그는 행위로는 치질 질환 예방에 전혀 도움이 되지 않습니다. 오랜 시간 쪼그려 앉아 있을 경우 항문 혈관의 압력이 증가하거나 치열 부위 상처가 덧날 수 있습니다. 일반 샤워기를 이용해 물살이 세지 않게 조정해 다음 체온과 비슷한 37.3도의 온도로 항문 주변을 마사지해주는 것이 좋으며 좌욕 후에는 물기가 남아있지 않도록 완벽하게 건조해야 항문소양증 같은 2차 항문질환을 예방할 수 있습니다. 건승하세요

에이즈 검사,안녕하세요 요약 에이즈의 원인 바이러스인 HIV 바이러스가 체내에 들어온적이 없다는 것입니다. HIV 항체가 2주부터 약 12주까지 형성되며 HIV 감염 위험 노출 후 12주 정도면 대부분 항체가 형성됩니다. 항체 형성 시기는 사람에 따라 다를 수 있기 때문에 에이즈 검사는 12주 후에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 건승하세요

쿠퍼액과 전립선액이 같은건지 등,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을

드리기 어려우나 1. 다르기 때문에 도움이 되지 않는 것 같습니다 2. 다르기 때문에 비뇨 의학과를 방문하셔서 정확한 검사를 받고 원인에 따라 치료를 받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

포경수술이후 너무 커진 붓기..안녕하세요 요약 1. 수술 후 붓기 때문에 생기는 당연한 현상으로 2. 붓기를 빼려고 어떻게 하려고 말고 그냥 놔두면 대부분 한달내로 좋아집니다. 포경 수술 후 부종이 발생하면 가장 흔하게 발생하는 부위가 절개라인의 원위부로 튜브나 링모양 붓기를 형성하여 소대쪽 부종이 가장 오래가는 편입니다. 건승하세요

충수염 수술후 통증은 어느정도인가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 수술 직후에는 통증이 심하므로 무통 주사 등을 사용하기도 하고 진통제를 사용하여 적극적으로 조절합니다. 24시간 이후부터는 통증이 많이 사라집니다.

사신의 부위에 찌릿한 통증이 있습니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 근육통 가능성이 높습니다. 충분한 휴식을 취하고 진통소염제를 복용해 보시기 바랍니다. 만약 호전이 없다면 진료가 필요합니다.

침 삼키면 목아픈인후염 증상 때문에 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 인후염이 1주일 이사 지속된다면 편도염 등의 동반 여부를 확인해 보아야 합니다. 단순 바이러스성 인후두염도 1주일 이상 지속될 수는 있습니다.

혹시 씻지 않은 손으로 성기 표피 끝 부분을 반복적으로 만지면 요도염에 걸릴 수가 있나요?,안녕하세요 요약 1. 요도염이라고 해서 무조건 성병은 아닙니다. 2. 언급한 상황도 요도염의 원인이 됩니다. 예전엔 요도염을 일으키는 균을 임질로만 알고 있었는데 임질을 제외한 균으로 클라미디아 마이코플라스마 유레아플라스마 트리코모나스 포도상구균 연쇄상구균 등의 비임균성 요도염의 원인이 되기도 합니다. 건승하세요

아스퍼질러스 알려지가 뭔가요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아스퍼질러스는 일종의 곰팡이균입니다. 아스퍼질루스는 어디에나 존재할 수 있어 이에 대한 알려지 반응이 있다면 회피 요법이 가장 도움이 됩니다.

당뇨약 저혈당,안녕하세요. 메디이즈입니다. 현재 복용 중인 당뇨약은 저혈당은 흔히 유발하지는 않는 약입니다. 하지만 명확한 저혈당이 있다면 약제 복용을 중단하고 당당과의 상의하기 바랍니다.

관계 후 임신가능성,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금은 가임기가 아니어서 임신가능성은 없는시기로 생각되고 또 피임에도 문제는 없었던것으로 생각되니 임신가능성은 희박할 것 같습니다

혈관염 알려지반응은 무엇으로 생기는 걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈관염이 생기는 이유는 다음과 같습니다. 면역계 이상 혈관염은 면역계 이상으로 인해 발생하는 자가면역질환의 일종입니다. 혈관의 염증 반응이 지속적으로 일어나면서 혈관벽이 손상되고 이로 인해 혈관염이 발생합니다. 감염 세균 바이러스 곰팡이 등의 감염으로 인해 혈관염이 발생할 수 있습니다. 감염으로 인한 혈관염은 주로 피부나 점막에 발생하며 감염이 혈관 내부로 침투하여 혈관벽을 손상시킵니다. 약물 부작용 약물 부작용으로 인해 혈관염이 발생할 수 있습니다. 약물 부작용으로 인한 혈관염은 주로 피부에 발생하며 약물이 혈관벽을 자극하거나 손상시켜 염증 반응을 유발합니다. 유전적 요인 유전적 요인이 혈관염의 발생에 영향을 미칠 수 있습니다. 유전적 요인이 있는 경우 혈관염이 발생할 가능성이 높아지며 가족 중에 혈관염 환자가 있는 경우에도 발생 위험이 증가합니다. 기타 기타 원인으로는 방사선 치료 수술 외상 등이

있습니다. 혈관염의 기전은 혈관벽의 염증 반응으로 인해 혈관벽이 손상되고 이로 인해 혈관이 좁아지거나 막혀 혈액순환에 장애가 생기는 것입니다.

성병 포비아..소변sti검사 음성 매독키트 음성 성기에 피부 문의,안녕하세요. 메디이즈입니다. 사진상 곤지름헤르페스매독HIV 감염과 같은 성병의 특징적인 병변이 관찰되지 않으므로 성병의 가능성은 낮습니다. 작은 피부 병변으로 생각되는데 크기 변화가 있다면 진료를 보시기 바랍니다.

발쪽에 모세혈관들이 빨갛게 보이는데 괜찮을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모세혈관이라고 합니다. 이 정도는 정상적인 소견이 맞습니다. 이번에 사진을 찍어놓으셨으니 나중에 혹시 더 두드러지는지는 비교해 보시면 좋겠습니다.

쿠퍼액과 전립선액이 같은건지 등,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 1. 다르기 때문에 도움이 되지는 않을 것 같습니다 2. 다르기 때문에 비뇨의학과를 방문하셔서 정확한 검사를 받고 원인에 따라 치료를 받아보세요 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

전립샘액 검체를 채취하는 방법 중 이런 방법도 되는지,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 사정액을 받아주시며 비슷한 효과를 볼 수 있을 것 같습니다 쿠퍼액은 약간 적절하지는 않을 것 같습니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

에이즈 일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 에이즈의 가능성은 없으니 걱정안하셔도 될 것 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

약간 불안장애? 강박증 같은게 있는거같은데 이게 좀 심해져요 ...안녕하세요. 메디이즈입니다. 본인이 불편감을 자각하고 있고 일상생활에 지장이 있다면 정신건강의학과 진료를 보는 것이 바람직한 판단으로 생각합니다. 예정대로 진료를 보시기 바랍니다

약간 불안장애? 강박증 같은게 있는거같은데 이게 좀 심해져요 ,안녕하세요. 메디이즈입니다. 본인이 불편감을 자각하고 있고 일상생활에 지장이 있다면 정신건강의학과 진료를 보는 것이 바람직한 판단으로 생각합니다. 예정대로 진료를 보시기 바랍니다.

오늘 갑자기 피부가 간지럽고 이렇게 되었어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 접촉성 피부염 또는 급성 두드러기로 보입니다. 항히스타민제 복용이 도움이 되므로 진료를 보거나 약국에서 구매하여 복용하기 바랍니다.

자다가 일어났는데 복부 통증이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 원인을 알기 어렵지만 치킨을 많이 먹었다면 그것이 원인일 수 있습니다. 일단 금식하시고 좋아질때까지 기다려야 하는데 심하면 진료받아보셔야 합니다

에이즈 검사와 HIV 검사 차이,안녕하세요. 메디이즈입니다. HIV 감염에 의해 나타나는 질환이 에이즈 입니다. 따라서 에이즈 검사가 음성이라는 것은 HIV 감염이 없음을 의미하는 것입니다.

선생님 피부에 갑자기 이렇게 생겼어요 도와주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 급성 두드러기 또는 약발진 등으로 생각합니다. 항히스타민제 복용에도 증상이 악화된다면 스테로이드 등의 치료가 필요하므로 다시 진료를 보시기 바랍니다.

혈관염 알려지반응은 무엇으로 생기는 걸까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 혈관염이 생기는 이유는 다음과 같습니다. 면역계 이상 혈관염은 면역계 이상으로 인해 발생하는 자가면역질환

혈관의 일종입니다. 혈관의 염증 반응이 지속적으로 일어나면서 혈관벽이 손상되고 이로 인해 혈관염이 발생합니다. 감염 세균 바이러스 곰팡이 등의 감염으로 인해 혈관염이 발생할 수 있습니다. 감염으로 인한 혈관염은 주로 피부나 점막에 발생하며 감염이 혈관 내부로 침투하여 혈관벽을 손상시킵니다. 약물 부작용 약물 부작용으로 인해 혈관염이 발생할 수 있습니다. 약물 부작용으로 인한 혈관염은 주로 피부에 발생하며 약물이 혈관벽을 자극하거나 손상시켜 염증 반응을 유발합니다. 유전적 요인 유전적 요인이 혈관염의 발생에 영향을 미칠 수 있습니다. 유전적 요인이 있는 경우 혈관염이 발생할 가능성이 높아지며 가족 중에 혈관염 환자가 있는 경우에도 발생 위험이 증가합니다. 기타 기타 원인으로는 방사선 치료 수술 외상 등이 있습니다. 혈관염의 기전은 혈관벽의 염증 반응으로 인해 혈관벽이 손상되고 이로 인해 혈관이 좁아지거나 막혀 혈액순환에 장애가 생기는 것입니다.

포경수술이후 너무 커진 붓기..안녕하세요 요약 1. 수술 후 붓기 때문에 생기는 당연한 현상으로 2. 붓기를 빼려고 어떻게 하려고 말고 그냥 놔두면 대부분 한달내로 좋아집니다. 포경수술 후 부종이 발생하면 가장 흔하게 발생하는 부위가 절개라인의 원위부로 튜브나 링모양 붓기를 형성하여 소대쪽 부종이 가장 오래가는 편입니다. 건승하세요

혹시 씻지 않은 손으로 성기 표피 끝 부분을 반복적으로 만지면 요도염에 걸릴 수가 있나요?, 안녕하세요 요약 1. 요도염이라고 해서 무조건 성병은 아닙니다. 2. 언급한 상황도 요도염의 원인이 됩니다. 예전엔 요도염을 일으키는 균을 임질로만 알고 있었는데 임질을 제외한 균으로 클라미디아 마이코플라스마 유레아플라스마 트리코모나스 포도상구균 연쇄상구균 등의 비임균성 요도염의 원인이 되기도 합니다. 건승하세요

입을 벌릴 때 한쪽 과두가 앞이 아닌 옆으로 빠집니다..안녕하세요 턱관절장애입니다. 턱관절에서 잡음이 들리거나 통증이 있고 입을 열고 닫는데 어려움이 생기는데 증상으로는 입을 벌릴 때 귀 뺨 관자놀이 등에서 통증 딱딱 소리 심하면 입을 벌릴 수 없거나 갑자기 입을 다물 수 없는 장애가 발생하며 안면비대칭의 원인이 되기도 합니다. 대학병원 구강내과로 가보세요 건승하세요

지금 상황에서는 매독으로 인한 궤양이라 생각 안해도 괜찮을까요?,안녕하세요. 매디이즈입니다. 매독은 아닌것 같습니다. 하지만 매독을 검사없이 매독이다 아니다를 이야기 할 수 없으니 매독에 관한 혈액 검사로 확인해보세요

의료사고 인가요?,안녕하세요. 매디이즈입니다. 조영제에 의한 영향일 가능성이 적으며 가부를 확인할 수 있는 검사법이나 진찰이 불가능합니다. 지능의 뚜렷한 저하가 있다면 뇌 영상검사를 다시 해보셔야 하며 애매한 정도라면 치료법이 있으니 병원을 또 가보셔야 합니다.

안과 진료 때 선생님이 눈 위쪽을 눌렀는데,안녕하세요. 매디이즈입니다. 아마도 위 눈꺼풀을 뒤집어 까면서 나타난 증상이 아닌가 생각됩니다. 그 정도로 망막에 무리가 가지는 않을테니 너무 걱정하지마세요

외국 병원에 가져가야 할 자료가 뭐가 있을까요?,안녕하세요. 매디이즈입니다. 의무기록을 복사해서 드리면 좋을것 같습니다. 양이 많으면 지금 상태와 직접연관된 진료 검사기록만 챙기세요 당뇨 고혈압 같은 만성질환이있으면 그기록도 포함시켜주세요

오늘 언제부터인제는 모르겠는데요....,안녕하세요 요약 1. 자다가도 증상이 생기는지 확인해보세요 2. 반복성과 재현성이 중요합니다. 3. 증상이 지속되거나 증상이 악화되면 다시 확인할 필요가 있습니다. 건승하세요

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요....,안녕하세요. 매디이즈입니다. 상기 증상을 종합할 때 건강에 영향을 미칠만한 문제는 없는 것으로 판단됩니다. 너무 걱정하지 말고 다른 증상이 나타

나는지 확인하기 바랍니다.

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요....,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 종합할 때 건강에 영향을 미칠만한 문제는 없는 것으로 판단됩니다. 너무 걱정하지 말고 다른 증상이 나타나는지 확인하기 바랍니다.

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요....,안녕하세요 요약 1. 자다가도 증상이 생기는지 확인해보세요 2. 반복성과 재현성이 중요합니다. 3. 증상이 지속되거나 증상이 악화되면 다시 확인할 필요가 있습니다. 건승하세요

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요....,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단은 증상이 심하지 않으니 증상에 너무 민감하게 반응하지 않으시고 무시하시는 것이 좋을것 같습니다. 증상이 심해지면 진료 받아보셔요

뇌수막종 증상과 미세출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러가지로 많이 힘드시겠습니다. 시력의 차이가 이전에는 어땠는지 지금 시력은 어떤지 고려가 필요해 보입니다. 오른쪽에 수막종이 있지만 시신경과 위치도 고려해보셔야 할것 같습니다 주치의 선생님이 별말이 없으셨다고 하면 큰 문제는 아닌것 같습니다

TSH ACTH 수치문의,안녕하세요 요약 1. 아래 기준 안에 들어가 있으면 정상입니다. 2. 단위가 다르지만 정상입니다. 갑상성호르몬 측정법과 기관에 따라 기준이 다소 다를 수 있습니다. TSH 0.45.1 U/mL T4 5.9 13.8 ug/dL T3 98.0 180 ng/dL Free T4 0.81.9 ng/dL 건승하세요

급해요 촛불로도 흡입화상을 입을수있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가능성은 매우 낮아 보입니다 깊게 마시면 갈수 도 있습니다 다음의 과정을 거쳐 진단합니다 병력 청취 화재 및 연기 노출 여부 의식 소실 여부 호흡곤란 등의 증상 확인 신체 검진 안면부 화상 비강 내 그을음 음성 변화 쉼썩거림 기침 객혈 등 호흡기 증상 관찰 검사실 소견 동맥혈가스분석 카르복시헤모글로빈 수치 흉부 X선 검사 등 후두경 검사 목소리 변화가 있는 경우 성대기관 부종 및 화상 여부 확인 기관지경 검사 상부하부 기도 병변 관찰 흡입화상은 생명을 위협할 수 있는 중증 상황이므로 신속하고 적절한 치료가 필수적입니다. 흡입화상의 주요 치료법은 다음과 같습니다. 기도 확보 및 호흡 보조 필요시 기관내삽관 또는 기관절개술을 시행하여 기도를 확보 인공호흡기 등을 이용한 호흡 보조 산소 공급 고농도 산소를 공급하여 저산소증 교정 기관지경 시술 기관지내시경으로 기도 내 이물질 제거 및 병변 평가 약물 치료 부신피질호르몬제 기도 부종 감소 기관지확장제 기도 확장 항생제 2차 감염 예방 수액 및 영양 공급 화상 치료 안면부 화상이 있을 경우 화상 치료 인공호흡기 이탈 및 기관내튜브 제거 시도 재활 치료

올대 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 연부조직의 손상과 부종이 있을 수 있습니다. 우선은 소염제를 복용하시면서 이비인후과에서 비용이 비싸지 않은 후두경 검사를 확인하시면 좋겠습니다.

매독 증상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 증상은 성병과는 관련이 없습니다 다만 의심스러운 성관계라면 증상과 상관 없이 성병검사는 받는 것이 안전합니다 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요. 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

건강악화,안녕하세요. 메디이즈입니다. 많이 힘드시겠네요. 천식이 심하지 않은경우에는 잠시 그랬다가 좋아지곤 하지만 심하면 입원치료가 필요한 경우도 있습니다. 진료시 호흡에는 문제가 없다고 하니 심리적인 원인은 없는지 살펴보아야 합니다. 목명을 만져봐달라고 요청해보셔

요

입술 관련 질문한 사람입니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 그러시군요. 임상적으로는 헤르페스 1형 단순포진 이 의심되고 다음부터 피곤하거나 잠못자거나 스트레스 많으면 다시 올라올 가능성이 높습니다

매독 자가키트 검사 질문 합니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 매독 자가 검사 키트는 편리하고 비밀스럽게 매독 감염 여부를 확인하는 방법이지만 정확도에 한계가 있다는 점을 명심해야 합니다. 민감도 및 특이도 민감도 실제로 매독에 감염된 사람 중 키트가 양성으로 판단하는 비율입니다. 높을수록 정확도가 높아집니다. 특이도 실제로 매독에 감염되지 않은 사람 중 키트가 음성으로 판단하는 비율입니다. 높을수록 정확도가 높아집니다. 현재 판매되는 매독 자가 검사 키트의 민감도는 제품마다 다르지만 일반적으로 70 90 정도입니다. 이는 10명 중 매독에 실제로 감염된 사람이 79명 정도는 키트 검사 결과 양성으로 판단된다는 것을 의미하지만 13명은 음성으로 잘못 판단될 가능성이 있다는 것을 의미합니다. 따라서 매독 자가 검사 키트는 초기 단계의 감염을 놓칠 수 있거나 이미 치료를 받고 음성 판정을 받은 경우에도 양성으로 잘못 판단될 가능성이 있다는 점을 유념해야 합니다.

피부 두드러기 간지러움 증상 봐주세요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 원인은 정확하게 알기는 어렵습니다. 혈관염의 형태로 나타나는 알러지 반응이 아닌가 의심스럽습니다. 항히스타민 스테로이드로 치료가 필요해보입니다

,안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 췌장암을 의심하는 것은 말도 안됩니다. 걱정되면 검사를 통해서 확인해보세요. 기본적으로 불안 근심걱정이 많은 분 같은데 이런분들은 검색을 안하시는 것이 도움이 될 것 같습니다

손바닥석회로 통증 침치료는???,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사 치료가 효과적이지 않다면 약물 치료를 먼저 받아 보시기 바랍니다. 만약 통증이 지속된다면 수술적 치료를 고려할 수 있습니다.

손바닥석회로 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 주사 치료가 효과적이지 않다면 약물 치료를 먼저 받아 보시기 바랍니다. 만약 통증이 지속된다면 수술적 치료를 고려할 수 있습니다.

손바닥석회로 통증,안녕하세요. 메디이즈입니다. 약물치료와 물리치료가 기본이 됩니다. 적절한 주사치료도 도움이 되며 이미 맞으신 주사는 스테로이드 성분이었을 것 같습니다. 다음에는 스테로이드를 맞지는 않으시면 좋겠습니다.

수술 공포증 원인을 알면 해소할수있을까요?,안녕하세요 요약 정신의학과에서 불안장애에 대한 조연을 얻으세요 불안장애는 다양한 형태의 비정상적 병적인 불안과 공포로 인하여 일상 생활에 장애를 일으키는 질환입니다. 불안장애에 해당하는 질환으로는 공황 장애광장공포증을 동반하거나 하지 않는 특정 공포증고소 공포증 혈액 공포증 뱀 공포증 등 사회 공포증 강박 장애 외상 후 스트레스 장애 범불안장애 급성 스트레스 장애 등이 있습니다. 건승하세요

녹내장 의증 시신경유두함몰비 증가,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤상황이 심해질지 그대로 있을지 좋아질지를 예측하기 어렵기 때문에 주기적인 측정이 필요합니다. 헬스트레이너고 직업상 무게를 많이 들어야 한다면 너무 무리하지 않는 선에서 운동하시면서 검진 주기를 일년에 두번으로 늘려서 안과 진찰 받아보셔요 다른 검사가 정상이니 녹내장 확진은 아닙니다

체외충격파 받고 더 아파졌어요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 어떤 문제로 어디부분에 어떤 타입으로 받았는지에 따라서도 달라집니다. 보통 시행할때 참을수 있는 정도의 통증이 느껴질 정도로 그 강도를 올려서 하긴 합니다만... 일단 치료후 통증이 더 심해지셨다면 다른 원인들도 있을수가 있습니다. 일단 가볍게 스트레칭 위주로 풀어주시고 증상 지속시 치료받으셨

던 병원에 한번 더 문의해보시기 바랍니다. 감사합니다.

진료과 문의드려요 그리고 상담 부탁드립니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 대장은 검사를 이전에 받지 않으셨다고 하면 전립선과 함께 진료를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 신경과도 진료 받아보셔요

스테로이드 말고 어덜한 주사 있나요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의사마다 경험치가 다르니 그 선생님이 어떤 주사까지 가능하실 지 모릅니다. 집 근처에서 다른 병원들을 찾아서 다른 치료들을 해보시는 것도 좋습니다.

고환 피지낭종,안녕하세요. 메디이즈입니다. 자꾸 손대지 않으시는것이 좋겠습니다. 손대면 염증이 생겨서 커지기도 합니다. 그냥 그대로 있거나 작아지기도 합니다

담석이 스트레스파라 증상이 변할수도있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 지금 불편한 증상이 담석 때문인지 스트레스인지 정확한 구분은 어렵습니다. 담석이 있다 하더라도 지금정도의 증상은 당장 조치가 필요해보이지는 않습니다. 심한 통증이 있거나 만성 소화불량 증상이있으면 수술을 고려할 수 있습니다

반월상연골손상,안녕하세요. 메디이즈입니다. 특별한 외상의 병력도 없고 mri로 연골판 손상을 진단 받은 적도 없고 하니 체중을 줄이고 운동강도를 줄이면서 경과를 지켜보셔요. 무릎주위 근육의 문제로 통증이 있을 수 있으니 자세한 진찰이 필요합니다

발목,안녕하세요. 메디이즈입니다. 축구를 하던 중 발목을 부상당하셨고 병원에서는 특별한 문제가 보이지 않는다는 이야기를 들었지만 통증이 지속되고 있어 걱정스러우시겠습니다. 우선 육안으로 관찰되는 질문자님의 발목에서는 심한 염증반응이 의심되지는 않습니다. 붉어지는 발적 두드러지는 부종 멍 등의 징후가 보이지는 않기 때문입니다. 하지만 통증이 지속되므로 근육이나 인대의 손상이 존재할 것임을 유추해볼수는 있습니다. 이 경우에 발목을 고정해놓는 처치가 12주 정도 필요할 수 있는데 부목이 없으실테니 발목보호대를 착용하며 사용을 자제하시고 회복을 기다려보시기 바랍니다. 발목보호대는 주무시는 시간을 제외한 나머지 모든 시간동안 착용하시면 되겠고 약국에서 구입하실 수 있습니다. 12주의 시간이 지났음에도 통증이 여전히 나타난다면 정형외과 진료를 다시 받아보셔야 하는 상황이라고 볼 수 있습니다. 그러니 이 경우에는 병원을 방문하시기 바랍니다.

페인트 성분이 묻은 손으로 직접 음식을 먹으면 몸에 많이 나쁠까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 페인트를 일부 섭취하신 것 같아서 걱정스러우시군요. 상당한 양의 페인트를 섭취한다면 당연히 문제가 발생하겠지만 질문자님의 상황은 손에 묻어있는 정도의 적은 양을 섭취한 상황이므로 그리 문제가 되지 않을 것입니다. 그럼에도 이물질을 섭취했을 때 복통 구토 설사 혈변 발열 등의 증상이 나타나는 경우에는 반드시 진료가 필요하니 23일 경과를 살피시고 문제가 있다고 생각되시면 꼭 병원을 방문하시기 바랍니다.

퇴행성 관절염 질문드립니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 퇴행성 관절염 골관절염이 의심스러운 상황이라 고민스러우시군요. 해당 질환을 진단할 때 반드시 일어서서 엑스레이를 촬영해야 하는 것은 아닙니다. 구체적으로 어떤 방식의 촬영이 있었는지는 알 수 없으나 일반적으로 무릎 관절을 촬영하는 방식을 사용했을 것이므로 질문자님께서 찍은 촬영 사진에서도 퇴행성 관절염의 소견인 좁아진 관절 공간 뼈돌기 osteophyte의 형성 등이 관찰될 수 있을 것이고 이를 통해 질환을 추정할 수 있습니다. 물론 초기 퇴행성 관절염인 경우에 엑스레이가 정상처럼 보이는 경우도 있습니다. 따라서 질문자님께서 검사받으실 때 정상적인 소견을 보였으나 의심스러운 증상이 지속되면 재방문을 권해드릴 수 있습니다. 다만 질문자님께서 호소하시는 증상인 무릎 관절 움직임 시 소리가 들리는 문제는 퇴행성관절염을 의심할만한 증상이라 보긴

어렵습니다. 주된 증상이 통증이고 무릎 관절을 제대로 굽히지 못하게 된다거나 부어오르는 증상 등이 동반될 수 있습니다. 따라서 이러한 증상이 없다면 너무 신경쓰지 마시고 근육운동을 저강도부터 천천히 시도해보시기 바랍니다.

자궁경부암 건강검진 후 산부인과에서 조직검사 했어요.안녕하세요. 인유두종 바이러스HPV에 감염이 되면 매우 드물게 감염이 몇 년간 지속될 수 있으며 이러한 경우 자궁 경부나 생식기 부위에 병변을 발생시킬 수 있습니다. 자궁경부이형성증은 자궁경부가 HPV바이러스에 감염되어 자궁경부세포와 조직이 비정상적인 형태로 변형되는 질환으로 1단계에서 3단계까지 있는데 LSIL저등급 편평상피내병변는 자궁경부이형성증 1단계로 경증에 해당됩니다. 3개월 후 더 진행하는지를 봐야 합니다. 건승하세요

.안녕하세요. 메디이즈입니다. 증상만으로 췌장암을 의심하는 것은 말도 안됩니다. 걱정되면 검사를 통해서 확인해보세요. 기본적으로 불안 근심걱정이 많은 분 같은데 이런분들은 검색을 안하시는 것이 도움이될 것 같습니다

성기 기동쪽 뽀루지? 같은게 났는데 헤르페스나 성병인가요.안녕하세요. 메디이즈입니다. 2. 항생제 연고 발라보고 해결안되면 병원으로 오세요. 모낭염은 세균감염 화학적 물리적 자극에 의하여 모낭털구멍에 염증이 생기는 질환으로 모낭이 세균에 감염이 되면 발적 종창과 함께 노란 고름이 잡히게 되고 모낭염이 심해지고 커져서 결절이 생긴 것을 종기라고 합니다. 건승하세요.

.안녕하세요 요약 1. 음성입니다. 2. 키트에 음성에측도 민감도 특이도 등이 어떻게 되는지 확인해 보세요 3. 정확도가 높은지 확인해 보시고 그래도 걱정되면 4. 보건소에서도 검사를 해보세요. 무료입니다. 보건소 가면 아래 성병들은 무료로 검사 가능합니다 남자 에이즈 매독 임질 클라미디아 여자 에이즈 매독 건승하세요

흑변에 이어 혈변까지 나왔습니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 흑변으로 위내시경 검사를 진행했고 식도궤양을 진단받으신 상황에서 단단한 변을 보다가 항문의 통증과 함께 출혈을 경험하신 상태로 이해됩니다. 정황상 치열에 의한 항문의 출혈이 가장 의심스럽지만 최근 식도 궤양을 진단받으셨으므로 확인 없이 온수좌욕만 하며 관리하시기엔 위험한 상태라고 생각됩니다. 따라서 가까운 외과에서 치열에 의한 출혈이 맞는지에 대해 확인해보시기 바라며 항문에 통증이 있었던 것과 달리 치열은 미미하고 대장에서의 출혈이 의심된다는 소견이 있다면 추가적인 대장내시경도 고려해보아야 하겠습니다. 질문자님의 쾌유를 빕니다.

임신준비중 고관절통증 어디병원을 가야할까요?.안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신을 준비중인 상황인데 고관절을 포함한 다리에 통증이 나타나 걱정스러우시군요. 말씀하신 통증의 양상이 주로는 왼쪽으로 나타나는 것 같습니다. 하지만 동시에 양쪽 둔부에도 통증이 나타나고 있습니다. 한 쪽으로만 나타나는 고관절이나 둔부 부근의 통증은 척추질환 고관절질환을 의심해야 하겠지만 양쪽 모두에게 나타나는 경우 척추질환의 가능성이 떨어지겠습니다. 어느 부위의 문제로 통증이 발생하는 것인지는 반드시 엑스레이와 같은 영상 촬영으로 알아내야만 하는 것은 아니고 신체진찰을 통해서도 유추할 수 있습니다. 이러한 진찰을 가장 잘 할 수 있는 전문가는 정형외과 의사이므로 가까운 정형외과를 우선 방문해보시기 바랍니다. 또한 현재 임신이 되었는지 알 수 없는 상황이라서 엑스레이 촬영이 부담스럽다는 말씀도 함께 해보시면 진료에 도움이 되겠습니다. 다만 1회의 엑스레이 촬영으로 노출되는 방사선량의 영향력은 미미하므로 꼭 필요한 검사라면 촬영을 고려해보실수도 있겠습니다.

발쪽에 모세혈관들이 빨갛게 보이는데 괜찮을까요?.안녕하세요. 메디이즈입니다. 모세혈관이라고 합니다. 이 정도는 정상적인 소견이 맞습니다. 이번에 사진을 찍어놓으셨으니 나중에 혹시

더 두드러지는지는 비교해 보시면 좋겠습니다.

선생님질문있습니다..안녕하세요 요약 1. 식도궤양이 아니라 항문궤양인가요? 2. 좌욕을 한다고 오랜 시간 쪼그려 앉아 있을 경우 3. 오히려 항문 혈관의 압력이 증가하거나 치열 부위 상처가 덧날 수 있습니다. 좌욕을 하면 항문 조임근이 이완돼 항문압이 낮아지고 괄약근 주변 혈액순환이 활발해져서 치질 증상 완화에 도움이 되지만 따뜻한 물을 받아 엉덩이를 오래 담그는 행위로는 치질 질환 예방에 전혀 도움이 되지 않습니다. 오랜 시간 쪼그려 앉아 있을 경우 항문 혈관의 압력이 증가하거나 치열 부위 상처가 덧날 수 있습니다. 일반 샤워기를 이용해 물살이 세지 않게 조정한 다음 체온과 비슷한 37.3도의 온도로 항문 주변을 마사지해주는 것이 좋으며 좌욕 후에는 물기가 남아있지 않도록 완벽하게 건조해야 항문소양증 같은 2차 항문질환을 예방할 수 있습니다. 건승하세요

에이즈 일까요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 말씀만으로는 정확한 답변을 드리기 어려우나 에이즈의 가능성은 없으니 걱정안하셔도 될 것 답변이 되었는지 모르겠네요 더 궁금하신 것이 있으시면 질문주세요 성심성의껏 답변드리겠습니다 감사합니다.

에이즈 검사,안녕하세요 요약 에이즈의 원인 바이러스인 HIV 바이러스가 체내에 들어온적이 없다는 것입니다. HIV 항체가 2주부터 약 12주까지 형성되며 HIV 감염 위험 노출 후 12주 정도면 대부분 항체가 형성됩니다. 항체 형성 시기는 사람에 따라 다를 수 있기 때문에 에이즈 검사는 12주 후에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 건승하세요

입술에 이거 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에도 이런적 있으셨나요? 지금보기에는 헤르페스1형단순포진으로 인한 피부병변으로 생각됩니다. 항바이러스 약을드시면 좀 빨리회복됩니다

입술에 이거 뭔가요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 이전에도 이런적 있으셨나요? 지금보기에는 헤르페스1형단순포진으로 인한 피부병변으로 생각됩니다. 항바이러스 약을드시면 좀 빨리회복됩니다

발목,안녕하세요. 메디이즈입니다. 축구를 하던 중 발목을 부상당하셨고 병원에서는 특별한 문제가 보이지 않는다는 이야기를 들었지만 통증이 지속되고 있어 걱정스러우시겠습니다. 우선 육안으로 관찰되는 질문자님의 발목에서는 심한 염증반응이 의심되지는 않습니다. 붉어지는 발적 두드러지는 부종 멍 등의 징후가 보이지는 않기 때문입니다. 하지만 통증이 지속되므로 근육이나 인대의 손상이 존재할 것임을 유추해볼수는 있습니다. 이 경우에 발목을 고정해놓는 처치가 12주 정도 필요할 수 있는데 부목이 없으실테니 발목보호대를 착용하며 사용을 자제하시고 회복을 기다려보시기 바랍니다. 발목보호대는 주무시는 시간을 제외한 나머지 모든 시간동안 착용하시면 되겠고 약국에서 구입하실 수 있습니다. 12주의 시간이 지났음에도 통증이 여전히 나타난다면 정형외과 진료를 다시 받아보셔야 하는 상황이라고 볼 수 있습니다. 그러니 이 경우에는 병원을 방문하시기 바랍니다.

발톱무좀일경우에도요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱무좀 자체로는 증상을 유발하지 않을 가능성이 높습니다. 내성발톱이 동반되어 통증이 유발될 가능성이 높아 보입니다

퇴행성 관절염 질문드립니다..안녕하세요. 메디이즈입니다. 퇴행성 관절염 골관절염이 의심스러운 상황이라 고민스러우시군요. 해당 질환을 진단할 때 반드시 일어서서 엑스레이를 촬영해야 하는 것은 아닙니다. 구체적으로 어떤 방식의 촬영이 있었는지는 알 수 없으나 일반적으로 무릎 관절을 촬영하는 방식을 사용했을 것이므로 질문자님께서 찍은 촬영 사진에서도 퇴행성 관절염의 소견인 좁아진 관절 공간 뼈돌기 osteophyte의 형성 등이 관찰될 수 있을 것이고 이를 통해 질환을 추정할 수 있습니다. 물론 초기 퇴행성 관절염인 경우에 엑스레이가 정상처

림 보이는 경우도 있습니다. 따라서 질문자님께서 검사받으실 때 정상적인 소견을 보였으나 의심스러운 증상이 지속되면 재방문을 권해드릴 수 있습니다. 다만 질문자님께서 호소하시는 증상인 무릎 관절 움직임 시 소리가 들리는 문제는 퇴행성관절염을 의심할만한 증상이라 보긴 어렵습니다. 주된 증상이 통증이고 무릎 관절을 제대로 굽히지 못하게 된다면 부어오르는 증상 등이 동반될 수 있습니다. 따라서 이러한 증상이 없다면 너무 신경쓰지 마시고 근력운동을 저강도부터 천천히 시도해보시기 바랍니다.

페인트 성분이 묻은 손으로 직접 음식을 먹으면 몸에 많이 나쁠까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 페인트를 일부 섭취하신 것 같아서 걱정스러우시군요. 상당한 양의 페인트를 섭취한다면 당연히 문제가 발생하겠지만 질문자님의 상황은 손에 묻어있는 정도의 적은 양을 섭취한 상황이므로 그리 문제가 되지 않을 것입니다. 그럼에도 이물질을 섭취했을 때 복통 구토 설사 혈변 발열 등의 증상이 나타나는 경우에는 반드시 진료가 필요하니 23일 경과를 살피시고 문제가 있다고 생각되시면 꼭 병원을 방문하시기 바랍니다.

흑변에 이어 혈변까지 나왔습니다...안녕하세요. 메디이즈입니다. 흑변으로 위내시경 검사를 진행했고 식도궤양을 진단받으신 상황에서 단단한 변을 보다가 항문의 통증과 함께 출혈을 경험하신 상태로 이해됩니다. 정황상 치열에 의한 항문의 출혈이 가장 의심스럽지만 최근 식도궤양을 진단받으셨으므로 확인 없이 온수좌욕만 하며 관리하시기에 위험한 상태라고 생각합니다. 따라서 가까운 외과에서 치열에 의한 출혈이 맞는지에 대해 확인해보시기 바라며 항문에 통증이 있었던 것과 달리 치열은 미미하고 대장에서의 출혈이 의심된다는 소견이 있다면 추가적인 대장내시경도 고려해보아야 하겠습니다. 질문자님의 쾌유를 빕니다.

임신준비중 고관절통증 어디병원을 가야할까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 임신을 준비중인 상황인데 고관절을 포함한 다리에 통증이 나타나 걱정스러우시군요. 말씀하신 통증의 양상이 주로는 왼쪽으로 나타나는 것 같습니다. 하지만 동시에 양쪽 둔부에도 통증이 나타나고 있습니다. 한 쪽으로만 나타나는 고관절이나 둔부 부근의 통증은 척추질환 고관절질환을 의심해야 하겠지만 양쪽 모두에게 나타나는 경우 척추질환의 가능성이 떨어지겠습니다. 어느 부위의 문제로 통증이 발생하는 것인지는 반드시 엑스레이와 같은 영상 촬영으로 알아내야만 하는 것은 아니고 신체진찰을 통해서도 유추할 수 있습니다. 이러한 진찰을 가장 잘 할 수 있는 전문가는 정형외과 의사이므로 가까운 정형외과를 우선 방문해보시기 바랍니다. 또한 현재 임신이 되었는지 알 수 없는 상황이라서 엑스레이 촬영이 부담스럽다는 말씀도 함께 해보시면 진료에 도움이 되겠습니다. 다만 1회의 엑스레이 촬영으로 노출되는 방사선량의 영향력은 미미하므로 꼭 필요한 검사라면 촬영을 고려해보실수도 있겠습니다.

두통 및 발열 머리 압박감이 있습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 오랜기간 지속되는 두통과 발열이 동반되는 상황으로 걱정스럽고 힘드시겠습니다. 두통의 양상만 두고 본다면 편두통이 의심스럽겠지만 발열이 동반되지는 않는 편입니다. 그렇다면 발열과 심한 두통 뒷목의 통증을 함께 나타내는 뇌수막염과 같은 감염성 질환을 질문자님의 말씀처럼 의심해보아야 할 수도 있습니다. 다만 진료 후 혈액검사상 이상이 없었음을 확인했고 치료를 이어가는 중이며 열이 떨어지고 다른 증상들이 개선되어간다면 뇌수막염 외의 다른 감염증으로 인해 나타난 증상일 가능성도 있을 것이라 보입니다. 두통 외 뚜렷한 불편함을 호소하고 계시지 않아서 발열의 원인을 찾기가 어려운 상황이지만 증상이 나아지지 않으면 추가적인 검사가 필요하다는 사실이 달라지지는 않습니다. 치료 잘 받으시고 두통이 오랜기간 지속된다면 신경과를 열이 잘 떨어지지 않는다면 내과를 추가로 방문해보시기 바랍니다.

발톱무좀일경우에도요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱무좀 자체로는 증상을 유발하지 않을

가능성이 높습니다. 내성발톱이 동반되어 통증이 유발될 가능성이 높아 보입니다
겨드랑이 옆 양쪽팔뚝에 이유를 알 수 없는 빨간선이 생겼습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다.
피부병변부위에 스테로이드 연고를 바르면서 경과를 지켜보셔도 괜찮을 것으로 생각합니다.그러면 없어질것 같습니다

안과 진료 때 선생님이 눈 위쪽을 눌렀는데,안녕하세요. 메디이즈입니다. 아마도 위 눈꺼풀을 뒤집어 까면서 나타난 증상이 아닌가 생각합니다. 그정도로 망막에 무리가 가지는 않을테니 너무 걱정하지마세요

헤르페스 질문입니다,안녕하세요. 요약 헤르페스 아닙니다. 헤르페스바이러스에 감염되면 작은 포도송이 같은 물집이 피부와 점막에 무리를 지어 생기는 것이 특징이며 물집은 가렵고 따갑고 짓무르기도 합니다. 이 물집과 접촉하면 헤르페스바이러스에 감염됩니다. 건승하세요.
외국 병원에 가져가야 할 자료가 뭐가 있을까요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 의무기록을 복사해서 드리면 좋을것 같습니다. 양이 많으면 지금 상태와 직접연관된 진료 검사기록만 챙기셔요 당뇨 고혈압 같은 만성질환이있으면 그기록도 포함시켜주세요

방광염 균 검사 결과,안녕하세요. 요약 1. 항생제 감수성 결과 2. 언급한 2세대 세파계열 항생제는 언급되어 있지 않습니다. 3. S 라고 찍힌것들이 다 감수성이 있다고 되어 있으니 4. 그 중에서 시중에 판매되고 있는 항생제를 골라 잡수시면 됩니다. 건승하세요.

비타민a 간손상 질문입니다.,안녕하세요. 메디이즈입니다. 통상적인 상황에서는 간손상이 올 수 있을 정도로 비타민 a 영양제를 먹거나 비타민 a 가 많은 음식을 섭취하기는 어렵습니다. 적당히 드시는 것이 좋겠습니다

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 일단은 증상이 심하지 않으니 증상에 너무 민감하게 반응하지 않으시고 무시하시는 것이 좋을것 같습니다. 증상이 심해지면 진료 받아보셔요

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 종합할 때 건강에 영향을 미칠만한 문제는 없는 것으로 판단됩니다. 너무 걱정하지 말고 다른 증상이 나타나는지 확인하기 바랍니다.

오늘 언제부터인지는 모르겠는데요...,안녕하세요. 메디이즈입니다. 상기 증상을 종합할 때 건강에 영향을 미칠만한 문제는 없는 것으로 판단됩니다. 너무 걱정하지 말고 다른 증상이 나타나는지 확인하기 바랍니다.

콘돔 찢어짐,안녕하세요 요약 1. 콘돔이 찢어졌다면 임신 가능성이 조금이라도 있으니 2. 피임을 원한다면 사후피임약을 처방받으세요 3. 처방받을때 한번더 물어 보세요 건승하세요
조직검사 결과 암판정을 받으면 몇기정도,안녕하세요. 메디이즈입니다. 정확한 병기는 수술을 해야 알 수 있습니다 T1N1M0 stage II B가 의심됩니다
<https://www.kahbbs.or.kr/confdata/index.kin?gubun5sgubun6>

뇌수막종 증상과 미세출혈,안녕하세요. 메디이즈입니다. 여러가지로 많이 힘드시겠습니다. 시력의 차이가 이전에는 어땠는지 지금 시력은 어떤지 고려가 필요해 보입니다. 오른쪽에 수막종이 있지만 시신경과 위치도 고려해보셔야 할것 같습니다 주치의 선생님이 별말이 없으셨다고 하면 큰 문제는 아닌것 같습니다

요산수치,안녕하세요. 메디이즈입니다. 높은 상태가 계속 되면 문제가 발생할 수도 있습니다. 다만 아직까지는 이상반응이 생기지 않은 상태로 보이구요. 요산 수치가 높다고 다 통풍이 발생하는 것은 아니고 발생할 가능성이 높다고 생각하면 됩니다. 체중관리가 필요해 보입니다.

급해요 촛불로도 흡입화상을 입을수있나요?,안녕하세요. 메디이즈입니다. 가능성은 매우 낮아

보입니다 깊게 마시면 갈수 도 있습니다 다음의 과정을 거쳐 진단합니다 병력 청취 화재 및 연기 노출 여부 의식 소실 여부 호흡곤란 등의 증상 확인 신체 검진 안면부 화상 비강 내 그을음 음성 변화 싹싹거림 기침 객혈 등 호흡기 증상 관찰 검사실 소견 동맥혈가스분석 카르복시헤모글로빈 수치 흉부 X선 검사 등 후두경 검사 목소리 변화가 있는 경우 성대기관 부종 및 화상 여부 확인 기관지경 검사 상부하부 기도 병변 관찰 흡입화상은 생명을 위협할 수 있는 중증 상황이므로 신속하고 적절한 치료가 필수적입니다. 흡입화상의 주요 치료법은 다음과 같습니다. 기도 확보 및 호흡 보조 필요시 기관내삽관 또는 기관절개술을 시행하여 기도를 확보 인공호흡기 등을 이용한 호흡 보조 산소 공급 고농도 산소를 공급하여 저산소증 교정 기관지경 시술 기관지내시경으로 기도 내 이물질 제거 및 병변 평가 약물 치료 부신피질호르몬제 기도 부종 감소 기관지확장제 기도 확장 항생제 2차 감염 예방 수액 및 영양 공급 화상 치료 안면부 화상이 있을 경우 화상 치료 인공호흡기 이탈 및 기관내튜브 제거 시도 재활 치료

발톱무좀일경우에도요,안녕하세요. 메디이즈입니다. 발톱무좀 자체로는 증상을 유발하지 않을 가능성이 높습니다. 내성발톱이 동반되어 통증이 유발될 가능성이 높아 보입니다

피부에 이게 뭔지 알고 싶습니다,안녕하세요. 메디이즈입니다. 모공성 각화증은 오래된 피부 세포가 정상적으로 탈락하지 못하고 표피 내로 들어가 모공의 출구를 막음으로써 모공이 커져서 오돌도돌 닭살처럼 보이는 질환입니다. 비만한 사람 아토피 피부염이 있는 사람 피부가 건조한 사람에게 많이 생기는데 가려움증이 생기며 심하게 긁으면 모공이 도드라지고 오돌도 툭해지면서 더 올라오게 됩니다. 각질 용해제를 쓰기도 하지만 근본적인 치료 방법은 아니며 펄링 레이저 시술로 제거하기도 하지만 주기적 재시술이 필요합니다. 건승하세요.