

Второе задание по допглавам

Anikin Evgeny

29 апреля 2017 г.

1 Метод Лапласа

Задача 1 Решить уравнение

$$\sum_k (a_k + b_k x) \frac{d^k u}{dx^k} = 0 \quad (1)$$

с помощью подстановки

$$u = \oint_{\gamma} v(z) e^{xz} dz, \quad (2)$$

где γ — некоторый контур. Какие условия должны выполняться на концах контура?

Задача 2 Решить уравнение Эйри

$$u'' - zu = 0 \quad (3)$$

Получить два решения, экспоненциально растущее и убывающее при $z \rightarrow \infty$, в виде интегралов по контуру и методом перевала найти их асимптотики при вещественных z , $z \rightarrow \pm\infty$.

Задача 3 С помощью метода Лапласа решить уравнение на полиномы Эрмита и найти производящую функцию полиномов Эрмита.

Задача 4 Методом Лапласа решить уравнение Бесселя с произвольным, не обязательно целым аргументом:

$$u'' + \frac{1}{z}u' + \left(1 - \frac{\nu^2}{z^2}\right)u = 0 \quad (4)$$

Используя полученную интегральную формулу, найти выражение для $J_{n+\frac{1}{2}}(z)$ через элементарные функции. *Указание:* сделать в уравнении замену $u = z^{-\nu}v$.

2 Полиномы Лежандра

Задача 5 Вывести рекуррентные соотношения для полиномов Лежандра, используя производящую функцию:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xy+y^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)y^n \quad (5)$$

Указание: одно из соотношений получается, если продифференцировать равенство по y .

3 Гипергеометрическая функция

Задача 6 Пусть z_0 — особая точка коэффициентов $p(z)$ и $q(z)$ уравнения

$$u'' + p(z)u' + q(z)u = 0 \quad (6)$$

Доказать, что уравнение имеет решение в виде степенного ряда

$$u(z) = z^\nu \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k \quad (7)$$

тогда и только тогда, когда

$$\begin{aligned} p(z) &= \frac{p'(z)}{z - z_0}, \\ q(z) &= \frac{q'(z)}{(z - z_0)^2}, \end{aligned} \quad (8)$$

где $p'(z)$, $q'(z)$ — регулярные в z_0 функции. Как найти ν ?

Особые точки дифференциальных уравнений, в которых выполняются условия (7), называются *регулярными*.

Задача 7 Доказать, что уравнение (5) имеет решение вида

$$u(z) = z^\nu \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{-k} \quad (9)$$

в окрестности $z = \infty$ тогда и только тогда, когда

$$\begin{aligned} p(z) &= \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^{-k} \\ q(z) &= \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} q_k z^{-k} \end{aligned} \quad (10)$$

Эти условия представляют собой очевидное обобщение (7) на случай $z = \infty$. В этом случае говорят, что $z = \infty$ — регулярная особая точка.

Задача 8 Найти общий вид уравнения второго порядка с

1. двумя регулярными особыми точками;
2. тремя регулярными особыми точками.

Имеется в виду, что никаких других особых точек нет.

Задача 9 Найти решение гипергеометрического уравнения

$$z(z-1)u'' + (-\gamma + (\alpha + \beta + 1)z)u' + \alpha\beta u = 0 \quad (11)$$

в виде ряда по z : $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$, причём $c_0 = 1$.

Задача 10 Доказать, что произвольное уравнение с тремя регулярными особыми точками сводится к гипергеометрическому, если перевести особые точки дробно-линейным преобразованием в $0, 1, \infty$ и сделать после этого замену $u = z^\mu(z-1)^\nu v$. *Указание:* μ и ν следует выбрать таким образом, чтобы существовали регулярные решения в окрестности 0 и 1 .

Задача 11 Получить вырожденную гипергеометрическую функцию в виде ряда и уравнение на неё, сделав в (10) замену $z = z'/\beta$ и перейдя к пределу $\beta \rightarrow \infty$.

Задача 12 Выразить полиномы Лежандра через гипергеометрическую функцию. *Указание:* использовать уравнение на полиномы Лежандра.

Задача 13 Решить уравнение на вырожденную гипергеометрическую функцию методом Лапласа.

4 Квантовая механика

Задача 14 Свести радиальное уравнение Шрёдингера для атома водорода к уравнению на вырожденную гипергеометрическую функцию и найти уровни энергии.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \left(-\frac{Ze^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) \psi = E\psi \quad (12)$$

Задача 15