

Paciente: **LUA**
Espécie: **Canina**
Raça: **Pinscher**
Sexo: **Fêmea**
Idade: **11 meses**
Requisição: **29642**

Clínica: **UNIVETS**
Veterinário(a): **Dr João Victor CRMV:3049 - PB**
Proprietário(a): **Maria do Socorro**
Data da coleta: **18/12/2024**
Data de entrada: **18/12/2024**
Data de conclusão: **18/12/2024**

HEMOGRAMA

Material: Sangue total.

Método: Automação em equipamento Hematoclin 2.8 Vet / Exame realizado com revisão de lâmina.

ERITROGRAMA	Resultados	Valores de referência
Hemácias:	1,02 milhões/ μ L	6,0 a 7,0
Hemoglobina:	2,0 g/dL	14,0 a 17,0
Hematócrito:	8,4 %	40,0 a 47,0
VCM:	82,4 fL	65,0 a 78,0
CHCM:	23,8 %	30,0 a 35,0
HCM:	19,6 %	19,0 a 23,0

Conclusão

Anemia normocítica hipocrômica;
Anisocitose acentuada.

LEUCOGRAMA	Resultados	Valores de referência
Leucócitos totais:	1.000 /mm ³	8.000 a 16.000
	relativa(%)	absoluto (/mm ³)
Mielócitos:	0	0
Metamielócitos:	0	0
Neutrófilos bastonetes	0	0
Neutrófilos segmentados	0	0
Linfócitos:	0	0
Monócitos:	0	0
Eosinófilos:	0	0
Basófilos:	0	0

Conclusão

Leucopenia acentuada.

Nota do patologista: Não foi possível realizar a contagem diferencial das células leucocitárias devido a acentuada leucopenia.

PLAQUETAS	24.000 /mm ³	200.000 a 500.000
-----------	--------------------------------	-------------------

Observação

Trombocitopenia acentuada;
Plasma normal.

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS TOTAIS:	6,40 g/dL	5,0 a 7,0
-------------------------------	------------------	-----------

PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS

Negativo para pesquisa.

O resultado negativo não significa ausência de hemoparasitas devido às características cíclicas destes.


Maria do Bom Conselho de Sousa
Médica Veterinária
CRMV-PB 2155
007-MultVet 4.23®



Responsável Técnico : Maria do Bom Conselho de Sousa - CRMV-PB 2155

Os resultados dos testes laboratoriais podem sofrer influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos e etc. A presente análise tem seu valor restrito à amostra entregue ao Laboratório. A interpretação deste resultado e a conclusão é um ato do Médico Veterinário e depende da análise conjunta dos dados clínicos e epidemiológicos.