

## Examen d'appel du 5 juillet 2019

*Les documents, calculatrices et téléphones sont interdits. Le barème n'est donné qu'à titre indicatif et pourra être modifié. Il sera tenu compte de la présentation de la copie et de la rédaction dans l'évaluation.*

Durée : 2h

**Exercice 1 (3 points).** Déterminer, suivant la valeur du paramètre réel  $\lambda$ , la signature de la forme quadratique définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^2, q(x) = (1 + \lambda)(x_1^2 + x_2^2) + 2(1 - \lambda)x_1x_2,$$

où  $x_1, x_2$  sont les coordonnées du vecteur  $x$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ .

**Exercice 2 (4 points).** Étant donné  $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$  dans  $\mathbb{R}^4$ , on pose

$$\forall x \in \mathbb{R}^2, \forall y \in \mathbb{R}^2, b(x, y) = \alpha x_1y_1 + \beta x_1y_2 + \gamma x_2y_1 + \delta x_2y_2,$$

où  $x_1, x_2$  (resp.  $y_1, y_2$ ) sont les coordonnées du vecteur  $x$  (resp.  $y$ ) dans la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ . Déterminer des conditions nécessaire et suffisantes sur  $\alpha, \beta, \gamma$  et  $\delta$  pour que  $b$  définisse un produit scalaire sur  $\mathbb{R}^2$ .

**Exercice 3 (2 points).** Soit la matrice

$$M = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 8 & -4 \\ 8 & 1 & 4 \\ -4 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que  $M$  est une matrice orthogonale.
2. Sans calculer son polynôme caractéristique, justifier que  $M$  est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres avec leurs multiplicités.

**Exercice 4 (4 points).** Soit  $n$  un entier naturel non nul et  $A$  une matrice symétrique de  $M_n(\mathbb{R})$ , telle que  $A^2 = A$ .

1. Que dire de  $A$ ? Montrer en particulier que  $\text{tr}(A) = \text{rang}(A)$ .
2. Établir que

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \leq n\sqrt{\text{rang}(A)} \leq n^{3/2}.$$

3. Montrer alors que

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| < n^{3/2} \text{ si } n \geq 2.$$

**Exercice 5 (3 points).** Soit  $A$  une matrice de  $M_n(\mathbb{R})$  telle que

$$\forall B \in M_n(\mathbb{R}), \text{tr}(B) = 0 \Rightarrow \text{tr}(AB) = 0.$$

1. Quelle est la dimension du sous-espace vectoriel  $E = \{B \in M_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(B) = 0\}$ ?
2. En utilisant la structure euclidienne canonique de  $M_n(\mathbb{R})$ , montrer qu'il existe un réel  $\lambda$  tel que  $A = \lambda I_n$ .

**Exercice 6 (4 points).** Soit  $E$  un espace vectoriel euclidien,  $u$  une isométrie de  $E$  et l'endomorphisme  $v = u - Id$  de  $E$ .

1. Montrer que  $\text{Ker}(v) = \text{Im}(v)^\perp$ . En déduire que  $\text{Ker}(v)^\perp = \text{Im}(v)$ .
2. Soit

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u^k, \text{ où } u^k = \underbrace{u \circ \dots \circ u}_{k \text{ fois}}.$$

Montrer que l'image d'un élément de  $E$  par l'application  $u_n$  converge vers le projeté orthogonal de cet élément sur  $\text{Ker}(v)$  quand  $n$  tend vers l'infini.