

Examen - Mercredi 13 janvier 2021.

durée : 2h00.

Les documents, calculatrices, téléphones et ordinateurs portables sont interdits.

La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation.

Le barème est donné à titre indicatif.

Dans tout le sujet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ désigne un espace de probabilité.

Exercice 1. (5 pts)

1. Donner la définition d'une variable aléatoire discrète. Donner sans démonstration la condition pour qu'elle soit intégrable et donner son espérance dans ce cas.
2. Quand dit-on d'événements $(A_i)_{i \in I}$ qu'ils sont indépendants ?
3. Énoncer puis prouver l'inégalité de Markov.
4. Soit $A \subset \Omega$. Montrer que la fonction 1_A est une variable aléatoire *si et seulement si* $A \in \mathcal{F}$.

Exercice 2. (5 pts) Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre 1, c'est-à-dire de densité $x \rightarrow e^{-x}1_{[0, +\infty[}(x)$. On pose $Y = \min(X, 1)$.

1. Calculer $\mathbf{P}(Y = 1)$.
2. Déterminer la fonction de répartition de Y et la dessiner.
3. La variable aléatoire Y est-elle discrète ? à densité ?

Exercice 3. (5 pts) On considère les lancers successifs de deux pièces équilibrées : soit deux suites $(X_n)_{n \geq 1}$ et $(Y_n)_{n \geq 1}$ formant une famille i.i.d. de variables aléatoires de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$. On considère le premier instant où l'un des deux tirages est « pile » (c'est-à-dire 1) :

$$N = \inf\{n \geq 1 \mid X_n = 1 \text{ ou } Y_n = 1\},$$

avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$.

1. Pour tout $n \geq 1$, écrire l'événement $\{N > n\}$ à l'aide de X_1, \dots, X_n et Y_1, \dots, Y_n puis calculer $\mathbb{P}(N > n)$. Quelle est la loi de N ?
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, X_N est une variable aléatoire. (c'est une question un peu plus difficile : on pourra penser à utiliser la question 4 de l'exercice 1).
3. Pour tout $n \geq 1$ réécrire l'événement

$$\{N = n, X_N = 1, Y_N = 0\}$$

(on rappelle que les virgules se lisent « et ») en fonction de $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n$ et en déduire un calcul de sa probabilité. En déduire la valeur de $\mathbf{P}(X_N = 1, Y_N = 0)$.

4. Que vaut $\mathbf{P}(X_N = 0, Y_N = 0)$? Et $\mathbf{P}(X_N = 0, Y_N = 1)$? Et $\mathbf{P}(X_N = 1, Y_N = 1)$?
5. En déduire une méthode, à l'aide de pièces de monnaie équilibrées, pour tirer un nombre au hasard dans l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ de façon équiprobable.

Exercice 4. (5 pts) La durée de vie d'un atome d'un élément radioactif est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle dont le paramètre $\lambda > 0$ est la constante de désintégration. À $t = 0$, on considère n atomes et les comportements des différents atomes sont indépendants. On introduit donc les variables $(X_i)_{i \leq 1 \leq n}$ i.i.d. de même loi exponentielle de paramètre λ où pour $1 \leq i \leq n$, la variable X_i représente le temps de désintégration de l'atome i .

1. Montrer que X_1 satisfait la propriété de non vieillissement : pour tous réels positifs s et t ,

$$\mathbb{P}(X_1 > t + s | X_1 > t) = \mathbb{P}(X_1 > s)$$

2. Soit Y la variable aléatoire représentant le temps de la première désintégration. Exprimer Y comme fonction des $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ puis calculer la fonction de répartition de Y . Quelle loi reconnait on ?
3. Soit la variable aléatoire Z_t représentant le nombre de désintégrations observées sur $[0, t]$. Donner une expression mathématiques pour Z_t puis identifier sa loi.
4. Calculer $\mathbb{E}(Z_t)$.