



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo Práctico de Especificación

Análisis Habitacional Argentino

08/09/2021

Lc. Computación

Integrante	LU	Correo electrónico
Simon, Martino	374/21	martinosimon@gmail.com
Ramis, Ezequiel	881/21	ezequielramis.hello@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

Índice

1. Auxiliares para base de datos y generales	2
2. Especificación	3
2.1. Ejercicio 1	3
2.2. Ejercicio 2	5
2.3. Ejercicio 3	5
2.4. Ejercicio 4	6
2.5. Ejercicio 5	7
2.6. Ejercicio 6	7
2.7. Ejercicio 7	7
2.8. Ejercicio 8	8
2.9. Ejercicio 9	8
2.10. Ejercicio 10	9
2.11. Ejercicio 11	10

1. Auxiliares para base de datos y generales

Antes de empezar con la especificación de procedimientos, vamos a definir auxiliares para acceder más declarativamente a los atributos de cada tabla, y para uso general:

```
/* Tabla Hogares */
```

```
aux @hogCodusu :  $\mathbb{Z}$  = ord(HOGCODUSU);
aux @hogAño :  $\mathbb{Z}$  = ord(HOGAÑO);
aux @hogTrimestre :  $\mathbb{Z}$  = ord(HOGTRIMESTRE);
aux @hogLatitud :  $\mathbb{Z}$  = ord(HOGLATITUD);
aux @hogLongitud :  $\mathbb{Z}$  = ord(HOGLONGITUD);
aux @ii7 :  $\mathbb{Z}$  = ord(II7);
aux @region :  $\mathbb{Z}$  = ord(REGION);
aux @mas500 :  $\mathbb{Z}$  = ord(MAS_500);
aux @iv1 :  $\mathbb{Z}$  = ord(IV1);
aux @iv2 :  $\mathbb{Z}$  = ord(IV2);
aux @ii2 :  $\mathbb{Z}$  = ord(II2);
aux @ii3 :  $\mathbb{Z}$  = ord(II3);
```

```
/* Tabla Personas */
```

```
aux @indCodusu :  $\mathbb{Z}$  = ord(INDCODUSU);
aux @componente :  $\mathbb{Z}$  = ord(COMPONENTE);
aux @indAño :  $\mathbb{Z}$  = ord(INDAÑO);
aux @indTrimestre :  $\mathbb{Z}$  = ord(INDTRIMESTRE);
aux @ch4 :  $\mathbb{Z}$  = ord(CH4);
aux @ch6 :  $\mathbb{Z}$  = ord(CH6);
aux @nivelEd :  $\mathbb{Z}$  = ord(NIVELED);
aux @estado :  $\mathbb{Z}$  = ord(ESTADO);
aux @cat0cup :  $\mathbb{Z}$  = ord(CATOCUP);
aux @p47t :  $\mathbb{Z}$  = ord(P47T);
aux @pp04g :  $\mathbb{Z}$  = ord(PP04G);
```

```
/* Varios */
```

```
aux #atributosHogar :  $\mathbb{Z}$  = 12;
aux #atributosPersona :  $\mathbb{Z}$  = 11;
aux #habitaciones (h: hogar) : dato = h[@iv2];
aux #dormitorios (h: hogar) : dato = h[@ii2];
aux #personasEnHogar (ti:  $eph_i$ , h: hogar) :  $\mathbb{Z}$  =  $\sum_{i=0}^{|ti|-1}$  if personaEnHogar(ti[i], h) then 1 else 0 fi;
pred esCasa (h: hogar) {
  h[@iv1] = 1
}
pred personaEnHogar (i: individuo, h: hogar) {
  i[@indCodusu] = h[@hogCodusu]
}
pred hogaresConTrimestresIguales (h: hogar, g: hogar) {
  h[@hogTrimestre] = g[@hogTrimestre]
}
```

2. Especificación

2.1. Ejercicio 1

```
proc esEncuestaVálida (in th:  $eph_h$ , in ti:  $eph_i$ , out result: Bool) {  
  Pre {True}  
  Post {result = true  $\leftrightarrow$  encuestaValida(th, ti)}  
}  
  
pred encuestaValida (th:  $eph_h$ , ti:  $eph_i$ ) {  
  |th| > 0  $\wedge$  |ti| > 0  $\wedge_L$   
  esMatriz(th)  $\wedge$  esMatriz(ti)  $\wedge$   
  esTablaCompleta(th, #atributosHogar)  $\wedge$  esTablaCompleta(ti, #atributosPersona)  $\wedge_L$   
   $\neg$ hayIndividuoSinHogar(th, ti)  $\wedge$   $\neg$ hayHogarSinIndividuo(th, ti)  $\wedge$   
   $\neg$ hayIndividuoRepetido(ti)  $\wedge$   $\neg$ hayHogarRepetido(th)  $\wedge$   
  mismaFechaDeRelevamiento(th, ti)  $\wedge$   
  todosHogaresConMenosDe21Integrantes(th, ti)  $\wedge$   
  todosHogaresConMasHabitacionesQueDormitorios(th)  $\wedge$   
  todosAtributosEnRango(th, ti)  $\wedge$   
  atributosValidos(th, ti)  
}  
  
pred esMatriz (s: seq<seq<dato>>) {  
  |s| > 0  $\longrightarrow_L \neg(\exists t : seq<dato>)$  (  
    (t  $\in$  s)  $\wedge$  |head(s)|  $\neq$  |t|  
  )  
}  
  
pred esTablaCompleta (s: seq<seq<dato>>, l:  $\mathbb{Z}$ ) {  
  ( $\forall f : seq<dato>)$  (  
    f  $\in$  s  $\longrightarrow$  |f| = l  
  )  
}  
  
pred hayIndividuoSinHogar (th:  $eph_h$ , ti:  $eph_i$ ) {  
  ( $\exists i : individuo$ ) (  
    i  $\in$  ti  $\wedge_L$   
     $\neg(\exists h : hogar)$  (  
      h  $\in$  th  $\wedge_L$  personaEnHogar(i, h)  
    )  
  )  
}  
  
pred hayHogarSinIndividuo (th:  $eph_h$ , ti:  $eph_i$ ) {  
  ( $\exists h : hogar$ ) (  
    h  $\in$  th  $\wedge_L$   
     $\neg(\exists i : individuo)$  (  
      i  $\in$  ti  $\wedge_L$  personaEnHogar(i, h)  
    )  
  )  
}  
  
pred hayIndividuoRepetido (s:  $eph_i$ ) {  
  ( $\exists a, b : individuo$ ) (  
    (a  $\in$  s  $\wedge$  b  $\in$  s  $\wedge$  a  $\neq$  b)  $\wedge_L$  a[@indCodusu] = b[@indCodusu]  $\wedge$  a[@componente] = b[@componente]  
  )  
}
```

```

}
pred hayHogarRepetido (s:  $eph_h$ ) {
  ( $\exists a, b : hogar$ ) (
    ( $a \in s \wedge b \in s \wedge a \neq b$ )  $\wedge_L$   $a[@hogCodusu] = b[@hogCodusu]$ 
  )
}
pred mismaFechaDeRelevamiento (th:  $eph_h$ , ti:  $eph_i$ ) {
  ( $|th| > 0 \wedge |ti| > 0$ )  $\rightarrow_L$  (
    ( $\forall h : hogar$ ) (
       $h \in th \rightarrow_L$  (
         $h[@hogAño] = head(th)[@hogAño] \wedge$ 
         $h[@hogTrimestre] = head(th)[@hogTrimestre]$ 
      )
    )  $\wedge$ 
    ( $\forall i : individuo$ ) (
       $i \in ti \rightarrow_L$  (
         $i[@indAño] = head(ti)[@indAño] \wedge$ 
         $i[@indTrimestre] = head(ti)[@indTrimestre] \wedge$ 
         $i[@indAño] = head(th)[@hogAño] \wedge$ 
         $i[@indTrimestre] = head(th)[@hogTrimestre]$ 
      )
    )
  )
}
pred todosHogaresConMenosDe21Integrantes (th:  $eph_h$ , ti:  $eph_i$ ) {
  ( $\forall h : hogar$ ) (
     $h \in th \rightarrow_L 21 > \#personasEnHogar(ti, h)$ 
  )
}
pred todosHogaresConMasHabitacionesQueDormitorios (th:  $eph_h$ ) {
  ( $\forall h : hogar$ ) (
     $h \in th \rightarrow_L \#habitaciones(h) \geq \#dormitorios(h)$ 
  )
}
pred todosAtributosEnRango (th:  $eph_h$ , ti:  $eph_i$ ) {
  ( $\forall h : hogar$ ) (
     $h \in th \rightarrow_L$  (
       $1 \leq h[@ii7] \leq 3 \wedge$ 
       $1 \leq h[@region] \leq 6 \wedge$ 
       $0 \leq h[@mas500] \leq 1 \wedge$ 
       $1 \leq h[@iv1] \leq 5 \wedge$ 
       $1 \leq h[@ii3] \leq 2$ 
    )  $\wedge$ 
    ( $\forall i : individuo$ ) (
       $i \in ti \rightarrow_L$  (
         $1 \leq i[@ch4] \leq 2 \wedge$ 
         $0 \leq i[@nivelEd] \leq 1 \wedge$ 
         $-1 \leq i[@estado] \leq 1 \wedge$ 
         $0 \leq i[@catOcup] \leq 4 \wedge$ 
         $1 \leq i[@pp04g] \leq 10 \wedge$ 
         $-1 \leq i[@p47t]$ 
      )
    )
  )
}

```

```

}
pred atributosValidos (th:  $eph_h$ , ti:  $eph_i$ ) {
  ( $\forall h : hogar$ ) (
     $h \in th \rightarrow_L$  (
       $0 < h[@hogCodusu] \wedge$ 
       $1800 \leq h[@hogAño] \wedge$ 
       $1 \leq h[@hogTrimestre] \leq 4 \wedge$ 
       $1 \leq \#habitaciones(h) \wedge$ 
       $1 \leq \#dormitorios(h)$ 
    )
  )  $\wedge$ 
  ( $\forall i : individuo$ ) (
     $i \in ti \rightarrow_L$  (
       $0 < i[@indCodusu] \wedge$ 
       $1 \leq i[@componente] \wedge$ 
       $1800 \leq i[@indAño] \wedge$ 
       $1 \leq i[@indTrimestre] \leq 4 \wedge$ 
       $0 \leq i[@ch6]$ 
    )
  )
}

```

2.2. Ejercicio 2

```

proc histHabitacional (in th:  $eph_h$ , in ti:  $eph_i$ , in region:  $\mathbb{Z}$ , out res:  $seq\langle\mathbb{Z}\rangle$ ) {
  Pre { $encuestaValida(th, ti) \wedge 1 \leq region \leq 6$ }
  Post { $longitudDeHistograma(th, region, res) \wedge$ 
    ( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |res| \rightarrow_L res[i] = \#casaConNHabitacionesEnRegion(th, i + 1, region)$ )
  }
}

aux #casaConNHabitacionesEnRegion (th:  $eph_h$ , n:  $\mathbb{Z}$ , r: dato) :  $\mathbb{Z} =$ 
   $\sum_{i=0}^{|th|-1} \text{if } esCasa(th[i]) \wedge \#habitaciones(th[i]) = n \wedge th[i][@region] = r \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi}$ 
;
pred longitudDeHistograma (th:  $eph_h$ , r:  $\mathbb{Z}$ , res:  $seq\langle\mathbb{Z}\rangle$ ) {
  ( $\exists h : hogar$ ) (
     $h \in th \wedge_L esCasa(h) \wedge h[@region] = r \wedge$ 
    ( $\forall g : hogar$ ) (
       $(g \in th \wedge_L esCasa(g) \wedge g[@region] = r) \rightarrow \#habitaciones(h) \geq \#habitaciones(g)$ 
    )
  )  $\wedge$ 
   $\#habitaciones(h) = |res|$ 
}
}

```

2.3. Ejercicio 3

```

proc laCasaEstaQuedandoChica (in th:  $eph_h$ , in ti:  $eph_i$ , out res:  $seq\langle\mathbb{R}\rangle$ ) {
  Pre { $encuestaValida(th, ti)$ }
  Post { $|res| = 6 \wedge_L$ 
    ( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) (
       $0 \leq i < |res| \rightarrow_L$  (
         $(\#casasPorRegion(th, i + 1) \neq 0 \rightarrow$ 
           $res[i] = \#casasCriticasPorRegion(th, ti, i + 1) / \#casasPorRegion(th, i + 1)$ 
        )
      )
    )
  }
}

```

```

    ) ∧
    (#casasPorRegion(th, i + 1) = 0 → res[i] = 0)
  )
}
}
}
aux #casasPorRegion (th: ephh, r: ℤ) : ℤ =
  ∑i=0|th|-1 if esCasa(th[i]) ∧ th[i][@region] = r ∧ ¬estaEnGranAglomerado(th[i]) then 1 else 0 fi
;
aux #casasCriticasPorRegion (th: ephh, ti: ephi, r: ℤ) : ℤ =
  ∑i=0|th|-1 if esCasaCritica(th[i], ti) ∧ th[i][@region] = r then 1 else 0 fi
;
pred esCasaCritica (h: hogar, ti: ephi) {
  esCasa(h) ∧ esHacinamientoCritico(h, ti) ∧ ¬estaEnGranAglomerado(h)
}
pred esHacinamientoCritico (h: hogar, ti: ephi) {
  #personasEnHogar(ti, h) / #dormitorios(h) > 3
}
pred estaEnGranAglomerado (h: hogar) {
  h[@mas500] = 1
}

```

2.4. Ejercicio 4

```

proc creceElTeleworkingEnCiudadesGrandes (in t1h: ephh, in t1i: ephi, in t2h: ephh, in t2i: ephi, out res: Bool) {
  Pre {(encuestaValida(t1h, t1i) ∧ encuestaValida(t2h, t2i)) ∧L (
    esHogarConAñoPrevio(head(t1h), head(t2h)) ∧
    hogaresConTrimestresIguales(head(t1h), head(t2h))
  )}
  Post {res = true ↔ teleworkingEnCiudadesGrandes(t1h, t1i) < teleworkingEnCiudadesGrandes(t2h, t2i)}
}

pred esHogarConAñoPrevio (h: hogar, g: hogar) {
  h[@hogAño] < g[@hogAño]
}

aux teleworkingEnCiudadesGrandes (th: ephh, ti: ephi) : ℝ =
  if #personasTrabajandoEnCiudadesGrandes(th, ti) ≠ 0 then
    #personasTrabajandoADistanciaEnCiudadesGrandes(th, ti) / #personasTrabajandoEnCiudadesGrandes(th, ti)
  else 0 fi
;
aux #personasTrabajandoADistanciaEnCiudadesGrandes (th: ephh, ti: ephi) : ℤ =
  ∑i=0|ti|-1 if viveEnHogarAptoParaTeleworking(ti[i], th) ∧ trabajaADistancia(ti[i]) then 1 else 0 fi
;
aux #personasTrabajandoEnCiudadesGrandes (th: ephh, ti: ephi) : ℤ =
  ∑i=0|ti|-1 if viveEnCiudadGrande(ti[i], th) ∧ trabaja(ti[i]) then 1 else 0 fi
;
pred viveEnHogarAptoParaTeleworking (i: individuo, th: ephh) {
  (∃h : hogar) (
    h ∈ th ∧L
    personaEnHogar(i, h) ∧ esCasaODepto(h) ∧ h[@mas500] = 1 ∧ h[@ii3] = 1
  )
}

```

```

}
pred esCasaODepto (h: hogar) {
  h[@iv1] = 1  $\vee$  h[@iv1] = 2
}
pred trabajaADistancia (i: individuo) {
  i[@pp04g] = 6  $\wedge$  trabaja(i)
}
pred trabaja (i: individuo) {
  i[@estado] = 1
}
pred viveEnCiudadGrande (i: individuo, th: ephh) {
  ( $\exists h : \text{hogar}$ ) (
    h  $\in$  th  $\wedge_L$ 
    personaEnHogar(i, h)  $\wedge$  esCasaODepto(h)  $\wedge$  h[@mas500] = 1
  )
}

```

2.5. Ejercicio 5

```

proc costoSubsidioMejora (in th: ephh, in ti: ephi, in monto:  $\mathbb{Z}$ , out res:  $\mathbb{Z}$ ) {
  Pre { encuestaValida(th, ti)  $\wedge$  monto > 0 }
  Post { res =  $\sum_{i=0}^{|th|-1}$  if esHogarSubsidiado(th[i], ti) then monto else 0 fi }
}
pred esHogarSubsidiado (h: hogar, ti: ephi) {
  esCasa(h)  $\wedge$  h[@ii7] = 1  $\wedge$  #dormitorios(h) < #personasEnHogar(ti, h) - 2
}

```

2.6. Ejercicio 6

```

proc generarJoin (in th: ephh, in ti: ephi, out junta: joinHI) {
  Pre { encuestaValida(th, ti) }
  Post { ( $\forall i : \text{individuo}$ )(i  $\in$  ti  $\longrightarrow$  ( $\exists hi : \text{hogar} \times \text{individuo}$ )(hi  $\in$  junta  $\wedge$  i  $\in$  hi1))  $\wedge$ 
    ( $\forall hi : \text{hogar} \times \text{individuo}$ )(hi  $\in$  junta  $\longrightarrow$  (
      hi0  $\in$  th  $\wedge$  hi1  $\in$  ti  $\wedge_L$  hi0[@hogCodusu] = hi1[@indCodusu])
    )
  }
}

```

2.7. Ejercicio 7

```

proc ordenarRegionYTipo (inout th: ephh, inout ti: ephi) {
  Pre { encuestaValida(th, ti)  $\wedge$  th = TH  $\wedge$  ti = TI }
  Post {
    |th| = |TH|  $\wedge$  |ti| = |TI|  $\wedge$ 
    ( $\forall h : \text{hogar}$ )(h  $\in$  th  $\leftrightarrow$  h  $\in$  TH)  $\wedge$ 
    ( $\forall i : \text{individuo}$ )(i  $\in$  ti  $\leftrightarrow$  i  $\in$  TI)  $\wedge_L$ 
    hogaresOrdenados(th)  $\wedge$  individuosOrdenados(th, ti)
  }
}
pred hogaresOrdenados (th: ephh) {
  ( $\forall i : \mathbb{Z}$ )(0  $\leq$  i < |th| - 1  $\longrightarrow_L$  (

```



```

    th[i][@region] ≤ th[i + 1][@region] ∧
    (th[i][@region] = th[i + 1][@region] → th[i][@hogCodusu] < th[i + 1][@hogCodusu])
  )
}
pred individuosOrdenados (th: ephh, ti: ephi) {
  (∀i : ℤ)(0 ≤ i < |ti| - 1 →L
    indicePorCodusu(th, ti[i][@indCodusu]) = indicePorCodusu(th, ti[i + 1][@indCodusu]) → (
      ti[i][@componente] < ti[i + 1][@componente]
    ) ∧
    ti[i][@indCodusu] < ti[i + 1][@indCodusu] → (
      indicePorCodusu(th, ti[i][@indCodusu]) < indicePorCodusu(th, ti[i + 1][@indCodusu])
    )
  )
}
aux indicePorCodusu (s: ephh, e: dato) : ℤ = ∑i=0|s|-1 if s[i][@hogCodusu] = e then i else 0 fi;

```

2.8. Ejercicio 8

```

proc muestraHomogenea (in th: ephh, in ti: ephi, out res: seq⟨hogar⟩) {
  Pre {encuestaValida(th, ti)}
  Post {(∃s : seq⟨hogar⟩) (
    esHomogenea(s, th, ti) ∧
    (∀t : seq⟨hogar⟩)(esHomogenea(t, th, ti) → |s| ≥ |t|) ∧
    (|s| < 3 → res = <>) ∧
    (|s| ≥ 3 → res = s)
  )}
}
pred esHomogenea (s: seq⟨hogar⟩, th: ephh, ti: ephi) {
  (∀h : hogar)(h ∈ s → h ∈ th) ∧L mismaDiferencia(s, ti) ∧ ordenadaPorIngresos(s, ti)
}
pred mismaDiferencia (s: seq⟨hogar⟩, ti: ephi) {
  (∀i : ℤ)(1 ≤ i < |s| - 1 →L diferenciaDeIngresos(s[i], s[i - 1], ti) = diferenciaDeIngresos(s[i], s[i + 1], ti))
}
pred ordenadaPorIngresos (s: seq⟨hogar⟩, ti: ephi) {
  (∀i : ℤ)(0 ≤ i < |s| - 1 →L ingresosEnHogar(s[i], ti) ≤ ingresosEnHogar(s[i + 1], ti))
}
aux diferenciaDeIngresos (a, b: hogar, ti: ephi) : ℤ = |ingresosEnHogar(a, ti) - ingresosEnHogar(b, ti)|;
aux ingresosEnHogar (h: hogar, ti: ephi) : ℤ =
  ∑i=0|ti|-1 if personaEnHogar(ti[i], h) ∧ ti[i][@p47T] ≠ -1 then ti[i][@p47T] else 0 fi
;

```

2.9. Ejercicio 9

```

proc corregirRegion (inout th: ephh, in ti: ephi) {
  Pre {encuestaValida(th, ti) ∧ th = TH}
  Post {|th| = |TH| ∧L (∀i : ℤ)(0 ≤ i < |th| →L (
    (TH[i][@region] = 1 → th[i] = setAt(TH[i], @region, 5)) ∧
    (TH[i][@region] ≠ 1 → th[i] = TH[i]))
  )
}

```

```

    })
}

```

2.10. Ejercicio 10

```

proc histogramaDeAnillosConcentricos (in th:  $eph_h$ , in centro:  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , in distancias:  $seq(\mathbb{Z})$ , out result:  $seq(\mathbb{Z})$ ) {
  Pre {
     $tablaHogarValida(th) \wedge$ 
     $|distancias| > 0 \wedge$ 
     $(\forall i : \mathbb{Z})(0 \leq i < |distancias| - 1 \longrightarrow_L 0 < distancias[i] < distancias[i + 1])$ 
  }
  Post {  $|result| = |distancias| \wedge_L$ 
     $(\forall i : \mathbb{Z}) ($ 
       $0 \leq i < |result| \longrightarrow_L ($ 
         $(i = 0 \longrightarrow res[i] = hogaresEnRadio(th, centro, -1, distancias[0])) \wedge$ 
         $(i \neq 0 \longrightarrow res[i] = hogaresEnRadio(th, centro, distancias[i - 1], distancias[i]))$ 
      )
    )
  }
}

pred tablaHogarValida (th:  $eph_h$ ) {
   $|th| > 0 \wedge_L$ 
   $esMatriz(th) \wedge$ 
   $esTablaCompleta(th, \#atributosHogar) \wedge_L$ 
   $\neg hayHogarRepetido(th) \wedge$ 
   $mismaFechaDeRelevamientoHogar(th) \wedge$ 
   $todosHogaresConMasHabitacionesQueDormitorios(th) \wedge$ 
   $todosAtributosEnRangoHogar(th) \wedge$ 
   $atributosValidosHogar(th)$ 
}

pred mismaFechaDeRelevamientoHogar (th:  $eph_h$ ) {
   $(\forall h : hogar) ($ 
     $h \in th \longrightarrow_L ($ 
       $h[@hogAño] = head(th)[@hogAño] \wedge$ 
       $h[@hogTrimestre] = head(th)[@hogTrimestre]$ 
    )
  )
}

pred todosAtributosEnRangoHogar (th:  $eph_h$ ) {
   $(\forall h : hogar) ($ 
     $h \in th \longrightarrow_L ($ 
       $1 \leq h[@ii7] \leq 3 \wedge$ 
       $1 \leq h[@region] \leq 6 \wedge$ 
       $0 \leq h[@mas500] \leq 1 \wedge$ 
       $1 \leq h[@iv1] \leq 5 \wedge$ 
       $1 \leq h[@ii3] \leq 2$ 
    )
  )
}

pred atributosValidosHogar (th:  $eph_h$ ) {
   $(\forall h : hogar) ($ 

```

```

     $h \in th \longrightarrow_L ($ 
     $0 < h[@hogCodusu] \wedge$ 
     $1800 \leq h[@hogAño] \wedge$ 
     $1 \leq h[@hogTrimestre] \leq 4 \wedge$ 
     $1 \leq \#habitaciones(h) \wedge$ 
     $1 \leq \#dormitorios(h)$ 
  )
}
aux hogaresEnRadio (th:  $eph_h$ , centro:  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , desde:  $\mathbb{Z}$ , hasta:  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z} =$ 
   $\sum_{j=0}^{|th|-1} \text{if } desde < distanciaEuclidiana(centro, (th[j][@hogLatitud], th[j][@hogLongitud])) \leq hasta \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi}$ 
;
aux distanciaEuclidiana (c1,c2:  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{R} = \sqrt{(c2_0 - c1_0)^2 + (c2_1 - c1_1)^2}$ ;

```

2.11. Ejercicio 11

```

proc quitarIndividuos (inout th:  $eph_h$ , inout ti:  $eph_i$ , in busqueda:  $seq\langle ItemIndividuo \times dato \rangle$ , out result:  $eph_h \times eph_i$ )
{
  Pre {  $encuestaValida(th, ti) \wedge busquedaValida(busqueda) \wedge th = TH \wedge ti = TI$  }
  Post {
     $(\forall i : individuo)(i \in ti \longrightarrow i \in TI) \wedge$ 
     $(\forall h : hogar)(h \in th \longrightarrow h \in TH) \wedge$ 
     $(\forall h : hogar)(\forall i : individuo)($ 
       $(i \in TI \wedge h \in TH \wedge_L personaEnHogar(i, h)) \longrightarrow_L ($ 
         $(hayAlguienCoincidente(TI, h, busqueda)) \leftrightarrow$ 
         $((h, i) \in result \wedge h \notin th \wedge i \notin ti)$ 
      )
    )
  }
}

pred busquedaValida (busqueda:  $seq\langle ItemIndividuo \times dato \rangle$ ) {
   $(\forall b : ItemIndividuo \times dato) ($ 
     $b \in busqueda \longrightarrow esAtributoBusquedaValido(ord(b_0), b_1)$ 
  )  $\wedge_L$ 
   $\neg(\exists i, j : \mathbb{Z}) ($ 
     $0 \leq i, j < |busqueda| \wedge i \neq j \wedge_L ord(busqueda[i]_0) = ord(busqueda[j]_0)$ 
  )
}

pred esAtributoBusquedaValido (i:  $\mathbb{Z}$ , dato:  $\mathbb{Z}$ ) {
   $(i = @indCodusu \longrightarrow 0 < dato) \wedge$ 
   $(i = @componente \longrightarrow 1 \leq dato) \wedge$ 
   $(i = @indAo \longrightarrow 1800 \leq dato) \wedge$ 
   $(i = @indTrimestre \longrightarrow 1 \leq dato \leq 4) \wedge$ 
   $(i = @ch4 \longrightarrow 1 \leq dato \leq 2) \wedge$ 
   $(i = @ch6 \longrightarrow 0 \leq dato) \wedge$ 
   $(i = @nivelEd \longrightarrow 0 \leq dato \leq 1) \wedge$ 
   $(i = @estado \longrightarrow -1 \leq dato \leq 1) \wedge$ 
   $(i = @catOcup \longrightarrow 0 \leq dato \leq 4) \wedge$ 
   $(i = @p47t \longrightarrow -1 \leq dato) \wedge$ 
   $(i = @pp04g \longrightarrow 1 \leq dato \leq 10)$ 
}

pred coincideConTerminos (i : individuo, busqueda:  $seq\langle ItemIndividuo \times dato \rangle$ ) {

```

```

    ( $\forall t : \mathbb{Z}$ ) (
       $0 \leq t < |busqueda| \longrightarrow_L i[ord(busqueda[t]_0)] = busqueda[t]_1$ 
    )
  }
pred hayAlguienCoincidente (ti:  $eph_i$ , h: hogar, busqueda:  $seq\langle ItemIndividuo \times dato \rangle$ ) {
  #personasEnHogarCoincidentes(ti, h, busqueda) > 0
}
aux #personasEnHogarCoincidentes (ti:  $eph_i$ , h: hogar, busqueda:  $seq\langle ItemIndividuo \times dato \rangle$ ) :  $\mathbb{Z} =$ 
   $\sum_{j=0}^{|ti|-1}$  if personaEnHogar(ti[j], h)  $\wedge$  coincideConTerminos(ti[j], busqueda) then 1 else 0 fi
;

```