SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

## Datos del Producto

**Número de Registro:** 15715 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 14/01/1981 **Renovación:** 27/02/2017 **Caducidad:** 31/10/2026

**Nombre Comercial:** SEMEFIL 20 SL

## Titular

**NUFARM ESPAÑA S.A.**

C/ Balmes 200, 1º 4ª

08006 Barcelona

(Barcelona)

ESPAÑA

## Fabricante

**NUFARM ESPAÑA S.A.**

C/ Balmes 200, 1º 4ª

08006 Barcelona

(Barcelona)

ESPAÑA

## Composición

ACIDO GIBERELICO 2% [SL] P/V

## Envases

Botellas y garrafas de HDPE fluorado de capacidad 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l y 20 l.

## Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | Retraso maduración del cultivo | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 | - | 1.000-3.000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)Aplicar en fruto maduro (BBCH 81).Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| | Aumento de cuajado | 1,5 l/ha | Máx. 2 | 14 | 1.500 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)<br>Aplicar en primavera, la primera aplicación cuando comienza la floración (BBCH 61) y la segunda aplicación cuando comienza el cuajado (BBCH 71).<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Alcachofa | Adelanto maduración del cultivo | 0,4 - 0,88 l/ha | Máx. 3 | 14-21 | 500 l/ha | Al aire libre.<br>Aplicar en otoño para avanzar la recolección, dirigir el tratamiento al cogollo del cultivo. La primera aplicación se realizará entre las 6 y 8 hojas verdaderas del cultivo (BBCH 16-18). |
| | Aumento peso del fruto | 0,4 l/ha | | | | |
| Cítricos | Retraso maduración del cultivo | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 | - | 1.000-3.000 l/ha | Naranjo dulce, mandarino, limonero, pomelo y lima.<br>Aplicar en fruto maduro (BBCH 81). |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Aumento de cuajado | 1,5 l/ha | Máx. 2 | 14 | 1.500 l/ha | Incluye clementino. Aplicar en primavera, la primera aplicación cuando comienza la floración (BBCH 61) y la segunda aplicación cuando comienza el cuajado (BBCH 71). |
| Vid de mesa | Aumento peso del fruto | 1 - 2 l/ha | Máx. 2 | 14-21 | 1.000 l/ha | Solo en uva de mesa sin semilla.<br><br>Realizar la primera aplicación cuando alrededor del 70-80% de los capuchones flores se han caído (BBCH 67-68) y la segunda aplicación al final de la floración (BBCH 69), principio del cuajado (BBCH 71). |
| | Inducción alargamiento del racimo | | | | Uva de mesa sin semilla: 1.000 l/ha<br>Uva de mesa con semilla: 600 l/ha | Uva de mesa sin semilla y con semilla.<br><br>Sin semilla: realizar la primera aplicación cuando alrededor del 70-80% de los capuchones flores se han caído (BBCH 67-68) y la segunda aplicación al final de la floración (BBCH 69), principio del cuajado (BBCH 71).<br><br>Con semilla: Aplicar durante la aparición del órgano floral (BBCH 53-55).<br>Dosis: 1,2 l/ha. Máximo 1 aplicación. |
| Vid | Inducción alargamiento del racimo | 0,25 l/ha | 1 | - | 1.000 l/ha | Pasas de Corinto.<br>Aplicar al final de la floración (BBCH 69), principio del cuajado (BBCH 71). |

## Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|---|---|
| Aguacate | 1 |
| Alcachofa, Cítricos, Mandarino (incluido clementino e híbridos), Vid de mesa, Vid | NA |

## Condiciones Generales de Uso

Fitorregulador.
Pulverizar sobre la planta cubriéndola totalmente con el caldo. En la etiqueta se indicará la incompatibilidad con otros productos fitosanitarios. Evitar arrastre de líquido pulverizado a otros cultivos por el viento.
Aplicar solo al aire libre mediante pulverización con tractor o manual con mochila y lanza/pistola.
Los efectos provocados por el tratamiento dependen de las condiciones ambientales, momentos fenológicos del cultivo tratado y las diversas variedades de cultivo. Antes del tratamiento, probar en pequeñas muestras de cultivo con la dosis más baja sobre la variedad a tratar con la finalidad de considerar posibles efectos no esperados. Se adaptarán las técnicas a utilizar.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

## Clase de Usuario

Uso profesional.

## Mitigación de riesgos en la manipulación

**SEGURIDAD DEL APLICADOR**

**AIRE LIBRE:**
**• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:**
**Para pulverizaciones con tractor y manuales con mochila y lanza/pistola:**
**o Ropa de trabajo,**
**o Guantes de protección química.**

**• APLICACIÓN:**
**Para pulverizaciones con tractor:**
**o Ropa de trabajo.**

**Para pulverizaciones manuales con mochila y lanza/pistola:**
**o Ropa de trabajo.**
**o Guantes de protección química.**

**INVERNADERO:**
**• MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:**
**Pulverizaciones manuales con mochila y lanza/pistola:**
**o Ropa de trabajo,**
**o Guantes de protección química.**

**SEGURIDAD DEL TRABAJADOR**
**o Ropa de trabajo.**

**PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):**
**-**

**FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO**
**Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.**
**Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo**
**No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.**

## Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Irritación cutánea. Categoría 2. |
| Pictograma | GHS07 (signo de exclamación) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.<br>H315 -Provoca irritación cutánea. |
| Consejos de Prudencia | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.<br><br>P280 -Llevar guantes y prendas de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | |
| Consejos de Prudencia | |

## Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

## Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

(*) Con respecto a los usos menores autorizados en esta propuesta de autorización; aguacate, tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”