SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 19848 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 04/12/1995 **Renovación:** 20/01/2016 **Caducidad:** 28/02/2026

Nombre Comercial: CORDALENE

Titular

CBC (EUROPE) S.R.L.

Via Zanica, 25

24050 GrassobbioBG

ITALIA

Fabricante

CBC (EUROPE) S.R.L.

Via Zanica, 25

24050 GrassobbioBG

ITALIA

Composición

BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) (24x106 U.I./G) 18,3% [SC] P/V

Envases

Botellas de 30 ml, 100 ml (Ø de boca 41,7 mm), 250 ml (Ø de boca 41,7 mm) y 500 ml (Ø de boca 41,7 mm).
Botellas de 1 l (Ø de boca 41,7 mm),
Garrafas de 5 l (Ø de boca 41,8 mm), 10 l (Ø de boca 41,8 mm), 20 l, rango de 25 l a 1.000 l, de HDPE, COEX y EVOH.
Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Acelga	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Acerolo	Heliothis, Helicoverpa spp. Plusia, Autographa gamma Plusia, Chrysodeixis chalcites Rosquilla negra, Spodoptera littoralis Rosquilla verde, Spodoptera exigua	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Aguacate	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Heliothis, Helicoverpa spp.					

Ajo	Lepidópteros Plusia, Autographa gamma Plusia, Chrysodeixis chalcites	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Alcachofa	Barrenador de la alcachofa, Gortyna xanthenes				500-1.000 l/ha	Solo aire libre. Aplicar durante y después del desarrollo foliar (BBCH > 19).
	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Almendro	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana Lepidópteros Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella Polilla oriental, Grapholita molesta	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Altramuz	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, solo altramuz seco, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Apio	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero, para tallo y hojas): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Apionabo	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Arándano, mirtilo	Heliothis, Helicoverpa spp. Lepidópteros Plusia, Autographa gamma Plusia, Chrysodeixis chalcites Rosquilla negra, Spodoptera littoralis Rosquilla verde, Spodoptera exigua	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, incluye arándano común o azul y arándano rojo): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Arbustos frutales	Heliothis, Helicoverpa spp. Lepidópteros Plusia, Autographa gamma Plusia, Chrysodeixis chalcites Rosquilla negra, Spodoptera littoralis Rosquilla verde, Spodoptera exigua	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, incluye escaramujos y bayas de saúco): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Al aire libre e invernadero.
	Polilla oriental, Grapholita molesta Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana					(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Específico contra polilla de invierno. Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).

	Lepidópteros					
Avellano	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Barbarea	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Batata, boniato	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Berenjena	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar hasta maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
Berro de agua	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Berro, mastuerzo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Berza , col	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Brécol	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Canónigo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Caqui	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, incluye caqui de Virginia): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Cardo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Polilla oriental, Grapholita molesta					(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Específico contra polilla de invierno. Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana					
	Lepidópteros					
Castaño	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Heliothis, Helicoverpa spp.					
	Lepidópteros					
	Plusia, Autographa gamma					
Cebolleta	Plusia, Chrysodeixis chalcites	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Heliothis, Helicoverpa spp.					
	Lepidópteros					
	Plusia, Autographa gamma					
Cebollino	Plusia, Chrysodeixis chalcites	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Heliothis, Helicoverpa spp.					

	Plusia, Autographa gamma					
Chalote	Plusia, Chrysodeixis chalcites	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Chirimoyo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Chirivía	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Cítricos	Prays, polilla de los cítricos, Prays citri	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Aplicar hasta la maduración del fruto (BBCH 80).
Col de Bruselas	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Col de China	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Coliflor	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Colinabo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Colirrábano	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Procesionaria, Thaumetopoea spp. Lagartas, Lymantria spp.					Aire libre e invernadero. En aplicación aérea en pinares contra procesionaria el producto se emplea a dosis 1,5 l /ha mezclado con 3,5 l/ha de agua.
Coníferas	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-2000 l/ha	Aire libre e invernadero.
Cucurbitáceas de piel comestible (producto cosechado)	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Calabacín, pepino. Al aire libre e invernadero. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
Cucurbitáceas de piel no comestible	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Melón, sandía, calabaza. Al aire libre e invernadero. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
Endibia	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Espárrago	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Especias	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero, solo apio, cilantro, eneldo e hinojo): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Espinaca	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Heliothis, Helicoverpa spp. Lepidópteros Plusia, Autographa gamma Plusia, Chrysodeixis chalcites Rosquilla negra, Spodoptera littoralis					

Frambueso	Rosquilla verde, Spodoptera exigua	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Frondosas	Lagartas, Lymantria spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-2000 l/ha	Aire libre e invernadero.
Frutales de hueso	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Melocotonero/nectarino, albaricoquero, cerezo, ciruelo y endrino. En el caso del endrino únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Aplicar hasta la maduración del fruto (BBCH 80).
	Polilla oriental, Grapholita molesta	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Melocotonero/nectarino, albaricoquero, cerezo, ciruelo y endrino. En el caso del endrino únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Aplicar hasta la maduración del fruto (BBCH>80).
Frutales de pepita	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana Capua, Adoxophyes orana Orugas de la piel, Pandemis spp.	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Manzano, peral, membrillero. Aplicar hasta la maduración del fruto (BBCH 80).
Granado	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Grosellero	Heliothis, Helicoverpa spp. Lepidópteros Plusia, Autographa gamma Plusia, Chrysodeixis chalcites Rosquilla negra, Spodoptera littoralis Rosquilla verde, Spodoptera exigua	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Guisante para grano	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Guisante proteaginoso /forrajero	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Guisante verde	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Haba forrajera	Heliothis, Helicoverpa spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Haba para grano	Heliothis, Helicoverpa spp.				500-1.000 l/ha	Aire libre. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Haba verde	Heliothis, Helicoverpa spp.				500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Hierbas aromáticas y flores comestibles (producto cosechado)	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, incluye salvia real, romero, tomillo, albahaca, hojas de laurel y estragón, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Higuera	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Hinojo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).

Judía forrajera	Heliothis, Helicoverpa spp.	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.000 l/ha	Aire libre. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
Judía para grano	Heliothis, Helicoverpa spp.	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.000 l/ha	Aire libre. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
Judía verde	Heliothis, Helicoverpa spp.	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
Kiwi	Arrollador, cigarrero, Archips spp.	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Específico contra Eulia. Aplicar hasta la maduración de los frutos (BBCH 80).
Kiwiberry / kiwiño	Heliothis, Helicoverpa spp. Lepidópteros Plusia, Autographa gamma Plusia, Chrysodeixis chalcites Rosquilla negra, Spodoptera littoralis Rosquilla verde, Spodoptera exigua	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Lenteja verde	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Lenteja	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, solo lentejas secas, aire libre): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Lúpulo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Maíz dulce	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Mango	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Mostaza china	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Nabo	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Níspero, níspero del Japón	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana Capua, Adoxophyes orana Orugas de la piel, Pandemis spp.	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*). Manzano, peral, membrillero. Aplicar hasta la maduración del fruto (BBCH 80).
Nogal	Polilla oriental, Grapholita molesta Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana Lepidópteros Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Específico contra polilla de invierno. Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*). (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Ñame	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).

Okra, quimbombo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Olivo	Prays, polilla del olivo, Prays oleae	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Aplicar hasta la maduración del fruto (BBCH 80).
Ornamentales herbáceas	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	Al aire libre e invernadero.
Papaya	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Pataca, aguaturma, tupinambo	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Pepinillo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Perejil	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Perifollo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Pimiento	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
Pinos	Polilla oriental, Grapholita molesta Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana Lepidópteros Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Específico contra polilla de invierno. Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*). (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Pistachero	Polilla oriental, Grapholita molesta Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana Lepidópteros Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Específico contra polilla de invierno. Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*). (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Plátanos de sombra	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Puerro	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Rábano rusticano	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Rábano	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Raíz de perejil	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					

Remolacha de mesa	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Repollo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Rúcula	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Ruibarbo	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Salsifí	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Semillas de algodón	Heliothis, Helicoverpa spp.	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	Aplicar hasta envero o madurez de fruto y semilla (BBCH 80).
Tabaco	Heliothis, Helicoverpa spp.	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	Aplicar hasta la maduración de las semillas (BBCH 80).
Tallos jóvenes	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero, solo brotes de bambú y palmitos): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Tomate	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar hasta la maduración de los frutos y semillas (BBCH 80).
Verdolaga	Lepidópteros	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	500-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional, aire libre e invernadero): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto y semillas). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).
Vid	Polilla de la vid, Eupoecilia ambiguella Polilla del racimo, Lobesia botrana	0,75 - 1 l/ha	Máx. 3	7-10	100-1.500 l/ha	Vid de mesa y vinificación. Aplicar hasta la maduración de los frutos (BBCH 80).
Zarzamoras	Heliothis, Helicoverpa spp. Lepidópteros Plusia, Autographa gamma Plusia, Chrysodeixis chalcites Rosquilla negra, Spodoptera littoralis Rosquilla verde, Spodoptera exigua	1 - 2 l/ha	Máx. 3	7-10	600-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar mediante pulverización normal hasta BBCH 80 (maduración del fruto). Ver en el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores" (*).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Acelga, Acerolo, Aguacate, Ajo, Alcachofa, Almendro, Altramuz, Apio, Apionabo, Arándano, mirtilo, Arbustos frutales, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Avellano, Barbarea, Batata, boniato, Berenjena, Berro de agua, Berro, mastuerzo, Berza , col, Brécol, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Canónigo, Caqui, Cardo, Castaño, Cebolleta, Cebollino, Chalote, Chirimoyo, Chirivía, Cítricos, Col de Bruselas, Col de China, Coliflor, Colinabo, Colirrábano, Coníferas, Cucurbitáceas de piel comestible (producto cosechado), Cucurbitáceas de piel no comestible, Endibia, Espárrago, Especias, Espinaca, Frambueso, Frondosas, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Granado, Grosellero, Guisante para grano, Guisante proteaginoso /forrajero, Guisante verde, Haba forrajera, Haba para grano, Haba verde, Hierbas aromáticas y flores comestibles (producto cosechado), Higuera, Hinojo, Judía forrajera, Judía para grano, Judía verde, Kiwi, Kiwiberry / kiwiño, Lenteja verde, Lenteja, Lúpulo, Maíz dulce, Mango, Mostaza china, Nabo, Níspero, níspero del Japón, Nogal, Ñame, Okra, quimbombo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Papaya, Pataca, aguaturma, tupinambo, Pepinillo, Perejil, Perifollo, Pimiento, Pinos, Pistachero, Plátanos de sombra, Puerro, Rábano rusticano, Rábano, Raíz de perejil, Remolacha de mesa, Repollo, Rúcula, Ruibarbo, Salsifí, Semillas de algodón, Tabaco, Tallos jóvenes, Tomate, Verdolaga, Vid, Zarzamoras	NP

Condiciones Generales de Uso

Insecticida con tipo de acción por ingestión.
Aplicar en pulverización normal terrestre, diluido en suficiente cantidad de agua, para cubrir uniformemente todo el follaje de las plantas que se desean tratar. En aplicación aérea en pinares contra procesionaria el producto se emplea a dosis 1,5l /ha mezclado con 3,5 l/ha de agua.
El momento más oportuno para su aplicación es al principio del desarrollo de las larvas.

No aplicar este producto a través de ningún tipo de sistema de riego.

Para obtener los mejores resultados, agitar bien el envase antes de mezclarlo con agua en el tanque de pulverización y mantener la agitación constantemente en el mismo durante la aplicación.

El producto contiene aceite de parafina en su formulación por lo que deberá prestarse especial atención a posibles aplicaciones anteriores o posteriores de clortalonil en las plantas o de cualquier otra sustancia que resulte incompatible con este tipo de aceites. También, se vigilará la acumulación del mismo en caso de realizarse varias aplicaciones seguidas.
Evitar el uso de agua con un pH superior a 8.
Emplear insecticidas con diferente modo de acción a Bacillus thuringiensis kurstaki tras 3 aplicaciones.
Efectuar un seguimiento regular de las parcelas para averiguar las razones de inadecuados niveles de control.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales en lugares no destinados al público en general. (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

PULVERIZACIONES TERRESTRES (AIRE LIBRE E INVERNADERO):

• MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
o Guantes de protección química.
o Ropa de protección de al menos tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126: 2004.
o Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2 según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010, o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2, según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, excepto de la ropa de trabajo, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.
PULVERIZACIONES AÉREAS:• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPOo Guantes de protección química.o Ropa de protección de al menos tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126: 2004.o Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2 según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010, o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2, según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR
o Guantes de protección química.
o Ropa de protección de al menos tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126: 2004.
o Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2 según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010, o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
□ Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
□ No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química
□ Se requerirá el uso de aeronaves con cabina cerrada durante la aplicación del producto.□ No se considera que el piloto realice las operaciones de mezcla/carga ni de manipulación del equipo de aplicación, limitándose a la aeronave y al correcto funcionamiento de los sistemas GPS y DGPS obligatorios.□ No se considera la figura del señalero ya que queda reemplazado por los equipos obligatorios de posicionamiento y de corrección de diferencial en tiempo real citados anteriormente.□ En los caminos y vías de acceso a la zona de carga y de tratamiento, se instalarán señales específicas advirtiendo de la realización de tratamientos terrestres/aéreos con productos fitosanitarios, y de las propiedades sensibilizantes del producto. Se mantendrán dichas señales al menos hasta la finalización del tratamiento.□ Se dejará una franja de 100 m alrededor de la zona tratada.□ Se deberá cumplir lo especificado en el RD 1311/2012 para el tipo de aplicaciones aéreas.□ No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P284 -Llevar equipo de protección respiratoria. (El fabricante o el proveedor especificarán el tipo de equipo) P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

Spe3: Para proteger a los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Spe3: Para proteger a los artrópodos no objetivo, para el uso en vid respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.
SPe3: Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 100m hasta las masas de agua superficial en aplicaciones aéreas.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Contiene Bacillus thuringinesis kurstaki cepa EG 2348. Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.

El producto no se usará en combinación con otros productos.

No se debe autorizar para uso en jardinería exterior doméstica.
Según el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. En el ANEXO VI Condiciones generales para la realización de las aplicaciones aéreas. Punto 6 Realización de los tratamientos. “No se aplicarán productos fitosanitarios por medios aéreos sobre núcleos urbanos o masas de agua (ríos, lagunas o embalses), asentamientos avícolas ni cultivos ecológicos no objeto de tratamiento, dejando a su alrededor una franja de seguridad mínima de 100 metros en la cual no podrá realizarse ningún tratamiento por medios aéreos”.

Esta propuesta de autorización tiene carácter provisional. Cuando en el seno de la Comisión Europea se vote finalmente la inclusión de las distintas cepas de Bacillus thuringiensis en el Anexo IV del Reglamento 396/2005 o se decida establecer límites máximos de residuos (valores umbral de CFU, unidades formadoras de colonias) para las distintas cepas de Bacillus thuringiensis en los distintos productos agrícolas, se deberá revisar la presente propuesta de autorización. Del mismo modo, se debería revisar la presente propuesta de autorización si EFSA emite nuevas opiniones razonadas.
(*) Con respecto a los usos menores autorizados en esta propuesta de autorización; almendro, castaño, avellano, pino piñonero, pistachero, nogal, níspero, níspero del Japón, zarzamora, moras, frambueso, mirtilo o arándano común o azul, arándano rojo, grosellas, escaramujos, acerolas, kiwi Berry, bayas de saúco, higo, caqui y caqui de Virginia, aguacate, plátanos, mango, papaya, granado, chirimoya, mandioca, batata, ñames, arruruces, remolacha de mesa, apionabo, rábano rusticano, aguaturma, chirivía, perejil (raíz), rábano, salsifíes, colinabo, nabo), ajo, chalote, cebolleta y cebollino, okra o kimbobo, pepinillo, maiz dulce, inflorescencias brásicas (brécol, coliflor), cogollos brásicas (coles de Bruselas, repollo), hojas brásicas (col china, berza), colirrábanos, perifollo, cebolletas, hojas de apio, perejil, salvia real, romero, tomillo, albahaca y flores comestibles, hojas de laurel, estragón), canónigos, mastuerzos y otros brotes, barbareas, rúcula o ruqueta, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), espinacas, verdolagas, acelgas, berros de agua, endivias, leguminosas (habas, guisantes, lentejas), leguminosas secas (habas, lentejas, guisantes, altramuces), espárragos, cardos, apio, hinojo, alcachofas, puerros, ruibarbos, brotes de bambú, palmitos, especies de semilla (apio, cilantro, comino, eneldo, hinojo), lúpulo tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”

Condiciones de almacenamiento

P 411: Puede almacenarse a temperaturas 20 ±2 ºC durante 2 años.