SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 23435 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 03/11/2004 **Renovación:** 13/07/2017 **Caducidad:** 31/03/2026

Nombre Comercial: PLATFORM 40 WG

Titular

FMC Agricultural Solutions S.A.U.

P.º Castellana 257, 5º

28046 Madrid

(Madrid)

ESPAÑA

Fabricante

FMC CHEMICAL SPRL

Boulevard de France 9A

1420 BraineLAlleud

BÉLGICA

Composición

CARFENTRAZONA-ETIL 40% [WG] P/P

Envases

Envases de 100 y 250 gr.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)					
Avena	Verónica, hierba gallinera, Veronica spp. Amor del hortelano, Galium spp.	50 g/ha	1	200 - 400 l/ha	Tratar con el cultivo entre los estados de 2 hojas hasta final del ahijado y la mala hierba hasta el inicio de la floración. Tratar con el cultivo entre los estados de 3 hojas y 2º nudo y la mala hierba hasta una altura de 20 cm.
Cebada	Verónica, hierba gallinera, Veronica spp. Amor del hortelano, Galium spp.	50 g/ha	1	200 - 400 l/ha	Tratar con el cultivo entre los estados de 2 hojas hasta final del ahijado y la mala hierba hasta el inicio de la floración. Tratar con el cultivo entre los estados de 3 hojas y 2º nudo y la mala hierba hasta una altura de 20 cm.
Centeno	Verónica, hierba gallinera, Veronica spp. Amor del hortelano, Galium spp.	50 g/ha	1	200 - 400 l/ha	Tratar con el cultivo entre los estados de 2 hojas hasta final del ahijado y la mala hierba hasta el inicio de la floración. Tratar con el cultivo entre los estados de 3 hojas y 2º nudo y la mala hierba hasta una altura de 20 cm.
Trigo	Verónica, hierba gallinera, Veronica spp. Amor del hortelano, Galium spp.	50 g/ha	1	200 - 400 l/ha	Tratar con el cultivo entre los estados de 2 hojas hasta final del ahijado y la mala hierba hasta el inicio de la floración. Tratar con el cultivo entre los estados de 3 hojas y 2º nudo y la mala hierba hasta una altura de 20 cm.
Triticale	Verónica, hierba gallinera, Veronica spp. Amor del hortelano, Galium spp.	50 g/ha	1	200 - 400 l/ha	Tratar con el cultivo entre los estados de 2 hojas hasta final del ahijado y la mala hierba hasta el inicio de la floración. Tratar con el cultivo entre los estados de 3 hojas y 2º nudo y la mala hierba hasta una altura de 20 cm.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale	NP

Condiciones Generales de Uso

Controla malas hierbas en post-emergencia.
Aplicar en pulverización normal, diluida la dosis en 200-400 l. de agua, en una sola aplicación.
A efectos de prevenir posibles efectos de fitotoxicidad, en cultivos de sustitución en caso de fallo del cereal tratado, únicamente se podrán sembrar cereales.
En la etiqueta se darán instrucciones para el uso correcto del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de utilización del producto por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador utilizará guantes de protección adecuados durante las operaciones de mezcla/carga y aplicación así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas.
SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Sensibilización cutánea. Categoría 1 B.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

El preparado no se usará en combinación con otros productos.
Contiene bentonita. El contenido de partículas de sílice cristalino (con diámetro inferior a 50 µm) debe ser inferior al 0.1%.