SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

## Datos del Producto

**Número de Registro:** 23738 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 13/06/2005 **Renovación:** 06/02/2017 **Caducidad:** 28/02/2026

**Nombre Comercial:** DIPEL DF

## Titular

**KENOGARD, S.A.U.**

C/ Diputación, 279

08007 Barcelona

(Barcelona)

ESPAÑA

## Fabricante

**VALENT BIOSCIENCES LLC (USA)**

1910 Innovation Way, Suite 100

IL-60048 Libertyville

(Illinois)

USA

## Composición

BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P

## Envases

- Bolsas de 1 kg compuestas de polipropileno. PET metalizado y polietileno.
- Sacos de papel kraft de 5 kg con bolsa interior de polietileno.
- Sacos de papel kraft de 25 kg con bolsa interior de polietileno.
- Sobres de 15 g de complejo aluminio estucado.
- Bote de plástico HDPE de 0,5 kg.

## Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Condic. Especifico |
|---|---|---|---|
| Acelga | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Acerolo | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Los frutos serán aptos para consumo humano. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Aguacate | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)<br>Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1000-1.500 l/ha.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| | Lepidópteros<br><br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp. | | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-16 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Orugueta, Aglaope infausta | | |
| Albaricoquero | Polilla oriental, Grapholita molesta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-16 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Alcachofa | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Algodonero | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Almendro | Lepidópteros<br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp.<br>Orugueta, Aglaope infausta<br>Polilla oriental, Grapholita molesta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Apio | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): La producción está destinada al consumo de tallos (var.dulce), hojas (var.secalinum) o semillas (especias).<br>Aplicar en pulverización normal. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Arándano, mirtilo | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Arroz | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 400-500 l/ha. |
| Avellano | Lepidópteros<br>Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana<br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp.<br>Orugueta, Aglaope infausta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Barbarea | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Berenjena | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | Aire libre e invernadero: Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. |
| Berro de agua | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Berro, mastuerzo | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Berza , col | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Brécol | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Calabacín | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (solo invernadero): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. |
| Calabaza | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Canónigo | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Caqui | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Castaño | Lepidópteros<br><br>Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana<br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp.<br><br>Orugueta, Aglaope infausta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Cerezo | Lepidópteros<br><br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp.<br><br>Orugueta, Aglaope infausta<br><br>Polilla oriental, Grapholita molesta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-16 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Chirimoyo | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)<br>Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1000-1.500 l/ha.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Chufa | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| | Lepidópteros<br><br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Carpocapsa de las ciruelas, Grapholita funebrana<br>Lagartas, Lymantria spp. | | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-16 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciruelo | Orugueta, Aglaope infausta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-16 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Cítricos | Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana Prays, polilla de los cítricos, Prays citri | 0,75 - 1 Kg/ha | Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. |
| Cogollos del género Brassica | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Col de Bruselas | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Col de China | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Coliflor | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Colirrábano | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Endibia | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Escarola | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Espinaca | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Frambueso | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Fresal | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo invernadero): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. |
| Granado | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Grosellero | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Incluye grosella y grosellas espinosas. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Guayabo | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)<br>Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1000-1.500 l/ha.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Guisante verde | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Para uso con y sin vaina. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Haba verde | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (solo invernadero): Para uso con y sin vaina. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación.<br>(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Producción de habas verdes sin vaina. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Incluye: salvia, romero, tomillo, albahaca y estragón. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Judía verde | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (solo invernadero): Para uso con y sin vaina. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación.<br>(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Producción de judías verdes sin vaina. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kiwi | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)<br>Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Laurel | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Lechuga | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Leguminosas de grano | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Incluye leguminosas secas: judías, lentejas, habas, guisantes y altramuces. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Lenteja | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Mango | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)<br>Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1000-1.500 l/ha.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Manzano | Lepidópteros<br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella<br>Lagartas, Lymantria spp.<br>Orugueta, Aglaope infausta | 0,5 - 1 Kg/ha | Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha.<br>Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. |
| Melocotonero | Lepidópteros<br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp.<br>Orugueta, Aglaope infausta<br>Polilla oriental, Grapholita molesta | 0,75 - 1 Kg/ha | Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-16 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.<br>Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-16 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. |
| Melón | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Membrillero | Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella<br>Lagartas, Lymantria spp.<br>Lepidópteros<br>Orugueta, Aglaope infausta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Moreras | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Los frutos (moras blancas y negras) serán aptos para consumo humano. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Mostaza china | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Lepidópteros<br><br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella<br>Lagartas, Lymantria spp. | | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Níspero, níspero del Japón | Orugueta, Aglaope infausta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| | Lepidópteros<br><br>Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana<br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp. | | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Nogal | Orugueta, Aglaope infausta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Okra, quimbombo | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Olivo | Prays, polilla del olivo, Prays oleae | 0,75 - 1 Kg/ha | Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. |
| Ornamentales herbáceas | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo invernadero): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. |
| | Lepidópteros<br><br>Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana<br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp. | | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Pacano, nuez de pecán | Orugueta, Aglaope infausta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Papaya | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)<br>Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1000-1.500 l/ha.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Pepinillo | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Pepino | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | (solo invernadero): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. |
| | Lepidópteros | | Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella<br>Lagartas, Lymantria spp. | | |
| Peral | Orugueta, Aglaope infausta | 0,5 - 1 Kg/ha | Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. |
| Perejil | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Perifollo | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Pimiento | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | Aire libre e invernadero: Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. |
| | Lagartas, Lymantria spp. | | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Exclusivamente para pino piñonero. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Pinos | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Exclusivamente para pino piñonero. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Piña Tropical | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional)<br>Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1000-1.500 l/ha.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| | Lepidópteros | | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Para lepidópteros defoliadores. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Pistachero | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana<br>Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.<br>Lagartas, Lymantria spp.<br>Orugueta, Aglaope infausta | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Platanera | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-16 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. |
| Puerro | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Rosales | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Los frutos (escaramujos) serán aptos para consumo humano. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 -10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Rúcula | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Sandía | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |
| Saúcos | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Los frutos serán aptos para consumo humano. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Tomate | Lepidópteros | 0,5 - 1 Kg/ha | Aire libre e invernadero: Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas en el intervalo de dosis 0,1-0,2 kg/hl, ajustando el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación. |
| Verdolaga | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (solo aire libre): Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vid | Polilla del racimo, Lobesia botrana | 0,5 - 1 Kg/ha | Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-2.000 l/ha. |
| Zarzamoras | Lepidópteros | 0,75 - 1 Kg/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): (solo invernadero): Se incluye mora ártica. Realizar un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |

## Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|---|---|
| Acelga, Acerolo, Aguacate, Albaricoquero, Alcachofa, Algodonero, Almendro, Apio, Arándano, mirtilo, Arroz, Avellano, Barbarea, Berenjena, Berro de agua, Berro, mastuerzo, Berza , col, Brécol, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Calabacín, Calabaza, Canónigo, Caqui, Castaño, Cerezo, Chirimoyo, Chufa, Ciruelo, Cítricos, Cogollos del género Brassica, Col de Bruselas, Col de China, Coliflor, Colirrábano, Endibia, Escarola, Espinaca, Frambueso, Fresal, Granado, Grosellero, Guayabo, Guisante verde, Haba verde, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Judía verde, Kiwi, Laurel, Lechuga, Leguminosas de grano, Lenteja, Mango, Manzano, Melocotonero, Melón, Membrillero, Moreras, Mostaza china, Níspero, níspero del Japón, Nogal, Okra, quimbombo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Pacano, nuez de pecán, Papaya, Pepinillo, Pepino, Peral, Perejil, Perifollo, Pimiento, Pinos, Piña Tropical, Pistachero, Platanera, Puerro, Rosales, Rúcula, Sandía, Saúcos, Tomate, Verdolaga, Vid, Zarzamoras | NP |

## Condiciones Generales de Uso

Insecticida biológico empleado en cultivos al aire libre e invernadero. Aplicar mediante pulverización normal o manual en cultivos al aire libre y mediante pulverización manual en cultivos en invernadero.
El momento más oportuno para su aplicación es el principio de desarrollo de las larvas.

## Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales en lugares no destinados al público en general.

## Mitigación de riesgos en la manipulación

**SEGURIDAD DEL APLICADOR**

**AIRE LIBRE E INVERNADERO:**

**o MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:**
**- Guantes de protección química,**
**- Ropa de protección tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126: 2004.**
**- Gafas o protectores oculares**
**- Protección respiratoria: mascarilla tipo FFP3 según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010.**

**SEGURIDAD DEL TRABAJADOR**
**- Guantes de protección química,**
**- Ropa de protección tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126: 2004.**
**- Gafas o protectores oculares**
**- Protección respiratoria: mascarilla tipo FFP3 según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010.**

**FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO**

**- Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Los operadores llevarán guantes de protección química cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación.**
**- Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.**
**- Ajustar el volumen de caldo para asegurar una cobertura total, sin llegar al punto de saturación.**
**- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.**
**- No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.**
**- En los caminos y vías de acceso a la zona de tratamiento, se instalarán señales específicas advirtiendo de la realización de tratamientos con productos fitosanitarios, y de las propiedades sensibilizantes del producto. Se mantendrán dichas señales al menos hasta la finalización del tratamiento.**
**- Se recomienda respetar una franja de seguridad mínima de 50 m alrededor de la zona tratada.**
**- Asimismo, se recomienda respetar una franja mínima de 50 metros a las zonas adyacentes a zonas residenciales.**

## Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.<br>EUH 210 -Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
| Consejos de Prudencia | P284 -[En caso de ventilación insuficiente] llevar equipo de protección respiratoria.<br>P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.<br><br>P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.<br><br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático crónico 3 |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | H412 -Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. |

## Mitigación de riesgos ambientales

Spe3: para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:
-30 m para melocotón, platanera, cítricos, manzano, peral, aguacate, chirimoyo, mango, piña tropical, guayabo, papaya y kiwi.
-15 m para olivo.
-10 m para vid.
- 5 m para hortalizas y algodón.

## Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
Contiene Bacillus thuringiensis Kurstaki cepa ABTS-351. Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea e inhalatoria.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
(*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; aguacate, chirimoyo, mango, piña tropical, guayabo, papaya, kiwi, chufa, okra, calabaza, pepinillo, moreras, zarzamora, mora ártica, frambuesa, arándano, grosellero, escaramujo, acerola, bayas de saúco, membrillero, níspero, caqui, granado, frutos de cáscara (almendro, castaño, avellano, pacano, pino piñonero, pistachero, nogal), albaricoquero, cerezo, ciruelo, canónigos, mastuerzos, barbareas, rúcula, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), berros de agua, hojas de apio, perejil, salvia, romero, tomillo, albahaca, estragón, coles de Bruselas, berza, colirrábano, judía verde sin vaina, haba verde sin vaina, guisante verde con y sin vaina, leguminosas de grano (judías, lentejas, habas, guisantes y altramuces), tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”

## Condiciones de almacenamiento

P411 - El producto permanece estable en su envase original cerrado al menos durante dos años a una temperatura de 25 ºC.