SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 25937 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 27/02/2018 **Renovación:** **Caducidad:** 31/03/2026

Nombre Comercial: BIOPOLYSECT CE

Titular

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.

4 Allée des Séquoias

69760 Limonest

FRANCIA

Fabricante

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S.

4 Allée des Séquoias

69760 Limonest

FRANCIA

Composición

ACEITE DE COLZA 77,7% [EC] P/V

Envases

Caja de cartón con envase PET de 250 ml (tapón medidor).

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Árboles y arbustos frutales	Ácaros Insectos	3 ml/m2	Para tratamiento de plagas en estado hibernante. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar con manual (mochila de 5 l).
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Cerezo	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Ciruelo	Áfidos, pulgones, Aphididae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae		

Coníferas	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	2 ml/m2	Exclusivamente para uso ornamental Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Endrino	Áfidos, pulgones, Aphididae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l). Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.
Frondosas	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	2 ml/m2	Exclusivamente para uso ornamental Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Hortícolas	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Manzano	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Melocotonero	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Membrillero	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Ornamentales herbáceas	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Moscas blancas, Aleyrodidae	2 ml/m2	Únicamente especies florales. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Palmáceas	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Patata	Áfidos, pulgones, Aphididae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Peral	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae	2 ml/m2	Peral y nashi. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae		

	Cochinillas, Coccidae		
Rosales	Moscas blancas, Aleyrodidae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
Tomate	Moscas blancas, Aleyrodidae	2 ml/m2	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar manual (mochila 5 l).
	Ácaros		
Vid	Insectos	3 ml/m2	Para tratamiento de plagas en estado hibernante. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 7-14 días mediante pulverización foliar con manual (mochila de 5 l).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Cerezo, Ciruelo, Endrino, Hortícolas, Manzano, Melocotonero, Membrillero, Patata, Peral, Tomate	2
Árboles y arbustos frutales, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Rosales, Vid	NP

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento insecticida/acaricida para uso no profesional en jardinería exterior doméstica. Aplicar en un día sin lluvia ni viento mediante pulverización foliar manual (mochila de 5 l).
Reducir la dosis a 1 ml/m2 para las hojas tiernas de plantas jóvenes.
No tratar sobre un terreno con riesgo de arrastre hacia un punto de agua, arroyo, estanque, mar, pozo....etc, en particular si el terreno está en pendiente.
El producto puede dañar a la fauna auxiliar.
No mezclar con otros productos y esperar 10 días antes de tratar con un producto que contenga azufre o cobre.

Clase de Usuario

Uso no profesional

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

Se recomienda el uso de guantes durante el manejo del producto y limpieza del equipo.
Durante la aplicación del producto, el aplicador evitará el contacto con el follaje húmedo.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SPe8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
Autorizado para jardinería exterior doméstica.
En cumplimiento del artículo 48.2 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, los envases unitarios destinados a uso en jardinería exterior doméstica, por venderse el preparado al público en general, no excederá la capacidad de 500 ml.