## Datos del Producto

**Número de Registro:** ES-00154 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 16/11/2015 **Renovación:** **Caducidad:** 28/02/2026

**Nombre Comercial:** SERENADE ASO

## Titular

**BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)**

Avda. Baix Llobregat 3-5

08970 SantJoanDespi

(Barcelona)

ESPAÑA

## Fabricante

**BAYER AG (LEVERKUSEN)**

Kaiser Wilhelm Allee 1

51373

(Leverkusen)

ALEMANIA

## Composición

BACILLUS SUBTILIS (CEPA QST 713) 1,34% [SC] P/V

## Envases

Botellas y garrafas de HDPE de 1, 5 y 10 l. Rango de 1 l a 20 l.

## Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 55-98. |
| Alcachofa | Pseudomonas spp.<br>Xanthomonas spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Aplicar solo al aire libre entre BBCH 13-89. |
| Almendro | Mancha bacteriana de los frutales de hueso y del almendro, Xanthomonas arboricola pv. pruni<br>Monilia, Monilinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 57-89. |
| Arbustos frutales | Podredumbre gris, Botrytis cinerea<br>Oídio del grosellero, Microsphaera grossulariae<br>Oídio del grosellero, Podosphaera mors-uvae | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Incluye únicamente zarzamoras, moras árticas, frambuesas, mirtilos gigantes, arándanos, grosellas (roja, negra y blanca), grosellas espinosas, escaramujos, moras, acerolas, bayas de sáuco.<br>Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 53-95.<br>Incluye únicamente zarzamoras, moras árticas, frambuesas, mirtilos gigantes, arándanos, grosellas (roja, negra y blanca), grosellas espinosas, escaramujos, moras, acerolas, bayas de sáuco.<br>Aplicar solo al aire libre entre BBCH 53-95. |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Oídios, Erysiphaceae | 5 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-2000 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 11-85. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | Piricularia del arroz, Pyricularia oryzae | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 300-500 l/ha | Contra Pyricularia oryzae.<br>Aplicar al aire libre entre BBCH 30-89.<br>Uso en aplicaciones preventivas, preferentemente en infecciones bajas o moderadas. |
| Avellano | Podredumbre bacteriana del avellano, Xanthomonas arboricola pv. corylina<br>Podredumbre gris, Botrytis cinerea<br>Pseudomonas spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 57-89. |
| Barbarea | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | | | | | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49. |
| | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | | Aplicar al aire libre e invernadero.<br>En pulverización foliar: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre BBCH 13-49 a una dosis de 4-8 l/ha.<br>En aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo: 1 aplicación entre BBCH 00-13 a una dosis de 5-10 l/ha. |
| | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Contra Rhizoctonia solani.<br>Aplicar solo al aire libre mediante aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| Berenjena | Fusariosis, Fusarium spp. | 10 l/ha | 1 | - | 200-500 l/ha | Aplicar solo en invernadero por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| | Mancha bacteriana del tomate, Xanthomonas vesicatoria<br>Pseudomonas spp. | 4 - 8 l/ha | | 5 días | 200-1500 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-89. |
| | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Botrytis spp. | 8 l/ha | 1-6 | 5-14 días | 500-1000 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 21-89. |
| Berro, mastuerzo | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | | | | | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49. |
| | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | | Aplicar al aire libre e invernadero.<br>En pulverización foliar: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre BBCH 13-49 a una dosis de 4-8 l/ha.<br>En aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo: 1 aplicación entre BBCH 00-13 a una dosis de 5-10 l/ha. |
| | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Contra Rhizoctonia solani.<br>Aplicar solo al aire libre mediante aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | | | | | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49. |
| | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | | Aplicar al aire libre e invernadero.<br>En pulverización foliar: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre BBCH 13-49 a una dosis de 4-8 l/ha.<br>En aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo: 1 aplicación entre BBCH 00-13 a una dosis de 5-10 l/ha. |
| | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Contra Rhizoctonia solani.<br>Aplicar solo al aire libre mediante aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| Calabacín | Fusariosis vascular, Fusarium oxysporum | 10 l/ha | 1 | - | 200-500 l/ha | Uso al aire libre e invernadero.<br>Aplicar entre BBCH 00-13.<br>Aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo.<br>En pulverización:<br>Antes de la plantación: pulverización seguida de una incorporación superficial al suelo,<br>post-plantación: pulverización al suelo seguida de un riego de 5 mm. |
| | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1500 l/ha | Uso al aire libre e invernadero.<br>Aplicar entre BBCH 13-89. |
| Calabaza | Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum<br>Fusariosis vascular, Fusarium oxysporum | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1500 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-89. |
| | | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Uso solo al aire libre e invernadero.<br>Aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | | | | | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | | Aplicar al aire libre e invernadero.<br>En pulverización foliar: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre BBCH 13-49 a una dosis de 4-8 l/ha.<br>En aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo: 1 aplicación entre BBCH 00-13 a una dosis de 5-10 l/ha. |
| Canónigo | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Contra Rhizoctonia solani.<br>Aplicar solo al aire libre mediante aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| Caqui | Bacteriosis<br>Manchas circulares del caqui, Plurivorosphaerella nawae | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 55-75. |
| Cebolleta | Botrytis spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Aplicar solo al aire libre entre BBCH 14-49. |
| Champiñón | Trichoderma spp. | 40 ml/100 kg | 1 | - | 250-300 ml/100 kg de compost | Contra Trichoderma aggressivum.<br>Tratamiento del compost mediante aplicación al suelo en BBCH 00.<br>Hasta 52 ciclos por año. |
| | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | | | | | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49. |
| | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | | Aplicar al aire libre e invernadero.<br>En pulverización foliar: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre BBCH 13-49 a una dosis de 4-8 l/ha.<br>En aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo: 1 aplicación entre BBCH 00-13 a una dosis de 5-10 l/ha. |
| Escarola | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Contra Rhizoctonia solani.<br>Aplicar solo al aire libre mediante aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| Fresal | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | Aire libre: 200-1000 l/ha<br>Cultivo protegido: 400-2000 l/ha | Aplicar al aire libre y en cultivo protegido entre BBCH 55-89.<br>Al aire libre: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días y una dosis de 4-8 l/ha.<br>En cultivo protegido: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5-14 días y una dosis de 8 l/ha. |
| Frutales de hueso | Mancha bacteriana de los frutales de hueso y del almendro, Xanthomonas arboricola pv. pruni<br>Monilia, Monilinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Incluye albaricoquero, cerezo, melocotonero, nectarino y ciruelo.<br>Aplicar entre BBCH 57-89. |
| Granado | Botrytis spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 100-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 57-89. |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Sclerotinia spp.<br>Bacteriosis<br>Podredumbre gris, Botrytis cinerea<br>Oídios, Erysiphaceae | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Incluye únicamente flores comestibles y hojas de hinojo, hojas de cilantro, hojas de eneldo, hojas de alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae, perejil, hisopillo, ajedrea, romero, tomillo, mejorana, orégano, albahaca, melisa, menta, menta piperita, hojas de laurel.<br>Aplicación solo al aire libre entre BBCH 13-49.<br>Incluye únicamente flores comestibles y hojas de hinojo, hojas de cilantro, hojas de eneldo, hojas de alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae, perejil, hisopillo, ajedrea, romero, tomillo, mejorana, orégano, albahaca, melisa, menta, menta piperita, hojas de laurel.<br>Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49.<br>Incluye únicamente flores comestibles y hojas de hinojo, hojas de cilantro, hojas de eneldo, hojas de alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae, perejil, hisopillo, ajedrea, romero, tomillo, mejorana, orégano, albahaca, melisa, menta, menta piperita, hojas de laurel.<br>Aplicar solo en invernadero entre BBCH 13-49. |
| Kiwi | Podredumbre gris, Botrytis cinerea<br>Botrytis spp.<br>Pseudomonas syringae<br>Pseudomonas viridiflava | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1500 l/ha<br>500-1500 l/ha | Uso al aire libre.<br>Aplicar entre BBCH 07-89.<br>Aplicar entre BBCH 55-98.<br>Uso al aire libre.<br>Eficaz frente a P. syringae y P. viridiflava.<br>Aplicar entre BBCH 55-98 frente a P. syringae y P. viridiflava y/o entre BBCH 07-89 frente a P. syringae. |
| | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 5 l/ha | 1 | - | 200-500 l/ha | Contra Rhizoctonia solani solo al aire libre.<br>Aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| | Botrytis spp. | | | | Aire libre: 300-1000 l/ha<br>Invernadero: 200-1000 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49.<br>En invernadero: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre aplicaciones y una dosis de 4-8 l/ha. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Sclerotinia spp. | 8 l/ha | 1-6 | 5-14 días | Aplicación foliar: aire libre 300-1000 l/ha, invernadero 200-1000 l/ha<br>Aplicación al suelo: 200-500 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero.<br>Mediante pulverización foliar entre BBCH 13-49.<br>-Al aire libre: 1-6 aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de 5-14 días y una dosis de 8 l/ha.<br>-En invernadero: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre aplicaciones y una dosis de 4-8 l/ha.<br>Mediante aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo (solo al aire libre): 1 aplicación entre BBCH 00-13 a una dosis de 5 l/ha. |
| Leguminosas de grano | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero en leguminosas de grano (judía, guisante y haba).<br>Aplicar entre BBCH 15-89. |
| Leguminosas forrajeras | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero en leguminosas forrajeras (judía, guisante y haba).<br>Aplicar entre BBCH 15-89. |
| Leguminosas verdes (frescas) | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero en leguminosas verdes con o sin vaina (judía verde, guisante, alubia y haba).<br>Aplicar entre BBCH 15-89. |
| Mango | Oídio del mango, Oidium mangiferae | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 55-98. |
| Manzano | Fuego bacteriano de las rosáceas, Erwinia amylovora | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 3 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 60-79. |
| Melón | Fusariosis vascular, Fusarium oxysporum | 10 l/ha | 1 | - | 200-500 l/ha | Uso al aire libre e invernadero.<br>Aplicar entre BBCH 00-13.<br>Aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo.<br>En pulverización:<br>Antes de la plantación: pulverización seguida de una incorporación superficial al suelo,<br>post-plantación: pulverización al suelo seguida de un riego de 5 mm. |
| | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1500 l/ha | Uso al aire libre e invernadero.<br>Aplicar entre BBCH 13-89. |
| Membrillero | Fuego bacteriano de las rosáceas, Erwinia amylovora | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 57-79. |
| Mostaza china | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | | | | 200-1000 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49. |
| | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | | Aplicar al aire libre e invernadero.<br><br>En pulverización foliar: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre BBCH 13-49 a una dosis de 4-8 l/ha.<br>En aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo: 1 aplicación entre BBCH 00-13 a una dosis de 5-10 l/ha. |
| | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 5 - 10 l/ha | 1 | - | | Contra Rhizoctonia solani.<br>Aplicar solo al aire libre mediante aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| Níspero, níspero del Japón | Fuego bacteriano de las rosáceas, Erwinia amylovora | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 57-79. |
| Nogal | Podredumbre bacteriana del nogal, Xanthomonas arboricola pv. juglandis | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 55-75. |
| Olivo | Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides | | | | | Uso al aire libre.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.<br>Eficaz frente a Colletotricum gloeosporioides. |
| | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | | | | | Uso al aire libre.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.<br>Eficaz frente a Cycloconium oleaginum. |
| | Pseudomonas spp.<br>Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 400-1500 l/ha | Uso al aire libre.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.<br>Eficaz frente a Pseudomonas sp. ,Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi (PSDMSA).. |
| Ornamentales herbáceas | Botrytis spp.<br>Mycosphaerella spp.<br>Pseudomonas spp.<br>Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1500 l/ha | Se incluye también los cultivos de producción de flor cortada.<br>Aplicar al aire libre y en invernadero entre BBCH 13-89. |
| | Fusariosis vascular, Fusarium oxysporum | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Se incluye también los cultivos de producción de flor cortada.<br>Aplicar al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo al aire libre o en invernadero entre BBCH 00-13. |
| | Oídios, Erysiphaceae | 5 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-2000 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 11-85. |
| Patata | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 2,5 - 5 l/ha | 1 | - | 200-500 l/ha | Contra Rhizoctonia solani.<br>Aplicación al suelo en el surco en el BBCH 00. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1500 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-89. |
| Pepinillo | Fusariosis vascular, Fusarium oxysporum | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero.<br>Aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| | Fusariosis vascular, Fusarium oxysporum | 10 l/ha | 1 | -- | 200-500 l/ha | Uso al aire libre e invernadero.<br>Aplicar entre BBCH 00-13.<br>Aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo.<br>En pulverización:<br>Antes de la plantación: pulverización seguida de una incorporación superficial al suelo,<br>Post-plantación: pulverización al suelo seguida de un riego de 5 mm. |
| Pepino | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1500 l/ha | Aplicar solo en invernadero entre BBCH 13-89. |
| | Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium | | | | | |
| Peral | Fuego bacteriano de las rosáceas, Erwinia amylovora | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 3 días | 500-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 60-79. |
| | Fusariosis, Fusarium spp. | 10 l/ha | 1 | - | 200-500 l/ha | Aplicar solo en invernadero.<br>Aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| | Mancha bacteriana del tomate, Xanthomonas vesicatoria | | | | | |
| | Pseudomonas spp. | 4 - 8 l/ha | | 5 días | 200-1500 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-89. |
| | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | | | | | |
| Pimiento | Botrytis spp. | 8 l/ha | 1-6 | 5-14 días | 500-1000 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 21-89. |
| | Sigatoka común o amarilla del banano, Pseudocercospora musae | | | | | |
| Platanera | Sigatoka negra del banano, Pseudocercospora fijiensis | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-3000 l/ha | Contra Pseudocercospora fijiensis (Mycosphaerella fijiensis) y Pseudocercospora musae (Mycosphaerella musicola).<br>Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 12-89. |
| Puerro | Pseudomonas spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Aplicar solo al aire libre entre BBCH 31-89. |
| Remolacha azucarera | Cercosporiosis de la remolacha, Cercospora beticola | 2 - 4 l/ha | 1-4 | 5 días | 100-400 l/ha | Aplicar entre BBCH 31-90. |
| | Podredumbre negra de las crucíferas, Xanthomonas campestris pv. campestris | | | | | |
| Repollo | Pseudomonas spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Aplicar al aire libre entre BBCH 13-89. |
| Rosales | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 5 l/ha | 1-6 | 5 días | 500-2000 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 11-85. |
| | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | | | | | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-49. |
| | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | | Aplicar al aire libre e invernadero.<br><br>En pulverización foliar: 1-6 aplicaciones con un intervalo de 5 días entre BBCH 13-49 a una dosis de 4-8 l/ha.<br>En aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo: 1 aplicación entre BBCH 00-13 a una dosis de 5-10 l/ha. |
| Rúcula | Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani | 5 - 10 l/ha | 1 | - | 200-1000 l/ha | Contra Rhizoctonia solani.<br>Aplicar solo al aire libre mediante aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| | Fusariosis vascular, Fusarium oxysporum | 10 l/ha | 1 | -- | 200-500 l/ha | Uso al aire libre e invernadero.<br>Aplicar entre BBCH 00-13.<br>Aplicación al suelo mediante pulverización al suelo o riego por goteo.<br>En pulverización:<br>Antes de la plantación: pulverización seguida de una incorporación superficial al suelo,<br>Post-plantación: pulverización al suelo seguida de un riego de 5 mm. |
| Sandía | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1500 l/ha | Uso al aire libre e invernadero.<br>Aplicar entre BBCH 13-89. |
| | Botrytis spp. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabaco | Sclerotinia spp. | 4 - 8 l/ha | 1-6 | 5 días | 200-1000 l/ha | Aplicar entre BBCH 31-69. |
| | Fusariosis, Fusarium spp. | 10 l/ha | 1 | - | 200-500 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero.<br>Aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo entre BBCH 00-13. |
| | Mancha bacteriana del tomate, Xanthomonas vesicatoria<br>Pseudomonas spp. | 4 - 8 l/ha | | 5 días | 200-1500 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 13-89. |
| | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | | | | | |
| Tomate | Botrytis spp. | 8 l/ha | 1-6 | 5-14 días | 500-1000 l/ha | Aplicar al aire libre e invernadero entre BBCH 21-89. |
| Vid | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 4 l/ha | 1-4 | 5 días | 100-1500 l/ha | Aplicar entre BBCH 60-89. |
| Zanahoria | Alternaria spp. | 8 l/ha | 1-6 | 5-14 días | 200-800 l/ha | Aplicar al aire libre entre BBCH 41-49.<br>Aplicar al aire libre entre BBCH 41-49. |

## Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|---|---|
| Aguacate, Alcachofa, Almendro, Arbustos frutales, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Arroz, Avellano, Barbarea, Berenjena, Berro, mastuerzo, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Calabacín, Calabaza, Canónigo, Caqui, Cebolleta, Champiñón, Escarola, Fresal, Frutales de hueso, Granado, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Kiwi, Lechuga, Leguminosas de grano, Leguminosas forrajeras, Leguminosas verdes (frescas), Mango, Manzano, Melón, Membrillero, Mostaza china, Níspero, níspero del Japón, Nogal, Olivo, Ornamentales herbáceas, Patata, Pepinillo, Pepino, Peral, Pimiento, Platanera, Puerro, Remolacha azucarera, Repollo, Rosales, Rúcula, Sandía, Tabaco, Tomate, Vid, Zanahoria | NO PROCEDE |

## Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida/bactericida.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.Aplicación por pulverización foliar mediante aplicaciones con tractor o mochila o aplicación al suelo por pulverización al suelo o riego por goteo o aplicación al suelo en el surco en patata o para tratamiento del compost en el suelo en el caso del champiñón (ver condicionamientos específicos).Aplicar el producto preferiblemente a temperaturas superiores a 15ºC y en periodos de alta humedad. La aplicación debe asegurar una cobertura homogénea de la vegetación. Como medida de precaución, repetir la aplicación en caso de lluvias superiores a 20 mm. Dado que la eficacia del producto es parcial, su uso debe ir acompañado de medidas profilácticas. Antes de usar el producto, se recomienda que el usuario compruebe su eficacia o la ausencia de posibles riesgos de fitotoxicidad para el cultivo a tratar.
Los usos autorizados en invernadero o cultivo protegido para este producto han sido solicitados con anterioridad al 1 de junio de 2022, y por tanto no han sido evaluados de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de sistemas de cultivo, en consonancia con las conclusiones del Southern Member States Steering Committee (SMS SC) y los criterios de EFSA Journal 2014; 12(3): 3615

## Clase de Usuario

Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

## Mitigación de riesgos en la manipulación

**SEGURIDAD DEL APLICADOR- Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables.**

**- Ropa de protección tipo 6B: contra salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009 y la UNE-EN 14126:2004/AC: 2006 relativa a la ropa de protección contra agentes biológicos.**

**- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II), metidos por dentro de la pernera del pantalón.**

**Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010 o bien mascarilla con filtro para partículas al menos de tipo P2 según norma UNE – EN 143:2021".**

**SEGURIDAD DEL TRABAJADOR- Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables.**

**- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) o Ropa de protección nivel C1, frente a productos fitosanitarios, conforme a la norma UNE-EN ISO 27065:2017/A1:2019.**

**Medidas adicionales de mitigación del riesgo:**
**- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.**

## Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | |
| Consejos de Prudencia | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.<br><br>P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.<br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | |
| Consejos de Prudencia | |

## Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

## Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

## Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Otras Indicaciones reglamentarias

El preparado no se usará en combinación con otros productos.
Contiene Bacillus amyloliquefaciens (anteriormente subtilis) aislado QST 713. Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

## Condiciones de almacenamiento

P411: Almacenar a temperaturas no superiores a 25ºC.