SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00445 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 22/03/2018 **Renovación:** **Caducidad:** 28/02/2027

Nombre Comercial: VITISAN

Titular

ANDERMATT IBERIA, S.L.

C/ Miguel Íscar 3-5º D

47001

(Valladolid)

Fabricante

BIOFA GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 2

D-72525 MNsingen

ALEMANIA

Composición

HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 99% [SP] P/P

Envases

Sacos de válvula (LDPE/PE) 5 kg y (LDPE)25 kg

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Acelga	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Aguacate	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ajo	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (estadio avanzado de látigo: el cotiledón comienza a ser desechado) a BBCH 89 (madurez completa: semillas negras y duras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Alcachofa	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Almendro	Oídio del rosal, Podosphaera pannosa	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (primeras hojas se separan) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Apio	Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Exclusivamente para consumo de hojas y de tallo. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).

Arándano, mirtilo	Oídio, Microsphaera penicillata	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Avellano	Oídio del avellano, Phyllactinia guttata	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (primeras hojas se separan) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Batata, boniato	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Berro de agua	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Berza , col	Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Borraja	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Exclusivamente para consumo de hojas y tallos. Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Brécol	Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Canónigo	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Caqui	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Cardo	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Exclusivamente para consumo de hojas y tallos. Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Cebolleta	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (estadio avanzado de látigo: el cotiledón comienza a ser desechado) a BBCH 89 (madurez completa: semillas negras y duras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Cerezo	Moteado, cribado del cerezo,Venturia cerasi Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (primeras hojas se separan; escamas verdes comienzan a abrirse; hojas comienzan a emerger) a BBCH 85 (aumento de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Chalote	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (estadio avanzado de látigo: el cotiledón comienza a ser desechado) a BBCH 89 (madurez completa: semillas negras y duras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Chirimoyo	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Moteado del melocotonero, Venturia carpophila					

Ciruelo	Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (primeras hojas se separan; escamas verdes comienzan a abrirse; hojas comienzan a emerger) a BBCH 85 (aumento de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Col de Bruselas	Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Col de China	Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Coliflor	Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Cucurbitáceas	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum Oídio, Podosphaera fuliginea	5 Kg/ha	4-6	3-10	600-1000 l/ha	BBCH 10-89 Tratamientos al aire libre y microtúnel. El intervalo entre aplicaciones puede prolongarse a 10 días en condiciones secas y calientes mientras que el mínimo intervalo entre aplicaciones en microtúnel es de 7 días
Endrino	Moteado del melocotonero, Venturia carpophila Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (primeras hojas se separan; escamas verdes comienzan a abrirse; hojas comienzan a emerger) a BBCH 85 (aumento de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Escarola	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Espárrago	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1ª hoja verdadera emerge del coleóptilo) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Espinaca	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Frambueso	Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Frutales de pepita	Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis Moteado o roña del peral, Venturia pyrina Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	BBCH 10-85 Bajo condiciones secas y calientes, los intervalos entre las aplicaciones deben prolongarse hasta 10 días
Granado	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Grosellero	Oídio del grosellero, Microsphaera grossulariae Oídio del grosellero, Podosphaera mors-uvae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).

Guisante para grano	Erysiphe spp.	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Contra oídio del género Erysiphe. Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones, desplegados completamente) a BBCH 89 (madurez completa: vainas, maduras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Guisante verde	Erysiphe spp.	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Contra oídios del género Erysiphe. Guisante con vaina y sin vaina. Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones, desplegados completamente) a BBCH 89 (madurez completa: vainas, maduras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Haba para grano	Erysiphe spp.	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Contra oídios del género Erysiphe. Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones, desplegados completamente) a BBCH 89 (madurez completa: vainas, maduras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Haba verde	Erysiphe spp.	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Haba con vaina y sin vaina. Contra oídios del género Erysiphe. Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones, desplegados completamente) a BBCH 89 (madurez completa: vainas, maduras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Exclusivamente para hojas de cilantro, eneldo, perejil, albahaca, mentas incluidas hierbabuena y melisa. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Higuera	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Hinojo	Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Judía para grano	Erysiphe spp.	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Contra oídios del género Erysiphe. Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones, desplegados completamente) a BBCH 89 (madurez completa: vainas, maduras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Judía verde	Erysiphe spp.	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Contra oídios del género Erysiphe. Judía con vaina y sin vaina. Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones, desplegados completamente) a BBCH 89 (madurez completa: vainas, maduras). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Kiwi	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Lúpulo	Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (1er par de hojas desplegadas) a BBCH 89 (madurez de cosecha: cabezuelas cerradas; lupulina de color amarillo, aroma desarrollado). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Mango	Oídio del mango, Oidium mangiferae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Nogal	Oídio, Microsphaera penicillata	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (primeras hojas se separan) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores.
Papaya	Oídio de la papaya, Oidium caricae-papayae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Pistachero	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (primeras hojas se separan) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores.
Platanera	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	6	1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) a BBCH 85 (continuación de la coloración de frutos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).

Puerro	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1ª hoja verdadera emerge del coleóptilo) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Remolacha de mesa	Oídio de la remolacha, Erysiphe betae	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (estadio cotiledonar: cotiledones, desplegados horizontalmente; 1ª hoja, visible (tamaño cabeza de alfiler)) a BBCH 89 (madurez total: tegumento seminal de color normal; perispermo, duro). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Repollo	Oídio de las crucíferas, Erysiphe cruciferarum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Rúcula	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados; el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera, visible) a BBCH 89 (madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Vid	Oídio de la vid, Erysiphe necator	6 Kg/ha	4-6	3	600 l/ha	Para uva de mesa y vinificación. BBCH 12-89
Zarzamoras	Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis	5 Kg/ha	2-6	3	600-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desenrollados) a BBCH 89 (maduración plena o de recolección). En condiciones de calor y sequía, ampliar el intervalo entre aplicaciones a 10 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Cucurbitáceas, Frutales de pepita, Vid	
Acelga, Aguacate, Ajo, Alcachofa, Almendro, Apio, Arándano, mirtilo, Avellano, Batata, boniato, Berro de agua, Berza , col, Borraja, Brécol, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Canónigo, Caqui, Cardo, Cebolleta, Cerezo, Chalote, Chirimoyo, Ciruelo, Col de Bruselas, Col de China, Coliflor, Endrino, Escarola, Espárrago, Espinaca, Frambueso, Granado, Grosellero, Guisante para grano, Guisante verde, Haba para grano, Haba verde, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Higuera, Hinojo, Judía para grano, Judía verde, Kiwi, Lúpulo, Mango, Nogal, Papaya, Pistachero, Platanera, Puerro, Remolacha de mesa, Repollo, Rúcula, Zarzamoras	NP

Condiciones Generales de Uso

Aplicación mediante pulverización mecánica. Pulverización al aire libre y pulverización manual en microtúnel

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Resumen de las condiciones de uso seguras al aire libre (uso profesional):
El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 (protege contra salpicaduras de productos líquidos) durante la mezcla/carga y aplicación del producto y ropa de trabajo adecuada (Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente) para la reentrada.
Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
Medidas adicionales de mitigación del riesgo:
• En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga.
• No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
Resumen de las condiciones de uso seguras en microtúnel (Uso profesional):
Aplicación manual. El intervalo entra aplicaciones es de 7 días.
El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 (protege contra salpicaduras de productos líquidos) durante la mezcla/carga y aplicación del producto y ropa de trabajo adecuada (Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente) para la reentrada.
Medidas adicionales de mitigación del riesgo:
• En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga.
• Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos respétese una banda de seguridad 5 m con hasta las masas de agua superficial.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

(*) Con respecto a los usos menores autorizados en esta propuesta de autorización; Almendro, avellano, pistachero, nogal, cerezo, ciruelo, endrino, zarzamora, frambueso, arandano, mirtilo, grosellero, higuera, caqui, kiwi, aguacate, mango, papaya, granado, chirimoyo, platanera, batata, boniato, remolacha de mesa, ajo, chalote y cebolleta, brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, coles de china, berza, col, canónigos, escarola, rúcula, brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, espinaca, acelga, berro de agua, apio, hierbas aromáticas y flores comestibles, judía verde, haba verde, guisante verde, judía para grano, haba para grano, guisante para grano, espárrago, puerro, cardo, borraja, hinojo, alcachofa y lúpulo tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).