SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

## Datos del Producto

**Número de Registro:** ES-00499 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 21/12/2017 **Renovación:** **Caducidad:** 30/04/2026

**Nombre Comercial:** ORDAGO CAPS

## Titular

**ADAMA Agriculture España S.A.**

C/ Ramírez de Arellano Nº 29-2ª

28043

(Madrid)

ESPAÑA

## Fabricante

**ADAMA AGAN LTD.**

Northern Industrial Zone, P.O. Box 262

7710201 Ashdod

ISRAEL

## Composición

PENDIMETALINA 40% [CS] P/V

## Envases

Botellas/contenedores de HDPE/PE:
- Categoría L1:
• Tamaño < 1 litro (cualquier anchura de boca).
• 1 litro < tamaño < 5 litros (cualquier anchura de boca).
• 5 litros < tamaño ≤ 20 litros (anchura de boca ≥ 45 mm).
- Categoría L2:
• 5 litros ≤ tamaño ≤ 20 litros (anchura de boca < 45 mm).

## Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor** | | | | | | |
| Ajo | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia/post-trasplante. |
| Alcachofa | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia, pre-brote o en cultivo en vegetación, sólo entre filas y alrededor de las cepas. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |



95787 - 2025140

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almendro | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar desde la post-cosecha hasta los botones florales separados, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-9). |
| Avellano | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar desde la post-cosecha hasta los botones florales separados, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| Berenjena | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| Castaño | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar desde la post-cosecha hasta los botones florales separados, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| Cebolla | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia/post-trasplante. |
| Cereales de invierno / primavera | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 150 - 400 l/ha | Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale.<br>Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia antes del macollamiento. |
| Céspedes | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en BBCH 29, 9 o más hijuelos o macollas visibles. |
| Chalote | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia/post-trasplante. |
| Chopos y álamos | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-9). |
| Cítricos | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar desde la post-cosecha hasta el principio del cuajado, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col de Bruselas | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Coliflor | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Coníferas | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental.<br>Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-9). |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Endibia | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Escarola | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Especies vegetales | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Exclusivamente viveros.<br>Aplicar en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-9). |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Fresal | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante o periodo invernal y en post-trasplante entre filas. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Frondosas | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental.<br>Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-9). |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Frutales de hueso | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar desde la post-cosecha hasta el principio del cuajado, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Frutales de pepita | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar desde la post-cosecha hasta el principio del cuajado, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Girasol | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | | | | | |
| | Gramíneas anuales | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechuga | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| Leguminosas de grano | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Exclusivamente para garbanzo, haba para grano, judía para grano, lenteja y guisante para grano.<br>Aplicar en pre-emergencia. |
| Leguminosas forrajeras | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Exclusivamente para veza, altramuz forrajero, haba forrajera, guisante forrajero, esparceta, alverja, yeros y zulla.<br>Aplicar en pre-emergencia. |
| Leguminosas verdes (frescas) | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Exclusivamente para judías verdes, guisantes verdes y habas verdes.<br>Aplicar en pre-emergencia. |
| Maíz dulce | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 150 - 400 l/ha | Aplicar en pre-emergencia y post-emergencia (2 hojas). |
| Maíz | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 150 - 400 l/ha | Aplicar en pre-emergencia y post-emergencia (2 hojas). |
| Melón | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| Nogal | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar desde la post-cosecha hasta los botones florales separados, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| Palmáceas | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-9). |
| Palmera datilera | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano).<br>Aplicar en árboles ornamentales en fase de reposo vegetativo (BBCH 95-9). |
| Patata | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales<br>Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |
| Pistachero | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar desde la post-cosecha hasta los botones florales separados, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |
| Puerro | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia/post-trasplante. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |
| Repollo | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |
| Soja | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |
| Tabaco | Gramíneas plurianuales | 3 - 4 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante (BBCH 0) o en post-trasplante (BBCH 12-21). |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |
| Tomate | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-trasplante. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |
| Vid | Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Incluye vid de mesa y vid de vinificación.<br>Aplicar desde la post-cosecha hasta el principio del cuajado, en pre-emergencia de las malas hierbas. |
| | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha<br>Gramíneas anuales | | | | | |
| Zanahoria | Gramíneas plurianuales | 2,5 l/ha | 1 | - | 200 - 500 l/ha | Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia (3-4 hojas). |

## Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|---|---|
| Avellano | NO PROCEDE |
| Ajo, Alcachofa, Almendro, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Avellano, Berenjena, Castaño, Cebolla, Cereales de invierno / primavera, Céspedes, Chalote, Chopos y álamos, Cítricos, Col de Bruselas, Coliflor, Coníferas, Endibia, Escarola, Especies vegetales, Fresal, Frondosas, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Girasol, Lechuga, Leguminosas de grano, Leguminosas forrajeras, Leguminosas verdes (frescas), Maíz dulce, Maíz, Melón, Nogal, Palmáceas, Palmera datilera, Patata, Pimiento, Pistachero, Puerro, Repollo, Soja, Tabaco, Tomate, Vid, Zanahoria | NO PROCEDE |

## Condiciones Generales de Uso

Tratamientos en pulverización.No aplicar en suelos arenosos.En la etiqueta indicará:- El espectro de acción herbicida.- Se darán instrucciones para el correcto uso del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa.- Se informará sobre la estrategia adecuada a efectos de prevenir la aparición de resistencias y el manejo de las mismas.

## Clase de Usuario

Uso profesional agrario.
Uso profesional no agrario en lugares no destinados al público en general.

## Mitigación de riesgos en la manipulación

**SEGURIDAD DEL APLICADOR**

**El aplicador utilizará durante la mezcla/carga y aplicación: guantes de protección química y ropa de protección tipo 6.**

**SEGURIDAD DEL TRABAJADOR**

**El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada.**

**NORMATIVA APLICABLE:**

**- Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos.**
**- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente.**

**Medidas adicionales de mitigación del riesgo:**

**- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.**
**- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.**
**- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.**
**- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.**
**- No utilizar por mujeres embarazadas.**

## Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Toxicidad para la reproducción (desarrollo), categoría 2 |
| Pictograma | GHS08 (peligro para la salud) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H361d -Se sospecha que puede dañar al feto. |
| Consejos de Prudencia | P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.<br><br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P201+P202 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P391 -Recoger el vertido. |

## Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:
- 20 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 50% o 10 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 75% en cítricos, céspedes, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera y cereales.
- 20 m con cubierta vegetal en el resto de cultivos.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

## Eliminación del producto y/o caldo

SP1: No contaminar el agua con el producto o su embalaje. [No limpiar el material de aplicación cerca del agua de superficie / Evitar la contaminación vía sistemas de evacuación de las aguas a partir de corrales o de carreteras].

## Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Otras Indicaciones reglamentarias

El preparado no se usará en combinación con otros productos.
EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3[2H]-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH204: “Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica”.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

OBSERVACIONES:

No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general en cumplimiento con el artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.