SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

## Datos del Producto

**Número de Registro:** ES-00744 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 22/02/1984 **Renovación:** 19/11/2020 **Caducidad:** 30/09/2027

**Nombre Comercial:** TOUCHDOWN ULTIMO

## Titular

**ADAMA Agriculture España S.A.**

C/ Ramírez de Arellano N.º 29-2ª

28043 Madrid

(Madrid)

ESPAÑA

## Fabricante

**ADAMA AGAN LTD.**

Northern Industrial Zone, P.O. Box 262

7710201 Ashdod

ISRAEL

## Composición

GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V

## Envases

Botellas de polietileno de 100 cc, 250 cc y 1 L
Garrafas de polietileno de 5, 10, 20 y 25 L
Bidones de polietileno de 200, 640 y 1000 L
NOTA: Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

## Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)** | | | | | |
| Herbáceas extensivas | Monocotiledóneas anuales<br>Dicotiledóneas anuales<br>Dicotiledóneas plurianuales<br>Monocotiledóneas plurianuales | 3 - 6 l/ha<br>6 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Aplicar en presiembra del cultivo.<br>Si las infestantes son gramíneas anuales en primeros estadios puede reducirse la dosis a 1.5 L/ha.<br>Aplicar en presiembra del cultivo. |
| Herbáceas intensivas | Monocotiledóneas anuales<br>Dicotiledóneas anuales<br>Dicotiledóneas plurianuales<br>Monocotiledóneas plurianuales | 3 - 6 l/ha<br>6 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Aplicar en presiembra del cultivo.<br>Si las infestantes son gramíneas anuales en primeros estadios puede reducirse la dosis a 1.5 L/ha.<br>Aplicar en presiembra del cultivo. |
| Leñosas | Dicotiledóneas anuales<br>Monocotiledóneas anuales<br>Dicotiledóneas plurianuales<br>Monocotiledóneas plurianuales | 3 - 6 l/ha<br>6 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Aplicar en el suelo en las líneas o entre líneas cuando las malas hierbas estén creciendo.<br>Evitar el contacto con las hojas y los tallos.<br>Aplicar sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años y en aplicación dirigida.<br>Se puede aplicar en ultrabajo volumen con 20-30 l/ha de volumen de caldo (hasta 6 l pf/ha).<br>Aplicar en el suelo en las líneas o entre líneas cuando las malas hierbas estén creciendo.<br>Si las infestantes son gramíneas anuales en primeros estadios puede reducirse la dosis a 1.5 L/ha.<br>Evitar el contacto con las hojas y los tallos.<br>Aplicar sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años y en aplicación dirigida.<br>Se puede aplicar en ultrabajo volumen con 20-30 l/ha de volumen de caldo (hasta 6 l pf/ha).<br>Aplicar en el suelo en las líneas o entre líneas cuando las malas hierbas estén creciendo.<br>Evitar el contacto con las hojas y los tallos.<br>Aplicar sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años y en aplicación dirigida.<br>Se puede aplicar en ultrabajo volumen con 20-30 l/ha de volumen de caldo (hasta 6 l pf/ha). |
| Pastos y praderas | Malas hierbas | 6 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Sólo en aplicaciones puntuales, para tratar malezas leñosas, o en zonas localizadas, para tratar malas hierbas cuando se pretenda la regeneración de la pradera.<br>Reducción de la dosis máxima de 10.0 a 6.0 L / ha si el cultivo siguiente que se siembra es un cultivo herbáceo.<br>La hierba tratada no será destinada a la alimentación animal. |
| **Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)** | | | | | |
| Acequias | Malas hierbas | 5 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Sólo en márgenes de acequias. |
| Bordes de arcén y cunetas | Malas hierbas | 5 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Excepto en bordes de arcén y cunetas de zonas urbanas y residenciales. |
| Caminos | Malas hierbas | 5 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Excepto en caminos de zonas urbanas y residenciales. |
| Canales de riego | Malas hierbas | 5 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. |
| Cortafuegos | Malas hierbas | 3 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | Cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/Ha. |
| Linderos | Malas hierbas | 5 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | |
| Márgenes de cultivos | Malas hierbas | 5 - 10 l/ha | 1 | 200 - 400 l/ha | |

## Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|---|---|
| Herbáceas extensivas, Herbáceas intensivas, Leñosas, Pastos y praderas, Acequias, Bordes de arcén y cunetas, Caminos, Canales de riego, Cortafuegos, Linderos, Márgenes de cultivos | NA |

## Condiciones Generales de Uso

Controla malas hierbas en postemergencia.En cultivos leñosos, en aplicaciones en la línea o entre líneas, la superficie tratada será del 50%, por lo que la dosis real de aplicación por ha será del 50%, quedando limitada a un máximo de 1800 g de sa/ha.Adoptar prácticas alternativas de control de malezas (mecánicas, culturales, etc.) cuando sea posible, y alternancia de herbicidas (con herbicidas de diferente modo de acción) para evitar el desarrollo de resistencias.

## Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

## Mitigación de riesgos en la manipulación

**El aplicador debe utilizar guantes de protección química y ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos, de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009 y calzado resistente durante la mezcla/carga y aplicación.**
**El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada.**
**En las pulverizaciones en fila, la dosis real de aplicación por ha será del 50%, quedando limitada a un máximo de 1800 g de sa/ha).**

**Medidas adicionales de mitigación del riesgo:**
**• Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.**
**• En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.**
**• Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo**
**• No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.**
**• Las pulverizaciones hidráulicas con tractor se limitan a un máximo de 300 l/ha de volumen de caldo.**
**• Las pulverizaciones manuales hidráulicas deberán usar un mínimo de 325 l/ha de volumen de caldo.**
**• Las pulverizaciones manuales centrífugas se limitarán a un máximo de dosis de 3 l/ha y un mínimo de 25 l/ha de volumen de caldo.**

## Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | |
| Consejos de Prudencia | P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático crónico 2 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido. |

## Mitigación de riesgos ambientales

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.
SPe3: Para proteger las plantas no objetivo respétese una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada o usar boquillas de reducción del 90% de deriva.
Para proteger las plantas no objetivo en los usos no agrarios respétese una banda de seguridad de 5 m hasta el límite de la zona tratada o utilizar boquillas de reducción del 90% de deriva.
Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012.

## Eliminación del producto y/o caldo

SP1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de las aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

## Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Otras Indicaciones reglamentarias

No autorizado para uso no profesional y para uso profesional en lugares destinados al público en general en base a las disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2324 de la Comisión de 12 de Diciembre de 2017, que renueva la aprobación del glifosato.
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.