Datos del Producto

Número de Registro: ES-00765 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 01/03/2019 **Renovación:** **Caducidad:** 28/02/2027

Nombre Comercial: DEXTOP

Titular

AGRONATURALIS LTD.

Suite 2, Crown House, 2 Southampton Road

BH24 1HY Ringwood

(Hampshire)

REINO UNIDO

Fabricante

AGRONATURALIS LTD.

Suite 2, Crown House, 2 Southampton Road

BH24 1HY Ringwood

(Hampshire)

REINO UNIDO

Composición

HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 0,425% [AL] P/V

Envases

Botella de HDPE con pistola pulverizadora de 500 ml, 750 ml y 1000 ml.
Botella de PET con pistola pulverizadora de 250 a 1000 ml.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Oídios, Erysiphaceae	100 ml/m2	5	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar en el estadío de follaje joven.
Berenjena	Erysiphe spp. Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica	60 ml/m2	6	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Leveillula taurica y Erysiphe sp.
Calabacín	Oídio, Golovinomyces cichoracearum Oídio, Podosphaera fuliginea	60 ml/m2	6	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Erysiphe cichoracearum o Golovinomyces cichoracearum. Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea o Podosphaera fuliginea.
Frambueso	Podosphaera spp.	100 ml/m2	5	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 87. Eficaz contra Podosphaera sp. y Sphaerotheca sp.
Fresal	Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis	60 ml/m2	6	8	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 85. Eficaz contra Podosphaera aphanis. Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 85. Eficaz contra Podosphaera macularis o Sphaerotheca macularis.
Frutales de hueso	Monilia, Monilinia spp.	100 ml/m2	3	3	-	Tratamientos fungicidas al aire libre en; melocotonero, nectarino y albaricoque. Aplicar entre BBCH 79 y BBCH 89. Eficaz contra Monilinia fructicola, Monilinia fructigena y Monilinia laxa.
Frutales de pepita	Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis Moteado o roña del peral, Venturia pyrina	100 ml/m2	5	8	-	Tratamientos fungicidas al aire libre en; manzano, peral, membrillero, nashi, níspero y pomette. Aplicar entre BBCH 07 y BBCH 89. Eficaz contra Venturia inaequalis y Venturia pirina.
Grosellero	Podosphaera spp.	100 ml/m2	5	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre en grosellero negro y grosellero rojo. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 87. Eficaz contra Podosphaera sp.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Oídios, Erysiphaceae	60 ml/m2	6	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero en hierbas aromáticas y plantas medicinales. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89.
Hortalizas de hoja	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	60 ml/m2	6	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre para la producción de semillas. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89.
Ornamentales herbáceas	Oídios, Erysiphaceae	60 ml/m2	6	7	-	Ornamentales herbáceas y especies florales. Ornamentales herbáceas: Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar en los estadíos de flores, follaje joven y maduro. Especies florales: Tratamientos fungicidas al aire libre y en invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Incluye tratamientos en ornamentales florales o de flor al aire libre para producción de semillas.
Pepinillo	Oídio, Golovinomyces cichoracearum Oídio, Podosphaera fuliginea	60 ml/m2	6	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Erysiphe cichoracearum; Sphaerotheca fuliginea. Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea o Podosphaera fuliginea.
Pepino	Oídio, Golovinomyces cichoracearum Oídio, Podosphaera fuliginea	60 ml/m2	6	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Erysiphe cichoracearum o Golovinomyces cichoracearum. Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Podosphaera fuliginea o Sphaerotheca fuliginea.
Pimiento	Erysiphe spp. Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica	60 ml/m2	6	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Leveillula taurica y Erysiphe sp.
Rosales	Oídio del rosal, Podosphaera pannosa	100 ml/m2	5	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre los estadíos de: hojas (BBCH 41-49) y capullos de las flores (BBCH 51-59). Eficaz contra Podosphaera pannosa.
Tomate	Erysiphe spp. Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica	60 ml/m2	6	7	-	Tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10 y BBCH 89. Eficaz contra Leveillula taurica y Erysiphe sp.
Vid de mesa	Oídio de la vid, Erysiphe necator Botrytis spp.	100 ml/m2	5	7 8	-	Tratamientos fungicidas al aire libre. Aplicar entre BBCH 15 y BBCH 89. Eficaz contra Uncinula necator o Erysiphe necator. Tratamientos fungicidas al aire libre. Aplicar entre BBCH 61 y BBCH 89. Eficaz contra Botrytis cinerea.
Vid de vinificación	Oídio de la vid, Erysiphe necator Botrytis spp.	100 ml/m2	5	7 8	-	Tratamientos fungicidas al aire libre. Aplicar entre BBCH 15 y BBCH 89. Eficaz contra Uncinula necator o Erysiphe necator. Tratamientos fungicidas al aire libre. Aplicar entre BBCH 61 y BBCH 89. Eficaz contra Botrytis cinerea.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Frambueso, Fresal, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Grosellero, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Tomate, Vid de mesa, Vid de vinificación	1
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hortalizas de hoja, Ornamentales herbáceas, Rosales	NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso

Tratamientos fungicidas mediante pulverización foliar. Producto listo uso, no requiere dilución.En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta utilización del producto.

Clase de Usuario

Uso no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Medidas adicionales de la mitigación del riesgo:
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- Se recomienda el uso de guantes de protección química al manejar el producto.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

Autorizado para jardinería exterior doméstica.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.