Datos del Producto

Número de Registro: ES-01484 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 31/05/2023 **Renovación:** **Caducidad:** 31/05/2027

Nombre Comercial: SIVAR GOLD

Titular

LAINCO S.A.

Avda. de Bizet 8-12

08191 Rub

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

LAINCO S.A.

Avda. de Bizet 8-12

08191 Rub

(Barcelona)

ESPAÑA

Composición

FOSFONATOS DE POTASIO 25,5% (Exp. como ácido fosforoso) + AZOXISTROBIN 6,25 % [SC] P/V

Envases

Garrafas de polietileno (HDPE) de 5, 10, 20 y 25 l.
Botella de polietileno (HDPE) de 1 l.

NOTA: Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Berenjena	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	3 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar en todos los estadios, excepto en la floración.
Melocotonero	Phytophthora spp.	3 l/ha	2	10 días	300 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar en otoño (BBCH 91-92) y/o verano (BBCH 70-81).
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	3 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar en todos los estadios, excepto en la floración.
Vid de mesa	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	3 l/ha	1	--	300 - 1000 l/ha	Aplicar a partir de la aparición del órgano floral. Influorescencias claramente visibles. (BBCH 53), excepto en la floración.
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	3 l/ha	1	--	300 - 1000 l/ha	Aplicar a partir de la aparición del órgano floral. Influorescencias claramente visibles. (BBCH 53), excepto en la floración.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Berenjena	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	3 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar en todos los estadios, excepto en la floración.
Melocotonero	Phytophthora spp.	3 l/ha	2	10 días	300 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar en otoño (BBCH 91-92) y/o verano (BBCH 70-81).
Patata	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	3 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar en todos los estadios, excepto en la floración.
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	3 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar en todos los estadios, excepto en la floración.
Vid de mesa	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	3 l/ha	1	--	300 - 1000 l/ha	Aplicar a partir de la aparición del órgano floral. Influorescencias claramente visibles. (BBCH 53), excepto en la floración.
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	3 l/ha	1	--	300 - 1000 l/ha	Aplicar a partir de la aparición del órgano floral. Influorescencias claramente visibles. (BBCH 53), excepto en la floración.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Berenjena	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	3 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar en todos los estadios, excepto en la floración.
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	3 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar en todos los estadios, excepto en la floración.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Melocotonero, Vid de mesa, Vid de vinificación, Patata	15
Berenjena, Tomate	NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida por pulverización foliar mecánica y manual con mochila al aire libre, y por pulverización foliar manual con mochila en invernadero.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS- Usar en alternancia con fungicidas con diferente modo de acción.- Usar como se recomienda en la etiqueta. No utilice dosis reducidas.- La aplicación debe realizarse en una etapa temprana de desarrollo o como una aplicación preventiva.- Utilizar otras medidas como variedades resistentes, buenas prácticas agronómicas…etc.

Clase de Usuario

Uso profesional agrario.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

En pulverizaciones mecánicas, el aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4 + calzado de protección frente a productos químicos; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + calzado de protección frente a productos químicos.

En pulverizaciones manuales con mochila, el aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección nivel C3 o en su defecto tipo 3 + calzado de protección frente a productos químicos + pantalla facial; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección nivel C3 o en su defecto tipo 3 + calzado de protección frente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado, además de guantes de protección química salvo en el cultivo de patata.

NORMATIVA APLICABLE:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO-374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección nivel C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN –ISO 27065:2017/A1:2019.
- Ropa de protección química tipo 3: contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009. Estos equipos se usarán con las limitaciones de uso indicadas por el fabricante.
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).
- Protección facial: pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o de tipo PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Será necesario que el trabajador use guantes de protección química durante la reentrada a los cultivos tratados durante todo el manejo de los cultivos tratados, salvo para tareas de inspección y riego.

SPo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 2: Para proteger a los organismos acuáticos, no aplicar en suelos drenados artificialmente para los usos en vid y patata.

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:
- 10m con cubierta vegetal en vid, patata, tomate y berenjena.
- 20m con cubierta vegetal en melocotonero y nectarino.

SPe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

SPe 3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial para manejar el riesgo de eutrofización.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.