

MIND MOVEMENT ACADEMY

Materiale formativo per Coach — Scheda di transizione

Dal Sit-up alle alternative sicure: protocollo di sostituzione, progressione e valutazione

A cura di Francesco Busanca — Direttore Tecnico, A.S.D. Evolution Sport / Mind Movement Lab

1. Razionale in una riga

Il sit-up non viene sostituito perché “non funziona”, ma perché il suo **rapporto rischio/beneficio è sfavorevole**: carica in flessione lombare ripetuta e sotto compressione un tratto (L4-L5/L5-S1) che tollera male il caricamento ciclico, mentre il retto addominale — l’obiettivo dichiarato — lavora solo nei primi ~30°. Esistono alternative che allenano lo stesso bersaglio (e meglio) **senza** quel costo.

Principio-guida da trasmettere ai coach: *l’addome non è un muscolo da isolare, è parte del sistema di trasferimento di forza tronco-bacino*. Alleniamo prima la capacità di **non muoversi** sotto carico (stabilità), poi il movimento controllato.

2. Logica di sostituzione (cosa rimpiazza cosa)

Cosa cercava il sit-up	Perché fallisce	Con cosa lo sostituiamo
Attivare il retto addominale	Dopo i primi 30° traina l’ileopsoas, non il retto	Curl-up McGill, hollow body
“Rinforzo del core”	Genera flessione lombare ripetuta sotto carico	Dead bug, bird dog (anti-movimento)
Controllo del tronco	Nessun controllo della neutralità lombare	Pallof press, chop/lift (anti-rotazione)

Progressione di carico	Carico non modulabile in sicurezza	Ab wheel, loaded carries (carico graduale)
------------------------	------------------------------------	--

3. Progressione a fasi

Ogni fase ha un **criterio di avanzamento**: non si passa alla successiva finché l'allievo non lo soddisfa senza compensi.

FASE 0 — Screening preliminare (prima di assegnare qualsiasi cosa)

Da valutare sul singolo allievo:

- **Consapevolezza del bacino**: sa trovare e mantenere la neutralità lombare (anteroversione/retroversona controllata da supino)?
- **Test di Thomas**: rigidità dei flessori d'anca (ileopsoas/retto femorale)?
- **Dissociazione anca-lombare**: riesce a flettere l'anca mantenendo il rachide fermo?
- **Anamnesi**: storia di dolore lombare, ernie, discopatie? → vedi red flags (§4)

Criterio per procedere: neutralità lombare mantenuta consapevolmente + assenza di red flags. Se manca la consapevolezza pelvica, si lavora *prima* su quella (respiro + tilt) senza esercizi di forza.

FASE 1 — Fondamenta anti-movimento (isometrico, neutralità lombare)

Obiettivo: insegnare il **bracing** e il controllo della colonna neutra sotto carico dinamico degli arti, senza mai flettere il lombare.

Esercizi base:

1. **Dead bug** — supino, anche e ginocchia a 90°, braccia verso il soffitto. Si abbassano arto superiore e inferiore controlaterali mantenendo il contatto lombare col pavimento. Progressioni: solo gambe → solo braccia → controlaterale completo.
2. **Curl-up di McGill** — mano sotto la lordosi lombare (preserva la curva), un ginocchio flesso, sollevamento *minimo* di testa/spalle (niente flessione del rachide), gomiti a terra come leva di controllo. Tenuta breve.
3. **Bird dog** — quadrupedia, estensione di braccio e gamba controlaterali mantenendo il rachide neutro (immaginare una tazza d'acqua sul sacro che non deve rovesciarsi).

Criterio di avanzamento: dead bug controlaterale, 8-10 rip. per lato, **senza** che il lombare si stacchi dal suolo e senza apnea di compenso. Bird dog stabile 5" per lato senza rotazione del bacino.

FASE 2 — Anti-estensione / anti-rotazione dinamica

Obiettivo: gestire il carico attraverso un range, resistendo all'estensione e alla rotazione lombare.

Esercizi:

1. **Hollow body hold** (progressioni) — retroversione con lombare a terra, arti estesi. Progressione: tuck → una gamba → hollow completo → rocks.
2. **Pallof press** — anti-rotazione, elastico/cavo al fianco, si spinge avanti resistendo alla rotazione. Ottimo primo carico "in piedi".
3. **Ab wheel / rullo** — da ginocchia, ROM parziale → completo. Alta richiesta anti-estensione: si introduce **solo** con una base solida di Fase 1, mai prima.

Criterio di avanzamento: controllo del range senza inarcamento lombare (nessun "cedimento" della zona lombare in estensione), respiro gestito, nessun dolore.

FASE 3 — Integrazione e trasferimento funzionale

Obiettivo: portare il controllo del core dentro i pattern reali di movimento — qui entra la logica delle catene fasciali e del trasferimento di forza.

Esercizi:

1. **Loaded carries** (farmer, suitcase, overhead) — anti-flessione laterale e stabilità globale sotto carico reale.
2. **Chop & Lift** (in ginocchio → in piedi) — anti-rotazione integrata alle catene oblique/spirali.
3. **Integrazione nei gesti** — stabilità del core dentro squat, affondi, spinte: l'addome come stabilizzatore del trasferimento, non come muscolo isolato.

Criterio: l'allievo mantiene la neutralità e il bracing dentro un pattern complesso senza pensarci consapevolmente (competenza automatizzata).

4. Red flags — criteri di esclusione/modifica sul singolo allievo

Da valutare **sempre**, non solo in Fase 0. Se compaiono, si ferma o si modifica:

- **Dolore lombare** durante qualsiasi flessione o sotto carico → stop, rivalutazione.
 - **Impossibilità a dissociare** lombare e anca → si torna al lavoro di consapevolezza pelvica.
 - **Doming / coning addominale** (la pancia forma una "cresta" centrale sotto sforzo) → possibile diastasi dei retti, frequente nel post-parto → modifica/invio a figura competente.
 - **Apnea / Valsalva incontrollata:** l'allievo trattiene il respiro e non sa gestire la pressione intra-addominale → si lavora prima sul respiro.
 - **Anteroversione pelvica che peggiora sotto carico** → ridurre carico/ROM, rinforzare il controllo prima di progredire.
-

5. Note di cueing coerenti col metodo

- **Respiro come guida:** espirazione sullo sforzo mantenendo il controllo pressorio; il respiro precede e organizza la stabilità.
 - **Catena funzionale anteriore:** far percepire la connessione addome-adduttori-cassa, non l'addome "a scomparti".
 - **"Stabilità prima di mobilità, controllo prima di carico":** ripetuto come mantra di progressione.
 - **Percezione prima di prestazione:** l'allievo deve *sentire* la neutralità, non solo eseguirla.
-

6. Griglia di valutazione rapida (per il coach)

Allievo: _____	Sì	No	Note
Trova/mantiene neutralità lombare	☐	☐	
Dissocia anca da lombare	☐	☐	

Dead bug controlaterale senza compensi	☐	☐	
Bird dog stabile 5"/lato	☐	☐	
Nessuna red flag presente	☐	☐	
Gestisce il respiro sotto carico	☐	☐	
Fase attuale assegnata:			Fase ____

Documento didattico interno — Mind Movement Academy. Non sostituisce la valutazione clinica in presenza di patologia.