1813

Apuntes Fisica Teorica (AFTIN)

Felipe Colli *

2025

Índice

1.	Clase de $23/05/2025$	2
	1.1. Cinemática	2
	1.1.1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)	2
	1.1.2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)	2
	1.1.3. Graficos	2
	1.1.4. Aplicando la Derivada a la ecuación de la Itininerario	2
2.	Clase del $30/05/2025$	3
	2.1. Movimiento Circunferencial Uniforme (MCU)	3
	2.1.1. Magnitudes Fisicas Temporales asociadas al Movimiento Ciclicos	
	2.1.2. Estudio lineal del M.C.U	:
	2.1.3 Estudio Angular del M.C.U.	6

^{*}AFTIN y Profesor Paul Cáceres

1. Clase de 23/05/2025

1.1. Cinemática

1.1.1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

- 1. Poseen una trayectoria rectilinea
- 2. Velocidad constante $(\vec{a} = 0 \frac{m}{s^2})$

•
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \ \vec{v} = \frac{\vec{d}}{t} \left(\frac{m}{s} \right) |\vec{v}| = v$$

$$x(t) = x_i + vt$$

$$a=0$$

$$|\vec{d}| = d$$

1.1.2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

- 1. Poseen una trayectoria rectilinea
- 2. Velocidad variable $\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \left(\frac{m}{s^2} \right)$
- 3. Si la aceleración es del mismo signo que la velocidad, el objeto se acelera. Si la aceleración es del signo opuesto a la velocidad, el objeto desacelera.
- Ecuancion de la Velocidad en Función del Tiempo $v=v_i+a\Delta t$
- Ecuación Iterinerario $x(t) = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$
- \blacksquare Ecuacion Independiente del Tiempo $v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f x_i)$
- $\bullet |\vec{d}| = d$

1.1.3. Graficos

- 1. Pendiente (Derivada) de la función
- 2. Área bajo la curva (Integral) de la función
- x vs $t \to \text{Pendiente} = \text{Velocidad}$, Area bajo la curva = Velocidad
- v v
s $t \to \Delta x = \frac{\Delta v \cdot t}{2} + v_i t$ Pendiente = Aceleración, Area bajo la curva = Distancia Recorrida

1.1.4. Aplicando la Derivada a la ecuación de la Itininerario

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v(t) = x' = v_1 + at^2$$

$$v(t)' = a$$

2. Clase del 30/05/2025

2.1. Movimiento Circunferencial Uniforme (MCU)

- Movimiento circular con rapidez constante
- Trayectoria circular
- Aceleración centrípeta $a_c = \frac{v^2}{r} \left(\frac{m}{s^2} \right)$
- Velocidad angular $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \left(\frac{rad}{s} \right)$
- Relación entre velocidad lineal y angular $v = r\omega \left(\frac{m}{s}\right)$

2.1.1. Magnitudes Fisicas Temporales asociadas al Movimiento Ciclicos

- Periodo $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{t}{N} = \frac{1}{f}[s]$ Tiempo que tarda en completar una vuelta
- Frecuencia $f = \frac{1}{T} = \frac{N}{t}[Hz]$
- Longitud de onda $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{vT}{N}$

2.1.2. Estudio lineal del M.C.U.

- Rapidez tangencial $v = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r f$
- Aceleración centrípeta $a_c = \frac{v^2}{r}$
- Aceleración tangencial $a_t = r\alpha$ donde α es la aceleración angular
- Aceleración total $a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$

2.1.3. Estudio Angular del M.C.U.

- $1rad \approx 57,3$
- $360 = 2\pi rad$
- Rapidez angular $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- Aceleración angular $\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$
- Relación entre aceleración centrípeta y angular $a_c = r\omega^2$
- \blacksquare Relación entre aceleración tangencial y angular $a_t = r\alpha$
- Aceleración total $a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$