Introducción a la Física Clásica

Clase III

Claudio Falcón Beas
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
cfalcon@uchile.cl

En la clase de hoy

Repaso definiciones cinemáticas (vector posición, velocidad, aceleración).
Movimientos sencillos en 1 dimensión.
Movimientos sencillos en 2 dimensiones.

Vectores

$\vec{r}(t)$ = vector posición
en función del tiempo



Si CURVAS SON RECTAS

$$\vec{v}(t) = \lim_{t'-t} \frac{\vec{r}(t') - \vec{r}(t)}{t' - t}$$

Vectores

$\vec{r}(t)$ = vector posición
en función del tiempo

$\vec{v}(t)$ = vector velocidad
en función del tiempo

Si CURVAS SON RECTAS

$$\vec{v}(t) = \lim_{t'-t} \frac{\vec{r}(t') - \vec{r}(t)}{t' - t}$$



Vectores

$\vec{v}(t)$ = vector velocidad en función del tiempo

$\vec{a}(t)$ = vector aceleración en función del tiempo



$$\vec{a}(t) = \lim_{t'-t} \frac{\vec{v}(t') - \vec{v}(t)}{t' - t}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_o + \Delta x) - f(x_o)}{\Delta x}$$



Fig. 1

Esto es lo que se llama "derivada de $f(x)$ evaluada en x_o"

Calcule la derivada de las funciones

$$f(x) = \sin(\kappa x)$$

$$f(x) = \kappa \exp(-x/\lambda)$$

$$f(x) = (x/\lambda)^n$$

En torno a $x_o = 0$

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



x(t): posición de la partícula puntual (?)
en una línea en función del tiempo

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



x(t): posición de la partícula puntual (?)
en una línea en función del tiempo

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



x(t): posición de la partícula puntual (?)
en una línea en función del tiempo

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



Cuando $v(t)=V=cte.$, el movimiento se llama RECTILINEO UNIFORME

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



La velocidad es sencillamente la pendiente de la recta

$x(t)=x_o+V*(t-t_o)$

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



Si la velocidad ahora tiene esta forma entonces

$v(t)=v_o+A*(t-t_o)$

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



Si la velocidad ahora tiene esta forma entonces

$v(t)=v_o+A*(t-t_o)$

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



Note que el área bajo la curva entre t_o y t_f es cuanto se desplazo en móvil ($x(t)$-x_o). Cuanto vale eso?

Movimiento parabólico

$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

$\vec{a}(t)$: vector aceleración



Movimiento parabólico



$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

$\vec{a}(t)$: vector aceleración

Movimiento parabólico



$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

$\vec{a}(t)$: vector aceleración

Movimiento parabólico



En la horizontal:
MRU
En la vertical:
MUA

Veamos algunas parábolas