Introducción a la Física Clásica

Clase V

Claudio Falcón Beas
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
cfalcon@uchile.cl

En la clase de hoy

Repaso movimientos sencillos en 2 dimensiones.
Movimiento Circunferencial (Uniforme y Acelerado)

Movimiento parabólico

$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

$\vec{a}(t)$: vector aceleración



Movimiento parabólico



$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

$\vec{a}(t)$: vector aceleración

Movimiento parabólico



$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

$\vec{a}(t)$: vector aceleración

Movimiento parabólico



En la horizontal:
MRU
En la vertical:
MUA

Veamos algunas parábolas

Circunferencial Uniforme

$\vec{r}(t)$: vector posición



Para adonde apunta

$$\phi(t) = \phi_o + \omega t$$



Circunferencial Uniforme



$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

$$\phi(t) = \phi_o + \omega t$$

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

Circunferencial Uniforme



$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

$\vec{a}(t)$: vector aceleración

$$\phi(t) = \phi_o + \omega t$$

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$