ЛП-№(013490)-(РГ-RU) от 21.09.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш – информация для пациента

ЦИТАЛОПРАМ, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ЦИТАЛОПРАМ, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ЦИТАЛОПРАМ, 40 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: циталопрам

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат ЦИТАЛОПРАМ и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата ЦИТАЛОПРАМ.
3. Прием препарата ЦИТАЛОПРАМ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ЦИТАЛОПРАМ.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат ЦИТАЛОПРАМ и для чего его применяют

Действующим веществом препарата ЦИТАЛОПРАМ является циталопрам, который относится к группе «психоаналептики, антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина». Он помогает увеличить уровень серотонина в головном мозге, блокируя его обратный захват нервными клетками.

Показания к применению

ЦИТАЛОПРАМ показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет и старше при:

- депрессивных эпизодах средней и тяжелой степени и предотвращении их рецидивов;
- паническом расстройстве с/без агорафобии.

Способ действия препарата ЦИТАЛОПРАМ

Циталопрам действует преимущественно на серотонин и практически не влияет на другие вещества в мозге (норадреналин, дофамин, гамма-аминомасляную кислоту). Препарат почти не взаимодействует с различными рецепторами в организме (в том числе серотониновыми, дофаминовыми, адренергическими, гистаминовыми, холинорецепторами и др.).

Циталопрам является антидепрессантом, селективным ингибитором обратного захвата серотонина. При депрессии в организме происходит нарушение обмена веществ, в частности серотонина (вещество, которое обеспечивает передачу сигналов между нервными клетками).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Циталопрам способствует накоплению серотонина, таким образом длительный прием циталопрама приводит к восстановлению серотонинового обмена и, тем самым, уменьшению симптомов болезни. Основное действие циталопрама – антидепрессивное.

Циталопрам влияет на структуру сна: уменьшает продолжительность фазы быстрого сна (REM) и увеличивает продолжительность глубокого сна. Такое изменение структуры сна – один из признаков антидепрессивного действия препарата.

Как и у других антидепрессантов, эффект препарата ЦИТАЛОПРАМ развивается постепенно. Может пройти несколько недель, прежде чем Вы почувствуете себя лучше. Продолжайте принимать препарат ЦИТАЛОПРАМ, даже если это займет некоторое время, прежде чем Вы почувствуете какое-либо улучшение Вашего состояния.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата ЦИТАЛОПРАМ

Противопоказания

Не принимайте препарат ЦИТАЛОПРАМ, если:

- у Вас аллергия на циталопрам или на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- Вы принимаете ингибиторы моноаминоксидазы (в том числе селегилин в дозе выше 10 мг/сутки). Интервал времени между окончанием приема необратимых ингибиторов моноаминоксидазы (селегилин, разагилин, фенелзин) и началом приема циталопрама должен составлять не менее 14 дней;
- Вы принимаете линезолид (антибиотик широкого спектра действия). Комбинация возможна только при условии, что Ваш лечащий врач может постоянно наблюдать за Вами и контролировать артериальное давление;
- Вы принимаете пимозид (применяется для лечения шизофрении и схожих психических заболеваний);
- у Вас установленное удлинение интервала QT или врожденный удлиненный интервал QT;
- Ваш возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата ЦИТАЛОПРАМ проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Перед началом приема препарата ЦИТАЛОПРАМ обязательно предупредите лечащего врача, если какой-либо из нижеуказанных пунктов относится к Вам:

- если Вам менее 18 лет;
- если у Вас была диагностирована парадоксальная тревога;
- если у Вас снижено содержание натрия в крови (гипонатриемия);
- если у Вас когда-либо были мысли о самоубийстве или попытки самоубийства;
- если у Вас диагностирована акатизия/психомоторное расстройство;
- если у Вас биполярное расстройство или ранее отмечались эпизоды мании;
- если у Вас эпилепсия или ранее возникали судорожные припадки;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- если у Вас сахарный диабет;
- если во время приема препарата у Вас развился серотониновый синдром (угрожающее жизни состояние, симптомы которого включают спутанность сознания, возбуждение, беспокойство, тошноту, рвоту, повышенное потоотделение и температуру тела, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления);
- если Вы принимаете препараты с серотонинергическим действием, такие как триптаны (суматриптан, окситриптан и др.), опиоиды (трамадол) и триптофан;
- если у Вас имеется склонность к кровотечениям или Вы принимаете препараты, повышающие риск кровотечения;
- если Вы проходите лечение с применением электросудорожной терапии;
- если Вы принимаете препараты, содержащие зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum*);
- если у Вас имеются заболевания сердца, нарушения сердечного ритма, замедленное сердцебиение, Вы недавно перенесли инфаркт миокарда или страдаете сердечной недостаточностью;
- если у Вас закрытоугольная глаукома или она была в прошлом;
- если у Вас снижено содержание калия или магния в крови.

Психоз

Если у Вас был диагностирован психоз с депрессивным эпизодом, применение препарата ЦИТАЛОПРАМ может усилить проявления психотических симптомов.

Симптомы отмены при прекращении терапии

При резком прекращении приема препарата ЦИТАЛОПРАМ возможно появления неприятных симптомов, которые называются синдромом «отмены». Поэтому прекращать прием препарата следует постепенно (см. раздел 3, подраздел «Если Вы прекратили прием препарата ЦИТАЛОПРАМ»).

Это важно для того, чтобы врач в полной мере смог оценить, насколько Вам безопасно применять данный препарат и потребуется ли соблюдение особых мер предосторожности.

Дети и подростки

Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте до 18 лет.

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность не установлены.

Другие препараты и препарат ЦИТАЛОПРАМ

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете какие-либо из нижеперечисленных препаратов:

- неселективные необратимые ингибиторы МАО, содержащие в качестве действующих веществ фенелзин, ипрониазид, изокарбоксазид, ниаламид и транилципромин. Если Вы принимали какой-либо из этих лекарственных препаратов, Вам нужно подождать 14 дней до начала приема препарата ЦИТАЛОПРАМ. После прекращения лечения препаратом ЦИТАЛОПРАМ необходимо подождать 7 дней, прежде чем принимать какой-либо из этих препаратов;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- обратимые селективные ингибиторы МАО-А, содержащие моклобемид (применяется для лечения депрессии), поскольку при одновременном применении с препаратом ЦИТАЛОПРАМ возрастает риск развития серотонинового синдрома;
- обратимые неселективные ингибиторы МАО, содержащие линезолид (антибиотик, применяемый для лечения бактериальных инфекций), поскольку их одновременное применение с препаратом ЦИТАЛОПРАМ не рекомендуется. Если врач сочтет необходимым одновременный прием указанных препаратов, то он подберет Вам более низкую дозу и будет регулярно контролировать Ваше состояние;
- необратимые селективные ингибиторы МАО-В, содержащие селегилин (применяется для лечения болезни Паркинсона), поскольку при одновременном применении с препаратом ЦИТАЛОПРАМ возрастает риск развития серотонинового синдрома;
- флекаинид, пропафенон, метопролол (применяются для лечения некоторых заболеваний сердца), дезипрамин, кломипрамин, нортриптилин (применяются для лечения депрессии), рисперидон, тиоридазин, галоперидол (применяются для лечения шизофрении и схожих психических заболеваний), поскольку при одновременном применении может потребоваться коррекция дозы препарата ЦИТАЛОПРАМ;
- препараты, удлиняющие интервал QT. Противопоказано одновременное применение препарата ЦИТАЛОПРАМ и следующих лекарственных препаратов (см. раздел 2, подраздел «Противопоказания»):
  - антиаритмические препараты классов IA и III (применяются при лечении нарушений ритма сердца);
  - нейролептики, например, производные фенотиазина, пимозид, галоперидол (применяются для лечения шизофрении и схожих психических заболеваний);
  - трициклические и тетрациклические антидепрессанты, например, амитриптилин, имипрамин, мапротилин и др. (применяются для лечения депрессии);
  - СИОЗС и подобные им антидепрессанты, например, флуоксетин, венлафаксин и др. (применяются для лечения депрессии);
  - некоторые противомикробные препараты: макролидные антибиотики и их аналоги, например, эритромицин, кларитромицин, производные хинолона и фторхинолона, например, спарфлоксацин, моксифлоксацин, пентамидин;
  - противогрибковые средства азолового ряда (кетоконазол, флуконазол);
  - домперидон, ондансетрон (противорвотные препараты);
  - препараты для лечения малярии, в частности, галофантрин;
  - некоторые антигистаминные препараты, например, астемизол, мизоластин (применяются для лечения аллергических реакций);
- суматриптан и другие триптаны (применяются для лечения мигрени), трамадол и бупренорфин (применяются для снятия сильной боли), поскольку при одновременном применении с препаратом ЦИТАЛОПРАМ возрастает риск развития серотонинового синдрома;
- мефлохин (применяется для лечения малярии), бупропион (применяется для лечения депрессии), трамадол (применяется для снятия сильной боли), антипсихотические препараты (нейролептики) из группы производных фенотиазина, тиоксантена и

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

бутирофенона (применяются для лечения шизофрении и схожих психических заболеваний), поскольку при одновременном применении с препаратом ЦИТАЛОПРАМ возможно развитие судорог;

- препараты лития (применяются для лечения психических заболеваний), триптофан (применяется при смене настроения, расстройствах сна, нарушении засыпания), препараты, содержащие Зверобой продырявленный (применяются для лечения легкой депрессии), поскольку при одновременном применении с препаратом ЦИТАЛОПРАМ повышается риск развития нежелательных реакций;
- антикоагулянты (препараты, препятствующие свертыванию крови), такие как варфарин, антиагреганты (препараты, препятствующие образованию сгустков крови в сосудах – тромбов), такие как ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, тиклопидин, дипиридамол, а также нестероидные противовоспалительные препараты (применяются при воспалении, боли, лихорадке), поскольку при одновременном применении с препаратом ЦИТАЛОПРАМ повышается риск развития кровотечений;
- препараты, вызывающие снижение уровня калия (гипокалиемию) и (или) магния (гипомагниемию) в крови, поскольку при одновременном применении с препаратом ЦИТАЛОПРАМ повышается риск развития тяжелых нарушений ритма сердца (аритмий);
- циметидин, лансопразол, омепразол (применяются для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) флуоксетин, флувоксамин (применяются для лечения депрессии), тиклопидин (препарат, препятствующий образованию сгустков крови в сосудах), поскольку при одновременном применении может потребоваться уменьшение дозы препарата ЦИТАЛОПРАМ.

Препарат ЦИТАЛОПРАМ с пищей, напитками и алкоголем

Избегайте употребления алкогольных напитков на протяжении всего курса лечения препаратом ЦИТАЛОПРАМ.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Убедитесь, что Вашему врачу известно о том, что Вы принимаете препарат ЦИТАЛОПРАМ.

Применение во время беременности аналогичных лекарственных препаратов (СИОЗС) может повышать риск развития у ребенка серьезного состояния, называемого персистирующей легочной гипертензией новорожденных. При этом состоянии дыхание новорожденного учащается, а кожа приобретает синеватый оттенок.

Если Вы принимали препарат ЦИТАЛОПРАМ на поздних сроках беременности, особенно в третьем триместре, за новорожденным будет установлено медицинское наблюдение. Если прием препарата продолжается вплоть до родов, у ребенка может развиться синдром «отмены», который может проявляться следующими симптомами: нарушение дыхания с возможными остановками во сне (апноэ), синюшность кожных покровов (цианоз), судороги, скачки температуры тела, трудности с кормлением, рвота, снижение концентрации сахара в крови (гипогликемия), повышенный или пониженный мышечный тонус (мышечная гипертония или гипотония), повышение рефлексов (гиперрефлексия), дрожь (тремор), повышенная нервно-рефлекторная возбудимость (которая может иметь самые разные

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

проявления, в том числе дрожание подбородка и конечностей, беспричинный плач, частые и обильные срыгивания, нарушение сна и другие), раздражительность, патологический сон (летаргия), постоянный плач, сонливость и плохой сон (см. раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). Как правило, такие осложнения возникают в первые сутки после рождения.

Если Вы принимали препарат в течение последнего месяца беременности, то в этом случае у Вас повышается риск развития послеродового кровотечения.

Грудное вскармливание

Циталопрам проникает в грудное молоко, что может повлиять на здоровье Вашего ребенка. Обратитесь к лечащему врачу, чтобы решить, следует ли Вам прекратить грудное вскармливание или отменить прием препарата ЦИТАЛОПРАМ.

Фертильность

Исследования на животных показали, что препараты, подобные препарату ЦИТАЛОПРАМ, могут влиять на качество спермы. До сих пор влияние циталопрама на фертильность человека не наблюдалось.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Циталопрам в минимальной или умеренной степени влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Во время лечения препаратом ЦИТАЛОПРАМ следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Препарат ЦИТАЛОПРАМ содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат ЦИТАЛОПРАМ содержит глицерол (глицерин)

Может вызывать головную боль, расстройство желудка и диарею (понос).

3. Прием препарата ЦИТАЛОПРАМ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Максимальная суточная доза – 20 мг.

Депрессия

Рекомендуемая доза препарата ЦИТАЛОПРАМ составляет 20 мг 1 раз в сутки. Доза может быть увеличена Вашим лечащим врачом до 40 мг в сутки.

Паническое расстройство

Начальная доза препарата ЦИТАЛОПРАМ составляет 10 мг 1 раз в сутки в течение первой недели лечения, затем доза повышается до 20 мг в сутки. Доза может быть увеличена Вашим лечащим врачом до 40 мг в сутки.

Путь и (или) способ введения

Таблетки следует принимать внутрь один раз в сутки. Препарат можно принимать в любое время дня вне зависимости от приема пищи.

Продолжительность терапии

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Продолжительность лечения будет зависеть от Вашего заболевания. Важно продолжать прием препарата ЦИТАЛОПРАМ на протяжении всего срока, прописанного врачом.

Депрессия

Для достижения антидепрессивного эффекта обычно требуется 2-4 недели. После исчезновения симптомов депрессии терапию необходимо продолжать, как минимум, еще в течение 6 месяцев для закрепления полученного эффекта.

Паническое расстройство

Максимальный терапевтический эффект циталопрама достигается примерно через 3 месяца после начала лечения и сохраняется при продолжении терапии.

Если Вы приняли препарата ЦИТАЛОПРАМ больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата ЦИТАЛОПРАМ больше, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу, Вам может потребоваться медицинская помощь. Обязательно возьмите упаковку препарата, чтобы врач знал, какой именно препарат Вы принимаете.

Симптомы передозировки могут включать судороги, учащение частоты сердечных сокращений, сонливость, кому, рвоту, тремор (дрожание), снижение артериального давления, нарушения сердечного ритма, тошноту, серотониновый синдром, ажитацию (сильное волнение, возбуждение), снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия), головокружение, повышение артериального давления, мидриаз (расширение зрачков вне зависимости от внешних условий), ступор, потоотделение, цианоз (состояние, при котором кожа и слизистые оболочки приобретают синеватый, фиолетовый или сероватый оттенок из-за того, что кровь недостаточно насыщена кислородом), гипервентиляцию (состояние, при котором дыхание становится слишком частым и глубоким).

Если Вы забыли принять препарат ЦИТАЛОПРАМ

Если Вы пропустили прием препарата, примите таблетку, как только вспомните об этом. Если время приема следующей дозы почти наступило, пропустите пропущенную дозу и примите следующую в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата ЦИТАЛОПРАМ

Не прекращайте прием препарата без консультации с Вашим лечащим врачом. Если Вы прекратите прием препарата ЦИТАЛОПРАМ слишком рано, симптомы Вашего заболевания могут вернуться.

После завершения курса лечения обычно рекомендуется постепенно снижать дозу препарата в течение нескольких недель. При прекращении лечения могут возникнуть симптомы отмены. Если при прекращении приема препарата ЦИТАЛОПРАМ у Вас возникли тяжелые симптомы отмены, обратитесь к Вашему врачу.

Симптомы отмены включают: головокружение, ощущение покалывания, жжения или удара током, нарушения сна, возбуждение или чувство тревоги, тошноту и/или рвоту, дрожание (тремор), спутанность сознания, потливость, головную боль, понос (диарею), учащенное сердцебиение, эмоциональную неустойчивость, раздражительность, нарушения зрения.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения следующих **серьезных нежелательных реакций:**

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- кровотечение.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- крупные зудящие волдыри на коже (крапивница).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- предобморочное состояние или потеря сознания, резкое снижение артериального давления, нарушение дыхания, бледно-синюшная, холодная, влажная кожа (анафилактические реакции);
- угрожающее жизни состояние, симптомы которого включают спутанность сознания, возбуждение, беспокойство, тошноту, рвоту, повышенное потоотделение и температуру тела, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления (серотониновый синдром).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата ЦИТАЛОПРАМ.

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- сонливость;
- бессонница;
- сухость во рту;
- тошнота;
- повышенная потливость.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- снижение аппетита;
- уменьшение массы тела;
- ажитация (состояние сильного эмоционального возбуждения, сопровождаемое чувствами страха и тревоги);
- снижение либидо;
- тревога;
- нервозность;
- спутанность сознания;
- аноргазмия (у женщин);
- необычные сновидения;
- тремор;
- парестезии (ощущение покалывания, онемения, жжения или «ползания мурашек» по коже без внешнего раздражителя);
- головокружение;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- нарушение внимания;
- шум в ушах;
- зевота;
- диарея;
- рвота;
- запоры;
- зуд;
- миалгия (боль в одной или нескольких мышцах без нарушения их анатомической целостности);
- артралгия (боль в одном или нескольких суставах);
- импотенция;
- нарушение эякуляции;
- отсутствие эякуляции;
- слабость.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- повышение аппетита;
- увеличение массы тела;
- агрессия;
- деперсонализация (психическое расстройство, которое характеризуется чувством разделения или отчуждения самого себя от собственного тела или окружающего мира);
- галлюцинации;
- мания;
- обморок;
- мидриаз;
- брадикардия (состояние, при котором частота сердечных сокращений опускается ниже 60 ударов в минуту у взрослого человека в состоянии покоя);
- тахикардия (состояние, при котором частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту в состоянии покоя);
- алопеция (патологическое выпадение волос, которое приводит к их частичному или полному исчезновению на определенных участках волосистой части головы или тела);
- сыпь;
- пурпура (симптом, который проявляется в виде мелкопятнистых капиллярных кровоизлияний в кожу, под кожу или в слизистые оболочки);
- фотосенсибилизация (повышенная чувствительность организма, в частности кожи и слизистых оболочек, к воздействию ультрафиолетового излучения);
- задержка мочи;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- меноррагия (обильное менструальное кровотечение) у женщин;
- отеки.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- гипонатриемия (снижение уровня натрия в крови);
- большие судорожные припадки;
- дискинезия;
- нарушение вкусовых ощущений;
- кровотечения;
- гепатит;
- гипертермия (патологическое повышение температуры тела выше индивидуальной физиологической нормы).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов в крови);
- повышенная чувствительность;
- недостаточная секреция антидиуретического гормона;
- гиперпролактинемия (избыточное содержание гормона пролактина в крови);
- гипокалиемия (снижение уровня калия в крови);
- панические атаки;
- бруксизм (непроизвольное сжимание челюстей и трение зубных рядов, которое не связано с приёмом пищи);
- беспокойство;
- суицидальные мысли;
- суицидальное поведение;
- нарушения зрения;
- судорожные расстройства;
- экстрапирамидные расстройства (нарушения движений);
- акатизия (клинический синдром, который проявляется непреодолимым внутренним побуждением к движению, неусидчивостью, неспособностью долго находиться в покое);
- двигательные расстройства;
- удлинение интервала QT на электрокардиограмме;
- желудочковая аритмия, в том числе по типу «пируэт» (torsade de pointes);
- ортостатическая гипотензия;
- носовое кровотечение;
- желудочно-кишечное кровотечение (в том числе ректальное кровотечение);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- нарушение функциональных показателей печени;
- экхимоз (кровоизлияние в кожу или слизистую оболочку диаметром более 3 мм);
- ангионевротические отеки;
- галакторея (выделение молока или молокообразной жидкости из молочных желёз вне периода беременности и грудного вскармливания);
- метроррагия (патологическое маточное кровотечение) у женщин;
- послеродовое кровотечение у женщин;
- приапизм (болезненная, продолжительная эрекция) у мужчин.

Исследования с участием пациентов в возрасте 50 лет и старше показали существование повышенного риска костных переломов у пациентов, принимающих СИОЗС и трициклические антидепрессанты.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленные на территории государства-члена Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, дом 4, строение 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата ЦИТАЛОПРАМ

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пачке картонной. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат ЦИТАЛОПРАМ содержит

Действующим веществом является циталопрам.

ЦИТАЛОПРАМ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг

Каждая таблетка содержит 10 мг циталопрама (в виде циталопрама гидробромида).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат, натрия крахмал гликолят (тип А), повидон К-25, глицерол (глицерин) 85 %; *состав оболочки:* гипромеллоза, титана диоксид (Е171), макрогол 400, диметикон 100.

ЦИТАЛОПРАМ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг

Каждая таблетка содержит 20 мг циталопрама (в виде циталопрама гидробромида).

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат, натрия крахмал гликолят (тип А), повидон К-25, глицерол (глицерин) 85 %; *состав оболочки:* гипромеллоза, титана диоксид (Е171), макрогол 400, диметикон 100, краситель железа оксид желтый (Е172).

ЦИТАЛОПРАМ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг

Каждая таблетка содержит 40 мг циталопрама (в виде циталопрама гидробромида).

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат, натрия крахмал гликолят (тип А), повидон К-25, глицерол (глицерин) 85 %; *состав оболочки:* гипромеллоза, титана диоксид (Е171), макрогол 400, диметикон 100.

Внешний вид препарата ЦИТАЛОПРАМ и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

ЦИТАЛОПРАМ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг

Таблетки 10 мг – круглые, двояковыпуклые, без риски, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На поперечном разрезе таблетка белого или почти белого цвета.

ЦИТАЛОПРАМ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг

Таблетки 20 мг – круглые, двояковыпуклые, без риски, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета. На поперечном разрезе видны два слоя, внутренний слой белого или почти белого цвета.

ЦИТАЛОПРАМ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг

Таблетки 40 мг – круглые, двояковыпуклые, с риской, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На поперечном разрезе таблетка белого или почти белого цвета.

Линия разлома (риска) предназначена исключительно для разламывания таблетки с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

ООО «ПРАНАФАРМ»

443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 106, корпус 81

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2026 № 17908
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

тел. (846) 334-52-32, 207-12-61

факс (846) 335-15-61, 207-41-62

e-mail: info@pranapharm.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «ПРАНАФАРМ»

443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 106, корпус 81

тел. (846) 334-52-32, 207-12-61

факс (846) 335-15-61, 207-41-62

e-mail: info@pranapharm.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru

(https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).