

Clase práctica virtual - 16/04/2020

Discusión sobre resolución de sistema de ecuaciones.

Problema 1. Determinar el conjunto de soluciones $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ del sistema lineal homogéneo:

$$\begin{cases} x - z + 2t = 0 \\ -x + 2y - z + 2t = 0 \\ -x + y = 0. \end{cases}$$

Solución. Primero armamos la matriz asociada:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La reducimos por filas haciendo las operaciones $F2 + F1$, $F3 + F1$, $F2 \leftrightarrow F3$, $F3 - 2 F2$. Obtenemos una MERF:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

El sistema original es equivalente al sistema asociado a esta MERF:

$$\begin{cases} x - z + 2t = 0 \\ y - z + 2t = 0 \end{cases}$$

Las variables dependientes corresponden a las columnas de los pivotes : x, y Las demás, z, t, son las variables independientes.

Las soluciones las encontramos despejando del sistema asociado a la MERF las variables dependientes en función de las independientes:

$$\begin{aligned} x &= z - 2t \\ y &= z - 2t. \end{aligned}$$

$$z, t \in \mathbb{R}.$$

Es decir que un vector de \mathbb{R}^4 es solución del sistema si y sólo si es de la forma $(z-2t, z-2t, z, t)$, con $z, t \in \mathbb{R}$.

Respuesta del ejercicio: El conjunto de soluciones es

$$\{(z - 2t, z - 2t, z, t) : z, t \in \mathbb{R}\}.$$

Pasos para resolver el ejercicio:

- Formo la matriz ampliada del sistema.
- Opero con las filas hasta llegar a una MERF.
- Despejo las variables dependientes (correspondientes a las columnas de los pivotes) en función de las independientes.
- Escribo la solución del sistema, haciendo que las variables independientes recorran el conjunto de todos los escalares.

Problema 2. Sea A la matriz 3×4 definida por

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dar una descripción implícita del conjunto de vectores (b_1, b_2, b_3) para los cuales el sistema

$$AX = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \text{ tiene solución.}$$

Nota: aquí no se pide resolver el sistema.

Formo la matriz ampliada del sistema en cuestión:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & | & b_1 \\ -1 & 2 & -1 & 2 & | & b_2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & | & b_3 \end{bmatrix}$$

Reducimos por filas hasta llegar en el lado izquierdo a una MERF: $F_2 + F_1$, $F_3 + F_1$, $F_2 - F_3$, $F_3 - 2F_2$

$$(1) \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & | & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & | & b_1 + b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & b_1 + b_2 - 2(b_1 + b_3) = -b_1 + b_2 - 2b_3 \end{bmatrix}$$

Notamos que el sistema $AX = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ es equivalente al sistema cuya matriz ampliada es (1):

$$\begin{cases} x - z + 2t = b_1 \\ y - z + 2t = b_1 + b_3 \\ 0 = 0x + 0y + 0z + 0t = -b_1 + b_2 - 2b_3 \end{cases}$$

Por lo tanto la respuesta es:

El sistema tiene solución si y sólo si

$$-b_1 + b_2 - 2b_3 = 0$$

Esto da una descripción implícita de los vectores (b_1, b_2, b_3) que se pedía.

Ejercicio 7) de la guía 3).

La traza de una matriz cuadrada $A = (A_{ij})$ es la suma de los coeficientes diagonales de la matriz:

$$\text{Tr}(A) = A_{11} + A_{22} + \cdots + A_{nn}.$$

Para la parte a), con A, B y C del ejercicio 1:

$$\text{Tr}(A) = 1 + (-2) + (-1) = -2, \quad \text{Tr}(B) = 6, \quad \text{Tr}(C) = 2.$$

Parte b): *Probar que $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.*

Por definición del producto de matrices:

$$(2) \quad (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj},$$

$$(3) \quad (BA)_{ij} = \sum_{k=1}^n B_{ik} A_{kj}.$$

Ahora:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n (AB)_{ii} \quad (\text{Por (2)}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{ki}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tr}(BA) &= \sum_{i=1}^n (BA)_{ii} \quad (\text{Por (3)}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n B_{ik} A_{ki}. \end{aligned}$$

Haciendo el cambio de índices entre $i \leftrightarrow k$:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(BA) &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n B_{ki} A_{ik} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{ki} \quad (\text{comparando con lo anterior}) \\ &= \text{Tr}(AB). \end{aligned}$$

Ejercicio 5) de la guía 3. A matriz $m \times n$, B, C matrices $n \times p$.

Por lo tanto están definidos los productos AB , AC y $A(B + C)$ y son matrices $m \times p$.

Tenemos que probar una igualdad entre matrices: $A(B + C) = AB + AC$.

Para que dos matrices sean iguales es necesario y suficiente que cada uno de sus coeficientes sean iguales.

Comparamos los coeficientes de ambas matrices $A(B + C)$ y $AB + AC$:

Sean $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq p$ (porque las matrices que queremos comparar son $m \times p$).

Por definición del producto de matrices:

$$(A.(B + C))_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} (B + C)_{kj}.$$

Ahora por definición de la suma de matrices,

$$(B + C)_{kj} = B_{kj} + C_{kj}.$$

Luego

$$\begin{aligned}(A.(B+C))_{ij} &= \sum_{k=1}^n A_{ik}(B_{kj} + C_{kj}) \quad (\text{distributividad del producto en } \mathbb{R}) \\&= \sum_{k=1}^n (A_{ik}B_{kj} + A_{ik}C_{kj}) \quad (\text{propiedades de la suma de números reales}) \\&= \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj} + \sum_{k=1}^n A_{ik}C_{kj} \quad (\text{por definición del producto de las matrices } AB \text{ y } BC) \\&= (AB)_{ij} + (AC)_{ij} \quad (\text{por definición de la suma de matrices } AB \text{ y } AC) \\&= (AC + BC)_{ij}.\end{aligned}$$

Hasta ahora hemos probado que

$$(A.(B+C))_{ij} = (AC + BC)_{ij}, \quad \forall i, j.$$

Por lo tanto, como todos sus coeficientes son iguales, las matrices son iguales, es decir: $A(B+C) = AB + AC$, como se pedía.

Ejercicio 20) a) de la guía 3.

Sugerencia: si tomamos $B = A^2, A^3, \dots$ (una potencia de A), entonces $AB = BA$ [toda matriz conmuta con sus potencias].

Ejemplo: tomemos como A la siguiente matriz 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Sea $B = A^2$:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Entonces $AB = BA$, pues B es una potencia de A .

Pero: ni A ni B son diagonales, ni tampoco ninguna de ellas es múltiplo escalar de la otra.

Por lo tanto la afirmación en 20) a) es **falsa**.

Ejercicio 20) b) de la guía 3. A : matriz 3×2 , B : matriz 2×3 . De donde AB : matriz 3×3 .

Tiene sentido preguntarse si AB es o no inversible.

Recordemos que una matriz cuadrada C es inversible si y sólo si el sistema homogéneo $CX = 0$ admite sólo la solución trivial $X = 0$.

Notar en este caso, que como B es 2×3 , el sistema homogéneo $BX = 0$ tiene más incógnitas (3) que ecuaciones (2).

Por lo tanto existe una solución no trivial $X_0 \neq 0$ del sistema $BX = 0$.

Notar que X_0 también es solución de $(AB)X = 0$, pues

$$(AB)X_0 = A(BX_0) = A \cdot 0 = 0$$

Como $X_0 \neq 0$, el sistema $(AB)X = 0$ tiene solución no trivial.

Por lo tanto matriz producto AB no puede ser inversible nunca y entonces la afirmación 20) b) es **falsa**.

Ejercicio 15) b).

Ayuda: A es de la forma

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Aquí: $\text{Tr}(A) = a + d = 0$.

A^2 es la matriz

$$\begin{bmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + dc & cb + d^2 \end{bmatrix}$$

Aquí: $\text{Tr}(A^2) = a^2 + bc + cb + d^2 = 0$.