▶ 2. Los datos provienen de un estudio del área de la salud. Las categorías registradas fueron:

O	O	N	\mathbf{J}	\mathbf{T}	\mathbf{F}	\mathbf{B}	\mathbf{B}	\mathbf{F}	O	\mathbf{J}	O	O	\mathbf{M}
O	\mathbf{F}	\mathbf{F}	O	O	N	O	\mathbf{N}	J	\mathbf{F}	\mathbf{J}	$_{\mathrm{B}}$	O	\mathbf{T}
J	O	\mathbf{J}	J	\mathbf{F}	N	O	\mathbf{B}	\mathbf{M}	O	\mathbf{J}	\mathbf{M}	O	В
O	\mathbf{F}	J	O	O	В	N	\mathbf{T}	O	O	O	\mathbf{M}	\mathbf{B}	\mathbf{F}

donde: J=articulación hinchada, F=fatiga, B=dolor de espalda, M=debilidad muscular, T=tos, N=nariz con flujo o irritación, O=otro. Obtenga las frecuencias absolutas y relativas para las distintas categorías y realice un gráfico para estos datos.

Categoría	FA	R
٦	9	9/56 ≈ 0.16
F	8	8/56 ≈ 0.14
В	7	⁷ /56 = 0.125
М	4	4/56 ≈ 0.07
T	3	3/56 ≈ 0.05
Ŋ	5	5/56 ≈ 0.09
0	zo	20/56 ≈ 0.36



