

Nombre: TOMÁS ACHAVARRA BEZERRA

A. 45085746

6,60

Hojas entregadas: 3

TEMA B

Primer parcial de Matemática Discreta II-26 de abril de 2024.

Escriba su nombre EN CADA HOJA y numere cada hoja de la forma n/N donde n es el número de la hoja y N el número total de hojas que entrega (sin contar esta).

1): (3,5 puntos) En el siguiente network, x es igual a la cifra de las unidades de su DNI. Hallar un flujo maximal en el, usando Dinitz en cualquiera de sus versiones. Dar también un corte minimal y mostrar que el valor del flujo maximal es igual a la capacidad del corte minimal.

(si ud. no aprendió Dinitz, puede hacerlo usando Edmonds-Karp, pero a) va a demorar mas y b) tiene un punto de descuento, es decir el ejercicio vale 2,5 puntos en ese caso).

$sA : 71 + x$

$sB : 100$

$sC : 100$

$sE : 70$

$sP : 11 + x$

$AI : 100$

$AM : 71$

$BH : 100$

$CD : 100$

$DM : 71 + x$

$EF : 70$

$EG : 71$

$Ft : 70$

$GN : 100$

$Ht : x$

$HJ : 100$

$It : x$

$IF : 100$

$JK : 100$

$KI : 10$

$KL : 100$

$LI : 100$

$Mt : 82 + x$

$Nt : 100$

$PM : 100$

$PQ : 100$

$QR : 100$

$RU : 100$

$UX : 100$

$XY : 100$

$Yt : 100$

2):

a) (2,5 puntos) A partir del siguiente network y comenzando con el flujo 0, construir el primer NA y hallar un flujo bloqueante en el usando WAVE.

b) (0,5 puntos) Luego de haber hecho a), a partir del flujo obtenido, continuar con Edmonds-Karp hasta hallar un flujo maximal y un corte minimal en el network. (nota: ud debe hacer la parte a) para poder hacer la parte b). Si Ud. hace la parte a) usando un algoritmo distinto a Wave, el ejercicio entero vale 0 puntos).

$sA : 15$

$BC : 10$

$sB : 10$

$BD : 5$

$AC : 15$

$CE : 20$

$AD : 5$

$CF : 9$

$DE : 10$

$DG : 9$

$Et : 9$

$Ft : 8$

$Gt : 7$

3): (3,5 puntos) Dado un grafo G con vertices $\{v_1, \dots, v_n\}$, sean x_1, \dots, x_n, z vértices que no estén en G y sea H el grafo con vértices $\{v_1, \dots, v_n, x_1, \dots, x_n, z\}$ y lados:

$$E(H) = E(G) \cup \{x_i v_j : v_i v_j \in E(G)\} \cup \{x_i z : i = 1, \dots, n\}$$

Probar que $\chi(H) = \chi(G) + 1$.

Nota: es casi obvio que $\chi(H) \leq \chi(G) + 1$ así que probar unicamente esta desigualdad vale solo 0,1 puntos.

(ayuda: una forma de hacerlo es suponer por contradicción que $\chi(H) = \chi(G)$ y usar el coloreo de H para crear un coloreo de G con $\chi(G) - 1$ colores. Nota: el coloreo de H no va a dar automáticamente un coloreo de G con $\chi(G) - 1$ colores. Dado el coloreo de H , que en particular colorea a G como subgrafo, hay que cambiar inteligentemente este ultimo coloreo para que queden $\chi(G) - 1$ colores).

TOMÁS ACHAUM BENKERO

45083746 A.

EJERCICIO N°1 (X=6)

DINITE NA1

SA 77 → 71 → 0

SB 100 → 94 → 84

SC 100 → 90 → 23

SE 70 → 0

SP 17 → 0

AI 100 → 94 → 34

AM 71 → 0 → 60

BH 100 → 94 → 84

CD 100 → 90 → 23

DM 77 → 71 → 0

EF 70 → 0 → 10 → 0

EG 71 → 61 → 1

> Ft 70 → 0

GN 100 → 90 → 30

> Ht 6 → 0

HJ 100 → 90

> It 6 → 0

IF 100 → 90 → 30

JK 100 → 90

KI 90 → 0

KL 100

LI 100

> Mt 88 → 77 → 0

> Nt 100 → 90 → 30


PM 100 → 83 → 100

PQ 100 → 83

QR 100 → 83

RU 100 → 83

UX 100 → 83



CAMINOS DFA

SAIt: 6

SAMt: 71


SBHt: 6

SEft: 70

SPMt: 77 ✓

FIN NA1 (FLUJO BLOQUEANTE)

NA2




CAMINOS: SBHJKIFEENt: 10

SCDMAIFEENt: 60

SCDMPQRUXYt: 77 ✓

FIN NA2 (FLUJO BLOQUEANTE)

NA3



NO LLEGA A t

CONST S = {S, B, C, H, D, J, K, L, I, A, F, M}

$$CAP(S) = c(S) + c(SP) + c(Ht) + c(It) + c(Ft) + c(Mt)$$

$$= 70 + 77 + 6 + 6 + 70 + 88 = 257 ✓$$

$$V(f) = OUT_f(S) - IN_f(S) = OUT_f(S) = 77 + 76 + 77 + 70 + 77$$

$$= 257 ✓$$

$$CAP(S) = 257 = V(f) \quad (f \text{ es MAXIMAL})$$

EL VALOR DEL FLUJO EN CADA UNO ESTÁ DADO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMER Y ÚLTIMO VALOR DE LA LISTA. ✓

Por ejemplo: $[GN: 100 \rightarrow 90 \rightarrow 30] \Rightarrow f(GN) = 100 - 30 = 70$

NOTA

2.5 0.5

HOJA N° 2/3

FECHA

Ejercicio N°2

NA de WAVE

BLOQUEADOS = ☐

Tomas ACHAQUE Berken

45085746 A.

SA 15 → 3 → 1							
SB 10 → 0	S	A B	C D	E F G	t		
AC 15 → 0 → 8 → 6	-25	15 10	15	20 5	9		
AD 5 → 0		0 0	25	11 0	14	OLA	→
BC 10 → 0 → 2			5				
BD 5 → 3			11	10		OLA	←
CE 20 → 0 → 11			7	4	17	OLA	→
CF 9 → 4 → 0 → 1				1			
DE 10		8	10	10		OLA	←
DG 9 → 4 → 2		3	5	5	22	OLA	→
Et 9 → 0			0	0			
Ft 8 → 3 → 0	-22	10				OLA	←
Gt 7 → 2 → 0							

FIN NA1 de WAVE, TODOS LOS VERTICES ESTÁN BLOQUEADOS (ES FLUJO BLOQUEANTE)

CONTINUO CON E-K

1ª CAMINO $S \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow t \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow B$ $\rightarrow S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow t: 2$

2ª CAMINO $S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow G$ NO LLEGA A t
 $S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$

$$CONST S = \{S, A, C, B, E, F, D, G\}$$

$$CAP(S) = C(Et) + C(Ft) + C(Gt)$$

$$= 9 + 8 + 7 = 24$$

$$CAP(S) = U(S) \text{ (ES MAXIMO)}$$

$$V(F) = OUT_F(S) - IN_F(S) = 24 + 10 = 24$$

DES EL VALOR DEL FLUJO EN CADA LADO ESTÁ DADO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMER Y ÚLTIMO VALOR DE LA LISTA PARA ESTE LADO.

$$Ej: [CF 9 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 1] \Rightarrow f(CF) = 9 - 1 = 8$$

TOMÁS ACHAVAL BARRERO

M5083746 Φ .EJERCICIO N° 3GRUPO G con vértices v_1, \dots, v_n x_1, \dots, x_n, z VÉRTICES QUE NO ESTÁN EN G .GRUPO H con vértices $v_1, \dots, v_n, x_1, \dots, x_n, z$ y LAOS

$$E(H) = E(G) \cup \{x_i v_j : v_i v_j \in E(G)\} \cup \{x_i z : i = 1, \dots, n\}$$

PROBAM QUE $\chi(H) = \chi(G) + 1$ SEA $\chi(G) = r$, SABEMOS QUE EXISTE UN COLORADO PROPIO DE G CON r COLORES, LO LLAMO C_G OBS: Si EXISTE UN COLORADO PROPIO DE H CON N COLORES $\Rightarrow \chi(H) \leq N$ EL SIGUIENTE ES UN COLORADO PROPIO DE H CON $r+1$ COLORES $\{1, \dots, r, r+1\}$

$$C_H(v_i) = C_G(v_i) \quad v_i = 1, \dots, n \quad \left. \vphantom{C_H(v_i) = C_G(v_i)} \right\} \text{ ES PROPIO PUES VIENE DE } C_G$$

$$C_H(x_i) = r+1 \quad v_i = 1, \dots, n \quad \left. \vphantom{C_H(x_i) = r+1} \right\} \text{ SIGUE SIENDO PROPIO PUES NO EXISTEN LAOS } x_i x_j \text{ Y } r+1 \neq C_H(v_i) \forall i$$

$$C_H(z) = 1 \quad \left. \vphantom{C_H(z) = 1} \right\} \text{ SIGUE SIENDO PROPIO PUES EL ÚNICO VÉRTICE COLORADO CON 1 (OLOS) SE ENCUENTRA EN LAS } v_i, \text{ Y ESTOS NO FORMAN LAOS CON } z.$$

POR LO TANTO $\chi(H) \leq r+1 = \chi(G) + 1$ EN LA SIGUIENTE PÁGINA MUESTRO QUE $\chi(H) \geq \chi(G) + 1$, PARA FINALMENTE CONCLUIR QUE $\chi(H) = \chi(G) + 1$ A PARTIR DEL RESULTADO ANTERIOR Y ESTE.

RECORDAMOS QUE C_G ES UN COLORADO PROPIO DE G CON $r = \chi(G)$ COLORES, Y QUE ESTE VALOR ES EL MÍNIMO POSIBLE. LLAMAMOS A ESTOS COLORES $\{1, -, r\}$

INTENTARE COLORAR H CON r COLORES (Y QUE SEA PROPIO).

INICIALMENTE, COLORO LOS VÉRTICES v_i DE ACUERDO A C_G , PUES ES LA MENOR CANTIDAD DE COLORES QUE PUEDO UTILIZAR.

~~Hay hipótesis de generalidad~~

SEAN v_k LOS VÉRTICES CON $C(v_k) = r$. SI TIENEN ESTE COLOR ES PORQUE TIENEN AL MENOS UN VECINO CON CADA COLOR $1, -, r-1$, PUES DE OTRA FORMA EXISTIRÍA UN COLORADO PROPIO CON MENOS DE r COLORES. *solo si usas greedy*

COMO TODOS LOS VECINOS DE v_k ESTÁN CONECTADOS A x_k , $C(x_k) = r$.

SEAN v_{k+1} LOS VÉRTICES CON $C(v_{k+1}) = r-1$. DE MANERA SIMILAR, TODOS SUS VECINOS UTILIZAN LOS COLORES

$\{1, -, r-2\} \cup \{r\}$ (SI NO, PODRÍA USAR UNO DE ESOS COLORES EN G Y OBTENER UN COL. PROPIO CON MENOS DE r COLORES)

Y ESTÁN CONECTADOS A x_{k+1} , POR LO TANTO $C(x_{k+1}) = r-1$

CONTINUAMOS DE LA MISMA FORMA CON LOS COLORES $r-2, -1$

$v_{k+2}, \dots, v_{k+r-1}$, CUYOS VECINOS UTILIZAN LOS COLORES $\{1, -, r-k-1\} \cup \{r-k+1, -, r\}$

DE ESTA FORMA, EXISTEN $x_{k+1}, \dots, x_{k+r-1}$ QUE UTILIZAN LOS r COLORES DE C_G

COMO z ESTÁ CONECTADO A TODOS ELLOS, $C(z) \neq 1, -, r$ Y NECESITA UN NUEVO COLOR.

CONCLUIROS EN LA PRIMERA PÁGINA QUE $\chi(H) \leq \chi(G) + 1$

Y AQUÍ QUE $\chi(H) \geq \chi(G) + 1$, PUES NO PUEDE UTILIZAR $\chi(G)$ COLORES.

POR AMBAS CONCLUSIONES, $\chi(H) = \chi(G) + 1$

X