



EVENTOS ADVERSOS

Manifestações Sistêmicas - VOP

Poliomielite associada à vacina: Quando o vírus vacinal desenvolve poliomyelite no vacinado ou em pessoas que convive com ele.

Geralmente ocorre de 4 a 40 dias após a vacinação. Os Sintomas iniciam com febre, dificuldade de movimentação, dor e fraqueza dos músculos, especialmente nas pernas, podendo atingir os músculos da respiração. Após alguns dias, a dor diminui, melhora também a dificuldade de movimentação, porém os músculos atrofiam e a amolecer.^(4,8)





Meningite asséptica e encefalite:

Pode ocorrer perda da consciência, da orientação espacial ou a sensibilidade e sintomas de irritação do cérebro (crises convulsivas).

Reações alérgicas: raras.

Urticária e erupções na pele com coceira pode ocorrer mas não contraindicam doses subsequentes.

Poliomielite por vírus derivado da vacina (VDPV): Pode ocorrer por uma instabilidade genética do vírus da vacinal ou pela combinação do vírus vacinal com outros vírus que vivem no intestino, ocasionando o surgimento de vírus mutantes capazes de causar poliomielite e pode ser transmitidos para outras pessoas.^(4,8)





VIP – Apresentação inativada da vacina Poliomielite.

Manifestações locais : eritema, endurecimento e dor.

Manifestações Sistêmicas: febre e anafilaxia são raras.

Anafilaxia, com risco maior para pessoas que têm alergia grave aos antibióticos que podem estar contidos na vacina (estreptomicina, neomicina e polimixina B).^(4,8)



CONDUTA

Notifique todos eventos graves/ raros ou inesperados.

