



## EVENTOS ADVERSOS

### Local

Inchaço, vermelhidão e dor. Inchaço extenso, pode atingir todo o membro (melhora espontânea em até em dois dias). Abscesso no local , estéril (abscesso frio) ou infeccioso (abscesso quente) neste caso sugere contaminação e deve ser notificado como EI.<sup>(4,8)</sup>

### Sistêmico

Febre, sonolência (24 até 72 horas após vacinação), inapetência, vômitos, choro persistente, Episódio hipotônico-hiporresponsivo (EHH) (nas primeiras 48 horas- bom prognóstico, iniciando com irritabilidade, febre, palidez, perda do tônus muscular e a consciência. Esse quadro pode durar desde alguns minutos até algumas horas, melhora sem deixar sequelas). Convulsão (primeiras 72 horas), encefalopatia, reações de hipersensibilidade (urticária e anafilaxia-rara).<sup>(4,8)</sup>





## CONDUTA

Aplique compressas frias para alívio da dor, analgésico com indicação médica para os casos de dor mais intensa.

Notifique: febre alta (Maior ou igual a 39,5º), abscessos frio ou quente, sonolência, choro persistente, EHH, convulsão, encefalopatia, anafilaxia, reações muito intensa ou inesperada.<sup>(4)</sup>

