



## EVENTOS ADVERSOS

- ✓ Geralmente nas primeiras 48 a 72 horas, sendo o componente *pertussis* o principal responsável.<sup>(8)</sup>
- ✓ Manifestações locais são comuns;
- ✓ Podem limitar transitoriamente a movimentação do membro;
- ✓ Os adjuvantes, em especial contendo alumínio, causam ação irritativa no local da aplicação.<sup>(4)</sup>





### Manifestações locais:

- ✓ Edema
- ✓ Hiperemia
- ✓ Dor
- ✓ Endurecimento
- ✓ Nódulo indolor no local da injeção<sup>(4)</sup>



### Abscesso no local da aplicação:

- ✓ **Frio**- (estéril) indica inoculação subcutânea inadvertida da vacina.
- ✓ **Quente**- (contendo pus) indica infecção bacteriana secundária.
- ✓ Os eventos adversos locais tem **prognóstico benigno**, com cura espontânea na maioria dos casos.<sup>(4)</sup>



### CONDUTA

Notifique Abscessos frio ou quente e reações locais muito intensa. Use compressas frias para alívio da dor e analgésicos, conforme indicação médica.<sup>(8)</sup>





### Manifestações Sistêmicas:

- ✓ Pode ocorrer nas primeiras 24 horas: **choro persistente, anorexia, vômitos e sonolência.**
- ✓ **Irritabilidade** pode ocorrer na primeira hora.
- ✓ Choro persistente é mais comum na primeira dose e a sonolência pode persistir por até 72h.<sup>(4)</sup>



### CONDUTA

Notifique casos persistentes: **sonolência, choro, anorexia e vômitos.**<sup>(4)</sup>





## Episódio hipotônico-hiporresponsivo (EHH)

- ✓ Ocorre nas primeiras 48h;
- ✓ É mais comum nas primeiras 6h;
- ✓ Geralmente é precedido de irritabilidade e febre;
- ✓ Dura alguns minutos ou horas;
- ✓ Geralmente é transitório e autolimitado;
- ✓ Bom prognóstico.<sup>(4)</sup>



### CONDUTA

Notifique todos casos de EHH.<sup>(4)</sup>





A **convulsão** pode ocorrer nas primeiras 72h, com prognóstico benigno.<sup>(4)</sup>



**Febre baixa a moderada** - geralmente na primeira dose e nas primeiras 24 horas.

**Febre alta** ( $\geq 39,5^{\circ}\text{C}$ ) - com mais de 24 horas duração ou que se inicia após as primeiras 24 horas da vacinação, devem ser avaliadas para verificar possibilidade de outras infecção não relacionada à vacina.



### CONDUTA

Notifique todos os casos convulsão.<sup>(4)</sup>



### CONDUTA

Notifique todos casos de febre alta.<sup>(4)</sup>





**Reações alérgicas cutâneas** frequentes e não contra indicam doses posteriores.

**Apneia** ocorre especialmente nos **prematturos extremos** geralmente evento benigno.



### CONDUTA

Investigue e notifique todos casos.<sup>(4)</sup>



### ATENÇÃO

Qualquer sintoma grave e/ou inesperado após a vacinação deve ser notificado.

EAPV persistentes, que se prolongam por mais de 24-72 horas (dependendo do sintoma), devem ser investigados para verificação de outras causas.<sup>(4)</sup>

