解答・解説

第 3 単元　DNA と複製・細胞周期　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5
配点	3	3	4	3	4
正解	⑤	①	③	④	②
分類	A	A	C	B	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。


解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

操作 1　根を，酢酸とエタノールの混合液に浸す。
操作 2　約 60 ℃に温めた希塩酸に数分間浸した後，水で洗う。
操作 3　スライドガラスにのせて，酢酸オルセイン溶液を 1 滴落とす。

問 1　操作 1〜3 の主な目的は，次の**ア**〜**ウ**のどれか。操作 1〜3 の目的の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

ア　細胞どうしを離れやすくする。
イ　核や染色体を染めて見やすくする。
ウ　細胞の活動を止め，生きていたときに近い状態で細胞の構造を保つ。

	操作 1	操作 2	操作 3
①	ア	イ	ウ
②	ア	ウ	イ
③	イ	ア	ウ
④	イ	ウ	ア
⑤	ウ	ア	イ
⑥	ウ	イ	ア

分類 A　**知識必須**

正解　⑤

必要な知識
体細胞分裂の観察
体細胞分裂の観察では，固定（酢酸とエタノールの混合液）→解離（温めた希塩酸）→染色（酢酸オルセイン溶液など）→押しつぶしの順に操作する。

知識の整理：体細胞分裂の観察

【図表で整理】体細胞分裂の観察の操作と目的

操作	用いるもの	目的
固定	酢酸とエタノールの混合液	細胞の活動を止め，構造を保つ
解離	約 60 ℃の希塩酸	細胞どうしを離れやすくする
染色	酢酸オルセイン溶液など	核や染色体を染める
押しつぶし	カバーガラスの上から押す	細胞を重ならないように広げる

あわせて覚える　観察には，細胞分裂が盛んな根の先端部を用いる。染色液には，酢酸オルセイン溶液のほかに酢酸カーミン溶液も使われる。

解説　操作 1 は固定でウ，操作 2 は解離でア，操作 3 は染色でイにあたる。よって，ウ・ア・イの⑤が正しい。

他の選択肢について

① 操作 1 を解離，操作 2 を染色，操作 3 を固定と取り違えている。
② 操作 3（染色）は合っているが，操作 1 を解離，操作 2 を固定と取り違えている。
③ 操作 2（解離）は合っているが，操作 1 を染色，操作 3 を固定と取り違えている。
④ 操作 1 を染色，操作 2 を固定，操作 3 を解離と取り違えている。
⑥ 操作 1（固定）は合っているが，操作 2 を染色，操作 3 を解離と取り違えている。

問 2

〔リード文 A より〕

……体細胞分裂を行う細胞では，細胞周期(a) とよばれる周期が繰り返され，細胞周期は間期と分裂期からなる。

問 2 下線部 (a) に関連して，体細胞分裂を行う細胞の細胞周期について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 中期には，凝縮した染色体が細胞の中央の面（赤道面）に並ぶ。
② 間期の細胞では，染色体が太く短く凝縮しており，光学顕微鏡で観察しやすい。
③ DNA の複製は，前期に，染色体が凝縮しながら行われる。
④ 後期には，核膜が再び現れて，二つの核ができる。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
体細胞分裂の過程
DNA は間期に複製される。分裂期は前期・中期・後期・終期に分けられ，中期に染色体が赤道面に並び，後期に両極へ分かれる。

知識の整理：体細胞分裂の過程

【図表で整理】体細胞分裂の各時期のようす

時期	染色体と核のようす
間期	染色体は細い糸状で核全体に広がり，この間に DNA が複製される
前期	染色体が凝縮して太く短くなり，核膜が消える
中期	染色体が赤道面に並ぶ
後期	染色体が分かれて両極へ移動する
終期	核膜が現れて二つの核ができ，細胞質が分かれる

あわせて覚える　植物細胞では終期に細胞板ができて細胞質が分かれ，動物細胞では細胞膜が外側からくびれて細胞質が分かれる。

解説　中期には，凝縮した染色体が赤道面に並ぶ。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 間期の染色体は細い糸状で核全体に広がっており，太く短く凝縮するのは分裂期である。
③ DNA の複製は間期に行われる。前期には，すでに複製された染色体が凝縮する。
④ 核膜が再び現れて二つの核ができるのは終期である。後期には，染色体が分かれて両極へ移動する。

問 3

〔リード文 A より〕

……なお，植物 Y の根の先端部の細胞の細胞周期は[2]20 時間であり，ある時期の細胞の数の割合は，[2]その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

[3]表 1　時期ごとの細胞の数

時期	間期	前期	中期	後期	終期	合計
細胞の数	340	30	12	8	10	400

問 3　表 1 とリード文の条件から，植物 Y の根の先端部の細胞が[1]中期に要する時間を求めると[1]何分になるか。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

① 24 分　② 30 分　③ 36 分
④ 90 分　⑤ 180 分　⑥ 1020 分

分類 C 知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
必要な数値と，細胞の数と時間の関係は，表 1 とリード文にある。
関連する教科書の項目：細胞周期と各時期の長さ

着眼点
[1] **設問文**　「中期」の時間を「何分」で答える。
[2] **リード文**　「20 時間」。数の割合＝時間の割合。
[3] **表 1**　中期「12」，合計「400」。

考え方

手順 1　中期の細胞の割合は，$12 \div 400 = 0.03$（3%）である。
手順 2　中期に要する時間は細胞周期 20 時間の 3% なので，$20 \times 0.03 = 0.6$ 時間である。
手順 3　答えは分で求めるので，$0.6 \times 60 = 36$ 分に換算する。計算の最後に，答えの単位を問題文と照らし合わせる。

解説　中期の細胞の割合は 3% なので，中期に要する時間は $20 \times 0.03 = 0.6$ 時間，すなわち 36 分である。よって③が正しい。


他の選択肢について

① 24 分は，後期の細胞 8 個で計算した値（後期に要する時間）である。
② 30 分は，終期の細胞 10 個で計算した値（終期に要する時間）である。
④ 90 分は，前期の細胞 30 個で計算した値（前期に要する時間）である。
⑤ 180 分は，前期から終期までの細胞 60 個で計算した値（分裂期全体に要する時間）である。
⑥ 1020 分は，間期の細胞 340 個で計算した値（間期に要する時間）である。


問 4

〔リード文 B より〕

……図 1 は，各区間で観察した細胞のうち分裂期の細胞が占める割合を，図 2 は，各区間の細胞の長さ（根が伸びる方向の長さ）の平均を示したものである。



2 図 1　根の先端からの距離と，分裂期の細胞の割合



3 図 2　根の先端からの距離と，細胞の長さの平均

問 4　図 1・図 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 根の 1 先端に近い区間ほど，分裂期の細胞の割合が大きい。

② 分裂期の細胞の割合が最も大きい区間では，細胞の長さの平均も最も大きい。

③ 根の先端から 2 mm までの区間では，細胞の数が増えることよりも，細胞が長くなることが，根が伸びることに大きくはたらいている。

④ 根の先端から 3 mm より基部側の区間では，細胞の数が増えることよりも，細胞が長くなることが，根が伸びることに大きくはたらいている。

分類 B　知識があると速い

正解　④

必要な知識

体細胞分裂が盛んな場所

植物では，体細胞分裂が盛んに行われる場所は根や茎の先端付近などに限られる。根の先端付近でつくられた細胞は，その基部側で大きくなる。

着眼点

1 **選択肢 1**　「先端に近い区間ほど」は全体の傾向を述べた記述なので，すべての区間で成り立つかを確かめる。

2 **図 1**　区間ごとの分裂期の細胞の割合（10，15，5，2，0%）を読む。

3 **図 2**　区間ごとの細胞の長さ（20，20，50，120，150 μm）を読む。

考え方

手順 1　全体の傾向を述べた記述は，すべての区間で成り立つかを確かめる。図 1 では，分裂期の細胞の割合は 1～2 mm で最大になり，最も先端側の 0～1 mm ではそれより小さい。3 mm より基部側では 2%，0% で，分裂はほとんど起こっていない。

手順 2　図 2 では，細胞の長さは先端から 2 mm まで 20 μm のまま変わらず，2～3 mm で 50 μm，3 mm より基部側では 120 μm，150 μm と大きく長くなっている。

手順 3　根が伸びるはたらきは，同じ区間の図 1 と図 2 を合わせて考える。分裂期の細胞が多く細胞が長くならない区間では細胞の数が増えることが，分裂期の細胞がほとんどなく細胞が長くなる区間では細胞が長くなることが，大きくはたらいている。3 mm より基部側は後者にあたる。

知識があると速い点　「先端付近で分裂が盛んで，基部側で細胞が大きくなる」と知っていれば，④に見当をつけて図で確かめるだけで済む。

知識の整理：体細胞分裂が盛んな場所

【図表で整理】根の先端付近のようす

場所	ようす
根の先端付近	体細胞分裂が盛んで，小さな細胞が多い
その基部側	分裂はほとんど行われず，細胞が大きく（長く）なる

あわせて覚える　体細胞分裂の観察に根の先端部を使うのは，分裂期の細胞が多く見られるからである。

解説　3 mm より基部側では分裂期の細胞がほとんど見られない一方で，細胞の長さが大きく増えている。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 0〜1 mm の区間（10%）より 1〜2 mm の区間（15%）のほうが大きく，先端に近いほど大きいとはいえない。

② 分裂期の細胞の割合が最も大きい 1〜2 mm の区間では，細胞の長さは 20 μm で，0〜1 mm の区間と並んで最も短い。

③ 先端から 2 mm までの区間では，細胞は長くならず，分裂期の細胞が多い。この区間では，細胞の数が増えることのほうが大きくはたらいている（手順 3）。

問 5

〔リード文 A より〕


……細胞周期は[1]間期と分裂期からなる。

〔リード文 B より〕

……なお，表 1 の細胞を観察した部位は，根の先端からの距離でみると，図 1 のいずれか一つの区間にあたる。また，根の先端からの距離が同じ部位では，分裂期の細胞の割合は根によらず等しいとみなせるものとする。

[2]表 1　時期ごとの細胞の数

時期	間期	前期	中期	後期	終期	合計
細胞の数	340	30	12	8	10	400



[3]図 1　根の先端からの距離と，分裂期の細胞の割合

問 5　表 1 の細胞を観察した部位は，図 1 のどの区間にあたると考えられるか。最も適当なものを，次の ①〜⑤ のうちから一つ選べ。 **5**

① 0〜1 mm　② 1〜2 mm　③ 2〜3 mm　④ 3〜4 mm　⑤ 4〜5 mm

分類 B　知識があると速い

正解　②

必要な知識

細胞周期の構成

細胞周期は，間期（G_1 期・S 期・G_2 期）と分裂期（M 期）からなり，分裂期は前期・中期・後期・終期に分けられる。

着眼点

[1] **リード文**　細胞周期は「間期と分裂期からなる」。

[2] **表 1**　間期以外の時期（前期・中期・後期・終期）の細胞の数と，合計 400 個を読む。

[3] **図 1**　各区間の分裂期の細胞の割合を読む。

考え方

手順 1　細胞周期は間期と分裂期からなるので，表 1 の時期のうち間期以外の前期・中期・後期・終期が分裂期にあたる。

手順 2　分裂期の細胞は $30 + 12 + 8 + 10 = 60$ 個で，その割合は $60 \div 400 = 0.15$（15%）である。

手順 3　図 1 で分裂期の細胞の割合が 15% なのは 1〜2 mm の区間だけである。

知識があると速い点　「分裂期は前期・中期・後期・終期からなる」ことを知っていれば，リード文から分裂期の範囲を推論する手順を省き，すぐに 60 個を数えられる。

知識の整理：細胞周期の構成

【図表で整理】細胞周期の時期の並び（長さは一例）



あわせて覚える　多くの細胞では細胞周期の大部分を間期が占めるので，観察すると間期の細胞が最も多く見える。

問 5（つづき）

解説　表 1 の分裂期の細胞の割合は 15% で，図 1 の 1〜2 mm の区間の値と一致する。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 0〜1 mm の区間は 10% で，400 個のうち分裂期の細胞は 40 個になるはずである。
(3) 2〜3 mm の区間は 5% で，400 個のうち分裂期の細胞は 20 個になるはずである。
(4) 3〜4 mm の区間は 2% で，400 個のうち分裂期の細胞は 8 個になるはずである。
(5) 4〜5 mm の区間は 0% で，分裂期の細胞は見られないはずである。