
# Opérations algébriques II

### Activité 1.

Voici des instructions pour calculer l'aire d'un rectangle.



- On commence par demander la valeur de la longueur,
- puis celle de la largeur,
- on calcule le produit longueur × largeur, on appelle ce résultat *S*,
- on renvoie ce résultat *S* qui est l'aire voulue.
- 1. Écrire les instructions qui demandent les dimensions d'un parallélépipède rectangle et calcule son volume.

Respecte la convention suivante : les boites vertes à coins arrondis sont pour les entrées/sorties, les boites bleues rectangulaires sont pour les commandes.

- 2. Écrire les instructions pour calculer le volume d'un cube.
- 3. Même chose pour le volume d'une sphère.
- 4. Calcule le volume du parallélépipède rectangle dont les dimensions sont a, a + 1 et a + 3, où a est une dimension à demander.
- 5. Calcule le volume d'un cylindre dont la hauteur est le double du rayon de la base.

Activité 2 (Nombres flottants I). Les puissances de 10. On rappelle l'écriture des puissances de 10 et on introduit une nouvelle notation :

- $10^2 = 10 \times 10 = 100$  que l'on note aussi 1e2 (pour 1 suivi de 2 zéros),
- $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$  que l'on note aussi 1e3,
- $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$  que l'on note aussi 1e4,
- mais aussi  $10^1 = 10$ , noté 1e1,
- et  $10^0 = 1$  noté 1e0.
- $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0, 1$  noté 1e-1,  $10^{-2} = \frac{1}{100} = 0, 01$  noté 1e-2...

#### Nombre flottant.

Un nombre flottant est un nombre qui s'écrit en deux parties :

- une première partie, la mantisse, qui est un nombre avec un seul chiffre avant la virgule (ce chiffre ne doit pas être 0 sauf pour le nombre 0 lui-même),
- et une seconde partie, *l'exposant*, commençant par *e* et suivie d'un entier relatif qui correspond à l'exposant de la puissance de 10.

Le nombre flottant est le produit de la mantisse multiplié par 10 à la puissance l'exposant.

$$\underbrace{1,234}_{\text{mantisse}} e \underbrace{2}_{\text{exposant}}$$

## Exemples:

- 1,234e2 c'est 1,234  $\times$  10<sup>2</sup> = 1,234  $\times$  100. Autrement dit, c'est le nombre 123,4 (partant de 1,234 on décale la virgule de deux positions vers la droite).
- 7,89e-3 c'est  $7,89\times10^{-3}=7,89\times1/1000$ . Autrement dit, c'est 0,00789 (partant de 7,89on décale la virgule de trois positions vers la gauche).
- 1. Écris les nombres flottants suivants en écriture décimale.
  - (a) 7,8914e3
  - (b) 7,8e-2
  - (c) 1,2066e5
  - (d) 3,14e-1
- 2. Écris les nombres suivants sous la forme de nombres flottants (attention le premier chiffre de la mantisse ne doit pas être 0).
  - (a) 21,57
  - (b) 71660
  - (c) 0,00625
  - (d) 718,2
  - (e) 0,00005
- 3. Calcule les nombres suivants. Écris le résultat sous la forme décimale et sous la forme d'un nombre flottant.
  - (a) 30,75+4,699
  - (b) 4,101+3,02+5,757
  - (c)  $3 \times (4, 157e2)$

### Activité 3 (Nombres flottants II).

Lorsqu'il est stocké dans la mémoire d'un ordinateur, un nombre flottant ne comporte qu'un nombre fixé de chiffres. Par exemple 10 chiffres pour une calculatrice. Dans cet exercice, on travaille avec une mini-calculatrice qui ne prend seulement en compte que 4 chiffres pour la mantisse (1 chiffre avant la virgule, 3 chiffres après).

Par exemple si x = 12,345 alors ce nombre est stocké dans la mini-calculatrice sous la forme nf(x) = 1,234e1. Note que le 5 n'est plus présent.

Comme les nombres sont stockés avec un nombre limité de chiffres, cela peut engendrer des erreurs de calculs.

#### 1. Erreurs d'arrondi.

```
Soient a = 1201, 3; b = 2201, 4; c = 3201, 5.
```

- (a) Calcule x = a + b + c et calcule le nombre flottant associé nf(x).
- (b) Calcule les nombres flottants nf(a), nf(b), nf(c) associés à a, b, c (avec 4 chiffres pour la mantisse). La mini-calculatrice calcule la somme nf(a) + nf(b) + nf(c).
- (c) Explique la différence entre nf(x) et nf(a) + nf(b) + nf(c).

**Analogie.** Si, lors des courses, on oublie de payer les centimes pour chaque article d'un ticket, à la fin, l'erreur totale peut être de plusieurs euros.

# 2. Phénomène d'absorption.

```
Soient a = 7564; b = 0, 1569.
```

- (a) Calcule nf(a) et nf(b), les nombres flottants associés à a et b puis nf(a) + nf(b).
- (b) Calcule a + b, et calcule le nombre flottant nf(a + b) associé.
- (c) Explique la différence.

**Analogie.** On peut mesurer le volume d'une piscine et aussi celui d'un verre d'eau. Mais si on verse le verre d'eau dans la piscine, le changement de volume n'est pas perceptible.

#### 3. Phénomène d'élimination.

Soient a = 65,2837 et b = 65,1258.

- (a) Calcule nf(a) et nf(b).
- (b) Calcule a b et nf(a b).
- (c) Au lieu de calculer a b, la mini-calculatrice calcule d'abord nf(a) nf(b). Explique la différence avec nf(a b).

**Analogie.** On transvase l'eau d'une piscine dans un bassin qui a presque la même taille. Il est difficile de savoir s'il va y avoir trop ou pas assez d'eau.