

Tabac : vrai ou faux ?

Testez vos connaissances en attendant votre rendez-vous.

Les réponses sont au dos... ou auprès de votre professionnel de santé.

1 Arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant une opération divise par 3 le risque de complications opératoires.

VRAI

FAUX

2 Quel que soit l'âge, il y a toujours des bénéfices à arrêter de fumer.

VRAI

FAUX

3 La prise de poids est systématique quand on arrête de fumer.

VRAI

FAUX

4 Un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement.

VRAI

FAUX

5 Les substituts nicotiniques sont remboursés à 65 % par l'Assurance maladie.

VRAI

FAUX

6 Seul le médecin peut prescrire des substituts nicotiniques.

VRAI

FAUX

7 Réduire de moitié sa consommation avec des substituts nicotiniques diminue déjà certains risques.

VRAI

FAUX

8 On peut se faire accompagner par des tabacologues au 39 89.

VRAI

FAUX

Envie d'en parler ? Demandez à votre professionnel de santé ou appelez le 39 89.

Les réponses

Tabac : vrai ou faux ?

VRAI

1. Arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant une opération divise par 3 le risque de complications opératoires.

Un arrêt 6 à 8 semaines avant l'intervention, poursuivi pendant la cicatrisation, est l'idéal. Mais arrêter est bénéfique jusqu'à la veille de l'opération.

VRAI

2. Quel que soit l'âge, il y a toujours des bénéfices à arrêter de fumer.

Le risque cardiovasculaire baisse quel que soit l'âge de l'arrêt, même après 70 ans. Les premiers bénéfices sont quasi immédiats : il n'est jamais trop tard.

FAUX

3. La prise de poids est systématique quand on arrête de fumer.

Elle n'est pas systématique et reste souvent limitée, notamment avec les substituts nicotiniques.

VRAI

4. Un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement.

Après 30 jours d'abstinence, la dépendance est moins forte et les symptômes de manque diminuent.

VRAI

5. Les substituts nicotiniques sont remboursés à 65 % par l'Assurance maladie.

Depuis le 1er janvier 2019, sur prescription. La complémentaire santé peut prendre en charge le reste.

FAUX

6. Seul le médecin peut prescrire des substituts nicotiniques.

Les sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes peuvent aussi les prescrire.

VRAI

7. Réduire de moitié sa consommation avec des substituts nicotiniques diminue déjà certains risques.

La réduction a des effets positifs et peut préparer une tentative d'arrêt. Mais l'objectif reste l'arrêt complet.

VRAI

8. On peut se faire accompagner par des tabacologues au 39 89.

Tabac info service propose un accompagnement personnalisé par téléphone, sur son site et son application.

Sources : gazette MSP sans tabac n°2 (FEMAS HDF), Assurance maladie, Tabac info service.