

**FAKULTET
ELEKTROTEHNIKE I
RAČUNARSTVA**

MATEMATIKA 1

**PREDAVANJA
DOMAĆE ZADAĆE**



ZAGREB, 2006.

Sadržaj:

1. MATEMATIČKA LOGIKA	
1.1. UVOD	-1-
1.2. SUDOVI	-1-
1.3. PREDIKATI	+8-
1.4. SKUPOVII I PRESLIKAVANJA	-11-
1.5. RELACIJE IMA SKUPU	-17-
2. REALNI I KOMPLEKSNI BROJEVI	
2.1. PRIRODNI BROJEVI, MATEMATIČKA INDUKCIJA, BINOMNA FORMULA.	-19-
2.2. CIJELI BROJEVI	-25-
2.3. RACIONALNI BROJEVI	-25-
2.4. REALNI BROJEVI	-26-
2.5. KOMPLEKSNI BROJEVI	-30-
3. MATRICE	
3.1. DEFINICIJA I PRIMJERI MATRICA	-41-
3.2. OPERACIJE S MATRICAMA	-43-
3.3. ALGEBRA MATRICA	-44-
3.4. DEFINICIJA DETERMINANTE	-52-
3.5. SVOJSTVA DETERMINANTI	-53-
4. RANG I INVERZ MATRICE	
4.1. INVERZNA MATRICA	-58-
4.2. ELEMENTARNE TRANSFORMACIJE I REDUCIRANI OBLIK MATRICE	-59-
4.3. ELEMENTARNE MATRICE, RANG I INVERZ MATRICE.	-60-
4.4. DETERMINANTE I INVERZNA MATRICA	-63-
4.5. LINEARNA NEZAVISNOST VETORA I RANG MATRICE	-75-
5. LINEARNI SUSTAVI	
5.1. GAUSSOVA METODA ELIMINACIJE	-80-
5.2. CRAMEROVO PRAVILO	-85-
5.3. KARAKTERISTIČAN POLINOM I SVOJSTVENA VRJEDNOST	-85-
6. FUNKCIJE	
6.1. SVOJSTVA REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE	-99-
6.2. TRANSFORMACIJE NAD FUNKCIJAMA	-104-
6.3. POPIS ELEMENTARNIH FUNKCIJA I NJIHOVIH KARAK. OBILJEŽJA	-106-
7. NIZOVI	
7.1. POJAM NIZA, PODNIZ, ONEĐEN NIZ.	-128-
7.2. POJAM GOMILIŠTA NIZA	-129-
7.3. KONVERGENCIJA NIZA REALNIH BROJEVA	-130-
7.4. PRAVILA ZA RAČUNANJE SLIMESIMA	-132-
7.5. NIZOVI I S BESKONAČnim LIMESIMA	-132-
7.6. MONOTONI NIZOVI	-133-
7.7. NEKI VAŽNI LIMESI	-135-
7.8. EKVIVALENTNE NEIZMJERNO VELIKE VELIĆINE	-137-
8. LIMES FUNKCIJE, NEPREKINUTE FUNKCIJE	
8.1. LIMES FUNKCIJE	-144-
8.2. RAČUNANJE LIMESA	-146-
8.3. JEDNOSTRANI LIMESI	-148-
8.4. NEPREKINUTE FUNKCIJE I LIMESI	-149-
8.5. SVOJSTVA NEPREKINUTIH FUNKCIJA	-151-

Samo je jedan Mali Irica!

9. DIFERENCIJALNI RAČUN I.	
9.1. TANGENTA NA KRIVULJU	-156-
9.2. DEFINICIJA DERIVACIJE	-156-
9.3. DERIVACIJA I NEPREKINUTOST	-157-
9.4. OSNOVNA PRAVILA DERIVIRANJA	-158-
9.5. DERIVACIJA SLOŽENE FUNKCIJE I INVERZNE FUNKCIJE	-159-
9.6. TABLICA DERIVACIJA ELEMENTARNIH FUNKCIJA	-164-
10. DIFERENCIJALNI RAČUN II.	
10.1. DERIVACIJA IMPLICITNO I PARAMETARSKI ZADANE FUNKCIJE	-170-
10.2. DIFERENCIJAL FUNKCIJE	-172-
10.3. OSNOVNI TEOREMI DIFERENCIJALNOG RAČUNA	-173-
10.4. TAYLOROVA FORMULA	-176-
10.5. L'HOSPITALovo PRAVilo	-178-
11. PRIMJENE DIFERENCIJALNOG RAČUNA	
11.1. TANGENTA I NORMALA NA GRAF FUNKCIJE	-186-
11.2. PAD I RAST FUNKCIJE, EKSTREMI.	-189-
11.3. PRIMJENE	-194-
12. ISPITIVANJE TIJEKA FUNKCIJE	
12.1. ASIMPTOTE	-202-
12.2. KONVEKSNOST I KONKAVNOST	-204-
12.3. TIJEK FUNKCIJE	-206-
13. INTEGRALNI RAČUN	
13.1. PRIMITIVNA FUNKCIJA	-220-
13.2. ODREĐENI INTEGRAL	-225-
13.3. STAVAK O SREDNJOJ VRJEDNOSTI INTEGRALNOG RAČUNA. LEIBNIZ-NEWTONOVA FORMULA.	-227-
13.4. PARCIJALNA INTEGRACIJA I SUPSTITUCIJA U ODREĐENOM INTEGRALU	-228-
14. INTEGRIRANJE NAJAVAŠNIH TIPOVA INTEGRALA	
14.1. INTEGRALI RACIONALNIH FUNKCIJA	-235-
14.2. INTEGRIRANJE NEKIH IRACIONALNIH FUNKCIJA	-239-
14.3. INTEGRALI NEKIH TRIGONOMETRIJSKIH I Hiperbolickih FUNKCIJA	-241-

Samo je jedan Mali Ivica!

1. MATEMATIČKA LOGIKA

1.1. UVOD

Samo je jedan Mali Ivica!

□ TEMELJNE OZNAKE

= označke skupova:

$$1. \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

-skup prirodnih brojeva

$$2. \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

-skup cijelih brojeva

$$3. \mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \right\}$$

-skup racionalnih brojeva (razlomaka)

$$4. \mathbb{R}$$

-skup realnih brojeva

↳ geometrijski je predložen brojevima pravcem

= označke zbroja i umnoška:

$$1. \sum_{i=1}^n a_i := a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (\text{: = ČITAJ : po definiciji jednaka})$$

$$2. \prod_{i=1}^n a_i := a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$$

1.2. SUDOVI

= Temeljni pojam matematičke logike je sud. Primjerice:

a: "5 > 3" → istinit sud

b: "4 > 10" → lažan sud

c: "KOLIKO JE SATI" → nije sud

d: "x > 2" → nije sud (predikat)

= Sud - smislena izreka kojoj možemo pripojiti vrijednost istinitosti:

1.) istinit (eng. true) → T, T, 1

2.) lažan (eng. false) → F, F, 0

-oznaka vrijednosti suda: t(a) ili v(a).

□ LOGIČKE OPERACIJE

= Definirajujući temeljnih operatara kao svolra stvara se u matematičkoj logici algebra sudova.

= Osnovni operatori:

- | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1. \neg | - negacija | } umarni operator |
| 2. \wedge | - konjunkcija | |
| 3. \vee | - disjunkcija | |
| 4. \Rightarrow | - implikacija | |
| 5. \Leftrightarrow | - ekvivalencija | |

= 1. Umarni operator → operatator koji za sebe veže samo jednu varijablu ($\neg x$)

= 2. Binarni operatator → operatator koji za sebe veže dve varijable ($x \wedge y, x \vee y, x \Rightarrow y, x \Leftrightarrow y$)

= DEFINICIJA 1.

↳ Negacija (\neg , čitaj: "nor, nije")

Sud $\neg x$ je istinit ako je x lažan, a lažan ako je x istinit.

↳ DOKAZ: tablica istinitosti operatora negacije (\neg)

x	$\neg x$
T	F
F	T

x	$\neg x$
1	0
0	1

= DEFINICIJA 2.

↪ Konjunkcija (\wedge , citaj: "i, et")

Sud $X \wedge Y$ je istinit ako su X i Y istiniti, inače je lažan.

↪ DOKAZ: tablica istinitosti operatora konjunkcije (\wedge)

X	Y	$X \wedge Y$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

X	Y	$X \wedge Y$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Sud je jedan Mali kvadrat!

= DEFINICIJA 3.

↪ Disjunkcija (\vee , citaj: "ili, vel")

Sud $X \vee Y$ je lažan ako su X i Y lažni, inače je istinit.

↪ DOKAZ: tablica istinitosti operatora disjunkcije (\vee)

X	Y	$X \vee Y$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

X	Y	$X \vee Y$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

= Uočimo da vrijedi:

1. $t(\neg X) = 1 - t(X)$
2. $t(X \wedge Y) = t(X) \cdot t(Y)$
3. $t(X \vee Y) = t(X) + t(Y) - t(X) \cdot t(Y)$

= DEFINICIJA 4.

↪ Implikacija (\Rightarrow , citaj: "x implicira y")

"x poslaci y"

"iz x slijedi y"

"ako je x onda je y"

"x je doštatan uvjet za y"

"y je nužan uvjet za x"

Sud x implicira y je lažan ako je X istinit, a Y lažan, inače je istinit

↪ DOKAZ: tablica istinitosti operatora implikacije (\Rightarrow)

X	Y	$X \Rightarrow Y$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

↪ Ako imamo označku $x \Rightarrow y$, x se naziva pretpostavka (antecedenta), a y zaključak (konsekventa).

= PRIMJER 1.

$$(x=2) \Rightarrow (x^2=4)$$

$x=2$ je doštatan uvjet za $x^2=4$

$x^2=4$ je nužan uvjet za $x=2$

= DEFINICIJA 5.

↪ Ekvivalencija ili obastrana implikacija (\Leftrightarrow , citaj: "x ekvivalentno y")

"x je nužan i doštatan

uvjet za y")

Sud x ekvivalentno y je istinit sud kada oba suda imaju iste istinitosti, tj. $t(x) = t(y)$.

↪ DOKAZ: tablica istinitosti operatora ekvivalencije (\Leftrightarrow)

x	y	$\neg(x \Rightarrow y)$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Samo je jedan Mali Ivica!

= Može se pokazati da se svaki od operatora može izraziti samo s 2 operatora, negacijom (\neg) i konjunkcijom (\wedge).

= S pomoću logičkih operacija algebre sudova tvorimo složene izraze (formule) služeci se pri tome zagradama (,) i operacijama +, -.

= PRIMJER 2.

Napiši tablicu istinitosti sljedeće formule: $(\neg a \vee b) \Rightarrow \neg(a \wedge c)$

a	b	c	$\neg a$	$\neg a \vee b$	$a \wedge c$	$\neg(a \wedge c)$	$L(a,b,c)$
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1

= Funkcije u logima su jedine vrijednosti varijabla (i ulaznih i izlaznih) 1 i 0 zovu se Booleove (logičke) funkcije.

= DEFINICIJA 6.

↳ Ako dvoje formule, $A(x_1, \dots, x_n)$ i $B(x_1, \dots, x_n)$, imaju istu Booleovu funkciju kažemo da su istovrijedne; to zapisujemo: $A(x_1, \dots, x_n) \equiv B(x_1, \dots, x_n)$.

= PRIMJER 3.

Provjeri istovrijednost formule: $x \Rightarrow y \equiv \neg(x \wedge \neg y) \equiv \neg x \vee y$

x	y	$x \Rightarrow y$	$\neg y$	$x \wedge \neg y$	$\neg(x \wedge \neg y)$	$\neg x$	$\neg x \vee y$
1	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1

= PRIMJER 4.

Provjeri istovrijednost formule: $x \Leftrightarrow y \equiv (x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow x)$

x	y	$x \Rightarrow y$	$y \Rightarrow x$	$y \Rightarrow x$	$L(x,y)$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1

= Zamjenom formula ili njihovih dijelova s istovrijednim možemo ih transformirati u jednostavnije funkcije koje imaju istu Booleovu funkciju.

= STAVAK 1.

↳ Neke korisne formule i dokazi:

$$1.) \neg(\neg x) \equiv x \rightarrow \text{dvostruka negacija}$$

x	$\neg x$	$\neg(\neg x)$
1	0	1

2.) $x \wedge x \equiv x$
 $x \vee x \equiv x$

x	$x \wedge x$	$x \vee x$
1	1	1
0	0	0

Samo je jedan Mali Ivica!

3.) $x \wedge y \equiv y \wedge x \rightarrow \text{komutativnost}$
 $x \vee y \equiv y \vee x$

x	y	$x \wedge y$	$y \wedge x$	$x \vee y$	$y \vee x$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0

4.) $x \wedge (y \wedge z) \equiv (x \wedge y) \wedge z$
 $x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z \rightarrow \text{asocijativnost}$

x	y	z	$y \wedge z$	$x \wedge (y \wedge z)$	$x \wedge y$	$(x \wedge y) \wedge z$	$y \vee z$	$x \vee (y \vee z)$	$x \vee y$	$(x \vee y) \vee z$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.) $x \wedge (y \vee z) \equiv (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
 $x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z) \rightarrow \text{distributivnost}$

x	y	z	$y \vee z$	$x \wedge (y \vee z)$	$x \wedge y$	$x \wedge z$	$L(x,y,z)$	$y \wedge z$	$x \vee (y \wedge z)$	$x \vee y$	$x \vee z$	$L(x,y,z)$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.) $\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y$
 $\neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y \rightarrow \text{De Morganove formule}$

x	y	$x \wedge y$	$\neg(x \wedge y)$	$\neg x$	$\neg y$	$\neg x \vee \neg y$	$x \vee y$	$\neg(x \vee y)$	$\neg x \wedge \neg y$
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1

7.) $x \Leftrightarrow y \equiv (x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow x)$

→ Tablica u primjeru 4.

8) $x \Rightarrow y \equiv (\neg y) \Rightarrow (\neg x)$ \rightarrow obrat po kontrapoziciji

x	y	$x \Rightarrow y$	$\neg x$	$\neg y$	$\neg y \Rightarrow \neg x$
1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1

Samo je jedan Mali Ivica!

9.) $\neg(x \Rightarrow y) \equiv x \wedge \neg y$

x	y	$x \Rightarrow y$	$\neg(x \Rightarrow y)$	$\neg y$	$x \wedge \neg y$
1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0

=DEFINICIJA 7.

\hookrightarrow Ako je neka formula istinita za sve stogove kazemo da je identički istinita ili **tautologija** (pišemo $\equiv T$), u suprotnom je identički lažna ($\equiv F$). Identički istinute formule temelj su logičkog zaključivanja.

=STAVAK 2.

\hookrightarrow Neke korisne i važnije tautologije i dokaz:

1.) $(x \wedge (x \Rightarrow y)) \Rightarrow y \rightarrow$ modus ponens

x	y	$x \Rightarrow y$	$x \wedge (x \Rightarrow y)$	$L(x,y)$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	1

2.) $((x \Rightarrow y) \wedge \neg y) \Rightarrow \neg x \rightarrow$ modus tollens

x	y	$x \Rightarrow y$	$\neg y$	$(x \Rightarrow y) \wedge \neg y$	$\neg x$	$L(x,y)$
1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1

3.) $((\neg x \Rightarrow y) \wedge \neg y) \Rightarrow x \rightarrow$ dokaz iz protuslovja

x	y	$\neg x$	$\neg x \Rightarrow y$	$\neg y$	$(\neg x \Rightarrow y) \wedge \neg y$	$L(x,y)$
1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1

4.) $((x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow z)) \Rightarrow (x \Rightarrow z)$ \rightarrow zakon silogizma

x	y	z	$x \Rightarrow y$	$y \Rightarrow z$	$x \wedge z$	$x \Rightarrow z$	$L(x,y,z)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Samo je jedan Mali Ivica!

= Uz dogovor o jačem vezivanju konjunkcije (\wedge) i disjunkcije (\vee) od implikacije (\Rightarrow) formule se pišu bez zagrade.

ZADACI

① Dokazi da je $x \wedge (x \Rightarrow y) \Rightarrow y$ (modus ponens) identički istinita.
 ↳ VIDJETI: STAVAK 2.1.

② Dokazi da je $(x \Rightarrow y) \wedge y \Rightarrow x$ (modus tollens) identički istinita.
 ↳ VIDJETI: STAVAK 2.2.

③ Dokazi da je $(\neg x \Rightarrow y) \wedge \neg y \Rightarrow x$ (dokaz iz protutvorja) identički istinita.
 ↳ VIDJETI: STAVAK 2.3.

④ Dokazi da je $(x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow z) \Rightarrow (x \Rightarrow z)$ (zakon silogizma) identički istinita.

1.3. PREDIKATI

= Skup svih promatranih objekata zvatemo univerzalnim skupom, označavati ćemo ga sa U (ili M ili Ω).

- DEFINICIJA 1.

↳ Sudna forma $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ koja za svaki slogan elemenata $x_1, x_2, \dots, x_n \in U$ postaje sud zove se n -mjesni predikat na U .

↳ Skup svih elemenata univerzalnog skupa za koje je predikat $P(x)$ istinit zove se karakterističan skup predikata $P(x)$, i označava se sa C_P .

- PRIMJER 1.

Neka je U zadani skup $U = \{1, 3, 5\}$. Odredi karakterističan skup za $P(x) \equiv x \leq 3$.

$$C_P = \{1\}.$$

- PRIMJER 2.

Neka je U zadani skup $U = \{1, 3, 5\}$. Odredi karakterističan skup za $P(x_1, x_2) \equiv x_1 \neq x_2$.

$$C_P = \{(1, 3), (1, 5), (3, 5)\}.$$

= Iz predikata tvore se složeni predikati logičkim operacijama algebre sudova čime nastaje algebra predikata.

- PRIMJER 3.

Neka je $P(x) \equiv "x \geq 2"$, $Q(x) \equiv "x \leq 5"$, a $U = \mathbb{R}$.

Definiramo novi predikat: $R(x) := P(x) \wedge Q(x) \equiv (x \geq 2) \wedge (x \leq 5)$.
 Za taj novi predikat $U \in N$ pa vrijedi $C_R = \{2, 3, 4, 5\}$.

Samo je jedan Mali Ivica!

= DEFINICIJA 2.

↳ Kazemo da je predikat $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ identički istinit ako je istinit za sve slogove elemenata iz \mathcal{U} . To zapisujemo: $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv T$.

Kazemo da je predikat $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ identički lažan ako je lažan za sve slogove elemenata iz \mathcal{U} . To zapisujemo: $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv F$.

= DEFINICIJA 3.

↳ Neka je $P(x)$ jedinomjensni predikat na \mathcal{U} .

1.) Sud $\forall x P(x)$ (čitaj: za svaki x je $P(x)$) je istinit onda i samo onda ako je $P(x)$ identički istinit predikat, tj. $P(x) \equiv T$.

↳ Simbol \forall (eng. all - svi) zove se univerzalni kvantifikator (kvant).

2.) Sud $\exists x P(x)$ (čitaj: postoji x tako da je $P(x)$) je istinit onda i samo onda ako je $P(x)$ identički lažan predikat, tj. $P(x) \equiv F$.

↳ Simbol \exists (eng. exist - postoji) zove se egzistencijalni kvantifikator (kvant).

↳ tablice istinitosti:

$$1) \forall x P(x) \rightarrow \text{istina} \quad 2) \exists x P(x) \rightarrow \text{istina}$$

$x \in \mathcal{U}$	$P(x)$
x_1	T
x_2	T
:	:
:	:
x_n	T

$x \in \mathcal{U}$	$P(x)$
x_1	
x_2	
:	
:	
x_n	T

= STAVAK 1.

↳ Iz definicije 3. direktnim zaključivanjem slijedi:

$$\begin{aligned} 1.) \neg \forall x P(x) &\equiv \exists x \neg P(x) \\ 2.) \neg \exists x P(x) &\equiv \forall x \neg P(x) \\ 3.) \forall x P(x) &\Rightarrow \exists x P(x) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{de Morganove formule za kvantifikatore} \\ \text{1. i 2.} \end{array} \right\}$$

= Očigledno je da tako u n -mjесnom predikatu $P(x_1, \dots, x_n)$ fiksiramo m objekata među x_1, x_2, \dots, x_n dobivamo $(n-m)$ -mjесni predikat.

Njmjesni predikati su sudovi, pa i obratno, sudove možemo smatrati njmjesnim predikatima.

= PRIMJER 4.

Neka je $\mathcal{U} = \{2, 3, 4\}$, $P(x, y)$: „ $x \geq y$ ”, $Q(x, y)$: „ $x \neq y$ ”. Naći tablicu istinitosti za $P(x, y)$, $Q(x, y)$, $\forall x P(x, y)$, $\exists x P(x, y)$.

1. tablica istinitosti za $P(x, y)$: 2. tablica istinitosti za $Q(x, y)$:

$x \setminus y$	2	3	4
2	1	0	0
3	1	1	0
4	1	1	1

$x \setminus y$	2	3	4
2	1	0	1
3	0	1	0
4	0	0	1

3. tablica istinitosti za $\forall x P(x, y)$

↳ x -vezana varijabla pa:

$$\forall x P(x, y) \equiv P_a(y)$$

4. tablica istinitosti za $\exists x P(x, y)$

↳ x -vezana varijabla pa:

$$\exists x P(x, y) \equiv P_a(y)$$

y	$P_a(y)$
2	1
3	0
4	0

y	$P_b(y)$
2	1
3	1
4	1

10-

= ZADATAK 1.

Napraviti tablicu istinitosti ako vrijede pravila iz prošlog zadatka za:

$$R(x,y) \equiv P(x,y) \wedge \neg Q(x,y).$$

 $P(x,y)$:

x \ y	1	2	3	4
1	1	0	0	1
2	1	1	0	0
3	1	1	0	1
4	1	1	1	1

 $\neg Q(x,y)$:

x \ y	1	2	3	4
1	2	0	1	0
2	3	1	0	1
3	4	1	1	0
4	4	1	1	0

 $R(x,y)$:

x \ y	1	2	3	4
1	2	0	0	0
2	3	1	0	0
3	4	1	1	0
4	4	1	1	0

= Ponovnom primjenom kvauntifikatora na slobodnu varijablu nastaju od jedno-mjesečnih predikata sudovi.

= PRIMJER 5.

Ako uzmemo podatke iz prošlog primjera dobivamo:

$$\begin{aligned} \exists y \forall x P(x,y) &\equiv T \\ \exists y \forall x P(x,y) &\equiv F \\ \exists y \exists x P(x,y) &\equiv T \\ \exists y \exists x P(x,y) &\equiv T \end{aligned}$$

Samo je jedan Mali Ivica

ZADACI (DZ 1. PRVI DIO)

⑤ a) $(\exists x \in \mathbb{N})(x^2 = 4) \equiv T$

- Rješenja jednadžbe $x^2 = 4$ su -2 i 2 , pa postoji takav $x \in \mathbb{N}$ (2) za koji vrijedi da mu jednadžba, oduosno sud je istinit.

b) $(\exists x \in \mathbb{Q})(x^2 = 3) \equiv F$

- Rješenje jednadžbe $x^2 = 3$ su $-\sqrt{3}$ i $\sqrt{3}$, a to su iracionalni brojevi, pa ne postoji niti jedan $x \in \mathbb{Q}$ za koji vrijedi da mu jednadžba, oduosno sud je lažan.

c) $(\forall x, y \in \mathbb{R})(x^2 = y^2 \Rightarrow x = y) \equiv F$

- Rješenje jednadžbe $x^2 = y^2$ je $|x| = |y|$, oduosno imamo 4 rješenja u skupu \mathbb{R} : $x = y$, $x = -y$, $-x = y$, $-x = -y$, što znači da dana implikacija ne vrijedi jer x i y očito ne moraju biti jednakim, oduosno sud je lažan.

d) $(\forall x, y \in \mathbb{R})(x^2 < y^2 \Leftrightarrow |x| < |y|) \equiv T$

- Da bi dokazali da je ova ekvivalentacija istinita moramo ju rastaviti na 2 implikacije,

1. $x^2 < y^2 \Rightarrow |x| < |y|$. Ako vrijedi da je $x^2 < y^2$, onda logičkom zaključevanjem vidimo da onda vrijedi da je $|x| < |y|$; $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

2. $|x| < |y| \Rightarrow x^2 < y^2$. Ako vrijedi da je $|x| < |y|$, onda ponovo logičkim zaključivačnjem vidimo da onda vrijedi da je $x^2 < y^2$; $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

Kako vrijede oba slučaja, onda zadani sud mora biti istinit.

⑥ a) $(\forall a \in \mathbb{Z})(\forall b \in \mathbb{Z})(\exists x \in \mathbb{Z})x^2 + ax = b \equiv F$

$$- x^2 + ax - b = 0 \quad (\forall a \in \mathbb{Z})(\forall b \in \mathbb{Z}) a^2 + 4b > 0$$

$x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4b}}{2}$ - Kako a i b mogu biti negativni onda i izraz može biti negativan, tj. izraz ne vrijedi $\forall b \in \mathbb{Z}$.

b) $(\forall a \in \mathbb{Z})(\forall b \in \mathbb{Z})(\exists x \in \mathbb{R})x^2 + ax = b \equiv F$

$$- x^2 + ax - b = 0 \quad (\forall a \in \mathbb{Z})(\forall b \in \mathbb{Z}) a^2 + 4b > 0$$

$x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4b}}{2}$ - Kako a i b mogu biti negativni onda i izraz može biti negativan, tj. izraz ne vrijedi $\forall b \in \mathbb{Z}$.


7. a) $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\exists b \in \mathbb{Z}) (\exists x \in \mathbb{R}) x^2 + ax + b = T$
 $-x^2 + ax + b = 0 \quad (\forall a \in \mathbb{Z}) (\exists b \in \mathbb{Z}) a^2 + 4b > 0$
 $x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4b}}{2} \quad$ Izraz vrijedi jer je a uvijek pozitivan, a za neki b će i izraz biti pozitivan.

b) $(\exists a \in \mathbb{Z}) (\forall b \in \mathbb{Z}) (\exists x \in \mathbb{R}) x^2 + ax + b = F$:
 $-x^2 + ax + b = 0 \quad (\exists a \in \mathbb{Z}) (\forall b \in \mathbb{Z}) a^2 + 4b > 0$
 $x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4b}}{2} \quad$ Kako je a uvijek pozitivan, a, b može biti negativni, izraz ne vrijedi $\forall b \in \mathbb{Z}$.
 $a^2 + 4b \geq 0$

1.4. SKUPOVI I PRESLIKAVANJA

= Neka je U univerzalni skup. Kazemo da je na U definiran skup S , ako se za svaki objekt $x \in U$ znače pripada li skupu S , označom $x \in S$, ili mu ne pripada, označom $x \notin S$.

Simbolički to možemo predstaviti Vennovim dijagramom skupa U :



$$x \in S, y \notin S$$

= Svakom skupu S možemo pridružiti njegov predikat pripadajuća $s(x)$, koji je istinit za one x koji pripadaju skupu S , a lošan za ostale. S je dakle karakterističan skup svoga predikata, tj. $S = \{x | s(x)\}$. To često zapisujemo: $S = \{x | x \in S\}$.


DEFINICIJA 1.

↳ Neka su $S_1, S_2, S \in U$. Definiramo operacije na skupovima.

1.) komplement (dopunak) skupa S (\bar{S})

$$\bar{S} = \{x | x \notin S\} = \{x | \neg(x \in S)\}$$


↳ Vennov dijagram:



2.) presjek skupova S_1 i S_2 ($S_1 \cap S_2$)

$$S_1 \cap S_2 = \{x | x \in S_1 \wedge x \in S_2\}$$


↳ Vennov dijagram:



3.) unija skupova S_1 i S_2 ($S_1 \cup S_2$)

$$S_1 \cup S_2 = \{x | x \in S_1 \vee x \in S_2\}$$

↳ Vennov dijagram:




12

4.) razlika između skupa S_1 i S_2 ($S_1 \setminus S_2$)

$$\hookrightarrow S_1 \setminus S_2 = \{x \mid x \in S_1 \wedge x \notin S_2\}$$

\hookrightarrow Vennov dijagram:




Samo je jedan Mali Iznad!

5.) simetrična razlika između skupa S_1 i S_2 ($S_1 \Delta S_2$)


$$\hookrightarrow S_1 \Delta S_2 := (S_1 \setminus S_2) \cup (S_2 \setminus S_1)$$

\hookrightarrow Vennov dijagram:

6.) relacija među skupovima ($S_1 \subseteq S_2$ - podskup)

$$\hookrightarrow S_1 \subseteq S_2 \Leftrightarrow \forall x (x \in S_1 \Rightarrow x \in S_2)$$

\hookrightarrow Vennov dijagram:



$$\hookrightarrow S_1 \subset S_2 \Rightarrow \text{pravi podskup}$$

= STAVAK 1.

\hookrightarrow Među skupovima vrijedi:


$$1.) S_1 = S_2 \Leftrightarrow (S_1 \subseteq S_2) \wedge (S_2 \subseteq S_1)$$

$$2.) S_1 \subseteq S_2 \Leftrightarrow S_1 \cup S_2 = S_2 \Leftrightarrow S_1 \cap S_2 = S_1$$


$$3.) \frac{S_1 \cup S_2 = \overline{S_1 \cap S_2}}{S_1 \cap S_2 = \overline{S_1 \cup S_2}} \quad \text{De Morganove formule za skupove}$$

\hookrightarrow DOKAZ 2:


$$3.1. \quad \overline{S_1 \cup S_2}$$



$$\overline{S_1 \cap S_2}$$



$$3.2. \quad \overline{S_1 \cap S_2}$$




□ PRESLIKAVANJA

= DEFINICIJA 2.

\hookrightarrow Neka su S_1 i S_2 skupovi na U . Kažemo da je f -funkeija sa skupa S_1 u S_2 , označom $f: S_1 \rightarrow S_2$, ako je svakom $x \in S_1$ pridružen retim

propisom f jednoznačno određeni $y \in S_2$, označom: $f: x \mapsto f$, tj. $y = f(x)$.



Vennov dijagram funkcije f :

$S_1 = \text{domena} \quad (\text{podnje definicije}) - D_f$

$S_2 = \text{kodomena}$

$x = \text{original}$

$y = f\text{-slika originala}$

$S = \text{slika skupa } S_1 \quad (\text{podnje vrednosti})$

$= f(S_1) = f(D_f) := \{f(x) \mid x \in S_1\}$

= Realne funkcije realne varijable su takve funkcije kod kogih je
 $S_1 \subseteq \mathbb{R}$, a $S_2 \subseteq \mathbb{R}$.

= DEFINICIJA 3.

↪ Neka je $f: S_1 \rightarrow S_2$, t.e. $\text{dom } f = S_1$ i $f(\text{dom } f) \subseteq S_2$.

1.) Funkcija je surjekcija ako je $f(\text{dom } f) = S_2$, tj. ako vrijedi:

$$\forall y \in S_2 \exists x \in S_1, f(x) = y.$$

Takvo preslikavanje je preslikavanja sa S_1 na S_2 , a ne u S_2 .

2.) Funkcija je injekcija ako različiti originali imaju različite slike, tj. ako vrijedi:

$$\forall x_1, x_2 \in S_1, (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)).$$

= Zbog poznate tautologije vrijedi:

$$\forall x_1, x_2 \in S_1, (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2).$$

3.) Funkcija je bijekcija (ili 1-1 preslikavanje) ako je funkcija i injekcija i surjekcija zajedno.

= DEFINICIJA 4.

↪ Neka je $f: S_1 \rightarrow S_2$, $X \subseteq S_1$. Onda je $f(X) := \{f(x) | x \in X\}$ f-slika podskupa X . Pa je onda $f(X) \subseteq S_2$. Ogranicimo se u djelovanju f na podskup X , dobivamo novo preslikavanje - restrikciju (suženje preslikavanja) f na X, označom $f|_X$. Vrijedi:


$$f|_X: X \rightarrow S_2, (f|_X)(x) = f(x) \quad \forall x \in X.$$

□ KOMPOZICIJA FUNKCIJA

= DEFINICIJA 5.

↪ Neka su S_1, S_2, S_3 skupovi, te $f: S_1 \rightarrow S_2$, $g: S_2 \rightarrow S_3$. Kompozicija tih funkcija (sastavak), označom $gof: S_1 \rightarrow S_3$, definiramo izrazom:

$$\forall x \in S_1, (gof)(x) := g[f(x)].$$



= Svojstva kompozicije funkcija:

1.) Kompozicija bijekcije je opet bijekcija.

2.) Kompozicija funkcija je asocijativna:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

3.) Bijekcija $f: S \rightarrow S$ zove se permutacija skupa S, ili bijekcija na S.


Permutacija $\text{id}_S: S \rightarrow S$, $\forall x \in S, \text{id}_S(x) = x$, koja svaki $x \in S$ preslikava u njega samoga zove se identičko preslikavanje ili identitet na S.

= DEFINICIJA 6.

↪ Neka je $f: S_1 \rightarrow S_2$. Preslikavanje $g: S_2 \rightarrow S_1$ zove se inverzno preslikavanje od f (inverzna funkcija od f), ako je:

$$\forall x \in S_1: g[f(x)] = x, \text{ tj. } g \circ f = \text{id}_{S_1},$$

$$\forall y \in S_1: f[g(y)] = y, \text{ tj. } f \circ g = \text{id}_{S_2}.$$



= STAVAK 2:

\hookrightarrow Za preslikavajuće $f: S_1 \rightarrow S_2$ opšto je inverzno preslikavajuće $g: S_2 \rightarrow S_1$, onda i samo onda, ako je f bijekcija. U tom slučaju je i g bijekcija.
Inverzno preslikavajuće je jedinstveno i označujemo ga f^{-1} .

= STAVAK 3:

\hookrightarrow Ako su $f: S_1 \rightarrow S_2$ i $g: S_2 \rightarrow S_3$ bijekcije, onda je: $(gof)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

\hookrightarrow DOKAZ:

$$1. (gof) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = (g \circ id_{S_2}) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = id_{S_3},$$

$$2. (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (gof) = id_{S_1},$$

$$1. i 2. (gof)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

ZADACI (DZ.1. DRUGI DIO)

8. a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$C = \{2, 4, 5, 8, 9\}$$

$$(A \Delta B) \Delta C$$

$$\hookrightarrow D = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1, 2, 7, 8\}$$

$$RJ = (D \setminus C) \cup (C \setminus D) = \{1, 4, 5, 7, 9\}$$


$$A \Delta (B \Delta C)$$

$$\hookrightarrow D = (B \setminus C) \cup (C \setminus B) = \{2, 3, 6, 7, 9\}$$


$$RJ = (A \setminus D) \cup (D \setminus A) = \{1, 4, 5, 7, 9\}$$

b) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$

1.



2.




9. $\{x \in \mathbb{Z} | (\exists y \in \mathbb{Z}) |x| + |y| = 5\}$ $x = \{-5, -4, \dots, 4, 5\}$

$$\rightarrow (-5, 0), (-4, -1), (-4, 1), (-3, -2), (-3, 2), (-2, -3), (-2, 3), (-1, -4), (-1, 4), (0, -5), (0, 5), (1, -4), (1, 4), (2, -3), (2, 3), (3, -2), (3, 2), (4, -1), (4, 1), (5, 0).$$

10. $|x-y| < \varepsilon$, ε mali broj. Graf:

$$\begin{array}{ll} 1^{\circ} x-y < \varepsilon & 2^{\circ} x-y > -\varepsilon \\ x < \varepsilon+y & x > y-\varepsilon \\ x=\varepsilon+y & x=y-\varepsilon \end{array}$$



* \hookrightarrow Ako je mali ε , to postaje pravac pa vrijedi:

\Rightarrow Funkcija je simetrična, jer je $\forall x \forall y xPy$, odnosno ako je x u relaciji s y i y je u relaciji sa x .

\Rightarrow Funkcija je refleksivna, jer je $\forall x xPx$, odnosno svaki x je u relaciji sa samim sobom.

\Rightarrow Funkcija nije transitivna.

$$|x-y| < \varepsilon \text{ i } |y-z| < \varepsilon \Rightarrow |x-z| < \varepsilon$$

Što se dobiva namještanjem brojeva

Samo je jedan Mali Ivica!

(11) $f(x) = 2x^2 + 4$
 $g(x) = x + 1$

Samo je jedan Mali Ivica!

$$f[g(x)] - g[f(x)] = 2(x+1)^2 + 4 - (2x^2 + 4 + 1) = \\ = 2x^2 + 4x + 2 + 4 - 2x^2 - 4 - 1 = \\ = 4x + 1$$

(12) $f(x) = \frac{x}{x+1}$
 $g(x) = 1 - \frac{1}{x}$

$$g[f(x+1)] = 1 - \frac{1}{\frac{x+1}{x+2}} = 1 - \frac{x+2}{x+1} = \frac{x+1-x-2}{x+1} = -\frac{1}{x+1}$$

(13) $A = \{1, 2, 3\}$
 $B = \{3, 4, 5, 6\}$
 $C = \{2, 4, 5\}$

a) $f: A \rightarrow B$

Funkcija nije surjekcija, jer postoji bar 1 $y \in B$ koji nema sliku u A.
 Funkcija je injekcija, jer različiti $x \in A$ imaju različite slike.

b) $f: B \rightarrow C$

Funkcija nije injekcija, jer različiti $x \in A$ nemaju različite slike.

Funkcija je surjekcija, jer svaki $y \in C$ ima svog sliku u B.

c) $f: A \rightarrow C$

Funkcija je bijekcija, jer je i injekcija i surjekcija istovremeno.

(14) a) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = \frac{1}{x^2}$

= Funkcija nije bijekcija jer se 2 različita x preslikaju u isti y.

b) $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$

= Funkcija nije bijekcija jer se 2 različita x preslikaju u isti y.

c) $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, 1], f(x) = 1 - x^4$

= Funkcija nije bijekcija jer se 2 različita x preslikaju u isti y.

d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^5$

= Funkcija je bijekcija, jer se 2 različita x preslikaju u isti y.

(15) DOKAZ:

- Funkcija f je injekcija, ako različiti originali imaju različite slike, oduvano ako vrijedi:

$$\forall x_1, x_2 \in S, (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)).$$

Zbog poznate tautologije iz gornjeg izraza vrijedi:

$$\forall x_1, x_2 \in S, (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2).$$

- Neka su zadane funkcije f i g injekcije, i neka je $h = g \circ f$. Tada je:

$$h(x_1) = (g \circ f)(x_1) = g[f(x_1)],$$

$$h(x_2) = (g \circ f)(x_2) = g[f(x_2)].$$

- Iz $h(x_1) = h(x_2)$ slijedi $g[f(x_1)] = g[f(x_2)]$. Kako je g injekcija, imat ćemo

$f(x_1) = f(x_2)$. Kako je i f injekcija, imat ćemo $x_1 = x_2$. Iz $h(x_1) = h(x_2)$ slijedi

da je $x_1 = x_2$, pa je onda i h , oduvano $g \circ f$ funkcija ponovo injekcija.

16-

$$f(x) = \frac{1}{x} - 2$$

$$y = \frac{1}{x} - 2$$

$$xy = 1 - 2x$$

$$x(y+2) = 1$$

$$x = \frac{1}{y+2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{x+2}$$

Samo je jedan Mali Ivica

17.

$$f(x) = \frac{x+2}{3x-1}$$

$$y = \frac{x+2}{3x-1}$$

$$3xy - y = x + 2$$

$$x(3y-1) = 2+y$$

$$x = \frac{2+y}{3y-1}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{2+x}{3x-1}$$

18.

$$f(x) = \log_2 \left(\frac{1}{3x-1} \right)$$

$$y = \log_2 \left(\frac{1}{3x-1} \right)$$

$$\log_2 2^y = \log_2 \left(\frac{1}{3x-1} \right)$$

$$3x \cdot 2^y - 2^y = 1$$

$$x = \frac{1+2^y}{3 \cdot 2^y}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1+2^x}{3 \cdot 2^x}$$

19.

$$f(x) = 3^{\frac{x+1}{x-1}}$$

$$y = 3^{\frac{x+1}{x-1}}$$

$$\log_3 y = \frac{x+1}{x-1} \cdot \log_3 3$$

$$x \cdot \log_3 y - \log_3 y = x + 1$$

$$x(\log_3 y - 1) = 1 + \log_3 y$$

$$x = \frac{1 + \log_3 y}{\log_3 y - 1}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1 + \log_3 x}{\log_3 x - 1}$$

20.

$$f(x) = \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}}$$

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = \frac{2^{\log_2 x^{\frac{1}{2}}} - 2}{2^{\log_2 x^{\frac{1}{2}}} + 2^{\log_2 x^{-\frac{1}{2}}} } =$$

$$g(x) = \log_4 x$$

$$= \frac{\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{\frac{x-1}{\sqrt{x}}}{\frac{x+1}{\sqrt{x}}} = \frac{x-1}{x+1}$$

 $f \circ g = ?$

$$1^{\circ} x > 0 \quad 2^{\circ} 2^x + 2^{-x} \neq 0$$

$$2^x + \frac{1}{2^x} \neq 0$$

$$\frac{2^{2x} + 1}{2^{2x}} \neq 0$$

$$3^{\circ} x+1 \neq 0$$

$$x \neq -1$$

$$1^{\circ} \cup 2^{\circ} \cup 3^{\circ} = x > 0$$

1.5. RELACIJE NA SKUPU


Samo je jedan Mali Ivica!

= DEFINICIJA 1.


↳ Kazano da je na skupu S definirana relacija ρ ako je $\rho \subseteq S \times S$, za svaki $(x, y) \in S \times S$ je dakle $(x, y) \in \rho$ (" x i y su u relaciji ρ ") ili $(x, y) \notin \rho$ (" x i y nisu u relaciji ρ "). Često pišemo: $x \rho y$.

= PRIMJER 1.


Zadan je skup $S_1 = \{P_1, P_2, P_3\}$ i relacija ρ_1 je relacija paralelnosti pravaca, tj. $x \rho_1 y \Leftrightarrow x \parallel y$. Odredi ρ_1 .



→ Iz zadane slike možemo računati Vennov dijagram skupa $S \times S$:



→ Sada možemo napraviti Vennov dijagram relacije ρ_1 :



$$\rho_1 = \{(P_1, P_1), (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_2), (P_2, P_3), (P_3, P_3)\}$$

= PRIMJER 2.

Zadan je skup $S_2 = \{1, 2, 4\}$ i relacija $x \rho_2 y \Leftrightarrow x \mid y$. Odredi ρ_2 .

$$\rho_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (4, 4)\}.$$

= DEFINICIJA 2.

1.) Relacija ρ je refleksivna, ako je $\forall x \ x \rho x$, tj. x je u relaciji sa samim sobom.

→ PRIMJER 1. ρ_1 - refleksivna

PRIMJER 2. ρ_2 - refleksivna

2.) Relacija ρ je simetrična, ako je $\forall x \ \forall y \ x \rho y \Rightarrow y \rho x$, tj. ako su x i y u relaciji onda slijedi da su i y i x u relaciji.

→ PRIMJER 1. ρ_1 - simetrična

PRIMJER 2. ρ_2 - nesimetrična

3.) Relacija ρ je antisimetrična, ako je $\forall x \ \forall y \ (x \rho y \wedge y \rho x \Rightarrow y = x)$, tj. za različite elemente x i y ne može istodobno biti $x \rho y$ i $y \rho x$.

→ PRIMJER 1. ρ_1 - nije antisimetrična

PRIMJER 2. ρ_2 - antisimetrična

4.) Relacija ρ je tranzitivna, ako je $\forall x \ \forall y \ \forall z \ (x \rho y \wedge y \rho z \Rightarrow x \rho z)$, tj. ako vrijedi da je x u relaciji s y i y u relaciji sa z , onda je x u relaciji sa z .

→ PRIMJER 1. ρ_1 - tranzitivna

PRIMJER 2. ρ_2 - tranzitivna

= DEFINICIJA 3.

↳ Relacija ρ koja je istovremeno refleksivna, simetrična i tranzitivna zove se ekvivalencija.

→ PRIMJER 1. ρ_1 - relacija ekvivalencije

PRIMJER 2. P_2 - nije relacija ekvivalencije

→ Primjer 1. se može pisati i ovako zbog rekčaja:


$$S_1 = \{P_1, P_2\} \cup \{P_3\},$$

pa se ti dijelovi nazivaju klase ekvivalencije od P_2 , a skup klasa čini partijom od skupa S_2 . AV: $\exists P_1, P_2, P_3 \in S_2$

↳ Relacija koja je istovremeno refleksivna, antisimetrična i transzitivna zove se relacija poređenja (uredaj).

→ Prikaz relacije uredanja raslojevidljiv u Primjer 2.

Vazimmo: $S_2 = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$, pišemo:



Samo je jedan Maf Ivić!

3. REALNI I KOMPLEKSNI BROJEVI

2.1. PRIRODNI BROJEVI. MATEMATIČKA INDUKCIJA. BINOMNA FORMULA

- Prirodni brojevi

↳ oznaka \mathbb{N}

↳ definicija $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$ i $n \in \mathbb{N}$

↳ predstavljanje skupa \mathbb{N} na brojevnom pravcu:



= STAVAK 1.

↳ Uz prirodne brojeve vezan je važan teorem: načelo (princip) matematičke indukcije:


Ako je neka tvrdnja $\mathcal{T}(n)$ koja ovisi o prirodnom broju n istinita za neki prirodan broj n_0 , i ako iz istinitosti te tvrdnje za ne $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq n_0$) slijedi da je istinita i za $n+1$, onda je ona istinita i za sve $n \in \mathbb{N}$ koji su veći od n_0 .

↳ To možemo prikazati i grafički:

KORAK 1.

- baza indukcije


n_0



KORAK 2.

- induktivna pretpostavka


n



KORAK 3.

- skok indukcije

$n+1$



= PRIMJER 1.

Dokazite da je prirodni broj $N = n^2 + 11n$ urijek paran, tj. $N = 2k$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

1. KORAK: baza indukcije:

$$n_0 = 1$$

$$N = 1^2 + 11 \cdot 1 = 12 \quad \text{u} \quad 12 = 2 \cdot 6 \quad (\text{paran broj})$$

2. KORAK: induktivna pretpostavka:

Potpovremimo da je N paran za neki $n \in \mathbb{N}$. tj. $n^2 + 11n = 2k$.

3. KORAK: skok indukcije:

Treba pokazati da je tvrdnja istinita i za $n+1$:

$$(n+1)^2 + 11(n+1) =$$

$$n^2 + 2n + 1 + 11(n+1) =$$

$$(n^2 + 11n) + (2n+12) =$$

2k po pretp.

$$2n+12 =$$

$$2(n+6)$$

2k broj jasno

Zaključak: Zaista je urijek $n^2 + 11n = 2k$ jer je skok bio uspješan.

□ BINOMNI KOEFICIJENTI

↳ Za zadani prirodni broj n i bilo koji $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ definiramo:

$$\binom{n}{k} := \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

$$\binom{n}{0} := 1$$

↳ Binomni koeficijenti čitaju se iz tzv. Pascalovog trokuta:

$$n=0$$

$$(a+b)^0 = 1$$

$$n=1$$

$$(a+b)^1 = 1a + 1b$$

$$n=2$$

$$(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

$$n=3$$

$$(a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$$

$$n=4$$

$$(a+b)^4 = \dots$$

$$n=5$$

$$(a+b)^5 = \dots$$

$$\vdots$$

= STAVAK 3.

↳ Bernoullijeva nejednakost:

Za svaki $x > 0$ i za svaki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi:

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

Samo je jedan Mali Ivica!

DOKA Z: - Pomocu matematicke indukcije:

1) baza indukcije:

$$n=1 \dots (1+x)^1 \geq 1+x$$

2) pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $(1+x)^n \geq 1+nx$

3) skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdja vrijedi i za $n+1$:

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x \end{aligned}$$

ZADACI (DZ.2, PRVI DIO)

① Dokaži: $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

① baza indukcije:

$$n=1 \dots 1 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{1 \cdot 2^2}{4} = \frac{4}{4} = 1 \checkmark$$

② pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

③ skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdja vrijedi i za $n+1$, tj. moramo dokazati da vrijedi:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2}{4}$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 =$$

PO PRETPOSTAVCI

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + 4(n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

Iz toga slijedi da tvrdja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

② Dokaži: $\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \cdot i^2 = (-1)^{n-1} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$

$$i=1 \dots (-1)^0 \cdot 1^2 = 1$$

$$i=2 \dots (-1)^1 \cdot 2^2 = -1 \cdot 4 = -4$$

$$i=3 \dots (-1)^2 \cdot 3^2 = 1 \cdot 9 = 9$$

$$i=4 \dots (-1)^3 \cdot 4^2 = -1 \cdot 16 = -16$$

① baza indukcije:

$$n=1 \dots 1 = (-1)^{1-1} \cdot \frac{1(1+1)}{2} = 1 \cdot 1 = 1 \checkmark$$

② pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \cdot i^2 = (-1)^{n-1} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$

③ skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdja vrijedi i za $n+1$, tj. moramo dokazati da vrijedi:

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n-1} \cdot n^2 + (-1)^n \cdot (n+1)^2 = (-1)^n \cdot \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n-1} \cdot n^2 + (-1)^n \cdot (n+1)^2 =$$

Po pretpostavci:

$$\begin{aligned} & (-1)^{n+1} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + (-1)^n \cdot (n+1)^2 = \\ & = (-1)^{n-1} n(n+1) + 2(-1)^n (n+1)^2 = \frac{(-1)^n (n+1) (-1n+2n+2)}{2} = \\ & = \frac{(-1)^n (n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Samo jedan Mafi Ivić!

Iz toga slijedi da tvrdnja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(3.) Dokazi: $\prod_{i=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^i}\right) = \frac{\sin x}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}$

$$\begin{array}{l} i=1 \dots \cos \frac{x}{2} \\ i=2 \dots \cos \frac{x}{2^2} \\ i=3 \dots \cos \frac{x}{2^3} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdot \cos \frac{x}{2^3} \dots \cos \left(\frac{x}{2^n}\right) \end{array} \right\}$$

(1) baza indukcije:

$$n=1 \dots \cos \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{2^1 \sin\left(\frac{x}{2^1}\right)} = \frac{\sin x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \cos \frac{x}{2} \checkmark$$

(2) pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $\prod_{i=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^i}\right) = \frac{\sin x}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}$.

(3) skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdnja vrijedi i za $n+1$, tj. moramo dokazati da vrijedi:

$$\cos \frac{x}{2^1} \cdot \cos \frac{x}{2^{n+1}} \cdot \dots \cdot \cos \frac{x}{2^n} \cdot \cos \frac{x}{2^{n+1}} = \frac{\sin x}{2^{n+1} \cdot \sin \frac{x}{2^{n+1}}}$$

$$\cos \frac{x}{2^1} \cdot \cos \frac{x}{2^{n+1}} \cdot \dots \cdot \cos \frac{x}{2^n} \cdot \cos \frac{x}{2^{n+1}} =$$

Po pretpostavci:

$$\begin{aligned} & \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \cdot \cos \frac{x}{2^{n+1}} = \frac{\sin x \cdot \cos \frac{x}{2^{n+1}}}{2^n \cdot 2 \sin \frac{x}{2^n} \cdot \cos \frac{x}{2^{n+1}}} = \\ & = \frac{\sin x}{2^{n+1} \cdot \sin \frac{x}{2^{n+1}}} \end{aligned}$$

Iz toga slijedi da tvrdnja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(4.) Dokazi: $\sum_{i=1}^n (2i+1)a_i = (n+1)^2 a_n - \frac{1}{2} n(n+1)$, $a_i = \sum_{j=1}^i \frac{1}{j}$

a) $a_i = \sum_{j=1}^i \frac{1}{j}$ $a_1 = 1$ $a_2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ $\Rightarrow a_n$ smo označili: $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$, da ne
 $a_3 = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{11}{6}$ pšemo u dokazu citaru sumu.

$$\vdots$$

b) $\sum_{i=1}^n (2i+1)a_i$ $a_1 = 3 \cdot 1 = 3$ $a_2 = 5 \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$ $\left\{ \begin{array}{l} 3 + \frac{15}{2} + \dots + (2n+1) \cdot a_n \end{array} \right.$

(1) baza indukcije:

$$n=1 \dots 3 = (1+1)^2 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 1(1+1) = 4 - 1 = 3 \checkmark$$

(2) pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi:

$$3 + \frac{15}{2} + \dots + (2n+1) \cdot a_n = (n+1)^2 a_n - \frac{1}{2} n(n+1)$$

(3) skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdnja vrijedi i za $n+1$, tj. moramo dokazati da vrijedi:

$$3 + \frac{15}{2} + \dots + (2n+1)a_n + (2(n+1)+1)a_{n+1} = (n+2)^2 a_{n+1} - \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$$

LIJEVA STRANA:

$$\begin{aligned} & (n+1)^2 a_n - \frac{1}{2} n(n+1) + (2n+3)(a_n + \frac{1}{n+1}) = \\ & = (n^2 + 2n + 1)a_n - \frac{1}{2}(n^2 + n) + 2na_n + 3a_n + \frac{2n+3}{n+1} = \\ & = a_n \cdot n^2 + a_n \cdot 2n + a_n - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} + 2na_n + 3a_n + \frac{2n+3}{n+1} = \\ & = a_n \cdot n^2 + a_n \cdot 4n + a_n \cdot 4 - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} + \frac{2n+3}{n+1} \end{aligned}$$

DEŠNA STRANA:

$$\begin{aligned} & (n+2)^2(a_n + \frac{1}{n+1}) - \frac{1}{2}(n+1)(n+2) = \\ & = (n^2 + 4n + 4)(a_n + \frac{1}{n+1}) - \frac{1}{2}(n^2 + 3n + 2) = \\ & = n^2 a_n + 4na_n + 4a_n + \frac{n^2 + 4n + 4}{n+1} - \frac{n^2 + 3n + 2}{2} = \\ & = a_n n^2 + a_n 4n + a_n 4 + \frac{(n+2)^2}{n+1} - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} - \frac{2n}{2} - 1 = \\ & = a_n n^2 + a_n 4n + a_n 4 - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} + \frac{2(n+2)^2 - 2n(n+1) - 2(n+1)}{2(n+1)} = \\ & = a_n n^2 + a_n 4n + a_n 4 - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} + \frac{2n^2 + 8n + 8 - 2n^2 - 2n - 2}{2(n+1)} = \\ & = a_n n^2 + a_n 4n + a_n 4 - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} + \frac{2(2n+3)}{2(n+1)} = \\ & = a_n \cdot n^2 + a_n \cdot 4n + a_n \cdot 4 - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} + \frac{2n+3}{n+1} \end{aligned}$$

Iz toga slijedi da tvrdnja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

5.

Dokazi:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} \geq \sqrt{n}$$

$$\left. \begin{array}{l} i=1 \dots \quad a_1 = 1 \\ i=2 \dots \quad a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ i=3 \dots \quad a_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ i=4 \dots \quad a_4 = \frac{\sqrt{4}}{4} = \frac{1}{2} \end{array} \right\}$$

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

(1) baza indukcije:

$$n=1 \dots \quad 1 \geq \sqrt{1} \geq 1 \quad \checkmark$$

(2) pretpostavka indukcije:

Potpovremo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi:

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$$

(3) skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdnja vrijedi i za $n+1$, tj. moramo dokazati da vrijedi:

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1}$$

$$\underbrace{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}}_{\text{PO PRETPOSTAVCI}} > \sqrt{n+1}$$

$$\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1} \quad | \cdot \sqrt{n+1}$$

$$\sqrt{n^2+n} + 1 \geq n+1$$

$$\sqrt{n^2+n} \geq n \quad \text{jedan je } \sqrt{n^2} = n \quad \text{pa je i } \sqrt{n^2+n} \geq n$$

Samo je jedan Mali Ivica!

Iz toga slijedi da tvrdnja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

⑥ Dokazi: $(2n)! > 3^n (n!)^2, n \geq 5$

① baza indukcije:

$$n=5: \dots (2 \cdot 5)! > 3^5 \cdot (5!)^2 \quad 3628800 > 703588 \quad \checkmark$$

② pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $(2n)! > 3^n (n!)^2, n \geq 5$.

③ skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdnja vrijedi i za $n+1$, tj. treba dokazati da vrijedi:

$$(2(n+1))! > 3^{n+1} ((n+1)!)^2$$

$$(2n+2)! > 3 \cdot 3^n (n+1)! (n+1)!$$

$$(2n)! (2n+1)(2n+2) > 3 \cdot 3^n (n!)^2 \cdot (n+1)^2$$

PO PRETPOSTAVCI

$$3^n (n!)^2 (2n+1)(2n+2) > 3^n (n!)^2 \cdot 3 \cdot (n+1)^2$$

$$(2n+1)(2n+2) > 3 \cdot (n+1)(n+1)$$

$$4n^2 + 6n + 3 > 3n^2 + 6n + 3 \quad \text{jedan je } 4n^2 > 3n^2$$

Iz toga slijedi da tvrdnja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

⑦ Dokazi:

$$5^{n-1} + 2^n = 3k$$

① baza indukcije:

$$n=1: \dots 5^{1-1} + 2^1 = 5^0 + 2 = 3 \text{ je djeljivo s } 3 \quad \checkmark$$

② Pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $5^{n-1} + 2^n = 3k$

③ Skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdnja vrijedi i za $n+1$, tj. treba dokazati da vrijedi: $5^{n+1-1} + 2^{n+1} = 3k$.

$$5^{n+1-1} + 2^{n+1} = 5 \cdot 5^{n-1} + 2 \cdot 2^n = 5(5^{n-1} + 2^n) + 5 \cdot 2^n + 2 \cdot 2^n =$$

$$5(5^{n-1} + 2^n) + 3 \cdot 2^n$$

$\underbrace{3k}_{\text{PO PRETPO-}} \underbrace{+ 2^n}_{\text{STAVCI}} = 3k + 2^n$

JALNO

Iz toga slijedi da tvrdnja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

⑧ Dokazi:

$$a_n = 2^{n-1} + 1$$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 3$$

$$a_{n+2} = 3 \cdot a_{n+1} - 2a_n$$

Samo je jedan Mati Ivica!

① baza indukcije:

$$n=1 \dots 2 = 2^{1-1} + 1 = 2^0 + 1 = 1 + 1 = 2 \checkmark$$

$$n=2 \dots 3 = 2^{2-1} + 1 = 2^1 + 1 = 2 + 1 = 3 \checkmark$$

② pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $a_n = 2^{n-1} + 1$, i da za neki $(n-1) \in \mathbb{N}$

$$\text{vrijedi: } a_{n-1} = 2^{n-2} + 1.$$

③ skok indukcije:

Treba dokazati da tvrdnja vrijedi i za $n+1$, tj. treba dokazati da vrijedi:
 $a_{n+1} = 2^n + 1$.

Ako vrijedi: $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ onda vrijedi i: $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$, pa treba dokazati da je: $3a_n - 2a_{n-1} = 2^n + 1$.

$$3a_n - 2a_{n-1} = 3 \cdot (2^{n-1} + 1) - 2 \cdot (2^{n-2} + 1) = 3 \cdot 2^{n-1} + 3 - 2 \cdot 2^{n-2} - 2 =$$

$$= 2^{n-1}(3-1) + 1 = 2^{n-1} \cdot 2 + 1 = 2^n + 1$$

Iz toga slijedi da tvrdnja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

2.2. CIJELI BROJEVI

= Cijeli brojevi

oznaka \mathbb{Z}

↳ definicija $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

= STAVAK 1.

↳ Teorem o dijeljenju:

Neka je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Onda postoji jednoznačno određeni cijeli brojevi q i r takvi da je:

$$m = nq + r, \quad 0 \leq r < n.$$

Broj q zove se nepotpunim kvocientom pri dijeljenju m s n , a r ostatom.

2.3. RACIONALNI BROJEVI

= Racionalni brojevi

oznaka \mathbb{Q}

↳ definicija $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \right\}$

= Aritmetička sredina u skupu \mathbb{Q} :

$$\begin{array}{c} m_1 \quad m_2 \\ \hline n_1 \quad n_2 \end{array} \quad \text{aritmetička sredina} = \frac{\frac{m_1}{n_1} + \frac{m_2}{n_2}}{2} = \frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{2 n_1 n_2} = \frac{m_3}{n_3}$$

↳ Svojstvo gustog skupa:

Skup \mathbb{Q} je gust skup, tj. između svaka 2 razlomka postoji još mnogo razlomaka.

Ali, sa druge strane čitar realni pravac ne može se „popuniti“ racionalnim brojevima, jer je primjerice $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

= PRIMJER 1.

Dokaži da broj $\sqrt{2}$ nije racionalan broj, odnosno dokazi da $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, tj.
 $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

↳ Dokaz se izvodi konsteči modus tollens (dokaz protuslovlja) koji glasi:

$$((\neg X \Rightarrow Y) \wedge \neg Y) \Rightarrow X.$$

Ovdje se izvodi zaključaj na ishodost suda "X", i to na sljedeći način: ako je ishod da je $\neg X \Rightarrow Y$, i ako je "Y" lažan, onda je sud "X" istinit.

↳ $X \dots \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$\neg X \dots \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n} \quad |^2, \quad m, n \in \mathbb{N} \text{ i oba broja nisu parna.}$$

$$2 = \frac{m^2}{n^2} \Rightarrow m^2 = 2n^2$$

↳ ako je m^2 parni, onda je i n parni, tj. $m=2k$ pa:

$$(2k)^2 = 2n^2$$

$$4k^2 = 2n^2$$

$$\Rightarrow n^2 = 2k^2$$

↳ ako je n^2 parni, onda je i n parni, tj. $n=2t$

Kako smo ustvrdili da ne mogu oba broja biti parni, onda je:

$X \dots \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$\neg X \dots \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

$Y \dots$ tvrdju: Nisu oba broja parni.

$\neg Y \dots$ tvrdju: Oba broja su parni.

Oduzimajući, naš dokaz nas je doveo u kontradikciju s ujetom, što znači da $\sqrt{2}$ nije racionalan broj.

↳ Simbolike:

$$\frac{m_1}{n_1} \quad \frac{m_2}{n_2}$$

↳ Usprihko tome što skup \mathbb{Q} ima svojstvo gustote postoji brojevi koji se ne nadjaju u njemu, oduzimajući brojnom pravcu postoji prazno mjesto u \mathbb{R} .

2.4. REALNI BROJEVI

= Realni brojevi

↳ znaka \mathbb{R}

↳ geometrijski prikaz: na brojnom pravcu

$$(-\infty) \quad \circ \quad (+\infty)$$

$$0 \quad r \in \mathbb{R}$$

= Svakom je realnom broju pripadala točka na brojnom pravcu i obratno.

= Ne postoji nijedan i nay već realni broj.

= Skup \mathbb{R} opisan je sa sljedećih 6 grupe aksioma:

= AKSIOM 1. = Aksiomi zbrajanja

↳ Na \mathbb{R} je definirana binarna operacija zbrajanja ($+$). S obzirom na tu operaciju, \mathbb{R} je komutativna grupa, tj. vrijedi:

$$Z1) \forall a \forall b \forall c \quad (a+b)+c = a+(b+c) \rightarrow \text{associativnost zbrajanja}$$

$$Z2) \exists 0 \in \mathbb{R} \quad \forall a \quad a+0 = 0+a = a \rightarrow \text{postoji jedan neutralni element}$$

$$Z3) \forall a \exists (-a) \quad a+(-a) = (-a)+a = 0 \rightarrow \text{postoji suprotan element}$$

$$Z4) \forall a \forall b \quad a+b = b+a \rightarrow \text{komutativnost}$$

= AKSIOM 2. = Aksiomi množenja

↳ Na \mathbb{R} je definirana binarna operacija množenja (\cdot). S obzirom na tu operaciju $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ je komutativna grupa, tj. vrijedi:

$$M1) \forall a \forall b \forall c \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \rightarrow \text{associativnost množenja}$$

$$M2) \exists 1 \in \mathbb{R} \quad \forall a \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \rightarrow \text{postoji jedan neutralni element}$$

$$M3) \forall a \exists a^{-1} \quad a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \rightarrow \text{postoji suprotan element}$$

Samo je jedan Mali bočac

$$M4) \forall a \forall b \quad a \cdot b = b \cdot a \rightarrow \text{komutativnost}$$

= AKSIOM 3. = Aksiomi (zakoni) distributivnosti

↳ Operacije zbrajanja i množenja povezane su međusobno na \mathbb{R}
zakonom distributivnosti.

$$D1) \forall a \forall b \forall c \quad (a+b) \cdot c = ac + bc \rightarrow \text{desna distributivnost množenja prema zbiru}$$

$$D2) \forall a \forall b \forall c \quad c \cdot (a+b) = ca + cb \rightarrow \text{lijeva distributivnost množenja prema zbiru}$$

= PRIMJEDBA 1.

↳ Skup u kojem vrijede aksiomi 1, 2, 3 zove se polje. Zato općenito o polju realnih brojeva. Obzirom da isti aksiomi vrijede i u skupu racionalnih brojeva, onda je i taj skup polje.

= AKSIOM 4. = Aksiom poretki (zakoni poretki)

↳ Na \mathbb{R} je definirana relacija poretki \leq , tako da vrijedi:

$$P1) \forall a \quad a \leq a$$

→ refleksivnost


$$P2) \forall a \forall b \quad (a \leq b) \wedge (b \leq a) \Rightarrow a = b \rightarrow \text{antisimetričnost}$$

$$P3) \forall a \forall b \forall c \quad (a \leq b) \wedge (b \leq c) \Rightarrow a \leq c \rightarrow \text{tranzitivnost}$$

$$P4) \forall a \forall b \quad a \leq b \vee b \leq a \rightarrow \text{potpuni poredek}$$

= PRIMJEDBA 2.

↳ Skup u kojem vrijede aksiomi P1, P2, P3 zove se djelomično (parcijalno) ureden skup, tj. u njemu postoje neusporedivi elementi.



↳ Skup u kojem vrijede aksiomi P1, P2, P3, P4 zove se potpuno ureden skup, tj. u njemu ne postoje neusporedivi elementi.

↳ Zbog toga se govori o uredenom polju realnih brojeva.

= AKSIOM 5. = Aksiomi monotoniye (zakoni monotoniye)

↳ U \mathbb{R} vrijede zakoni monotoniye za zbrajanje i množenje \therefore :

$$M1) \forall a \forall b \forall c \quad a \leq b \Rightarrow a+c \leq b+c \rightarrow \text{monotonost zbrajanja}$$

$$M2) \forall a \forall b \quad (0 \leq a) \wedge (0 \leq b) \Rightarrow 0 \leq a \cdot b \rightarrow \text{monotonost množenja}$$

= PRIMJEDBA 3.

↳ Svi do sada matrigeni aksiomi vrijede i u skupu \mathbb{Q} .

= AKSIOM 6. = Aksiomi potpunosti (neprekidnosti)

↳ Neka su $S_d : S_g \subset \mathbb{R}$ tako da je:

$$1) S_d \neq \emptyset, S_g \neq \emptyset$$

$$2) S_d \cup S_g = \mathbb{R}$$

$$3) \forall a \forall b \quad (a \in S_d) \wedge (b \in S_g) \Rightarrow a \leq b.$$

↳ Por podskupova S_d i S_g sa tim svojstvima zove se Dedekindov rez ili preoz, gdje je S_d donji skup rez, a S_g gornji skup rez.


↳ Tada postoji rezba točka sa sljedećim svojstvima:

A6.) Za svaki Dedekindov rez S_d, S_g postoji element $r \in \mathbb{R}$ tako

da vrijedi: $\forall a \in S_d \quad \forall b \in S_g \quad a \leq r \leq b.$

Broj r zove se remna točka rezba (S_d, S_g)

↳ Grafički:



= PRIMJERI 1.

↳ Za Dedekindov rez $(-\infty, r] \cup [r, \infty)$ gdje je $r^2 = 2$ pokazati se da rezba točka $r \notin \mathbb{Q}$, što znači da \mathbb{Q} nije potpun (neprekidan).


□ OMEDENI SKUPOVNI SUPREMUM I INFIMUM SKUPA.

-DEFINICIJA 1.

↪ Za podskup $S \subset \mathbb{R}$ kažemo da je **omeden odgođen** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da za sve $x \in S$ vrijedi $x \leq M$. Takav M zovemo **gornja meda skupa S** .

↪ Za podskup $S \subset \mathbb{R}$ kažemo da je **omeden odgođen** ako postoji $m \in \mathbb{R}$ takav da za sve $x \in S$ vrijedi $m \leq x$. Takav m zovemo **donja meda skupa S** .

↪ Grafički:



-DEFINICIJA 2.

↪ **Infimum** od S je najveća donja meda (ako postoji). Označa: $\inf S$. Ako je $\inf S$ sadržan u S onda ga zovemo **minimumom skupa S** i označavamo ga sa $\min S$.

↪ **Supremum** od S je najmanja gornja meda (ako postoji). Označa $\sup S$. Ako je $\sup S$ sadržan u S onda ga zovemo **maksimumom skupa S** i označavamo ga sa $\max S$.

=PRIMJER 1.

$$S_1 = [3, 5] \rightarrow \inf S_1 = 3$$

$$S_2 = (3, 5) \rightarrow \inf S_2 = 3, \text{ ali } 3 = \min S_2$$

=PRIMJER 3.

$$S_1 = (3, 5] \rightarrow \sup S_1 = 5, \text{ ali } 5 = \max S_1$$


$$S_2 = [3, 5) \rightarrow \sup S_2 = 5$$

=Svojstva supremuma (infimuma):

$$1) \forall x \in S \Rightarrow x \leq \sup S$$

$$2) \forall \epsilon > 0 \exists x \in S \quad (x > \sup S - \epsilon)$$

↪ Grafički:



=AKSIOM 7. =Aksiom ekvivalentan aksiomu potpunosti (AG)

AG') Svaki odgođeni omeden podskup skupa \mathbb{R} ima supremum u \mathbb{R} .

=PRIMJER 4.

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\} \rightarrow \sup S_1 = \sqrt{2}$$

$$S_2 = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\} \rightarrow \text{nema sup } S_2$$

-DEFINICIJA 3.

↪ Za $a, b \in \mathbb{R}$ definiramo razliku:

$$a - b := a + (-b)$$

↪ Za $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ definiramo kvocijent:

$$\frac{a}{b} := a \cdot b^{-1}$$

=Svojstva: 1.) $\frac{a}{b} \cdot c = \frac{ac}{b}$

$$2.) \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

=Vrste intervala u \mathbb{R} :

1.) otvoreni $\rightarrow (a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$, $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

2.) zatvoreni $\rightarrow [a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$, $a, b \in \mathbb{R}$

3.) polivotvoreni (poluzatvoreni) $\rightarrow (a, b], [a, b), (-\infty, b], [b, \infty)$, $a, b \in \mathbb{R}$

Samo je jedan Mali Ivica!

= STAVAK 1. = Arhimedov teorem ($\exists a_6, a_6'$)

\hookrightarrow Za svaki pozitiven realni broj $x > y$ postoji takav n takav da je $nx > y$.

= STAVAK 2. = Cantorov teorem ($\exists a_6, a_6'$)

\hookrightarrow Neka je $[a_n, b_n]$ skup od svih zatvorenih intervala u \mathbb{R} takih da je $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Onda je skup $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ neprazan i postoji $x \in \mathbb{R}$ koji se nalazi u svim intervalima.


□ APSOLUTNA VRJEDNOST I UDALJENOST U \mathbb{R}

= DEFINICIJA 4.

\hookrightarrow Funkcija koja realnom broju x pridružuje broj $|x|$ ako je $x \geq 0$, a $-x$ ako je $x < 0$, zove se **apsolutna vrijednost** realnog broja a , označom $|x|$.
Zapisujemo:


$$|x| := \begin{cases} x & \text{za } x \geq 0 \\ -x & \text{za } x < 0 \end{cases}$$

\hookrightarrow Graf funkcije $y = |x|$:



= Broj $|x|$ predstavlja udaljenost realnog broja x od 0 na realnom pravcu.
Broj $|x-a|$ predstavlja udaljenost točaka (x) i a . Vrijedi:

$$|x-a| < \epsilon \Leftrightarrow -\epsilon < x-a < \epsilon \Leftrightarrow a-\epsilon < x < a+\epsilon$$



= Za sve realne brojeve a i b vrijedi nejednakost trougla:

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

DOKAŽ. Rastavimo nejednakost na 4 slučaja:

$$1.) a=+ \quad b=+$$

$$|a+a| \leq |a| + |a|$$

$$a+b \leq a+a \quad \checkmark$$

$$2.) a=+ \quad b=-$$

$$|a+a+(-b)| \leq |a| + |-b|$$

$$|a-b| \leq a+b \quad \checkmark$$

$$3.) a=- \quad b=+$$

$$|-a+(-b)| \leq |-a| + |-b|$$

$$|a+b| \leq a+b \quad \checkmark$$

$$4.) a=- \quad b=-$$

$$|-a+(-b)| \leq |a| + |-b|$$

$$|a-b| \leq a+b \quad \checkmark$$

2.5. KOMPLEKSNI BROJEVI

= Kompleksni brojevi

↳ označak \mathbb{C}

↳ definicija: $\mathbb{C} := \{a+bi : a, b \in \mathbb{R}\}$

↳ zapis: $z = x+yi$

\rightarrow kompleksni broj

$x \rightarrow$ realni dio broja

$y \rightarrow$ imaginarni dio broja

$i \rightarrow$ imaginarna jedinica

Samo je jedan Mali Ivica!

= Neka svojstva:

↳ dva su broja jednakia $z_1 = z_2$ ($z_1 = a+bi$, $z_2 = c+di$) ako i samo ako su im

realni diojovi jednakci i imaginarni diojovi jednakci, tj. ako vrijedi:


$$a=c \wedge b=d \quad \text{onda } a+bi = c+di$$

□ GAUSSOVA RAVNINA

= skup kompleksnih brojeva \mathbb{C} možemo poštavjeti s Gaussovom ravninom;

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ koju čine svi poredani dvojni realnih brojeva (a, b) .

↳ Prikaz:



= DEFINICIJA 1.

- ↳ Vrijedi:
- 1) $(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) := (x_1+x_2, y_1+y_2)$
 - 2) $(x_1, y_1) \odot (x_2, y_2) := (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$

↳ Posebice:

$$(0, 1)^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0)$$

Sada uvedimo oznake:

$$(0, 1) = i \Rightarrow i^2 = -1$$

$$(x_1, y_1) = (x_1 + iy_1) \rightarrow \text{zapis para}$$

$$\hookrightarrow \text{Vrijedi: } 1) z_1 + z_2 = (x_1 + y_1i) + (x_2 + y_2i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$$

$$2) z_1 \cdot z_2 = (x_1 + y_1i)(x_2 + y_2i) = (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i$$

= Ostale operacije!

1) Konjugiranje kompleksnog broja $z = x+yi$

= DEFINICIJA 2.

↳ Za zadani kompleksni broj $z = x+yi$ definiramo konjugirano kompleksni broj od z sa: $\bar{z} := x-yi$

= Svojstva:

$$1) \bar{\bar{z}} = z$$

$$\text{DOKAZ: } \bar{\bar{z}} = \overline{x+yi} = \overline{x-yi} = x+yi = z \checkmark$$

$$2) \bar{z_1+z_2} = \bar{z_1} + \bar{z_2}$$

DOKAZ:

$$\bar{z_1+z_2} = \overline{x_1+yi+x_2+y_2i} = (x_1+x_2) + (y_1+y_2)i =$$

$$= (x_1+x_2) - (y_1+y_2)i = (x_1-y_1i) + (x_2-y_2i) =$$

$$= \bar{z_1} + \bar{z_2} \checkmark$$

$$3) \bar{z_1 \cdot z_2} = \bar{z_1} \cdot \bar{z_2}$$

$$\text{DOKAZ: } \bar{z_1 \cdot z_2} = \overline{(x_1+yi) \cdot (x_2+y_2i)} = (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i =$$

$$4) \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}, \quad \overline{z_2} \neq 0$$

$$\text{DOKAZ: } \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \left(z_1 \cdot \frac{1}{z_2} \right) = \overline{z_1} \cdot \left(\frac{1}{\overline{z_2}} \right) =$$

$$= \overline{z_1} \cdot \left(\frac{x-yi}{(x+yi)(x-yi)} \right) = \overline{z_1} \cdot \left(\frac{x_2-y_2i}{x_2^2+y_2^2} \right) =$$

$$= \overline{z_1} \cdot \frac{x_2+y_2i}{x_2^2+y_2^2} = \overline{z_1} \cdot \frac{x_2+y_2i}{(x_2+y_2i)(x_2-y_2i)} = \overline{z_1} \cdot \frac{1}{x_2-y_2i}$$

$$= \overline{z_1} \cdot \frac{1}{\overline{z_2}} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \quad \checkmark$$

2) Apsolutna vrijednost kompleksnog broja $z = x+yi$

= DEFINICIJA 3.

\hookrightarrow Za zadani kompleksni broj $z = x+yi$ definiramo **apsolutnu vrijednost kompleksnog broja z** kao: $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$, to je udaljenost broja z od ishodišta.

= Svojstva:

$$1) z \cdot \overline{z} = |z|^2$$

$$\text{DOKAZ: } z \cdot \overline{z} = (x+yi)(x-yi) = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad \checkmark$$

$$2) |z_1 \cdot z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$\text{DOKAZ: } |z_1 \cdot z_2|^2 = (z_1 z_2) (\overline{z_1} \overline{z_2}) = z_1 z_2 \overline{z_1} \overline{z_2} = z_1 \overline{z_1} z_2 \overline{z_2} = |z_1|^2 |z_2|^2$$

$$\text{Iz toga slijedi: } |z_1 \cdot z_2| = |z_1| |z_2|. \quad \checkmark$$

$$3) \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\text{DOKAZ: } \left| \frac{z_1}{z_2} \right|^2 = \frac{z_1}{z_2} \cdot \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|^2}{|z_2|^2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \checkmark$$

$$\text{Iz toga slijedi: } \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \checkmark$$

$$4) |z^n| = |z|^n$$

DOKAZ: Pomoću matematičke indukcije:

1) baza indukcije:

$$n=1 \dots z^1 = z^1 \Rightarrow z = z \quad \checkmark$$

2) pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $|z^n| = |z|^n$.

3) skok indukcije:

Treba dokazati da turduja vrijedi i za $n+1$, tj. da vrijedi: $|z^{n+1}| = |z|^{n+1}$.


$$|z^{n+1}| = |z^n \cdot z| = |z^n| \cdot |z| = |z|^n \cdot |z| = |z|^{n+1} \quad \checkmark$$

Iz toga slijedi da turduja vrijedi za svaki $n \in \mathbb{N}$.

5) Nejednakost trokuta:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

DOKAZ: Pomoću grafa, Gaussove ravnine. Nacrtali ćemo trokut u Gaussovoj ravni na koji odgovara kompleksnim brojevima z_1, z_2 i $z_1 + z_2$. Kako znamo da je u trokutu duljina svake stranice manja od duljina ostalih duga, turduja će biti dokazana:



Samo je jedan Moći Iznad!

- PRIMJER 1.

↪ Dokazi da je $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}$

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \left| \frac{1}{x+yi} \right| = \left| \frac{x-yi}{x^2+y^2} \right| = \sqrt{\left(\frac{x}{x^2+y^2} \right)^2 + \left(\frac{-y}{x^2+y^2} \right)^2} = \sqrt{\frac{x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{|z|}$$

- PRIMJER 2.


↪ Skicirati geometrijsko mjesto točaka $z \in \mathbb{C}$ za koje vrijedi $|z - z_0| \leq \epsilon$, $z_0 \in \mathbb{C}$.

$$|z - z_0| = |(x+yi) - (x_0+yi_0)| = |(x-x_0) + (y-y_0)i| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$$

$$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \leq \epsilon$$

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \leq \epsilon^2$$


↪ zatvorenji krug s (x_0, y_0) , $r = \epsilon$



↪ Dakle skup $\{z \mid |z - z_0| \leq \epsilon\}$ predstavlja kompleksne brojeve unutar zatvorenog kruga sa središtem u točki z_0 sa radijusom ϵ .

□ TRIGONOMETRIJSKI PRIKAZ KOMPLEKSNOG BROJA

↪ Svakom kompleksnom broju $z = x+yi$ odgovara točka $T(x, y)$ u Gaussovoj ravni, koji poistovjećujemo sa z .



= DEFINICIJA 4.

1) $|z|$ je udaljenost kompleksnog broja od ishodišta, tj.: $|z| := \sqrt{x^2+y^2}$.

2) $\arg z = \varphi$ je kut kojeg vektor $x+yi$ zatvara s pozitivnom realnom osi, tj.: $\tan \varphi = \frac{y}{x}$.

= Sa slike vidimo da vrijedi:

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

Iz toga možemo dobiti trigonometrijski oblik broja z kao:

$$x+yi = r \cos \varphi + i r \sin \varphi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Ako uvedemo novu oznaku:

$$\cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$$

možemo pisati: $z = x+yi = r \cdot e^{i\varphi}$

-PRIMER 3.

↳ Prikazi u trigonometrijskom obliku sljedeće brojeve:

a) $z = -1 + i$

→ III kvadrant

→ $|z| = \sqrt{2}$

→ $\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{-1} = -1 \Rightarrow \varphi = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

$z = \sqrt{2} \cdot \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$

Samo je jedan Mali Mističal

b) $z = 1 - i$

→ IV kvadrant

→ $|z| = \sqrt{2}$

→ $\operatorname{tg} \varphi = \frac{-1}{1} = -1 \Rightarrow \varphi = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$

c) $z = -\sqrt{3} - i$

→ III kvadrant

→ $|z| = \sqrt{3^2 + 1^2} = 2$

→ $\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$ $\Rightarrow \varphi = \frac{7\pi}{6}$

$z = 2 \cdot \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right)$

= Operacije s kompleksnim brojevima u trigonometrijskom obliku

(1) množenje 2 broja

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i (\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)) = \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$

↳ Dakle:

$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$

$\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2$

↳ poseban slučaj kad je $z_1 = z_2 = z$:

$z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$

nazivamo pravim Moivre-ovom formulom za potenciranje

-PRIMER 4.

$$\begin{aligned} \hookrightarrow (-\sqrt{3} - i)^{12} &= \left(2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) \right)^{12} = 2^{12} \cdot (\cos 14\pi + i \sin 14\pi) = 2^{12} (\cos 0 + i \sin 0) \end{aligned}$$

□ KORIJEN KOMPLEKSNOG BROJA

= Neka je zadano $z = r e^{i\varphi}$. Tražimo kompleksni broj w , takav da vrijedi:

$w^n = z$. Traženi broj označujemo sa $w := \sqrt[n]{z}$.

Dakle: $z = r e^{i\varphi}$

$w = p e^{i\psi}, w^n = z \rightarrow$ traži se

$w^n = z$

$p^n e^{in\psi} = r e^{i\varphi}$

$\Rightarrow p^n = r \Rightarrow p = \sqrt[n]{r}$

$\Rightarrow n\psi = \varphi + 2k\pi \Rightarrow \psi = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}, k = 0, 1, \dots, n-1$

= Kompleksni broj $z \neq 0$ ima točno n n -tih korijena koji leže u vrhovima pravilnog n -takta upisanog u kvadrat poluprečnika $\sqrt[n]{r}$.


= Iz tog je izvodimo Moivreovu formulu za radikiranje (korijenovanje):

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \cdot \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

ZADACI (DZ.2. DRUGI DIO)


(4) Stavirati:

a) $|z-4+5i| = 3$
 $|x+yi-4+5i| = 3$
 $|x-4+i(y+5)| = 3$
 $\sqrt{(x-4)^2 + (y+5)^2} = 3$
 $(x-4)^2 + (y+5)^2 = 9$
Kružnica: $S(4, -5)$, $r = 3$



Samo je jedan mali greška

b) $|z+i| + |z-i| = 3$
 $|x+yi+i| + |x+yi-i| = 3$
 $\sqrt{x^2 + (y+1)^2} = 3 - \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$
 $x^2 + (y+1)^2 = 9 - 6\sqrt{x^2 + (y-1)^2} + x^2 + (y-1)^2$
 $(y+1)^2 - (y-1)^2 - 9 = -6\sqrt{x^2 + (y-1)^2}$
 $y^2 + 2y + 1 - y^2 + 2y - 1 - 9 = -6\sqrt{x^2 + (y-1)^2}$
 $4y - 9 = -6\sqrt{x^2 + (y-1)^2}$
 $16y^2 - 72y + 81 = 36x^2 + 36(y-1)^2$
 $16y^2 - 72y + 81 - 36x^2 - 36y^2 + 72y - 36 = 0$
 $-36x^2 - 20y^2 + 45 = 0$
 $36x^2 + 20y^2 = 45$
 $\frac{x^2}{\frac{45}{36}} + \frac{y^2}{\frac{45}{20}} = 1$
 $\frac{x^2}{\frac{5}{4}} + \frac{y^2}{\frac{9}{4}} = 1$
dipsa: $a^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{5}}{2} = 1,12$
 $b^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow b = \frac{3}{2} = 1,5$
 $c = \sqrt{\frac{5}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{-\frac{1}{4} + \frac{9}{4}}$



(10) Stavirati:


$$\operatorname{Im}\left(\frac{1}{z+i}\right) = 1$$

$$\frac{1}{z+i} = \frac{1}{x+(y+1)i} \cdot \frac{x-i(y+1)}{x-i(y+1)} = \frac{x-i(y+1)}{x^2 + (y+1)^2} \Rightarrow \operatorname{Im}\left(\frac{1}{z+i}\right) = \frac{-y-1}{x^2 + (y+1)^2} = 1$$

$$-y-1 = x^2 + y^2 + 2y + 1$$

$$x^2 + y^2 + 3y + 2 = 0$$

$$x^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$
Kružnica: $S(0, -\frac{3}{2})$, $r = \frac{1}{2}$



$$\textcircled{11.} \quad \arg z = \frac{2\pi}{3} \rightarrow z = 2\sqrt{3} \cdot \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2\sqrt{3} \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) =$$

$$|z| = 2\sqrt{3}$$

$z - 4i$ je?

$$= -\sqrt{3} + 3i$$

$$\rightarrow z - 4i = -\sqrt{3} + 3i - 4i = -\sqrt{3} - i$$

$$\rightarrow |z| = \sqrt{3+1} = 2, \text{ III kvadrant}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6} + \frac{7\pi}{6}$$

$$z - 4i = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right)$$

\textcircled{12.}

$$\text{a)} \quad z = (\sqrt{3} - i)^7$$

$$\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}$$

$$*) \sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$$

$$|z| = 2, \text{ IV kvadrant}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}$$

$$z = \left[2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) \right]^7 = 2^7 \cdot \left(\cos \frac{77\pi}{6} + i \sin \frac{77\pi}{6} \right) =$$

$$\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}$$

$$\frac{2^7 \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)}{\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}} = 2^7 \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{12} \right) \right) =$$

$$= 2^7 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = 2^7 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2^6 (-\sqrt{2} + i \sqrt{2})$$

$$\text{b)} \quad z = \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^7 \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$*) \quad -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$|z| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1, \text{ II kvadrant}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$$

$$z = \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)^7 \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) =$$

$$= \left(\cos \frac{34\pi}{3} + i \sin \frac{34\pi}{3} \right) \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) =$$


$$= \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) =$$

Samo je jedan! Mati Ivica!

$$= \cos\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{5\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{5\pi}{12}\right) = \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$$


(13.)

a) $\arg(z^4) = \pi$
 $4\arg z = \pi + 2k\pi$
 $\arg z = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$
 \hookrightarrow provac $y=x$
 $y=-x$



Samo je jedan Mal Ivica!

b) $\arg(z^6) = \pi$
 $6\arg z = \pi + 2k\pi$
 $\arg z = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$
 \hookrightarrow provac $-x=0$
 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$
 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$
 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}y$
 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}y$



(14.)

a) $z = \sqrt[3]{i} = \sqrt[3]{\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}}$
 $\Rightarrow i = \cdot$
 $|z| = 1$
 $\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{0} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$


opcj: $\sqrt[3]{1} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right), k=0,1,2$

$$k=0 \dots z_0 = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2}$$

$$k=1 \dots z_1 = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2}$$

$$k=2 \dots z_2 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i$$

skica:



b) $z = \sqrt[7]{1} = \sqrt[7]{\cos \pi + i \sin \pi}$

*) $1 =$

$|z| = 1$

$\operatorname{tg} \varphi = \frac{0}{1} \Rightarrow \varphi = \pi$

opcija: $\sqrt[7]{1} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{7} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{7} \right), k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$

$k=0 \dots z_0 = \cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7}$

$k=1 \dots z_1 = \cos \frac{3\pi}{7} + i \sin \frac{3\pi}{7}$

$k=2 \dots z_2 = \cos \frac{5\pi}{7} + i \sin \frac{5\pi}{7}$


$k=3 \dots z_3 = \cos \pi + i \sin \pi$

$k=4 \dots z_4 = \cos \frac{9\pi}{7} + i \sin \frac{9\pi}{7}$

$k=5 \dots z_5 = \cos \frac{11\pi}{7} + i \sin \frac{11\pi}{7}$

$k=6 \dots z_6 = \cos \frac{13\pi}{7} + i \sin \frac{13\pi}{7}$

slučaj:



c) $z = \sqrt[8]{-1 - \sqrt{3}i} = \sqrt[8]{2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)}$

*) $-1 - \sqrt{3}i =$

$|z| = 2, \text{ III kvadrant}$

$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{4\pi}{3}$

opcija: $\sqrt[8]{2} \cdot \left(\cos \frac{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi}{8} + i \sin \frac{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi}{8} \right), k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

$k=0 \dots z_0 = \sqrt[8]{2} \cdot \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

$k=1 \dots z_1 = \sqrt[8]{2} \cdot \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$

$k=2 \dots z_2 = \sqrt[8]{2} \cdot \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$

$k=3 \dots z_3 = \sqrt[8]{2} \cdot \left(\cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right)$


$k=4 \dots z_4 = \sqrt[8]{2} \cdot \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right)$

$$k=5 \dots z_5 = 2\sqrt{8} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right)$$

$$k=6 \dots z_6 = 2\sqrt{8} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)$$

$$k=7 \dots z_7 = 2\sqrt{8} \left(\cos \frac{23\pi}{12} + i \sin \frac{23\pi}{12} \right)$$

skica:



Samo je jedan Mali Ivica!

$$(15.) z^4 = ((\sqrt{3}+i)(1-i)^2)^8$$

$$*) \sqrt{3}+i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$|z|=2$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$$

$$*) 1-i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$$

$$|z|= \sqrt{2}, \text{ kv.}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$$

$$z^4 = \left(2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \cdot \left(\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) \right)^7 \right)^8 =$$

$$= \left(2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \cdot \left(8\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) \right) \right)^8 =$$

$$= \left(16\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) \right)^8 =$$

$$= 16^8 \left(\cos \frac{40\pi}{3} + i \sin \frac{40\pi}{3} \right)$$

$$\Rightarrow z = \sqrt[4]{16^8} \cdot \left(\cos \frac{\frac{40\pi}{3} + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{40\pi}{3} + 2k\pi}{4} \right), k=0,1,2,3$$

$$k=0 \dots z_0 = 512 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$k=1 \dots z_1 = 512 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$k=2 \dots z_2 = 512 \left(\cos \frac{9\pi}{3} + i \sin \frac{9\pi}{3} \right)$$

$$k=3 \dots z_3 = 512 \left(\cos \frac{13\pi}{6} + i \sin \frac{13\pi}{6} \right)$$

$$(16.) z^6 + z^4 + z^2 + 1 = 0$$

$$z^4(z^2+1) + (z^2+1) = 0$$

$$(z^4+1)(z^2+1) = 0$$

$$*) z^4+1=0$$

$$-1 \Rightarrow$$

$$|z|=1$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{0}{1} \Rightarrow \varphi = \pi$$

$$z = \sqrt[4]{\cos \pi + i \sin \pi}$$

$$\text{Opći: } z = \cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{4}, \quad k=0,1,2,3$$

$$k=0 \dots z_0 = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$k=1 \dots z_1 = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$k=2 \dots z_2 = \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$k=3 \dots z_3 = \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$*) z^2 - 1 = 0 \quad z = \sqrt{\cos \pi + i \sin \pi}$$

$$z^2 = -1$$

$$z = \sqrt{-1}$$

$$\text{Opći: } z = \cos \frac{\pi + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{2}, \quad k=0,1$$

$$k=0 \dots z_0 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$$

$$k=1 \dots z_1 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i$$

$$17. \quad z^8 + 2z^4 + 4 = 0$$

$$z^4 = t$$

$$t^2 + 2t + 4 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-16}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}i}{2} = -1 \pm \sqrt{3}i$$

$$t_1 = -1 + \sqrt{3}i$$

$$z^4 = -1 + \sqrt{3}i$$

$$z = \sqrt[4]{-1 + \sqrt{3}i}$$

$\hookrightarrow |z|=1$, II kv.

$$\operatorname{tg} \varphi = \sqrt{3} \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$$

$$z = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{4} \right)$$

$$k=0 \dots \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$k=1 \dots \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$k=2 \dots \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$k=3 \dots \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{8\pi}{6} + i \sin \frac{8\pi}{6} \right)$$

$$t_2 = -1 - \sqrt{3}i$$

$$z^4 = -1 - \sqrt{3}i$$

$$z = \sqrt[4]{-1 - \sqrt{3}i}$$

$\hookrightarrow |z|=1$, III kv.

$$\operatorname{tg} \varphi = -\sqrt{3} \rightarrow \varphi = \frac{4\pi}{3}$$

$$z = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi}{4} \right)$$

$$k=0 \dots \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$k=1 \dots \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$k=2 \dots \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$k=3 \dots \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$$

$$18. \quad z^{10} + \overline{z} = 0 \quad | \cdot z$$

$$z^{11} + |z|^2 = 0$$

$$z^{11} = -|z|^2 \quad \rightarrow z=0$$

$$r^{10} (\cos 11\varphi + i \sin 11\varphi) = -1$$

$$r^9 (\cos 11\varphi + i \sin 11\varphi) = -1$$

$$r^9 (\cos 11\varphi + i \sin 11\varphi) = \cos \pi + i \sin \pi$$

$$\hookrightarrow r^9 = 1 \quad 11\varphi = \pi + 2k\pi$$

$$r=1 \quad \varphi = \frac{\pi}{11} + \frac{2k\pi}{11}, \quad k=0-10$$

$$z_1 = \cos \frac{\pi}{11} + i \sin \frac{\pi}{11}$$

$$z_2 = \cos \frac{3\pi}{11} + i \sin \frac{3\pi}{11}$$

$$z_3 = \cos \frac{5\pi}{11} + i \sin \frac{5\pi}{11}$$

$$z_4 = \cos \frac{7\pi}{11} + i \sin \frac{7\pi}{11}$$

$$z_5 = \cos \frac{9\pi}{11} + i \sin \frac{9\pi}{11}$$

$$z_6 = \cos \pi + i \sin \pi$$

$$z_7 = \cos \frac{13\pi}{11} + i \sin \frac{13\pi}{11}$$

$$z_8 = \cos \frac{15\pi}{11} + i \sin \frac{15\pi}{11}$$

$$z_9 = \cos \frac{17\pi}{11} + i \sin \frac{17\pi}{11}$$

$$z_{10} = \cos \frac{19\pi}{11} + i \sin \frac{19\pi}{11}$$

$$z_{11} = \cos \frac{21\pi}{11} + i \sin \frac{21\pi}{11}$$

19. $\arg z = \frac{2\pi}{3}$, II kvadrant !!

$$|z+1| = \sqrt{7}$$

I) $\frac{y}{x} = -\sqrt{3} \Rightarrow y = -\sqrt{3}x$

II) $|z+1| = \sqrt{7}$
 $|x+y+i| = \sqrt{7}$

$$\begin{aligned} \sqrt{(x+1)^2 + y^2} &= \sqrt{7} \\ (x+1)^2 + y^2 &= 7 \end{aligned}$$

I ; II

$$(x+1)^2 + 3x^2 = 7$$

$$x^2 + 2x + 1 + 3x^2 - 7 = 0$$

$$4x^2 + 2x - 6 = 0$$

$$2x^2 + x - 3 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{4} = \frac{-1 \pm 5}{4}$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -\frac{3}{2}$$

$$y_1 = -\sqrt{3} \quad y_2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

Samo je jedan Mali Ispit!

$$\begin{aligned} z_1 &= 1 - i\sqrt{3} \\ z_2 &= -\frac{3}{2} + i\frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

20. $|z^4 + i| = |z^4 + 1| = 1$

I) $|z+i| = |z+1|$

$$\begin{aligned} |R+i+i| &= |R+i+1| \\ R^2 + (1+1)^2 &= (R+1)^2 + 1^2 \end{aligned}$$

$$R^2 + 1^2 + 2i + 1 = R^2 + 2R + 1 + 1^2$$

$$2i = 2R$$

$$i = R$$

$$\rightarrow z_0 = 0$$

1) $z^4 = 0$

2) $z^4 = -1-i$

$$z = 4\sqrt{-1-i}$$

$$\hookrightarrow |z| = \sqrt{2}, 3kV.$$

$$\operatorname{tg} \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$$

$$z = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}{4} \right), k=0,1,2,3$$

$$k=0 \dots z_1 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{3\pi}{16} + i \sin \frac{3\pi}{16} \right)$$

$$k=1 \dots z_2 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{11\pi}{16} + i \sin \frac{11\pi}{16} \right)$$

$$k=2 \dots z_3 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{19\pi}{16} + i \sin \frac{19\pi}{16} \right)$$

$$k=3 \dots z_4 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{27\pi}{16} + i \sin \frac{27\pi}{16} \right)$$

3. MATRICE

Samo jedan Mali Ivica!

3.1. DEFINICIJA I PRIMJERI MATRICA.

= DEFINICIJA 1.

↳ Matrica je pravokutna tablica realnih brojeva sa m redak i n stupaca. Posebice, ako je $m=n$, matrica se zove kvadratna matrica reda n.

= PRIMJER 1.

↳ Matrice primjeri:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \text{matrica tipa (formata) } 2 \times 3, (2 \times 3), \text{ t.zv. pravokutna matrica}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{matrica tipa } 2 \times 1, (2 \times 1), \text{ t.zv. vektor stupac}$$

= Zapis matrice:

$$A = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} i\text{-ti redak od } A \\ j\text{-ti stupac od } A \end{array}$$

= Zapis elementa matrice:

$$A = (a_{ij}) \quad A \rightarrow \text{matrica} \\ i \rightarrow \text{indeks redka} \\ j \rightarrow \text{indeks stupca} \\ a_{ij} \rightarrow \text{opći element matrice}$$

$$m \left\{ \begin{array}{|c|} \hline // \text{A} // \\ \hline \end{array} \right\} \rightarrow \text{za isticanje formata matrice A, } m \times n$$

= DEFINICIJA 2.

↳ Jednakost matrica:

Dvije matrice, A i B su jednake, označom $A=B$, ako su istog tipa i ako je $(A)_{ij} = (B)_{ij} \forall i, \forall j$.

□ PRIMJERI MATRICA

1) Nul-matrica

↳ Matrica čija su svi elementi nule naziva se nul-matrica, oznaka $\mathbf{0}$.

↳ Zapis:

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

2) Dijagonalna matrica

↳ Matrica koja je istjedno kvadratna i koja su svi elementi van dijagonale jednaki nuli ($a_{ij} = 0, i \neq j$).

↳ Zapis:

$$A = \begin{bmatrix} c_{11} & & & \\ & c_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & 0 & & c_{nn} \end{bmatrix}$$

↳ Primjer:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3) Jedinčina matrica

↳ Jedinčina matrica je dijagonalna matrica čiji su dijagonalni elementi jednaki jedan, oznaka I, E .

↳ Zapis:

$$I = (S_{ij}), \quad S_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{za } i=j \\ 0 & \text{za } i \neq j \end{cases} \quad \rightarrow (S_{ij}) - \text{Kronekerov simbol}$$

↳ Primjer:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Samo je jedan Mati Ispit!

4) Trokutasta matrica

→ Kvadratna matrica je gornja trokutasta ako su svi elementi ispod glavne dijagonale jednaki nula.

Zapis:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{bmatrix} \rightarrow \text{gornji trokut}$$

→ Kvadratna matrica je donja trokutasta ako su svi elementi iznad glavne dijagonale jednaki nula.

Zapis:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & \dots & a_{n(n-1)} & a_{nn} \end{bmatrix} \rightarrow \text{donji trokut}$$

5) Transponirana matrica

↳ Matrica B je transponirana matrica matrice A ako vrijedi da je:

$$(B)_{ij} = (A)_{ji}, \quad \forall i, \forall j \text{ ili } b_{ij} = a_{ji}.$$

↳ Postupak: Elemente prve retke matrice A zapisemo na mjesto prve stupca matrice B , i tako redom.

↳ Zapis:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

6) Vektor matrica

↳ Matrica kojoj ima samo 1 redak/stupac, pa govorimo o vektor-retku, vektor-stupcu.

↳ Zapis:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \quad A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$$

↳ Transponiraje:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \quad A^T = [a_1, a_2, \dots, a_n]$$

7) Simetrična matrica

↳ Kvadratna matrica koja se zrcaljuje s obrtom na dijagonalu ne mijenja, tj. $A^T = A$.

↳ Primjer:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

= PRIMER 2.

↳ Transponiraj:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad (2 \times 3)$$

$$B^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \quad (3 \times 2)$$

Samo je jedan Mali Ivica!

3.2. OPERACIJE S MATRICAMA

= Skup svih matrica istog tipa $m \times n$ označavamo sa $\mathcal{M}_{m,n}$.

= DEFINICIJA 1.

↳ Na skupu $\mathcal{M}_{m,n}$ definiraju se dve operacije:

1) zbrojne matrice

↳ Zbroj dviju matrica A i B je matrica s elementima:

$$(A+B)_{ij} := (A)_{ij} + (B)_{ij}.$$

Da bi zbrojni matrica bio definiran, obje matrice moraju biti istog tipa. Rezultat zbrojanja je opet matrica, istog tipa $m \times n$.

2) množenje matrice skalarom

↳ Neka je $\lambda \in \mathbb{R}$ bilo koji skalar, te $A \in \mathcal{M}_{m,n}$. Umnožak matrice A skalarom λ je matrica $\lambda \cdot A$ tipa $m \times n$ tako da je:

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot (A)_{ij} \quad \forall i, \forall j.$$

Dakle, matrica se množi skalarom tako da se svaki njezin element pomnoži tim skalarom.

= PRIMER 1.

a) zbrajajuće matrica:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 4 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \text{nije definiran}$$

b)

$$5 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 0 & 20 & 35 \end{bmatrix}$$

$$(-1) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -A$$

= PRIMEDBA 1.

↳ Matrice tipa $\mathcal{M}_{m,n}$ čine komutativnu grupu s obzirom na operaciju zbrajanja matrica.

Postoji: - neutralni element je nul-matrica

- suprotni element je $-A$ matrica

Vrijedi: $A + (-A) = 0$

3.3. ALGEBRA. MATRICA

- DEFINICIJA 1.

↳ Množenje matrica:

→ Da bi postojao umnožak dvaju matrica, one moraju biti uklanjanice, tj. broj stupaca prve matrice mora biti jednak broju redaka druge matrice.

Grafički:

$$\begin{matrix} m \\ \boxed{A} \\ n \end{matrix} \cdot \begin{matrix} n \\ \boxed{B} \\ p \end{matrix} = \begin{matrix} m \\ \boxed{A \cdot B} \\ p \end{matrix}$$

Samo je jedan Mali Ivić!

Znači matrica A se množi s B po tipovima ovako:

$$(m, n) \cdot (n, p) = (m, p)$$

→ Neka je $A = (a_{ij})$ matrica tipa $m \times n$, i matrica $B = (b_{ij})$ matrica tipa $n \times p$. Opći član umnoška $A \cdot B$ dan je formulom:

$$(A \cdot B)_{ij} := a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj}$$

$$(A \cdot B)_{ij} := \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Grafički:

$$\begin{matrix} i\text{-ta redak od } A & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \end{matrix} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \begin{matrix} n \\ \boxed{A} \\ m \end{matrix} & \cdot & \begin{matrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{matrix} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \begin{matrix} p \\ \boxed{B} \\ m \end{matrix} & = & \begin{matrix} j \\ \boxed{(AB)} \\ i \end{matrix} \end{matrix}$$

$(AB)_{ij}$ je skalarni produkt dva vektora i to i -tag retka od A sa j -tim stupcem od B .

= PRIMJER 1.

a)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

b)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

= PRIMJER 2.

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2+2 & -3+3 \\ 6-6 & 9-9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

= PRIMJER 3.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6+6+1 & -2+0+1 \\ 0+2-2 & 0+0+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & -3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

= Neobičajena svojstva matrica:

- 1) ako je umnožak $A \cdot B$ definiran, onda $B \cdot A$ ne mora biti definiran.
- 2) ako postoji matrice AB , BA vrijedi: $AB \neq BA$.
- 3) ako je $A \cdot B = 0$, tada ne mora biti $A = 0$ niti $B = 0$.

□ SVOJSTVA MATRIČNOG MNÖŽENJA

1) asocijativnost matričnog množenja
= STAVAK 1.

↳ Vrijedi: $(AB)C = A(BC)$, ako su umnošci definirani s obje strane znaka jednakosti.

DOKAZ:

Neka je $A = (a_{ij})$ tipa $m \times n$

$B = (b_{jk})$ tipa $n \times p$

$C = (c_{kl})$ tipa $p \times r$

I provjeri tipa:

LJEVA STRANA: $[(m, n)(n, p)] \cdot (p, r) = (m, p)(p, r) = (m, r)$

DESNA STRANA: $(m, n) \cdot [(n, p)(p, r)] = (m, n)(n, r) = (m, r)$ ✓

II provjeri općih elemenata

LJEVA STRANA:

$$[(AB) \cdot C]_{il} = \sum_{k=1}^p (AB)_{ik} \cdot C_{kl} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \right) \cdot c_{kl} = \\ = \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} c_{kl}$$

DESNA STRANA:

$$[A(BC)]_{il} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot (BC)_{kl} = \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^p b_{ks} c_{sl} = \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^p a_{ik} b_{ks} c_{sl} \\ \left(\begin{array}{l} \text{zamjena: } k \rightarrow j \\ \text{ } \quad \quad \quad s \rightarrow l \end{array} \right) = \\ = \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} c_{kl}$$

2) distributivnost množenja prema zbracijaju

↳ Vrijedi:

a) $(A+B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C \rightarrow$ desna distributivnost

b) $C \cdot (A+B) = C \cdot A + C \cdot B \rightarrow$ lijeva distributivnost

DOKAZ:

$$[(A+B) \cdot C]_{ik} = \sum_{j=1}^n (A+B)_{ij} \cdot C_{jk} = \sum_{j=1}^n (a_{ij} + b_{ij}) c_{jk} = \\ = \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{jk} + \sum_{j=1}^n b_{ij} c_{jk} = (AC)_{ik} + (BC)_{ik} = \\ = [AC + BC]_{ik}$$

3.) umnožak s jediničnom matricom

= STAVAK 2.

↳ Ako je I jedinična matrica reda n , te A kvadratna matrica reda n , tada je:

$$A \cdot I = I \cdot A = A$$

Odušum, jedinična matrica je neutralni element

DOKAZ:

$$(A \cdot I)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} (\delta_{kj}) = 0+0+\dots+a_{ij} \cdot 1+0+0 = a_{ij} = (A)_{ij}$$

$$(I \cdot A)_{ij} = \sum_{k=1}^n (\delta_{kj}) a_{ik} = 0+0+\dots+1 \cdot a_{ij}+0+0 = a_{ij} = (A)_{ij} \quad \checkmark$$

samo je jedan Mali Ivica

4) transformirajuće umnoška matrica

$$\hookrightarrow \text{Vrijedi: } (A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

DOKAZ:

I provjerat će: A tipa (m, n)
B tipa (n, p)

$$\text{LIJEVA STRANA: } AB = (m, n)(n, p) = (m, p)$$

$$(AB)^T = (p, m)$$

$$\text{DESNA STRANA: } B^T A^T = (p, n)(n, m) = (p, m)$$

II provjerat će elementa:

$$[(AB)^T]_{ik} = (AB)_{ki} = \sum_{j=1}^n a_{kj} b_{ji} = \sum_{j=1}^n (B^T)_{ij} (A^T)_{jk} = (B^T A^T)_{ik}$$

Samo je jedan. Mati jevič!

5) potencirajuće matrica

\hookrightarrow Kvadratne matrice definiraju se samo za kvadratne matrice i to induktivno sve potencije matrice A definiraju se samo za kvadratne matrice, na način:

$$A^2 := A \cdot A$$

$$A^s := A^{s-1} \cdot A = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{s-\text{faktora}}$$

6) matični polinom

= DEFINICIJA 2.

\hookrightarrow Neka je $f(x) = a_p x^p + \dots + a_1 x + a_0$, bilo koji polinom stupnja p, i neka $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Tada definiramo:

$$f(A) := a_p A^p + \dots + a_1 A + a_0 I$$

= PRIMJER 4.

$$f(x) = x^2 - 4x + 7, \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad f(A) = ?$$

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + 7 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-3 & 2+2 \\ -6-3+4 & 8-12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 12 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 12 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8 & -4 \\ 12 & -8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

= Vrijedi:

$$A^n = \begin{bmatrix} a^n & n \cdot a^{n-1} \\ 0 & a^n \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}$$

Dokaz: Matematičkom indukcijom:

① baza indukcije:

$n=1$:

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^1 & 1 \cdot a^0 \\ 0 & a^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix} \checkmark$$

② pretpostavka indukcije:

Potpovestavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $A^n = \begin{bmatrix} a^n & n \cdot a^{n-1} \\ 0 & a^n \end{bmatrix}$.

③ skok indukcije

treba dokazati da tvrdnja vrijedi i za $n+1$:

$$A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{bmatrix} a^n & n \cdot a^{n-1} \\ 0 & a^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^n a & a^{n+1} + n a^{n-1} \cdot a \\ 0 & a^n \cdot a \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a^{n+1} & (n+1) a^n \\ 0 & a^{n+1} \end{bmatrix} \checkmark$$

ZADACI (DZ.3 PREDVI - D10)

Samo je jedan Mali Ivica!

$$\textcircled{1} \quad X = ? \quad AX = A, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \rightarrow A \cdot X = A$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} + 2a_{21} & a_{12} + 2a_{22} \\ a_{11} + 2a_{21} & a_{12} + 2a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$a_{11} + 2a_{21} = 1 \Rightarrow a_{11} = 1 - 2a_{21}$$

$$a_{12} + 2a_{22} = 2 \Rightarrow a_{12} = 2 - 2a_{22}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 - 2a_{21} & 2 - 2a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad a_{21}, a_{22} \in \mathbb{R}$$

$$\textcircled{2} \quad X = ?$$

$$X \cdot \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -3 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -4 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 6 & -8 & 2 \end{bmatrix}$$

Tip: $(?, ?) \cdot (2, 3) = (3, 3)$
 $(?, ?) = (3, 2)$

$$X = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -3 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -4 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 6 & -8 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3a_{11} - 3a_{12} & -2a_{11} & a_{11} - a_{12} \\ 3a_{21} - 3a_{22} & -2a_{21} & a_{21} - a_{22} \\ 3a_{31} - 3a_{32} & -2a_{31} & a_{31} - a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -4 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 6 & -8 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3a_{11} - 3a_{12} = -3 \\ -2a_{11} = -4 \Rightarrow a_{11} = 2 \\ a_{11} - a_{12} = -1 \Rightarrow a_{12} = 2 + 1 = 3 \\ 3 \quad 3a_{31} - 3a_{32} = 6 \\ -2a_{31} = -8 \Rightarrow a_{31} = 4 \\ a_{31} - a_{32} = 2 \Rightarrow a_{32} = 4 - 2 = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \quad 3a_{21} - 3a_{22} = 3 \\ -2a_{21} = 0 \Rightarrow a_{21} = 0 \\ a_{21} - a_{22} = 1 \Rightarrow a_{22} = 0 - 1 = -1 \end{array}$$

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{3} \quad X = ?$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tip: $(3, 3) \cdot (?, ?) = (3, 2)$
 $(?, ?) = (3, 2)$

-48-

$$X = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} + a_{31} & a_{12} + a_{32} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} a_{21} &= 3 \\ a_{22} &= 5 \\ a_{11} + a_{31} &= 0 \Rightarrow a_{31} = -a_{11} \\ a_{12} + a_{32} &= 1 \quad a_{32} = 1 - a_{12} \end{aligned}$$

$$X = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 3 & 5 \\ a_{31} & 1 - a_{12} \end{bmatrix}, \quad a_{11}, a_{12} \in \mathbb{R}$$

4. $X = ?$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{tip: } (2,2) \cdot (? , ?) = (2,2)$$

$$\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} + 2a_{21} & a_{12} + 2a_{22} \\ 2a_{11} + 4a_{21} & 2a_{12} + 4a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad a_{11} + 2 \cdot a_{21} &= 1 \\ 2a_{11} + 4a_{21} &= 3 \\ 2(1 - 2a_{21}) + 4a_{21} &= 3 \\ 2 - 4a_{21} + 4a_{21} &= 3 \\ 2 &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad a_{12} + 2a_{22} &= 2 \\ 2a_{12} + 4a_{22} &= 4 \\ 2(2 - 2a_{22}) + 4a_{22} &= 4 \\ 4 - 4a_{22} + 4a_{22} &= 4 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Matrica X ne postoji.

5. $P(x) = x^2 - 6x + 5 \quad A = ? \text{ (diagonarna)} \rightarrow P(A) = 0$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \rightarrow P(A) = 0$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} + 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}^2 & 0 \\ 0 & a_{22}^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5a_{11} & 0 \\ 0 & 5a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}^2 - 6a_{11} + 5 & 0 \\ 0 & a_{22}^2 - 6a_{22} + 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$1 \quad a_{11}^2 - 6a_{11} + 5 = 0$$

$$a_{11(1)} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 20}}{2} = \frac{6 \pm 4}{2}$$

$$\begin{aligned} a_{11(1)} &= 1 \\ a_{11(2)} &= 5 \end{aligned}$$

$$2 \quad a_{22}^2 - 6a_{22} + 5 = 0$$

$$\begin{aligned} a_{22(1)} &= 1 \\ a_{22(2)} &= 5 \end{aligned}$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Samo je jedan Mali Ivica!

(6) $X = ?$

$$A \cdot X = X \cdot A \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+3b & 2a+4b \\ c+3d & 2c+4d \end{bmatrix}$$

$$a+2c = a+3b \Rightarrow 3b = 2c \Rightarrow b = \frac{2c}{3} = \frac{2 \cdot 3b}{3} = 2b$$

$$b+2d = 2a+4b \Rightarrow 2a+3b = 2d$$

$$3a+4c = c+3d \Rightarrow a+c=d \Rightarrow d = a+3b$$

$$3b+4d = 2c+4d \Rightarrow 3b = 2c \Rightarrow c = \frac{3b}{2} = \frac{3 \cdot 2b}{2} = 3b$$

$$X = \begin{bmatrix} a & 2b \\ 3b & a+3b \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{R}$$

(7) $X = ?$

$$A \cdot X = X \cdot A, A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3a+d & 3b+e & 3c+f \\ 3d+g & 3e+h & 3f+i \\ 3g & 3h & 3i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a & a+3b & b+3c \\ 3d & d+3e & e+3f \\ 3g & g+3h & h+3i \end{bmatrix}$$

$$3a+d = 3a \Rightarrow d=0$$

$$3d+g = 3d \Rightarrow g=0$$

$$3g = 3g \Rightarrow l$$

$$3b+e = a+3b \Rightarrow e=a$$

$$3e+h = d+3e \Rightarrow h=d=0$$

$$3h = g+3h \Rightarrow g=0$$

$$3c+f = b+3c \Rightarrow f=b$$

$$3f+i = e+3f \Rightarrow i=e=a$$

$$3i = h+3i \Rightarrow h=0$$

$$X = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R}$$

(8) $B = ?$

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

\hookrightarrow treba naći matricu B za koju vrijedi: $AB = BA$

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow AB = BA$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ cd & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{bmatrix}$$

$$a+c = a \rightarrow c=0$$

$$b+d = a+b \rightarrow b=0$$

$$c=0$$

$$d=c+d \rightarrow d=0$$

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{R}$$

Samo je jedan Mali Ircal

- 9.) Dokazi, opovrgni. Ako za matrice A i B vrijedi $A^2 = B^2$ onda je $A=B$ ili $A=-B$.

↳ Tvrđaja ne vrijedi. Povojno je naći jedan protuprimjer. Uzvemo na primjer matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ i } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Vidimo da: $A \neq B$, $A \neq -B$.

Izračunajmo A^2 i B^2 :

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} A^2 = B^2.$$

$$B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Time je tvrdja opovrgnuta.

- 10.) Dokazi. Matrice A i B komutiraju ako i samo ako je $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$.

$$(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$$

$$A^2 + AB - BA - B^2 = A^2 - B^2$$

↳ Te dvije strane su jednake ako je:

$$AB - BA = 0$$

Oduvojmo:

$$AB = BA,$$

tj. matrice komutiraju.

- 11.) Matrica $A \rightarrow$ involutarna ako je $A^2 = I$. Neka su A i B sa svojstvom $A=B-I$.

Dokazi da je A involutarna ako i samo ako je $B^2 = 2B$.

↳ A je involutarna $\Leftrightarrow B^2 = 2B$. Treba dokazati obje strane:

I) A je involutarna $\Rightarrow B^2 = 2B$:

↳ Pretpostavimo da je $A^2 = I$. IZ $A=B-I$ vrijedi: $B = A + I$. Dokazujemo $B^2 = 2B$:

$$B^2 = (A+I)^2 = A^2 + 2A + I = I + 2A + I = 2I + 2A = 2(A+I) = 2B \checkmark$$

P.P.

II) $B^2 = 2B \Rightarrow A$ je involutarna:

↳ Pretpostavimo da je $B^2 = 2B$. Vrijedi: $A = B - I$. Dokazujemo $A^2 = I$:

$$A^2 = (B-I)^2 = B^2 - 2B + I = 2B - 2B + I = I \checkmark$$

P.P.

- (12) Dokaz: Ako su A i B simetrične, onda je i $AB + BA$ simetrična matrica.
 ↳ Ako su matrice simetrične vrijedi:

$$A = A^T$$

$$B = B^T$$

Treba dokazati jednakost:

$$(AB + BA)^T = AB + BA.$$

Samo je jedan Mali Ivica!

$$(AB + BA)^T = (AB)^T + (BA)^T = [B^T A^T + A^T B^T] = BA + AB = AB + BA \checkmark$$

$\because A = A^T$
 $B = B^T$

- (13.) $\begin{bmatrix} 2 & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n, n \in \mathbb{N} = ?$

$$\begin{array}{l} n=1 \dots \\ \quad \begin{bmatrix} 2 & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} n=2 \dots \\ \quad \begin{bmatrix} 2 & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} n=3 \dots \\ \quad \begin{bmatrix} 4 & 3\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\text{opća član: } \begin{bmatrix} 2^n & (2^n - 1)\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kako smo samo predviđeli rješenje, potrebno ga je dokazati matematičkom indukcijom.

(1) baza indukcije:

$$\begin{array}{l} n=1 \dots \\ \quad \begin{bmatrix} 2 & (2-1)\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \checkmark$$

(2) pretpostavka indukcije:

$$\text{Pretpostavimo da za neki } n \in \mathbb{N} \text{ vrijedi: } A^n = \begin{bmatrix} 2^n & (2^n - 1)\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(3) skok indukcije:

Treba dokazati da vrijedi za $n+1$.

$$A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{bmatrix} 2^n & (2^n - 1)\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2^{n+1} & 2^n \cdot \lambda + (2^n - 1)\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2^{n+1} & \lambda(2^{n+1} - 1) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Zaključak: Time smo dokazali da je:

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 2^n & (2^n - 1)\lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.4. DEFINICIJA DETERMINANTE

= Svakoj je kvadratnoj matrici pripada skalar, mjezina determinanta, označen $\det A$ ili $|A|$.

= Determinante se definiraju induktivno:

1) determinanta matrice prveg reda - $n=1$:

$$A = [a_{ij}] \rightarrow \det A = |a_{11}| = a_{11}$$

2) determinanta matrice drugog reda - $n=2$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \rightarrow \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} := a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$$

3) determinanta matrice trećeg reda - $n=3$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} := a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

↳ označimo:

$$M_{11} := \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, M_{12} := \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, M_{13} := \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

M_{11} - minoru elementa a_{11}

M_{12} - minoru elementa a_{12}

M_{13} - minoru elementa a_{13}

= Općenito: Minoru (M_{ij}) elementa a_{ij} je determinanta matrice koja se dobije izbacivanjem i -tog redka i j -tog stupca matrice A .

↳ označimo:

$$A_{11} := +M_{11}, A_{12} := -M_{12}, A_{13} := +M_{13}$$

A_{11} - algebarski komplement elementa a_{11}

A_{12} - algebarski komplement elementa a_{12}

A_{13} - algebarski komplement elementa a_{13}

= Općenito: Algebarski komplement (A_{ij}) elementa a_{ij} , tj. ko-faktor od

$$a_{ij}, je: A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

= Uz ove označke, definicija determinante trećeg reda je:

$$\det A = a_{11} \cdot M_{11} + a_{12} \cdot (-M_{12}) + a_{13} \cdot M_{13} =$$

$$= a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13} =$$

$$= \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} \cdot a_{1j} \cdot M_{1j}$$

↳ Sarusovo pravilo za računanje determinanta trećeg reda:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - (a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13} + a_{32} \cdot a_{23} \cdot a_{11} + a_{33} \cdot a_{21} \cdot a_{12})$$

→ postupak: prva dva stupca determinante se prepisu iza trećeg i potom izmene po tri broja koja se razlike na istovrsnim dijagonalama. Padajuće dijagonale nose pozitivan, a rastuće negativan predznak.

4) determinanta matrice četvrtog reda - $n=4$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \rightarrow \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \end{vmatrix} +$$

$$+ a_{22} \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \end{vmatrix} + a_{32} \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{42} \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}$$

= PRIMER 1.

↳ det A = ?

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 4 & 2 & 2 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} \rightarrow \det A = 0 \cdot A_{13} + 0 \cdot A_{23} + 2 \cdot (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 7 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot \left\{ 0 \cdot A_{11} + 0 \cdot A_{12} + (-1) \cdot (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} \right\} =$$

$$= 2 \cdot (-5) = -10$$

□ DETERMINANTA MATRICE n-TOGA REDA – LAPLACEOV RAZVOJ

= Determinanta matrice se inče definiše razvojem po nekom retku, odnosno stupcu, pa se takav razvoj naziva Laplaceov razvoj determinante.

= Neka je M_{ij} minor, a A_{ij} algebraški komplement elementa a_{ij} . Tada se determinanta matrice reda n definira kao:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \cdot M_{ij}$$

↳ razvoj po elementima na i -tag retku

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$$

↳ razvoj po elementima na j -tag stupca.

= Shema predznaka:

$$\begin{matrix} n=3 & \dots & + & - & + \\ & & - & + & - \\ & & + & - & + \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} n=4 & \dots & + & - & + & - \\ & & - & + & - & + \\ & & + & - & + & - \\ & & - & + & - & + \end{matrix}$$

3.5. SVOJSTVA DETERMINANTI

= Svojstva determinanata biti će iskazana za retke determinante, ali isto vrijedi i za stupce.

= SVOJSTVO 1.

↳ Ako matrica A ima redak sastavljen od samo nula, onda je $\det A = 0$.

= SVOJSTVO 2.

↳ Determinanta trokutaste matrice jednaka je umnošku elemenata na dijagonali.

= SVOJSTVO 3.

↳ Ako matrica A ima dva jednaka retka, onda je $\det A = 0$.

DOKAŽ: Matematičkom indukcijom.

① $n=1$...

$$\det A \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{12} - a_{11} \cdot a_{12} = 0 \times 1$$

② Pretpostavimo da su u matrici reda n dva reda jednaka, npr. čeli isti redak. Tada je $\det A = 0$, tj.

$$\det A_n = \begin{vmatrix} \vdots & & & \vdots \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} & = 0 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & \end{vmatrix}$$

Samo je jedan Mati Ivinac

③ Treba dokazati da je $\det A_{n+1} = 0$.

$$\det A_{n+1} = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & a_{n,n+1} \end{vmatrix}, i \neq 1, j \neq 1$$

↪ razvojem po elementima 1. retka, konstelačno induktivnu pretpostavku:

$$\det A_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{1+k} a_{1k} M_{1k} = 0$$

= SVOJSTVO 4.

↪ Transponiranjem matrice vrijednost determinante se ne mijenja, tj.
 $\det A = \det A^T$

= SVOJSTVO 5.

↪ Determinanta se množi skalarem tako da se jedan redak (bilo koji) pomnoži tim skalarom.

DOKAZ:

Neka je A početna matrica, a A' matrica u kojoj je jedan redak pomnožen sa λ . Tada vrijedi:

$$\det A' = \sum_{j=1}^n (\lambda a_{1j}) A_{1j} = \lambda \cdot \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j} = \det A$$

↪ Ovo svojstvo koristi se za izlučivanje faktora iz matrice.

= PRIMJER 1.

$$\begin{array}{c|ccc} 4 & 5 & 6 & \\ \downarrow & & & \\ 20 & 40 & 80 & = 4 \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc} 1 & 5 & 6 & \\ \downarrow & & & \\ 5 & 40 & 80 & = 4 \cdot 5 \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc} 1 & 5 & 6 & \\ \downarrow & & & \\ 1 & 8 & 6 & = 4 \cdot 5 \cdot 2 \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc} 1 & 5 & 3 & \\ \downarrow & & & \\ 1 & 8 & 3 & \\ 4 & 4 & 1 & \end{array}$$

= SVOJSTVO 6.

↪ Rastaviti se svi elementi nekog redka matrice na zbroj dvaju elemenata, onda je determinanta zbroj dviju odgovarajućih determinanata.

= SVOJSTVO 7.

↪ Ako zamijenimo dva redka matrice, determinanta mijenja predznak.

= SVOJSTVO 8.

↪ Ako nekom redku matrice dodamo neki drugi redak pomnožen skalarom, vrijednost determinante neće se promjeniti.

= PRIMJER 2.

$$D = \begin{vmatrix} 200 & 5 & 99 & -3 \\ 202 & 6 & 100 & -3 \\ 204 & -2 & 101 & -3 \\ 206 & 7 & 102 & -3 \end{vmatrix} = \left(1.s. - 3.s. \times 2 \right) = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 99 & -3 \\ 2 & 6 & 100 & -3 \\ 2 & -2 & 101 & -3 \\ 2 & 7 & 102 & -3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \text{ ista} \\ \text{stupca} \end{pmatrix} = 0$$

= PRIMJER 3.

$$D = \begin{vmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & \sqrt{5} & \sqrt{3} \\ \sqrt{6} & \sqrt{21} & \sqrt{10} & -2\sqrt{3} \\ \sqrt{10} & 2\sqrt{15} & 5 & \sqrt{6} \\ 2 & 2\sqrt{6} & \sqrt{10} & \sqrt{15} \end{vmatrix} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2.s. - 1.s. \\ 3.s. - 1.s. \\ 4.s. - 1.s. \end{pmatrix} =$$

$$= 3\sqrt{10} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & \sqrt{3}-\sqrt{3} & \sqrt{2}-\sqrt{3} & -2 \\ \sqrt{5} & \sqrt{5} & 0 & \sqrt{2}-\sqrt{3} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 & \sqrt{5}-\sqrt{2} \end{vmatrix} = 3\sqrt{10} \begin{vmatrix} \sqrt{7}+\sqrt{3} & \sqrt{2}-\sqrt{3} & -2-\sqrt{3} \\ \sqrt{5} & 0 & \sqrt{2}-\sqrt{5} \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{5}-\sqrt{2} \end{vmatrix} =$$

$$= 3\sqrt{10} \cdot (-1)(\sqrt{2}-\sqrt{3}) \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{5}-\sqrt{2} = 3\sqrt{10}(\sqrt{3}-\sqrt{2})(5-2) = 9\sqrt{10}(\sqrt{3}-\sqrt{2})$$

= SVOJSTV
D. 9.

↳ Binet-Cauchyjev teorem:

Determinanta umnoška dvoju kvadratnih matica jednaka je umnošku determinanata faktora, tj.: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

ZADACI (DZ 3. DRUGI DIO)

(14.) a) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ 8 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -3(6-5) = -3$

b) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 9 & 8 & 2 & 5 \\ 6 & -2 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & -2 & 7 & 6 & -2 \end{vmatrix} = 2(0+18+8+0+4-21) = 18$

(15.) a) $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ -2 & 0 & 6 & 8 & 10 \\ -2 & -4 & 0 & 8 & 10 \\ -2 & -4 & -6 & 0 & 10 \\ -2 & -4 & -6 & -8 & 6 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2.r_1 + 1.r_2 \\ 3.r_1 + 1.r_3 \\ 4.r_1 + 1.r_4 \\ 5.r_1 + 1.r_5 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 0 & 4 & 12 & 16 & 20 \\ 0 & 0 & 6 & 16 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = \text{(trokutasta)}$

$$= 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 = 3840$$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2+3+4+1 \\ 5+6 \rightarrow 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

(16.) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & X & X & X \\ 1 & X & 0 & X & X \\ 1 & X & X & 0 & X \\ 1 & X & X & X & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2.s_1 - 3.s_2 \\ 4.s_1 - 5.s_3 \\ \dots \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -X & X & 0 & X \\ 1 & X & 0 & 0 & X \\ 1 & 0 & X & -X & X \\ 1 & 0 & X & X & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2.r_1 + 3.r_2 \\ \dots \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & X & 0 & 2X \\ 1 & X & 0 & 0 & X \\ 1 & 0 & X & -X & X \\ 1 & 0 & X & X & 0 \end{vmatrix} =$

$$= x \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & X & 0 & 2X \\ 1 & X & X & X \\ 1 & X & X & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 3.r_1 - 4.r_2 \\ 2.r_1 - 3.r_3(2) \end{pmatrix} = x \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -X & 2X & 0 \\ 0 & 0 & -2X & X \\ 1 & X & X & 0 \end{vmatrix} = +x \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -X & 2X & 0 \\ 0 & -2X & X \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 1.s_1 - 3.r_2 \\ \dots \end{pmatrix} =$$

$$= x \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -X & 2X & 0 \\ -X & -2X & X \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} -X & 2X \\ -X & -2X \end{vmatrix} = x(2X^2 + 2X^2) = 4x^3$$

Samo je jedan Mali Ivica!

17.

$$\begin{array}{c}
 \rightarrow \left| \begin{array}{cccccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \\ -x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -x & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x & x \end{array} \right| = a_1 \\
 + \left| \begin{array}{cccccc} x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -x & x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -x & x & 0 \end{array} \right| - a_2 \\
 + \left| \begin{array}{cccccc} x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -x & x & 0 \end{array} \right| + a_3 \\
 + \left| \begin{array}{cccccc} -x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -x & x & 0 \end{array} \right| - a_4 \\
 + \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & -x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x \end{array} \right| + a_5 \\
 + \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x \end{array} \right| - a_6 \\
 + \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x \end{array} \right| + a_7 \\
 + \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| = a_1 \cdot x^6 - a_2 \cdot (-x^6) + a_3 \cdot x^6 - a_4 \cdot (-x^6) + a_5 \cdot x^6 - a_6 \cdot (-x^6) + a_7 \cdot x^6 = x^6(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7)
 \end{array}$$

18.

$$\begin{array}{c}
 \left| \begin{array}{ccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-x & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3-x & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4-x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 5-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 6-x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7-x \end{array} \right| = 0 \\
 \downarrow \\
 \left| \begin{array}{ccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3-x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4-x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5-x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6-x \end{array} \right| = 0 \\
 \downarrow \\
 \left| \begin{array}{ccccccc} 1-x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2-x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4-x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5-x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6-x & 0 \end{array} \right| = 0
 \end{array}$$

$$(1-x)(2-x)(3-x)(4-x)(5-x)(6-x) = 0$$

$$\begin{aligned}
 \downarrow \quad & \left. \begin{aligned} 1-x=0 & \rightarrow x=1 \\ 2-x=0 & \rightarrow x=2 \\ 3-x=0 & \rightarrow x=3 \\ 4-x=0 & \rightarrow x=4 \\ 5-x=0 & \rightarrow x=5 \\ 6-x=0 & \rightarrow x=6 \end{aligned} \right\} x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}
 \end{aligned}$$

Samo je jedan Mati Ivić!

(19)

$$\det \begin{vmatrix} 3 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 3 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 3 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11+23+37+47+57 \\ 23+23+23+23+23 \\ 5 & 3 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 3 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & 11 & 11 & 11 & 11 \\ 5 & 3 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 3 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 25-15 \\ 35-15 \\ 45-15 \\ 55-15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 23 \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 23 \cdot 2^4 = 368$$

(20) Dokazi. Ako za A vrijedi $A^2 = I$, $\det(A-I) \neq 0$ onda vrijedi $\det(A+I) = 0$.

$$A^2 - I = (A-I)(A+I)$$

→ Po Binet Chouchyjevom teoremu :

$$\det \underbrace{(A^2 - I)}_0 = \det(A-I) \cdot \det(A+I)$$

$$0 = \underbrace{\det(A-I)}_{\neq 0} \cdot \underbrace{\det(A+I)}_0 = 0$$

↪ Kako je $\det(A^2 - I)$ nula, onda da bi turduja bila jednaka nula jedan od dva člana ($\det(A-I)$ ili $\det(A+I)$) us desne strane biti jednaki nuli. Kako je zadano da vrijedi $\det(A-I) \neq 0$, onda je očito da je $\det(A+I) = 0$, ēime je turduja dokazana.

Samo je jedan Mali Ivica!

4. RANG I INVERZ MATRICE

4.1. INVERZNA MATRICA

-DEFINICIJA 1.

↪ Neka je $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ zadata matrica. Matrica A' za koju vrijedi:

$$A' \cdot A = A \cdot A' = I \quad (*)$$

naziva se inverzna matrica od A , a označava se A^{-1} .

↪ za matricu A kažemo da je regularna ukoliko postoji njezina inverzna matrica A^{-1} . Ako ona ne postoji, kažemo da je A singularna matrica.

-STAVAK 1.

↪ Neka je $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Ako A^{-1} postoji, onda je ona jednoznačno određena.

DOKAZ.

Pretpostavimo da postoje 2 matrice A' i A'' za koje vrijedi uvjet (*). Onda je:

$$\begin{aligned} A \cdot A' &= I \quad | \cdot A \\ (A \cdot A') A'' &= I \cdot A'' \\ A'(A \cdot A'') &= I \cdot A'' \\ \text{PP} \\ A' \cdot I &= I \cdot A'' \\ A' &= A'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cdot A' &= I \quad | \cdot A'' \\ (A \cdot A') A'' &= I \cdot A'' \\ A \cdot (A' \cdot A'') &= I \cdot A'' \\ \text{PP} \\ A \cdot I &= I \cdot A'' \\ A &= A'' \end{aligned}$$

-PRIMJER 1.

↪ Odredi je li matrica A regularna ili singularna, ako je $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Pretpostavimo da A^{-1} postoji. Tada je $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Iz uvjeta (*) $A \cdot A^{-1} = I$ slijedi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

X ~ oznaka za kontradikciju, tj. A^{-1} ne postoji jer $0 \neq 1$, pa je matrica A singularna.

-STAVAK 2.

↪ Ako su A i B regularne matrice istog reda ($A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$), tada je i $A \cdot B$ regularna, i vrijedi:

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

DOKAZ: Direktnim provjerom uvjeta (*) za obje strane uvjeta:

LJEVA STRANA:

$$\begin{aligned} (AB) \cdot (AB)^{-1} &= (AB) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = (AI) \cdot A^{-1} \\ &= A \cdot A^{-1} = I \end{aligned}$$

DESNA STRANA:

$$\begin{aligned} (AB)^{-1} \cdot (AB) &= (B^{-1} \cdot A^{-1}) \cdot (AB) = B^{-1} (A^{-1} A) B = (B^{-1} I) B = \\ &= B^{-1} \cdot B = I \end{aligned}$$

samo je jedan Mali Ivica!

4.2. ELEMENTARNE TRANSFORMACIJE I REDUCIRANI OBLIK MATRICE

= DEFINICIJA 1.

↳ Elementarne transformacije nad retčinama matrice su:

- 1) zamjena dvaju redaka,
- 2) množenje nekog retka skalarnom razlikom od nule,
- 3) dodavanje nekog retka nekom drugom retku,

↳ Ove transformacije koriste se kada:

- 1) računajući determinanti,
- 2) rješavajući linearnih sustava,
- 3) određujući rang matrice,
- 4) načinjavaju inverzne matrice.

↳ Ove transformacije služe za dovođenje matrice u tzv. reducirani oblik.

= DEFINICIJA 2.

↳ Reducirani oblik matrice:

I grafički:

1	x	y	0	0	0	0	-5
0	0	0	1	0	0	0	3
0	0	0	0	1	0	0	2
0	0	0	0	0	1	-1	
0	0	0	0	0	0	0	

II rječima:

Mora vrijediti: a) Prvi stožerni element (nenuj element) svakog retka iznosi jedan.

Svi preostali elementi u stupcu tog stožernog elementa jednaki su nula.

b) Svaki naredni stožer (gleđajući po retčima poredski od prvog) nalazi se desno od prethodnog stožera, tj. ako su:

$$a_{i_1 j_1} = 1, \quad a_{i_2 j_2} = 1,$$

tada:

$$i_2 > i_1 \Rightarrow j_2 > j_1.$$

IZLJETAM BINTNEJAVI: Ako imam rednicu sa samo nulama one se nalaze pod rednikom ispod kojima se nalazi stožerni element.

↳ Primjeri reduciranih oblika matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

= Algoritam srušenja matrice na reducirani oblik:

= 1. korak: Izaberimo u 1. stupcu neki element različit od nule. Primjenjujući prvu elementarnu transformaciju, možemo ga dovesti na poziciju stožernog elementa a_{11} (ako je $a_{11} \neq 0$, prvi je korak nepotreban). Ako su svi elementi 1. stupa nula prelazimo na sljedeći postupak.

= 2. korak: Podeljimo elemente 1. retka s a_{11} (druga elementarna transformacija).

Tim se stožerni element postaje jednak 1.

= 3. korak: Pomoluštožernog elementa ponistavamo sve preostale elemente u

mjegovom stupcu, primjenjujući treću elementarnu transformaciju.

=PRIMJER 2.

↳ Reduciraj:

$$\begin{array}{l}
 \text{Vrsta 2} \rightarrow [2 \leftrightarrow 5] \quad \text{E}(U) = (AM, S) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 \left(\begin{array}{c} 2 \rightarrow 4 \\ 2 \rightarrow 4 \end{array} \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 7 & 5 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 9 & 41 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 41 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 41 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2r_1 - 3r_3 \times 2 \\ 4r_2 - 3r_3 \times (-9) \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 4r_4 / 35 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

=PRIMJER 3.

↳ Reduciraj:

$$\begin{array}{l}
 \text{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3r_1 - 1r_3 \times (-1) \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2r_1 / 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1r_2 - 2r_1 \times 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3r_3 / 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2r_1 - 3r_3 \times \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

4.3. ELEMENTARNE I EKVIVALENTNE MATRICE. RANG I INVERZ MATRICE.

=Elementarne transformacije mogu se opisati pomoću množenja s matricama triju tipova, koje nazivamo elementarnim matricama.

=DEFINICIJA 1.

↳ Pretpostavimo da je matrica B dobivena iz matrice A nizom elementarnih transformacija. Tada za matrice A i B kažemo da su **ekvivalentne**, i to zapisujemo $B \sim A$.

↳ Pokazuje se da je reducirana forma matrice jednoznačno određena (bez dokaza). Izbor elementarnih transformacija nije jednoznačan, ali končan rezultat jest.

=DEFINICIJA 2.

↳ Rang matrice je broj ne-nul redaka u reduciranoj obliku matrice A . Rang se iskazuje simbolom $\text{rang } (A)$.

↳ Moguće su još daje definicije ranga. Pomoću:

- 1) linearne nezavisnosti redaka matrice
- 2) determinanata

Samo je jedan Mati Ivica!

= Iz definicije 2. sljеди:

a)

$$\begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc|c} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right] \\ m \\ n \end{array}$$

$$\text{rang } (A) \leq m$$

↳ maksimalan broj ne-nul redaka je m

b)

$$\begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc|c} \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ m \\ n \end{array}$$

$$\text{rang } (A) \leq n$$

↳ najviše je n mesta za raspored stupenja elemenata po stupcima

= STAVAK 1.

↳ Da bi izveli algoritam za računanje inverzne matrice moramo izvesti 2 leme. Zbog jednoznačnosti i definicije reducirane forme je?

= LEMA 1.

↳ Kvadratna matrica A reda n ima rang jednak n onda i samo onda ako je A_R jedinčna matrica, tj. $A_R = I$.

= LEMA 2.

↳ Ako je kvadratna matrica A regularna i matrica B ekvivalentna s njom, tada je i matrica B regularna.

↳ Zbog toga imamo: algoritam za računanje inverzne matrice

→ Neka je A kvadratna regularna matrica reda n. Po Lemi je $A_R = I$. To znači da se jedinčna matrica može dobiti iz matrice A nizom elementarnih transformacija. Možemo napisati:

$$I = (E_F E_{F-1} \dots E_1) A$$

gdje su E_F, E_{F-1}, \dots, E_1 elementarne matrice.

→ Sada se vidi da je A^{-1} jednaka umnošku elementarnih matrica koje su sudjelovale u transformaciji, tj.

$$A^{-1} = E_F E_{F-1} \dots E_2 E_1$$

→ Dakle, inverzna matrica A^{-1} jednaka je produktu elementarnih matrica upotrebljenih da se matrica A svede na reducirani formu: $A_R = I$. Međutim, pri računu A^{-1} nije potrebno ispisivati eksplicitno matrice E_i i računati njihove produkte. Naime, te se matrice dobivaju istim transformacijama koje su račinjene na matrici A.

= Elementarne matrice:

↳ 1. elementarna matrica: -i-ti redak zamijenimo s j-tim redkom.

$$E_{i,j} = \begin{bmatrix} \vdots & & \\ 0 & 1 & \leftarrow i \\ 1 & 0 & \leftarrow j \end{bmatrix}$$

↳ svi elementi su kao i jedinčni, osim $e_{ii} = e_{jj} = 0$, $e_{ij} = e_{ji} = 1$.

↳ 2. elementarna matrica: -i-ti redak pomnožimo skalarom λ različitim od nule

$$E_i(\lambda) = \begin{bmatrix} \vdots & & \\ \lambda & & \\ \vdots & & \\ 1 & & \end{bmatrix}$$

↳ svi ostali elementi jednaku su onima u podjednici matrici.

↳ 3. elementarna matrica: - i-ti redak pomnožen skalarom λ dodajemo j.-tom retku.

$$E_i(\lambda) = \begin{bmatrix} \dots & \dots & 1 & \leftarrow i \\ \dots & \dots & \lambda & \leftarrow j \end{bmatrix} \quad E_j(\lambda) = \begin{bmatrix} \dots & \dots & 1 & \leftarrow i \\ \dots & \dots & 1 & \leftarrow j \end{bmatrix}$$

↳ matrica je istorijeta jediničnog, osim što vrijedi: $c_{ij} = \lambda$

- PRIMJER 1.

Zamjena 1. i 3. retka matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ dobije se množenjem s elementarnom matricom oblika:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \leftrightarrow 3 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tj.:

$$A \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

elementarna matrica tipa E_I

- PRIMJER 2.

Prodot 2. i 3. retka matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ dobije se množenjem s elementarnom matricom oblika:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 \cdot r \times 3 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tj.:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 9 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

elementarna matrica tipa E_{II}

- PRIMJER 3.

Dodavajući 1. retku pomnoženo s -2 trećem retku matrice dobije se množenjem s elementarnom matricom oblika:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 \cdot r_1 + 1 \cdot r_3 \rightarrow r_3 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tj.:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

elementarna matrica tipa E_{III}

Stoga možemo koristiti sljedeći algoritam:

↳ Korak 1.: Napišemo matricu tipa $n \times 2n$ u kojoj je lijevo ispisana matrica A , a desno matrica I_{2n} :

$$\left[\begin{array}{c|ccc} a_{11} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & 0 & \dots & 1 \end{array} \right] = [A | I] \rightarrow \text{tzv. proširena matrica}$$

↳ Korak 2: Vršimo elementarne transformacije na proširenu matricu, dok matricu A ne dovedemo u reduciranu formu, tj.:

$$[A|I] \sim [E_1 A | E_1] \sim [E_2 E_1 | E_2 E_1] \sim \dots \sim [A_2 | E_2 \dots E_2 E_1] \sim [A_2 | B]$$

↳ Korak 3: Ako je $A_2 = I$ tada je matrica A regularna, i ma desnoj proširene matrice, nazi se A^{-1} .

Ako je pak $A_2 \neq I$ matrica A nije regularna i ne postoji njena inverzna matrica, a je brojča ne-nula redaka od A_2 može se zaključiti koliki je rang o A .

Dokle:

Početna matrica: $[A|I]$. Nakon prve elementarne transformacije kad je A regularna i svedena na reduciranu formu:

$$[A'|I] \sim [A_2 | B] = [I | B] = [E_2 \dots E_2 | A' | E_1 \dots E_1].$$

Kako je $B = E_1 \dots E_1$, a matrica $I = E_2 \dots E_2$, $A \equiv B \cdot A'$.

Zbog toga slijedi: $B = A^{-1}$.

=PRIMER 4.

Odredi inverz matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 4 & -8 & 5 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

4.4. DETERMINANTE I INVERZNA MATRICA

= Iz relacije $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$ koja vrijedi za regularne matrice, primjerom.

Binet-Cauchyjevog teorema slijedi:

$$\det(A^{-1} \cdot A) = \det A^{-1} \cdot \det A = \det I = 1.$$

Odatle zaključujemo da je za regularnu matricu $\det A \neq 0$ i $\det A^{-1} \neq 0$.

= STAVAK 1.

↳ Ako je $\det A \neq 0$ onda je matrica A regularna.

DOKAZ: Izvodi se konstruktivno, tj. biti će izvedena eksplicitna formula za računanje A^{-1} .

→ Prvi deo jednog determinante je: (lajlaceov razvoj po elementima k-tog stupca):

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{jk} A_{jk}$$

- Ako u ovoj formuli A_{jk} (algebarski komplement od a_{jk}) zamišljimo algebarski komplementom nekog drugog stupca, onda je:

$$\sum_{j=1}^n a_{jk} A_{ji} = 0, \text{ za } i \neq k.$$

Obrazloženje: Ova je suma lajlaceov razvoj determinante po i -tom stupcu koja ima dva jednaka stupca, tj. i -ti i k -ti. Stoga slijedi:

$$\sum_{j=1}^n A_{ji} a_{jk} = \det A \cdot \delta_{ik}. \quad (*)$$

Oznacimoli matricu kofaktora (A_{ij}^T) sa \tilde{A} matom element A_{ij} shvatiti kao transpoziciju elementarne matrice $(\tilde{A})^T$, tj.:

$$\sum_{j=1}^n A_{ij}^T a_{jk} = \det A \cdot \delta_{ik}.$$

Kako $A_{ij}^T a_{jk}$ možemo shvatiti kao (i, k) -ti element matice koja se dobiva množenjem \tilde{A}^T matrice A , dobivajući zapis formule (*) kao:

$$A \cdot \tilde{A} = \det A \cdot I, \text{ gde je } \tilde{A} \text{ tzv. adjungirana matrica od } A.$$

Odušesno:

$$\frac{\tilde{A}^T}{\det A} \cdot A = I$$

Kako je $A \cdot \tilde{A}^{-1} = I$ vrjeti:

$$\tilde{A}^{-1} = \frac{\tilde{A}^T}{\det A}$$

=STAVAK 2.

↳ Cramerovo pravilo za inverz matrice:

- Neka je A kvadratna matrica reda n . Ona je regularna ako i samo ako vrijedi $\det A \neq 0$.

Elementi inverzne matrice su:

$$(A^{-1})_{ij} = a_{ij}' = \frac{A_{ji}}{\det A}.$$

Uvjesta ove formule postoji eksplicitni zapis inverzne matrice:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}^T$$

=TRIMJER 1.

Odredi inverz matrice Cramerovim pravilom:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Samo je jedan Mati Ivica!

- 1.) determinanta mora biti razvijata od 0 da bi matrica imala inverz.

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & | & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & | & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & | & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 + 0 + 2 - 0 - 12 - 0 = -10 \quad \text{pa } \det A \neq 0$$

Samo je jedan Mali Ivica!

2) Cramerovo pravilo:

$$A^{-1} = \frac{A^T}{\det A}$$

$$\begin{aligned} A_{11} &= + \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -6 & A_{21} &= - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 & A_{31} &= + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \\ A_{12} &= - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4 & A_{22} &= + \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 & A_{32} &= - \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -5 \\ A_{13} &= + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 & A_{23} &= + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 & A_{33} &= + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \\ A^{-1} &= \frac{\begin{vmatrix} -6 & 2 & 0 \\ 2 & -8 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix}}{-10} = \frac{1}{-10} \begin{vmatrix} -6 & 2 & 0 \\ 2 & -8 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{10} \begin{vmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 4 & -8 & 5 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

= Dakle: možemo konstituti sljedeći algoritam:

↳ Korak 1: Izračunati determinantu od matrice A. Ako je ona različita od nule krećemo dalje sa korakom 2, a ako nije, matrica nije inverzna.

↳ Korak 2: Odrediti algebraški komplement svakog matičnog elementa i zapisati ih u odgovarajuće mjesto u matrici.

↳ Korak 3: Transponirati dobivenu matricu i podijeliti je s determinantom.

ZADACI (DZ4. PRVI DIJ)

1. a) $A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} \sim \left(1 \mid 2 \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} \sim \left(2r_1 - 1r_2 \times 6 \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$

$$\text{rang } A = 1$$

b) $A = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} \sim \left(2r_1 - 1r_2 \times (2) \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} \sim \left(3r_2 - 1r_3 \times (3) \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} \sim \left(2r_2 / (-3) \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} \sim \left(1r_2 - 2r_1 \times (4) \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} \sim \left(3r_3 - 2r_1 \times (-6) \right) \sim$

$$\sim \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{rang } A = 2$$

c) $A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} \sim \left(2r_1 \leftrightarrow r_2 \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} \sim \left(2r_1 - 1r_2 \times (-2) \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} \sim \left(3r_2 - 1r_3 \times (-1) \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 9 \\ 0 & 5 & 9 \end{vmatrix} \sim$

$$\left(2r_1 / 5 \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{9}{5} \\ 0 & 5 & 9 \end{vmatrix} \sim \left(1r_1 - 2r_2 \times (2) \right) \sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 1 & \frac{9}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{rang } A = 2$$

(2)

$$\begin{array}{l}
 \text{a)} \quad A = \left[\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & 4 & -4 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccc} 3r_1 - 1r_2 \times (2) \\ 3r_1 - 1r_3 \times (1) \\ 4r_1 - 1r_4 \times (1) \\ 1r_1 + 3r_2 \times (-1) \\ 4r_1 - 3r_3 \times (5) \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 5 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 3r_2 / 4 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)
 \end{array}$$

$$\text{rang } A = 3$$

$$\begin{array}{l}
 \text{b)} \quad A = \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cccc} 3r_1 - 1r_2 \times (2) \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 3r_2 / (-9) \\ 1 & 0 & 0 & \frac{7}{9} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{9} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{9} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 1r_1 - 3r_2 \times (5) \\ 1 & 0 & 0 & \frac{7}{9} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{9} \end{array} \right) \sim
 \end{array}$$

$$\text{rang } A = 3$$

$$\begin{array}{l}
 \text{3.)} \quad A = \left[\begin{array}{ccc} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 \leftrightarrow 2 \\ 2r_1 - 1r_3 \times (3) \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{array} \right) \dots E_1 = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \\
 \sim \left(\begin{array}{ccc} 3r_2 - 2r_3 \times (2) \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -12 \\ 0 & 2 & -29 \end{array} \right) \dots E_2 = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \\
 \sim \left(\begin{array}{ccc} 3r_1 / 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -12 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \dots E_3 = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right] \sim \\
 \sim \left(\begin{array}{ccc} 2r_3 - 3r_2 \times (2) \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \dots E_4 = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right] \sim \\
 \sim \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{1}{5} \end{array} \right) = \frac{1}{5} \left[\begin{array}{ccc} 0 & 5 & 0 \\ 5 & -24 & -2 \\ -2 & 6 & 1 \end{array} \right]
 \end{array}$$

$$\text{rang } A = 3$$

Samo je jedan Mali Ivica!

(4)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & -3 & 3 & 9 \\ -1 & 1 & 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & x(4) & 0 & 0 \\ 4 & -1 & x(-1) & 0 & 0 \\ 5 & -1 & x(-1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rang}(A)=3$$

(5)

$$A = \begin{bmatrix} 2\lambda-1 & \lambda & 1 \\ \lambda & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \leftrightarrow 3 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ \lambda & \lambda & 1 \\ 2\lambda-1 & \lambda & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2r-1 \times (\lambda) \\ 3r-1 \times (2\lambda-1) \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 \\ 0 & -\lambda-1 & -2\lambda^2-\lambda+1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 \leftrightarrow 3 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 0 & -\lambda-1 & -2\lambda^2-\lambda+1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2r(-\lambda-1) \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & 1-2\lambda \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1r-2r(1) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1-\lambda \\ 0 & 1 & 1-2\lambda \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3r/(1-\lambda^2) \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1-\lambda \\ 0 & 1 & 1-2\lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1r-3r(1-\lambda) \\ 2s-3r(1-2\lambda) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1^{\circ} \text{ rang}(A)=3 \text{ za } \lambda \neq -1, \lambda \neq 1$$

$$2^{\circ} \lambda=-1 \quad *) \text{ uvrštavaš ispred dijeljenja matrice sa } (-\lambda-1):$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \text{rang}(A)=1 \text{ za } \lambda=-1$$

$$3^{\circ} \lambda=1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \text{rang}(A)=2 \text{ za } \lambda=1$$

Samo je jedan Mali Ivica!

(6)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & \lambda & \lambda & \lambda \\ 2 & 6 & \lambda & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2r - 1r \times (-1) \\ 3r - 1r \times (2) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 3+\lambda & 2+\lambda & 3+\lambda \\ 0 & 0 & \lambda-4 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2r/(3+\lambda) \\ 3r/(3+\lambda) \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{2+\lambda}{3+\lambda} & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-4 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1r - 2r \times (3) \\ 2r - 3r \times \left(\frac{2+\lambda}{3+\lambda}\right) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{\lambda}{3+\lambda} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2+\lambda}{3+\lambda} & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-4 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3r/(3-\lambda) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{\lambda}{3+\lambda} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2+\lambda}{3+\lambda} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1r - 3r \times \left(-\frac{\lambda}{3+\lambda}\right) \\ 2r - 3r \times \left(\frac{2+\lambda}{3+\lambda}\right) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1° rang(A)=3 za $\lambda \neq 4, \lambda \neq -3$

2° $\lambda = -3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2r \times (-1) \\ 3r - 2r \times (-7) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1r + 2r \times (2) \\ 3r - 2r \times (-7) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

rang(A)=2 za $\lambda = -3$

3° $\lambda = 4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

rang(A)=2 za $\lambda = 4$

(7) $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\text{rang } A < n$, da li je $\text{rang}(AB) = n$?

- Da bi rang A bio strogo manji od n, matrica A ne smije biti regularna, oduosno mora vijedati da je $\det A = 0$.

- za matricu AB vijedi:

$\det AB = \det A \cdot \det B = 0 \cdot \det B = 0$,
fj. matrica AB nije regularna, pa vijedi: $\text{rang}(AB) < n$.

(8)

$$[A, I] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \leftrightarrow 2 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1r/2 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2r - 1r \times (2) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2r/(-3) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1r - 2r \times (2) \\ 3r - 2r \times (3) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3r/4 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1r - 3r \times (2) \\ 2r - 3r \times (-1) \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1/6 & 1/3 & -1/2 \\ -1/12 & 1/12 & 1/4 \\ 1/4 & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/6 & 1/3 & -1/2 \\ -1/12 & 1/12 & 1/4 \\ 1/4 & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

Samo je jedan Mali Irvica!

(9)

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} (1r-2r) \times (1) \\ (2r-3r) \times (1) \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} (1r-3r) \times (-1) \\ (2r-3r) \times (1) \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} (1r-4r) \times (1) \\ (2r-4r) \times (-1) \\ (3r-4r) \times (1) \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

(10)

$$[A|I] \sim \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} (2r-1r) \times (-1) \\ (4r-1r) \times (1) \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{(2r+15)} \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} (1r-2r) \times (2) \\ 3r-2r \times (2) \\ 4r-2r \times (-3) \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left(3r \mid \frac{2}{5} \right) \sim \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r-3r \times (\frac{2}{5}) \\ 2r-3r \times (-\frac{1}{2}) \\ 4r-3r \times (-\frac{3}{5}) \end{matrix}} \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{4r \mid (-\frac{1}{2})} \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -3 & -2 \end{array} \right]$$

$$\left(2r-4r \times (\frac{1}{2}) \atop 3r-4r \times (-\frac{1}{2}) \right) \sim \left[\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -3 & -2 \end{array} \right] \quad A^{-1} = \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & -2 \end{array} \right]$$

(11)

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & -a \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2a & -a^2 \end{bmatrix}, a=? \text{ da postoji } A^{-1}, A^{-1}=?$$

- Da postoji A^{-1} : $\det A \neq 0$

$$\begin{bmatrix} a & 1 & -a \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2a & -a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 2a \end{bmatrix} = (0+3-4a^2) - (0+6a^2-2a^2) = 3-4a^2-4a^2 = 3-8a^2 \neq 0$$

$$a^2 \neq \frac{3}{8}$$

$$a \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$

- Po Crameru slijedi:

$$\tilde{A}^{-1} = \frac{\tilde{A}^T}{\det A}$$

$$\tilde{A}^T = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 & 3 \\ 2a-a^2 & 1-a^2 & 2a & 1 \\ 1-a & a-a^2 & a & 1 \\ 2a-a^2 & a-a^2 & 1 & 2a \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -6a & 2a^2+3 & 4a & -2 \\ -a^2 & -a^3+a & -2a^2+2 & -5a \\ 3 & -5a & -2 & -2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -6a & -a^2 & 3 \\ 2a^2+3 & -a^3+a-5a & 4a \\ 4a & -2a^2+2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3-8a^2} \cdot \begin{bmatrix} -6a & -a^2 & 3 \\ 2a^2+3 & -a^3+a & -5a \\ 4a & -2a^2+2 & -2 \end{bmatrix}$$

(12.)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, (A^{-1} \cdot B \cdot A)^n = ?$$

$$A^{-1} \Rightarrow [A : I] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A^{-1} \cdot B \cdot A)^1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(A^{-1} \cdot B \cdot A)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

$$(A^{-1} \cdot B \cdot A)^3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -7 \\ 0 & 8 & 19 \\ 0 & 0 & 27 \end{bmatrix}$$

$$(A^{-1} \cdot B \cdot A)^n = \begin{bmatrix} 1 & 2^n-1 & -2^{n+1} \\ 0 & 2^n & 3^{n-2^n} \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix}$$

= Kako smo rješavali mnoštvo, potrebno ga je dokazati matematičkom indukcijom.

I baza indukcije:

$n=1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \checkmark$$

II pretpostavka indukcije:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $(A^{-1} \cdot B \cdot A)^n = \begin{bmatrix} 1 & 2^n-1 & -2^{n+1} \\ 0 & 2^n & 3^{n-2^n} \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix}$

Samo je jedan Mali Ivica!

(III) step indukcije:

Treba dokazati da tvrdnja vrijedi i za $n+1$:

$$C^{n+1} = C^n \cdot C = \begin{bmatrix} 1 & 2^n - 1 & -2^n + 1 \\ 0 & 2^n & 3^n - 2^n \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1+2(2^n-1) & -1+2^n-1+3(-2^n+1) \\ 0 & 2^n \cdot 2 & 2^n + 3(3^n - 2^n) \\ 0 & 0 & 3 \cdot 3^n \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1+2 \cdot 2^n - 2 & -1-1+3+2^n-3 \cdot 2^n \\ 0 & 2 \cdot 2^n & 2^n - 3 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n \\ 0 & 0 & 3 \cdot 3^n \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2^{n+1}-1 & -2^{n+1}+1 \\ 0 & 2^{n+1} & -2^{n+1}+3^{n+1} \\ 0 & 0 & 3^{n+1} \end{bmatrix}$$

Zaključak: Tvrđenja vrijedni za svaki $n \in \mathbb{N}$.(13) $A, B, X \in \mathbb{C}^{Mn}$ su regularne i vrijedi: $A^{-1} \cdot X^2 = B^{-1} \cdot A \cdot X$.

$$\begin{aligned} X &= ? \\ \det X &= ? \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{izrazi} \\ \text{det } A = G \\ \det B = g \\ \det X = ? \end{array} \right.$$

$$= \det A = G$$

$$\det B = g$$

$$\det X = ?$$

$$= A^{-1} \cdot X^2 = B^{-1} \cdot A \cdot X \quad | \cdot X^{-1} (L)$$

$$A^{-1} \cdot X^2 \cdot X^{-1} = B^{-1} \cdot A \quad | \cdot A (D)$$

$$X^2 \cdot X^{-1} = A \cdot B^{-1} \cdot A$$

$$X = A \cdot B^{-1} \cdot A$$

$$\det X = \det A \cdot \frac{1}{\det B} \cdot \det A = \frac{\det^2 A}{\det B}$$

$$= \det X = \frac{G^2}{g} = 4$$

(14) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, regularne? Riješi: $(BX^{-1}A)^{-1} = AB$

$$= \det A \neq 0 \quad \det B \neq 0$$

$$\det A = 1+6=7 \neq 0 \quad \det B = 0+3 \neq 0$$

$$= (BX^{-1}A)^{-1} = AB$$

$$A^{-1} \cdot X \cdot B^{-1} = AB \quad | \cdot A (L)$$

$$X \cdot B^{-1} = A^2 \cdot B \quad | \cdot B (D)$$

$$X = A^2 \cdot B^2$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 6 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 34 \\ 8 & 31 \end{bmatrix}$$

15.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, X=?$$

$$AX = B \mid \cdot A^{-1} (L)$$

$$X = A^{-1} B$$

$$A^{-1} \Rightarrow [A^{-1} I] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{c|ccccc} 3r_1 - 1r_2 & x(-2) & & & & \\ \hline 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{c|ccccc} 1r_1 - 2r_2 & x(-1) & & & & \\ 3r_1 - 2r_3 & x(-2) & & & & \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3/4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

16.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, X=?$$

$$AX = B \mid \cdot A^{-1} (L)$$

$$X = A^{-1} B$$

$$A^{-1} \Rightarrow [A^{-1} I] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_4} \left(\begin{array}{c|cccccc} 2 \leftrightarrow 1 & & & & & & \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3/(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{c|cccccc} 1r_1 - 1r_2 & x(-1) & & & & & \\ 3r_1 - 1r_3 & x(-1) & & & & & \\ 4r_1 - 1r_4 & x(-1) & & & & & \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3/(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{c|cccccc} 3r_1 - 2r_4 & x(-1) & & & & & \\ 4r_1 - 2r_4 & x(-1) & & & & & \\ \hline 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3/(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{c|cccccc} 3r_1 - 3r_4 & x(-1) & & & & & \\ 2r_1 - 3r_4 & x(-1) & & & & & \\ \hline 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3/(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Samajje jedan Mati Ivica!

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} 1r - 4r \times (-1) \\ 2r - 4r \times (1) \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} 1r \\ 2r \\ 3r \\ 4r \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} A^{-1} \\ 1r \\ 2r \\ 3r \\ 4r \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|cc} 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$X = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

17. a) Dokazi da za regularne matrice $A, B, C \in M_n$ je: $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

$$\begin{aligned} (ABC)X &= I \\ ABCX &= I \cdot I \cdot A^{-1}(L) \\ BCX &= A^{-1} \cdot I \cdot B^{-1}(L) \\ CX &= B^{-1}A^{-1} \cdot I \cdot C^{-1}(L) \\ X &= C^{-1}B^{-1}A^{-1} \checkmark \end{aligned}$$

b)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} BX^{-1}A &= B^{-1}A^{-1} \cdot B^{-1}(L) \\ X^{-1}A &= B^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A^{-1} \cdot I \cdot A^{-1}(D) \\ X^{-1} &= B^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A^{-1} \cdot A^{-1} \cdot I^{-1} \\ X &= A^2 \cdot A^1 \cdot B^1 \cdot B^2 \\ X &= A^2 \cdot B^2 \end{aligned}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

18.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (X^{-1}A)^{-1} &= I + BX \\ A^{-1}X &= I + BX \cdot I \cdot X^{-1}(D) \\ A^{-1} &= X^{-1} + B \\ X^{-1} &= A^{-1} - B \end{aligned}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \left(2r - 1r \times 3 \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \left(1r - 2r \times 2 \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \left(1r / 5 \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \left(2r / (-2) \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(19)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow A, B - \text{regularne?} \\ \rightarrow AX^{-1}B \stackrel{?}{=} (B^T)^{-1}A$$

$$= \det A \neq 0$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \checkmark$$

$$\det B \neq 0$$

$$\det B = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2 + 2 = 1 \checkmark$$

$$= AX^{-1}B = (B^T)^{-1}A \cdot A^T(L)$$

$$X^{-1}B = A^{-1} \cdot (B^T)^{-1}A \cdot A^T \cdot B^T(D)$$

$$X^{-1} = A^{-1} \cdot (B^T)^{-1} \cdot A \cdot B^T \cdot D^{-1}$$

$$X = B \cdot A^{-1} \cdot B^T \cdot A$$

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{pmatrix} 3r_1 - r_2 \\ 2r_1 - r_3 \end{pmatrix}} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{pmatrix} 2 \leftrightarrow 3 \end{pmatrix}} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{pmatrix} 2r_3 - r_2 \\ 1r_1 + 2r_3 - r_2 \end{pmatrix}} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{pmatrix} 2 \leftrightarrow 3 \end{pmatrix}} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{pmatrix} 2r_1 - (-2r_2) \\ 1r_1 + 2r_3 - r_2 \end{pmatrix}} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{pmatrix} 2 \leftrightarrow 3 \end{pmatrix}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}} A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & -6 & 2 \\ \frac{3}{2} & -4 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$(20) \left\{ \begin{array}{l} AX + Y = I \mid B(D) \\ XB + A^{-1}Y = 0 \mid A(L) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} AXB + YB = B \\ AXB + Y = 0 \end{array} \right.$$

$$YB - B = -Y$$

$$YB + Y = B$$

$$Y(B + I) = B$$

$$Y = B \cdot (B + I)^{-1}$$

$$Y = B$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X, Y = ?$$

$$\Rightarrow Y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AX = I - Y \mid \cdot A^{-1}(L)$$

$$X = A^{-1}(I - Y)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1r_1 + 4r_2 \\ 1r_1 + 3r_2 \end{pmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -4 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} 2r_1 - r_2 \\ 1r_1 + 2r_2 \end{pmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} 2r_2 - r_1 \\ 1r_2 + 3r_1 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1r_1 + 2r_2 \\ 1r_1 + 3r_2 \end{pmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Samo je jedan Mati Irical

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

4.5. LINEARNA NEZAVISNOST VEKTORA I RANG MATRICE

= Sa V^n označavat ćemo prostor svih vektor-stupaca duljine n , ondušno:

$$V^n \rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

= DEFINICIJA 1.

↳ Neka su $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$ bilo koji vektori iz prostora V^n . Linearna kombinacija vektora $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$ je vektor oblika:

$$\vec{x} = \lambda_1 \cdot \vec{a}_1 + \lambda_2 \cdot \vec{a}_2 + \dots + \lambda_k \cdot \vec{a}_k,$$

gdje su $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ skalari iz \mathbb{R} .

Skup svih ovakvih linearnih kombinacija nazivamo prostor razapet vektorma $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$, i označavamo s:

$$L(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k) = \{ \vec{x} \mid \vec{x} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_k \vec{a}_k, \lambda_i \in \mathbb{R} \}.$$


= PRIMER 1.

Neka je $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in V^2$. Naći $L(\vec{a}_1) = \lambda$, i interpretirati vektor geometrijski.

$$= L(\vec{a}_1) = \{ \vec{x} = \lambda \cdot \vec{a}_1, \lambda \in \mathbb{R} \} = \left\{ \begin{bmatrix} 2\lambda \\ 3\lambda \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

= vektor \vec{a}_1 pisemo i kao: $2\vec{i} + 3\vec{j} = \lambda(2\vec{i} + 3\vec{j})$

Grafički:



$\rightarrow L(\vec{a}_1)$ je jednodimenzionalni podprostor u V^2 ; predstavlja pravac p kroz ishodište određen vektorm $2\vec{i} + 3\vec{j}$ tзв. vektor nosač.


= PRIMER 2.

U skupu V^3 nati prostor razapet vektorma: $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ i $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

$$= L(\vec{a}_1, \vec{a}_2) = \{ \vec{x} \mid \vec{x} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 \} = \{ \vec{x} \mid \vec{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \} = \{ \vec{x} \mid \vec{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 \\ \lambda_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$$

↳ $\vec{x} = (\lambda_1 + \lambda_2) \vec{i} + \lambda_1 \vec{j}$.

= grafički:



- Ovo je podprostor vektora u XoY ravni, jer se svaki vektor iz XoY može napisati putem linearne kombinacije od \vec{a}_1 i \vec{a}_2 .

DOKAZ:

1) geometrijski - sa slikom:
 $\vec{x} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2$

2) analitički:

Uzmimo bilo koji vektor \vec{x} u \mathbb{R}^2 ; recimo $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \lambda_1 + \lambda_2 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{Ako: } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0$$


$$\begin{aligned} x_1 &= \lambda_1 + \lambda_2 & \Rightarrow \lambda_2 &= x_1 - \lambda_1 \\ x_2 &= \lambda_2 & \Rightarrow \lambda_1 &= x_2 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Dakle za svaki vektor \vec{x} u \mathbb{R}^2 možemo pronaći odgovarajuće koeficijente λ_1, λ_2 tako da je $\vec{x} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2$.

= Pitanje 3.

a) Neka su zadani $\vec{a}_1 = [1, 1, 0]^T$, $\vec{a}_2 = [0, 1, 1]^T$. Naći $L(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$ i skiciraj ga.

→ graf:



$L(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$: skup svih radij-vektora koji leže u ravni Π razapetoj s vektorima \vec{a}_1, \vec{a}_2 .

b) 1 PITANJE: Ako uzmemo treti vektor $\vec{a}_3 = [2, -1, -3]^T$, da li vrijedi:

$L(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) = L(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$?
Vrijedi $L_1(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) = L_2(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$ jer vektor \vec{a}_3 leži u ravni razapenoj vektorima \vec{a}_1 i \vec{a}_2 .

Naime:

$\vec{a}_3 = 2\vec{a}_1 - 3\vec{a}_2$, tj. \vec{a}_3 je linearna kombinacija tih dva vektora.

2 PITANJE: Ako uzmemo treti vektor $\vec{a}_3 = [0, 1, 0]^T$, da li vrijedi:

$L_1(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) = L_2(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$?
Ne vrijedi $L_1(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) = L_2(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$, jer vektor \vec{a}_3 ne leži u ravni razapenoj vektorima $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{i}$.

$L_1(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) = V^3$

Naime, svaki vektor $\vec{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$ možemo pokazati kao linearnu kombinaciju vektura $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$, tj.:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \lambda_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \lambda_1 & \lambda_1 &= x_1 \\ x_2 &= \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 & \lambda_2 &= x_2 - x_1 \\ x_3 &= \lambda_2 & \lambda_3 &= x_3 \end{aligned}$$

Samo je jedan Mali Ivica

= DEFINICIJA 2.

↳ Kazemo da su vektori $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$ linearno nezavisni ako iz jednačnosti:

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_k \vec{a}_k = \vec{0}$$

sljedi da svi skaliari $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ moraju biti jednak 0, tj.: $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$.

Dругим rječima, vektori su linearno nezavisni ako njihova linearna kombinacija isčezava samo na trivijalan način.

= DEFINICIJA 3.

↳ Kazemo da su vektori $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k$ linearno zavisni ako postoji skalar $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ kod kojih barem jedan nije jednak nuli, tako da vrijedi:

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_k \vec{a}_k = \vec{0}$$

Dругim rječima, vektori su linearno zavisni ako njihova linearna kombinacija isčeza na ne-trivijalan način.

= PRIMJER 1.

↳ U slučaju linearno zavisnih vektora, jedan od vektora može se izraziti kao linearna kombinacija ostalih. Naime, ako je primjerice $\lambda_i \neq 0$, onda:

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_i \vec{a}_i + \lambda_k \vec{a}_k = \vec{0} \quad | : \lambda_i$$

$$\vec{a}_i = \frac{\lambda_1}{\lambda_i} \vec{a}_1 + \dots + \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} \vec{a}_{i-1} + \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \vec{a}_{i+1} + \dots + \frac{\lambda_k}{\lambda_i} \vec{a}_k$$

= PRIMJER 4.

Ispitaj da li su vektori zavisni ili nezavisni ako vrijedi:

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{a}_1, \vec{a}_2 \in V^3$$

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 = \vec{0}$$

$$\lambda_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda_2 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff \begin{array}{l} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{array} \iff \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

↳ Trivijalno rješenje, vektori su linearno nezavisni.

= PRIMJER 5.

Ispitaj da li su vektori zavisni ili nezavisni ako vrijedi:

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \in V^3$$

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \lambda_3 \vec{a}_3 = \vec{0}$$

$$\lambda_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 + 2\lambda_3 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ \lambda_2 - 3\lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \lambda_1 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 - 3\lambda_3 = 0 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \begin{array}{l} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = -3 \\ \lambda_3 = 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \lambda_3 \vec{a}_3 = \vec{0}$$

$$2\vec{a}_1 + 3\vec{a}_2 - \vec{a}_3 = \vec{0}$$

$$\vec{a}_3 = 2\vec{a}_1 + 3\vec{a}_2$$


↳ vektori su zavisni jer se jedan vektor može izraziti kao kombinacija preostalih vektora.

= PRIMJER 6.

Odredi dimenziju prostora $L(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3)$ i nacrtaj graf, ako vrijedi:

$$\vec{a}_1 = [1, 1, 0]^T, \vec{a}_2 = [0, 1, 1]^T, \vec{a}_3 = [2, -1, 3]^T$$

Dimenzija prostora $L(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3)$ je 2, jer postoji vektor $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ koji su linearno zavisni, dok su npr. \vec{a}_1 i \vec{a}_2 linearno nezavisni, grafčki:



= za zadane vektore $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ uvijet je jednoznačno određen broj linearno nezavisnih vektora iz skupa $\{ \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \}$. Taj broj nazivamo dimenzijom prostora kojeg označavamo $L(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n)$.

= PRIMJER 7.

Dakle da li su vektori zavisni ili nezavisni ako vrijedi:

$$\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, \dots, \vec{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n = \vec{0}$$

$$\lambda_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + \lambda_n \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \vdots \\ \lambda_n = 0 \end{array}$$

→ vektori su linearno nezavisni

= to znači da se svaki vektor $\vec{x} = [x_1, \dots, x_n]^T$, može prikazati u obliku linearne kombinacije zadanih vektora e_1, \dots, e_n .

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + x_n \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n$$

Samo je jedan Mati kval

= Broj linearno nezavisnih redaka u matrici A obziđe se tako da se ta matrica svede na reduciraju formu A_2 . Onda je broj linearno nezavisnih redaka od matrice A jednak rangu matrice A_2 , tj. broju ne-nulredaka od A_2 .

= STAVAK 1.

↳ Broj linearno nezavisnih redaka bilo koje matrice jednak je broju njenih linearno nezavisnih stupaca.

Samo je jedan Mali Ivica!

5. LINEARNI SUSTAVI

5.1. GAUSSOVA METODA ELIMINACIJE

= PRIMJER 1.

Napiši vektorski zapis sustava:

$$\begin{aligned} x+3y-2 &= -4 \\ -x+2y+3z &= 5 \\ 2x+y+z &= 6 \end{aligned}$$

↳ Zadatkom sustavu pripisemo maticu:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

↳ Iz sustava vrijedi: $x=2$

$$\begin{aligned} y &= 1 \\ z &= 3 \end{aligned} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

= Općenito, sustav od m jednadžbi s n nepoznaticama zapisuje se:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

\vdots

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Njegov zapis dan je u obliku matrične jednadžbe $A\vec{x} = \vec{b}$; to da vrijedi:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

A = matica koeficijenata sustava

\vec{x} = vektor nepoznaticica

\vec{b} = desna strana sustava, vektor slobodnih koeficijenata

Rješenje sustava je svaki n -terac (x_1, x_2, \dots, x_n) koji zadovoljava sve jednadžbe sustava. Mogu nastupiti sljedeći slučajevi za broj rješenja:

1.) nula rješenja \Rightarrow kontradiktoran (protuslovan) sustav

= PRIMJER 2.

Sustav: $\begin{aligned} 2x+3y &= 4 \\ 4x+6y &= 7 \end{aligned}$ je protuslovan.

$$\begin{aligned} 2x+3y &= 4 \cdot 2 \\ 4x+6y &= 7 \\ 4x+6y &= 7 \\ 4x+6y &= 7 \\ 7 &= 8 ?? \end{aligned}$$

2.) jedno rješenje \Rightarrow jednoznačno (jedincato) rješenje

= PRIMJER 3.

Sustav: $\begin{aligned} 2x+3y &= 4 \\ x+y &= 3 \end{aligned}$ ima jedincato rješenje.

Samo je jedan Mali Ivica!

Samo je jedan Mali Ivica!

$$\begin{aligned} 2x+3y &= 4 \\ -x+y &= 3 \rightarrow x = y - 3 \\ 2(y-3)+3y &= 4 \quad x = -1 \\ 5y &= 10 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

= PRIMER 4.

Sustav: $\begin{array}{l} 2x+3y=4 \\ 4x+6y=8 \end{array}$ ima beskonačno mnogo rješenja.

$$\begin{aligned} 2x+3y &= 4 \rightarrow 2x = 4 - 3y \\ 4x+6y &= 8 \quad x = 2 - \frac{3}{2}y \rightarrow x = 2 - \frac{3}{2}\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ 4\left(2 - \frac{3}{2}y\right) + 6y &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8 - 6y + 6y &= 8 \\ 0 &= 0 \quad (\infty) \\ y &= \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

= Gaussova metoda eliminacije

↳ Metoda se sastoji u tome da se sustav prevede elementarnim transformacijama u ekvivalentni sustav kojem se lako razaze rješenja.

Navedene transformacije doista je provoditi nad proširenom matricom koeficijenata sustava: $[A|B]$.

↳ Algoritam:

-1.korak - Sustav $A\vec{x} = \vec{B}$ napisana u matičnom obliku $[A|B]$.

-2.korak - Matricu A svedemo na reducirani oblik A_r čime se dobiva ekvivalentni sustav: $[A_r|B]$.

Ako postoji nulredak od A_r takao da je odgovarajući član u stupcu \vec{B} različit od nule, sustav tada nemaju rješenja jer je rang $(A) < \text{rang } (A, \vec{B})$.

-3.korak - Ispisujemo sustav jednadžbi koji odgovara sustavu $[A_r|B]$. Nepoznate pridružene stupcima sa stozera elementima ostavljaju na lijevoj strani jednostoti (to su tzv. "vezane" nepoznate), a ostale elemente prebacujemo na desnu stranu jednostoti (to su tzv. "slobodne" nepoznate).

-4.korak - Prebacene nepoznate parametriziramo, jer mogu poprimiti sve moguće vrijednosti iz \mathbb{R} , te zapisujemo rješenja sustava u vektorskom obliku.

= Postoje dvije vrste sustava:

1.) homogeni sustav:

$$\text{Oblik: } a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

:

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$

bunjet ima rješenje (\emptyset)

2.) nehomogeni sustav:

↳ ostali sustavi

↳ ne mora vrijediti imati rješenje

=PRIMJER 5.

Riješi sustav:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 &= 0 \\2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 &= 0 \\x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 &= 0 \\x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0\end{aligned}$$

Samo je jedan Mali Ivičić

$$\hookrightarrow [A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2r_1 - 1r_2 & x(2) \\ 3r_1 - 1r_3 & x(1) \\ 4r_1 - 1r_4 & x(1) \\ r_1 & x(1) \end{array} \right) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2r_1 & (-3) \\ r_1 & x(1) \end{array} \right) \sim$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1r_1 - 2r_2 & x(2) \\ 4r_1 - 2r_3 & x(-1) \\ r_1 & x(1) \end{array} \right) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1r_1 - 3r_2 & x(\frac{1}{3}) \\ 2r_1 - 3r_3 & x(\frac{1}{3}) \\ r_1 & x(1) \end{array} \right) \sim$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\hookrightarrow \begin{aligned}x_1 + x_4 &= 0 \\x_2 &= 0 \\x_3 &= 0\end{aligned} \quad \begin{aligned}x_1, x_2, x_3 &\rightarrow \text{"vezane" nepoznate} \\x_4 &\rightarrow \text{"slobodna" nepoznatica} \quad x_4 = \lambda, \lambda \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

↔

$$\begin{aligned}x_1 &= -x_4 \\x_2 &= 0 \\x_3 &= 0\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{aligned}x_1 &= -\lambda \\x_2 &= 0 \\x_3 &= 0\end{aligned}, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda \\ 0 \\ 0 \\ \lambda \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}$$

=PRIMJER 6.

Riješi sustav:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\2x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\3x_2 + 3x_3 &= 5\end{aligned}$$

$$\hookrightarrow [A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 5 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2r_1 - 1r_2 & x(-2) \\ 3r_1 - 2r_3 & x(3) \end{array} \right) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 3 & 5 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2r_1 & 3 \end{array} \right) \sim$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 5 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1r_1 - 2r_2 & x(1) \\ 3r_1 - 2r_3 & x(3) \end{array} \right) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right]$$

$$\hookrightarrow \begin{aligned}x_1 &= 1 \\x_2 + x_3 &= 2 \\0 &= -3\end{aligned}$$

↳ protuslovni sustav jer $0 \neq -\frac{1}{3}$ pa sustav ne može biti rješen
 ↳ rang(A) < rang([A|B])

2 < 3

Samo je jedan Mali Ivica!

=PRIMER 7.

Riješi sustav:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 7x_5 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 + 5x_5 &= 0 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow [A|b] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 3 & 7 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 5 & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2r-1r \times (2) & & & & & \\ 3r-1r \times (2) & & & & & \\ & & & & & \end{array} \right) \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1r-2r \times (1) & & & & & \\ 3r-2r \times (-1) & & & & & \\ & & & & & \end{array} \right) \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\hookrightarrow \begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_4 + 2x_5 &= 0 & x_1, x_3 - \text{"vezane" nepoznacice} \\ x_3 - x_4 + x_5 &= 0 & x_2, x_4, x_5 - \text{"slobodne" nepoznacice} \\ x_2 = -2x_1 - 3x_4 - 2x_5 &\Leftrightarrow x_1 = -2d - 3B - 2x & x_2 = d, d \in \mathbb{R} \\ x_3 = x_4 - x_5 && x_3 = B + X, B, X \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow \begin{aligned} x_1 &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2d - 3B - 2x \\ d \\ B - x \\ B \\ x \end{bmatrix} = d \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + B \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, d, B, x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

↪ dobili smo troparametarsko predstavljanje u kojem vektori:
 $[-2 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]^T, [3 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]^T, [2 \ 0 \ -1 \ 0 \ 1]^T$
 razapinju tridimenzionalni prostor.

=PRIMER 8.

Riješi sustav u ovisnosti o parametru λ :

$$\begin{aligned} x + y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \lambda \\ x + y + \lambda z &= \lambda \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow [A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2r-1r \times (1) & & & & & \\ 3r-1r \times (2) & & & & & \\ & & & & & \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & 1 & \lambda \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^2 & 1 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} 1^{\text{st}} \quad \lambda - 1 &= 0 \\ \lambda &= 1 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow [A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} x + y + z & = 1 \\ x + y - z & = 0 \\ x - y - z & = 0 \end{array} \right)$$

\uparrow

$$\begin{aligned} x &= 1 - y - z \\ x &= 1 - d - B \end{aligned}$$

$x - \text{"vezana" nepoznacica}$
 $y, z - \text{"slobodne" nepoznacice}$
 $x = d, z = B, d, B \in \mathbb{R}$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda - B + 1 \\ \lambda \\ B \end{bmatrix} = \lambda \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + B \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda, B \in \mathbb{R}$$

Samo je jedan. Mati Ivica!

$$2^{\circ} \quad \lambda - 1 \neq 0 \\ \lambda \neq 1$$

$$[A : b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & 1 - \lambda^2 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 - 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \lambda & 1 + \lambda & 1 + \lambda \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \lambda & 1 + \lambda & 1 + \lambda \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \lambda + 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 + \lambda & 1 + \lambda \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \lambda + 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \lambda & 1 + \lambda \end{array} \right)$$

$$2a^{\circ} \quad \lambda + 2 = 0 \\ \lambda = -2$$

$$[A : b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} x + 2 = -2 \\ y - 2 = 0 \\ 0 = -1 \end{array}$$

↳ protuskladni sustav
↳ nemam rješenja //

$$2b^{\circ} \quad \lambda + 2 \neq 0 \\ \lambda \neq -2$$

$$[A : b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \lambda + 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 + \lambda & 1 + \lambda \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \lambda + 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \lambda & 1 + \lambda \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 - \frac{1}{\lambda + 2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 - \frac{1}{\lambda + 2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 - \frac{1}{\lambda + 2} \end{array} \right)$$


$$x = -\frac{1}{\lambda + 2}$$

$$y = \frac{\lambda + 1}{\lambda + 2}$$

$$z = \frac{\lambda + 1}{\lambda + 2}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\lambda + 2} \\ \frac{\lambda + 1}{\lambda + 2} \\ \frac{\lambda + 1}{\lambda + 2} \end{bmatrix}$$

↳ Shematski:



5.2. CRAMEROVO PRAVILA

= STAVAK 1.

↳ Svaka komponenta x_i rješenja \vec{x} sustava $A\vec{x} = \vec{b}$ s regularnom matricom A može se napisati u obliku redateljstva u kojem je u mazninku determinanta od matrice A , a u brojniku determinanta matrice u kojoj je ići stupac zamijenjen s vektorm b , tj.:

$$x_i = \frac{D_i}{D}$$

↳ Korisno samo za matrice reda 2 i 3.

= PRIMER 1.

↳ Riješi sustav Cramerovim pravilom:

$$\begin{array}{l} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x - y - z = 1 \\ x + 3y + 4z = 6 \end{array}$$

$$\hookrightarrow D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 2 & -1 & -1 & | & 1 \\ 1 & 3 & 4 & | & 3 \end{vmatrix} = -4 - 2 + 18 + 3 + 3 - 16 = 2$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 & | & 2 \\ 1 & -1 & -1 & | & 1 \\ 6 & 3 & 4 & | & 3 \end{vmatrix} = -20 - 12 + 9 + 18 + 15 - 8 = 2$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & | & 5 \\ 2 & 1 & -1 & | & 1 \\ 1 & 6 & 4 & | & 6 \end{vmatrix} = 4 - 5 + 36 - 3 + 6 - 40 = -2$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 & | & 2 \\ 2 & -1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 3 & 6 & | & 3 \end{vmatrix} = -6 + 2 + 30 + 5 + 3 - 24 = 4$$

$$\hookrightarrow x = \frac{D_x}{D} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{4}{2} = 2$$

5.3. KARAKTERISTIČNI POLINOM I SVOJSTVENA VRIJEĐNOST

= DEFINICIJA 1.

↳ Vektor $\vec{v} \neq 0$ zovemo svojstvenim (vlastitim) vektorom kvadratne matrice A ako postoji skalar λ takav da vrijedi:

$$A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$$

Skalar λ zovemo svojstvena (vlastita) vrijednost matrice A , koja odgovara svojstvenom vektoru \vec{v} .

= STAVAK 1.

↳ Ako su \vec{x}, \vec{y} dva nekolinearna vektora koji odgovaraju istoj svojstvenoj vrijednosti λ , onda je i vektor $\alpha \cdot \vec{x} + \beta \cdot \vec{y}$ svojstveni vektoriza vrijednost λ .

DOKAZ:

$A(d\vec{x} + B\vec{y}) = d \cdot A\vec{x} + B \cdot A\vec{y} = d\lambda\vec{x} + B\lambda\vec{y} = \lambda(d\vec{x} + B\vec{y})$

↳ To znači da je svaki vektor iz podprostora $L(\vec{x}, \vec{y})$ razapetog vektorskog prostora \vec{x}, \vec{y} svojstven. Taj podprostor nazivamo svojstveni podprostor koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ . \square \square \square

=PRIMER 1.

za matricu $A = I$ vrijedi: Svaki je vektor svojstveni, a zajednička svojstvena vrijednost je $\lambda = 1$, jer obično vrijedi: $I \cdot \vec{v} = 1 \cdot \vec{v}$

=PRIMER 2.

Nadji svojstvenu vrijednost i svojstvene vektore matrice $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

↳ $A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{bmatrix}$$

 \Leftrightarrow

$$\begin{array}{l} x_2 = \lambda x_1 \\ x_1 = \lambda x_2 \end{array}$$

$$x_1 = \lambda(\lambda x_1) = \lambda^2 x_1$$

$$x_1(\lambda^2 - 1) = 0$$

$$1^{\circ} \quad \lambda^2 - 1 = 0$$

$$2^{\circ} \quad x_1 = 0$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = -1$$

$$x_2 = 0 \rightarrow \text{otпада}, \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 0$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = -1$$

$$x_2 = 0 \rightarrow \text{отпада}, \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$1^{\circ} \quad \lambda_1 = 1 \quad \dots \quad \begin{array}{l} x_2 = x_1 \\ x_1 = x_2 \end{array} \Leftrightarrow \vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \in \mathbb{R}$$

↳ za $\lambda_1 = 1$ dobijemo svojstveni vektor $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Taj vektor je svojstveni vektor koji odgovara svojstvenoj vrijednosti $\lambda = 1$.

$$2^{\circ} \quad \lambda_2 = -1$$

$$\begin{array}{l} x_2 = -x_1 \\ x_1 = -x_2 \end{array} \Leftrightarrow \vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \in \mathbb{R}$$

↳ za $\lambda_2 = -1$ dobijemo svojstveni vektor $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Taj vektor je svojstveni vektor koji odgovara svojstvenoj vrijednosti $\lambda = -1$.

II NALAŽENJE SVOJSTVENIH VEKTORA

= Sudjeli se na rješavanje homogenog sustava.

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \Leftrightarrow (A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

Slijedi: \vec{v} je svojstveni vektor onda i samo onda ako homogeni sustav $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$ ima neprividno rješenje.

Dati bi to bilo ispunjeno, matrica $A - \lambda I$ ne smije biti regularna, pa zato njen determinanta mora biti različita od nule, tj.

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

=DEFINICIJA 2.

↳ Karakteristični polinom matrice A , označenom $K(\lambda)$ je:

$$K(\lambda) := \det(\lambda I - A) = \lambda^n - \alpha_1 \lambda^{n-1} - \cdots - \alpha_{n-1} \lambda - \alpha_n$$

Jednadžba:

$$K(\lambda) = \det(\lambda I - A) \neq 0$$

zove se karakteristična jednadžba matrice A , a rješenja rješenja svih svojstvenih vrijednosti matrice A .

= Algoritam za traženje svojstvenih vektora:

-1. korak - Izračunamo karakteristični polinom:
 $K(\lambda) = \det(\lambda I - A)$.

-2. korak - Odredimo svojstvene vrijednosti (sva rješenja karakteristične jednadžbe $\lambda(\lambda) = 0$)

-3. korak - za svaku svojstvenu vrijednost λ odredimo propadnu svojstveni vektor. To su linearno nezavisna, različita od nule rješenja homogenog sustava:
 $(\lambda I - A)\vec{v} = 0$

= PRIMER 3.

Otkidi svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore matrice

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 4 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

↳ karakteristični polinom:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & 1 \\ -2 & \lambda - 5 & 2 \\ -4 & -4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda + 1) +$$
 $+ 8 + 8 + 4(\lambda - 5) + 8(\lambda - 4) - 2(\lambda + 1) =$
 $= (\lambda^2 - 5\lambda - 4\lambda + 20)(\lambda + 1) + 16 + 4\lambda - 20 + 8\lambda - 32 - 2\lambda - 2 =$
 $= \lambda^3 + \lambda^2 - 9\lambda^2 + 9\lambda + 20\lambda + 20 + 16 + 4\lambda - 20 + 8\lambda - 32 - 2\lambda - 2 =$
 $= \lambda^3 - 8\lambda^2 + 21\lambda - 18$

↳ karakteristična jednadžba:

$$K(\lambda) = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 21\lambda - 18 = 0$$

rješenja jednadžbe mogu biti samo cijelobrojni djelitelji broja 18, pa dobivamo da je $\lambda_1 = 2$ i $\lambda_2 = 3$. pa pišemo gornju jednadžbu kao:

$$k(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 3)^2 = 0$$

1° $\lambda_1 = 2$ - svojstvena vrijednost (jednostvuka)

Mora biti $(\lambda_1 I - A)\vec{v} = 0$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ -2 & -3 & 2 \\ -4 & -4 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 2 & 0 \\ -4 & -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & -3 & 2 & 0 \\ -4 & -4 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -2 & -3 & 2 & 0 \\ -4 & -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -4 & -4 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -4 & -4 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left(2r1(+2) \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{4}x_3 = \frac{1}{4}t$$

$$x_2 = \frac{1}{2}x_3 = \frac{1}{2}t$$

$$x_3 = t$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}t \\ \frac{1}{2}t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, 2a + 4 \dots \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

88

2. $\lambda_{2,3} = 3$ - svojstvena vrijednost (duostruka)

Nora bin : $(\lambda_{2,3} I - A) \vec{v} = \vec{0}$

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \\ -4 & -4 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 0 \\ -4 & -4 & 4 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & -4 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 - x_3 = 0 \quad x_1 = s - t \\ x_2 = t \\ x_3 = s$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s-t \\ t \\ s \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

\Rightarrow postoje 2 suvodstvena vektora:

$$v_1 = [1 \ 0 \ 1]^T \text{ i } v_2 = [-1 \ 1 \ 0]^T.$$

Samo je jedan Mali Ivica!

ZADACI (DZ 5. PRVI DIO)

1.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \\ 7x_1 + 4x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0 \\ x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & -6 & 0 \\ 7 & 4 & 6 & -5 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & -6 & 0 \\ 7 & 4 & 6 & -5 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -12 & -13 & 0 \\ 0 & 4 & -50 & -54 & 0 \\ 0 & 2 & -25 & -27 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -12 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -12 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -4 & & & & 0 \\ 0 & 1 & & & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -12 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -12 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -12 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -12 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 8 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -36 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow x_1 - x_4 = 0 \quad x_1 = x_4 = 2 \\ x_2 - x_4 = 0 \quad x_2 = x_4 = 2 \\ x_3 + x_4 = 0 \quad x_3 = -x_4 = -2$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Samo je jedan Masi Ivica!

(2)

Građevni:

$$\begin{cases} x + y + 3z = -7 \\ -x - y + 3z = 1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

$$D = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 - (-1) \cdot (-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = -1 + 3 + 3 - (-3 + 3 - 1) = 12$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -7 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -7 + 3 - 3 - (-3 + 21 + 1) = -12$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 21 - 3 - (3 + 3 + 7) = +36$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -7 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 1 + 7 - (7 - 1 - 1) = -12$$

$$x = \frac{D_x}{D} = -1 \quad y = \frac{D_y}{D} = -3 \quad z = \frac{D_z}{D} = -1$$

(3)

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 3 \\ x + 2y - 2z = 3 \\ x + 2z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 3 \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2r_1 - r_2 \times (1) \\ 3r_1 - r_3 \times (2) \\ \cdot \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 \rightarrow 3 \\ \cdot \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3r_1 - 2r_2 \times (2) \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + 2x_3 = 1$$

$$x_2 - 2x_3 = 1$$

$$x_3 = d$$

$$x_1 = 1 - 2d$$

$$x_2 = 1 + 2d$$

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2d \\ 1+2d \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, d \in \mathbb{R}$$

(4)

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_4 = -5 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = -4 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc} -2 & 1 & 0 & 3 & -5 \\ 3 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & -4 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 1 & -4 \\ 3 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 1 & -4 \\ 3 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 2r_1 - 1r_3 & \times (3) & & & \\ 3r_1 - 1r_4 & \times (-5) & & & \\ 4r_1 - 1r_2 & \times (-2) & & & \\ & & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & -3 & -4 & 5 & 13 \\ 0 & -3 & -4 & 1 & 11 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 13 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 8r_1 / (-3) & & & & \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{13}{3} & \\ 0 & 3 & -4 & 1 & 11 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & -13 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 1 & -4 \\ 3r_2 - 2r_1 & \times (11) & & & \\ 4r_3 - 2r_1 & \times (-3) & & & \\ 4r_4 - 2r_1 & \times (3) & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1r_1 - 3r_2 & \times (-\frac{2}{3}) & & & \\ 2r_1 - 3r_3 & \times (\frac{1}{3}) & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow x_1 + \frac{2}{3}x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{4}{3}x_3 = -\frac{7}{2} \\ x_4 = -\frac{1}{2} \\ x_3 = \alpha$$

$$x_1 = -\frac{2}{3}\alpha \\ x_2 = -\frac{4}{3}\alpha - \frac{7}{2} \\ x_3 = \alpha \\ x_4 = -\frac{2}{3}\alpha - \frac{7}{2} \\ x_5 = \alpha$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3}\alpha \\ -\frac{4}{3}\alpha - \frac{7}{2} \\ \alpha \\ -\frac{2}{3}\alpha - \frac{7}{2} \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{7}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 1 \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}$$

(5) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{ccccc} 2 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right] \sim \left(1 \rightarrow 2 \right) \sim \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right] \sim \left(2r_1 - 1r_2 \right) \sim \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left(2r_1 / (-1) \right) \sim \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right] \sim \left(1r_1 - 2r_2 \times (1) \right) \sim \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow x_1 + 2x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 1 \\ x_2 - 3x_3 - x_4 - 3x_5 = -1 \\ x_3 = \alpha \\ x_4 = \beta \\ x_5 = \gamma$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha - 2\beta - 2\gamma + 1 \\ 3\alpha + \beta + 3\gamma - 1 \\ \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

(6) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{ccccc} 1 & 3 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \sim \left(2r_1 - 1r_2 \times (1) \right) \sim \left(3r_1 - 1r_3 \times (1) \right) \sim \left(4r_1 - 1r_4 \times (1) \right) \sim \left(5r_1 - 1r_5 \times (1) \right) \sim \left(2 \rightarrow 5 \right) \sim \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 3 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & -7 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 3 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & -7 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

Samo je jedan Mali Ivica!

$$\begin{array}{c}
 \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 3 & 5 & -1 & 0 & | & 1 \\ \hline 0 & 1 & 4 & 0 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & -5 & -4 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & -7 & -4 & 2 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 & | & 2 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1r & -2r_1 & x & (3) \\ 3r & -2r_1 & x & (-5) \\ 4r & -2r_1 & x & (-7) \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 & | & 2 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 0 & 7 & -1 & 3 & | & 5 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 16 & 0 & -6 & | & 12 \\ 0 & 0 & 24 & 2 & -8 & | & 16 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 1 & | & 2 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline (3r_1)16 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{3}{8} & | & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} & | & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{8} & | & \frac{1}{4} \\ \hline \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 0 & -7 & -13 & 5 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{8} & | & \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 24 & 2 & -8 & | & 16 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 1 & | & 2 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & r & -3r_1 & x & (-7) \\ 2 & r & -3r_1 & x & (4) \\ 4 & r & -3r_1 & x & (24) \\ 5 & r & -3r_1 & x & (-3) \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 0 & 0 & -1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{8} \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 4r_1 | 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{8} \\ \hline \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & r & -4r_1 & x & (-1) \\ 5 & r & -4r_1 & x & (1) \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{7}{8} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{8} \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 5r_1 | \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{7}{8} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 11 & -5r & x & (\frac{7}{8}) \\ 21 & -5r & x & (\frac{1}{2}) \\ 3r & +5r & x & (-\frac{3}{8}) \\ 41 & -5r & x & (\frac{1}{2}) \\ \hline \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ \hline \end{array} \right)
 \end{array}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 \textcircled{7.} \quad A(0,3) \quad y = ax^2 + bx + c \quad \dots \quad 3 = c \\
 B(1,4) \quad \dots \quad 4 = a + b + c \\
 C(2,9) \quad \dots \quad 9 = 4a + 2b + c
 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{|ccc|} \hline 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 9 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccc|} \hline 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 9 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccc|} \hline 3r_1 - 1r_3 & (4) \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -3 & 7 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccc|} \hline 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -3 & 7 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccc|} \hline 2 \rightarrow 3 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccc|} \hline 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 2r_1 | (-2) \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1r_1 - 2r_2 & x(1) \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1r_1 - 3r_2 & x(-\frac{1}{2}) \\ 2r_1 - 3r_3 & x(\frac{3}{2}) \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{|ccccc|} \hline 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \right)$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow y = 2x^2 - x + 3 //$$

$$\begin{array}{l}
 \textcircled{8.} \quad P(0) = 1 \quad y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad \dots \quad 1 = d \\
 P(1) = 4 \quad \dots \quad 4 = a + b + c + d \\
 P(2) = 15 \quad \dots \quad 15 = 8a + 4b + 2c + d \\
 P(-1) = 0 \quad \dots \quad 0 = -a + b - c + d
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 & 15 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{(1 \rightarrow 2)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 1 & 15 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 3r_1 - 1r_2 \\ 4r_1 - 1r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 15 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 3r_1 - 1r_4 \\ 4r_1 - 1r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -6 & 7 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 2r_1 \\ 3r_1 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -6 & 7 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r_1 - 2r_2 \\ 3r_1 - 2r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 3r_1 - (-6) \\ 2 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \\
 \\
 \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & -6 & 7 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 2r_1 \\ 3r_1 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -6 & 7 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r_1 - 2r_2 \\ 3r_1 - 2r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 3r_1 - (-6) \\ 2 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \\
 \\
 \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 4r_1 - 3r_2 \\ 3r_1 - 4r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r_1 - 4r_2 \\ 2r_1 - 4r_3 \\ 3r_1 - 4r_4 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]
 \end{array}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow y = x^3 + x^2 + x + 1$$

(9)

$$P(0)=1 \quad y=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e \dots 1=e$$

$$P(1)=3$$

$$P(2)=21$$

$$P(-2)=21$$

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{(1 \rightarrow 2)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 3r_1 - 1r_2 \\ 4r_1 - 1r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -12 & -14 & -15 \\ 0 & 24 & 12 & 18 & 15 \end{array} \right] \xrightarrow{(2 \rightarrow 3)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 24 & 12 & 18 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r_1 - 2r_2 \\ 4r_1 - 2r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 \\
 \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 8 & -12 & -14 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 24 & -12 & 18 & 15 \end{array} \right] \xrightarrow{2r_1(-8)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & \frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{7}{4} & \frac{27}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -24 & 12 & 18 & 15 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r_1 - 2r_2 \\ 4r_1 - 2r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{3}{8} \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & \frac{15}{8} & \frac{27}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 24 & 24 & 30 \end{array} \right] \xrightarrow{(3 \rightarrow 4)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{3}{8} \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & \frac{15}{8} & \frac{27}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{4r_1/24} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{3}{8} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{15}{8} & \frac{27}{8} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{4} & \frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r_1 - 3r_2 \\ 2r_1 - 3r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{4} & \frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r_1 - 4r_2 \\ 3r_1 - 4r_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{1}{4}x_4 + 1 \\
 x_2 &= -\frac{1}{4}x_4 \\
 x_3 &= -x_4 + 1 \\
 x_4 &= d \\
 x_5 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}x_4 + 1 \\ -\frac{1}{4}x_4 \\ -x_4 + 1 \\ d \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ d \\ 1 \end{bmatrix} + d \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, d \in \mathbb{R} \Rightarrow y = x^4 + x^2 + 1$$

$$(10) \quad a \in \mathbb{R} = ? \quad (x_1, y, z) = (1, -1, 2) \quad I) \rightarrow -a^2 + 4 = 0 \quad a + 1 + 6 = 3 \Rightarrow a = -2, \text{ datko postoji!}$$

$$\begin{cases} a^2 y + 2z = 0 \\ ax + y + 3z = 3 \end{cases} \quad a = ?$$

$$\begin{array}{c}
 \downarrow \\
 \begin{array}{l} 4y + 2z = 0 \\ -2x + y + 3z = 3 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{(1 \rightarrow 2)} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{1r_1(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -3 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{2r_1/4} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} 1r_1 + 2r_2 \\ 2 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{5}{2} & -3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{array} \right]
 \end{array}$$

Samo je jedan Mati Ivica!

$$\begin{aligned}x_1 + \frac{5}{4}x_3 - \frac{3}{2} \\x_2 = -\frac{1}{2}x_3 \\x_3 = \lambda\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -\frac{1}{2}x_3 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4}\lambda - \frac{3}{2} \\ 0 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4}\lambda - \frac{3}{2} \\ 0 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Samo je jedan Mali Ivica!

11.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 3 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = -2 \\ -4x_1 + 9x_2 - 7x_3 - 2x_4 = \lambda \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & -1 & 1 & -2 \\ -4 & 9 & -7 & -2 & \lambda \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} 2r_1 - r_2 \\ 3r_1 - r_3 \\ -4r_1 + r_3 \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & \lambda + 12 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} 1r_1 - r_2 \\ 3r_1 - r_3 \\ -4r_1 + r_3 \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 4 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda + 11 \end{array} \right]$$

1º za $\lambda \neq 11 \rightarrow$ sustav nema rešenja2º za $\lambda = 11$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 4 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 4x_3 - 5x_4 + 5 = -4\lambda - 5B + 5 \\ x_2 &= -x_3 - 2x_4 + 1 = -\lambda - 2B + 1 \\ x_3 &= \lambda \\ x_4 &= B \end{aligned}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4\lambda - 5B + 5 \\ -\lambda - 2B + 1 \\ \lambda \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ B \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} -5 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda, B \in \mathbb{R}$$

12.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 = \lambda \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & \lambda & \lambda \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} 2r_1 - r_2 \\ 3r_1 + r_3 \\ r_1 + r_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & \lambda + 2 & \lambda + 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} 1r_1 - r_3 \\ 3r_1 + r_2 \\ -r_1 + r_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda + 4 & \lambda + 4 \end{array} \right]$$

1º za $\lambda = -4$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= -2 \\ x_2 &= 2x_3 - 3 = 2\lambda - 3 \\ x_3 &= \lambda \end{aligned} \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 + \lambda \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}$$

13.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = -1 \\ 2x_1 - x_2 - \lambda x_3 = -1 \\ 2\lambda x_1 - \lambda x_2 - 4x_3 = -2 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -\lambda & -1 \\ 2\lambda & -\lambda & -4 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} 2r_1 - r_2 \\ 3r_1 - r_3 \\ -2r_1 + r_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -\lambda + 2 & 1 \\ 0 & \lambda - 4 + 2\lambda & -2 + 2\lambda & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} 1r_1 - r_3 \\ 3r_1 - r_2 \\ -2r_1 + r_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - 4 & \lambda - 2 \end{array} \right]$$

1º a) $\lambda = -2$: \rightarrow sustav nema rešenja

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right]$$

b) za $\lambda = 2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} x_1 &= x_3 = \alpha \\ x_2 &= 1 \\ x_3 &= \alpha \end{aligned}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 1 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Samo je jedan Mali Ivićal

2^o a) za $\lambda \neq -2, \lambda \neq 2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda^2-4 & \lambda-2 \end{array} \right] \sim \left(3r/(\lambda^2-4) \right)$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\lambda+2} \end{array} \right]$$

$$\sim \left(1r - 3r x_1 (\lambda+2) \right)$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{\lambda-1}{\lambda+2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{\lambda+2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\lambda+2} \end{array} \right]$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\lambda-1}{\lambda+2} \\ \frac{2}{\lambda+2} \\ \frac{1}{\lambda+2} \end{bmatrix}$$

(14.)

$$\left\{ \begin{array}{l} (2\lambda-1)x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 2-\lambda \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2\lambda-1 & \lambda & 1 & 2-\lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left(1 \rightarrow 3 \right) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2-\lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left(2r - 1r x_1 \lambda \atop 3r - 1r x_1 (2\lambda-1) \right) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \\ 0 & 1-\lambda & 2\lambda-1 & 3-3\lambda \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \\ 0 & 1-\lambda & 2\lambda-1 & 3-3\lambda \end{array} \right]$$

$$\left(2 \rightarrow 3 \right) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array} \right]$$

1^o za $\lambda = 1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2-B+1 \\ 2 \\ B \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

d, B EIR

2^o za $\lambda \neq 1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda & -2\lambda^2+\lambda+1 & 3-3\lambda \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array} \right] \sim \left(2r/((1-\lambda)) \right)$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2\lambda+1 & 3 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array} \right] \sim \left(1r - 2r x_1 (1) \right)$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\lambda-1 & -2 \\ 0 & 1 & 2\lambda+1 & 3 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array} \right]$$

$$\left(3r/(1-\lambda) \right) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\lambda-1 & -2 \\ 0 & 1 & 2\lambda+1 & 3 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 1 \end{array} \right]$$

1^{oo} za $\lambda = -1$: \rightarrow sustav nemre rješenja

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\lambda-1 & -2 \\ 0 & 1 & 2\lambda+1 & 3 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left(1r - 3r x_1 (-\lambda-1) \atop 2r - 3r x_1 (2\lambda+1) \right)$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\lambda-1 & -2 \\ 0 & 1 & 2\lambda+1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

2^{oo} za $\lambda \neq -1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\lambda-1 & -2 \\ 0 & 1 & 2\lambda+1 & 3 \\ 0 & 0 & 1+\lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left(3r/((1+\lambda)) \right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{1+\lambda} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{1+\lambda} \end{array} \right]$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{2}{1+\lambda} \\ \frac{1}{1+\lambda} \end{bmatrix}$$

Samo je jedan Mati Ivica!

15.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{array} \right. \sim \left[\begin{array}{cccc|c} \lambda & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 & \lambda^2 & \lambda^2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 2\lambda - 1 + \lambda x(\lambda) \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3\lambda - 1 + \lambda x(1) \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 & \lambda^2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 0 & 1 - \lambda^2 & 0 & 0 & 1 - \lambda^2 \\ 0 & 1 + \lambda & \lambda - 1 & \lambda^2 - \lambda & \lambda^2 - \lambda \end{array} \right]$$

1° za $\lambda = 1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda - B + 1 \\ \lambda \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda, B \in \mathbb{R}$$

2° za $\lambda = -1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}$$

3° za $\lambda \neq 1, \lambda \neq -1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 & 2/(1-\lambda^2) \\ 0 & 1-\lambda^2 & 0 & 1-\lambda^2 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & \lambda^2-\lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & \lambda & 1 & \lambda & 1/(1-\lambda^2) \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3/(1-\lambda^2) \\ 0 & 1-\lambda^2 & \lambda-1 & \lambda^2-\lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2-\lambda}{\lambda-1} & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2-\lambda}{\lambda-1} & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & -\lambda-1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left(\frac{3\lambda}{(1-\lambda)} \right) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2-\lambda}{\lambda-1} & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2-\lambda}{\lambda-1} & 1 \end{array} \right]$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2-\lambda}{\lambda-1} \\ 1 \\ \frac{2-\lambda}{\lambda-1} \\ \frac{2-\lambda}{\lambda-1} \end{bmatrix}$$

16.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \lambda \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} \lambda & 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 2\lambda - 1 + \lambda x(1) & 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 3\lambda - 1 + \lambda x(1) & 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 - \lambda & \lambda + 1 \\ 4\lambda - 1 + \lambda x(\lambda) & 0 & 0 & \lambda + 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & 1 - \lambda^2 & 0 \end{array} \right]$$

1° za $\lambda = 1$:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 - B - \lambda + 1 \\ \lambda \\ B \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda, B \in \mathbb{R}$$

$$2^{\circ} \text{ za } \lambda \neq 1:$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & -\lambda & \lambda-1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & -\lambda^2 & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cc} 2r & (\lambda-1) \\ 4r & (\lambda-1-\lambda) \end{array} \right) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1+\lambda & 0 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cc} 1r-2rx(1) \\ 4r-2rx(1) \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda+1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2+\lambda & -1 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cc} 3r(\lambda+1) \\ -1 \end{array} \right) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2+\lambda & -1 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cc} 1r-3rx(1) \\ 4r-3rx(1) \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \lambda+2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+3 & -1 \end{array} \right]$$

$$1^{\text{oo}} \text{ za } \lambda = -3:$$

\rightarrow sustav norma rješenja

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

$$2^{\text{oo}} \text{ za } \lambda \neq -3:$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \lambda+2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+3 & -1 \end{array} \right] \sim \left(\begin{array}{cc} 4r(\lambda+3) \\ -1 \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{\lambda+2}{\lambda+3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{-1}{\lambda+3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{-1}{\lambda+3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{\lambda+3} \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\lambda+2}{\lambda+3} \\ \frac{-1}{\lambda+3} \\ \frac{-1}{\lambda+3} \\ \frac{-1}{\lambda+3} \end{bmatrix} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

(17)

Svojstvena vrijednost / vektor = ?

I) polinom:

$$\det(\lambda I - A) = \det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \right) = \det \begin{bmatrix} \lambda-1 & 2 \\ -2 & \lambda-4 \end{bmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-4)-4 = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda-5) \rightarrow \lambda_1 = 0 \rightarrow \lambda_2 = 5 //$$

$$\text{II) } 1^{\text{o}} \lambda_1 = 0 \dots$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(1r(-1) \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(2r-1rx(-2) \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x \\ x \end{bmatrix} = d \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad d \in \mathbb{R}$$

$$2^{\text{o}} \lambda_2 = 5 \dots$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(1r/4 \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \left(2r-1rx(-2) \right) \sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Samo je jedan Mali Ivičić

Samo je jedan Mali Ivica!

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112\lambda \\ 2 \end{bmatrix} = \lambda \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} //$$

- (18) Svojstvena vrijednost/vektor? ... $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

I) polinom:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \lambda+3 & 0 \\ -1 & \lambda-3 \end{pmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-3) \rightarrow \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 3$$

II) 1° $\lambda_1 = -3$... $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -6 & 0 \end{bmatrix} \sim (1 \leftrightarrow 2) \sim \begin{bmatrix} -1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim (1r | (-1)) \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6\lambda \\ 2 \end{bmatrix} = \lambda \cdot \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} //$$

2° $\lambda_2 = 3$... $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim (1r | 6) \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim (2r - 1c \times (-1)) \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} //$$

- (19) Svojstvena vrijednost/vektor? ...

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

I) polinom:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 2 & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda-1)\lambda^2 \rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0 //$$

II) 1° $\lambda_1 = 1$... $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim (3r - 2c \times (1)) \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} //$$

2° $\lambda_2 = 0$... $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{I}r(\text{I}-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{II}r(\text{I}-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, d \in \mathbb{R} //$$

Samo je jedan Mali Ivica!

20) Svojstva vrijednosti vektora? ...

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

I) polinom:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{bmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & 1 \\ -2 & 1 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4 \rightarrow \lambda_1 = 1 \\ \rightarrow \lambda_2 = 2 \\ \rightarrow \lambda_3 = -2 //$$

II) $1^{\circ} \lambda_1 = 1$...

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{II}r(1-\text{I})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{III}r(2-\text{I})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d \\ 2d \\ d \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, d \in \mathbb{R} //$$

$2^{\circ} \lambda_2 = 2$...

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{II}r(1+\text{I})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{III}r(2-\text{I})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d \\ -2 \\ d \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, d \in \mathbb{R} //$$

$3^{\circ} \lambda_3 = -2$...

$$\begin{bmatrix} -3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{II}r(1+\text{I})} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{III}r(3-\text{I})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{III}r(5-\text{II})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{III}r(5-\text{II})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$


$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5}d \\ \frac{4}{5}d \\ d \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{bmatrix}, d \in \mathbb{R} //$$

Samo je jedan Mali Ivica!

6. FUNKCIJE

6.1. SVOJSTVA REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

- = Ako su skupovi $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}$ kazemo da je $f: S_1 \rightarrow S_2$ realna funkcija realne varijable.
- ↳ domena (područje definicije funkcije) : $D_f = S_1$.
- ↳ slika funkcije : $Jm(f) = f(D_f) = f(S_1)$
- ↳ graf funkcije : $G(f) := \{(x, y) \mid y = f(x)\}$
- crtanjem grada $G(f)$ dobivamo krvilju u ravnini \mathbb{R}^2 , primjerice:



- ↳ znamo da za inverznu funkciju f^{-1} (ukoliko postoji), a postoji ako i samo ako je f bijekcija vrijedi:

$$(1) \quad D(f^{-1}) = Jm(f)$$


$$D(f) = Jm(f^{-1})$$

$$(2) \quad f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in D(f)$$


$$f(f^{-1}(x)) = x, \forall x \in D(f^{-1})$$

PRIMERI:

- a) ↳ Nacrtaj funkciju i odredi domenu: $\sin(\arcsin x) = x$.




- b) ↳ Nacrtaj funkciju i odredi domenu: $\arcsin(\sin x) = x$.



-100-

- = za funkcije definirane na simetričnom intervalu oko ishodišta imamo kada neka posebna svojstva.
- Simetrični interval oko nule je $S \subseteq \mathbb{R}$ tako da je: $x \in S \Rightarrow -x \in S$; grafički:




* ako je $p \in S$ tada $-p \in S$
* ako je $s \in S$ tada $-s \in S$

= Pojam simetrije: - postoji 2 vrste simetrije:

1) osna simetrija

- ↳ simetrija s obzirom na os simetrije:
- ↳ Tocke A i A' su simetrične s obzirom na os simetrije P ako vrijedi:
 - A i A' su sa suprotnih strana od P
 - A i A' su otomlji na P
 - udaljenost točke A od pravca P i točke A' od pravca P je jednaka (tj. $d(A, P) = d(A', P)$)


↳ Stica:



2) centralna simetrija

- ↳ simetrija s obzirom na točku (center)
- ↳ Tocke A i A' su simetrične s obzirom na točku simetrije ako vrijedi:
 - center simetrije nalazi se na dužini $\overline{AA'}$ (tj. $S \in \overline{AA'}$)
 - udaljenost točaka A i A' od centra je jednaka (tj. $d(A, S) = d(A', S)$)

↳ Stica:



□ PARNOST I NEPARNOST

• DEFINICIJA 1.

- ↳ funkcija $f(x)$ je parna (takođe) ako je domena od f simetrična oko nule i ako vrijedi:


$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in D(f).$$

- ↳ funkcija $f(x)$ je neparna (lijesa) ako je domena od f simetrična oko nule i ako vrijedi:

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D(f).$$

= Geometrijska interpretacija parnosti i neparnosti:

- Alto je funkcija parna, graf te funkcije je simetričan s obzirom na os y .




$$\Rightarrow f(x) = y \Rightarrow f(-x) = y, \text{ tj.}$$

$$(x, y) \in G(f) \Rightarrow (-x, y) \in G(f)$$


Samo je jedan Mali Ivica!

2) Ako je funkcija neparna, graf te funkcije je simetričan s obzirom na istočne osi, kao centar simetrije.



= PRIMJER 2.

→ Odredi da li je funkcija x^2 parna ili neparna i dokazi općenito za x^{2n} .



$$f(x) = x^2$$


$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ - Parne funkcije

Općenito vrijedi i za $f(x) = x^{2n}$. Dokaz:

$$f(-x) = (-x)^{2n} = (-1)^{2n} \cdot x^{2n} = x^{2n} = f(x)$$
 - Parne funkcije

= PRIMJER 3.

→ Odredi da li je funkcija x^3 parna ili neparna i dokazi općenito za x^{2n+1} .



$$f(x) = x^3$$

$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ - Neparna funkcija

Općenito vrijedi i za $f(x) = x^{2n+1}$. Dokaz:

$$f(-x) = (-x)^{2n+1} = (-1)^{2n+1} \cdot x^{2n+1} = -x^{2n+1} = -f(x)$$

Neparna funkcija

= PRIMJER 4.

→ Odredi da li je funkcija parna ili neparna.

$$y = \frac{x + \cos x}{x^2 + 1}$$

$$f(-x) = \frac{-x + \cos(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x + \cos x}{x^2 + 1} \neq \frac{x + \cos x}{x^2 + 1} \neq f(x)$$

$$\neq -\frac{x + \cos x}{x^2 + 1} \neq -f(x)$$

Ni parna, ni neparna funkcija.

= STAVAK 1.


→ Neka je $y = f(x)$ neparna funkcija. Ako $f(0) \in D(f)$ tada je $f(0) = 0$, odnosno graf $G(f)$ mora prolaziti ishodistom $(0,0)$.

Dokaz:

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = y \\ f(-0) = f(0) = -y \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} y = -y \\ 2y = 0 \\ y = 0 \end{array} \Rightarrow f(0) = 0 \quad \text{Q.E.D.}$$

= PRIMJER 5.

↳ Otkuci da li je funkcija parna ili neparna:



$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

↳ Neparna funkcija

Samo je jedan Mati Ivica!

= STAVAK 2.

i) ↳ Neka je $y=f(x)$ parna funkcija, i neka je $y=g(x)$ bilo kakva realna funkcija realne varijable. Tada je kompozicija tih dviju funkcija $(gof)(x)$ parna funkcija.

ii) ↳ Neka je $y=f(x)$ neparna funkcija. Ako je:

- 1) $y=g(x)$ parna funkcija i kompozicija $(gof)(x)$ je parna funkcija.
- 2) $y=g(x)$ neparna funkcija, kompozicija $(gof)(x)$ je neparna funkcija.

Dokaz:

i) $(gof)(x)$
 $(gof)(-x) = g[f(-x)] = g[f(x)] = (gof)(x) \rightarrow$ Parna funkcija.

ii) Iz pretpostavki: $f(-x) = -f(x)$

$$\begin{aligned} \text{stoga: } (gof)(-x) &= g[f(-x)] = g[f(x)] = g[f(x)] \\ &\downarrow \\ &(gof)(-x) = (gof)(x) \end{aligned}$$

2) Iz pretpostavki: $f(-x) = -f(x)$

$$g(-x) = -g(x)$$

$$\begin{aligned} \text{stoga: } (gof)(-x) &= g[f(-x)] = g[-f(x)] = -g[f(x)] \\ &\downarrow \\ &(gof)(-x) = -(gof)(x) \end{aligned}$$

= PRIMJER 6.

↳ Dokazite da je produkt parne i neparne funkcije neparna funkcija.

$$\begin{aligned} y_1 &= f(x) \text{ - Neparna} \\ y_2 &= g(x) \text{ - Parna} \end{aligned}$$

$$y_3 = y_1 \cdot y_2 = f(x) \cdot g(x).$$

$$y_3(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = [-f(x)] \cdot g(x) = -f(x)g(x) = -y_3(x)$$

Q.E.D.

□ PERIODIČNOST

= DEFINICIJA 2.

↳ Funkcija $y=f(x)$ je periodička ako postoji realan broj P takav da vrijedi:

$$f(x+P) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Najmanji takav broj P , ako postoji, zovemo temeljnim periodom i obično označavamo sa T .

= PRIMJER 7.

a) $y = \sin x \quad \left. \begin{array}{l} y = \cos x \end{array} \right\} T = 2\pi$

b) $y = \tan x \quad \left. \begin{array}{l} y = \cot x \end{array} \right\} T = \pi$

c) $y = A \cos(nx) + B \sin(nx) \quad T = \frac{2\pi}{n}$
 ↓ harmoniku Fourierovom redu

↳ Odmos kompozicije i periodičnosti funkcije dana je sljedećim teoremom.

= STAVAK 3.

↳ Neka je $y=f(x)$ periodička funkcija s temeljnim periodom T , te neka je $y=g(x)$ injektivna realna funkcija realne varijable. Onda je kompozicija $(gof)(x) = g[f(x)]$ također periodička funkcija s istim temeljnim periodom T .

Samo je jedan Mali Ivica!

= PRIMER 8.

a) $f(x) = e^{\tan x}$

Funkcija je periodička sa temeljnim periodom $T = \pi$.

b) $f(x) = \sin(\sin 3x)$

Funkcija je periodička sa temeljnim periodom $T = \frac{2\pi}{3}$.

= PRIMER JEDBA 10

↳ Uvjet injektivnosti za funkciju $y = g(x)$ u stiku 3 je potreban jer se u prostornom temeljnem periodu može promijeniti.

= PRIMER 9.

$f(x) = \sin^2 x$

Funkcija $y = x^2$ nije injektivna. Ova funkcija ima temeljni period $T = \pi$, tj. period nulte je funkcije koji iznosi 2π . Je smatran.

II. MONOTONOST

= DEFINICIJA 3.

↳ Funkcija $y = f(x)$ je monotono rastuća na intervalu $[a, b]$ ako vrijedi:

$$x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2), \forall x_1, x_2 \in [a, b],$$

↳ Funkcija $y = f(x)$ je monotono padajuća na intervalu $[a, b]$ ako vrijedi:


$$x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2), \forall x_1, x_2 \in [a, b].$$

↳ Funkcija $y = f(x)$ je monotona na intervalu $[a, b]$ ako je ili monotono rastuća ili monotono padajuća na tom intervalu.

↳ Pri tome, ako vrijede stroge nejednakosti kazemo da je funkcija $y = f(x)$ strogo monotona.

= PRIMER 10.


a) $y = e^x$



$$x_1 < x_2 \Rightarrow y_1 < y_2$$

↳ Funkcija je striktno monotono rastuća na intervalu \mathbb{R} .


b) $y = \ln x$



$$x_1 < x_2 \Rightarrow y_1 < y_2$$

↳ Funkcija je striktno monotono rastuća na intervalu $(0, \infty)$.

c) $y = \sin x$



↳ Funkcija nije monotona jer je monotona samo po dijelovima. Isto:

$[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$ - monotono rastuća

$[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi]$ - monotono padajuća

= STAVAK 4.

↳ Oduš kompozicije i monotonosti funkcija:

- Neka je $f(x)$ rastuća funkcija na intervalu $[a, b]$. Ako je $g(x)$ rastuća funkcija na \mathbb{R} tada je i kompozicija $(gof)(x)$ rastuća funkcija na intervalu $[a, b]$.
- Neka je $f(x)$ rastuća funkcija na intervalu $[a, b]$. Ako je $g(x)$ padajuća funkcija na \mathbb{R} tada je i kompozicija $(gof)(x)$ padajuća funkcija na intervalu $[a, b]$.
- Neka je $f(x)$ padajuća funkcija na intervalu $[a, b]$. Ako je $g(x)$ rastuća funkcija na \mathbb{R} tada je i kompozicija $(gof)(x)$ padajuća funkcija na intervalu $[a, b]$.
- Neka je $f(x)$ padajuća funkcija na intervalu $[a, b]$. Ako je $g(x)$ padajuća funkcija na \mathbb{R} tada je i kompozicija $(gof)(x)$ rastuća funkcija na intervalu $[a, b]$.

• PRIMJER 11.

a) Funkcija $h(x) = e^{2x}$ sastavljena je od 2 funkcije: $f(x) = 2x$, $g(x) = e^x$.

- Funkcija $f(x) = 2x$ je rastuća funkcija, a funkcija $g(x) = e^x$ je također rastuća funkcija. Kompozicija tih dvoju funkcija je: $(gof)(x) = g[f(x)] = e^{2x}$.

Funkcija e^{2x} je također rastuća funkcija.

b) Funkcija $h(x) = e^{-2x}$ sastavljena je od 2 funkcije: $f(x) = -2x$, $g(x) = e^x$.

- Funkcija $f(x) = -2x$ je rastuća funkcija, a funkcija $g(x) = e^x$ je padajuća funkcija. Kompozicija tih dvoju funkcija je: $(gof)(x) = g[f(x)] = e^{-2x}$.

Funkcija e^{-2x} je padajuća funkcija.

c) Funkcija $h(x) = e^{-2x}$ sastavljena je od 2 funkcije: $f(x) = -2x$, $g(x) = e^x$.

- Funkcija $f(x) = -2x$ je padajuća funkcija, a funkcija $g(x) = e^x$ je rastuća funkcija. Kompozicija tih dvoju funkcija je: $(gof)(x) = g[f(x)] = e^{-2x}$.

Funkcija e^{-2x} je padajuća funkcija.

d) Funkcija $h(x) = e^{2x}$ sastavljena je od 2 funkcije: $f(x) = -2x$, $g(x) = e^x$.

- Funkcija $f(x) = -2x$ je padajuća funkcija, a funkcija $g(x) = e^x$ je padajuća funkcija. Kompozicija tih dvoju funkcija je: $(gof)(x) = g[f(x)] = e^{2x}$.

Funkcija e^{2x} je rastuća funkcija.

= Pomagalo za monotonost funkcija:


+	+	\neq	+
+	-	\neq	-
-	+	\neq	-
-	-	\neq	+

6.2. TRANSFORMACIJE NAD FUNKCIJAMA

= Pod transformacijama nad realnim funkcijama realne varijable podrazumijevamo horizontalnu i vertikalnu translaciju, promjenu amplitude i skaliranje.

□ TRANSLACIJA

- Ako je točka $O(\varnothing, \varnothing)$ ishodište u sustavu xoy , onda je točka $O'(a, b)$ ishodište u sustavu $x'y'$. Da bi došli iz točke O u točku O' moramo izvršiti translaciju za vektor $a\vec{i} + b\vec{j}$.




- Sa slike čitamo: $x = x' + a$ } $x' = x - a$
 $y = y' + b$ } $y' = y - b$
 ↳ jednadžbe translacije

Samo je jedan Mali Iznad

=PRIMER 1.

↳ zadana je parabola u sustaru $x'y'$, odredi njenu jednadžbu.




$$y' = d \cdot x'^2$$

$$y' - b = d(x'-a)^2$$

$$y = d(x-a)^2 + b$$

↳ jednadžba parabole u početnim sustavom $x'y'$.

=Općito:



= Ako je $y' = f(x')$ jednadžba u sustaru $x'y'$, uz $O'(a, b)$, onda je:

$$y - b = f(x - a).$$

Porečku sljedeći:

1) horizontalni pomak za a :

↳ Za funkciju $y = f(x)$ njena horizontalna translacija za broj $a \in \mathbb{R}$ je funkcija $y = g(x)$ definirana na slijedeći način:

$$g(x) = f(x-a), \quad x \in D(f)$$

↳ Ako je $c > 0$ tada graf nastaje translacijom u desno, a ako je $c < 0$ translacijom u lijevo, za $-a$.

2) vertikalni pomak za b :

↳ Za funkciju $y = f(x)$ njena vertikalna translacija za broj $b \in \mathbb{R}$ je funkcija $y = g(x)$ definirana na slijedeći način:

$$g(x) = f(x) + b, \quad x \in D(f)$$

↳ Ako je $b > 0$ tada graf nastaje translacijom prema gore, a ako je $b < 0$ translacijom prema dolje, za $-b$.

□ SKALIRANJE

= Rasterajuće funkcije $f(x)$ u smjeru osi Ox :1) skalirajuće u smjeru osi y :

↳ Promjmom amplitudice funkcije $y = f(x)$ za faktor $A > 0$ dobivamo funkciju $y = g(x)$ definiranu:

$$g(x) = A f(x), \quad x \in D(f)$$

2) skalirajuće u smjeru osi x :

↳ Skalirajući funkciju $y = f(x)$ za broj $\lambda > 0$ dobivamo novu funkciju $y = g(x)$ koja je definirana na slijedeći način:


$$g(x) = f(\lambda x), \quad \forall x \in D(f)$$

↳ Ako je $\lambda > 1$ - strezanje
 $\lambda < 1$ - rastezanje

6.3. POPIS ELEMENTARNIH FUNKCIJA I NJIHOVIH KARAKTERISTIČNIH OBILJEŽJA

□ POLINOMI


1) Konstanta $f(x) = c$



- $D(f) = \mathbb{R}$
- $Jm(f) = \{c\}$
- nultočka postoji ako je $c=0$, i tada je \mathbb{R}
- parna funkcija


Samo je jedan Mali Ivica!

2) Afina funkcija $f(x) = ax + b$




- $D(f) = \mathbb{R}$
- $Jm(f) = \mathbb{R}$, uz uvjet da je $a \neq 0$
- nultočka: $x = -\frac{b}{a}$, $a \neq 0$

3) Kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$



- $D(f) = \mathbb{R}$
- $Jm(f) = \left[\frac{4ac-b^2}{4a}, \infty \right)$, $a > 0$
- nultočke: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, $b^2-4ac \geq 0$
- parna funkcija: $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$

4) Kubna funkcija $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$



- $D(f) = \mathbb{R}$
- $Jm(f) = \mathbb{R}$
- nultočka: $x = 0$


5) Polinom n-tog stupnja $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$

- $D(f) = \mathbb{R}$
- $Jm(f) = \mathbb{R}$

□ FRACIONALNE FUNKCIJE

↳ inkrerene funkcije Polinoma

1) Funkcija kvadratni koriđen




$$f(x) = \sqrt{x}$$

- simetrična funkcija funkcije $y = x^2$ s obzirom na pravac $y=x$ nakon uvođenja restitucije $f(x) = x^2 | [0, \infty]$.
- $D(f) = [0, \infty)$
- $Jm(f) = [0, \infty)$
- nultočka: $x = 0$

\hookrightarrow vrijedi: $\sqrt{x^2} = x, \forall x \in [0, \infty)$
 $(\sqrt{x})^2 = x, \forall x \in [0, \infty)$

\hookrightarrow primjerice: $\sqrt{x^2} = |x|$

2) Funkcija treći korijen $f(x) = \sqrt[3]{x}$



- inverzna funkcija funkcije $y = x^3$ s obzirom na pravac

- $D(f) = \mathbb{R}$ jer funkcija $y = x^3$ je injektivna


- $Jm(f) = \mathbb{R}$

- nultočka $x = 0$

\hookrightarrow vrijedi: $\sqrt[3]{x^3} = x, \forall x \in \mathbb{R}$
 $(\sqrt[3]{x})^3 = x, \forall x \in \mathbb{R}$

□ EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA

1) Eksponencijalna funkcija $f(x) = a^x, a > 0, a \neq 1$




- $D(f) = \mathbb{R}$

- $Jm(f) = (0, \infty)$

- nultočka nema

\hookrightarrow vrijedi: $a^{x_1+x_2} = a^{x_1} \cdot a^{x_2}, \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

2) Logaritamska funkcija $f(x) = \log_a x, a > 0, a \neq 1$



- inverzna funkcija eksponencijalne funkcije $y = a^x$ s obzirom na pravac $y = x$ jer funkcija $y = a^x$ je injektivna

- $D(f) = (0, \infty)$

- $Jm(f) = \mathbb{R}$

- nultočka $x = 1$

\hookrightarrow vrijedi: $\log_a(x_1 \cdot x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2, \forall x_1, x_2 \in (0, \infty)$


$\log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a x, \forall x \in (0, \infty)$

$\log_a(a^x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$

$a^{\log_a x} = x, \forall x \in (0, \infty)$

□ TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE

1) Funkcija sinus $f(x) = \sin x$



- $D(f) = \mathbb{R}$


- $Jm(f) = [-1, 1]$

- nultočke $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

- periodička funkcija $T = 2\pi$

- neparna funkcija $\sin(-x) = -\sin x$

2) Funkcija kosinus $f(x) = \cos x$



$$-D(f) = \mathbb{R}$$

$$-J_m(f) = [-1, 1]$$

$$-\text{nultočke } x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

-periodička funkcija $T = 2\pi$


-parna funkcija: $\cos(-x) = \cos x$

samo je jedan Mali Ivica!

-Osnovne formule za funkcije sinus i kosinus:

$$1) \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

DOKAZ: Iz trigonometrijske kružnice primjenjujući Pitagorin poučak:



2) adicione formule:

$$A) \sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y \quad (1 \text{ i } 2)$$

$$B) \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y \quad (3 \text{ i } 4)$$

3) formule za polarni i dvostruki argument:

$$A) \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \quad (7 \text{ i } 8)$$

$$B) \sin 2x = 2 \sin x \cos x \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \quad (5 \text{ i } 6)$$

4) formule zbroja i razlike funkcija:

$$A) \sin x \pm \sin y = 2 \sin \frac{x \mp y}{2} \cdot \cos \frac{x+y}{2} \quad (12 \text{ i } 13)$$

$$B) \cos x \pm \cos y = 2 \cos \frac{x \mp y}{2} \cdot \cos \frac{x+y}{2} \quad (14)$$

$$C) \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \sin \frac{x-y}{2} \quad (15)$$

5) formule produkta funkcija:

$$A) \sin x \sin y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) - \cos(x+y)) \quad (9)$$

$$B) \cos x \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) + \cos(x+y)) \quad (10)$$

$$C) \sin x \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x-y) + \sin(x+y)) \quad (11)$$

DOKAZ:

(1) Koristeći redukciju i adicijske teoreme za kosinus funkciju: (ili vidi dokaz 3)


$$\begin{aligned} \sin(x+y) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (x+y)\right) = \cos\left((\frac{\pi}{2}+x)-y\right) = \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\cos y + \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\sin y = \\ &= \sin x \cos y + \cos x \sin y \end{aligned}$$

(2) Koristeći adicijski teorem za sinus funkciju i parnost-neparnost:

$$\sin(x-y) = \sin(x+(-y)) = \sin x \cos(-y) + \cos x \sin(-y) =$$

$$= \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

(3) Pomocu trigonometrijske kružnice :



- Luk \hat{AB} ima duljinu $x+y$, kao i luk \hat{CD} . Kako jednake su duljine i pripadaju te iste imaju jednaku duljinu, vrijedi:

$$|AB| = |CD|$$

- Koordinate tih točaka su:

$$A(1,0)$$

$$B(\cos(x+y), \sin(x+y))$$

$$C(\cos(-y), \sin(-y)) = (\cos y, -\sin y)$$

$$D(\cos x, \sin x)$$

$$\begin{aligned} - Vrijedi: |AB|^2 &= (\cos(x+y)-1)^2 + (\sin(x+y))^2 = \\ &= \cos^2(x+y) - 2\cos(x+y) + 1 + \sin^2(x+y) = \\ &= 2 - 2\cos(x+y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |CD|^2 &= [\cos x - \cos y]^2 + [\sin x + \sin y]^2 = \\ &= \cos^2 x - 2\cos x \cos y + \cos^2 y + \sin^2 x + 2\sin x \sin y + \sin^2 y = \\ &= 2 - 2\cos x \cos y + 2\sin x \sin y \end{aligned}$$

- Kako je $|AB|^2 = |CD|^2$ vrijedi:

$$2 - 2\cos(x+y) = 2 - 2\cos x \cos y + 2\sin x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

(4) Konsteći adicijske formule za kosinus i zornost neparnost:

$$\begin{aligned} \cos(x-y) &= \cos(x+(-y)) = \cos x \cos(-y) - \sin x \sin(-y) = \\ &= \cos x \cos y + \sin x \sin y \end{aligned}$$

(5) Konsteći adicijski teorem za sinus:

$$\sin 2x = \sin(x+x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x$$

(6) Konsteći adicijski teorem za kosinus:

$$\cos 2x = \cos(x+x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

(7) Konsteći formulu za kosinus dvostrukog kuta:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2\cos^2 x - 1$$

$$\downarrow \\ \cos^2 x = \frac{\cos 2x + 1}{2}$$

(8) Konsteći formulu za kosinus dvostrukog kuta:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\downarrow \\ \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

(9) Konsteći adicijske teoreme:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cos(x-y) - \frac{1}{2} \cos(x+y) &= \frac{1}{2} \cos x \cos y + \frac{1}{2} \sin x \sin y - \frac{1}{2} \cos x \cos y - \frac{1}{2} \sin x \sin y = \\ &= \sin x \cdot \sin y \end{aligned}$$

110

(10) Koristeći odjacijske teoreme:

$$\frac{1}{2} \cos(x-y) + \frac{1}{2} \cos(x+y) = \frac{1}{2} \cos x \cos y + \frac{1}{2} \sin x \sin y + \frac{1}{2} \cos x \cos y - \frac{1}{2} \sin x \sin y = \\ = \cos x \cos y$$

(11) Koristeći odjacijske teoreme:

$$\frac{1}{2} \sin(x-y) + \frac{1}{2} \sin(x+y) = \frac{1}{2} \sin x \cos y - \frac{1}{2} \cos x \sin y + \frac{1}{2} \sin x \cos y + \frac{1}{2} \sin y \cos x = \\ = \sin x \cos y$$

(12 i 13) Koristeći formule transformacije umnoška u zbroj i supstitucijom: $x+y=d$, $x-y=B$,
tj. $x = \frac{d+B}{2}$ i $y = \frac{d-B}{2}$:

$$\text{I } \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\text{SUPS: } \sin d = \sin \frac{d+B}{2} \cos \frac{d-B}{2} + \cos \frac{d+B}{2} \sin \frac{d-B}{2}$$

$$\text{II } \sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\text{SUPS: } \sin B = \sin \frac{d+B}{2} \cos \frac{d-B}{2} - \cos \frac{d+B}{2} \sin \frac{d-B}{2}$$

$$\text{I+II} \rightarrow \sin d + \sin B = 2 \sin \frac{d+B}{2} \cos \frac{d-B}{2}$$

$$\text{I-II} \rightarrow \sin d - \sin B = 2 \cos \frac{d+B}{2} \sin \frac{d-B}{2}$$

(14 i 15) Koristeći formule transformacije umnoška u zbroj i supstitucijom gore navedenom:

$$\text{I } \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$


$$\text{SUPS: } \cos d = \cos \frac{d+B}{2} \cos \frac{d-B}{2} - \sin \frac{d+B}{2} \sin \frac{d-B}{2}$$

$$\text{II } \cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

$$\text{SUPS: } \cos B = \cos \frac{d+B}{2} \cos \frac{d-B}{2} + \sin \frac{d+B}{2} \sin \frac{d-B}{2}$$


$$\text{I+II} \rightarrow \cos d + \cos B = 2 \cos \frac{d+B}{2} \cos \frac{d-B}{2}$$

$$\text{I-II} \rightarrow \cos d - \cos B = -2 \cos \frac{d+B}{2} \sin \frac{d-B}{2}$$

3) Funkcija tangens: $f(x) = \operatorname{tg} x$ - definirana formulom: $\operatorname{tg} x := \frac{\sin x}{\cos x}, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ - $D(f) = \cup \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right), k \in \mathbb{Z}$ - $J_m(f) = \mathbb{R}$ - nultočke: $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ - periodična funkcija: $T = \pi$ - neparna funkcija: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$

Samo je jedan Mali Ivica!

3) Funkcija kotangens $f(x) = \operatorname{ctg} x$



- definirana formulom: $\operatorname{ctg} x := \frac{1}{\operatorname{tg} x} := \frac{\cos x}{\sin x}$,

$x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$

- $D(f) = U(k\pi, \pi + k\pi), k \in \mathbb{Z}$

- Jm(f) = \mathbb{R}

- nultočke $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

- periodička funkcija, $T = \pi$

- neparna funkcija: $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$

= Osnovne formule za funkcije tangens i kotangens:

$$1) \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x = 1$$

$$\text{Dokaz: } \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = 1$$

2) adicione formule:

$$\operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y}{1 \mp \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y} \quad (11:2)$$

$$\operatorname{ctg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y \mp 1}{\operatorname{ctg} x \pm \operatorname{ctg} y} \quad (3:4)$$

3) formule polovičnog i dvostrukog argumenta:

$$\operatorname{tg}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x} \quad \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1+\cos 2x}{1-\cos 2x} \quad (7:8)$$

$$\operatorname{tg} 2x = \frac{2\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg}^2 x} \quad \operatorname{ctg} 2x = \frac{\operatorname{ctg}^2 x - 1}{2\operatorname{ctg} x} \quad (5:6)$$

4) formule zbroja i razlike argumenta: (adicione formule)

$$\operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y}{1 \mp \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}$$

$$\operatorname{ctg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y \mp 1}{\operatorname{ctg} x \pm \operatorname{ctg} y}$$

5) formule zbroja i razlike funkcije:

$$\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y = \frac{\sin(x \pm y)}{\cos x \cos y} \quad (9:10)$$

$$\operatorname{ctg} x \pm \operatorname{ctg} y = \frac{\pm \sin(x \mp y)}{\sin x \sin y} \quad (11:12)$$

$$\operatorname{tg} x \pm \operatorname{ctg} y = \frac{\cos(x-y)}{\cos x \sin y} \quad (13)$$

$$\operatorname{ctg} x \pm \operatorname{tg} y = \frac{\cos(x+y)}{\sin x \cos y} \quad (14)$$

Samo je jedan Mali Ivica!

DOKAZI:

(1) Koristeći jednostavni teoremi za sinus i kosinus:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(x+y) &= \frac{\sin(x+y)}{\cos(x+y)} = \frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\cos x \cos y - \sin x \sin y} : \cos x \cos y \quad \left. \begin{array}{l} \text{jed:} \\ \cos x \neq 0 \\ \cos y \neq 0 \end{array} \right. \\ &= \frac{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin y}{\cos y}}{1 - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\sin y}{\cos y}} = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y} \end{aligned}$$

(2) Koristeći mrežnost funkcije tangens:

$$\operatorname{tg}(x-y) = \operatorname{tg}(x+(-y)) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg}(-y)}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg}(-y)} = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}$$

(3) Koristeći jednostavni teoremi za tangens:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg}(x+y) &= \frac{\cos(x+y)}{\sin(x+y)} = \frac{\cos x \cos y - \sin x \sin y}{\sin x \cos y + \cos x \sin y} : \sin x \sin y \quad \left. \begin{array}{l} \text{jed:} \\ \sin x \neq 0 \\ \sin y \neq 0 \end{array} \right. \\ &= \frac{\frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{\cos y}{\sin y} - 1}{\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\cos y}{\sin y}} = \frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} y} \end{aligned}$$

(4) Koristeći mrežnost funkcije kotangens:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg}(x-y) &= \operatorname{ctg}(x+(-y)) = \frac{\operatorname{ctg} x \cdot \operatorname{ctg}(-y) - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg}(-y)} = \frac{-\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y - 1}{\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} y} = \\ &= \frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y + 1}{\operatorname{ctg} y - \operatorname{ctg} x} \end{aligned}$$

(5 i 6) Koristeći jednostavni teoremi za tangens:

$$\operatorname{tg} 2x = \operatorname{tg}(x+x) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} x} = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$$

$$\operatorname{ctg} 2x = \operatorname{ctg}(x+x) = \frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} x - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} x} = \frac{\operatorname{ctg}^2 x - 1}{2 \operatorname{ctg} x}$$

(7 i 8) Koristeći mrežnu formulu polarnog argumenta za sinus i kosinus:

$$\operatorname{tg}^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\frac{1-\cos 2x}{2}}{\frac{1+\cos 2x}{2}} = \frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}$$

$$\operatorname{ctg}^2 x = \frac{1+\cos 2x}{1-\cos 2x}$$

(9 i 10) Koristeći jednostavne formule za sinus:

$$\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y = \frac{\sin x}{\cos x} \pm \frac{\sin y}{\cos y} = \frac{\sin x \cos y \pm \sin y \cos x}{\cos x \cos y} = \frac{\sin(x \pm y)}{\cos x \cos y}$$

(11 i 12) Koristeći jednostavne formule za sinus:

$$\operatorname{ctg} x \pm \operatorname{ctg} y = \frac{\cos x}{\sin x} \pm \frac{\cos y}{\sin y} = \frac{\cos x \sin y \pm \cos y \sin x}{\sin x \sin y} = \frac{\pm \sin(x \pm y)}{\sin x \sin y}$$

Samo je jedan Mali Ivica!

(13) Konštejemo adicionele formule za kosinus:

$$\operatorname{tg}x + \operatorname{tg}y = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin y}{\cos y} = \frac{\sin x \sin y + \cos x \cos y}{\cos x \cos y} = \frac{\cos(x-y)}{\cos x \cos y}$$


(14) Konštejemo adicionele formule za kosinus:

$$\operatorname{ctgx} - \operatorname{ctgy} = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\cos y}{\sin y} = \frac{\cos x \cos y - \sin x \sin y}{\sin x \cos y} = \frac{\cos(x+y)}{\sin x \cos y}$$

□ CIKLOMETRIJSKE FUNKCIJE

↳ inverzne funkcije trigonometrijskih funkcija

1) Arkus-sinus funkcija $f(x) = \arcsin x$



- inverzna funkcija funkciji $y = \sin x$ nakon uvođenja restrikcije $f(x) = \sin x |_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$.

$$- D(f) = [-1, 1]$$

$$- Jm(f) = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$


$$- nultočka x=0$$

$$- neparna funkcija \arcsin(-x) = -\arcsin x$$

$$\text{Vrijedi: } \arcsin(\sin x) = x, \forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$\sin(\arcsin x) = x, \forall x \in [-1, 1]$$

2) Arkus-kosinus funkcija $f(x) = \arccos x$



- inverzna funkcija funkciji $y = \cos x$ nakon uvođenja restrikcije $f(x) = \cos x |_{[0, \pi]}$.

$$+ D(f) = [-1, 1]$$

$$+ Jm(f) = [0, \pi]$$

$$- nultočka x=1$$

$$- ni parna ni neparna funkcija$$

$$\text{Vrijedi: } \arccos(\cos x) = x, \forall x \in [0, \pi]$$

$$\cos(\arccos x) = x, \forall x \in [-1, 1]$$

= Osnovne formule za funkcije arccos i arcsin:

$$1) \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \forall x \in [-1, 1]$$

$$2) \arccos(-x) = \pi - \arccos x, \forall x \in [-1, 1]$$

DOKAZ:


$$1) \arcsin x = y_1 \rightarrow x = \sin y_1, \quad \left. \begin{array}{l} \sin y_1 = \cos y_2 = \sin \left(\frac{\pi}{2} - y_2 \right) \\ \arccos x = y_2 \rightarrow x = \cos y_2 \end{array} \right\} \quad \downarrow$$

$$y_1 = \frac{\pi}{2} - y_2 \Rightarrow y_1 + y_2 = \frac{\pi}{2} \quad \square \quad Q.E.D.$$

$$2) \arccos(x) = y_1 \rightarrow -x = \cos y_1, \quad \left. \begin{array}{l} -\cos y_1 = \cos y_2 = \cos(\pi - y_2) \\ x = \cos y_2 \end{array} \right\} \quad \downarrow$$

$$y_1 = \pi - y_2 \Rightarrow y_1 + y_2 = \pi \quad \square \quad Q.E.D.$$


ili na trigonometrijskoj kružnici:



$$\Rightarrow \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

Samo je jedan Mali Ivica!


3) Arkus-tangens funkcija $f(x) = \operatorname{arctg} x$



$$\hookrightarrow \text{vrijedi: } \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x, \forall x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

$$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$$

4) Arkus-kotangens funkcija $f(x) = \operatorname{arcctg} x$



$$\hookrightarrow \text{vrijedi: } \operatorname{arcctg}(\operatorname{ctg} x) = x, \forall x \in (0, \pi)$$

$$\operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$$

- Osnovne formule za funkcije arcctg i arctg :

$$1) \operatorname{arcctg} x + \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2) \operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg}(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

DOKAZ:

$$1) \begin{cases} y_1 = \operatorname{arcctg} x \rightarrow x = \operatorname{ctg} y_1 \\ y_2 = \operatorname{arctg} x \rightarrow x = \operatorname{tg} y_2 \end{cases} \left\{ \operatorname{tg} y_1 = \operatorname{ctg} y_2 = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - y_2 \right) \right.$$

$$\Downarrow y_1 = \frac{\pi}{2} - y_2 \Rightarrow y_1 + y_2 = \frac{\pi}{2} \text{ Q.E.D.}$$



$$2) \begin{cases} y_2 = \operatorname{arcctg}(-x) \rightarrow -x = \operatorname{tg} y_2 \\ y_1 = \operatorname{arctg} x \rightarrow x = \operatorname{ctg} y_1 \end{cases} \left\{ \operatorname{ctg} y_1 = -\operatorname{tg} y_2 = \operatorname{tg} (\pi - y_2) \right.$$

$$\Downarrow y_1 = \pi - y_2 \Rightarrow y_1 + y_2 = \pi \text{ Q.E.D.}$$

- inverzna funkcija funkcije $y = \operatorname{tg} x$ nakon uvodnja restrikcije $f(x) = \operatorname{tg} x |_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}$
- $D(f) = \mathbb{R}$
- $J_m(f) = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
- nultočka $x = 0$
- neparna su inverzna funkcija: $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x$

Samo je jedan Mali Ivica!

□ HIPERBOLIČKE FUNKCIJE

1) Sinus hiperbolički $f(x) = \operatorname{sh}x$ 2) Kosinus hiperbolički $f(x) = \operatorname{ch}x$ - definiran formulom: $\operatorname{sh}x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ - $D(f) = \mathbb{R}$ - $Jm(f) = \mathbb{R}$ - nultočka $x=0$ - neparna funkcija: $\operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh}x$

= Osnovne formule za funkcije sh i ch:

1) $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1 \quad (1)$

2) adicione formule:

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh}x \operatorname{chy} \mp \operatorname{ch}x \operatorname{sh}y \quad (2; 3)$$

$$\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch}x \operatorname{ch}y \pm \operatorname{sh}x \operatorname{sh}y \quad (4; 5)$$

3) formule polovicnog i dvostrukog argumenta:

$$\operatorname{sh}2x = \frac{1}{2}(\operatorname{ch}2x - 1) \quad \operatorname{ch}2x = \frac{1}{2}(\operatorname{ch}2x + 1) \quad (6; 7)$$

$$\operatorname{sh}2x = 2\operatorname{sh}x \operatorname{ch}x \quad \operatorname{ch}2x = \operatorname{sh}^2 x + \operatorname{ch}^2 x \quad (8; 9)$$

4) formule zbroja i razlike funkcija

$$\operatorname{sh}x \operatorname{sh}y = 2 \operatorname{sh}\frac{x+y}{2} \operatorname{ch}\frac{x-y}{2} \quad (10; 11)$$

$$\operatorname{ch}x \operatorname{ch}y = 2 \operatorname{ch}\frac{x+y}{2} \operatorname{ch}\frac{x-y}{2} \quad (12)$$

$$\operatorname{ch}x \operatorname{sh}y = 2 \operatorname{sh}\frac{x+y}{2} \operatorname{sh}\frac{x-y}{2} \quad (13)$$

DOKAŽI:

(1) Po definiciji:

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x} - e^{2x} + 2e^{-2x}) = 1$$

(2; 3) Po definiciji:

$$LS: \operatorname{sh}(x+y) = \frac{e^{x+y} - e^{-x-y}}{2}$$

$$DS: \operatorname{sh}x \operatorname{chy} + \operatorname{ch}x \operatorname{sh}y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^{x+y} + e^{-x-y}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^{x+y} - e^{-x-y}}{2} = \\ = \frac{e^x e^{x+y} - e^{-x} e^{-x-y} + e^{-x} e^{x+y} - e^x e^{-x-y}}{4} = \frac{2(e^x e^y - e^{-x} e^{-y})}{4} = \frac{e^{x+y} - e^{-x-y}}{2}$$

LS = DS

Analogna formula 3.

(4i5) Pogledati izvod formule (2).

(6i7) Pomocu definicije:

$$\operatorname{sh}^2 x = \operatorname{sh} x \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} + e^{-2x} - e^{x-x} - e^{x+x}}{4} = \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 1}{2} =$$

$$= \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{2}$$

Analogna formula 7.

(8i9) Pomocu definicije:

$$2\operatorname{sh} x \operatorname{ch} x = 2 \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} + 1 - e^{-2x}}{2} = \operatorname{sh} 2x$$

$$\operatorname{sh}^2 x + \operatorname{ch}^2 x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} - 2e^{x-x} + e^{-2x} + e^{2x} + 2e^{x+x} + e^{-2x}}{4} =$$

$$= \frac{2(e^{2x} + e^{-2x})}{4} = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = \operatorname{ch} 2x$$

(10 i 11) Pomocu supstitucije i adicijonih formula:

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2}, y = \frac{\alpha - \beta}{2}$$

I) $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y + \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$

$$\text{SUPS: } \operatorname{sh} \alpha = \operatorname{sh} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{ch} \frac{\alpha - \beta}{2} + \operatorname{ch} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{sh} \frac{\alpha - \beta}{2}$$

II) $\operatorname{sh}(x-y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y - \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$

$$\text{SUPS: } \operatorname{sh} \beta = \operatorname{sh} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{ch} \frac{\alpha - \beta}{2} - \operatorname{ch} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{sh} \frac{\alpha - \beta}{2}$$

I+II) $\operatorname{sh} \alpha + \operatorname{sh} \beta = 2 \operatorname{sh} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{ch} \frac{\alpha - \beta}{2}$

I-II) $\operatorname{sh} \alpha - \operatorname{sh} \beta = 2 \operatorname{ch} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{sh} \frac{\alpha - \beta}{2}$

(12 i 13) Pomocu supstitucije i adicijonih formula:

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2}, y = \frac{\alpha - \beta}{2}$$

I) $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$

$$\text{SUPS: } \operatorname{ch} \alpha = \operatorname{ch} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{ch} \frac{\alpha - \beta}{2} + \operatorname{sh} \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{sh} \frac{\alpha - \beta}{2}$$

II) $\operatorname{ch}(x-y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y - \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$


$$\text{SUPS: } \operatorname{ch} \beta = \operatorname{ch} \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{ch} \frac{\alpha - \beta}{2} - \operatorname{sh} \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{sh} \frac{\alpha - \beta}{2}$$

I+II) $\operatorname{ch} \alpha + \operatorname{ch} \beta = 2 \operatorname{ch} \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{ch} \frac{\alpha - \beta}{2}$

I-II) $\operatorname{ch} \alpha - \operatorname{ch} \beta = 2 \operatorname{sh} \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{sh} \frac{\alpha - \beta}{2}$

Samo je jedan Mali Ivica!

3) Taugens hiperbolicki $f(x) = \operatorname{th}x$



- definiran formulom: $\operatorname{th}x := \frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x} := \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$


- $D(f) = \mathbb{R}$

- $\operatorname{Im}(f) = (-1, 1)$

- nultočka $x=0$

- neparna funkcija: $\operatorname{th}(-x) = -\operatorname{th}x$

4) Kotaugens hiperbolicki $f(x) = \operatorname{cth}x$



- definiran formulom: $\operatorname{cth}x := \frac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x} := \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$

- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

- $\operatorname{Im}(f) = (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

- nultočka nema

- neparna funkcija: $\operatorname{cth}(-x) = -\operatorname{cth}x$

= Osnovne formule za funkcije $\operatorname{th}x$, $\operatorname{cth}x$:

$$1) \operatorname{th}x \cdot \operatorname{cth}x = 1$$

2) adicione formule:

$$\operatorname{th}(x \pm y) = \frac{\operatorname{th}x \mp \operatorname{thy}}{1 \mp \operatorname{th}x \operatorname{thy}}$$

$$\operatorname{cth}(x \pm y) = \frac{1 \pm \operatorname{cth}x \operatorname{cth}y}{\operatorname{cth}x \mp \operatorname{cth}y}$$

3) formule polovinog i dvostrukog kuta:

$$\operatorname{th}\frac{x}{2} = \frac{\operatorname{sh}x}{1 + \operatorname{ch}x} \quad \operatorname{cth}\frac{x}{2} = \frac{1 + \operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x}$$

$$\operatorname{th}2x = \frac{2\operatorname{th}x}{1 + \operatorname{th}^2 x} \quad \operatorname{cth}2x = \frac{\operatorname{cth}^2 x + 1}{2\operatorname{cth}x}$$

4) formule zbroja i razlike:

$$\operatorname{th}x \pm \operatorname{thy} = \frac{\operatorname{sh}(x \pm y)}{\operatorname{ch}x \operatorname{chy}}$$


DOKAZ:

Analogni za tangens i kotangens funkcije na stranici 112.

□ AREA-FUNKCIJE

↳ inverzne funkcije hiperboličkih funkcija

1) Funkcija area-sinus $f(x) = \text{arsh}x$



$f(x) = \text{arsh}x$ - inverzna funkcija funkcije $y = \sinh x$

- $D(f) = \mathbb{R}$

- $Jm(f) = \mathbb{R}$

- nultočka $x=0$

- neparna funkcija: $\text{arsh}(-x) = -\text{arsh}x$

↳ vrijedi: $\text{arsh}(\sinh x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$
 $\sinh(\text{arsh}x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$

↳ može se prikazati kao: $\text{arsh}x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

DOKAZ:

$$x = \sinh y = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \cdot 2e^y$$


$$2ye^y = e^{2y} - 1$$

$$(e^y)^2 + (e^y)2x - 1 = 0$$

$$e^y_{1,2} = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 - 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

Dobivamo 2 stvari predznak, ali tako je $e^y > 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}$, onda uzimamo rješenje: $e^y = x + \sqrt{x^2 + 1} \quad \text{Q.E.D.}$

2) Funkcija area-kosinus $f(x) = \text{arch}x$



- inverzna funkcija funkcije $y = \cosh x |_{x \geq 0}$

- $D(f) = [1, \infty)$

- $Jm(f) = [0, +\infty)$

- nultočka $x=1$


↳ vrijedi: $\text{arch}(\cosh x) = x, \forall x \in [0, \infty)$

$\cosh(\text{arch}x) = x, \forall x \in [1, \infty)$

↳ može se prikazati kao: $\text{arch}x = \ln(1 + \sqrt{x^2 - 1})$

Dokaz: analogan prethodnom

3) Funkcija area-tangens $f(x) = \text{arth}x$



- inverzna funkcija funkcije $y = \tanh x$

- $D(f) = (-1, 1)$

- $Jm(f) = \mathbb{R}$

- nultočke $y=0$

- neparna funkcija: $\text{arth}(-x) = -\text{arth}x$


↳ vrijedi: $\text{arth}(\tanh x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$

$\tanh(\text{arth}x) = x, \forall x \in (-1, 1)$

↳ može se prikazati kao: $\text{arth}x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, x \in (-1, 1)$

Samo je jedan Mali Ivica

4) Funkcija area-kotangens $f(x) = \operatorname{arcth} x$



- inverzna funkcija funkcije $y = \operatorname{cth} x$
- $D(f) = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$
- $Jm(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- nema nulačke
- neparna funkcija: $\operatorname{arcth}(-x) = -\operatorname{arcth} x$

↳ sledi: $\operatorname{arcth}(\operatorname{cth} x) = x, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
 $\operatorname{cth}(\operatorname{arcth} x) = x, \forall x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

↳ može se prikazati kao:

$$\operatorname{arcth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \forall x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

ZADACI (DZ 6. PRVIO DIO)

1. $T(-1, 3)$

A(0, 1)

os simetrije y

$$y = ax^2 + bx + c = ?$$

$$y_{1,2} = ?$$

$$\text{I)} 1 = c$$

$$\text{II)} 1 = a \cdot 4 + b \cdot (-2) + c$$

$$\text{III)} T(x, y) = T(-1, 3)$$

$$\text{a)} x = \frac{-b}{2a} \rightarrow -1 = \frac{-b}{2a}$$


$$+2a = -b$$

$$2a = b$$

$$\text{b)} y = \frac{4ac - b^2}{4a} \rightarrow 3 = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

$$12a = 4ac - b^2$$

$$12a = 4c - b^2$$



$$\text{a)} \text{ i } \text{b)} 12a = 4a - (2a)^2$$

$$12a = 4a - 4a^2$$

$$4a^2 + 8a = 0$$

$$4a(a+2) = 0$$

$$a=0 \quad a=-2$$

$$b = -2 \cdot 2 = -4$$

$$y = -2x^2 - 4x + 1$$

$$y_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16+8}}{-4} = \frac{4 \pm 2\sqrt{6}}{-4} = \frac{2 \pm \sqrt{6}}{-2}$$


$$y_1 = \frac{2+\sqrt{6}}{-2} \quad y_2 = \frac{2-\sqrt{6}}{-2}$$

2. $N_1(1, 0)$

$N_2(3, 0)$

$N(2, 2)$

$A \sin(\omega x + d)$



$$\text{1)} A=2$$

$$\text{2)} P = \frac{2\pi}{\omega} \quad 4 = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow 4\omega = 2\pi \quad \omega = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{3)} 2 = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 2 + d\right) \Rightarrow \sin d = -1 \Rightarrow d = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

$$y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

3. $y = 2x^2 - 1$

a) ZA 1 U DESNO $\rightarrow y = 2(x-1)^2 - 1 = 2x^2 - 4x + 2 - 1 = 2x^2 - 4x + 1$

b) ZA 2 GORE $\rightarrow (y-2) = 2x^2 - 1$

$$y = 2x^2 + 1$$

c) ZRCAUNO-Y-OS $\rightarrow y = 2(-x)^2 - 1 = 2x^2 - 1$

Samo je jedan Mali Ivica!

4. $y = x^2 + x$

a) ZA 3 U LIJEVO $\rightarrow y = (x+3)^2 + (x+3) = x^2 + 6x + 9 + x + 3 = x^2 + 7x + 12$

b) ZA 1 DOLJE $\rightarrow (y+1) = x^2 + x$

$$y = x^2 + x - 1$$

c) ZRCAUNO-X-OS $\rightarrow -y = x^2 + x$

$$y = -x^2 - x$$

5. $y = \frac{1}{x}$

a) ZA 2 LIJEVO $\rightarrow y = \frac{1}{x+2}$

b) ZA 1 GORE $\rightarrow y - 1 = \frac{1}{x+2}$

$$y = \frac{x+2+1}{x+2} = \frac{x+3}{x+2}$$

c) ZRCAUNO-X-OS $\rightarrow -y = \frac{x+3}{x+2}$

$$y = -\frac{x+3}{x+2}$$

6. a) $f(x) = \sqrt{x^3 - 3x^2 - 10x + 24}$, $D(f) = ?$

$$x^3 - 3x^2 - 10x + 24 \geq 0$$


\hookrightarrow Rješenja su cijelobrojni djeljitelji broja 24 ($\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24$)
Dobiju se tako da se nađe jedno i da se ostala nađu djeljivačem polinoma:

$$x_1 = 2$$

$$\begin{array}{r} (x^3 - 3x^2 - 10x + 24) : (x-2) = x^2 + x - 12 \\ \underline{-x^3 + 2x^2} \\ \hline -x^2 - 10x + 24 \\ \underline{+x^2 + 2x} \\ \hline -12x + 24 \\ \underline{+12x + 24} \\ \hline 0 \end{array} \quad x_{2,3} = \frac{1 \pm \sqrt{1+48}}{2} = \frac{1 \pm 7}{2}$$

$$x_2 = 4$$

$$x_3 = -3$$




$$x \in [-3, 2] \cup [4, \infty)$$

b) $f(x) = \frac{4x-1}{2-\sqrt{x^2-3x}}$, $D(f) = ?$

$$\begin{aligned} 1^0 \quad & 2 - \sqrt{x^2 - 3x} \neq 0 \\ & \sqrt{x^2 - 3x} \neq 2 \\ & x^2 - 3x \neq 4 \\ & x^2 - 3x - 4 \neq 0 \\ & x_{1,2} \neq \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{2} \neq \frac{3 \pm 5}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & x_1 \neq 4 \\ & x_2 \neq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^0 \quad & x^2 - 3x \geq 0 \\ & x(x-3) \geq 0 \\ & x_1 = 0 \\ & x_2 = 3 \end{aligned}$$



$$x \in (-\infty, 0] \cup [3, \infty) \setminus \{-1, 4\}$$

(7) a) $f(x) = \sqrt{3 - |x - 1|}$, $D(f) = ?$

$$3 - |x - 1| \geq 0$$

$$|x - 1| \leq 3 \quad |(-1)|$$

$$|x - 1| \leq 3$$

$$1^{\circ} x - 1 \leq 3$$

$$x \leq 4$$

$$2^{\circ} x - 1 \geq -3$$

$$x \geq -2$$

$$x \in [-2, 4] //$$

b) $f(x) = \sqrt{|x^2 - 3x - 1| - 3}$, $D(f) = ?$

$$|x^2 - 3x - 1| - 3 \geq 0$$

$$|x^2 - 3x - 1| \geq 3$$


$$1^{\circ} x^2 - 3x - 1 \geq 3$$

$$x^2 - 3x - 4 \geq 0$$

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2}$$

$$= \frac{3 \pm 5}{2}$$

$$x_1 = 4 \quad x_2 = -1$$



$$x \in (-\infty, -1] \cup [4, \infty)$$

$$2^{\circ} x^2 - 3x - 1 \leq -3$$

$$x^2 - 3x + 2 \leq 0$$

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2}$$


$$= \frac{3 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = 1$$



$$x \in [1, 2]$$

$$1^{\circ} (i) 2^{\circ}$$



$$x \in (-\infty, -1] \cup [1, 2] \cup [4, \infty) //$$

(8) a) $f(x) = \frac{1}{\ln(x^2 - 3)}$, $D(f) = ?$

$$1^{\circ} \ln(x^2 - 3) \neq 0$$

$$\ln(x^2 - 3) \neq \ln e^0$$


$$x^2 - 3 \neq 1$$

$$x^2 \neq 4$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = -2$$

$$2^{\circ} x^2 - 3 > 0$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{3}$$



$$x \in (-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, \infty)$$

$$1^{\circ} i 2^{\circ} \quad x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \infty) \setminus \{-2, 2\} //$$

b) $f(x) = \sqrt{\frac{\ln(x^2 - 13)}{x - 7}}$, $D(f) = ?$

$$1^{\circ} x - 7 \neq 0$$


$$x \neq 7$$

$$2^{\circ} \frac{x^2 - 13}{x - 7} > 0$$

$$x - 7$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{13}$$

$$x_3 = 7$$



$$x \in (-\sqrt{13}, \sqrt{13}) \cup (7, \infty)$$

$$3^{\circ} \ln\left(\frac{x^2-13}{x-7}\right) \geq 0$$

$$\ln\left(\frac{x^2-13}{x-7}\right) \geq \ln e^0$$

$$\frac{x^2-13}{x-7} - 1 \geq 0$$


$$\frac{x^2+13-x-7}{x-7} \geq 0$$

$$\frac{x^2-x-6}{x-7} \geq 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} \quad \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

$$x_3 = 7$$

1^o i 2^o i 3^o



$$x \in [-2, 3] \cup (7, \infty)$$

9. a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{x-2}\right)$, $\mathcal{D}(f) = ?$

$$1^{\circ} x-2 \neq 0 \\ x \neq 2$$


$$2^{\circ} -1 \leq \frac{1}{x-2} \leq 1$$

$$a) \frac{1}{x-2} \geq -1$$

$$\frac{1+x-2}{x-2} \geq 0$$

$$\frac{x-1}{x-2} \geq 0$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = 2$$




$$x \in (-\infty, 1] \cup [2, \infty)$$

$$b) \frac{1}{x-2} \leq 1$$

$$\frac{1-x+2}{x-2} \leq 0$$


$$\frac{-x+3}{x-2} \leq 0$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 2$$



$$x \in (-\infty, 2] \cup [3, \infty)$$

1^o; 2^oa; 2^ob



$$x \in (-\infty, 1] \cup [3, \infty)$$

b) $f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x^2-x-1}\right)$, $\mathcal{D}(f) = ?$

$$1^{\circ} x^2 - x - 1 \neq 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$2^{\circ} \quad 1 < \frac{1}{x^2 - x - 1} < -1$$


a) $\frac{1}{x^2 - x - 1} > 1$

$$\frac{x^2 - x - 1}{1 - x^2 + x + 1} > 0$$

$$\frac{x^2 - x - 1}{-x^2 + x + 2} > 0$$

$$\frac{x^2 - x - 1}{x^2 - x - 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \quad |x_1 = -1| \\ |x_2 = 2|$$

$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad |x_3 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}| \\ |x_4 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}|$$



$$x \in \left(-1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 2\right)$$


b) $\frac{1}{x^2 - x - 1} < -1$

$$\frac{1 - x^2 - x - 1}{x^2 - x - 1} < 0$$

$$\frac{x(x-1)}{x^2 - x - 1} < 0$$


$$x_1 = 0 \\ x_2 = 1$$

$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad |x_3 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}| \\ |x_4 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}|$$



$$x \in \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right) \cup \left(1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$$

10 i (2^o ili 2^ob)



$$x \in (-1, 0) \cup (1, 2) //$$


(10) a) $f(x) = \ln(2\sin x - 1)$

$$2\sin x - 1 > 0$$

$$2\sin x > 1$$

$$\sin x > \frac{1}{2}$$

$$x \in \left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right)$$



b) $f(x) = \sqrt{\arccos x - \frac{\pi}{3}}$

$$1^o \quad \arccos x - \frac{\pi}{3} \geq 0$$

$$\arccos x \geq \frac{\pi}{3}$$

$$x > \frac{1}{2}$$

1^o i 2^oa i 2^ob

$$2^o \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$a) \quad x \leq 1$$

$$b) \quad x \geq -1$$




$$x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] //$$

(11) $f(x) = \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}}$, $\mathcal{D}(f) = ?$, $f^{-1} = ?$, $\mathcal{D}(f^{-1}) = ?$, f -injekcija

1) $x \rightarrow y \quad \rightarrow \quad x = \frac{2^y - 2^{-y}}{2^y + 2^{-y}} \quad | \cdot (2^y + 2^{-y})$

$$\begin{aligned} x \cdot 2^y - x \cdot 2^{-y} &= 2^y - 2^{-y} \\ x \cdot 2^y - 2^y &= -2^{-y} + x \cdot 2^{-y} \\ 2^y(x-1) &= 2^y(1+x) \quad | : 2^y \quad | : (x-1) \\ \frac{2^y}{2^y} &= \frac{1+x}{x-1} \\ 2^y &= \frac{1+x}{x-1} \\ 4^y &= \frac{1+x}{x-1} \quad | \cdot \log_4 \end{aligned}$$
 $y \log_4 4 = \log_4 \frac{1+x}{x-1}$
 $y = \log_4 \frac{1+x}{x-1} = \frac{1}{2} \log_2 \frac{1+x}{x-1}$

2) $\mathcal{D}(f) = ?$
 $2^x - 2^{-x} \neq 0$
 $2^x \neq 2^{-x} \quad | \log$
 $\log 2^x \neq \log 2^{-x}$
 $x \log 2 \neq -x \log 2$
 $x + x \neq 0$
 $2x \neq 0$
 $x \neq 0$
 $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

3) $1^0 \frac{1+x}{x-1} > 0$


$x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

2⁰ $x-1 \neq 0$
 $x \neq 1$


4) f -injekcija:
 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

(12) $f(x) = \frac{2e^x - 1}{e^x + 2}$, $\mathcal{D}(f) = ?$, $f^{-1} = ?$, $\mathcal{D}(f^{-1}) = ?$, f -injekcija

1) $x \rightarrow y \quad \rightarrow \quad x = \frac{2 \cdot e^y - 1}{e^y + 2} \quad | \cdot (e^y + 2)$

$$\begin{aligned} x \cdot e^y + 2x &= 2 \cdot e^y - 1 \\ x \cdot e^y - 2e^y &= -1 - 2x \\ e^y(x-2) &= -(1+2x) \\ e^y &= \frac{1+2x}{2-x} \quad | \ln \\ y \cdot \ln e &= \ln \frac{1+2x}{2-x} \\ y &= \ln \frac{1+2x}{2-x} \end{aligned}$$

2) $\mathcal{D}(f) = ?$
 $e^x + 2 \neq 0$
 $e^x \neq -2$
 $x \in \mathbb{R}$

3) $1^0 \frac{1+2x}{2-x} > 0$

 $x \in (-\frac{1}{2}, 2)$

2⁰ $2-x \neq 0$
 $x \neq 2$

4) f -injekcija

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ \frac{2e^{x_1} - 1}{e^{x_1} + 2} &= \frac{2e^{x_2} - 1}{e^{x_2} + 2} \\ 2e^{x_1} + 4e^{x_1} - e^{x_2} - 2 &= 2e^{x_2} + 4e^{x_2} - e^{x_1} - 2 \\ 5e^{x_1} &= 5e^{x_2} \\ \Downarrow \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

1⁰ $x \in (-\frac{1}{2}, 2)$

Samo je jedan Mafi Ivica!

(13.) $f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{x-1}}\right)$, $f^{-1}=?$, $D(f)=?$, $D(f^{-1})=?$

1)

$$\begin{array}{l} x \geq y \\ y > x \end{array} \rightarrow x = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{y-1}}\right) \quad 1^{\circ} - 1 \leq \frac{1}{\sqrt{y-1}} \leq 1$$

$$\sin x = \frac{1}{\sqrt{y-1}}$$

$$\sin^2 x (y-1) = 1$$

$$y \sin^2 x - \sin^2 x = 1$$

$$y \sin^2 x = 1 + \sin^2 x$$

$$y = \frac{1 + \sin^2 x}{\sin^2 x}$$

2) $D(f)=?$

$$\begin{aligned} a) \quad \frac{1}{\sqrt{x-1}} &\geq -1 \quad | \cdot \sqrt{x-1} \\ 1 &\geq \sqrt{x-1}/2 \\ 1 &\geq x-1 \\ x &\leq 2 \end{aligned}, \quad \sqrt{x-1} > 0, \quad x > 1$$

$$\begin{aligned} b) \quad \frac{1}{\sqrt{x-1}} &\leq 1/\sqrt{x-1} \quad | \cdot \sqrt{x-1} \\ 1 &\leq \sqrt{x-1}/2 \\ 1 &\leq x-1 \\ x &\geq 2 \end{aligned}, \quad \sqrt{x-1} > 0, \quad x > 1$$

3) $D(f^{-1})=?$

$$\sin^2 x \neq 0$$

$$2 \sin x \cos x \neq 0$$

$$\sin x \neq 0 \quad \cos x \neq 0$$

$$x \neq k\pi$$

$$x_1 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$x_2 \neq -\frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$2^{\circ} \sqrt{x-1} \neq 0$$

$$x-1 \neq 0$$

$$x \neq 1$$

$$x \in [2, \infty)$$

$$3^{\circ} \quad x-1 > 0$$

$$x > 1$$

$$D(f^{-1}) \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$D_f \in (1, \infty)$$

(14.) Dokazi:

$$a) \sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x-y) + \sin(x+y)]$$

$$DS = \frac{1}{2} (\sin(x-y) + \sin(x+y)) = \frac{1}{2} (\sin x \cos y - \cos x \sin y + \sin x \cos y + \cos x \sin y)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \sin x \cos y = \sin x \cos y = LS \quad w.$$

Q.E.D.

$$b) \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2}$$

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2}, \quad y = \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$(I) \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\text{SUPS: } \sin d = \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$(II) \sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\text{SUPS: } \sin B = \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} - \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$(I) + (II) = \sin d + \sin B = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

(15.) Dokazi: $\arctg x + \operatorname{arccotg} x = \frac{\pi}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{array}{l} y_1 = \arctg x \rightarrow x = \tg y_1 \\ y_2 = \operatorname{arccotg} x \rightarrow x = \cot y_2 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \tg y_1 = \cot y_2 = \tg \left(\frac{\pi}{2} - y_2 \right) \\ \downarrow \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{\pi}{2} - y_2 \\ y_1 + y_2 &= \frac{\pi}{2} \quad w. \end{aligned}$$

Q.E.D.

-126-

(16.) $\cos(2\arccos x) = 2x$, $x \in [-1, 1]$

$$\cos^2(\arccos x) - \sin^2(\arccos x) = 2x$$

$$\cos^2(\arccos x) - 1 + \cos^2(\arccos x) = 2x$$

$$2\cos^2(\arccos x) - 1 = 2x$$

↓

$$\cos(\arccos x) = x$$
, $x \in [-1, 1]$

↓

$$2x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+8}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$x_1 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x_2 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{jer } x \in [-1, 1]$$

Samo je jedan Mali Ivica!

(17.) a) $y = \arccos(\cos x) \rightarrow \text{graf}$


b) $\arccos(\cos x) = \frac{x}{3}$, $x = ?$

a) $\rightarrow \cos x \text{ i m a } P = 2\pi \Rightarrow \arccos(\cos x) \text{ i m a } P = 2\pi$

1) $[0, \pi] \rightarrow \arccos(\cos x) = y$

$$x = y \\ 2\pi - x = y$$

→ graf:



b) $\arccos(\cos x) = \frac{x}{3} \mid \cos \Rightarrow \frac{x}{3} \in [0, \pi] \Rightarrow x \in [0, 3\pi]$

$$\cos x = \cos \frac{x}{3}$$

$$\cos x - \cos \frac{x}{3} = 0$$

$$-2 \sin \frac{2x}{3} \sin \frac{x}{3} = 0$$

I) $\sin \frac{2x}{3} = 0$

$$\frac{2x}{3} = k\pi$$

$$x = \frac{3k\pi}{2}$$

$$k=0 \dots x_1 = 0$$

$$k=1 \dots x_2 = \frac{3\pi}{2}$$

$$k=2 \dots x_3 = 3\pi$$

$$x \in \{0, \frac{3\pi}{2}, 3\pi\}$$

II) $\sin \frac{x}{3} = 0$

$$\frac{x}{3} = k\pi$$

$$x = 3k\pi$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 3\pi$$

$$x_3 = 6\pi$$

$$\text{jer } x \in [0, 3\pi]$$

(18.) $\Rightarrow \sin(x+y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$, dokazi!
 ↳ Vidi str. 115. dokazi (2 i 3).

(19.) $4\sin(\ln x) = x$, $x = ? \Rightarrow x > 0$

$$\begin{aligned} 4 \cdot \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{2} &= x \\ 2(x - x^{-1}) &= x \\ 2x + \frac{2}{x} &= x \cdot x \\ 2x^2 - 2 &= x^2 \\ x^2 &= 2 \\ x &= \pm \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$x = +\sqrt{2} //$$

(20.) $\cosh(\ln x) = x$, $x = ? \Rightarrow x > 0$

$$\begin{aligned} \frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2} &= x / \cdot 2 \\ x + x^{-1} &= 2x \\ x + \frac{1}{x} &= 2x \cdot x \\ x^2 + 1 &= 2x^2 \\ -x^2 &= -1 \\ x^2 &= 1 \\ x &= \pm 1 \end{aligned}$$

$$x = 1 //$$


Z. NIZOVI

Samo je jedan Mali Ivica

7.1. POJAM NIZA. PODNIZ. OMEDEN NIZ.

= DEFINICIJA 1.

↪ Funkcija $a: \mathbb{N} \rightarrow S$ zove se niz (sljed) u skupu S . Ako je $S = \mathbb{R}$ onda je to niz (sljed) realnih brojeva.



= Oznake:
 $a(n) = a_n \rightarrow$ opis člana niza
 $(a_n) \rightarrow$ oznaka niza
 $\{a_n\} \rightarrow$ skup vrijednosti niza $\{a_n\}$

= DEFINICIJA 2.

↪ Kazemo da je niz realnih brojeva (b_n) podniz niza (a_n) , ako postoji struko rastvora funkcija $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ takva da je $b_n = a_{f(n)}$.

= PRIMERI 1.


↪ Navedimo nekoliko nizova:

a) $a_n = \frac{1}{n}$

↪ $(a_n) = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$

↪ $\{a_n\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$

↪ grafički:



b) $a_n = \frac{1}{2^n}$

↪ $(a_n) = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}$

↪ $\{a_n\} = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots\}$

↪ Niz $(a_n) = \frac{1}{2^n}$ je odatlo godniz niza iz primjera a jer je funkcija $f(n) = 2^n$ monotono rastvora.

c) $a_n = (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}$

↪ $(a_n) = \frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \dots$

↪ $\{a_n\} = \{\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \dots\}$

d) $a_n = \sqrt{n}$

↪ $(a_n) = 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \dots, \sqrt{n}$

↪ $\{a_n\} = \{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \dots, \sqrt{n}, \dots\}$

= DEFINICIJA 3.

↪ Kazemo da je niz (a_n) omeđen odvođa (odvođa) ako je skup $\{a_n\}$ omeđen odvođa (odvođa). Niz je omeđen, ako je omeđen i odvođa i odvođa.

↳ Primjer: a, b, c su omeđeni nizovi, a d nije


7.2. POJAM GOMILIŠTA NIZA

= DEFINICIJA 1.

↳ Neka je $a_0 \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. ε -okoliš broja a_0 je interval oblika:

$$V_\varepsilon(a_0) = \{a \in \mathbb{R} \mid |a - a_0| < \varepsilon\} \equiv (a_0 - \varepsilon, a_0 + \varepsilon)$$

ili grafički:




$$V_\varepsilon(a_0)$$

↳ Okolišem broja a_0 nazivamo svaki skup za kojeg postoji ε -okoliš koji je u njemu sadržan.

= Radi prikladnijeg daljnog iskazivanja definicija i teorema dodajemo stupu \mathbb{R} još dva objekta, tj. točke $+\infty$ i $-\infty$.

↳ Grafički:



↳ za $a \in \mathbb{R}$ vrijedi:

$$-\infty < a < +\infty.$$


↳ Skup $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} = \overline{\mathbb{R}}$; zove se prošireni brojni pravac.

= DEFINICIJA 2.

↳ Skup $V_M(+\infty) = \{a \in \mathbb{R} \mid a > M\} = (M, +\infty)$ naziva se M -okoliš točke $+\infty$.



↳ Skup $V_M(-\infty) = \{a \in \mathbb{R} \mid a < M\} = (-\infty, M)$ naziva se M -okoliš točke $-\infty$.



↳ Okoliš točke $+\infty$ (\rightarrow) je svaki skup za kojeg postoji M -okoliš koji je u njemu sadržan.

= DEFINICIJA 3.

↳ Realan broj $a \in \mathbb{R}$ je gomiliste niza (a_n) ako se unutar svakog okoliša nalazi beskonačno mnogo članova niza (a_n) .


↳ Gomila definicija može se proširiti u smislu da $a \in \mathbb{R}$ možemo zamijeniti beskonačno dalekim točkama $+\infty$ ili $-\infty$.

= PRIMJER 1.

↳ Navedimo gomiliste iz prethodnog primjera:

a) $a_n = \frac{1}{n}$

$$(a_n) = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$$




↳ niz ima gomiliste: $A = 0$

NETPARNI ČLANOVII PARNI ČLANOVII

b) $a_n = (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}$


$$(a_n) = \frac{1}{2^1} - \frac{2}{3}, \frac{3}{4} - \frac{5}{4}, \dots$$



↪ niz ima 2 gornilišta: $A_1 = -1$ i $A_2 = 1$

c) $a_n = \sqrt{n}$

$$(a_n) = 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \dots$$



↪ niz ima gornilište: $A = +\infty$, jer za $n > M^2$ su svi $a_n = \sqrt{n}$ unutar okolisa $(M, +\infty)$

= STAVAK 1.

↪ Svaki omeđen niz realnih brojeva ima barem jedno gornilište, i to gornilište je realan broj.

Dokaz:

- Neka se svi članovi nalaze unutar intervala $[m, M]$. Ako podijelimo taj interval na dva podintervala: $\left[m, \frac{m+M}{2}\right], \left[\frac{m+M}{2}, M\right]$. U barem jednom od tih dva podintervala mora biti beskonačno mnogo članova niza. Ako odatlemo jedan od podintervala u kojem ima beskonačno mnogo članova niza i podijelimo ga na dva manja podintervala onda opet u jednom od njih ima beskonačno mnogo članova. Nastavljajući taj postupak dolazimo do niza zadnjih intervala $[a_i, b_i]$ takvih da je $[a_{i+1}, b_{i+1}] \subset [a_i, b_i]$, čiji presjek neka je broj a . U okolisu tog broja a nalazi se beskonačno mnogo članova niza, što znači da je upravo taj broj a gornilište niza a_n .

= Ako dozvolimo da gornilište može biti $+\infty$ ili $-\infty$ stavak možemo proširiti na:

↪ Svaki niz (a_n) ima gornilište u \mathbb{R} . Posebice ima:

- 1) najmanje gornilište \rightarrow limes inferior ($\liminf a_n$)
- 2) najveće gornilište \rightarrow limes superior ($\limsup a_n$)

= PRIMJER 3.

↪ Navedimo \limsup i \liminf iz prethodnog primjera:

a) $a_n = (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}$

$$(a_n) = \frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \dots \quad \Rightarrow \liminf a_n = -1 \\ \Rightarrow \limsup a_n = +1$$

b) $a_n = \frac{1}{n}$


$$(a_n) = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \quad \Rightarrow \limsup a_n = \liminf a_n = 0$$

7.3. KONVERGENCIJA NIZA REALNIH BROJEVA

= PRIMJER 1.

$$\hookrightarrow a_n = \frac{1}{n} \dots (a_n) = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$$

↪ Unutar okolisa $(-\epsilon, \epsilon)$ postoji beskonačno mnogo članova, a izvan končno mnogo članova.



= DEFINICIJA 1.

↪ Niz realnih brojeva (a_n) konvergira (teži) k realnom broju L ako svaki svaki okolis od \mathbb{R} sadrži beskonačno mnogo članova niza (a_n) , a izvan bilo kojeg okolisa ima samo končno mnogo članova niza.

Za L kažemo da je limes niza (a_n) i to zapisujemo: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ili $a_n \rightarrow L$.

= PRIMJEDBA 1.

↪ U gornjoj definiciji dostatno je postaviti samo drugi zaključak (daivan okolisa


Samo je jedan Mali Ivica!

ima samo konačno mnogo članova), jer je pri zadataku (da unutar ima beskonačno mnogo članova) njegova posledica.

= Ako niz ima limes onda je konvergentan, inače je divergentan.

= Ako je $\epsilon > 0$ onda možemo napisati ϵ -iziranu definiciju limesa:

$$V_\epsilon(L)$$



↳ Među konačno mnogo članova izvan okoliša $V_\epsilon(L)$ neki ima najveći indeks n_0 , pa za $n_0 = n_1 + 1$, i za sve $n \geq n_0$ vrijedi da je svaki daljnji član je unutar okoliša $V_\epsilon(L)$.

Dakle vrijedi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Leftrightarrow (\forall \epsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N})[n \geq n_0 \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon].$$

$$\Leftrightarrow [n \geq n_0 \Rightarrow a_n \in N_\epsilon(L)].$$

PRIMJER 2.

↳ Koristeći ϵ -iziranu definiciju limesa dokazite da je: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

- Arhimedov stavak glasi:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(n_0 > \frac{1}{\epsilon})$$

- Uvrštavanjem $a_n = \frac{1}{n}$ i $L=0$ dobivamo:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists n_0)(\forall n)(n \geq n_0 \Rightarrow |\frac{1}{n} - 0| < \epsilon),$$

što znači da je: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ jer za $n \geq n_0$ imamo:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \epsilon \quad \text{Q.E.D.}$$

STAVAK 1.

↳ Konvergentan niz je onečten.

Pokaz:

- Među konačno mnogo članova s desna i s lijeva od intervala $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ postoji najveći, dočinio najmanji, broj, i pa su to mreže skupovi $\{a_n\}$.

Grafički:



STAVAK 2.

↳ Konvergentan niz ima samo jedan limes.

Dokaz:

- Pretpostavimo suprotno, da postoji dva limesa, Grafički:



- Izvan $V_\epsilon(L_1)$ ima samo konačno mnogo članova, pa u okolišu $V_\eta(L_2)$ ne može biti beskonačno mnogo članova, pa L_2 nije limes, što smo trebali i dokazati.

STAVAK 3.

↳ Ako postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n \leq b_n$ za sve $n \geq n_0$, onda je $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

STAVAK 4.

↳ tzv. „Sandvič-teorem“:

Ako postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n \leq b_n \leq c_n$ za svaki $n \geq n_0$, tada je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L, \text{ onda je i } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L.$$

Dokaz:

- Direktna posljedica stavka 3, tako da se on upotrijebi 2 puta.

= STAVAK 5.

↳ Vrijedi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$$

Dokaz:

- Neposredna posljedica prethodne ekvivalencije: $|a_n - 0| < \epsilon \Leftrightarrow | |a_n| - 0 | < \epsilon$

7.4. PRAVILA ZA RAČUNANJE S LIMESIMA

= STAVAK 1.

↳ Ako su a_n i b_n konvergentni nizovi, onda vrijedi:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}, \text{ za } b_n \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$

Dokaz:

a) Uzmimo da je $\epsilon > 0$. Tada vrijedi:

$$\exists n_1 : \forall n \geq n_1 \Rightarrow |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$\exists n_2 : \forall n \geq n_2 \Rightarrow |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$$

Neka je $n_3 = \max\{n_1, n_2\}$ onda za $n \geq n_3$ vrijedi:

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$$

Q.E.D.

b) Konvergentni niz je omeđen, pa za $\exists M_1$ vrijedi da je $|a_n| < M_1$.

Neka je $M = \max\{M_1, |b_n|\}$.

Za $\epsilon > 0$ vrijedi:

$$\exists n_1, \dots, n \geq n_1 \Rightarrow |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2M}$$

$$\exists n_2, \dots, n \geq n_2 \Rightarrow |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2M}$$

Za $n_3 = \max\{n_1, n_2\}$, vrijedi za $n \geq n_3$:

$$|a_n b_n - ab| = |(a_n b_n - a_n b) + (a_n b - ab)| \leq |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a| < \\ < M \cdot \frac{\epsilon}{2M} + M \cdot \frac{\epsilon}{2M} = \epsilon$$

Q.E.D.

7.5. NIŽOVI S BESKONAČNIM LIMESIMA

= DEFINICIJA 1.

↳ Niz realnih brojeva (a_n) divergira k $+\infty$, i to zapisujemo: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, $a_n \rightarrow +\infty$), ako za svaki $M > 0$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da za $n \geq n_0$ vrijedi $a_n > M$.

↳ Niz realnih brojeva (a_n) divergira k $-\infty$, i to zapisujemo: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, $a_n \rightarrow -\infty$), ako za svaki $m < 0$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da za $n \geq n_0$ vrijedi $a_n < m$.

Samo je jedan Mali Ivica!

= PRIMJER 1.

$\hookrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$, jer :

$(\forall M > 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}) (n_0 > M^2)$, a onda vrijedi i :

$$(\forall n, n \geq n_0) \Rightarrow (n > M^2) \Rightarrow (\sqrt{n} > M)$$

Q.E.D.

= STAVAK 1.

\hookrightarrow Neka su nizovi (a_n) i (b_n) takvi da je $\lim a_n = a > 0$, $b_n > 0$ i $\lim b_n = 0$. Tada je : $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$. (simbolički : $\frac{a}{0} = +\infty$).

= STAVAK 2.

\hookrightarrow Neka su nizovi (a_n) , (b_n) , (c_n) takvi da je $\lim a_n = +\infty$, $\lim b_n = +\infty$ i $\lim c_n = c$. Tada vrijedi :

SIMBOLIČKI:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = +\infty \rightarrow (+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + c_n) = +\infty \rightarrow (+\infty) + (c) = +\infty$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = +\infty \rightarrow (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot c_n) = +\infty, \text{ za } c > 0 \rightarrow +\infty \cdot c = +\infty, c > 0 \\ -\infty, \text{ za } c < 0 \rightarrow +\infty \cdot c = -\infty, c < 0$$

$$e) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{a_n} = 0 \rightarrow \frac{c}{\infty} = 0$$

= PRIMJER 2.

\hookrightarrow Izračunaj limese:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{2n^2+4n} \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) : n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{4}{n}} = \frac{0}{2} = 0$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+1}{2n^2+4n} \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) : n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{4}{n}} = \frac{3}{2}$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n+2^n}{3^{n+1}+2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n+2^n}{3^n \cdot 3+2^n \cdot 2} \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) : 3^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{3+2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{1}{3}$$

7.6. MONOTONI NIZOVI

= Niz $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ je monotoni ako je pripadajuća funkcija a monotona.


= STAVAK 1.

\hookrightarrow Ako je niz realnih brojeva monotoni i omeđen, onda je niz konvergentan.

Dokaz:

- Neka je a_n monotono rastući niz, i omeđen odozgo. Neka je $\sup \{a_n\} = L$.

Grafički :



- Za svaki $\epsilon > 0$, $L-\epsilon$ nije supremum od $\{a_n\}$, pa postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_{n_0} > L-\epsilon$. Kako je niz (a_n) rastući tada i za sve $n \geq n_0$ vrijedi :

$a_n \in (L-\epsilon, L+\epsilon)$, tj. ϵ -okoliš od L sadrži beskonačno mnogo članova niza, dok je izvan tog okoliša konačno mnogo članova niza ($n_0 - 1$), tj. prema osnovnoj definiciji: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Q.E.D.

- Analogno se izvodi i druga monotonoost.

PRIMJER 1.

↳ Ispitati konvergenciju geometrijskog niza $a_n = g^n$, $g \in (-\infty, 1)$.

$$(a_n) = (g^n) = 1, g, g^2, \dots, g^n.$$

a) Niz je padajući, dokaz: $a_{n+1} = g^{n+1} = g^n \cdot g = a_n \cdot g < a_n$



$$a_{n+1} < a_n \quad \text{Q.E.D.}$$

b) Niz je ograničen odozgo brojem 0, dokaz je očit (grafički).

- Kako smo dokazali da je monoton i omeđen, onda je niz konvergentan i ima limes: $\lim_{n \rightarrow \infty} g^n = L$.

Iz rekurne formule za opći član niza: $a_{n+1} = a_n \cdot g$ i primjenom limes postupka na lijevu i desnu stranu formule dobije se:

$$\underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1})}_{L} = \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot g)}_{L} = g \cdot \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}_{L} = g \cdot L$$

$$\downarrow$$

$$L = L \cdot g$$

$$L - L \cdot g = 0$$

$$L(1-g) = 0$$

$$1^\circ L = 0$$

$$2^\circ 1-g=0$$

$$\hookrightarrow \text{jed } g \in (-\infty, 1)$$

- Preostali slučajevi lako se ispituju iz:

$$\text{I) } g \in [-1, 0) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} g^n = \lim_{n \rightarrow \infty} |g|^n = \lim_{n \rightarrow \infty} |g|^n = 0 \quad \text{jed je } |g| \in (0, 1)$$

$$\text{II) } g = 0 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 0^n = 0$$

$$\text{III) } g = 1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

$$\text{IV) } g = -1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = 1, -1, 1, -1, \dots \rightarrow \text{niz je divergentan}$$

$$\text{V) } g \in (1, \infty) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} g^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{g^{-1}}\right)^n = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (g^{-1})^n} = \frac{1}{0} = +\infty \rightarrow \text{niz divergira k } +\infty$$

- Tablica za geometrijski niz $a_n = g^n$:

$$g = \begin{cases} (-\infty, -1] & \dots \text{divergira} \\ (-1, 1) & \dots \text{konvergira, } L=0 \\ 1 & \dots \text{konvergira, } L=1 \\ (1, \infty) & \dots \text{divergira} \end{cases}$$

PRIMJER 2.

↳ Ispitati konvergenciju niza: $a_n = \frac{n^2 \cos n}{n^3 + 1}$.

$$\text{- Uzimamo } b_n = |\cos n| = \left| \frac{n^2 \cos n}{n^3 + 1} \right| = \frac{n^2 |\cos n|}{n^3 + 1}.$$

- Iz sandvič teorema:

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 |\cos n|}{n^3 + 1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^3 + 1} \cdot \frac{n^3}{n^2} = \frac{0}{1} = 0$$

Samo je jedan Mali Ivica!

- Pca: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \cos n}{n^3 + 1} = 0$, iz čega slijedi: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \cos n}{n^3 + 1} = 0$.

= PRIMER 3.

→ Ispitati konvergenciju niza s općim članom: $a_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}$.

- $(a_n) = \sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots$. Iz toga uočimo rekursivnu formulu za:

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}.$$

- a) Niz je omeđen odnosno što se dokaze matematičkom indukcijom:

I) baza indukcije: $a_1 = \sqrt{2} < 2$ ✓.

II) pretpostavka: $a_n < 2$.

III) skok: $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{2 + 2} = 2 < \sqrt{2}$ ✓ Q.E.D.

Dakle $a_n < 2$.

b) Niz je monotono rastući:

I) baza indukcije: $a_1 = \sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad a_2 > a_1$
 $a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$

II) pretpostavka: $a_n > a_{n-1}$

III) skok: $\sqrt{2 + a_n} > \sqrt{2 + a_{n-1}} \quad / \sqrt$

$$\sqrt{2 + a_n} > \sqrt{2 + a_{n-1}} \\ a_{n+1} > a_n \text{ ✓ Q.E.D.}$$

- Niz je monoton i omeđen, pa je konvergentan, tj. ima limes: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Iz rekursivne formule: $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ primjenom limesa slijedi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 + a_n} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} (2 + a_n)} = \sqrt{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n} \Rightarrow$$

$$L = \sqrt{2 + L} \quad |^2$$

$$L^2 = 2 + L$$

$$L^2 - L - 2 = 0$$

$$L_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} \quad / \quad L_1 = 2 \quad / \quad L_2 = -1 \quad \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$$

= Ovdje smo primjenili činjenicu da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 + a_n} = \sqrt{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$, što vrijedi i općenito!

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)$ za neprekidne funkcije f , a takve su sve elementarne funkcije.

funkcije.

7.7. NEKI VAŽNI LIMESI

$$\Rightarrow 1) \lim_{n \rightarrow \infty} g^n = \begin{cases} 0 & \dots g \in (-1, 1) \\ 1 & \dots g \in 1 \\ \infty & \dots g > 1 \end{cases}$$

Dokaz: Pogledati stranicu 134.

$$\Rightarrow 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Dokaz: Niz je rastući i omeđen je odnosno $g_1 < 3$.
 Neodređeni oblik: 1^∞ .

-136-

$$\Rightarrow 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \forall a \in \mathbb{R}$$

Dokaz: Niz je padači i omeđen je odredno s nulom.

Neodređeni oblik: $\frac{\infty}{\infty}$.

- Uočiti rekurentnu formulu: $a_{n+1} = a_n \cdot \left(\frac{a}{n+1}\right)$.

= Faktorijel brže teži u beskonačno od bilo koje eksponencijalne funkcije.

$$\Rightarrow 4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{a^n} = 0, \forall p \in \mathbb{Q}^+, \forall a > 1$$

Dokaz: Niz je padači i omeđen je odredno s nulom.

Neodređeni oblik: $\frac{\infty}{\infty}$.

- Uočiti rekurentnu formulu: $a_{n+1} = \frac{(1+\frac{1}{n})^p}{a} \cdot a_n$.

= Eksponencijalna funkcija brže teži u beskonačno od bilo koje potencije.

$$\Rightarrow 5) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Dokaz: Koristeći sendvič-teorem.

Neodređeni oblik: ∞^0 .

$$\Rightarrow 6) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, \forall a > 0$$

Dokaz: Koristeći sendvič-teorem.

$$\Rightarrow 7) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$$

= PRIMJER 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n + \sqrt{n^2+1}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) : n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 + \sqrt{\frac{n^2+1}{n^2}}} = \frac{3+0}{1+1} = \frac{3}{2}$$

= PRIMJER 2.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=0}^n i^2}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\dots+n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+n}{2n^2} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) : n^2 = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{n}}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

= PRIMJER 3.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(\sqrt{n^2+1}-n)} \left(\frac{1}{\infty(\infty-\infty)} \right) \cdot \frac{\sqrt{n^2+1}+n}{\sqrt{n^2+1}+n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1}+n}{n(n^2+1-n^2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1}+n}{n^2} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{n^2+1}{n^2}+1}+1}{n} = 2 \end{aligned}$$

= PRIMJER 4.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (3\sqrt[3]{n^3+2n} - 2n) \left(\frac{\infty-\infty}{\infty-\infty} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+2n-(2n)^3}{(3\sqrt[3]{n^3+2n})^2 + 3\sqrt[3]{n^3+2n} \cdot 2n + (2n)^2} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+2n-8n^3}{(3\sqrt[3]{n^3+2n})^2 + 2n \sqrt[3]{n^3+2n} + 4n^2} : n^3 = \frac{-7}{0} = -\infty \end{aligned}$$

= PRIMJER 5.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+3}{3n+2} \right)^n \quad (1^\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+2+1}{3n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3n+2} \right)^{\frac{n(3n+2)}{(3n+2)}} = \\ = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+2}} = e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e}$$

= PRIMJER 6.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3}{2n+1} \right)^{3n-2} \quad (1^\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1+2}{2n+1} \right)^{3n-2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2n+1} \right)^{3n-2} = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2n+1} \right)^{\frac{(3n-2)(2n+1)}{(2n+1)}} = e^{2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{2n+1}} = e^{2 \cdot \frac{3}{2}} = e^3$$

= PRIMJER 7.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2} \right)^{3n+4} \sim \left(\frac{2}{3} \right)^\infty = 0$$

= PRIMJER 8.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+2}{2n+3} \right)^{n^2+4} \sim \left(\frac{3}{2} \right)^\infty = \infty$$

= PRIMJER 9.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^n + 8^n + 3}{n^{100} + n^{98} + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^n}{n^{100}} = \infty$$

7.8. EKVIVALENTNE NEIZMJERNO VELIKE VELIČINE

= DEFINICIJA 1.

↳ Kazemo da su a_n i b_n beskonačno velike veličine istog reda ako je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pm \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c, c \neq 0, c \neq \pm \infty.$$

U posebnom slučaju a_n i b_n su ekvivalentne beskonačno velike veličine ako

$$\text{Vrijedi: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pm \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1, \text{ što zapisujemo } a_n \sim b_n.$$

= STAVAK 1.

↳ Ako su a_n i b_n beskonačno velike veličine i (c_n) bilo koja beskonačno velika veličina, tada je $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{c_n} = \infty \Rightarrow a_n \sim b_n$, tj. u kvocientu $\frac{\infty}{\infty}$

neizmjerno velika veličina može se zamjeniti sa sebi ekvivalentnom.

= PRIMJER 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 + 3n^2 + n + 1}{4n^3 + n^2 + 2n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3}{4n^3} = \frac{5}{4}$$

$$\text{jer je: } (5n^3 + 3n^2 + n + 1) \sim (5n^3) \text{ i} \\ (4n^3 + n^2 + 2n + 3) \sim (4n^3) \text{ kada } n \rightarrow \infty.$$

= PRIMJER 2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2+n+1} + \sqrt[3]{n+1}}{\sqrt[4]{n^3+n+3} + \sqrt[n]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2}}{\sqrt[4]{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n}} = 0$$

$$\text{jer je: } (\sqrt[3]{n^2+n+1} + \sqrt[3]{n+1}) \sim (\sqrt[3]{n^2}) \text{ i} \\ (\sqrt[4]{n^3+n+3} + \sqrt[n]{n}) \sim (\sqrt[4]{n^3}) \text{ kada } n \rightarrow \infty.$$

Samo je jedan Mali Ivica!

ZADACI (DZ.7. PRVI DIO)

1. I) $a_n = (-1)^{n+1} \frac{n}{2n+5}$

→ gomilista, limes = ?

II) $b_n = (-1)^{n+1} \frac{n}{2n^2+5}$

I) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+5} : n = \frac{1}{2}$, ako je $n = 2k \dots \frac{1}{2}$
 , ako je $n = 2k+1 \dots -\frac{1}{2}$

↳ niz nemal limes jer ima dva gomilista $A_1 = \frac{1}{2}$ i $A_2 = -\frac{1}{2}$.

III) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n^2+5} : n^2 = \frac{0}{2} = 0$, ako je $n = 2k \dots 0$
 , ako je $n = 2k+1 \dots 0$

↳ niz ima limes jer ima jedno gomiliste $A_1 = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+5} = 0$.

2. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+1}{3n^2+3n+4} : n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2}} = \frac{2}{3}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n^2+4} : n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{4}{n^2}} = \frac{0}{1} = 0$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \frac{n^2+2n}{n+5} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+5n-n^2-2n}{n+5} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+5} : n = \frac{3}{1} = 3$

3. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3+n}{n^4+1} : n^4 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n} + \frac{1}{n^3}}{1 + \frac{1}{n^4}} = \frac{0}{1} = 0$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{2n^2+3n+4} : n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2}} = \frac{1}{2}$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 - \frac{n^3+n^2}{n+4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3+4n^2-n^3-n^2}{n+4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n+4} : n^2 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1 + \frac{4}{n^2}} = \frac{3}{1 + 0} = +\infty$

4. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+4}{2n^3+3} : n^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{n} + \frac{4}{n^3}}{2 + \frac{3}{n^3}} = \frac{0}{2} = 0$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \frac{n^2+3n}{n+4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+4n-n^2-3n}{n+4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+4} : n = \frac{1}{1} = 1$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n}+1}{\sqrt[4]{n}+4} : \sqrt[3]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}}{\sqrt[4]{n} + \frac{4}{\sqrt[3]{n}}} = \frac{1}{0} = +\infty$

5. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3+3n^2+3n+5}{3n^3+5n^2+5n+3} : n^3 = \frac{5}{3}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n+1}}{\sqrt[n^3+1]} : \sqrt[n^3]{} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{1}{n^3}}{\sqrt[1+\frac{1}{n^3}]} = \frac{0}{1} = 0$

$$\text{c)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \frac{(n-1)^5}{(n+1)^4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n+1)^4 - (n-1)^5}{(n+1)^4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^8 + 4n^4 + 6n^3 + 4n^2 + n - n^8 + 5n^4 - 10n^3 + 10n^2 - 5n + 1}{n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^4}{n^4} : n^4 = \frac{9}{1} = 9$$

$$\text{6.) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \frac{(n-a)^3}{(n+1)^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n+1)^2 - (n-a)^3}{(n+1)^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n^2+2n+1) - (n^3 - 3n^2a + 3n^2a^2 - a^3)}{n^2+2n+1} \right) = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n^2 + n - n^3 + 3n^2a - 3n^2a^2 + a^3}{n^2+2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n^2a + n - 3n^2a^2 + a^3}{n^2+2n+1} : n^2 = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 3a + \frac{1}{n} - \frac{3a^2}{n} + \frac{a^3}{n^2}}{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{2+3a}{1} = 2+3a$$

7.) a) Dokazati: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$.

$$\hookrightarrow (\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}) (\forall n \geq n_0) \left(\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| < \varepsilon \right)$$

$$\left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n}, \quad n_0 \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon \quad \text{W Q.E.D.}$$

$$\text{b)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \sin n}{n^2 + n + 1} : n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sin n}{n}}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\text{8.) a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 6^n}{2^n + 7^n} : 7^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{7}\right)^n + \left(\frac{6}{7}\right)^n}{\left(\frac{2}{7}\right)^n + 1} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\text{b)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^n - 1 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot 2 - 1}{2^n \cdot 2^1 + 1} : 2^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{2^n}}{2 + \frac{1}{2^n}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\text{9.) a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^n} \right)$$

$$\hookrightarrow a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{1}{3^2} \Rightarrow g = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{3}$$

$$S_g = a_1 \cdot \frac{g^n - 1}{g - 1} = \frac{\frac{1}{3} - 1}{\frac{1}{3} - 1} = \frac{3^n - 1}{3 - 1} = \frac{-3(3^n - 1)}{2} = \frac{3(1 - 3^{-n})}{2}$$

\hookrightarrow za $g = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ gleda se $(n+1)$ -član:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + 3 \cdot 3^{-n-1}}{2} = \frac{3}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 3^{-n} \cdot 3^{-1}}{2} = \frac{3}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{-n}}{2} = \frac{3}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \cdot 3^n} =$$

$$= \frac{3}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n \right) = \frac{3}{2} - 0 = \frac{3}{2}$$

$$\text{b)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^n}{1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n}$$

$$\hookrightarrow a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 4, \quad a_4 = 8 \Rightarrow g = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$$

$$S_g = a_1 \cdot \frac{g^n - 1}{g - 1} = 1 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

↳ za g-niz gleđa se $(n+1)$ član:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2^n}{2^{n+1}-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2^n}{2^n \cdot 2-1} : 2^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}{2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{1}{2}$$

10. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{5} + \frac{4}{25} - \dots + \left(-\frac{2}{5}\right)^n\right)$

↳ $a_1=1, a_2=-\frac{2}{5}, a_3=\frac{4}{25} \Rightarrow g\text{-niz } g = -\frac{2}{5}$

$$S_g = a_1 \cdot \frac{g^n - 1}{g - 1} = \frac{\left(-\frac{2}{5}\right)^n - 1}{-\frac{7}{5}} = \frac{5 \left((-2)^n - 5^n\right)}{-7 \cdot 5^n} = \frac{5 \cdot 5 - (-2)^n \cdot 5}{-7 \cdot 5^n}$$

↳ za g-niz gleđa se $(n+1)$ član:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} - (-2)^{n+1} \cdot 5}{7 \cdot 5^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n \cdot 5 - (-2)^n \cdot (-2) \cdot 5}{7 \cdot 5^n \cdot 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n \cdot 5 + 2 \cdot (-2)^n}{7 \cdot 5^n} = \frac{5^n}{5^n} = 1$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + 2 \cdot \left(\frac{-2}{5}\right)^n}{7} = \frac{5}{7}$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+10^n}{1+10+10^2+\dots+10^n}$

↳ $a_1=1, a_2=10, a_3=100 \Rightarrow g\text{-niz } g=10$

$$S_g = a_1 \cdot \frac{g^n - 1}{g - 1} = \frac{10^n - 1}{10 - 1} = \frac{10^n - 1}{9}$$

↳ za g-niz gleđa se $(n+1)$ član:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+10^n}{\frac{10^{n+1}-1}{9}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9+9 \cdot 10^n}{10^n \cdot 10 - 1} : 10^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{9}{10}\right)^n + 9}{10 - \left(\frac{1}{10}\right)^n} = \frac{9}{10}$$

11. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+2n}{n^2+1}$

↳ $a_1=1, a_2=2, a_3=3 \Rightarrow a\text{-niz } d=1$

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) = \frac{n}{2} (1+2n) = n(1+2n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+2n)}{(n^2+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2n^2}{n^2+1} : n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + 2}{1 + \frac{1}{n^2}} + 2$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+5+\dots+(2n+1)}{n^2+1}$

↳ $a_1=1, a_2=3, a_3=5 \Rightarrow a\text{-niz } d=2$

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) = \frac{n}{2} (1+2n-1) = \frac{n}{2} \cdot 2n = \frac{2n^2}{2} = n^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} : n^2 = 1$$

12. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1-1}{n+1}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{n+1}\right)^{n+1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n+5}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1+4-4}{2n+5}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{2n+5}\right)^{n(2n+5)} = e^{-4 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+5}}$

$$= e^{-4 \cdot \frac{1}{2}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

13. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{2n+1} \right)^{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1-1}{2n+1} \right)^{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{2n+1} \right)^{2n+1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n^2+1} \right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1-1}{n^2+1} \right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{n^2+1} \right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{n^2+1} \right)^{\frac{n^2(n^2+1)}{n^2+1}} =$
 $= e^{-1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$

14. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n-1}{3n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n-1+2-2}{3n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{3n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{3n+2} \right)^{\frac{n(3n+2)}{3n+2}} =$
 $= e^{-3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+2} = e^{-3} \cdot \frac{1}{3} = e^{-1} = \frac{1}{e}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+3} \right)^{n+4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2+1-1}{n+3} \right)^{n+4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{n+3} \right)^{n+4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{n+3} \right)^{\frac{(n+4)(n+3)}{(n+3)}} =$
 $= e^{-1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+4}{n+3} = e^{-1} = \frac{1}{e}$

15. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n\sqrt{n^2+n+1}} : n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} = \frac{1}{2}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^4+n^3+n^2+n+1} - n^2} \cdot \frac{\sqrt{n^4+n^3+n^2+n+1} + n^2}{\sqrt{n^4+n^3+n^2+n+1} + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n^2 + \sqrt{n^4+n^3+n^2+n+1})}{\sqrt{n^4+n^3+n^2+n+1} - n^2} =$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+n^2+n\sqrt{n^4+n^3+n^2+n+1} + \sqrt{n^4+n^3+n^2+n+1}}{n^3+n^2+n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3n^2+\sqrt{n^6+n^5+n^4+n^3+n^2+n+1}}{n^3+n^2+n+1}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n} + \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^5} + \frac{1}{n^6}}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3}} = \frac{2}{1} = 2$

16. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n} + \sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \cdot \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1} + \sqrt{n}} : \sqrt{n} =$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{n+\sqrt{n}}{n}}}{\sqrt{\frac{n+\sqrt{n}+\sqrt{n}}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}} + 1}}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$

17. $\lim_{n \rightarrow \infty} (4\sqrt[4]{n^4+n^3+n^2+n+1} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4+n^3+n^2+n+1 - n^4}{(4\sqrt[4]{n^4+n^3+n^2+n+1} + n)(\sqrt[4]{n^4+n^3+n^2+n+1} + n^2)}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+n^2+n+1}{(4\sqrt[4]{n^4+n^3+n^2+n+1})^3 + 4\sqrt{n^{12} \cdot n^{11} \cdot n^{10} \cdot n^9 + n^{18}} + \sqrt{n^6 \cdot n^5 \cdot n^4 + n^3 + n^2 + n^3}}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(4\sqrt[4]{n^4})^3 + \sqrt[4]{n^{12} + \sqrt{n^6} + n^3}} : n^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+1+1+1} = \frac{1}{4}$

(18) $a_n = \sqrt{3 \cdot \sqrt{3 \cdot \dots \cdot \sqrt{3}}} \quad \text{Dokazi konvergenciju i nadi limes.}$

$\hookrightarrow a_1 = \sqrt{3} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{rekurzivna formula} = a_{n+1} = \sqrt{3 \cdot a_n} \\ a_2 = \sqrt{3 \cdot \sqrt{3}} \end{array} \right.$

\hookrightarrow Da bi niz bio konvergentan mora biti monotoni i omeđen.

a) Pretpostavimo da je niz rastuci i dokazimo to matematičkom indukcijom.

I) baza: $a_2 > a_1$

$$\sqrt{3 \cdot \sqrt{3}} > \sqrt{3} \quad \checkmark$$

II) pretpostavka: $a_n > a_{n-1}$

III) skok: $a_{n+1} > a_n$

$$\sqrt{3 \cdot a_n} > \sqrt{3 \cdot a_{n-1}} \quad |^2$$

$$3 \cdot a_n > 3 \cdot a_{n-1} \quad | : 3$$

$$a_n > a_{n-1} \Rightarrow a_{n+1} > a_n \quad \text{Q.E.D.}$$

b) Pretpostavimo da je niz omeđen odgođa sa 3 i dokazimo to indukcijom.

I) baza: $a_1 < 3$

$$\sqrt{3} < 3 \quad \checkmark$$

II) pretpostavka: $a_n < 3$

III) skok: $a_{n+1} < 3$

$$\sqrt{3 \cdot a_n} < 3 \quad |^2$$

$$3 \cdot a_n < 9 \quad | : 3$$

$$a_n < 3 \quad \text{Q.E.D.}$$

Niz a_n je konvergenten i ima limes $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

$$a_{n+1} = \sqrt{3 \cdot a_n} \quad | \lim_{n \rightarrow \infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3 \cdot a_n} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} (3 \cdot a_n)} = \sqrt{3 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$$

$$L = \sqrt{3 \cdot L} \quad |^2$$

$$L^2 = 3L$$

$$L^2 - 3L = 0$$

$$L(L-3) = 0$$

$$L \neq 0 \quad L_2 = 3 \quad \checkmark \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3 \quad //$$

(19) $a_n = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}} \quad \text{Dokazi konvergenciju i nadi limes.}$

$\hookrightarrow a_1 = \sqrt{6} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{rekurzivna formula} = a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} \\ a_2 = \sqrt{6 + \sqrt{6}} \end{array} \right.$

\hookrightarrow Da bi niz bio konvergentan mora biti monotoni i omeđen.

a) Pretpostavimo da je niz rastuci i dokazimo to indukcijom!

I) baza: $a_2 > a_1$

$$\sqrt{6 + \sqrt{6}} > \sqrt{6} \quad \checkmark$$

II) pretpostavka: $a_n > a_{n-1}$

III) skok: $a_{n+1} > a_n$

$$\sqrt{6 + a_n} > \sqrt{6 + a_{n-1}} \quad |^2$$

$$6 + a_n > 6 + a_{n-1}$$

$$a_n > a_{n-1} \Rightarrow a_{n+1} > a_n \quad \text{Q.E.D.}$$

b) Pretpostavimo da je niz omeđen odgođa sa 3 i dokazimo to indukcijom:

I) baza: $a_1 < 3$

$$\sqrt{6} < 3 \quad \checkmark$$

II) pretpostavka: $a_n < 3$

III) skok: $a_{n+1} < 3$

$$\sqrt{6 + a_n} < 3 \quad |^2$$

$$6 + a_n < 9$$

$$a_n < 3 \quad \text{Q.E.D.}$$

Niz a_n je konvergentan i ima limes $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
 $a_{n+1} = \sqrt{6+a_n}$ | $\lim_{n \rightarrow \infty}$

$$\underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}}_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{6+a_n} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} (6+a_n)} = \sqrt{6+\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$$

$$L = \sqrt{6+L} / 2$$

$$L^2 = 6+L$$

$$L^2 - L - 6 = 0$$

$$L_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} \quad \begin{cases} L_1 = 3 \text{ i } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3 \\ L_2 = -2 \end{cases}$$

(20) $a_1 = 1$

Dokaz konvergencije i nadi limes.

$$a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n + 3}$$

Da bi niz bio konvergentan mora biti monotan i omeđen.

a) Pretpostavimo da je niz rastući i dokazimo to indukcijom,

I) baza: $a_2 > a_1$.

$$\frac{11}{4} > 1 \vee$$

II) pretpostavka: $a_{n-1} < a_n$.

III) skok: $a_n < a_{n+1}$

$$3 - \frac{1}{a_{n-1} + 3} < 3 - \frac{1}{a_n + 3} \quad | \cdot (-1)$$

$$a_n + 3 > a_{n-1} + 3$$

$$a_n > a_{n-1} \Rightarrow a_{n+1} > a_n \text{ w Q.E.D.}$$

b) Pretpostavimo da je niz omeđen odvođen i da je gornja međa 3, što je očito; taj je vrednost i ne treba se dokazovati.

Niz je konvergentan pa ima limes $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

$$a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n + 3}$$

$$L = 3 - \frac{1}{L+3} = \frac{3L+9-1}{L+3} = \frac{3L+8}{L+3}$$

$$L^2 + 3L - 3L - 8 = 0$$

$$L^2 - 8 = 0$$

$$L^2 = 8$$


$$L_1 = 2\sqrt{2} \quad \cancel{L_2 = -2\sqrt{2}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2\sqrt{2}$$

8. LIMES FUNKCIJE. NEPREKINUTE FUNKCIJE.

8.1. LIMES FUNKCIJE

= Promotrimo graf:




↳ funkcija ima konačni limes u konačnosti

= DEFINICIJA 1.

↳ Broj L je limes funkcije $y = f(x)$ u točki $x = a$ onda i samo onda ako za svaki niz $\{x_n\}$, $\{f(x_n)\} \subseteq D(f) \setminus \{f(a)\}$, s $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.


Sada vrijedi: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$, $\forall x_n$, što označujemo $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

↳ Ova se definicija proširuje i na slučaj $L = \pm \infty$ ("beskonačni limes u konačnosti")




↳ Ova se definicija proširuje i na slučaj

$a = \pm \infty$, $L \in \mathbb{R}$ ("konačni limes u beskonačnosti")



↳ Ova se definicija proširuje i na slučaj $a = \pm \infty$, $L = \pm \infty$ ("beskonačni limes u beskonačnosti")



= Za praktično računanje pogodan je umjesto definicije 1. bolje koristiti gornju epsilon-δ definiciju.


= STAVAK 1.

↳ Realan broj L je limes funkcije $y = f(x)$ u točki $x = a$, oznakom $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ako vrijedi:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D(f) \setminus \{a\})[|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon]$$

Samo je jedan Mali Ivica!

↳ graficki:



- x -zadodjara $|x-a| < \delta$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

= STAVAK 2.


↳ Ako funkcija ima limes onda je on jednoznačno određen.
= PRIMER 1.

↳ Funkcija $f(x)$ dana je izrazom:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1 & \dots x < 0 \\ -x + 3 & \dots x \geq 0 \end{cases}$$

Ispitati limes u točki $x=0$.

- Nacrtajmo funkciju:



- Funkcija nema limesa u točki $x=0$, jer za rastvori niz $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow 0$ je: $\lim f(x_n) = 1$, a za podajajući niz $\{y_n\}$, $y_n \rightarrow 0$ je: $\lim f(y_n) = 2$.

- Obzirom da je $L_1 \neq L_2$, funkcija nema limesa u točki $x=0$.


= PRIMER 2.

↳ Funkcija $f(x)$ dana je izrazom:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \dots x < 0 \\ 0 & \dots x = 0 \\ 1 & \dots x > 0 \end{cases}$$

Ispitati limes u točki $x=0$.

- Nacrtajmo funkciju:



- Funkcija nema limesa u točki $x=0$, jer za rastvori niz $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow 0$ je: $\lim f(x_n) = 1$, a za podajajući niz $\{y_n\}$, $y_n \rightarrow 0$ je: $\lim f(y_n) = -1$.

- Obzirom da je $L_1 \neq L_2$, funkcija nema limesa u točki $x=0$.


= PRIMER 3.

↳ Funkcija $f(x)$ dana je izrazom:

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \dots x \neq 0 \\ 0 & \dots x = 0 \end{cases}$$

Ispitati limes u točki $x=0$.

- Nacrtajmo funkciju:



$$A=1$$

$$\text{nutražke: } \frac{1}{x} = k\pi$$

$$x = \frac{1}{k\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} \rightarrow f(a_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1 \rightarrow f(a_n) = 1, 1, 1, \dots, 1 \rightarrow ①$$


$$b_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi} \rightarrow f(b_n) = \sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right) = -1 \rightarrow f(b_n) = -1, -1, \dots, -1 \rightarrow ②$$

- Kako postoji 2 gornjista (-1) i (1) funkcija nema limes u točki $x=0$.

= PRIMJER 4.

↳ Ispitaj da li funkcija $f(x) = \frac{1}{x-3}$, ima limes u točki $x=3$.

- Nacrtajmo graf:




- $f(a_n) \rightarrow -\infty$
 $f(b_n) \rightarrow +\infty$

} - Kako postoji 2 gornjista ($-\infty$) i ($+\infty$) funkcija nema limes u točki $x=3$.

= PRIMJER 5.

↳ Ispitaj da li funkcija $f(x) = \tan x$, ima limes u točki $x = \frac{\pi}{2}$.

- Nacrtajmo graf:



- $f(a_n) \rightarrow +\infty$
 $f(b_n) \rightarrow -\infty$

} - Kako postoji 2 gornjista ($-\infty$) i ($+\infty$) funkcija nema limes u točki $x = \frac{\pi}{2}$.

8.2. RACUNANJE LIMESA

= STAVAK 1.

↳ Neka su f i g realne funkcije s istim domenama ($D(f)=D(g)$) i mete je $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, $a, b \in \mathbb{R}$. Onda vrijedi:

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a \pm b$$

$$2) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a \cdot b$$

$$3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{a}{b}, \text{ za } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$$

$$4) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = a^b$$

Dokaz:

Sva ova pravila su s obzirom na definiciju direktna poslijedira za limese razvoja.

Vz odgovarajuće "računanje" s $(+\infty)$ i $(-\infty)$ tiskuje stvaru vrijede i u slučajima $a, b \in \mathbb{R}$ kad izrazi na desnim stranama nisu neodređeni.

= Neodređeni oblici:

$$1) \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \text{brojnik i nazivnik dijelimo s najvećom potencijom}$$

$$2) \frac{0}{0} \Rightarrow \text{brojnik i nazivnik skratimo}$$

3) $\infty - \infty \Rightarrow$ primjena algebarskih operacija kojima se funkcije transformira u odgovarajuću racionalnu funkciju

$$4) 1^\infty \Rightarrow \text{potrebno upotrijebiti transformaciju: } f(a)^{g(a)} = e^{\ln(f(a))^{g(a)}} = e^{\ln f(a)}$$

$$5) 0^0$$

$$6) \infty^0$$

= Osnovni limesi:

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{ctgh} x = -\infty$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{ctgh} x = +\infty$$

$$14) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsinx}{x} = 1$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$$

$$15) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$10) \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$11) \lim_{x \rightarrow 1^-} \operatorname{arctgh} x = -\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$12) \lim_{x \rightarrow 1^+} \operatorname{arctgh} x = +\infty$$

= PRIMJERI:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{\sin 2x} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$: 2x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{\sin 2x} = \frac{3}{2}$$

ili

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{2 \sin x \cos x} = \frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = \frac{3}{2 \cos 0} = \frac{3}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x}{2x+3} \right)^{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x+3-3}{2x+3} \right)^{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{-3}{2x+3} \right)^{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{-3}{2x+3} \right)^{\frac{4x(2x+3)}{2x+3}} = \\ = e^{-3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{2x+3}} = e^{-6}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x^3} \quad \left(\frac{0}{0} \right) : 2x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{x^3}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2} = \frac{2}{0} = +\infty$$

= STANAK 2.

Racunanje limesa supstitucijom:

Neka postoji limes funkcije $y = f(x)$ u točki $x = x_0$, u označi $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Neka

$f \in D(f) \subseteq D(g)$ te neka funkcija $y = g(x)$ ima limes $\lim_{y \rightarrow x_0} g(y) = L$, tako da je $\lim_{y \rightarrow x_0} g(y) = g(L)$. Onda vrijedi:


$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = \lim_{y \rightarrow L} g(y).$$

=PRIMJER 2.

$$\begin{aligned}
 a) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}} \left(\frac{0}{0} \right) &= \left| \begin{array}{l} \text{SUPST: } x=t^6 \\ x \rightarrow 1 \Leftrightarrow t \rightarrow 1 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1-t^3}{1-t^2} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(1-t)(1+t+t^2)}{(1-t)(1+t)} = \frac{3}{2} \\
 b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \left(\frac{0}{0} \right) &= \left| \begin{array}{l} \text{SUPST: } e^x - 1 = t \\ e^x = t + 1 \\ x = \ln(t+1) \\ x \rightarrow 0 \Leftrightarrow t \rightarrow e^x - 1 \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+t)}{t}} = \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\ln((\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}}))} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST: } \frac{1}{t} = z \\ t = \frac{1}{z} \\ t \rightarrow 0 \Leftrightarrow z \rightarrow \infty \end{array} \right| = \frac{1}{\ln(\lim_{z \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{z})^z)} = \\
 &= \frac{1}{\ln e} = 1
 \end{aligned}$$

8.3. JEDNOSTRANI LIMESI

=PRIMJER 1.




- Ova se funkcija ponosi razliko za pozitivne x i za negativne x u okolini $x_0 = 0$. To zapisujemo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

=DEFINICIJA 1.

↳ Neka je f realna funkcija i $x_0 \in \mathbb{R}$. Neka je k točku: $V^{(-)} = (-\infty, x_0) \cap D(f)$
 $V^{(+)} = (x_0, +\infty) \cap D(f)$



- Kazemo da je a lijevi limes funkcije $f(x)$ kad $x \rightarrow x_0^-$, i to zapisujemo ovako:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a,$$

ako je: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (f|_{V(-)}) = a$.

- Kazemo da je b desni limes funkcije $f(x)$ kad $x \rightarrow x_0^+$, i to zapisujemo ovako:


$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = b,$$

ako je: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f|_{V(+)}) = b$.

=PRIMJER 2.

↳ Izračunajte lijevi i desni limes funkcije u točki:

$$a) \lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{1}{x-1}$$




$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{(1-0)-1} = \frac{1}{-0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{(1+0)-1} = \frac{1}{+0} = +\infty$$

Samo je jedan Mali Ivica.


b) $\lim_{x \rightarrow 3^{\pm}} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{x-3} \right)$



$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{x-3} \right) = \operatorname{arctg} \frac{1}{3-0-3} = \operatorname{arctg} \frac{1}{-0} = \operatorname{arctg} (-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{x-3} \right) = \operatorname{arctg} \frac{1}{3+0-3} = \operatorname{arctg} \frac{1}{+0} = \operatorname{arctg} (+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

c) $\lim_{x \rightarrow \pm 0} e^{\frac{1}{x}}$



$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = e^{-\infty} = 0$$


$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = e^{+\infty} = +\infty$$

= STAVAK 1.

↳ Ako postoji lijevi i desni limes funkcije $f(x)$ kod $x \rightarrow x_0$, postoji $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, i ako su međusobno jednaki, onda postoji i limes funkcije u točki $x=x_0$ koji je jednak tim limesima:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

8.4. NEPREKINUTE FUNKCIJE I LIMESI



= DEFINICIJA 1.

↳ Funkcija $y=f(x)$ neprekinuta je u točki $x_0=x$, $x_0 \in \mathbb{R}$, ako vrijedi:

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x \in D(f)) [|x-x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(x_0)| < \varepsilon]$$

↳ Ako funkcija nije neprekinuta u točki $x=x_0$ kažemo da u točki $x=x_0$ ima prekid.

↳ Funkcija $f(x)$ je neprekinuta na skupu S ako je neprekinuta u svakoj točki skupa S .

= STAVAK 1.

↳ Neka postoji limes funkcije $y=f(x)$ u točki $x=x_0$, te neka je $x_0 \in D(f)$, i $f(x_0)=\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Onda je $f(x)$ neprekinuta funkcija u točki $x=x_0$.

= STAVAK 2.

↳ Ako su $f(x)$ i $g(x)$ neprekinute funkcije u x_0 , onda su u x_0 neprekinute i funkcije:

- $f(x) \neq g(x)$
- $f(x) \cdot g(x)$
- $\frac{f(x)}{g(x)}$, za $g(x_0) \neq 0$

= PRIMJER 1.

a) Sve elementarne funkcije su neprekinute funkcije u svakoj točki svoje domene.

b) Ako je funkcija f neprekinuta funkcija i $x_0 \in D(f)$, onda je:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x)$$

c) $f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x} & \dots x \neq 0 \\ 0 & \dots x=0 \end{cases}$. Dokazati da je f neprekidna na \mathbb{R} .

I) $x \neq 0 \dots$ funkcija je neprekinuta jer su neprekinute i funkcije:

$$\frac{1}{x}, \sin \frac{1}{x}, x \cdot \sin \frac{1}{x}$$

II) $x=0 \dots \lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \sin \frac{1}{x}) = ?$

↳ Sandvič teoremom:

$$0 \leq |x \cdot \sin \frac{1}{x}| = |x| \cdot |\sin \frac{1}{x}| \leq \underbrace{|x|}_{\leq 1}$$

Za $x \rightarrow 0$:

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} |x \sin \frac{1}{x}| \leq \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \sin \frac{1}{x}) = 0$$

funkcija f je neprekinuta u točki $x=0$ jer je $f(0)=0=\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

d)

$f(x) = \frac{x+e^{\frac{1}{x}}+1}{x-e^{\frac{1}{x}}-1}$. Kolika treba biti $f(0)$ da bi funkcija bila neprekinuta u točki $x=0$.

↳ $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = ?$

$$\text{I) lijevi limes: } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+e^{\frac{1}{x}}+1}{x-e^{\frac{1}{x}}-1} = \frac{0+e^{+\infty}+1}{0-e^{-\infty}-1} = +1$$

$$\text{II) desni limes: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+e^{\frac{1}{x}}+1}{x-e^{\frac{1}{x}}-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+e^{\frac{1}{x}}+1+e^{-\frac{1}{x}}}{x-e^{\frac{1}{x}}-1-e^{-\frac{1}{x}}} = \frac{0 \cdot e^{-\infty}+1+e^{-\infty}}{0 \cdot e^{-\infty}-1-e^{-\infty}} = \frac{0+1+0}{0-1-0} = -1$$


↳ Treba definirati da je $f(0) = -1$.

8.5. SVOJSTVA NEPREKINUTIH FUNKCIJA

= STAVAK 1.

↪ Weierstrass-ov teorem:

Funkcija f koja je neprekidna na zatvorenom intervalu $I = [a, b]$, natom je intervalu I omeđena i prima na njemu minimalnu vrijednost $\min_I f$ i maksimalnu vrijednost $\max_I f$.




= STAVAK 2.

↪ Stavak o meduvrijednosti:


Ako je za $x_1, x_2 \in I = [a, b]$, tako da je $f(x_1) = y_1 < f(x_2) = y_2$. Onda za svaku vrijednost y_0 , $y_1 < y_0 < y_2$, postoji $x_0 \in [x_1, x_2]$, tako da je $f(x_0) = y_0$.

- grafički:



= PRIMJEDBA 1.

↪ Ovi stavci općenito ne vrijede na pothvaćima kada nisu zatvoreni intervali, npr. $y = \frac{1}{x}$, na $(0, 1)$ jest neprekidna funkcija, ali ne poprima niči minimum, niči maksimum.



ZADACI

- ① a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 1}{3x^2 + 3x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 1 : x^2}{3x^2 + 3x + 4 : x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x^2}}{3 + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}} = \frac{2}{3}$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 1}{3x^2 + 3x + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x^2}}{3 + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}} = \frac{2}{3}$
- c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + 1}{3x^2 + 3x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + 1 : x^3}{3x^2 + 3x + 4 : x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2 + \frac{1}{x^3}}{\frac{3}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3}} = \frac{-2}{0} = -\infty$
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 1}{3x^2 + 3x + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x^3}}{\frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3}} = \frac{2+0}{0+0+0} = \frac{2}{0} = +\infty$

$$(3.) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{4x^2+3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x+1}{\sqrt{4x^2+3}} : x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 + \frac{1}{x}}{\sqrt{4 + \frac{3}{x^2}}} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{4x^2+3}} : x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{\sqrt{4 + \frac{3}{x^2}}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$(3.) a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x+1}{\sqrt[3]{-x^3-x^2-x-1}} : x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2 + \frac{1}{x}}{\sqrt[3]{-1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}}} = \frac{-2}{-1} = 2$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}} : x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}}} = \frac{2}{1} = 2$$

$$(4.) a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x+\sqrt{4x^2+3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x+1}{-x+\sqrt{4x^2+3}} : x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2 + \frac{1}{x}}{-1 + \sqrt{4 + \frac{3}{x^2}}} = \frac{-2}{-1+2} = -2$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x+\sqrt{4x^2+3}} : x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 + \sqrt{4 + \frac{3}{x^2}}} = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3}$$

$$(5.) a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^4+x^3+1}-x^2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^4+x^3+1}-x^2}{-x+1} \cdot \frac{\sqrt{x^4+x^3+1}+x^2}{\sqrt{x^4+x^3+1}+x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4+x^3+1-x^4}{(-x+1)(x^2+\sqrt{x^4+x^3+1})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3+1}{-x^3-\sqrt{x^6-x^5-x^2+x^2+\sqrt{x^4-x^3+1}}} : x^3 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x^3}}$$

$$= \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^4+x^3+1}-x^2}{x+1} = \frac{\sqrt{x^4+x^3+1}+x^2}{\sqrt{x^4+x^3+1}+x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4+x^3+1-x^4}{(x+1)(x^2+\sqrt{x^4+x^3+1})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+1}{x^3+\sqrt{x^6+x^5+x^2}+x^2+\sqrt{x^6+x^5+x^2}} : x^3 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x^3}}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$(6.) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x^3+3x^2+3x+3} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+3x^2+3x+3-x^3}{\sqrt[3]{x^3+3x^2+3x+3}^2 + 3\sqrt{x^3+3x^2+3x+3+x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+3x+3}{3\sqrt{x^3+3x^2+3x+3}^2 + 3\sqrt{x^3+3x^2+3x+3+x^2}} : x^2 =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} + \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{3}{x^3} + 1}} = \frac{3}{3} = 1$$

$$(7.) \lim_{x \rightarrow \infty} (4\sqrt{x^4+x^3+x^2+x+1} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (4\sqrt{x^4+x^3+x^2+x+1} - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4+x^3+x^2+x+1-x^4}{(4\sqrt{x^4+x^3+x^2+x+1}+x)(\sqrt{x^4+x^3+x^2+x+1+x^2})} : x^3 =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^3+x^2-x+1}{4\sqrt{x^4+x^3+x^2+x+1}^3 + 4\sqrt{x^4+x^3+x^2+x+1+x^2} + \sqrt{x^5+x^4-x^3+x^2+x^3}} =$$

Samo je jedan Mali Ivica!

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4}} + 1} = \frac{-1}{1+1+1+1} = -\frac{1}{4}$$

$$(8) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x+1}{x+2} = \frac{-2-0+1}{-2-0+2} = \frac{-1}{-0} = +\infty$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+1}{x+2} = \frac{-2+0+1}{-2+0+2} = \frac{-1}{+0} = -\infty$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x+1}{(x+2)^2} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x+1}{x^2+4x+4} = \frac{-2+1}{+0} = \frac{-1}{+0} = -\infty$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+1}{(x+2)^2} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+1}{x^2+4x+4} = \frac{-2+1}{+0} = \frac{-1}{+0} = -\infty$$

$$(9) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(1-0)^2-3(1-0)+2} = \frac{1}{1-0+0-3+0+2} = \frac{1}{+0} = +\infty$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(1+0)^2-3(1+0)+2} = \frac{1}{1+0+0-3-0+2} = \frac{1}{+0} = +\infty$$

$$(10) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-2x}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x+2} = \frac{2-0}{2-0+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2-2x}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{x+2} = \frac{2+0}{2+0+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$(11) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-3x+2}{x^2-2x+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-2}{x-1} = \frac{1-0-2}{1-0+1} = \frac{-1}{-0} = +\infty$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-3x+2}{x^2-2x+1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-2}{x-1} = \frac{1+0-2}{1+0-1} = \frac{-1}{+0} = -\infty$$

$$(12) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 2^+} x \cdot e^{\frac{x+1}{x+2}} = \lim_{x \rightarrow 2^+} x \cdot \lim_{x \rightarrow 2^+} e^{\frac{x+1}{x+2}} = 2 \cdot e^{\frac{-2+0+1}{-2+0+2}} = 2 \cdot e^{\frac{-1}{+0}} = 2 \cdot e^{-\infty} = 2 \cdot 0 = +\infty$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 2^+} x \cdot e^{\frac{x+1}{x+2}} = \lim_{x \rightarrow 2^+} x \cdot \lim_{x \rightarrow 2^+} e^{\frac{x+1}{x+2}} = 2 \cdot e^{\frac{-2+0+1}{-2+0+2}} = 2 \cdot e^{\frac{-1}{+0}} = 2 \cdot e^{-\infty} = 2 \cdot \frac{1}{e^\infty} = 0$$

$$(13) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 2^-} \operatorname{arctg} \left(\frac{x+1}{x-2} \right) = \operatorname{arctg} \frac{2-0+1}{2-0-2} = \operatorname{arctg} \frac{3}{-0} = \operatorname{arctg} (+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 2^+} \operatorname{arctg} \left(\frac{x+1}{x-2} \right) = \operatorname{arctg} \frac{2+0+1}{2+0-2} = \operatorname{arctg} \frac{3}{+0} = \operatorname{arctg} (+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

$$(14) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{cth}(x^2-x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{cth}(x(x-1)) = \operatorname{cth}((0-0)(0-0-1)) = \operatorname{cth}(-0 \cdot (+1)) = \operatorname{cth}(+0) = +\infty$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{cth}(x^2-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{cth}(x(x-1)) = \operatorname{cth}((0+0)(0+0-1)) = \operatorname{cth}(+0 \cdot (-1)) = \operatorname{cth}(+0) = -\infty$$

$$(15) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+3} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3-3}{x+3} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{x+3} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{x+3} \right)^{\frac{x(x+3)}{x+3}} = \\ = e^{-3 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+3}} = e^{-3 \cdot 1} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x+5} \right)^{2x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+5-4}{2x+5} \right)^{2x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{2x+5} \right)^{2x+3} = \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{2x+5} \right)^{\frac{(2x+3)(2x+5)}{2x+5}} = e^{-4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{2x+5}} = e^{-4 \cdot 1} = \frac{1}{e^4}$$

$$(16) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln(2x+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{\ln(2x+1)}{x} \cdot 2} = \frac{1}{2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x+1)}{2x}} = \frac{1}{2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x+1)}{2x}} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^{3x}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{e^{3x}-1}{x} \cdot 3} = \frac{1}{3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x}-1}{3x}} = \frac{1}{3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x}-1}{3x}} = \frac{1}{3}$$

$$(17) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(2x)}{\arcsin(3x)} : 2x : 3x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\arcsin 3x} \cdot \frac{1}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin \frac{x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot 4} = \frac{1}{2}$$

$$(18) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+2x}{x+1} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x+2)}{x+1} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x+1} \cdot \frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \right) = \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{x+1} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x\sqrt{x}}{x+2} \ln \left(\frac{x}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x\sqrt{x}}{x+2} \cdot \left(-\ln \frac{x+1}{x} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-x\sqrt{x} \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right) = \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-\sqrt{x}}{x+2} \cdot \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\sqrt{x}}{x+2} : x \cdot 1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \frac{2}{\sqrt{x}}} = \frac{0}{1} \cdot 1 = 0$$

(19) $a=?$ - da funkcija bude neprekinuta
 $f(x)=a+\operatorname{th} \left(\frac{x}{x+1} \right)$, ato $x>1$

$$f(x)=x^2+x \quad , \text{ato } x \leq 1$$

$$\rightarrow \text{vrijet: } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{I) } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} a+\operatorname{th} \left(\frac{x}{x+1} \right) = a \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \operatorname{th} \left(\frac{x}{x+1} \right) = a+\operatorname{th} \left(\frac{1}{0^+} \right) = a+\operatorname{th}(+\infty) = a \cdot 1 = a \\ \text{II) } f(1) = 1+1=2 \end{array} \right.$$

$$\text{I+II} \Rightarrow a=2$$

(20) $a, b=?$ - da funkcija bude neprekinuta

$$f(x) = \frac{3e^{\frac{2}{x}} + 2 \cdot e^{\frac{1}{x}} + a}{b \cdot e^{\frac{3}{x}} + e^{\frac{1}{x}} + 2} \quad \text{za } x=0 \text{ i } f(0) \neq 1$$

$$\rightarrow \text{vrijet: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3+2 \cdot e^{-\frac{1}{x}} + a \cdot e^{-\frac{2}{x}}}{5+e^{-\frac{1}{x}} + 2 \cdot e^{-\frac{2}{x}}} = \frac{3+2 \cdot 0 + a \cdot 0}{5+0+2 \cdot 0} = \frac{3}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{a}{2}$$


$$\frac{5}{b} = f(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad b = 5$$

$$\frac{a}{2} = f(0) + 1 \quad \Rightarrow \quad a = 2$$

9. DIFERENCIJALNI RAČUN I

9.1. TANGENTA NA KRIVULJU

= Problem tangente:



t - tangenta

s - sekanta

Δx - prirost argumenta

Δy - prirost funkcije ($\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$)

$\overline{T_0 T}$ - tetiva

↳ slike: $\tan \delta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \Rightarrow k_s, t_j$ koeficijent smjera sekante

$\tan \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \rightarrow k_t, t_j$ koeficijent smjera tangente

9.2. DEFINICIJA DERIVACIJE

= DEFINICIJA 1.

↳ Neka je zadana realna funkcija f na otvorenom intervalu $I \subseteq \mathbb{R}$ i neka je $x_0 \in I$.

Ako postoji broj $f'(x_0)$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \dots (*)$$

onda taj broj zovemo derivacijom funkcije f u točki x_0 , i označimo ga $f'(x_0)$.

↳ Za funkciju kažemo da je derivabilna ili diferencijabilna u točki x_0 , ako postoji limites daju formulom (*) u toj točki. Nadalje, funkcija je derivabilna ili diferencijabilna na intervalu I ako u svakoj točki tog intervala ima derivaciju.

↳ Oznake: $- f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y(x_0)}{\Delta x}$... derivacija

$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$... prirost funkcije f u točki x_0

Δx ... prirost argumenta u točki x_0 .

↳ Derivacija je granična vrijednost kvocijenta prirosta funkcije i prirosta argumenta, kada prirost argumenta teži k nuli, tj.:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

= Jednadžba tangente i normalne na graf funkcije $f(x)$ u točki $T_0(x_0, y_0)$ je:

$$\text{t... } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\text{n... } y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

= PRIMJER 1.

↳ Koristeći definiciju derivacije izračunati derivacije sljedećih funkcija:

a) $f(x) = c$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x} = 0$$

$$\hookrightarrow (c)' = 0$$

Samo je jedan Mali Ivica!

b) $f(x) = x$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x + \Delta x - x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\hookrightarrow (x)' = 1$$

c) $f(x) = \sqrt{x}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \cdot \frac{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x+\Delta x-x}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+0} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

d) $f(x) = \sin x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin \frac{x+\Delta x-x}{2} \cdot \cos \frac{x+\Delta x+x}{2}}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \right) = \\ &= 1 \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) = \cos \left(x + \frac{0}{2}\right) = \cos x \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow (\sin x)' = \cos x$$

e) $f(x) = |x|$, u točki $x_0 = 0$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \\ &= \begin{cases} \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

\hookrightarrow Dakle, obzirom da su lijevi i desni limes različiti, nema limesa, tj. nema derivaciju u točki x_0 . Geometrijski to znači da ne postoji tangenčna pravica u tački x_0 .

9.3. DERIVACIJA I NEPREKUNUTOST

= STAVAK 1.

\hookrightarrow Ako je funkcija f diferencijabilna u točki x , onda je f neprekinita u toj točki x . Obrat: stvaranje mijedi.

Dokaz:

Premda pretpostavci u točki x postoji limes $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$. Vrijedi:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x+\Delta x) - f(x)] \cdot \frac{\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 0 \cdot f'(x) = 0.$$

To jest:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x+\Delta x) - f(x)) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x+\Delta x) - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x+\Delta x) - f(x) \Rightarrow 0$$

- Iz toga slijedi:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (x+\Delta x) = f(x) \Rightarrow f je neprekinita u x. Q.E.D.$$

↳ Geometrijsko značenje:

- To znači da "glatka" funkcija (tj. funkcija ma čiji graf možemo povuci tangenta) je ujedno i neprekinuta, što možemo i očekivati.
- Obrat ne vrijedi, tj. postoji neprekinute funkcije koje nisu "glatke", npr. $f(x) = |x|$.

9.4. OSNOVNA PRAVILA DERIVIRANJA

= STAVAK 1.

↳ Ako su f i g funkcije diferencijabilne u točki x , onda vrijedi:

- $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$
- $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- $\left[\frac{1}{f(x)} \right]' = \frac{-f'(x)}{f^2(x)}, f(x) \neq 0$
- $\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}, g(x) \neq 0$

DOKAZ:

- Pomocu definicije derivacije:

$$\begin{aligned} a) [f(x) + g(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) + g(x + \Delta x)] - [f(x) + g(x)]}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

- Analogno i za minus.

$$\begin{aligned} b) [f(x) \cdot g(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x)] - [f(x) \cdot g(x)]}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x + \Delta x) + f(x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[g(x + \Delta x) \cdot \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + f(x) \cdot \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right] = \\ &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \end{aligned}$$

*.) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x + \Delta x) = g(x)$ jer je po pretpostavci $g(x)$ diferencijabilna, i ne-prekinuta u točki x

$$\begin{aligned} c) \left[\frac{1}{f(x)} \right]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{f(x + \Delta x)} - \frac{1}{f(x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(x + \Delta x)}{f(x) \cdot f(x + \Delta x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x + \Delta x)}{\Delta x f(x) \cdot f(x + \Delta x)} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \cdot \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x)} \cdot \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x)} = \\ &= -f'(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \cdot \frac{1}{f(x)} = \frac{-f'(x)}{f^2(x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' &= \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right)' = f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left(\frac{1}{g(x)} \right)' = \\ &= \frac{f'(x)}{g(x)} + f(x) \cdot \left(-\frac{g'(x)}{g^2(x)} \right) = \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \\ &= \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \end{aligned}$$

= PRIMJEDBA 1.

- ↳ Vrijedi:
- $(f(x) + C)' = f'(x) + 0 = f'(x)$
 - $C \cdot f(x) + C \cdot f'(x) = C \cdot f'(x)$

Aditivna konstanta pri kom deriviranja nestaje, a množstvena konstanta se kod deriviranja prepisuje.

• PRIMJER 1.

$$y = 2\sqrt{x} \sin x + 3\pi$$

$$\begin{aligned} y' &= 2(\sqrt{x} \sin x)' + (3\pi)' = 2 \cdot ((\sqrt{x})' \sin x + \sqrt{x} \cdot (\sin x)') + 0 = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x + \sqrt{x} \cos x = \\ &= \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} \cos x \end{aligned}$$

= PRIMJER 2.

$$y = 2x + \frac{3}{\sin x} + \frac{1}{e}$$

$$y' = 2 + 3 \cdot \frac{-\cos x}{\sin^2 x} + 0 = 2 - \frac{3 \cos x}{\sin^2 x}$$

9.5. DERIVACIJA SLOŽENE FUNKCIJE I INVERZNE FUNKCIJE

= STAVAK 1.

↳ Neka je složena funkcija gof definirana u točki x . Neka je funkcija f diferencijabilna u točki x , g diferencijabilna u točki $f(x)$. Tada funkcija gof ima derivaciju u x i vrijedi:

$$(gof)'(x) = g'[f(x)] \cdot f'(x).$$

To se naziva t. "lancano pravilo".

Dokaz:

- Označimo: $y = (gof)(x) = g[f(x)] = g(u) \dots \quad u = f(x)$

Iz izraza:

$$g'(u) = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta u} \Rightarrow \frac{\Delta g}{\Delta u} = g'(u) + w(\Delta u) / \Delta u \quad | - g'(u) je broj! \quad + \lim_{\Delta u \rightarrow 0} w(\Delta u) = 0$$

$$\Delta g = g'(u) \cdot \Delta u + w(\Delta u) \cdot \Delta u \quad | : \Delta x$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta x} = \frac{g'(u) \cdot \Delta u}{\Delta x} + \frac{w(\Delta u) \cdot \Delta u}{\Delta x} \quad | . \lim_{\Delta x \rightarrow 0}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} g'(u) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} w(\Delta u) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

Kako promjena Δu nestaje radi promjene $x-a$ zbog pretpostavke da postoji derivacija f od $f(x)=0$ (sljedi da je funkcija f neprekidna u x pa ako Δx teži k nuli onda i Δu teži k noli), pa vrijedi:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} w(\Delta u) = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} w(\Delta u) = 0$$

Zbog toga pišemo:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} = g'(u) \cdot f'(x) + 0 \cdot f'(x)$$

$$\frac{\Delta g(f(x))}{\Delta x} = \frac{\Delta(gof)(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Samo je jedan Mali kvicaj

Dakle:

$$(gof)'(x) = g'[f(x)] \cdot f'(x)$$

↳ Ovaj stavak pišemo i u obliku:

- $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$, gdje je $y=g(u)$
 $u=f(x)$

- $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}$, gdje je $y=f(u)$, te $y=(f \circ g \circ h)(x)$
 $u=g(v)$
 $v=h(x)$

= PRIMJER 1.

↳ Primjenjujući derivaciju kompozicije funkcija ili definiciju nadi sljedeće derivacije:

a) $y = \cos x$, $y' = ?$

I) $y = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow y = \sin u$
 $u = x + \frac{\pi}{2}$

II) $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos u (1+0) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$

↳ $(\cos x)' = -\sin x$

b) $y = e^x$, $y' = ?$

$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x(e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = e^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x \cdot 1 = e^x$

↳ $(e^x)' = e^x$ Zato je e^x jedinica za eksponentnu funkciju.

c) $y = e^{-x}$, $y' = ?$

I) $y = e^{-x} \Rightarrow y = e^u$
 $u = -x$

II) $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = e^u \cdot (-1) = -e^u = -e^{-x}$

↳ $(e^{-x})' = -e^{-x}$

d) $y = \sinh x$, $y' = ?$

$y' = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x})' = \frac{1}{2} (e^x - ((-e^{-x})) = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) = \cosh x$

↳ $(\sinh x)' = \cosh x$

e) $y = \cosh x$, $y' = ?$

$y' = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x})' = \frac{1}{2} (e^x + ((-e^{-x}))) = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) = \sinh x$

↳ $(\cosh x)' = \sinh x$

f) $y = \operatorname{tg} x$, $y' = ?$

$y' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\sin' x \cdot \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

↳ $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

g) $y = a^x$, $y' = ?$

I) $y = a^x = e^{\ln(a^x)} = e^{x \ln a} \Rightarrow y = e^u$
 $u = x \ln a$

II) $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = e^u \cdot \ln a \cdot 1 = e^{x \ln a} \cdot \ln a = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \cdot \ln a$
 $\hookrightarrow (a^x)' = a^x \cdot \ln a$

h) $y = x^d$, $d \in \mathbb{R}$, $y' = ?$

I) $y = x^d = e^{\ln(x^d)} = e^{d \ln(x)} \Rightarrow y = e^u$
 $u = d \cdot \ln x$

II) $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = e^u \cdot d \cdot \frac{1}{x} = e^{d \cdot \ln x} \cdot d \cdot \frac{1}{x} = \frac{x^d \cdot d}{x}$
 $\hookrightarrow (x^d)' = d \cdot x^{d-1}$

= PRIMER 2.

↳ Derivacija:

a) $(x^4)' = 4x^3$

b) $(\frac{1}{x^3})' = (x^{-3})' = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$

c) $(\sqrt{x})' = x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

d) $\frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} = x^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}} = -\frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}$

= PRIMER 3.

↳ Derivacija: $f(x) = \operatorname{tg} \ln(x^2+1) = \frac{1}{\cos^2 \ln(x^2+1)} \cdot \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x$

Dokaz: $y = \operatorname{tg} u$

$$\left. \begin{array}{l} u = \ln v \\ v = x^2 + 1 \end{array} \right\} y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot \frac{1}{v} \cdot 2x = \frac{1}{\cos^2 \ln(x^2+1)} \cdot \frac{2x}{x^2+1}$$

= STAVAK 2.

↳ Derivacija inverzne funkcije:

- Neka je f diferencijabilna u točki $x \in I$, te $f'(x) \neq 0$. Onda je i inverzna funkcija f^{-1} (ako je definirana) diferencijabilna u točki $y = f(x)$ i vrijedi:

$$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(x)}$$

Dokaz:

- $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$

\Downarrow
 $f^{-1}(y) = x$, $y = f(x)$

- Koristenjem derivacije dobivamo:

$$\frac{df^{-1}(y)}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dx}{dx} = 1$$

a uz označku $x = f^{-1}(y)$ slijedi:

$$\frac{df^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)}$$

- Što češće zapisujemo:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} \text{ ili } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

Q.E.D

=PRIMER 4.

↳ Naći derivaciju inverzne funkcije od slijedećih funkcija:

a) $y = \ln x$

$$\downarrow \\ x = e^y \\ \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, x > 0$$

b) $y = \log_a x$

$$\downarrow \\ x = a^y / \ln a$$

$$\ln x = y \cdot \ln a$$

$$y = \frac{\ln x}{\ln a} \\ \frac{dy}{dx} = \left(\frac{\ln x}{\ln a} \right)' = \frac{1}{\ln a} \cdot (\ln x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}, x > 0$$

c) $y = \arcsin x$

$$\downarrow$$

$$x = \sin y \quad | \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\pm \sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

*) rješenje sa negativnim predznakom odbacujemo jer je kosinus pozitivan
u 1 i 4 kvadrantu.

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, |x| < 1$$

d) $y = \operatorname{arsh} x$

$$\downarrow$$

$$x = \operatorname{sh} y$$

1. način: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\operatorname{ch} y} = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

*) negativno rješenje odbacujemo jer je $\operatorname{ch} y \geq 1$

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

2. način: $\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

$$(\operatorname{arsh} x)' = (\ln(x + \sqrt{1+x^2}))' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x \right) = \\ = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

e) $y = \operatorname{arth} x$

$$\downarrow$$

$$x = \operatorname{th} y$$

1. način: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 y} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y} = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2}$

$$(\operatorname{arth}x)' = \frac{1}{1-x^2}, |x| < 1$$

$$2. \text{nacin: } \operatorname{arth}x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

$$(\operatorname{arth}x)' = \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \right)' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1-x}{1+x} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1-x}{1+x} \cdot \frac{(1-x)-(1+x) \cdot (-1)}{(1+x)^2}$$

$$(\operatorname{arth}x)' = \frac{1}{1-x^2}, |x| < 1$$

□ DERIVACIJA LOGARITAMSKE I EKSPONENCIJALNE FUNKCIJE

= 1. nacin: - Primjenjuje se prvensteno kada otkači $y = f(x)^{g(x)}$.

- Osnovna ideja je da se računa derivacija od broj, a ne od y , pa navedi:

$$y = f(x)^{g(x)} / \ln$$

$$\ln y = g(x) \cdot \ln f(x) /'$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = g'(x) \cdot \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \cdot (f(x))' / -y$$

$$y' = f(x)^{g(x)} \cdot \left[g'(x) \cdot \ln f(x) + \frac{g(x) \cdot f'(x)}{f(x)} \right]$$

= 2. nacin: - Ova mogućnost je bolja.

- Osnovna ideja je da se kod zapisa funkcije koji dobivamo konisti identitet: $A = e^{g(x)}$ pa slijedi: $g(x) = e^{g(x) \cdot \ln f(x)} /'$

$$f(x)^{g(x)} := e^{g(x) \cdot \ln f(x)} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)} /'$$

$$y' = e^{g(x) \cdot \ln f(x)} \cdot (g(x) \cdot \ln f(x))' =$$

$$= e^{g(x) \ln f(x)} \cdot (g'(x) \ln f(x) + g(x) \cdot \ln' f(x))$$

□ PRIMJER 5

b) Deriviraj funkcije:

$$a) 1) y = (\ln x)^{\sin x} / \ln$$

$$\ln y = \sin x \ln \ln x /'$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} / : y$$

$$y' = y \cdot \left[\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right]$$

$$y' = x^{\sin x} \cdot \left[\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right]$$

$$2) y = x^{\sin x} \Rightarrow y = e^{(\ln x)^{\sin x}} = e^{\sin x \ln x}$$

$$y' = (e^{\sin x \ln x})' = e^{\sin x \ln x} \cdot (\sin x \ln x) = e^{\sin x \ln x} \cdot (\cos x \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}) =$$

$$= x^{\sin x} \cdot \left[\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right]$$

$$b) y = (1+x)^x + \sin x$$

$$y' = (e^{x \ln(1+x)} + \sin x)' = e^{x \ln(1+x)} \cdot (x \ln(1+x))'' + \cos x =$$

$$= e^{x(\ln(1+x))} \cdot \left[\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \right] + \cos x = \\ = (1+x)^x \left(\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \right) + \cos x$$

□ DERIVACIJE VIŠEG REDA

= DEFINICIJA 1.

↳ Derivacija funkcije je operacije ovet funkcija, i to da taka može biti ponovno diferencijabilna, što označavamo $(f'(x))' = f''(x)$, i nazivamo drugom derivacijom funkcije f .

↳ Operacija n -te derivacije od funkcije f , $n \geq 2$, derivacija $(n-1)$ -te derivacije, u koliko ta postoji i diferencijabilna je, tj. $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$, $n \geq 2$.

= PRIMJER 6.

↳ Odredi n -tu derivaciju sljedećih funkcija:

a) $(a^x)^{(n)} = ?$

$$y = a^x \rightarrow y' = a^x \cdot \ln a$$

$$y'' = a^x \cdot \ln a \cdot \ln a = a^x \cdot \ln^2 a$$

$$y''' = a^x \cdot \ln^2 a \cdot \ln a = a^x \cdot \ln^3 a$$

$$y^{(n)} = a^x (\ln a)^n$$

Dokaz: - matematičkom indukcijom:

I) baza: $n_0 = 1$

$$y' = a^x \cdot \ln a \quad \checkmark$$

II) pretpostavka:

Pretpostavimo da za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $y^{(n)} = a^x (\ln a)^n$

III) stok: Treba dokazati da vrijedi i za $n+1$:

$$y^{(n+1)} = (y^{(n)})' = (a^x (\ln a)^n)' =$$

$$= a^x \cdot \ln a \cdot ((\ln a))^n =$$

$$= a^x \cdot (\ln a)^{n+1}$$

Q.E.D.

b) $(\sin x)^{(n)} = ?$

$$y = \sin x$$

$$\rightarrow y' = \cos x$$

$$y'' = -\sin x$$

$$y''' = -\cos x$$

$$y^{(4)} = \sin x$$

$$y^{(n)} = \begin{cases} \cos x, & \text{za } n = 2k+1 \\ -\sin x, & \text{za } n = 2k+2 \\ -\cos x, & \text{za } n = 2k+3 \\ \sin x, & \text{za } n = 2k+4 \end{cases}$$

9.6. TABLICA DERIVACIJA ELEMENTARNIH FUNKCIJA

funkcija: $f(x) =$	derivacija: $f'(x) =$	napomena:
a	0	$(a \cdot x)' = ax$ $(ax)' = 1$
x^a	ax^{a-1}	$\frac{1}{x^n} = x^{-n}$ $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$
e^x	e^x	%
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	%
a^x	$a^x \cdot \ln a$	$(\ln a = \text{konst.})$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$(\ln a = \text{konst.})$

funkcija: $f(x) =$	derivacija: $f'(x) =$	napomena:
$\sin x$	$\cos x$	%
$\cos x$	$-\sin x$	%
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	%
ctgx	$-\frac{1}{\sin^2 x}$	%
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f'(x) = -(\arccos x)'$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f'(x) = -(\arcsin x)'$

funkcija: $f(x) =$	derivacija: $f'(x) =$	napomena:
$\arctg x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$f'(x) = -(\arctg x)'$
$\operatorname{arcctg} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$	$f'(x) = -(\operatorname{arcctg} x)'$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	%
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	%
$\operatorname{th} x$	$\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	%
$\operatorname{ctgh} x$	$-\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$	%

funkcija: $f(x) =$	derivacija: $f'(x) =$	napomena:
$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	%
$\operatorname{arch} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	%
$\operatorname{arth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$	$f'(x) = (\operatorname{arth}(x))'$
$\operatorname{arctgh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$	$f'(x) = (\operatorname{arctgh} x)'$
$ x $	$\frac{x}{ x }$	$\frac{x}{ x } = \frac{ x }{x}$

ZADACI (Dz. 9. PREDV. PRO)

① $y = \operatorname{tg}^3 \frac{\pi x}{3}$, $y' = ?$

$$y' = \operatorname{tg}^2 \frac{\pi x}{3} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{3}} \cdot \frac{\pi}{3} = \pi \cdot \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{\pi x}{3}}{\cos^2 \frac{\pi x}{3}} //$$

② $f(x) = 2^x \operatorname{sh} x + 2^x \operatorname{ch} x + \sqrt[3]{\operatorname{sh} x}$, $f''(0) = ?$

$$f'(x) = 2^x \ln 2 \operatorname{sh} x + 2^x \operatorname{ch} x + 2^x \operatorname{sh} x + \frac{1}{3} \operatorname{sh} x^{-\frac{2}{3}} \cdot \operatorname{ch} x$$

$$f''(x) = \ln 2 (2^x \ln 2 \operatorname{sh} x + 2^x \operatorname{ch} x) + 2^x \ln 2 \operatorname{ch} x + 2^x \operatorname{sh} x + 2^x \operatorname{ch} x - \frac{2}{9} \operatorname{sh} x^{-\frac{5}{3}} \cdot \operatorname{ch} x^2 + \frac{1}{3} \operatorname{sh} x^{-\frac{2}{3}} \operatorname{sh} x$$

$$= 2^x \operatorname{sh} x (\ln 2 + 1) + 2^x \operatorname{ch} x \cdot 2 \ln 2 + 2^x \operatorname{ch} x - \frac{2 \operatorname{ch}^2 x}{9 \sqrt[3]{\operatorname{sh} x^5}} + \frac{\sqrt[3]{\operatorname{sh} x}}{3}$$

$$f''(0) = \cancel{2^0 \operatorname{sh} 0 (\ln 2 + 1)} + \cancel{2^0 \operatorname{ch} 0 \cdot 2 \ln 2} + \cancel{2^0 \operatorname{ch} 0} - \frac{\cancel{2 \operatorname{ch}^2 0}}{9 \sqrt[3]{\operatorname{sh} 0^5}} + \frac{\sqrt[3]{\operatorname{sh} 0}}{3} = \\ = 2 \ln 2 + 2 - \frac{2}{0} + \frac{0}{3} = -\infty //$$

③ $y = x \cdot e^{-x}$, dokazi da je $x \cdot y' = (1-x)y$

$$y' = e^{-x} - x \cdot e^{-x}$$

$$x \cdot y' = (1-x) \cdot y$$

$$x e^{-x} (1-x) = (1-x) \cdot x \cdot e^{-x} \quad \text{Q.E.D.} //$$

④ $f(x) = x^2 \cdot 2^x + (x+1)^x$, $f'(x) = ?$

$$f'(x) = 2x \cdot 2^x + x^2 \cdot 2^x \cdot (\ln 2 + e^{x \ln 2}) \cdot \left(\ln(x+1) + \frac{x}{x+1} \right) =$$

$$= 2^x (2 + x \ln 2) + (x+1)^x \left(\ln(x+1) + \frac{x}{x+1} \right) //$$

Samo jedan Mali Ivica!

166-

5) $f(x) = \ln^3(\sin 5x)$, $f'(x) = ?$

$$f'(x) = 3 \ln^2(\sin 5x) \cdot \frac{1}{\sin 5x} \cdot \cos 5x \cdot 5 = 15 \ln^2(\sin 5x) \cdot \operatorname{ctg} 5x //$$

6) $y = x \cdot |x|$, $y' = ?$

$$y' = |x| + x \cdot \frac{|x|}{x} = |x| + |x| = 2|x| //$$

7) dokazati da za $x \neq 0 \Rightarrow (\ln|x|)' = \frac{1}{x}$

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{|x|}{x} = \frac{1}{x} //$$

8) $f^{(n)}(x) = ?$ $f(x) = \sin x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x \\ f'''(x) &= -\cos x \\ f^{(IV)}(x) &= \sin x \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \cos x & za n=2k+1 \\ -\sin x & za n=2k+2 \\ -\cos x & za n=2k+3 \\ \sin x & za n=2k+4 \end{cases} //$$

9) $f^{(n)}(x) = ?$ $f(x) = \cos x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x \\ f'''(x) &= \sin x \\ f^{(IV)}(x) &= \cos x \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} -\sin x & za n=2k+1 \\ -\cos x & za n=2k+2 \\ \sin x & za n=2k+3 \\ \cos x & za n=2k+4 \end{cases} //$$

10) $f^{(n)}(x) = ?$ $f(x) = a^x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= a^x \cdot \ln a \\ f''(x) &= a^x \cdot (\ln^2 a) \\ f'''(x) &= a^x \cdot \ln^3 a \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = a^x \cdot \ln^n a$$

Dokaz indukcijom:

1) baza: $n=1 \dots f'(x) = a^x \cdot \ln a$ ✓

2) pretpostavka: $\forall n \in \mathbb{N}$ vrijedi: $f^{(n)}(x) = a^x \cdot (\ln a)^n$

3) skok: dokazati:

$$\begin{aligned} (f^{(n)}(x))' &= f^{(n+1)}(x) = a^x \cdot (\ln a)^{n+1} \\ (a^x \cdot (\ln a)^n)' &= a^x \cdot \ln a \cdot (\ln a)^n = \\ &= a^x \cdot (\ln a)^{n+1} \quad Q.E.D. // \end{aligned}$$

11) $y = x \dots t$
 $y = \lambda e^x$, $\lambda = ?$
 $T(x_0, y_0) = ?$

II) $k_T = 1$
 $k_T = y'(x_0) = \lambda e^{x_0}$

$$1 = \lambda e^{x_0}$$

$$\lambda = \frac{1}{e^{x_0}}$$

$$\lambda = \frac{1}{e^{x_0}} = \frac{1}{e^t} = \frac{1}{e^{\ln a}}$$

I) $T(x_0, y_0) \dots$

$$\begin{aligned} x_0 &= \lambda e^{x_0} \\ \lambda &= \frac{x_0}{e^{x_0}} \end{aligned}$$

II i II) $\frac{x_0}{e^{x_0}} = \frac{1}{e^{x_0}}$

$$x_0 = 1$$

$$\lambda = \frac{1}{e^{x_0}} = \frac{1}{e^t} = \frac{1}{e^{\ln a}}$$

12) $y = x \dots n$
 $y = \lambda x(1-x)$, $\lambda = ?$ $x \neq 0$

II) $k_N = 1$

$$k_N = -\frac{1}{k_T} \Rightarrow k_T = -1$$

$$k_T = y'(x_0) = \lambda [1-x_0] + \lambda x_0(-1) = \lambda(1+x_0-x_0) =$$

$$= \lambda(1-2x_0)$$

$$\lambda = \frac{1}{2x_0 - 1}$$

I) $T(x_0, y_0) \dots$

$$\begin{aligned} x_0 &= ? \cdot x_0(1-x_0) \\ \lambda &= \frac{1}{1-x_0} \end{aligned}$$

$$\text{I} \cap \text{II}) \quad \frac{1}{1-x_0} = \frac{1}{2x_0 - 1}$$

$$1 - x_0 = 2x_0 - 1$$

$$-3x_0 = -2$$

$$x_0 = \frac{2}{3} //$$

$$x = \frac{1}{1-x_0} = \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3 //$$

(13.) $y = x \dots n$
 $y = \lambda e^x, \lambda = ?, \lambda < 0$

$$\text{I}) T(x_0, y_0) \dots$$

$$x_0 = \lambda e^{x_0}$$

$$\lambda = \frac{x_0}{e^{x_0}}$$

$$\text{II}) k_N = 1$$

$$k_N = -\frac{1}{k_T} \Rightarrow k_T = -1$$

$$k_T = y'(x_0) = \lambda e^{x_0}$$

$$-1 = \lambda e^{x_0}$$

$$\lambda = -\frac{1}{e^{x_0}}$$

$$\text{I} \cap \text{II}) \quad \frac{x_0}{e^{x_0}} = -\frac{1}{e^{x_0}} \quad \lambda = -\frac{1}{e^{-1}} = -e //$$

$$x_0 = -1 //$$

(14.) $y = x \dots t$
 $y = x^2 + c, c = ?$

$$\text{II}) \quad \begin{cases} k_T = 4 \\ k_T = y'(x_0) = 2x_0 \\ 2x_0 = 1 \end{cases}$$

$$\text{I}) T(x_0, y_0)$$

$$x_0 = x_0 + c$$

$$c = x_0 - x_0^2$$

$$x_0 = \frac{1}{2}$$

$$\text{I} \cap \text{II}) \quad c = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} //$$

(15.) a) $A = ?$
 b) $\omega = ?$

$$y = A \cdot \sin(\omega x) \rightarrow t \dots T(0, 0)$$

$$k_T = 1$$

$$\rightarrow T = 4\pi$$

$$\text{b) } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2} //$$

$$\text{a) } t \dots y - y_0 = k_T(x - x_0)$$

$$y = x$$

$$y'(0) = 1$$

$$A \cdot \cos(\omega x) \cdot \omega = 1$$

$$A \cdot \cos\left(\frac{1}{2} \cdot 0\right) \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$A \cdot 1 \cdot 1 = 2$$

$$A = 2 //$$

(16)

$$t \dots = ?$$

$$y = \sqrt[3]{x-1}, T(1,0)$$

$$y' = \left((x-1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (x-1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{(x-1)^2}}$$

$$k_T = y'(1) = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{1-1^2}} = \frac{1}{3 \cdot 0} = \frac{1}{0} \neq \infty \Rightarrow \text{mora biti okončka na } x \text{ osi}$$

$$t \dots T(1,0) \Rightarrow x = \cancel{1}$$

(17)

$$t_1, t_2 = ? \quad T(-2, -3), \text{ na } y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$$

$$\rightarrow y' = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \Rightarrow k_T = y'(x_0) = \frac{1}{2}x_0 + \frac{1}{2}$$

$$t_1, t_2 \dots y+3 = \left(\frac{1}{2}x_0 + \frac{1}{2} \right)(x+2)$$

$$\rightarrow T_1(x_0, y_0), T_2(x_0, y_0) = ?$$

$$(1) T_{1,2} \rightarrow \text{leži na tangentu: } y_0 + 3 = \frac{1}{2}(x_0 + 1)(x_0 + 2) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$(2) T_{1,2} \rightarrow \text{leži na paraboli: } y_0 = \frac{1}{4}x_0^2 + \frac{1}{2}x_0 - \frac{3}{4} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$3 = \frac{1}{2}x_0^2 + \frac{3}{2}x_0 + 1 - \frac{1}{4}x_0^2 - \frac{1}{2}x_0 + \frac{3}{4} \quad | \cdot 4$$

$$12 = 2x_0^2 + 6x_0 + 4 - x_0^2 - 2x_0 + 3$$

$$-x_0^2 + 4x_0 + 5 = 0$$

$$x_0^2 - 4x_0 - 5 = 0$$

$$x_{0,1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16+20}}{2} = \frac{-4 \pm 6}{2}$$

$$x_{0,1} = 1$$

$$y_{0,1} = 0$$

$$x_{0,2} = -5$$

$$y_{0,2} = 3$$

$$t_1, \dots y+3 = \left(\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \right)(x+2)$$

$$\begin{aligned} y+3 &= x+2 \\ y &= x-1 // \end{aligned}$$

$$t_2, \dots y+3 = \left(\frac{1}{2} \cdot (-5) + \frac{1}{2} \right)(x+2)$$

$$y+3 = -2(x+2)$$

$$y+3 = -2x-4$$

$$y = -2x-7 //$$

(18)

$$a = ? \quad f_1(x) = \ln x \quad \text{dirati } f_2(x) = ax^2$$

↳ dirati će graf funkcije ukoliko obe grafe imaju zajedničku tangentu:

$$y'_1 = \frac{1}{x}$$

$$y'_1(x_0) = y'_2(x_0)$$

$$y'_2 = 2ax$$

$$\frac{1}{x_0} = 2ax_0$$

$$\frac{1-2ax_0^2}{x_0} = 0$$

$$1-2ax_0^2 = 0$$

$$2ax_0^2 = 1$$

$$a = \frac{1}{2x_0^2} //$$

(19) $f'(0)=?$ $f(x)=\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}}} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\right) \cdot (-2x) = \\ &= \frac{x}{2\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$

$$f'(0)=\frac{0}{2\sqrt{1-\sqrt{1-0}} \sqrt{1-0}}=\frac{0}{2 \cdot 0 \cdot 1}=\frac{0}{0} \rightarrow \text{ne postoji } f'(0)$$

(20) $f'(0)=?$ $f(x)=x \cdot \sin \frac{1}{x}, x \neq 0, f(0)=0$

$$f'(x)=\sin \frac{1}{x} + x \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot (-x^{-2})=\sin \frac{1}{x}-\frac{\cos \frac{1}{x}}{x}$$

$$f'(0)=\sin \frac{1}{0}-\frac{\cos \frac{1}{0}}{0} \rightarrow \text{ne postoji}$$

$g'(0)=?$ $g(x)=x^2 \sin \frac{1}{x}, x \neq 0, g(0)=0$

$$g'(x)=2x \sin \frac{1}{x}+x^2 \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot (-x^{-2})=2x \sin \frac{1}{x}-\cos \frac{1}{x}$$

$$g'(0)=2 \cdot 0 \cdot \sin \frac{1}{0}-\cos \frac{1}{0} \rightarrow \text{ne postoji}$$

10. DIFERENCIJALNI RAČUN II

10.1. DERIVACIJA IMPLICITNO I PARAMETARSKI ZADANE FUNKCIJE

□ DERIVACIJA IMPLICITNO ZADANE FUNKCIJE


= Ako je skup točaka $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ zadat jednačinom $F(x,y)=0$, tj. $\{(x,y) | F(x,y)=0\} \subseteq \mathbb{R}^2$, onda taj graf ne mora biti graf funkcije.

- PRIMER 1.

↪ Ako je $F(x,y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$, onda je to jednačina krugove s rjeseњima:

$$\begin{aligned} y_1 &= \sqrt{R^2 - x^2} \\ y_2 &= -\sqrt{R^2 - x^2} \end{aligned}$$

↪ Grafički:



↪ Pitanje je: Može li se naći eksplicitni izraz za y' bez da se razvija eksplicitno izražiti y_1 i y_2 .

Odgovor je: -Može, i to tako da shvatimo y kao funkciju od x i zapisujemo:

$$F(x,y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0 \quad | \frac{d}{dx}$$

$$2x + 2y \cdot y' = 0$$

$$y' = -\frac{x}{y} = -\frac{x}{y(x)}$$

$$1) \text{ za } y_1 = f_1(x) = \sqrt{R^2 - x^2} \text{ slijedi } y'_1(x) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

$$2) \text{ za } y_2 = f_2(x) = -\sqrt{R^2 - x^2} \text{ slijedi } y'_2(x) = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$


- Ako pak u izrazu $F(x,y)=0$ shvatimo $x=x(y)$ dobit ćemo na analogan način derivaciju invertne funkcije:

$$F(x,y) = x^2(y) + y^2 - R^2 = 0 \quad | \frac{dx}{dy}$$

$$2x \cdot x' + 2y = 0$$

$$x' = -\frac{y}{x}$$

↪ Grafički:



= PRIMJER 2.

↳ Naci jednadžbu tangente u točki $T(3,4)$ kružnice zadane jednadžbom $x^2+y^2=25$.

$$x^2+y^2=25 \quad | \frac{dy}{dx}$$

$$k_T = y'(3,4) = -\frac{3}{4}$$

$$2x+2y \cdot y' = 0$$

$T(3,4)$

$$y' = -\frac{x}{y}$$

$$y - y_1 = k_T(x - x_1)$$

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$$

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$$

= PRIMJER 3.

↳ Naci $y''(x)$ ako je $\ln y + x^4 - 3y - 5 = 0$.

$$1) \ln y + x^4 - 3y - 5 = 0 \quad | \frac{dy}{dx}$$

$$2) y'' = 4 \cdot \frac{(x^3 y)'(3y-1) - (x^3 y)(3y-1)'}{(3y-1)^2} =$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' + 4x^3 - 3y' = 0$$

$$= 4 \cdot \frac{(3x^2 y + x^3 y')(3y-1) - x^3 y \cdot 3y'}{(3y-1)^2} =$$

$$\frac{y'}{y} - 3y' + 4x^3 = 0$$

$$= 4 \cdot \frac{(3x^2 y + x^3 \cdot \frac{4x^3 y}{3y-1})(3y-1) - (x^3 y \cdot 3 \cdot \frac{4x^3 y}{3y-1})}{(3y-1)^2}$$

$$y' \left(\frac{1}{y} - 3 \right) = -4x^3$$

$$y' = 4 \cdot \frac{x^3 \cdot y}{3y-1}$$

□ DERIVACIJA PARAMETARSKI ZADANE FUNKCIJE

= Neka je $\mathcal{C} = \{ x = \varphi(t), y = \psi(t) \}, t \in [\alpha, \beta]$.

Pretpostavimo da su funkcije $\varphi(t)$ i $\psi(t)$ diferencijabilne na $[\alpha, \beta]$, što označavamo s: $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ i $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$. Pretpostavimo da funkcija $x = \varphi(t)$ ima inverznu

funkciju $t = \varphi^{-1}(x)$, tj. $y = \psi[\varphi^{-1}(x)]$. Ako taj izraz shvatimo kao kompltnu funkciju, tada imamo:

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}},$$

iz čega slijedi:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

= PRIMJER 4.

↳ Naci jednadžbu normalke u točki u kojoj je parametar $t = \frac{\pi}{4}$, ako je funkcija zadana parametarski $\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$.

1.) Naci točku za $t = \frac{\pi}{4}$:

$$x(T) = R \cos \frac{\pi}{4} = \frac{R}{\sqrt{2}}, \quad y(T) = R \sin \frac{\pi}{4} = \frac{R}{\sqrt{2}} \Rightarrow T\left(\frac{R}{\sqrt{2}}, \frac{R}{\sqrt{2}}\right)$$

2)

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{R \cos t}{-R \sin t} = -\cot t$$

$$k_T = y'(T) = y'\left(t = \frac{\pi}{4}\right) = -\cot \frac{\pi}{4} = -1$$

$$k_N = -\frac{1}{k_T} = 1$$

$$\text{n... } y - y_1 = k_N(x - x_1)$$

$$y - \frac{R}{\sqrt{2}} = 1 \cdot (x - \frac{R}{\sqrt{2}})$$

$$y = x$$

= Više derivacije parametarski zadane funkcije:

↪ Ako je poznata $(n-1)$ derivacija $y^{(n-1)}(x)$, onda je:

$$\begin{aligned} y^{(n)}(x) &= \frac{dy^{(n-1)}(x)}{dx} \cdot \frac{dt}{dt} = \frac{dt}{dx} \cdot \frac{dy^{(n-1)}(x)}{dt} = \\ &= \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \cdot \frac{dy^{(n-1)}(x)}{dt} = \frac{1}{\dot{x}} \cdot \frac{d}{dt}(y^{(n-1)}) = y^{(n)}(x) \end{aligned}$$

↪ Posebice:

$$y''(x) = \frac{1}{\dot{x}} \cdot (y') = \frac{1}{\dot{x}} \cdot \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{1}{\dot{x}} \cdot \frac{\ddot{y} \cdot \dot{x} - \dot{y} \cdot \ddot{x}}{(\dot{x})^2} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{(\dot{x})^3}$$

= PRIMJER 5.


↪ Naci $y'''(x)$ ako je $\begin{cases} x = t - \ln t, & t > 0 \\ y = t + \ln t \end{cases}$

$$y'(x) = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{1 + \frac{1}{t}}{1 - \frac{1}{t}} = \frac{t+1}{t-1}$$

$$y''(x) = \frac{1}{\dot{x}} \cdot (y'(x)) = \frac{1}{1 - \frac{1}{t}} \cdot \frac{1(t-1) - (t+1) \cdot 1}{(t-1)^2} = \frac{t}{t-1} \cdot \frac{-2}{(t-1)^2} = \frac{-2t}{(t-1)^3}$$

$$y'''(x) = \frac{1}{\dot{x}} \cdot (y''(x)) = \frac{1}{1 - \frac{1}{t}} \cdot (-2) \cdot \frac{(t-1)^2 - t \cdot 3(t-1)^2}{(t-1)^4} = \frac{4t^2 + 2t}{(t-1)^4}$$

10.2. DIFERENCIJAL FUNKCIJE



$$\text{tg } d = \frac{dy}{dx}$$

= Neka je $y = f(x)$ funkcija koja je diferenčljivna u točki $x = x_0$. Onda je:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}. \text{ Odavde slijedi:}$$

$$\Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + w(\Delta x) \cdot \Delta x, \text{ pri čemu}$$

je drugi član zanemariv u odnosu na prvi sljeduci jer je $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} w(\Delta x) = 0$.

Sada Δy zovemo primst funkcije, a tim izrazom je definiran diferencijal funkcije u točki $x = x_0$.

Samo je jedan Mali Ivica!

= DEFINICIJA 1.

↪ Neka je $y = f(x)$ diferencijabilna u točki x . Prvi diferencijal od f u x je izraz:

$$df = f'(x) \cdot dx$$

gdje smo umjesto Δx pisali dx , jer za $\Delta x \ll$ (jako mali) možemo identificirati $\Delta x \approx dx$.

↪ Geometrijska interpretacija:

- Prvi diferencijal jednok je promjena na tangentu povučenoj u točki x , ako se nezavisno varijabla promjeni za dx .

= Izračunavaju približne vrijednosti funkcije, aproksimirajući prasta funkcije njenu diferencijalom vrši se formulom:

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \cdot \Delta x, \text{ za } \Delta x \ll,$$

jer za $\Delta x \ll$ vrijedi: $\Delta f \approx df$, te $\Delta f \approx f'(x) \cdot \Delta x$.

= PRIMJER 1.

↪ Izračunati približnu vrijednost $\sqrt{38}$.

$$f(x) = \sqrt{x} \quad (\text{funkcija koju tražimo})$$

$x = 36$ ($\text{i najблиža vrijednost iz koje znamo izvoditi korigen}$)

$\Delta x = 2$ ($\text{razlika zadane i najbliže vrijednosti}$)

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \cdot \Delta x$$

$$f(38) \approx f(36) + f'(36) \cdot 2 \approx 6 + \frac{1}{12} \cdot 2 \approx \frac{37}{6} \approx 6,16$$

= PRIMJER 2.

↪ Izračunati približnu vrijednost $\operatorname{ctg} 44^\circ$.

$$f(x) = \operatorname{ctgx}$$

$$x = 45^\circ$$

$$\Delta x = -10$$

$$f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \cdot \Delta x$$

$$f(44^\circ) \approx f(45^\circ) + f'(45^\circ) \cdot (-10) \approx$$


$$\approx \operatorname{ctg} 45^\circ + \frac{1}{\sin^2 45^\circ} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx 1 + \frac{\pi}{90^\circ} \approx 1.0345$$

10.3. OSNOVNI TEOREMI DIFERENCIJALNOG RAČUNA

= DEFINICIJA 1.

↪ Kažemo da funkcija f ima u točki lokalni minimum (maksimum) ako postoji okoliš $U = U(x_0)$ točke x_0 takav da je $f(x_0)$ minimum funkcije, oznakom $\min f$, nad tim okolišem (maksimum funkcije, oznakom $\max f$).


↪ Lokalni minimum i maksimum zvukno se zovu lokalni ekstremini.



= STAVAK 1. Fermatov teorem

↪ Ako funkcija f diferencijabilna na otvorenom intervalu I ima u točki $x_0 \in I$ lokalni ekstrem, onda vrijedi da je: $f'(x_0) = 0$.

↳ DOKAZ:



1) Neka f ima lokalni maksimum u točki x_0 . Vrijedi:

$$(\exists U(x_0)) (\forall x) (f(x) \leq f(x_0)), \text{ tj.:}$$

$$f(x) - f(x_0) \leq 0.$$

Prema pretpostavci je funkcija diferencijabilna u x_0 , tj. postoji limes:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

a) Ako je $x > x_0$ tj. $x - x_0 > 0$, onda:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\ominus}{\oplus} = \ominus \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

b) Ako je $x < x_0$, tj. $x - x_0 < 0$, onda:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\oplus}{\ominus} = \oplus \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

Obzirom da mora biti:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

to je moguće jedino u slučaju kad je $f'(x_0) = 0$.

2) Za funkciju koja ima lokalni minimum, dokaz je analogan.


Q.E.D.

↳ Geometrijska interpretacija:

- I svakoj točki lokalnog ekstrema tangenta na graf diferencijabilne funkcije je horizontalna.

PRIMJEDBA 1.

↳ Ako f nije bila diferencijabilna na I moguće je da se ekstrem postiže u tzv. kritičnoj točki u kojoj nije $f'(x_0) = 0$, već derivacija u x_0 ne postoji. Takve, kritične točke, zovu se još i stacionarne točke, a dobivaju se tako da se $f'(x_0)$ izjeđači s nulom.




↳ Dakle, Fermatov teorem kaže da ako je funkcija f diferencijabilna na I , ima ekstreme, onda su ti ekstremi stacionarne točke.

STAVAK 2. Rollevov teorem.

↳ Neka je funkcija f neprekidna na intervalu $\bar{I} = [a, b]$ i diferencijabilna na otvorenom intervalu $I = (a, b)$, te neka je $f(a) = f(b)$. Onda postoji točka ξ (ksi) $\in I$ takva da je $f'(\xi) = 0$.

↳ DOKAZ:



1) - Za $f(\bar{I}) = \{f(a)\} \Rightarrow f(x) = \text{konst. } c \Rightarrow f'(x) = 0$ na I , pa stavak vrijedi.

2) - Za netrivijalne sustave vrijedi:



↳ Prema Weierstrassovom teoremu za neprekidne funkcije nad zatvorenim intervalom, funkcija poprima min f , max f , od kojih je barem jedan ekstrem razlikit od $f(a) = f(b)$, te ga funkcija poprima u točki $\xi \in I$. Prema stavku 1. $\Rightarrow f'(\xi) = 0$

Q.E.D.

↳ Geometrijska interpretacija:

- Stavak 2. kaže da za svaku horizontalnu sekantu $\overline{T_1 T_2}$, grafa diferencijabilne funkcije, postoji među točka T grafa, u kojoj je tangenta usporedna s tom sekantom. (skica 1.)

- To vrijedi i općenitije, za sekantu $\overline{T_1 T_2}$ koja nije horizontalna. (skica 2.)



= STAVAK 3. Lagrangeov teorem o srednjoj vrijednosti.

↳ Neka je funkcija f neprekinuta na $I = [a, b]$ i diferencijabilna na $I = (a, b)$. Onda postoji točka $\xi \in I$ takva da je:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

↳ DOKAŽI:

- Definirajmo pomoćnu funkciju $F(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$. Za $F(x)$

ispunjeni su uvjeti Rolleovog teorema. Posebice je: $F(a) = F(b) = f(a)$. Stoga postoji $\xi \in I$ takav da je $F'(\xi) = 0$, tj.:

$$F(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$


Q.E.D.

↳ Geometrijska interpretacija:

- Vidi skicu 2.

= PRIMJER 1.

↳ Pronadi ξ za funkciju $y=x^2$ nad $I = [-1, 2]$ primjenom stavka srednje vrijednosti.



$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{2^2 - (-1)^2}{2 - (-1)} = \frac{4 - 1}{2 + 1} = 1$$


$$f'(\xi) = 2\xi = 1$$

$$\xi = \frac{1}{2}$$

$$T\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$$

= PRIMJER 2.

↳ Pronadi ξ za funkciju $y=|x|$ nad $I = [-1, 2]$ primjenom stavka srednje vrijednosti.



- Obzirom da nije ispunjeni uvjeti stavka 3 (tj. f nije diferencijabilna) stavak nije moguće primijeniti.

= Stavak sreduje vrijednosti imaju sljedeći važan korolar:

KOROLAR 1. Obrat formule $c=0$

↳ Ako je funkcija f neprekinuta na $\bar{I} = [a, b]$ i diferencijabilna na $I = (a, b)$, te ako je $f'(x) = 0$ na I , onda je funkcija konstanta na I .

↳ DOKAZ:

- Za to je god $x_1, x_2 \in \bar{I}$, $x_1 \neq x_2$, vrijede uvjeti stava sreduje vrijednosti, te postoji $\xi \in (x_1, x_2)$ takav da je:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 0 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$$

Budući da to vrijedi za bilo koje $x_1, x_2 \in \bar{I}$, očividno je f konstanta na \bar{I} . Q.E.D.

= Općenitije vrijedi:

KOROLAR 2.

↳ Neka je funkcija f diferencijabilna na $I = (a, b)$:

a) Ako je $f'(x) > 0$ na I onda je f monotonu (stogo) rastuća na I .

b) Ako je $f'(x) < 0$ na I onda je f monotonu (stogo) padajuća na I .

↳ DOKAZ:

-(a) Uzmimo bilo koje $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$. Prema stavku sreduje vrijednosti postoji neki $\xi \in (x_1, x_2)$ takav da je:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi) (x_2 - x_1) = (+) \cdot (+) = (+) > 0$$

Dakle $f(x_1) < f(x_2)$, tj. funkcija je monotonu rastuća.

(b) Analogan dokaz.

Q.E.D.

= STAVAK 4. Cauchyjev teorem srednje vrijednosti.

↳ Neka su f, g funkcije neprekinute na $\bar{I} = [a, b]$ i diferencijibilne na $I = (a, b)$, te neka je $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in I$. Onda je $g(b) \neq g(a)$, i postoji $\xi \in I$ takav da je:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

= PRIMJEDBA 2.

↳ Za $g(x) = x$ dobiva se iz Cauchyjevega teorema, Lagrangeov teorem sreduje vrijednosti, tj.:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

10.4. TAYLOROVA FORMULA

= Ako izvodimo obradu neke funkcije čija je jednadžba komplikirana, dolazi na ideju o aproksimaciji promatrane funkcije, na način da je u okolišu neke točke aproksimirano funkcijom s kojom lako racunamo. Taylorova formula daje prikaz zadane funkcije kao zbroj nekog polinoma i ostatka.

= DEFINICIJA 1.

↳ Neka je funkcija f definisana na $I = (a, b)$ koja je u točki $x_0 \in I$ n-puta diferencijabilna. Polinom n -tog stupnja je

$$\begin{aligned} T_n(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \\ &= \sum_{r=0}^n \frac{f^{(r)}(x_0)}{r!} (x-x_0)^r \end{aligned}$$

zove se Taylorov polinom n -tog stupnja od f u točki x_0 .

↳ Ako je $x_0 = 0$ Taylorov polinom nazivamo MacLaurinovim polinomom:

$$T_n(x) = \sum_{r=0}^n \frac{f^{(r)}(0)}{r!} (x^r)$$

= PRIMJER 1.

↳ Naći MacLaurinove funkcije, funkcije $f(x) = e^x$, za različite $n \leq 4$. Skicirati funkciju i grafove polinoma T_1, T_2, T_3, T_4 .

$$f(x) = e^x$$

$$f^n(x) = 0, \forall n$$

$$f^n(0) = 1, \forall n$$

$$T_0(x) = f(0) = e^0 = 1$$


$$T_1(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x = 1 + \frac{1}{1!} x = 1+x$$

$$T_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2$$

$$T_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

$$T_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$$

Graf:



- Vidi se: porast stupnja polinoma postiže da se graf polinoma sve jače približava grafu funkcije e^x u okolini točke $x_0 = 0$.

= STAVAK 1.

↳ Neka je funkcija f definirana na I , i neka je na I $(n+1)$ -puta diferencijabilna, te neka je $x_0 \in I$. Onda se f može na I prikazati s pomoću Taylorske formule:

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x),$$

dakle:

$$\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_n(x),$$

Pri čemu je $R_n(x)$ tзв. n -ti ostatak, kojeg zapisujemo u Lagrangeovom obliku tako:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x-x_0)^{n+1},$$

gde je ξ neka točka iz intervala (x_0, x) , tj. $\xi = x_0 + \vartheta(x-x_0)$, $\vartheta \in (0, 1)$.

= PRIMJER 2.

↳ Primjeniti MacLaurinovu formulu, te prezenatom ostatak od $R_4(x)$ približno izračunati \sqrt{e} i $e^{\frac{1}{2}}$.

- Očito konstuiši funkciju $f(x) = e^x$, pa vrijedi:

$$e^x = \sum_{k=0}^4 \frac{x^k}{k!} + R_4(x), \quad R_4(x) = \frac{x^5}{5!} \cdot e^\xi, \quad \xi \in (0, x)$$

$$\sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}}$$

$$R_4\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\xi^5}{5!} \left(\frac{1}{2}\right)^5, \quad \xi \in (0, \frac{1}{2})$$

$$e^\xi \in (1, \sqrt{e}) \subseteq (1, 2)$$

$$R_4\left(\frac{1}{2}\right) \leq \frac{2}{5!} \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$\approx 0,0005$$

Ostatak:

$$\sqrt{e} = 1 + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{4!} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \approx 1,6484 //$$

 $-e^2$

$$R_4(2) = \frac{e^{\frac{5}{2}}}{5!} \cdot 2^5$$

 $\xi \in [0, 2]$

$$R_4(2) \leq \frac{e^{\frac{5}{2}}}{5!} \cdot 2^5 \approx 2.4$$

$$e^{\xi} \in [1, e^2]$$

Ostatak:

$$e^2 = 1 + \frac{1}{2!} \cdot 2^2 + \frac{1}{3!} \cdot 2^3 + \frac{1}{4!} \cdot 2^4 = 5 //$$

10.5. L'HOSPITALOV PRAVILO

= L'Hospitalovo pravilo služi za računanje limesa kvocijenta dvoju funkcija, tj. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, kada on ima neodređeni oblik $\frac{0}{0}$ ili $\frac{\infty}{\infty}$.

= STAVAK 1. L'Hospitalovo pravilo $\frac{0}{0}$

↪ Neka su funkcije f i g differencijabilne na $(a, x_0) \cup (x_0, b) = S$, te neta je $g'(x) \neq 0$ na S . Ako vrijedi:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0,$$

i ako postoji:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \overline{\mathbb{R}},$$

onda je:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

= STAVAK 2. L'Hospitalovo pravilo $\frac{\infty}{\infty}$

↪ Neka su funkcije f i g differencijabilne na $(a, x_0) \cup (x_0, b) = S$, te neta je $g'(x) \neq 0$ na S . Ako vrijedi:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty,$$

i postoji:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \overline{\mathbb{R}},$$

onda je:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

= PRIMJER 1.

↪ Izračunajte sljedeće limese:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arth} x}{\sin(2x)} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1-x^2}}{2\cos 2x} = \frac{1-0}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \left(\frac{0}{0} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\operatorname{ctgx}} = \left(\frac{-\infty}{+\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin^2 x} = -1 \cdot 0 = 0$$

d)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{\operatorname{ch} x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{ch} x}{\sin x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{\operatorname{ch} x} \dots$$

↳ očito je da ova funkcija nije moguće rastaviti (rijesiti) na ovaj način
pa treba paziti kada L'Hospitalovo pravilo primjeni, a kada ne
↳ u ovom slučaju:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{\operatorname{ch} x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th} x = 1$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \cos \frac{1}{x} = 1 \cdot 0 = 0$$

= Drugi neodređeni oblici ($0 \cdot \infty$; $\infty - \infty$; $0^\circ \cdot 1^\circ$, ∞^0) rrođimo već na spomenute oblike po sljedećim pravilima:

(1) oblici tipa $0 \cdot \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = (\infty \cdot 0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

dli

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

(2) oblici tipa $\infty - \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \left(1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right) = \begin{cases} \infty - 0 & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1 \\ \pm \infty & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} \neq 1 \end{cases}$$

(3) oblici tipa: $\infty^0, 0^0, 1^\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = (\infty^0 \text{ ili } 0^0 \text{ ili } 1^\infty) = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{\frac{g(x) \ln f(x)}{f(x)}} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln f(x)}$$

STRMJEĆER 2.

↳ izračunajte sljedeće limite:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = (0^+ \cdot (-\infty)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{-\infty}{+\infty} \right) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} (x \operatorname{arth} x - x) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{arth} x - 1}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1-x^2}}{-\frac{1}{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2}{1-x^2} = 1$$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\operatorname{ch}x - \operatorname{sh}x) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{ch}x (1 - \operatorname{th}x) = (\infty \cdot 0) =$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \operatorname{th}x}{\operatorname{ch}x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}}{-\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}^2 x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\operatorname{sh}x} = 0$$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin x = (0^0) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \ln x} = e^0 = 1$

$\hookrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \ln x = (0 \cdot (-\infty)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = 0$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = (\infty \cdot 0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{0}{0}\right) =$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot (-1 \cdot x^{-2})}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \frac{x}{x+1}}{-\frac{1}{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{-1}}{\cancel{x(x+1)}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1} : x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1$$

ZADACI

$$\textcircled{1} \quad y' = ? \quad x^3 + y^3 = 3axy \quad |'$$

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = 3a(y + x \cdot y')$$

$$3x^2 + 3y^2 y' = 3ay + 3ax y'$$

$$y'(3y^2 - 3ax) = 3ay - 3x^2$$

$$y' = \frac{3y - x^2}{y^2 - ax}$$

$$\textcircled{2} \quad y' = ? \quad x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \quad |'$$

$$\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}} \cdot y' = 0$$

$$y' = \frac{-\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}}{\frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}} = \frac{-\frac{1}{3\sqrt{x}}}{\frac{1}{3\sqrt{y}}} = -\sqrt[3]{\frac{y}{x}}$$

$$\textcircled{3} \quad t... = ? \quad y' = 4x^3 + 6xy$$

$A(1,2)$

$$y = f(x) \quad |'$$

$$4y^3 \cdot y' = 16x^3 + 6y + 6x \cdot y'$$

$$y'(4y^3 - 6x) = 16x^3 + 6y$$

$$y' = \frac{8x^3 + 3y}{2y^3 - 3x}$$

$$t... \quad y - y_1 = k_T(x - x_1)$$

$$y - 2 = -11(x - 1)$$

$$y = -11x + 11 + 2$$

$$y = -11x + 13$$

$$k_T = y'(1,2) = \frac{8+3}{2-3} = \frac{11}{-1} = -11$$

$$\textcircled{4} \quad y = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 20, \text{ točke?}, + 11 \text{ os } x$$

$$y' = 12x^3 + 12x^2 - 24x$$

$$y' = 0 \Rightarrow 12x^3 + 12x^2 - 24x = 0$$

$$x(x^2 + x - 2) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+3}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2}$$

$$x_2 = 1 \quad x_3 = -2$$

$$x_1 = 0 \quad \dots \quad y_1 = 20 \quad \Rightarrow T_1(0, 20)$$

$$x_2 = 1 \quad \dots \quad y_2 = 3 + 4 - 12 + 20 = 15 \quad \Rightarrow T_2(1, 15)$$

$$x_3 = -2 \quad y_3 = 3 \cdot (-2)^4 + 4 \cdot (-2)^3 - 12 \cdot (-2)^2 + 20 = -12 \quad \Rightarrow T_3(-2, -12)$$

5. $x = \frac{1+t}{t^3}, y = \frac{3}{2t^2} + \frac{1}{2t}, t=? \quad A(2,2)$

$$y'(x) = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\left(\frac{3}{2t^2} + \frac{1}{2t}\right)'}{\left(\frac{1+t}{t^3}\right)'} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{-2t}{t^4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{t^2}}{\frac{t^3 - 3t^2(1+t)}{t^6}} = \frac{-\frac{3}{t^3} - \frac{1}{2t^2}}{\frac{-2t-3}{t^4}} = \frac{(6+t)t}{2(2t+3)}$$

$$t=? \dots 2 = \frac{1+t}{t^3} / t^3$$

$$2t^3 - t - 1 = 0$$

$$\begin{array}{r} t_1 = 1 \\ \hline 2t^3 - t - 1 \\ -2t^3 + 2t^2 \\ \hline 2t^2 - t - 1 \\ -2t^2 + 2t \\ \hline t - 1 \\ -t + 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$k_T = y'(1) = \frac{(6+1)1}{2(2 \cdot 1 + 3)} = \frac{7}{10}, \quad A(2,2)$$

$$t \dots y - y_0 = k_T(x - x_0)$$

$$y - 2 = \frac{7}{10}(x - 2)$$

$$y = \frac{7}{10}x + \frac{3}{5} //$$

6. $y''=? \quad T\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right), \quad x=3\cos t, \quad 0 \leq t < 2\pi$
 $y=3\sin t$

$$t=? \dots x = 3\cos t$$

$$3\sqrt{2} = 3\cos t$$

$$\cos t = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}, \in [0, 2\pi]$$

$$y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{3\cos t}{-3\sin t} = -\cot t$$

$$y'' = \frac{\dot{y}'}{\dot{x}} = \frac{1}{\sin^2 t} \cdot \frac{1}{-3\sin t} = \frac{-1}{3\sin^3 t}$$

$$y''\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-1}{3\sin^3 \frac{\pi}{4}} = \frac{-1}{3 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3} = -\frac{8}{3 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{-4}{3\sqrt{2}} = \frac{-2\sqrt{2}}{3} //$$

7. $t=? \quad x = a\cos^3 t, \quad t = \frac{\pi}{4}$
 $y = a\sin^3 t$

$$y'(x) = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{a \cdot 3\sin^2 t \cos t}{-a \cdot 3\cos^2 t \sin t} = -\tan t$$

$$k_T = y'(x) = y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -1$$

$$t \dots y - y_0 = k_T(x - x_0)$$

$$y - \frac{a\sqrt{2}}{4} = -1(x - \frac{a\sqrt{2}}{4})$$

$$y = -x + \frac{a\sqrt{2}}{2} //$$

$$y = x = a\cos^3 \frac{\pi}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad T\left(\frac{a\sqrt{2}}{4}, \frac{a\sqrt{2}}{4}\right)$$

8) $y', y'', y''' = ?$ $x = t^2 + 1$
 $y = 3t + e^t$

$$y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{3+e^t}{2t}$$

$$y'' = \frac{1}{x} \cdot (\dot{y}') = \frac{1}{2t} \cdot \frac{e^t \cdot 2t + (3+e^t) \cdot 2}{4t^2} = \frac{te^t + e^t + 3}{4t^3}$$

$$y''' = \frac{1}{2t} \cdot \frac{(e^t + te^t + e^t)4t^3 + 12t^2(te^t + e^t + 3)}{16t^6} =$$

$$= \frac{[(te^t + 2e^t)t + 3(te^t + e^t + 3)] \cdot 4t^2}{32t^5} = \frac{te^t(t+2) + 3(te^t + e^t + 3)}{8t^5} //$$

9) $c = ?$ Lagrangeov teorem: $f(x) = \sin x$, $I = [0, \frac{\pi}{2}]$.

$$\begin{array}{l} a=0 \\ b=\frac{\pi}{2} \end{array}$$

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

$$f'(x) = \cos x$$

$$f'(c) = \cos c$$

$$\cos c = \frac{2}{\pi} \Rightarrow c = \arccos \frac{2}{\pi} //$$

10) $c = ?$ Lagrangeov teorem: $f(x) = \arcsin x$, $I = [-1, 1]$

$$\begin{array}{l} a=-1 \\ b=1 \end{array}$$

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{\arcsin 1 - \arcsin(-1)}{1+1} = \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(c) = \frac{1}{\sqrt{1-c^2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-c^2}} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow 2 = \pi \sqrt{1-c^2} / 2$$

$$4 = \pi^2(1-c^2)$$

$$4 = \pi^2 - \pi^2 c^2$$

$$\pi^2 c^2 = \pi^2 - 4$$

$$c^2 = \frac{\pi^2 - 4}{\pi^2} \Rightarrow c = \frac{\sqrt{\pi^2 - 4}}{\pi} //$$

11) $f(x) = \operatorname{ch} x$, Taylor-oko 0.

$$c=0$$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} \cdot (x-c)^k$$

$$1) f(0) = \operatorname{ch} 0 = 1$$

$$2) f'(0) = \operatorname{sh} x = \operatorname{sh} 0 = 0$$

$$3) f''(0) = \operatorname{ch} x = \operatorname{ch} 0 = 1$$

$$T_n = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} //$$

(12) $f(x) = \sin x$, Taylor - oto 0.

 $c=0$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k$$

1) $f(0) = \sin 0 = 0$

2) $f'(0) = \cos x = \cos 0 = 1$

3) $f''(0) = -\sin x = -\sin 0 = 0$

$$T_n(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}$$

(13) $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1$, Taylor, polynom u $(x-1)$

 $c=1$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k$$

1) $f(1) = 1+2-1+1 = 3$

2) $f'(1) = 3x^2 + 4x - 1 = 3+4-1 = 6$

3) $f''(1) = 6x + 4 = 6+4 = 10$

4) $f'''(1) = 6$

$$T_n(x) = 3 + 6(x-1) + 5(x-1)^2 + (x-1)^3$$

$$\begin{aligned} (14) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(3x)}{3x} \right]^{\frac{1}{x}} &= \left(0^{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln \frac{\sin(3x)}{3x} \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \frac{\sin(3x)}{3x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \frac{\sin(3x)}{3x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^A = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\infty} = 0 // \\ A &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin(3x)}{3x}}{x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} \cdot \frac{9x^2}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(3x) - \sin(3x) \cdot 3}{x \sin(3x)} \\ &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - 3x \sin(3x) - 3 \cos(3x)}{\sin(3x) + 3x \cos(3x)} = \frac{1-3}{0} = -\infty \end{aligned}$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2x\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-2)\sqrt{x} = 0,$$

$$(16) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x} = \begin{cases} \text{SUPST:} \\ \frac{\pi}{2}-x=y \Rightarrow y \rightarrow 0 \\ x=\frac{\pi}{2}-y \end{cases} = \lim_{y \rightarrow 0} (\cos(\frac{\pi}{2}-y))^y = \lim_{y \rightarrow 0} (\sin y)^y = \lim_{y \rightarrow 0} e^{\ln(\sin y)^y} =$$

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} y \cdot \ln(\sin y) &= \lim_{y \rightarrow 0} e^{\ln(\sin y)} = e^{\ln(\sin y)} = e^{+\infty} = +\infty // \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} y \cdot \ln(\sin y) = \lim_{y \rightarrow 0} e^{\ln(\sin y)} = e^{+\infty} = +\infty // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin y)}{y} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin y} \cdot \cos y}{-\frac{1}{y^2}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 \cos y}{\sin y} = \left(\frac{0}{0} \right) = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2y \cos y - y^2 \cdot \sin y}{\cos y} = \frac{0}{1} = +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (17) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} \right)^{\frac{1}{x}} &= \left(\left(\frac{0}{0} \right)^{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \frac{\operatorname{tg} x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^A + \\ &= e^0 = 1 // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\operatorname{tg} x}{x}}{x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} \cdot x - \operatorname{tg} x}{x^2} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cos x}{\cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cos x}{x \sin x \cos x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin(2x)}{x \cdot \frac{1}{2} \sin(2x)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(2x - \sin(2x))}{2x \cdot \sin(2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2\cos(2x)}{\sin(2x) + 2x\cos(2x)} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sin(2x)}{2\cos(x) + 2\cos(2x) - 4x\sin(2x)} = \\
 &= \frac{0}{2+2} = 0
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{18.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(\operatorname{ch}(x+3))}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\operatorname{ch}(3-x))}{-x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\operatorname{ch}(3-x)} \cdot (-1)}{-1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{th}(3-x) = \operatorname{th}(-\infty) = -1 //$$

$$\textcircled{19.} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sin x} \cdot x \cos x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{2x^2 \sin x} = \left(\frac{0}{0} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{2(2x \sin x + 2x^2 \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{4(x \sin x + x^2 \cos x)} = \left(\frac{0}{0} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - x \cos x}{4(\sin x + x \cos x + 2x \cos x - x^2 \sin x)} = \left(\frac{0}{0} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x - \cos x + x \sin x}{4(\cos x + \cos x - x \sin x + 2 \cos x - 2x \sin x - 2x \sin x - x^2 \cos x)} = //$$


$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos x + x \sin x}{4(4 \cos x + 5x \sin x - x^2 \cos x)} = \frac{-2}{4(4-0)} = \frac{-2}{16} = -\frac{1}{8} //$$

$$\textcircled{20.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x e^{-\frac{1}{x^2}} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x - x e^{-\frac{1}{x^2}}) = \lim_{x \rightarrow \infty} [x(1 - e^{-\frac{1}{x^2}})] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-\frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x}} =$$

$$= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-e^{-\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{2}{x^3} \right)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}} \cdot 2}{x} = \frac{1/e^0 \cdot 2}{\infty} = \frac{2}{\infty} = 0 //$$

79. PRIMJENE DIFERENCIJALNOG RAČUNA

11. 1. TANGENTA I NORMALA NA GRAF FUNKCIJE



→ Tangenta na graf funkcije f u točki (x_0, y_0) ima jednadžbu:

$$\text{t} \dots y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

→ Normala na graf funkcije f u točki (x_0, y_0) ima jednadžbu:


$$\text{n} \dots y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

= PRIMJER 1.

↳ Nadi jednadžbu tangente i normale na graf funkcije $y = \ln x$ u točki $x_0 = 1$.
Nacrtaj skicu.

$$y' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$\begin{aligned} k_T &= y'(1) = \ln 1 + 1 = 1 & \text{t} \dots y - 0 = 1(x - 1) \\ T(1, 0) & & y = x - 1 \\ & & n \dots y - 0 = -1(x - 1) \\ & & y = 1 - x \end{aligned}$$



= PRIMJER 2.

↳ Nadi jednadžbu tangente i normale na graf funkcije $x^4 + y^4 - y \ln x - 2 = 0$ u točki grafa $T(1, 1)$.

$$\begin{aligned} x^4 + y^4 - y \ln x - 2 &= 0 \quad | \frac{\partial}{\partial x} \\ 4x^3 + 4y^3 \cdot y' - y' \ln x - y \frac{1}{x} &= 0 \quad | T(1, 1) \\ y' (4y^3 - \ln x) &= \frac{y}{x} - 4x^3 \\ y' &= \frac{\frac{y}{x} - 4x^3}{4y^3 - \ln x} \end{aligned}$$

$$k_T = y'(1, 1) = \frac{1-4}{4-0} = -\frac{3}{4} \quad | \text{t} \dots y - 1 = -\frac{3}{4}(x - 1)$$

$$n \dots y - 1 = \frac{4}{3}(x - 1)$$

= PRIMJER 3.

↳ Nadi jednadžbu tangente i normale na graf funkcije zadane parametarski formulom: $\begin{cases} x = t + t^2 \\ y = t - t^2 \end{cases}$ u točki koja odgovara parametru $t = 0$.

$$\begin{aligned} T(x_0, y_0) \dots & x_0 = 0 + 0^2 = 0 \\ & y_0 = 0 - 0^2 = 0 \quad | T(1, -1) \end{aligned}$$


Samo je jedan Malo Ivica!

$$y'(x) = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{1-e^t}{1+e^t}$$

$$\left. \begin{array}{l} k_T = y'(T) = \frac{1-1}{1+1} = 0 \\ T(1, -1) \end{array} \right\} \begin{array}{l} t \dots y+1=0(x-1) \\ y=-1 \\ n \dots y+1=-\frac{0}{0}(x-1) \\ \downarrow \\ x=1 \end{array}$$

= PRIMER 4.

↪ Nadi jednadžbu tangente na funkciju $y^2 = 2px$ u točki $T(x_0, y_0)$.



$$y^2 = 2px / \frac{d}{dx}$$

$$2yy' = 2p \\ y' = \frac{2p}{2y} = \frac{p}{y}$$

$$k_T = y'(x_0, y_0) = \frac{p}{y_0}$$

$T(x_0, y_0)$

$$t \dots y - y_0 = \frac{p}{y_0}(x - x_0)$$

$$y - y_0 = \frac{px}{y_0} - \frac{px_0}{y_0}$$

$$y - y_0 = \frac{px}{y_0} - \frac{y_0^2}{2y_0}$$

$$y - y_0 = \frac{px}{y_0} + \frac{y_0}{2} \Rightarrow y = \frac{p}{y_0}x + \frac{y_0}{2} + y_0$$

$$yy_0 = px + \frac{y_0^2}{2}$$

$$yy_0 = px + \frac{2px_0}{2}$$


$$yy_0 = p(x + x_0)$$

↪ kada $p \in T(x_0, y_0)$ na funkciji
slijedi:

$$2px_0 = y_0^2 \\ x_0 = \frac{y_0^2}{2p}$$

= PRIMER 5.

↪ Nadi jednadžbu tangenata, paričenih iz točke $T(-1, 0)$ na graf parabole $y^2 = 2x$.



$$y^2 = 2x / \frac{d}{dx}$$

$$2yy' = 2$$

$$y' = \frac{1}{y}$$

$$y'(M) = \frac{1}{y_0}$$

$$T(x_0, y_0)$$

$$t \dots y - y_0 = \frac{1}{y_0}(x - x_0)$$

- Označimo točku $M(x_0, y_0)$ na paraboli u kojoj tangira parabolu.

-188

-2a točku $T(-1, 0)$:

$$I) 0 - y_0 = \frac{1}{y_0} (-1 - x_0) / \cdot y_0$$

$$y_0^2 = 1 + x_0$$

$$II) y_0^2 = 2x_0$$

$$- I) i II) \rightarrow 1 + x_0 = 2x_0$$

$$1 - x_0 = 0$$

$$-x_0 = -1$$

$$x_0 = 1$$

$$y_0^2 = 2$$

$$y_0 = \pm \sqrt{2}$$

$$M_1 (1, \sqrt{2})$$

$$M_2 (1, -\sqrt{2})$$

$$- M_1 (1, \sqrt{2})$$


$$\hookrightarrow t_1 \dots y - \sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (x - 1) //$$

$$- M_2 (1, -\sqrt{2})$$

$$\hookrightarrow t_2 \dots y + \sqrt{2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} (x - 1) //$$

□ KUT IZMEĐU KRIVULJA

= kut između krivulja je kut između njihovih tangenata u sjecištu.




$$\varphi = d_2 - d_1$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi &= \operatorname{tg}(d_2 - d_1) = \frac{\operatorname{tg} d_2 - \operatorname{tg} d_1}{1 + \operatorname{tg} d_2 \cdot \operatorname{tg} d_1} = \\ &= \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1} = \frac{f_2'(S) - f_1'(S)}{1 + f_1'(S) \cdot f_2'(S)} \end{aligned}$$

= PRIMJER 6.

\hookrightarrow Naći kut među krivuljama $y = \ln x$ i $y = 2 \ln x - 1$ i priloži sliku.



$$y_1' = \frac{1}{x} \quad y_1'(e, 1) = \frac{1}{e}$$

$$y_2' = 2 \frac{1}{x} \quad y_2'(e, 1) = \frac{2}{e}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\frac{2}{e} - \frac{1}{e}}{1 + \frac{2}{e} \cdot \frac{1}{e}} = \frac{\frac{1}{e}}{\frac{e^2 + 2}{e^2}} = \frac{e^2}{e(e^2 + 2)} = \frac{e}{e^2 + 2} \Rightarrow \varphi = \arctg \frac{e}{e^2 + 2} //$$


11.2. PAD I RAST FUNKCIJE. EKSTREMI

= STAVAK 1.

↳ Funkcija f raste na intervalu (a, b) onda i samo onda ako je $f'(x) \geq 0$ u svakoj točki x tog intervala.

↳ Funkcija f pada na intervalu (a, b) onda i samo onda ako je $f'(x) \leq 0$ u svakoj točki x tog intervala.

= Krajnje točke intervala monotonosti su ili rubovi domene, ili su stacionarne točke, u kojima je $f'(x)=0$, primjerice:




- $[a, x_1]$ - interval rasta
- $[x_1, x_2]$ - interval pada
- $[x_2, b]$ - interval rasta

= Nalaženje stacionarnih točaka i intervala monotonosti:

1. izračunamo derivaciju $f'(x)$
2. rješimo jednadžbu $f'(x)=0$ i odredimo stacionarne točke funkcije f
3. stacionarnim točkama podijelimo područje definicije na intervale monotonosti
4. preko svakog predznaka prve derivacije određujemo jesu li oni intervali rasta ili pada zadane funkcije, tj. :

	lijeko od x_0	desno od x_0	karakter točke
derivacija $f'(x) > 0$	$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$	maximum
derivacija $f'(x) < 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$	minimum
derivacija $f'(x) = 0$	$f'(x) > 0$	$f'(x) > 0$	horizontalna infleksija
derivacija $f'(x) = 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) < 0$	horizontalna infleksija

ili slikovito:



=PRIMJER 1.

Naći intervale monotonosti i ekstreme funkcije $y = \ln x$, pomoći skicu.

$$1.) f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

2.) graf:

$$f'(x) = 0$$

$$\ln x = -1$$

$$\ln x = -1$$

$$\ln x = \ln e^{-1}$$

$$x = \frac{1}{e}, \quad D_f \in (0, \infty)$$


0	$\frac{1}{e}$	∞
$f'(x)$	- 0 +	
$f(x)$	$\searrow -\frac{1}{e}$	\nearrow

min

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = (0 \cdot (-\infty)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} +$$

$$= \left(\frac{-\infty}{+\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} (x \cdot \ln x) = \infty \cdot \infty = +\infty,$$



=PRIMJER 2.

Naći intervale monotonosti i ekstreme funkcije $y = \frac{x}{x^2+1}$, pomoći skicu.

$$1.) f'(x) = \frac{x^2+1-x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$-x^2+1=0$$

$$-x^2=-1$$

$$x^2=1$$

$$x=\pm 1$$

$-\infty$	-1	1	∞
$f'(x)$	- 0 + 0 -		
$f(x)$	$\searrow -\frac{1}{2}$	$\nearrow \frac{1}{2}$	$\searrow \frac{1}{2}$


min max

2.) graf:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \frac{-\infty}{+\infty} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2x} = -\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x} = +\infty$$

$$y(-x) = \frac{-x}{x^2+1} = -y(x) \Rightarrow \text{Neparna}$$



=PRIMJER 3.

Od kartona kvadratnog oblika sa stranicom duljine a treba naprimiti otvorenu kutiju što je moguće većeg volumena. Koliki je taj volumen?



$$\left\} \frac{a-x}{2}\right.$$

$$V = V(x) = x^2 \cdot \frac{a-x}{2}$$

$$V(x) = \frac{a}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \rightarrow \text{funkcija čiji maksimum treći red je } x \in [0, a]$$

$$V'(x) = \frac{a}{2} \cdot 2x - \frac{3}{2} x^2 = ax - \frac{3}{2} x^2 = x(a - \frac{3}{2}x)$$

$$V(x) = 0$$

$$x(a - \frac{3}{2}x) = 0 \quad | \quad a - \frac{3}{2}x = 0 / :2$$

$$x_1 = 0$$

↓

trivijalni
minimum


$$2a - 3x = 0$$

$$x_2 = \frac{2a}{3}$$

↓

maksimum $\in [0, a]$

graficki:



$$V_{MAX} = V\left(\frac{2a}{3}\right) = \left(\frac{2a}{3}\right)^2 \cdot \frac{a - \frac{3}{2}\left(\frac{2a}{3}\right)}{2} = \frac{2}{27}a^3 //$$

$$\rightarrow \text{Prozjera: } x_2 = x_{\max}$$


$$P'(x) \text{ za } x \in (0, \frac{2}{3}a) \Rightarrow \text{sgn}\left(\frac{a}{3}(a - \frac{3}{2}\cdot\frac{a}{3})\right) = + \rightarrow P(x) \uparrow$$

$$P'(x) \text{ za } x \in (\frac{2}{3}a, a) \Rightarrow \text{sgn}\left(\frac{5}{6}a(a - \frac{3}{2}\cdot\frac{5}{6}a)\right) = - \rightarrow P(x) \downarrow$$

$\Rightarrow x_2 \rightarrow \text{MAX}$

= PRIMJER 4.

↳ Ochedimo pravokutnik majvede povrsine koji je upisan u elipsu s poluosima duljina a, b , tako da su mu stranice paralelne s osima elipse.



$$P = P(x) = x \cdot y = 4 = 4 \times b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} =$$

$$= \frac{4b}{a} \times \sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow \text{funkcija } \tilde{\epsilon} \text{ji maksimum tražimo; } x \in [0, a]$$

$$P'(x) = \frac{4b}{a} \left(\sqrt{a^2 - x^2} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - x^2}} (-2x) \right)$$

$$P'(x) = 0$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} = 0 \quad | \cdot \sqrt{a^2 - x^2}, \quad 2a \cdot a \neq x$$

$$a^2 - x^2 - x^2 = 0$$

$$a^2 - 2x^2 = 0$$


$$x^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$x_1 = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$x_2 = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

maksimum $\in [0, a]$


graficki:



Samo je jedan Mali Ivica!

$$P = P_{\text{MAX}} \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right) = \frac{4b}{\alpha} \cdot \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = 2ab //$$

□ GLOBALNI EKSTREM. EKSTREM FUNKCIJE NA ZATVORENOM INTERVALU.



= Ako tražimo maksimum ili minimum funkcije na cijelom intervalu $[a, b]$ onda govorimo o globalnim ekstremima. Tako se ekstrem mora postići u stacionarnoj točki unutar intervala, red možda i na njegovu rubu, ili u točki u kojoj derivacija ne postoji (tj. točka kome).

- PRIMJER 5.

↳ Naći najveću i najmanju vrijednost funkcije $y = x^2 + 1$ na intervalu $[0, 1]$.


$$\rightarrow y' = 2x$$

$$y' = 0 \Rightarrow 2x = 0$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = \frac{3}{4}, \quad T\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

→ graf:



→ Dodata iz grafa se vidi da je najmanja vrijednost funkcije u točki $T\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ a najveća vrijednost funkcije je u točki $(1, 2)$, koja nije stacionarna točka.

- PRIMJER 6.

↳ Naći najveću i najmanju vrijednost funkcije $f(x) = 3 \cdot 3\sqrt{x^2} - 2x$ na intervalu $[1, 2]$.

$$\rightarrow y' = 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} - 2 = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 2$$

$$y' = 0 \Rightarrow \frac{2}{\sqrt[3]{x}} = 2 \cdot \sqrt[3]{x}, \quad x \neq 0$$

$$2 = 2\sqrt[3]{x}$$

$$\sqrt[3]{x} = 1$$

$$x = 1 \rightarrow S(1, 1)$$

→ točke u kojima funkcija nije definirana:

$$T(0, 0)$$


$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 2 \right) = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 2 \right) = \frac{2}{+\infty} = +\infty$$

→ rubne vrijednosti:

$$\begin{aligned} x_1 &= -1 & f(x_1) &= f(-1) = 5 \\ x_2 &= 2 & f(x_2) &= f(2) = 0,76 \end{aligned}$$

→ graf:



= Najveća vrijednost → A (-1, 5);
najniža vrijednost → T(0, 0),
što nisu stacionarne točke.

□ DRUGA DERIVACIJA I EKSTREMI. DERIVACIJE VSEG REDA I EKSTREMI.

= Ispitivanje karaktera ekstrema pomoću druge derivacije:

1. Izračunamo derivacije $f'(x)$ i $f''(x)$
2. rješimo jednačinu $f'(x)=0$, a mjezima rješenja su stacionarne točke
3. a) ako je $f''(x_0) > 0$, onda je x_0 minimum;
- b) ako je $f''(x_0) < 0$, onda je x_0 maksimum;
- c) ako je $f''(x_0)=0$, onda karakter stacionarne točke istražujemo pomoću predznaka prve derivacije

= STAVAK 2.

↳ Ako vrijedi:

$$f'(c) = f''(c) = \dots = f^{(n-1)}(c) = 0,$$

a vrijedi:

$$f^{(n)}(c) \neq 0,$$

onda c nije točka ekstrema ukoliko je n neparni, a jest točka ekstrema ukoliko je n paran broj. Karakter ekstrema ovisi o predznaku derivacije, pa je:

c - točka minimuma za $f^{(n)}(c) > 0$,

c - točka maksimuma za $f^{(n)}(c) < 0$.

= PRIMJER 7.

a) ↳ Nadi ekstreme funkcije $f(x) = x^4 - 2x^2$.

$$\rightarrow f'(x) = 4x^3 - 4x$$

$$f'(x) = 0$$

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x=0 \quad x_{2,3} = \pm 1$$

stacionarne točke: $S_1(0,0)$

$S_2(1,-1)$

$S_3(-1,-1)$

nultočke: $x^4 - 2x^2 = 0$

$$x^2(x^2 - 2) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_{2,3} = \pm \sqrt{2}$$

$$\rightarrow f''(x) = 12x^2 - 4$$

$$f''(S_1) = -4$$

$< 0 \rightarrow$ maksimum


$$f''(S_2) = 8$$

$> 0 \rightarrow$ minimum

$$f''(S_3) = -8$$

$< 0 \rightarrow$ maksimum

→ graf:



= S_1 - nultočka pravnog reda
 S_2 i S_3 - nultočka nepavnog reda

Samo je jedan Mali Ivica!

b) Naci ekstreme prethodne funkcije na intervalu $[-\sqrt{2}, 2]$.

$$\rightarrow \text{stacionarne točke: } S_1(0,0) - \text{max.}$$

$$S_2(1,-1) - \text{min.}$$

$$S_3(-1,-1) - \text{max.}$$

$$\rightarrow \text{nultočke: } N_1(-\sqrt{2}, 0)$$


$$N_2(\sqrt{2}, 0)$$

→ na naborima funkcije:

$$f(-\sqrt{2}) = 0 \quad A(-\sqrt{2}, 0)$$

$$f(2) = 8 \quad B(2, 8)$$

→ graf:



= Maksimum: $(2, 8)$, a
minimum: $(1, -1)$ i $(-1, -1)$.

- PRIMJER 8.

↳ Odredite maksimum i minimum funkcije $f(x) = x^4 + 4x^3$ nad intervalom $[-1, 5]$.

$$\rightarrow f'(x) = 4x^3 + 12x^2$$

$$\rightarrow f''(x) = 12x^2 + 24x$$

$$f'(x) = 0$$

$$4x^3 + 12x^2 = 0$$

$$4x^2(x+3) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = -3 \Rightarrow T_1(0, 0)$$


$$T_2(3, -27)$$

$$f''(T_1) = 0 = 0 \quad ?$$

$$f''(T_2) = 36 > 0 \quad \text{minimum}$$

$$\rightarrow f'''(x) = 24x + 24$$

→ graf:



MAX=B $f'''(T_1) = -24 \neq 0 \rightarrow$ nije točka ekstrema nego je točka infleksije

$$\rightarrow \text{nultočke: } x^4 + 4x^3 = 0$$

$$x^3(x+4) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = -4$$

$$\rightarrow \text{nove točke: }$$

$$f(5) = 125 \quad B(5, 125)$$

$$f(-4) = 5 \quad A(-4, 5)$$


= Maksimum: $B(5, 125)$
Minimum: $T_2(3, -27)$

11.3. PRIMJENE

- PRIMJER 1.


↳ Dokazite da mjeri svim pravokutnicima s površinom P kada ih ima mnogo više opseg.

→ Skica:



$P = \text{konst.}$

→ opseg pravokutnika:



$$O = 2x + 2y, P = xy \Rightarrow y = \frac{P}{x}$$

$$O = 2x + 2 \cdot \frac{P}{x} = 2 \left(x + \frac{P}{x} \right) \rightarrow \text{funkcija } O \text{ minimum tražimo } x \in (0, \infty)$$

$$O' = 2 - \frac{2P}{x^2}$$

$$O' = 0$$

$$2 - \frac{2P}{x^2} = 0$$

$$\frac{2P}{x^2} = 2$$

$$x^2 = P$$


$$x_1 = \sqrt{P}, x_2 = \sqrt{P}, y_2 = \frac{P}{x} = \frac{P}{\sqrt{P}} = \sqrt{P} //$$

$x_2 = y_2 \Rightarrow$ pravokutnik je kvadrat //

= PRIMER 2.

↳ U zadatu kuglu polujera R upisimo vajak najvećeg volumena.

→ skica:



→ volumen vajka:

$$(I) V = Bh = r^2 \pi \cdot h$$

$$(II) h^2 + (2r)^2 = (2R)^2$$

$$\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2 = R^2$$

$$\frac{h^2}{4} + r^2 = R^2 \Rightarrow h = 2\sqrt{R^2 - r^2}$$

$$V(r) = r^2 \pi \cdot 2\sqrt{R^2 - r^2} \rightarrow \text{funkcija } V \text{ maximum tražimo}$$

$$V'(r) = 2\pi \left(2r\sqrt{R^2 - r^2} + \frac{1}{2\sqrt{R^2 - r^2}} (-2r) \cdot r^2 \right) = 2\pi \frac{2r(R^2 - r^2) - r^3}{\sqrt{R^2 - r^2}} =$$

$$= \frac{2\pi r(2(R^2 - r^2) - r^2)}{\sqrt{R^2 - r^2}}$$

$$V'(r) = 0$$

$$2\pi r(2(R^2 - r^2) - r^2) = 0$$

$$2R^2 - 2r^2 - r^2 = 0$$

$$2R^2 - 3r^2 = 0$$

$$r^2 = \frac{2R^2}{3}$$

$$r_1 = -\sqrt{\frac{2}{3}}R$$

$$r_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}R = \frac{\sqrt{6}}{3}R$$


$$\rightarrow V_{\text{MAX}} = V\left(\frac{\sqrt{6}}{3}R\right) = 2\pi \cdot \frac{2}{3}R^2 \sqrt{\frac{R^2}{3}} =$$

$$= \frac{4}{3}\pi R^2 \frac{R\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3}\pi}{9}R^3 //$$

Samo je jedan Mali Ivica!

=PRIMER 3.

↳ Dokazite da sve tangente na graf funkcije $f(x) = \frac{1}{x}$ u bilo kojoj točki u prvom kvadrantu sticaju s koordinatnim osima trokut konstantne površine. Izracunajte tu površinu.



→ jednadžba tangente:
t... $y - y_0 = y'_0 (x - x_0)$

$$y'_0 = f'(x) = -\frac{1}{x_0^2}$$

$$t... y - y_0 = -\frac{1}{x_0^2} (x - x_0)$$

$$(I) \begin{cases} x=0 \\ y=n \end{cases} \quad y_0 + \frac{x_0}{x_0^2} = \frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_0} = \frac{2}{x_0} \rightarrow N(0, \frac{2}{x_0})$$

$$(II) \begin{cases} y=0 \\ x=m \end{cases} \quad x_0^2 y_0 + x_0 = x_0 \cdot \frac{1}{x_0} + x_0 = 2x_0 \rightarrow M(2x_0, 0)$$

→ maksimalna površina:

$$P_{\Delta} = \frac{m \cdot n}{2} = \frac{2x_0 \cdot \frac{2}{x_0}}{2} = 2 //$$

ZADACI

(1) $t, n = ?$

$$y = \arcsin x \quad T(\frac{1}{2}, y)$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$t... y = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \quad T(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6})$$

$$k_T = y'(\frac{1}{2}) = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$t... y - y_0 = k(x - x_0)$$

$$y - \frac{\pi}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3} (x - \frac{1}{2})$$

$$y = \frac{2\sqrt{3}}{3} x - \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\pi}{6} //$$

$$t... y - y_0 = -\frac{1}{k} (x - x_0)$$

$$y - \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} (x - \frac{1}{2})$$

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{6} //$$

(2) $t, n = ?$

$$xy^2 + e^{x+y} = 2 \quad T(1, -1)$$

$$k_T = y'(T) = y'(1, -1) = \frac{-1-1}{-2+1} = \frac{-2}{-1} = 2$$

$$xy^2 + e^{x+y} = 2 \quad | \frac{d}{dx}$$

$$y^2 + 2yy'x + e^{x+y} (x+y)' = 0$$

$$y^2 + 2y^2x + e^{x+y} (y+1) = 0$$

$$y' (2yx + e^{x+y}) = -e^{x+y} - y^2$$

$$y' = \frac{-e^{x+y} - y^2}{2yx + e^{x+y}}$$

$$t... y - y_0 = k_T (x - x_0)$$

$$y + 1 = 2(x - 1)$$

$$y = 2x - 3 //$$

$$t... y - y_0 = -\frac{1}{k} (x - x_0)$$

$$y - 1 = -\frac{1}{2} (x + 1)$$

$$y = -\frac{1}{2} x - \frac{1}{2} //$$

$$(3) \quad y^x + \sin(x-1) = \sqrt{y}$$

$$T(1,1)$$

$$t... = ? \quad n... = ?$$

$$t... = y - y_0 = y'(T)(x-x_0)$$

$$\hookrightarrow y'(T) = ?$$

$$y^x + \sin(x-1) = \sqrt{y}$$

$$e^{ln y} + \sin(x-1) = \sqrt{y} \quad | \frac{d}{dy}$$

$$y'(\ln y + \frac{1}{y} \cdot y' \cdot x) + \cos(x-1) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot y' \quad n... \quad y - y_0 = \frac{-1}{k_T} (x-x_0)$$

$$y'(\ln y + \frac{x}{y} y' + \cos(x-1)) - \frac{1}{2\sqrt{y}} y' = 0$$

$$y' = \frac{-y^x \ln y - \cos(x-1)}{x \cdot y^{x-1} - \frac{1}{2\sqrt{y}}}$$

$$k_T = y'(T) = y'(1,1) = \\ = \frac{-1 \cdot 0 - 1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{-1}{\frac{1}{2}} = -2$$

$$t... \quad y - y_0 = k_T(x-x_0)$$

$$y - 1 = -2(x-1)$$

$$y = -2x + 3 \quad //$$

$$t... \quad y - y_0 = \frac{-1}{k_T} (x-x_0)$$

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x-1)$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \quad //$$

$$(4) \quad \begin{cases} x = \sin^2 t - \cos t \\ y = \ln(\tan \frac{t}{2}) \end{cases}, \quad t = \frac{\pi}{2}, \quad t, n = ?$$

$$T(x_0, y_0) \dots \quad x = \sin^2 \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} = 1 - 0 = 1$$

$$y = \ln(\tan \frac{\pi}{4}) = \ln 1 = 0$$

$T(1,0)$

$$y' = \frac{\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{2 \sin t \cos t}{\sin t} + \sin t} = \frac{1}{\frac{\tan \frac{t}{2} \cos^2 \frac{t}{2} \cdot 2}{2 \sin t \cos t + \sin t}} = \frac{1}{(\sin 2t + \sin t)(2 \tan \frac{t}{2} \cdot \cos^2 \frac{t}{2})}$$

$$k_T = y'(\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{(0+1)(2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2})} = 1$$

$$t... \quad y - y_0 = k_T(x-x_0)$$

$$y - 0 = 1(x+1)$$

$$y = x + 1 \quad //$$

$$n... \quad y - y_0 = -\frac{1}{k_T}(x-x_0)$$

$$y - 0 = -1(x-1)$$

$$y = -x + 1 \quad //$$

$$(5) \quad a) \quad y = x^2 - 1, \text{ najbliži } T(3, -1)$$

$$(1) \quad y+1 = k_N(x-3) \quad (2) \quad k_N = -\frac{1}{k_T} = -\frac{1}{2x}$$

$$k_N = \frac{y+1}{x-3}$$

$$x_1 = 1 \quad y_1 = 0 \quad T(1,0) \quad //$$

$$\frac{y+1}{x+3} = -\frac{1}{2x}$$

$$(y+1)2x = -x+3$$

$$(x^2-1)2x = -x+3$$

$$2x^3 - 2x + x - 3 = 0$$

$$2x^3 - x - 3 = 0$$

$$x_1 = 1 \quad (\text{djeljivo s nema drugih ravnih ravnata})$$

$$b) \quad y_1 = x^2 + x - 2, \text{ najbliži pravcu } y_2 = 5x + 10$$

$$y_1' = 2x + 1 \quad y_2' = 5$$

$$2x+1=5$$

$$2x=4$$

$$x=2$$

$$y=4 \quad T(2,4) \quad //$$

Samo je jedan Mali Kvical

(6)

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{2x} & \varphi = ? \\ y_2 &= e^{-3x} \end{aligned}$$

$$T(x_0, y_0) \dots \quad \begin{aligned} e^{2x} &= e^{-3x} \\ 2x &= -3x \\ 5x &= 0 \\ x &= 0, \quad y = 1 \quad T(0,1) \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} k_1 &= y_1' = e^{2x} \cdot 2 = 2 \\ k_2 &= y_2' = e^{-3x} \cdot (-3) = -3 \end{aligned} \right\} \quad \operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{-3 - 2}{1 + 6} \right| = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ //$$

$$(7) \quad \left. \begin{aligned} y_1 &= 4x^2 + 2x - 8 \\ y_2 &= x^3 - x + 10 \end{aligned} \right\} \text{ tangiraju u točki } T(3, 34), \text{ da li i u } T(-2, 4)$$

$$\begin{aligned} y_1' &= 8x + 2 \\ y_2' &= 3x^2 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_1 &= k_2 \\ 8x + 2 &= 3x^2 - 1 \\ 3x^2 - 8x - 3 &= 0 \end{aligned}$$

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64+36}}{6} = \frac{8 \pm 10}{6} \quad \begin{aligned} x_1 &= 3 \\ x_2 &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

→ derivacije su im jednake za $x=3$ i $x=-\frac{1}{3}$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow T_1(3, 34) &\rightarrow \text{tangiraju se} \\ T_2(-2, 4) &\rightarrow \text{ne tangiraju se} \end{aligned}$$

$$(8) \quad f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 1$$

↪ 1. derivacija

$$f'(x) = -6x^2 + 6x + 12$$

$$f'(x) = 0$$

$$-6x^2 + 6x + 12 = 0$$

$$-x^2 + x + 2 = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} \quad \begin{aligned} x_1 &= 2 \\ x_2 &= -1 \end{aligned}$$

$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↓	↗	↗	↓	↗

MIN MAX

$$\begin{aligned} \text{MIN} &\rightarrow S_1(-1, -8) \\ \text{MAX} &\rightarrow S_2(2, 19) \end{aligned}$$

$$(9) \quad f(x) = x^3 - 3x + 2$$

↪ 1. derivacija

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 3 = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1 \quad \begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_2 &= -1 \end{aligned}$$

$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	↓	↗	↗	↗

MAX MIN

$$\begin{aligned} \text{MIN} &\rightarrow S_1(-1, 4) \\ \text{MAX} &\rightarrow S_2(1, 0) \end{aligned}$$

$$(10) \quad f(x) = \frac{2x^2}{1-x^2}, \quad D \subset \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

↪ 1. derivacija

$$f'(x) = \frac{4x(1-x^2) - 2x^2(-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{4x - 4x^3 + 4x^3}{(1-x^2)^2} = \frac{4x}{(1-x^2)^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$4x = 0$$

$$x = 0$$

$f'(x)$	-	-	+	+	+
$f(x)$	↓	↓	↗	↗	↗

MIN

$$\text{MIN} \rightarrow S_1(0, 0) //$$

(11) $f(x) = x \ln(x^2)$, $D_f \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$f'(x) = \ln(x^2) + x \cdot \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \ln(x^2) + 2$$

$$f'(x) \neq 0$$

$$\ln(x^2) + 2 = 0$$

$$\ln(x^2) = -2$$

$$\ln(x^2) = \ln e^{-2}$$

$$x^2 = e^{-2}$$

$$x_1 = 1/e, \quad x_2 = -1/e$$

$\rightarrow \infty$	$-\frac{1}{e}$	0	$\frac{1}{e}$	∞
$f'(x)$	+	-	-	+
$f(x)$	\uparrow	\downarrow	\downarrow	\uparrow

$$\text{MAX } S_1 \left(-\frac{1}{e}, \frac{2}{e}\right) \\ \text{MIN } S_2 \left(\frac{1}{e}, -\frac{2}{e}\right)$$

//

(12) $f(x) = x^3 \cdot e^{-x^2}$

$$f'(x) = 3x^2 e^{-x^2} + x^3 e^{-x^2} (-2x) = e^{-x^2} (3x^2 - 2x^5)$$

$$f'(x) = 0$$

$$e^{-x^2} (3x^2 - 2x^5) = 0$$

$$x^2(3 - 2x^3) = 0$$

$$x_1 = 0 // \quad 3 - 2x^3 = 0$$

$$2x^3 = 3$$

$$x_2 = \sqrt[3]{\frac{3}{2}}, \quad x_3 = -\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$$

$\rightarrow \infty$	$-\sqrt{\frac{3}{2}}$	0	$\sqrt{\frac{3}{2}}$	∞
$f'(x)$	-	+	+	-
$f(x)$	\downarrow	\uparrow	\uparrow	\downarrow

$$\text{MIN } S_1 \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) e^{\frac{3}{2}} \\ \text{MAX } S_2 \left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) e^{-\frac{3}{2}}$$

//

(13) Dokazi: $\sin x < x < \tan x$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

I) $f(x) = \tan x - x$, $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 < 0 \Rightarrow$ funkcija je padaća $\Rightarrow f(x) > f(0), \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$

\hookrightarrow toga slijedi da je $x < \tan x$ za svaki $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

II) $g(x) = x - \sin x$, $g'(x) = 1 - \cos x > 0 \Rightarrow$ funkcija je rastuća $\Rightarrow f(x) > f(0), \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$
 \hookrightarrow toga slijedi da je $x > \sin x$ za svaki $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. \square

Q.E.D.

(14) Dokazi: $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$, $x > 0$

I) $f(x) = x - \ln(1+x)$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0 \Rightarrow$ funkcija je rastuća $\Rightarrow f(x) > f(0), \forall x > 0$

\hookrightarrow toga slijedi da je $x > \ln(1+x)$ za $x > 0$.


II) $g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$, $g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + \frac{1}{2} \cdot 2x = \frac{1 - 1 - x + x + x^2}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} > 0$

\Rightarrow funkcija je rastuća $\Rightarrow f(x) > f(0), \forall x > 0$

\hookrightarrow toga slijedi da je $\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$ za svaki $x > 0$. \square

Q.E.D.

(15) $P_{\max} = ?$, $y = -x^2 + 4$, segment $[-2, 2]$



$$P = 2xy = 2x(-x^2 + 4) = -2x^3 + 8x \Rightarrow$$
 funkcija čiji maksimum tražimo

$$P'(x) = -6x^2 + 8$$

$$P'(x) = 0 \Rightarrow -6x^2 + 8 = 0$$


$$x^2 = \frac{4}{3}$$

$$x_1 = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$x_2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$P_{\max} = P\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = -2 \cdot \frac{8 \cdot 2\sqrt{3}}{27} + 8 \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{-16\sqrt{3}}{9} + \frac{16\sqrt{3}}{3} = \frac{-16\sqrt{3} + 48\sqrt{3}}{9} = \frac{32\sqrt{3}}{9}$$

202-

16. $P_{\text{trap max}} = ?$ 

$$P = \frac{a+c}{2} \cdot v \quad | \quad a=2r \quad v^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2 = r^2 \Rightarrow c^2 = 4(r^2 - v^2)$$

$$P = \frac{2r + 2\sqrt{r^2 - v^2}}{2} \cdot v = v(r + \sqrt{r^2 - v^2}) \rightarrow \text{funkcija } c \text{ je maksimum tražimo}$$

$$P'(x) = r + \sqrt{r^2 - v^2} + v \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{r^2 - v^2}} \cdot (-2v) \right) = r + \sqrt{r^2 - v^2} - \frac{v^2}{\sqrt{r^2 - v^2}}$$

$$P'(x) = 0 \quad r + \sqrt{r^2 - v^2} - \frac{v^2}{\sqrt{r^2 - v^2}} = 0 \quad | \quad \sqrt{r^2 - v^2}$$

$$r\sqrt{r^2 - v^2} + r^2 - v^2 - v^2 = 0$$

$$r\sqrt{r^2 - v^2} = 2v^2 - r^2 / 2$$


$$r^2(r^2 - v^2) = 4v^4 - 4v^2r^2 + r^4$$

$$r^4 - r^2v^2 = 4v^4 - 4v^2r^2 + r^4$$

$$3r^2v^2 = 4v^4$$

$$3r^2 = 4v^2 \Rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2}r$$

$$P_{\text{max}} = P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}r(r + \sqrt{r^2 - \frac{3}{4}r^2}) = \frac{3}{2}r \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}r = \frac{3\sqrt{3}}{4}r^2 //$$

17. $P_D = ?$, elipsa: $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, vrh C(0,2), $\overline{AB} = 2x$ 

$$a = AB = 2x$$

$$h = 2+y = 2+2\sqrt{1-x^2}$$

$$P = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{2x \cdot 2(1+\sqrt{1-x^2})}{2} = 2x(1+\sqrt{1-x^2})$$

$$P(x) = 2x(1+\sqrt{1-x^2}) \rightarrow \text{funkcija } c \text{ je maksimum tražimo}$$

$$P'(x) = 2(1+\sqrt{1-x^2}) + \left(\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) \right) \cdot 2x = 2+2\sqrt{1-x^2} - \frac{4x^2}{2\sqrt{1+x^2}} = 2+2\sqrt{1-x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$P'(x) = 0$$

$$2\sqrt{1-x^2} + 2(1-x^2) - 2x^2 = 0$$

$$2\sqrt{1-x^2} = 4x^2 - 2 / 2$$

$$1-x^2 = (2x^2-1)^2$$


$$1-x^2 = 4x^4 - 4x^2 + 1$$

$$4x^4 - 3x^2 = 0$$

$$x^2(4x^2-3) = 0$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ x_3 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$P_{\text{max}} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{3}{4}} \right) = \sqrt{3} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} //$$

18. $P_{\square \text{ max}} = ?$ 

$$b^2 + \frac{a^2}{4} = R^2$$

$$a^2 = 4(R^2 - b^2)$$

$$a = 2\sqrt{R^2 - b^2}$$

$$P = a \cdot b = 2\sqrt{R^2 - b^2} \cdot b \rightarrow \text{funkcija } c \text{ je maksimum tražimo}$$

$$\begin{aligned} P'(b) &= 2\left(\sqrt{R^2 - b^2} + \frac{1}{2\sqrt{R^2 - b^2}} \cdot b(-2b)\right) = \\ &= 2\left(\sqrt{R^2 - b^2} - \frac{b^2}{\sqrt{R^2 - b^2}}\right) \end{aligned}$$


$$P'(b) = 0 \Rightarrow \sqrt{R^2 - b^2} = \frac{b^2}{\sqrt{R^2 - b^2}} \quad | \cdot \sqrt{R^2 - b^2}$$

$$R^2 - b^2 = b^2$$

$$2b^2 = R^2$$

$$b = \frac{R\sqrt{2}}{2}$$

$$P_{\text{max}} = 2 \cdot \sqrt{R^2 - \frac{R^2}{2}} \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} = 2 \cdot \frac{R^2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = R^2 //$$

(19) $V_{\max} = ?$ 

$$V = \frac{B \cdot v}{3} = \frac{\pi r^2 \cdot v}{3} = \frac{(s^2 - r^2)\pi v}{3} = \frac{\pi}{3} (s^2 - r^2)v \rightarrow \text{funkcija čiji maksimum tražimo}$$

$$\hookrightarrow s^2 = v^2 + r^2 \Rightarrow r^2 = s^2 - v^2$$

$$V'(v) = \frac{\pi}{3} (-2v \cdot v + s^2 - v^2) = \frac{\pi}{3} (s^2 - 3v^2)$$


$$V'(v) = 0 \Rightarrow s^2 - 3v^2 = 0$$

$$s^2 = 3v^2$$

$$v^2 = \frac{s^2}{3} \Rightarrow v_1 = \frac{s}{\sqrt{3}}$$

$$v_2 = \frac{s}{\sqrt{3}}$$

$$V_{\max} = \frac{\pi}{3} \left(s^2 - \frac{s^2}{3} \right) \cdot \frac{s}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{2s^2}{3} \cdot \frac{s}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi s^3}{9\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi s^3}{27} //$$

(20) $V_{\max} = ?$ 

$$V = \frac{B \cdot v}{3} = \frac{\pi r^2 v}{3}$$

$$\hookrightarrow s^2 = v^2 + r^2$$

$$\hookrightarrow s = 2R \cos \varphi = 2R \cdot \frac{v}{s} / s$$

$$s^2 = 2Rv$$

$$v^2 + r^2 = 2Rv \\ r^2 = 2Rv - v^2$$

$$V = (2Rv - v^2)v \frac{\pi}{3} = v^2 (2R - v) \frac{\pi}{3} \rightarrow \text{funkcija čiji maksimum tražimo}$$

$$V'(v) = (2v(2R - v) + (-1) \cdot v^2) \frac{\pi}{3} = (4vR - 2v^2 - v^2) \frac{\pi}{3} = (4vR - 3v^2) \frac{\pi}{3}$$

$$V'(v) = 0 \Rightarrow 4vR = 3v^2$$

$$4vR - 3v^2 = 0$$

$$v(4R - 3v) = 0$$

$$v_1 = 0$$

$$v_2 = \frac{4R}{3}$$

$$V_{\max} = \frac{16}{9} R^2 \left(2R - \frac{4R}{3} \right) \frac{\pi}{3} = \frac{16R^2}{9} \left(\frac{2R}{3} \right) \frac{\pi}{3} = \frac{32}{81} R^3 \pi //$$

72. ISPITIVANJE TJEKA FUNKCIJE

12.1. ASIMPTOTE

- DEFINICIJA 1.

↳ Neka se točka T neprekidno giba po grafu f funkcije f , tako da barem jedna od njezinih koordinata teži $+\infty$ ili $-\infty$. Ako pri tom njezina udaljenost od pravca φ teži k nuli, onda se taj pravac naziva asimptota funkcije.

= Treba razlikovati dva bitno različita slučaja:

I) vertikalne asimptote grafa funkcije


↳ Ako za funkciju f vrijedi: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$ ili $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$, onda je

pravac $x=x_0$ njezina vertikalna asimptota.

= PRIMER 1.

↳ Nadi vertikalne asimptote funkcije $y=\ln x$.

$$\rightarrow D_f \in \langle 0, \infty \rangle$$




$x=0 \rightarrow$ desna vertikalna asimptota

= PRIMER 2.

↳ Nadi vertikalne asimptote funkcije: $y=\tan x$, na intervalu $[0, \pi]$

$$\rightarrow D_f \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$$



$x = \frac{\pi}{2} \rightarrow$ obostrana vertikalna asimptota

II) kose asimptote grafa funkcije

↳ Desna kosa asimptota je pravac $\varphi = y=kx+l$ za koji je vrijedi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx+l)) = 0.$$

↳ Ako ovakav limes postoji; kod $x \rightarrow -\infty$, govorimo o lijevoj kosi asimptoti.

↳ Izračunavajući nepoznatih koeficijenata k i l :

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} ; \quad l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx)$$

DOKAZ: → Iz osnovnog uvjeta kojim je asimptota definirana slijedi:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (kx+l)] &= 0 / : x \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - \underbrace{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k}_{=k} + \underbrace{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{l}{x}}_{=0} &= 0 \end{aligned}$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

→ Sada se l izračuna iz osnovnog ujednačenja za asimptotu:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (kx + l)] = 0 \quad \text{w}$$


Q.E.D.

= Specijalni slučaj: Horizontalne asimptote grafa funkcije
↳ Kose asimptote sa koeficijentom slijedeci k=0.

= PRIMER 3.

↳ Naci horizontalne asimptote funkcije $y = e^x$.

$$\rightarrow \exists f \in \mathbb{R}$$




$y = 0 \rightarrow$ lijeva horizontalna asimptota

= PRIMER 4.

↳ Naci horizontalne asimptote funkcije $y = \ln x$.

$$\rightarrow \exists f \in \mathbb{R}$$



$y = 1 \rightarrow$ desna horizontalna asimptota

$y = -1 \rightarrow$ lijeva horizontalna asimptota

= PRIMER 5.

↳ Naci asimptote funkcije: $y = \frac{x^3}{x^2 + x + 1}$.

I) vertikalne asimptote:

$$x^2 + x + 1 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

↳ NEMA B

II) kose asimptote:

$$y = kx + l$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x^2 + x + 1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^3}{x^2 + x + 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 - x^2 - x}{x^2 + x + 1} = -1$$

→ $y = x - 1$

= PRIMER 6.


↳ Naci asimptote funkcije: $y = e^{\frac{1}{x}} - x$.

I) horizontalne asimptote:

$$x \neq 0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} y = \lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x}} - x) = e^{-\infty} + 0 = 0$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{\frac{1}{x}} + x) = e^{+\infty} - 0 = +\infty$$

↳ $x = 0 \rightarrow$ desna horizontalna asimptota



II) kose asymptote:


$$y = kx + l$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} - 1 \right) = 0 - 1 = -1$$

$$l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (e^{\frac{1}{x}} - x + x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$$

$$\hookrightarrow y = -x + 1$$

Graf:



-PRIMJER 7.

↳ Nadi obimptote funkcije: $y = x + \arctan x$

I) vertikalne asymptote:

$$\exists y \in \mathbb{R}$$

↳ NEMA Y

II) kose asymptote:

$$y = kx + l$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 - \frac{\arctan x}{x} \right) = 1$$

$$l_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$l_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$



$$\hookrightarrow y_1 = x + \frac{\pi}{2} \quad (\text{desna})$$

$$y_2 = x - \frac{\pi}{2} \quad (\text{lijevca})$$



12.2. KONVEKSNOST I KONKAVNOST

-DEFINICIJA 1.

↳ Funkcija $y = f(x)$ je konveksna na intervalu (a, b) ako se njen graf nalazi iznad tangente u po volji odabranoj točki iz intervala (a, b) . (Također i ako se njen graf nalazi ispod sekante).




↳ Funkcija $y = f(x)$ je konkavna na intervalu (a, b) ako se njen graf nalazi ispod tangente u po volji odabranoj točki iz intervala (a, b) . (Također i ako se njen graf nalazi ispod sekante).



= PRIMJER 1.

a) $f(x) = x^2$




\Rightarrow konveksna funkcija

$$y' = 2x$$

$$y'' = 2 = + > 0 \text{ (U)}$$

b) $f(x) = -x^2$




\Rightarrow konkavna funkcija

$$y' = -2x$$

$$y'' = -2 = - < 0 \text{ (N)}$$

= Općenito:



\rightarrow Ako je druga derivacija funkcije $f''(x) > 0$ onda je funkcija konveksna.
 \rightarrow Ako je druga derivacija funkcije $f''(x) < 0$ onda je funkcija konkavna.

□ TOČKA PREGIBA

= DEFINICIJA 2.

\hookrightarrow Točka $T(x_0, y_0)$ je točka infleksije (pregiba) funkcije $f(x)$, ako vrijedi:

1.) $f''(x_0) = 0$ ili $f''(x_0)$ nije definirana.

2.) $f''(x_0)$ mijenja predznak pri prolazu kroz točku x_0 .

= Određivanje intervala konveksnosti i točaka pregiba:

1. izračunamo $f''(x)$

2. rješimo jednadžbu $f''(x) = 0$, a mještajmo rješenja su eventualne točke pregiba

3. na osnovu intervalima na kojima je $f''(x) > 0$ funkcija je konveksna, a na ostalim intervalima ($f''(x) < 0$) je konkavna.

\hookrightarrow Na granici konveksnosti i konkavnosti može se naći točka infleksije.

= PRIMJER 2.

a) Ispitati konveksnost i konkavnost funkcije $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

$$f'(x) = 2x - 3$$

$$f''(x) = 2 = + > 0 \Rightarrow$$
 konveksna na \mathbb{R}

b) Ispitati konveksnost i konkavnost funkcije $f(x) = \ln x$.

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} = - < 0 \Rightarrow$$
 konkavna na \mathbb{R}

= PRIMJER 3.

\hookrightarrow Nadi točku infleksije i godišnja konveksnosti i konkavnosti te jednadžbu infleksione tangente, ako je $f(x) = x^3 - x$.


$$\begin{aligned} \rightarrow f'(x) &= 3x^2 - 1 \\ f''(x) &= 6x \\ 6x &= 0 \\ x = 0, y &= 0 \quad T(0,0) \end{aligned}$$

	$-\infty$	0	∞
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\cap	0	\cup

točka infleksije $T(0,0)$

$$\begin{aligned} (-\infty, 0) &\rightarrow f(-1) = \ominus \rightarrow \text{konkava} \\ (0, \infty) &\rightarrow f(1) = + \rightarrow \text{konveksna} \end{aligned}$$

graf:



-PRIMER 4.

→ Naći točku infleksije (ako postoji); odredi intervale konveksnosti i konkavnosti i nacrtaj graf funkcije $f = x|x|$.

$$\rightarrow f'(x) = 1 \cdot |x| + x \cdot \frac{|x|}{x} = 2|x|$$

$$f''(x) = 2 \frac{|x|}{x}, x \neq 0$$

$$f''(x) = 0$$

$$2 \frac{|x|}{x} = 0$$

$$2|x|=0$$


$$x=0, y=0 \quad T(0,0)$$

	$-\infty$	0	∞
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\cap	0	\cup

točka infleksije $T(0,0)$

$$\begin{aligned} (-\infty, 0) &\rightarrow f(-1) = \ominus \rightarrow \text{konkava} \\ (0, \infty) &\rightarrow f(1) = + \rightarrow \text{konveksna} \end{aligned}$$

graf:



12.3. TIJEK FUNKCIJE

→ Postupak crtanja grafa funkcije:

1.) Istraživanje funkcije f :

→ odredi se domena

→ odredi se linije funkcije u rubnim točkama domene

→ ispitaju se svojstva parnosti, neparnosti i periodičnosti

→ odredite se nultočke, i sječiste s osi y

→ odredite se asymptote

2) istraživanje funkcije f' :

→ način se ekstremi i ponašanja rasta i pada

3) istraživanje funkcije f'' :

→ način se točke infleksije i ponašanja konveksnosti i konkavnosti

4) po potrebi se izračuna vrijednost funkcije u nekakvoj po rođi odabranih točaka

= PRIMJER 1.

↳ Nacrtajte graf (kvadratni) funkcije $y = e^x - x$.

$$1) D_f \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

- asimptote: $y = -x + 1$ (obostrojava kosa) $\left. \begin{array}{l} \\ x=0 \end{array} \right\}$ (desna okomita) Vidi: PRIMJER 6. STR. 205.

$$2) f'(x) = -\frac{e^x}{x^2} - 1$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow e^x = -x^2$$

mora stacionarnih točaka

$$3) f''(x) = \frac{e^x}{x^2} \cdot \frac{1}{x^2} - e^x \cdot \frac{(-2)}{x^3} = \frac{e^x}{x^4} (1+2x)$$


$$f''(x) = 0 \Rightarrow 1+2x=0$$

$$x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{e^2} + \frac{1}{2}$$

$f'(x)$	-	+	+
$f(x)$	↑	U	U

$$\begin{aligned} <-\infty, -\frac{1}{2} > & f''(-1) = \ominus \rightarrow \text{konkava} \\ <-\frac{1}{2}, 0 > & f''(-\frac{1}{3}) = \oplus \rightarrow \text{konveksna} \\ <0, \infty > & f''(1) = \oplus \rightarrow \text{konveksna} \end{aligned}$$

→ graf:



= PRIMJER 2.

↳ Nacrtaj graf funkcije $y = \frac{\ln^2 x}{x}$

$$1) \text{domena } D_f \in (0, \infty)$$

+ na rubu:


$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x}{x} = \frac{(-\infty)^2}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x}{x} = (\frac{\infty}{\infty}) = \text{L'H} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{1} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = (\frac{\infty}{\infty}) = \text{L'H} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{1} = +0$$

- asimptote: 1) vertikalna $\rightarrow x=0$ (desna)

2) horizontalna $\rightarrow y=0$ (desna)

svaki se iz desne grafe, kada skice cirkun gornje vrline



-nultöcke: $\frac{\ln^2 x}{x} = 0$

$\ln^2 x = 0$

$\ln x = 0$

$\ln x = \ln e^0$

$$2) - y' = \frac{2\ln x \cdot \frac{1}{x} + x - \ln^2 x \cdot 1}{x^2} = \frac{\ln x (2 - \ln x)}{x^2}$$

$y' = 0$

$\ln x (2 - \ln x) = 0$

1) $\ln x = 0 \quad 2) 2 - \ln x = 0$

$\ln x = \ln e^0$

$x = 1$

$y = 0$

$S_1(1, 0)$

$x = e^2$

$\ln x = 2$

$\ln x = \ln e^2$

$x = e^2$

$y = \frac{4}{e^2}$

$S_2(e^2, \frac{4}{e^2})$

- interval pomocou predstava 2. derivacie:

$$y'' = \frac{(2\frac{1}{x} + 2\ln x \cdot \frac{1}{x}) \cdot x^2 + (2\ln x - \ln^2 x) \cdot 2x}{x^4} = \frac{2(1 - 3\ln x + \ln^2 x)}{x^3}$$


$y''(S_1) = y''(1) = 2 > 0 \Rightarrow \text{minimum}$

$y''(S_2) = y''(e^2) = -\frac{2}{e^6} < 0 \Rightarrow \text{máximum}$

$m(1, 0)$

$M(e^2, \frac{4}{e^2})$

- graf:



= PRÍMÝER 3.

↪ Nachajte graf funkcie: $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ (Tzv. Gaussova kružňa)


1) - domena $Df \in \mathbb{R}$

- nultočky: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$

- asymptóty: → vertikálne: NEMA

→ horizontálne: $y = 0$ (obostača)

↪ z dešumu grafu o ponaďauju
liniek gorných



- nultočky: NEMA

- parnosť: $f(x) = e^{-\frac{(-x)^2}{2}} = e^{-\frac{x^2}{2}} = f(x) \Rightarrow \text{Parne.}$

2)

$$f'(x) = -x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow -x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$$

$$x = 0$$

$$y = 1$$

$$S(0, 1)$$

$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\nearrow	1	\searrow

MAX (0, 1)

$$\leftarrow (-\infty, 0) \quad f'(-1) = \oplus$$

$$\leftarrow (0, \infty) \quad f'(1) = \oplus$$

3)

$$f''(x) = (x^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow (x^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x_1 = 1$$

$$y_1 = e^{-\frac{1}{4}}$$

$$x_2 = -1$$


$$y_2 = e^{-\frac{1}{4}}$$

$$S_1(1, e^{-\frac{1}{4}}), S_2(-1, e^{-\frac{1}{4}})$$

	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0+
$f(x)$	$\cup e^{\frac{1}{x}}$	$\cap e^{\frac{1}{x}}$		\cup

- $(-\infty, -1) \quad f''(-2) = (+) \rightarrow$ konveksna
 $(-1, 1) \quad f''(0) = (-) \rightarrow$ konkavna
 $(1, \infty) \quad f''(2) = (+) \rightarrow$ konveksna

-graf:



□ GRAFOVI RACIONALNIH FUNKCIJA

= Racionalna funkcija $f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ može biti:

- 1) prava racionalna : za $n < m$
 2) neprava racionalna : za $n \geq m$

↳ U ovom slučaju diobom brojnika i nazivnika dobije se :

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = R_{n-m}(x) + \frac{\sigma(x)}{Q_m(x)}$$


resultat

ostatak-prava racionalna funkcija


= Nultočke racionalne funkcije:

$$P_n(x) = 0 \Rightarrow x = x_1 \\ x = x_2$$

1) nultočke neparnog reda :



2.) nultočke parnog reda :




= Asimptote racionalne funkcije:

1) vertikalne asimptote


↳ nalaze se u nultočkama nazivnika :

$$(Q_m(x) = 0 \Rightarrow x = x_1, \\ x = x_2)$$

(a) asimptota neparnog reda :



(b) asimptota parnog reda :



2) horizontalne asimptote

↳ postoji onda i samo onda ako je stupanj brojnika manji ili je dva stupnja nazivnika , pa vrijedi :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$$

pa je $y = 0$ asimptota.

Uato je stupanj brojnika jednak stupnju razinika racionalna funkcija
Imat će horizontalnu asimptotu $y = \frac{a_n}{b_n}$ gdje su a_n i b_n vodeći ko-

eficijenti polinoma u brojniku i nazniku

3) kose asimptote

↳ ako je stupanj brojnika za jedan veći od stupnja naznika

= PRIMJER 4.

↳ Načrtujmo graf funkcije: $f(x) = \frac{3x-x^2}{x-4}$.

1.) - domena: $\mathbb{R} \setminus \{4\}$

- na rubovima:

$$\text{I)} \frac{-x^2+3x}{x-4} = \frac{(-x^2+3x):(x-4)}{x-4} = x-1 \quad P = -x-1 + \frac{-4}{x-4}$$

$$\begin{array}{r} -x \\ \hline x-4 \\ \hline x^2-3x \\ \hline -4 \end{array}$$

$$\frac{-x}{x-4}$$

$$\hookrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-x^2+3x}{x-4} \right) : x^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1 + \frac{3}{x}}{\frac{1}{x} - \frac{4}{x^2}} = +\infty$$

$$\hookrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-x^2+3x}{x-4} \right) : x^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1 + \frac{3}{x}}{\frac{1}{x} - \frac{4}{x^2}} = -\infty$$

$$\hookrightarrow \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{-x^2+3x}{x-4} = \frac{(4+0)^2 + 3(4+0)}{1+0+4} = \frac{16+0+0+12+0}{+0} = \frac{4}{+0} = +\infty$$

$$\hookrightarrow \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-x^2+3x}{x-4} = \frac{-(4-0)^2 + 3(4-0)}{1-0+4} = \frac{-16+0+0+12-0}{-0} = \frac{-4}{-0} = +\infty$$

- asimptote:

→ vertikalne: $x=4$

$$\rightarrow \text{kose: } k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x-x^2}{x^2-4x} = -1$$

$$(= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{3x-x^2}{x-4} + x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x}{x-4} = -1)$$

- parnost:

$$f(-x) = \frac{3(-x) - (-x)^2}{(-x)-4} = \frac{-3x - x^2}{-x-4} = \frac{x^2+3x}{x+4} \Rightarrow \text{ni parna ni neparna}$$

- nultočke:

$$\frac{3x-x^2}{x-4} = 0$$

$$3x-x^2=0$$

$$x(3-x)=0$$

$$x_1=0 \quad x_2=3$$

$$N(0,0)$$

$$N(3,0)$$

2) -

$$f'(x) = \frac{(3-2x)(x-4) - (3x-x^2)}{(x-4)^2} = \frac{(x-2)(x-6)}{(x-4)^2}$$

$$f'(x)=0 \Rightarrow (x-2)(x-6)=0$$

$$x_1=2 \quad x_2=6$$

$$y_1=-1 \quad y_2=-9$$


$$S_1(2, -1)$$

$$S_2(6, -9)$$

\rightarrow	2	6	$\rightarrow\infty$
$f'(x)$	- 0	+ 0 -	
$f(x)$	$\searrow -1$	$\nearrow -9$	\searrow
	MIN	MAX	
	$m(2, -1)$	$M(6, -9)$	

Samo je jedan Mali Irvica!

-graf:



ZADACI

① asimptote: $f(x) = \frac{-x^3 - x^2 + x + 5}{(x+1)^2}$

→ vertikalne: $\mathcal{D}_f \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$x = 1 \parallel$ (projekta:

$$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} \frac{-x^3 - x^2 + x + 5}{(x+1)^2} = \infty$$

→ kose:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-x^3 - x^2 + x + 5}{x(x+1)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-x^3 - x^2 + x + 5}{x^3 + 2x^2 + x} \right) = -1$$

$$l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - xk) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-x^3 - x^2 + x + 5}{x^3 + 2x^2 + x} + x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^3 - x^2 + x + 5 + x^3 + 2x^2 + x}{x^3 + 2x^2 + x} = -1$$

$$y = kx + l = -x - 1$$

② asimptote: $f(x) = e^{\frac{1}{x-2}}$

→ vertikalne: $\mathcal{D}_f \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$x = 2 \parallel$ (projekta:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} e^{\frac{1}{x-2}} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} e^{\frac{1}{x-2}} = 0$$

→ kose:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{e^{\frac{1}{x-2}}}{x} = 0$$

NEMA //

→ horizontalne:

$$l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{\frac{1}{x-2}} = 1 \quad y = 1 //$$

③ asimptote: $f(x) = \frac{x}{\ln^2 x}$

→ vertikalne: $\mathcal{D}_f \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$x = 1 \parallel$ (projekta:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{\ln^2 x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{\ln^2 x} = +\infty$$

skose:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{\ln^2 x} = 0$$

NEMA! //

→ horizontal value:

$$l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{2 \ln x + \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{x}} = +\infty$$

NEMA! //

(4.) asymptote:

$$f(x) = \arctg \frac{x^2}{x+1}$$

→ vertikalne: $\mathcal{D}_f \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \arctg(-\infty) = -\frac{\pi}{2} \quad x = -\frac{\pi}{2} //$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \arctg(+\infty) = \frac{\pi}{2} \quad x = \frac{\pi}{2} //$$

→ kose:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\arctg \left(\frac{x^2}{x+1} \right)}{x} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\infty} = 0$$

NEMA! //

→ horizontal value:

$$l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctg \left(\frac{x^2}{x+1} \right) = \arctg \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x+1} \right) = \arctg(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

$$y_1 = \frac{\pi}{2} // \quad y_2 = -\frac{\pi}{2} //$$

(5.) asymptote: $f(x) = 2x - 1 - \sqrt{x^2 - x + 1}$ → vertikalne: $\mathcal{D}_f \in \mathbb{R}$

NEMA!

→ kose:

$$k_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{x} - \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \right)^0 = 1$$

$$k_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x} + \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \right)^0 = 3$$

$$l_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - k_1 x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1 - \sqrt{x^2 - x + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)^2 - (x^2 - x + 1)}{x-1 + \sqrt{x^2 - x + 1}} =$$

$$\pm \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 1 - x^2 + x - 1}{x-1 + \sqrt{x^2 - x + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x-1 + \sqrt{x^2 - x + 1}} = -\frac{1}{2}$$

$$l_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1 - \sqrt{x^2 - x + 1} - 3x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x-1)^2 - (x^2 - x + 1)}{x-1 + \sqrt{x^2 - x + 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x + 1 - x^2 + x - 1}{x-1 + \sqrt{x^2 - x + 1}} =$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$y_1 = x - \frac{1}{2} // \quad y_2 = 3x + \frac{3}{2} //$$

(6.) $f(x) = x^3 + x^2 - 5x + 10$

↳ 2. derivacija

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 5$$

$$f''(x) = 6x + 2 = 0$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow 6x + 2 = 0$$

$$2(3x + 1) = 0$$

$$x = -\frac{1}{3} //$$

	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	∞
$f''(x)$	-	+	
$f(x)$	↑	↓	
		INF.	

(7.) $f(x) = \frac{x^2}{2} + \ln x$
 $\hookrightarrow 2.$ derivacija

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2} + \frac{1}{x} = x + \frac{1}{x}$$

$$f''(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$\begin{array}{c} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{array} \quad +D_f \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

	0	1	∞
$f''(x)$	-	+	
$f(x)$	\cap	\cup	

INF

(8.) $f(x) = \frac{1}{x+3}$
 $\hookrightarrow 2.$ derivacija

$$f'(x) = \frac{-x}{(x+3)^2}$$

$$f''(x) = \frac{-1(x+3)^2 + x \cdot 2(x+3) \cdot 1}{(x+3)^4} = \frac{-(x+3) + 2x}{(x+3)^3} = \frac{x-3}{(x+3)^3}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x-3 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} -\infty & 3 & +\infty \end{array} \quad \begin{array}{c} x=3 \\ // \end{array}, \quad D_f \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$$

$f''(x)$	-	+
$f(x)$	\cap	\cup

INF

(9.) $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$
 $\hookrightarrow 2.$ derivacija

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x+2)^{-\frac{2}{3}}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{9}(x+2)^{-\frac{5}{3}}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow -\frac{2}{9}(x+2)^{-\frac{5}{3}} = 0$$

$$x = -2 //$$

	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f''(x)$	+	-	
$f(x)$	\cup	\cap	

INF

(10.) $f(x) = (1+x^2)e^x$
 $\hookrightarrow 2.$ derivacija

$$f'(x) = 2xe^x + (1+x^2)e^x$$

$$f''(x) = 2e^x + 2xe^x + 2xe^x + (1+x^2)e^x = e^x(3+4x+x^2)$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow e^x(3+4x+x^2) = 0$$

$$x^2 + 4x + 3 = 0 \quad x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = \frac{-4 \pm 2}{2}$$

$$\begin{array}{c} x_1 = +3 // \\ x_2 = -1 // \end{array}$$

	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f''(x)$	+	-	+	
$f(x)$	\cup	\cap	\cup	

INF INF

Samo je jedan Mali Ivica!

2)

$$f'(x) = \frac{(2x-2)(x-1) - (x^2-2x+2)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-2x-2x+2-x^2+2x-2}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$$


$$f'(x)=0 \Rightarrow x^2-2x=0 \\ x(x-2)=0 \\ x_1=0 \quad x_2=2$$

$f'(x)$	+	-	-	+
$f(x)$	↗	↘	↙	↗

MAX $S_1(0, -2)$
MIN $S_2(2, 2)$

$$3) f''(x) = \frac{(2x-2)(x-1)^2 - (x^2-2x)2(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1)[(x-1)^2 - x^2 + 2x]}{(x-1)^4} = \frac{2(x^2-2x+2-x^2+2x)}{(x-1)^3} = \frac{4}{(x-1)^3}$$

$$f''(x)=0 \Rightarrow 4=0 \Rightarrow \text{nemta tocke infleksige} \\ \rightarrow \text{graf:}$$



$$13. f(x) = \frac{8}{x^2-4}, \text{ tok=?}$$

1) -domäna: $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$

-närbu:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{8}{x^2-4} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{8}{x^2-4} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{8}{x^2-4} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{8}{x^2-4} = +\infty$$

-nultocke: $x=0$

$$2) f'(x) = \frac{-8x^2}{x^2-4} \quad f'(x)=0 \\ -16x=0 \\ x=0$$

-asimptot: → vertikalte:

$$x=2, x=-2$$

→ kose:

$$k_1 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{8}{x^2-4} = 0 \quad \text{NEUTRAL}$$

→ horizontalte:

$$l_1 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{8}{x^2-4} = 0 \quad y=0$$

-parnost: $f(-x) = \frac{8}{(-x)^2-4} = \frac{8}{x^2-4} = f(x) \Rightarrow \text{parna}$


$f'(x)$	+	+	-	-
$f(x)$	↗	↗	↘	↘

MAX $\rightarrow S_1(0, -2)$

$$3) f''(x) = \frac{-16(x^2+4)^2 + 16x \cdot 2(x^2-4)2x}{(x^2-4)^3} = \frac{16(3x^2+4)}{(x^2-4)^3} = 0$$

$$f''(x)=0 \Rightarrow 3x^2+4=0$$

graf:



(14) $f(x) = xe^{-x}$, to k=?

1) - domena: $D_f \in \mathbb{R}$

- na rubu:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

- parnost: $f(-x) = -xe^{-x} \Rightarrow$ ni parna ni neparna- nultočka: $xe^{-x} = 0$

$$x=0 \quad y=0 \quad N(0,0)$$

- asimptote: \rightarrow vertikalne: NEVA \rightarrow kose:

$$k_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$$

$$k_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$$

NEVA

$$l_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

$$l_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} = -\infty$$


2) $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x)$
 $f'(x) = 0 \Rightarrow e^{-x}(1-x) = 0$
 $x=1$

	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	
$f(x)$	\nearrow	\searrow	

MAX $\Rightarrow S(1, \frac{1}{e})$

3.) $f''(x) = -e^{-x}(1-x) + e^{-x} = e^{-x} + 0, \forall x \in \mathbb{R}$

graf:



(15) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, to k=?

1) - domena: $D_f \in (0, \infty)$

- na rubu:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

- asimptote: \rightarrow vertikalne: $x=0$ \rightarrow kose:

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{NEVA}$$

 \rightarrow horizontalne:

$$l = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad y=0$$

- nultočka: $\ln x = 0$

$$\ln x = \ln e^0 \Rightarrow x=1 \quad N(1,0)$$

- parnost: ni parna ni neparna

2) $f'(x) = \frac{1}{x^2} (1 - \ln x)$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - \ln x = 0$$

$$\ln x = 1 \\ \ln x = \ln e \\ x=e$$

	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	-
$f(x)$	\nearrow	\searrow

MAX $\Rightarrow S(e, \frac{1}{e})$

$$3.) f'''(x) = \frac{-2}{x^3} (1 - \ln x) + \frac{1}{x^2} \left(\frac{-1}{x} \right) = \frac{1}{x^3} (2\ln x - 3)$$

$$f'''(x) = 0 \Rightarrow 2\ln x = 3$$


$$\ln x = \frac{3}{2}$$

$$x = e^{\frac{3}{2}}$$

0	$e^{\frac{3}{2}}$	∞
$f''(x)$	-	+
$f(x)$	\wedge	\cup

$$\text{INF} \Rightarrow S_1 \left(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2e^{\frac{3}{2}}} \right)$$

-graf:



$$16. f(x) = \sqrt{x} \ln x, 1.\text{ derivacija}$$

1) - domena: $D_f \in (0, \infty)$

- na rubu:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \ln x = +\infty$$

-asimptote: \rightarrow vertikalne: $x=0$

\rightarrow kose:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = -\infty \text{ NEMA}$$

- povećnost: ni povećani ni nepravilni

- nultočke: $\sqrt{x} \ln x = 0$

$$\ln x = 0 \Rightarrow x = 1 \quad N(1, 0)$$

$$2) f'(x) = \frac{1}{2} \frac{\ln x}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x} \left(\frac{1}{2} \ln x + 1 \right)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \ln x + 1 = 0$$


$$\ln x = -2$$

$$x = e^{-2}$$

0	e^{-2}	∞
$f'(x)$	-	+
$f(x)$	\searrow	\nearrow

$$\text{MIN} \Rightarrow S(e^{-2}, -\frac{2}{e})$$

-graf:



$$17. f(x) = x \arctg x, 1.\text{ derivacija}$$

1) - domena: $D_f \in \mathbb{R}$

- na rubu:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

-asimptote: \rightarrow vertikalne: NEMA

\rightarrow kose:

$$k_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \arctg x = \frac{\pi}{2}$$

$$k_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctg x = -\frac{\pi}{2}$$

$$l_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \arctg x - \frac{\pi}{2} x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\arctg x - \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$= (\infty 0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{arctg} x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2}{1+x^2} = -1$$

$$y = \frac{\pi}{2} x - 1$$

$$l_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x \operatorname{arctg} x + \frac{\pi}{2} x) = -1$$

$$y = -\frac{\pi}{2} x - 1$$

-nultöcke: $x=0$

$$2) f'(x) = \operatorname{arctg} x + \frac{x}{1+x^2}$$


$$f'(x) = 0$$

$$\operatorname{arctg} x = -x \Rightarrow x=0$$

	$-\infty$	0	∞
$f'(x)$	-	+	
$f(x)$	\searrow	\nearrow	

MIN

-graf:



$$18. f(x) = \operatorname{th} \frac{1}{1-x}, 1.\text{dervacija}$$

1) -domena: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

-na rubu:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$$


$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$2) f'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 \left(\frac{1}{1-x} \right)} \cdot \frac{1}{(1-x)^2} \neq 0, \forall x \neq 1 \Rightarrow \text{neutra extrema}$$

-graf:



$$19. f(x) = \operatorname{cth}(x^2 - 1), 1.\text{dervacija}$$

1) -domena: $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

-na rubu:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$$

-asymptote: \rightarrow vertikale $x=1$

\rightarrow kose: NEMA

\rightarrow horizontale: $y=1$

-nultöcke: NEMA


-parnost: $f(-x) = \operatorname{cth}(x^2 - 1) \Rightarrow$ parnos

2) $f'(x) = \frac{-2x}{\sin^2(x^2-1)}$
 $f'(x) = 0 \Rightarrow x=0$

$f'(x)$	+	+	-	-
$f(x)$	\nearrow	\nearrow	\searrow	\searrow

MAX $\rightarrow S(c, \frac{1+e^2}{1-e^2})$

-graf:



(20) $f(x) = (x+1)e^{\frac{1}{2x}}$, 1. derivacija

1) -domena: $Df \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

-na rubu:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2) $f'(x) = e^{\frac{1}{2x}} + (x+1)e^{\frac{1}{2x}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{x^2} = \frac{1}{2x^2} (2x^2 - x - 1)$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2x^2 - x - 1 = 0$$

$$x_{1/2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -\frac{1}{2}$$

$$k_1 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{e^{\frac{1}{2x}}}{x} = 1$$

$$l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x e^{\frac{1}{2x}} + e^{\frac{1}{2x}} - x) = \frac{3}{2}$$

$$y = x + \frac{3}{2}$$

-nultočke: $x+1=0$


$$x=-1 \quad N(-1, 0)$$

$f'(x)$	+	+	-	+
$f(x)$	\nearrow	\searrow	\searrow	\nearrow

MAX: $S_1 \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2e} \right)$

MIN: $S_2 \left(1, 2e \right)$

-graf:



Samo je jedan Mat. Ivić

13. INTEGRALNI RAČUN

13.1. PRIMITIVNA FUNKCIJA I NEODREĐENI INTEGRAL

= Pitanj e: Neka je zadana funkcija f sa $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Postoji li funkcija ($F: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$) za koju vrijedi $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in (a, b)$?

- DEFINICIJA 1.

↪ Kazemo da je $F(x)$ primitivna funkcija od $f(x)$ na intervalu $I = (a, b)$ ako je $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$.

↪ To zapisujemo:

$$\int f(x) dx = F(x)$$

integrand primitive funkcija
(podintegracija funkcija
funkcija)

- PRIMER 1.

a) \hookrightarrow Ako je $f(x) = e^x$, onda je $F(x) = e^x + C$ ili $F(x) = e^x + \frac{1}{e}$

b) \hookrightarrow Ako je $f(x) = x^2$, onda je $F(x) = \frac{x^3}{3} + C$ ili $F(x) = \frac{x^3}{3} + \ln 2$

c) \hookrightarrow Ako je $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, onda je $F(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + C$

- STAVAK 1.

\hookrightarrow Ako su $F_1(x)$ i $F_2(x)$ primitivne funkcije za isti integrand $f(x)$ na $I = (a, b)$, onda je:

$$F_1(x) - F_2(x) = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

DOKAZ:

- Označimo li $\Phi(x) = F_1(x) - F_2(x)$, treba dokazati da je $\Phi(x) = \text{konst.}$

Vrijedi:

$$\Phi'(x) = [F_1(x) - F_2(x)]' = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) + f(x) = 0$$

\downarrow
 $\Phi'(x) = 0$
 \downarrow

$$\Phi(x) = \text{konst.} = C, \quad Q.E.D.$$

= Dakle vrijedi: $F_1(x) = F_2(x) + C, \quad \forall x \in I$

Ako je dakle $F(x)$ neka primitivna funkcija na I , onda je skup svih primitivnih funkcija na I :

$$\{f(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\} = \int f(x) dx$$

- DEFINICIJA 2.

\hookrightarrow Skup svih primitivnih funkcija dane funkcije f na intervalu $I = (a, b)$ nazivamo neodređenim integralom funkcije f na intervalu I i označavamo:

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\} = F(x) + C,$$

što kada zapisujemo:

$$\int f(x) dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

Ova ekvivalentnost vrijedi za $I = (a, b)$ na kojem je $F(x)$ derivabilna.

- STAVAK 2.

\hookrightarrow Temeljica svojstva neodređenih integrala:

1.) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$

DOKAZ: $\frac{d}{dx} [F(x+C)] = F'(x) = f(x)$

$$2) d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx$$

$$3) \int d f(x) = f(x) + C$$

$$\int f'(x) dx = f(x) + C$$

$$4) \int c \cdot f(x) dx = c \cdot \int f(x) dx, c \in \mathbb{R}$$

$$5) \int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

DOKA2:

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx + \int g(x) dx \right] = \frac{d}{dx} [F(x) + C_1 + G(x) + C_2] = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x) // QED.$$

↳ Svojstva 4. i 5. iskazuju da je neodređeni integral tзв. linearni operator jer ima svojstva koje ima i linearne funkcije $L(x) = kx$:

a) aditivnost:

$$L(x+y) = k(x+y) = kx+ky = L(x)+L(y)$$

b) homogenost:

$$L(ax) = k(ax) = kax = a(kx) = a \cdot L(x)$$

= Na temelju stava 2 i obrata tablice derivacija, lako dobijemo tablicu neodređenih integrala:

integral: $\int f(x) dx$	rezultat:
$\int 0 dx$	C
$\int 1 dx$	$x+C$
$\int \frac{dx}{x}$	$\ln x +C$
$\int x^a dx$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}+C$
$\int e^x dx$	e^x+C
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a}+C$
$\int \sin x dx$	$-\cos x+C$
$\int \cos x dx$	$\sin x+C$
$\int \frac{dx}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctgx} x+C$

integral: $\int f(x) dx$	rezultat:
$\int \frac{dx}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x+C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$	$\arcsin\left(\frac{x}{a}\right)+C$
$\int \frac{dx}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right)+C$
$\int \operatorname{sh} x dx$	$\operatorname{ch} x+C$
$\int \operatorname{ch} x dx$	$\operatorname{sh} x+C$
$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x}$	$-\operatorname{ctgh} x+C$
$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\operatorname{th} x+C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$	$\ln x+\sqrt{x^2+a^2} +C$
$\int \frac{dx}{x^2-a^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \frac{ x-a }{ x+a }+C$

DOKA21 FORMULA:

$$1) \int \frac{dx}{x} = \ln|x|+C$$

$$\hookrightarrow \frac{d}{dx} [\ln|x|+C] = (\ln|x|)' = \frac{1}{|x|} \cdot |x|' = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{|x|}{x} = \frac{1}{x} // QED$$

$$2) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln|x+\sqrt{x^2+a^2}|+C$$

$$\hookrightarrow \text{brojući da je: } (\ln|f(x)|)' = \frac{1}{|f(x)|} \cdot \frac{|f(x)|'}{|f(x)|} \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

vrijedi:

$$\begin{aligned} (\ln |x + \sqrt{x^2+a}| + C)' &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2+a}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+a}}\right) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2+a}} \cdot \frac{x + \sqrt{x^2+a}}{\sqrt{x^2+a}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} // \text{ QED} \end{aligned}$$

= PRIMJER 2.

↳ Izračunati sljedeće integrale:

a) $\int (ax^2 + bx + c) dx = \int ax^2 dx + \int bx dx + \int c dx = a \frac{x^3}{3} + b \frac{x^2}{2} + cx + C$

b) $\int (x\sqrt{x+1} + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2+1}) dx = \int (x^{\frac{3}{2}} + 1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2+1}) dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + x + 3 \ln|x| - 4 \arctan x + C$

c) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+5}} = \ln|x + \sqrt{x^2+5}| + C = \ln(x + \sqrt{x^2+5}) + C$

d) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-5}} = \ln|x + \sqrt{x^2-5}| + C$

e) $\int \frac{dx}{99-x^2} = - \int \frac{dx}{x^2-99} = -\frac{1}{2\sqrt{99}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{99}}{x+\sqrt{99}} \right| + C$

= Ako neodređeni integral nije izračun preko elementarnih funkcija, kažemo da se radi o neelementarnom integralu, primjerice:

$\int e^{-x^2} dx, \int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}, \int \sin(x^2) dx \dots$

= STAVAK 3. Metoda supstitucije

↳ Neka je $f(x)$ integrabilna na $[a, b]$, a $\varphi(u)$ neprekidno differencijabilna funkcija na $[d, D]$. Tada je: $\varphi : [d, D] \rightarrow [a, b]$ pravouga je φ inverzna funkcija. Uz supstituciju $x = \varphi(u)$ vrijedi:

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int f(\varphi(u)) \cdot \varphi'(u) du \stackrel{\text{SUPST:}}{=} \int g(u) du = G(u) + C = \\ &= G[\varphi(x)] + C. \end{aligned}$$

= PRIMJER 3.

↳ Izračunati metodom supstitucije integrale:

a) $\int \sin(3x+2) dx = \int \sin u du \stackrel{\text{SUPST:}}{=} \int \sin u du = \frac{1}{3} (-\cos u) + C = -\frac{1}{3} \cos(3x+2) + C$

b) $\int (\sqrt{x+1})^{30} dx = \int u^{30} \cdot 2(u-1) du \stackrel{\text{SUPST:}}{=} \int u^{30} \cdot 2(u-1) du = 2 \cdot \int (u^{31} - u^{30}) du = 2 \frac{u^{32}}{32} - 2 \frac{u^{31}}{31} + C =$

c) $\int \frac{dx}{3x-1} = \int \frac{1}{u} du \stackrel{\text{SUPST:}}{=} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{3} \ln|u| + C = \frac{1}{3} \ln|3x-1| + C$

d) $\int e^{x^2+x+1} (2x+1) dx = \int e^u du \stackrel{\text{SUPST:}}{=} \int e^u du = e^u + C = e^{x^2+x+1} + C$

= PRIMJEDBA 1.

↳ Formulu supstitucije i stavka 3. primjenjujemo s obratnim smjerom onda kada je integrant umnošak složene funkcije $f[\varphi(x)]$ i differencijala $\varphi'(x) dx$. U tom slučaju je:

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ u = \varphi(x) \quad |' \\ du = \varphi'(x) dx \end{array} \right| = \int f(u) du = F(u) + C = F(\varphi(x)) + C$$

↳ Ovaj se postupak često zove i svodeuje pod znak diferencijalca.

=PRIMER 4.

↳ Riješi sljedeće integrale:

$$a) \int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ \cos x = u \quad |' \\ \sin x dx = du \\ dx = \frac{du}{\sin x} \end{array} \right| = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|\cos x| + C$$

$$b) \int \frac{\ln^5 x}{x} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ \ln x = u \quad |' \\ \frac{1}{x} dx = du \\ dx = x du \end{array} \right| = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{\ln^6 x}{6} + C$$

$$c) \int x e^{x^2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ e^{x^2} = u \quad |' \\ e^{x^2} \cdot 2x dx = du \\ dx = \frac{du}{2x \cdot e^{x^2}} \end{array} \right| = \int \frac{du \cdot x}{2 \cdot x} = \int \frac{du}{2} = \frac{1}{2} u + C = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$$

$$d) \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 3} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ e^x = u \quad |' \\ e^x dx = du \\ dx = \frac{du}{e^x} \end{array} \right| = \int \frac{du}{u^2 + \sqrt{3}^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{u}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{e^x}{\sqrt{3}} + C$$

$$e) \int \frac{\sin^3 x}{\cos^5 x} dx = \int \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \operatorname{tg}^3 x \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ \operatorname{tg} x = u \quad |' \\ \frac{1}{\cos^2 x} dx = du \\ dx = \frac{du}{\cos^2 x} \end{array} \right| = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{\operatorname{tg}^4 x}{4} + C$$

$$f) \int \frac{3x dx}{x^4 + 2} = \frac{3}{2} \int \frac{2x dx}{x^4 + 2} = \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2)}{(x^2)^2 + \sqrt{2}^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \arctg \left(\frac{x^2}{\sqrt{2}} \right) + C$$

=STAVAK 4. Parcijalna ili djelomična integracija

↳ Neka su f i g diferencijabilne funkcije na otvorenom intervalu I , onda vrijedi:

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx$$

Oznaćimo li: $u = f(x)$ i $v = g(x)$ imamo:

$$du = f'(x) dx, dv = g'(x) dx,$$

Pa gornju formulu možemo zapisati kao:

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du,$$

pri čemu je $v = \int dv$.

DOKAZ:

$$\frac{d}{dx} \left[f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \right] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = f(x)g'(x), \text{ QED}$$

=PRIMER 5.

↳ Izračunaj metodom parcijalne integracije sljedeće integrale:

$$a) \int x e^x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \quad |' \\ du = 1 dx \\ dv = e^x dx \quad |' \\ v = \int e^x dx = e^x \end{array} \right| = xe^x - \int e^x dx = xe^x + e^x + C = e^x(x+1) + C$$

↳ Da gau uzelj obrnuto: $u = e^x$, a $dv = x$, parcijalna integracija neli imala svrhu

jer bi se integral (podintegralna funkcija) zakomplificirao, tj. bio bi komplificiraniji od zadatog.

- * TRIKOVCI:
- ako je u integralu jedna od funkcija $\ln x, \operatorname{arcsin} x, \operatorname{arsh} x$, onda je to uvijek u, a dx je ostatak
 - ako je u integralu x sa metkom od gore navedenih funkcija, onda je on uvijek u, a dx je ostatak

$$b) \int \ln x \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln x \\ dv = \frac{1}{x} \, dx \\ du = \frac{1}{x} \, dx \\ dv = dx \end{array} \right| = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C$$

$$c) \int \ln^2 x \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln^2 x \\ dv = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ du = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ dv = dx \end{array} \right| = x \ln^2 x - \int 2x \ln x \cdot \frac{1}{x} \, dx =$$

$$\begin{aligned} &= x \ln^2 x - \int 2x \ln x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln^2 x - \int 2 \ln x \, dx = x \ln^2 x - 2 \int \ln x \, dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} u = \ln x \\ dv = \frac{1}{x} \, dx \\ du = \frac{1}{x} \, dx \\ dv = dx \end{array} \right| = x \ln^2 x - 2(x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx) = \\ &= x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + C = x(\ln^2 x - 2 \ln x + 2) + C \end{aligned}$$

$$d) \int \operatorname{arcsin} x \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arcsin} x \\ dv = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \\ du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \\ dv = dx \end{array} \right| = x \operatorname{arcsin} x - \int \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ 1-x^2=t \\ -2x \, dx = dt \\ dx = \frac{-dt}{2x} \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned} &= x \operatorname{arcsin} x - \int \frac{-dt}{2\sqrt{t}} = x \operatorname{arcsin} x + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{t} + C = \\ &= x \operatorname{arcsin} x + \sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

$$e) \int \operatorname{arsh} x \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arsh} x \\ dv = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \\ du = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \\ dv = dx \end{array} \right| = x \operatorname{arsh} x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x^2+1=t \\ 2x \, dx = dt \\ dx = \frac{dt}{2x} \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned} &= x \operatorname{arsh} x - \int \frac{dt}{2\sqrt{t}} = x \operatorname{arsh} x - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{t} + C = x \operatorname{arsh} x - \sqrt{x^2+1} + C. \end{aligned}$$

$$f) \int x^2 \sin x \, dx = \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ dv = 2x \, dx \\ du = 2x \, dx \\ dv = \sin x \, dx \end{array} \right| = -x^2 \cos x - \int -2x \cos x \, dx =$$

$$\begin{aligned} &= \left| \begin{array}{l} u = 2x \\ dv = 2 \, dx \\ du = 2 \, dx \\ dv = \cos x \, dx \end{array} \right| = -x^2 \cos x + 2x \sin x - \int 2 \sin x \, dx = \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C \end{aligned}$$

= PRIMJER 6.

↳ izračunaj integral:

$$I = \int e^{\alpha x} \cos(\beta x) \, dx = \left| \begin{array}{l} u = e^{\alpha x} \\ dv = \cos(\beta x) \, dx \\ du = \alpha e^{\alpha x} \, dx \\ dv = \cos(\beta x) \, dx \end{array} \right| =$$


$$\begin{aligned} &= e^{\alpha x} \frac{\sin(\beta x)}{\beta} - \int \frac{\alpha e^{\alpha x}}{\beta} \sin(\beta x) \, dx = e^{\alpha x} \frac{\sin(\beta x)}{\beta} - \frac{\alpha}{\beta} \int e^{\alpha x} \sin(\beta x) \, dx = \end{aligned}$$

Samo je jedan Mali Ivica!



$$\begin{aligned}
 & \left| \begin{array}{l} u = e^{\alpha x} \\ dv = \sin(Bx) dx \\ du = \alpha e^{\alpha x} dx \\ v = \int \sin(Bx) dx = -\frac{\cos(Bx)}{B} \end{array} \right| = \\
 & = e^{\alpha x} \left[\frac{\sin(Bx)}{B} + \frac{\alpha e^{\alpha x}}{B^2} \cdot \cos(Bx) - \frac{\alpha^2}{B^2} \int e^{\alpha x} \cos(Bx) dx \right] \\
 & I = \frac{e^{\alpha x} / B \sin(Bx) + e^{\alpha x} \alpha \cos(Bx)}{B^2} - \frac{\alpha^2}{B^2} I \\
 & I B^2 = e^{\alpha x} (B \sin(Bx) + \alpha \cos(Bx)) - \alpha^2 I \\
 & I (B^2 + \alpha^2) = e^{\alpha x} (B \sin(Bx) + \alpha \cos(Bx)) \\
 & I = \frac{e^{\alpha x} [B \sin(Bx) + \alpha \cos(Bx)]}{\alpha^2 + B^2} + C
 \end{aligned}$$

13.2. ODREĐENI INTEGRAL

= Problem nalaženja ploštine lika koji omeđuju krivulje (lik = pseudotrapez)



= Algoritam nalaženja ploštine P:



→ Ideja: Podijelimo interval $[a, b]$ na više dijelova, i u svakome nademo najmanju i najveću vrijednost funkcije i načinimo odgovarajuće pravokutnike.

↳ Zbroj pravokutnika s minimalnim visinama bit će manji od tražene površine, a zbroj pravokutnika s maksimalnim visinama veći od nje.

- Sto manje intervala uzimamo zbroj će biti bliži stvarnoj površini.

= Neka je f omeđena funkcija na intervalu $[a, b]$, te Δ neka razdioba intervala I . Sada označimo $m_i = \min_{I_i} f$, $M_i = \max_{I_i} f$, minimum i maximum funkcije f na I_i , za $i=1, \dots, n$.

↳ Vrijedi: $D_\Delta = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta_i x \rightarrow$ donja integralna suma

$S_\Delta = \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta_i x \rightarrow$ gornja integralna suma

$\sigma_\Delta = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta_i x \rightarrow$ integralna suma

↳ Sada očeviđamo vrijedi:

$$m(b-a) \leq I_\Delta \leq S_\Delta \leq M(b-a)$$

=DEFINICIJA 1.

↳ Neka je funkcija f omeđena na intervalu $[a, b] = I$. Realni broj:

$$(1) I_* = I_*(f, [a, b]) = \sup \{ I_\Delta \mid \Delta - \text{razdoba na } I \}$$

- zove se donji Riemannov integral

$$(2) I^* = I^*(f, [a, b]) = \inf \{ S_\Delta \mid \Delta - \text{razdoba na } I \}$$

- zove se gornji Riemannov integral

↳ Očeviđuje se:

$$I_\Delta \leq I_* \leq I^* \leq S_\Delta$$

za svaku razdobu Δ .

↳ Kažemo da je f integrabilna na $I = [a, b]$ (u Riemannovom smislu), ako je $I_* = I^* = I$. U tom slučaju pišemo:

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

=PRIMJEDBA 1.


↳ Ora oznaka: $\int_a^b f(x) dx$ dolazi od izraza: $S_\Delta = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta_i x$, zauvejujući grčka slova: Σ, ξ, Δ , sa latinskim: \int, x, d .

=STAVAK 1.

a) Ako je funkcija f neprekidna funkcija na $I = [a, b]$, onda je funkcija f integrabilna na $[a, b]$.

b) Ako je funkcija f omeđena na $I = [a, b]$; na njemu ima samo konicani broj točaka prekida, onda je funkcija f integrabilna na $[a, b]$,

primjerice:



=DEFINICIJA 2.

↳ Vrijedi: a) $\int_a^a f(x) dx := 0$

$$\text{b)} \int_a^a f(x) dx := - \int_b^a f(x) dx$$


=STAVAK 2. Pravila integriranja

1) Ako je f integrabilna na $[a, b]$ onda je integrabilna na svakom intervalu: $[x_1, x_2] \subseteq [a, b]$.

2) Ako je $a < c < b$ i ako je f integrabilna na $[a, c]$ i $[c, b]$ onda je:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

↳ Grafički:



3) Vrijedi aditivnost: $\int_a^b [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx$

4) Vrijedi homogenost: $\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx, \forall c \in \mathbb{R}$

13.3 STAVAK O SREDNJOJ VRIJEĐOSTI INTEGRALNOG RAČUNA. LEIBNIZ-NEWTONOVA FORMULA.

= STAVAK 1. Stavak o srednjoj vrijednosti integralnog računa

↳ Neka je funkcija f neprekidna na intervalu $I = [a, b]$. Onda postoji $\xi \in (a, b)$ tako da daje:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f(\xi)$$


DOKAZ:

$$\begin{aligned} \text{↳ } m(b-a) &\leq \Delta_d \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad /:(b-a) \\ m &\leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M \end{aligned}$$

↳ Znamo da funkcija neprekidna na zatvorenom intervalu prima na tom intervalu svaku vrijednost među m i M . Dakle, za neki $\xi \in (a, b)$

$$\text{Vrijednost: } f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}. \quad \text{Q.E.D.}$$

↳ Geometrijska interpretacija:




= STAVAK 2.

↳ Neka je funkcija f neprekidna na $I = [a, b]$, te $x \in I$. Onda je:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(x) dx$$

diferencijabilna funkcija na I i vrijedi: $\Phi'(x) = f(x)$.

↳ Skica:



DOKAZ:

$$\begin{aligned} \rightarrow \Phi(x+\Delta x) - \Phi(x) &= \int_a^{x+\Delta x} f(x) dx - \int_a^x f(x) dx = \int_a^x f(x) dx + \int_x^{x+\Delta x} f(x) dx - \int_a^x f(x) dx = \\ &= \int_a^{x+\Delta x} f(x) dx = \Delta x \cdot f(\xi), \quad \xi \in (x, x+\Delta x). \end{aligned}$$

→ Suda je:

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+\Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \cdot f(\xi)}{\Delta x} = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$$

QED.

=STAVAK 3.

↳ Opisuje vezu između određenog i neodređenog integrala:

$$\int_a^x f(x) dx = \int f(x) dx + C,$$

tj. neodređeni integral je jednaka je određenom kome je go-
rujuća granica upravo međavim varijablama.

=STAVAK 4. Leibniz-Newtonova formula

↳ Neka je funkcija f neprekidna na $[a, b]$, te F bilo koja primitiva funkcije od $f(x)$ na $[a, b]$. Onda je:

$$\int_a^x f(x) dx = F(b) - F(a) \underset{a}{\overset{b}{=}} F(x), \text{ za } F'(x) = f(x)$$

DOKAZ: → Po stavku 3 slijedi:

$$\int_a^x f(x) dx = \Phi(x) = F(x) + C,$$

jer su F i Φ primitivne funkcije iste funkcije f , pa se razli-
kuju za konstantu C .

→ Iz drugačia:

$$0 = \int_a^a f(x) dx = \Phi(a) = F(a) + C,$$

slijedi da je $C = F(a)$

→ Dakle je:

$$\Phi'(x) = F(x) - F(a), \text{ tj.}$$

$$\Phi(b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Q.E.D.

=PRIMJER 1.

↳ Izračunaj određeni integral:

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} + \frac{a^3}{3} = \frac{b^3 - a^3}{3}$$

13.4. PARCIJALNA INTEGRACIJA / SUPSTITUCIJA U ODREĐENOM INTEGRALU

=STAVAK 1. Parcijalna integracija

↳ Neka su f i g neprekidne diferencijabilne funkcije na $[a, b]$. Onda je:

$$\int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx = [f(x) g(x)] \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

= STAVAK 2. Supstitucija

↳ Neka je f neprekidna na $I = [a, b]$, diferencijabilna, neprekidna i injektivna na intervalu $I^* = [\alpha, \beta]$, te neka je $\varphi(I^*) \subseteq I$. Onda je, $v \in \text{ranje } \varphi$:

$$x = \varphi(v)$$

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(u)) \varphi'(u) du$$

$$G: \varphi(\beta) \Rightarrow \varphi(u_2) = \varphi(\beta) \Rightarrow u_2 = \beta$$

$$D: \varphi(\alpha) \Rightarrow \varphi(u_1) = \varphi(\alpha) \Rightarrow u_1 = \alpha$$

=PRIMJER 1.

↳ Riješi integrale:

$$a) \int_0^1 x e^x dx = x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x \cdot 1 dx = 1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0 - \int_0^1 e^x dx = e - e^0 \Big|_0^1 = e - e^1 + e^0 = 1$$

$$\begin{aligned}
 b) \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx &= \left| \begin{array}{l} \text{supst:} \\ x = \cos t \\ dx = -\sin t dt \\ x_1 = 0 \rightarrow 0 = \cos t \Rightarrow t_1 = \frac{\pi}{2} \\ x_2 = 1 \rightarrow 1 = \cos t \Rightarrow t_2 = 0 \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{1-\cos^2 t} (-\sin t) dt = \\
 &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{\sin^2 t} \sin t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos(2t)}{2} dt = \frac{1}{2} \left(t - \frac{\sin(2t)}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) - \frac{1}{2} (0 - 0) = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

= PRIMJER 2.

↳ Nadi rekurzivnu formulu za:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, n \geq 2.$$

$$- I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^0 x dx = \frac{\pi}{2}$$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -0 + 1 = 1$$

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \sin x dx = \sin^{n-1} x (-\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos x) (n-1) \sin^{n-2} x \cos x dx = \\
 &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cdot (1-\sin^2 x) dx = \\
 &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \\
 &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n, \quad I_n = (n+n-1) = (n-1) I_{n-2} / n
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} \Downarrow \\ I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2 \\ I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1. \end{array}$$

= PRIMJER 3.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x dx = \frac{5}{6} I_4 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot I_0 = \frac{5\pi}{32}$$

= PRIMJEDBA!

↳ ista formula vrijedi i za:

$$\begin{array}{c} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \frac{n+1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2 \\ I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1. \end{array}$$

= PRIMJER 4.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x dx = \frac{6}{7} I_5 = \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot I_1 = \frac{16}{35}$$

ZADACI

$$\textcircled{1} \quad \text{a) } \int \frac{2x+1}{x^4} dx = \int \frac{2x}{x^4} dx + \int \frac{1}{x^4} dx = \int 2x^{-3} dx + \int x^{-4} dx = 2 \frac{x^{-2}}{-2} + \frac{x^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{3x^3} + C //$$

$$\text{b) } \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx - \int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^2} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx - \int x^{-\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{-\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + \frac{2}{\sqrt{x}} + C$$

$$\textcircled{2} \quad \text{a) } \int_0^1 x(2x+1)^5 dx = \begin{cases} \text{SUPST:} \\ 2x+1=t \Rightarrow x=\frac{t-1}{2} \\ 2dx=dt \\ dx=\frac{dt}{2} \\ G: t=3 \\ D: t=1 \end{cases} = \int_1^3 \frac{t-1}{2} t^5 \frac{dt}{2} = \frac{1}{4} \int_1^3 (t^6 - t^5) dt = \frac{1}{4} \left(\frac{t^7}{7} - \frac{t^6}{6} \right) \Big|_1^3 = \frac{1}{4} \left[\left(\frac{3^7}{7} - \frac{3^6}{6} \right) - \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{6} \right) \right] = \frac{1}{4} \left[\frac{3^7 - 1}{7} + \frac{1 - 3^6}{6} \right] //$$

$$\text{b) } \int_0^1 x \sqrt{3x+1} dx = \begin{cases} \text{SUPST:} \\ 3x+1=t \Rightarrow x=\frac{t-1}{3} \\ 3dx=dt \\ dx=\frac{dt}{3} \\ G: t=4 \\ D: t=1 \end{cases} = \int_1^4 \frac{t-1}{3} \sqrt{t} \frac{dt}{2} = \frac{1}{6} \left(\int_1^4 t^{\frac{3}{2}} dt - \int_1^4 t^{\frac{1}{2}} dt \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_1^4 = \frac{1}{6} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \right) = \frac{1}{6} \left[\frac{2\sqrt{4^5}}{5} - \frac{2\sqrt{4^3}}{3} \right] - \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{2\sqrt{4^5} + 2}{5} + \frac{2 - 2\sqrt{4^3}}{3} \right)$$

$$\textcircled{3} \quad \text{a) } \int_0^3 x \sqrt{4-x^2} dx = \begin{cases} \text{SUPST:} \\ 4-x^2=t \\ -2xdx=dt \\ dx=-\frac{dt}{2} \\ G: t=1 \\ D: t=4 \end{cases} = \int_4^1 -\frac{dt}{2} \sqrt{t} = -\frac{1}{2} \int_4^1 t^{\frac{1}{2}} dt = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_4^1 = -\frac{1}{3} \sqrt{t^3} \Big|_4^1 = -\frac{1}{3} (1 - \sqrt{4^3}) = \frac{7}{3} //$$

$$\text{b) } \int_0^3 \frac{x dx}{\sqrt{x^2+1}} = \begin{cases} \text{SUPST:} \\ x^2+1=t \\ 2xdx=dt \\ dx=\frac{dt}{2x} \\ G: t=4 \\ D: t=1 \end{cases} = \int_1^4 \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2} \int_1^4 t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} \cdot 2 t^{\frac{1}{2}} \Big|_1^4 = \sqrt{t} \Big|_1^4 = 2 - 1 = 1 //$$

$$\textcircled{4} \quad \text{a) } \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} dx = \begin{cases} \text{SUPST:} \\ e^x+1=t \Rightarrow e^x=dt \\ e^x dx=dt \\ dx=\frac{dt}{e^x} \end{cases} = \int \frac{t-1}{\sqrt{t}} dt = \int t^{\frac{1}{2}} dt - \int t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} - 2t^{\frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{t^3}}{3} - 2\sqrt{t} = \frac{2\sqrt{(e^x+1)^3}}{3} - 2\sqrt{e^x+1} + C //$$

$$\text{b) } \int \frac{\ln^3 x}{x} dx = \begin{cases} \text{SUPST:} \\ \ln x=t \\ \frac{1}{x} dx=dt \\ dx=xdt \end{cases} = \int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C = \frac{\ln^4 x}{4} + C$$

$$\textcircled{5} \quad \text{a) } \int \operatorname{ctg}^2 x dx = \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{1-\sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx - \int dx = -\operatorname{ctg} x - x + C$$

$$\text{b) } \int \operatorname{th}(2x) dx = \int \frac{\operatorname{sh} 2x}{\operatorname{ch} 2x} dx = \begin{cases} \text{SUPST:} \\ \operatorname{ch} 2x=t \\ 2\operatorname{sh} 2x dx=dt \\ dx=\frac{dt}{2\operatorname{sh} 2x} \end{cases} = \int \frac{dt}{2t} = \frac{1}{2} \ln |t| + C = \frac{1}{2} \ln |\operatorname{ch}(2x)| + C$$

$$\begin{aligned}
 6. & \int_1^e (x^2 - 2x + 3) \ln x \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln x \\ dv = \frac{1}{x} dx \\ du = \frac{1}{x} dx \\ dv = (x^2 - 2x + 3) dx \end{array} \right| = \\
 & = \left[\ln x \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x \right) \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x \right) dx = \ln e \left(\frac{e^3}{3} - e^2 + 3e \right) - \ln \left(\frac{1^3}{3} - 1 + 3 \right) - \\
 & - \int_1^e \frac{x^2}{3} dx + \int_1^e x dx - \int_1^e 3 dx = \left. \frac{e^3}{3} - e^2 + 3e - \frac{1}{8} \frac{x^3}{3} \right|_1^e + \left. \frac{x^2}{2} \right|_1^e - 3x \Big|_1^e = \\
 & = \frac{e^3}{3} - e^2 + 3e - \frac{e^3}{9} + \frac{1}{9} + \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - 3e + 3 = \frac{2e^3}{9} - \frac{e^2}{2} - \frac{47}{18} //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. & \int_0^4 x^5 \sqrt{x^2 + 1} \, dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x^2 + 1 = t \Rightarrow x = \sqrt{t-1} \\ 2x \, dx = dt \\ dx = \frac{dt}{2x} \\ D: t=1 \\ G: t=4 \end{array} \right| = \int_1^4 \sqrt{t-1}^4 \cdot \sqrt{t} \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int_1^4 (t-1)^2 \sqrt{t} \, dt = \\
 & = \frac{1}{2} \int_1^4 (t^2 - 2t + 1) \sqrt{t} \, dt = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{7} t^{\frac{7}{2}} - 2 \cdot \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 = \\
 & = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \sqrt{t}^7 - \frac{4}{5} \sqrt{t}^5 + \frac{2}{3} \sqrt{t}^3 \right) \Big|_1^4 //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8. & \int_0^{16} \frac{dx}{(1+\sqrt[4]{x})^2} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ t = \sqrt[4]{x} \Rightarrow x = t^4 \\ dx = 4t^3 dt \\ G: t=2 \\ D: t=0 \end{array} \right| = \int_0^2 \frac{4t^3}{(1+t^2)^2} dt = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ 1+t^2 = u \\ dt = du \\ G: t=3 \\ D: t=1 \end{array} \right| = \int_1^3 \frac{4(u-1)^3}{u^2} du = \int_1^3 4(u^3 - 3u^2 + 3u - 1) \, du = \\
 & = 4 \int_1^3 \left(u^3 - 3u^2 + 3u - 1 \right) du = 4 \left(\frac{u^4}{4} - 3u^3 + 3u^2 - u \right) \Big|_1^3 = 4 \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} - 9 + 3 + 3(\ln 3 + \right. \\
 & \quad \left. + \frac{1}{3} - 1 \right) = -\frac{32}{3} + 12 \ln 3 //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9. & \int_0^1 \frac{x^2 dx}{x^6 + 1} = \int_0^1 \frac{x^2 dx}{(x^3)^2 + 1} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x^3 = t \\ 3x^2 dx = dt \\ dx = \frac{dt}{3x^2} \\ G: t=1 \\ D: t=0 \end{array} \right| = \int_0^1 \frac{dt}{3(t^2+1)} = \frac{1}{3} \arctan t \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10. & \int_0^1 \ln(2x+1) \, dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ 2x+1=t \\ 2dx=dt \\ dx = \frac{dt}{2} \\ G: 3=t \\ D: 1=t \end{array} \right| = \int_1^3 \frac{t \ln t}{2} dt = \frac{1}{2} \int_1^3 t \ln t \, dt = \left| \begin{array}{l} u = \ln t \\ du = \frac{1}{t} dt \\ v = t \\ dv = dt \end{array} \right| = \\
 & = \frac{1}{2} \left[t \ln t - \int t \frac{1}{t} dt \right] = \frac{1}{2} \left[t \ln t - t \right] \Big|_1^3 = \\
 & = \frac{1}{2} (3 \ln 3 - 3 - 0 + 1) = \frac{3 \ln 3 - 2}{2} = \frac{3}{2} \ln 3 - 1 //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11. & \int \frac{\cos^3 x \, dx}{\sqrt{\sin x}} = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} \cdot \cos^2 x \, dx = \int \frac{\cos x (1-\sin^2 x)}{\sqrt{\sin x}} \, dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ t = \sin x \\ dt = \cos x \, dx \\ dx = \frac{dt}{\cos x} \end{array} \right| = \int \frac{1-t^2}{\sqrt{t}} dt = \\
 & = \int t^{-\frac{1}{2}} dt - \int t^{\frac{3}{2}} dt = 2t^{\frac{1}{2}} - \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + C = 2\sqrt{\sin x} - \frac{2}{5} \sqrt{\sin^5 x} + C //
 \end{aligned}$$

$$(12) \int x^2 \sin(3x) dx = \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ dv = \sin(3x) dx \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} du = 2x dx \\ v = \int \sin(3x) dx = -\frac{\cos(3x)}{3} \end{array} \right| = -\frac{x^2 \cos(3x)}{3} +$$

$$+ \int \frac{2x \cos(3x)}{3} dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \cos(3x) dx \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} du = dx \\ v = \int \cos(3x) dx = \frac{\sin(3x)}{3} \end{array} \right| = -\frac{x^2 \cos(3x)}{3} + \frac{2}{3} \left[\frac{x \sin(3x)}{3} \right] -$$

$$- \int \frac{\sin(3x)}{3} dx = \frac{-x^2 \cos(3x)}{3} + \frac{2x \sin(3x)}{9} + \frac{2 \cos(3x)}{27} + C //$$

$$(13) \int x \sin^2 x dx = \left| \begin{array}{l} u = \sin^2 x \\ dv = x dx \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} du = 2 \sin x \cdot \cos x = \sin(2x) dx \\ v = \int x dx = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| = \frac{x^2 \sin^2 x}{2} - \int \frac{x^2 \sin(2x)}{2} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ dv = \sin(2x) dx \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} du = 2x dx \\ v = \int \sin(2x) dx = -\frac{\cos(2x)}{2} \end{array} \right| = \frac{x^2 \sin^2 x}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{-\cos(2x) x^2}{2} - \int x \cos(2x) dx \right] =$$

$$= \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \cos(2x) dx \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} du = dx \\ v = \int \cos(2x) dx = \frac{\sin(2x)}{2} \end{array} \right| = \frac{x^2 \sin^2 x}{2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\cos(2x) x^2}{2} - \left(\frac{x \sin(2x)}{2} - \right. \right.$$

$$\left. \left. - \int \frac{\sin(2x)}{2} dx \right) \right] = \frac{x^2 \sin^2 x}{2} + \frac{x^2 \cos(2x)}{4} - \frac{x \sin(2x)}{4} - \frac{\cos(2x)}{8} + C //$$

$$(14) \int \frac{x dx}{\sin^2 x} = \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \frac{1}{\sin^2 x} dx \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} du = dx \\ v = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x \end{array} \right| = -x \operatorname{ctg} x + \int \operatorname{ctg} x dx =$$

$$= -x \operatorname{ctg} x + \int \frac{\operatorname{cosec} x}{\sin x} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUST: } \\ \sin x = t \\ \cos x dx = dt \\ dx = \frac{dt}{\cos x} \end{array} \right| = -x \operatorname{ctg} x + \int \frac{dt}{t} = -x \operatorname{ctg} x +$$

$$+ \ln|\sin x| + C //$$

$$(15) \int x \operatorname{tg}^2 x dx = \int x \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int x \frac{(1-\cos^2 x)}{\cos^2 x} dx = \int x \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \frac{1}{\cos^2 x} dx \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} du = dx \\ v = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x \end{array} \right| = x \operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg} x dx - \frac{x^2}{2} = x \operatorname{tg} x - \frac{x^2}{2} - \int \frac{\sin x}{\cos x} dx =$$

$$+ \left| \begin{array}{l} \text{SUST: } \\ \cos x = t \\ -\sin x dx = dt \\ dx = -\frac{dt}{\sin x} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \sin x = t \\ \cos x dx = dt \\ dx = -\frac{dt}{\sin x} \end{array} \right| = x \operatorname{tg} x - \frac{x^2}{2} + \int \frac{dt}{t} = x \operatorname{tg} x - \frac{x^2}{2} + \ln|\cos x| + C //$$

$$(16) \int_0^1 e^{-\sqrt{x}} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUST: } \\ -\sqrt{x} = t \\ x = t^2 \\ dx = 2tdt \\ G: t=1 \\ D: t=0 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} -1 \\ 0 \end{array} \right| = 2 \int_0^1 t e^t dt = \left| \begin{array}{l} u = t \\ dv = e^t dt \\ du = dt \\ v = \int e^t dt = e^t \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 1 \\ 0 \end{array} \right| = 2 \left(t e^t \Big|_0^1 + \int_0^1 e^t dt \right) =$$

$$= 2 \left(t e^t \Big|_0^1 - e^t \Big|_0^1 \right) = 2 \left[(-1e^{-1} - 0) - (e^{-1} - e^0) \right] = \left[\frac{1}{e} - \frac{1}{e} + 1 \right] \cdot 2 = -\frac{4}{e} + 2 //$$

(17.)

$$\int \ln(\sin x) \cos x \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln(\sin x), \quad du = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x \, dx \\ dv = \cos x \, dx \quad v = \int \cos x \, dx = \sin x \end{array} \right| =$$

$$= \ln(\sin x) \cdot \sin x - \int \frac{\sin x \cos x}{\sin x} \, dx = \sin x \ln(\sin x) + \sin x + C //$$

(18.)

$$\int \sin x \cosh x \, dx = I$$

$$I = \int \sin x \cosh x \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx \\ dv = \cosh x \, dx \quad v = \int \cosh x \, dx = \sinh x \end{array} \right| = \sin x \sinh x - \int \cos x \sinh x \, dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} u = \cos x, \quad du = -\sin x \, dx \\ dv = \sinh x \, dx \quad v = \int \sinh x \, dx = \cosh x \end{array} \right| = \sin x \sinh x - \cos x \cosh x - \underbrace{\int \sin x \cosh x \, dx}_I$$

$$I = \sin x \sinh x - \cos x \cosh x - I$$

$$2I = \sin x \sinh x - \cos x \cosh x$$

$$I = \frac{\sin x \sinh x - \cos x \cosh x}{2} + C //$$

$$(19.) I = \int \sin(lux) \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \sin(lux), \quad du = \cos(lux) \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ dv = dx \quad v = \int dx = x \end{array} \right| = x \sin(lux) - \int \frac{x \cos(lux)}{x} \, dx =$$

$$= x \sin(lux) - \int \cos(lux) \, dx = \left| \begin{array}{l} u = \cos(lux), \quad du = -\sin(lux) \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ dv = dx \quad v = \int dx = x \end{array} \right| =$$

$$= x \sin(lux) - x \cos(lux) - \int \frac{x \sin(lux)}{x} \, dx = x \sin(lux) - x \cos(lux) - \underbrace{\int \sin(lux) \, dx}_I$$

$$I = x \sin(lux) - x \cos(lux) - I$$

$$2I = x \sin(lux) - x \cos(lux)$$

$$I = \frac{x}{2} (\sin(lux) - \cos(lux)) + C //$$

234-

$$(20) I = \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx = \left| u = |\ln x| \quad du = \frac{|\ln x|}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} dx \right| = x |\ln x| \Big|_{\frac{1}{e}}^e - \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{|\ln x|}{\ln x} dx$$

1. slučaj: $x > 1 \Rightarrow$

$$I = x \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^e - \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{\ln x}{\ln x} dx = x \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^e - x \Big|_{\frac{1}{e}}^e =$$

$$= e \ln e - \frac{1}{e} \ln e^{-1} - e + \frac{1}{e} = \frac{1}{e} + \frac{1}{e} = \frac{2}{e} //$$

2. slučaj: $0 < x < 1 \Rightarrow$

$$I = -x \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^e - \int_{\frac{1}{e}}^e -\frac{\ln x}{\ln x} dx = -x \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^e + x \Big|_{\frac{1}{e}}^e =$$

$$= -e \ln e + \frac{1}{e} \ln e^{-1} + e - \frac{1}{e} = -\frac{1}{e} - \frac{1}{e} = -\frac{2}{e} //$$

14. INTEGRIRANJE NAJVAŽNIJIH TIPOVA INTEGRALA

14.1. INTEGRALI RACIONALNIH FUNKCIJA

= Racionalna funkcija $f(x)$ je funkcija oblike: $f(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$.

Ako je: 1) $n < m$, onda je $f(x)$ prava racionalna funkcija;
 2) $n \geq m$, onda je $f(x)$ neprava racionalna funkcija.

Nepрава рационална функција се дробом бројника с мањим номенклатуром своди на цјели dio и праву razlomljenu cijelu funkciju:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = R_{n-m}(x) + \frac{\phi(x)}{Q_m(x)}$$

-PRINTER 1

$$\rightarrow \text{Podijeli: } \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 - 1}{x^2 + 3}$$

$$\begin{array}{r} (x^4 - 2x^3 + x^2 - 1) : (x^2 + 3) = x^2 - 2x - 2 \\ \hline -x^4 & +3x^2 \\ \hline -2x^3 & -2x^2 - 1 \\ +2x^3 & +6x \\ \hline -2x^2 & +6x - 1 \\ +2x^2 & +6 \\ \hline 6x & +5 \end{array} \Rightarrow \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 - 1}{x^2 + 3} = (x^2 - 2x - 2) + \frac{6x + 5}{x^2 + 3}$$

= S obzirom da je integrirajući cijelog dijela racionalne funkcije elementarni, problem integriranja racionalne funkcije svodi se na integral pravog racionalnog razlomka.

= STAVAK I.

↳ Svaki realni polinom $Q_m(x)$ ima rastav na jednoznačno određene linearne kvadratne realne faktore u obliku:

$$Q_m(x) = a_m \prod_{i=1}^f (x-x_i)^{\alpha_i} \cdot \prod_{j=1}^s (x^2 + p_j x + q_j)^{\beta_j},$$

$$v^2 : \sum_{i=1}^r d_i + 2 \sum_{j=1}^s \beta_j = m, \quad p_j^{d_j} - q_j < 0 \text{ for } j=1, 2, \dots, s$$

=PRIMER 2

↳ Rastavi na faktore :

$$a) \quad x^6 - 1 = (x^3 - 1)(x^3 + 1) = (x - 1)(x^2 + x + 1)(x + 1)(x^2 - x + 1) = \\ = (x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) =$$

$$5) x^9 + x^6 - x^3 - 1 = x^6(x^3+1) - (x^3+1) = (x^3+1)(x^6-1) = (x^3+1)(x^3+1)(x^3-1) = (x^3+1)^2(x^3-1) = \\ = [(x+1)(x^2-x+1)]^2 \cdot (x-1) \cdot (x^2+x+1) = \\ = (x+1)^2(x-1)^2(x^2-x+1)^2 \cdot (x^2+x+1)$$

= STAVAK 2

↳ Neka je $Q_m(x) = \prod_{i=1}^r (x-x_i)^{d_i} \cdot \prod_{j=1}^s (x^2+p_j x+q_j)$. Onda za pravu racionalnu

funkciju $f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ imamo ovaj jednoznačno određen rastav na parajalne razlomke:

$$(*) \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{P_n(x)}{\prod_{i=1}^r (x-x_i)^{d_i} \cdot \prod_{j=1}^s (x^2 + p_j x + g_j)^{B_j}} =$$

$$= \sum_{i=1}^r \left[\frac{A_{i1}^{(i)}}{(x-x_i)} + \dots + \frac{A_{id_i}^{(i)}}{(x-x_i)^{d_i}} \right] + \sum_{j=1}^s \left[\frac{B_{j1}^{(j)} x + C_{j1}^{(j)}}{x^2 + p_j x + g_j} + \dots + \frac{B_{jB_j}^{(j)} x + C_{jB_j}^{(j)}}{(x^2 + p_j x + g_j)^{B_j}} \right]$$

U formuli (*) koeficijenti $A_1^{(1)}, \dots, A_{d_1}^{(1)}, \dots, A_1^{(s)}, \dots, A_{d_s}^{(s)}$ jednoznačno su određeni, a dobivanih tako da obje strane gornjeg identiteta svedemo na celi oblik; zatim primjenjujući metode neodređenih koeficijenata, tj. razdvajajući koeficijente s istim stupnjem varijable x ili tako da u jednačbu vrstavimo za x neki odabran brojev.

= PRIMJER 3.

Rastavi na pravljive razlomke:

$$a) \frac{4x^2+1}{(x-1)^3(x^2+x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} + \frac{Dx+E}{(x^2+x+1)} + \frac{Fx+G}{(x^2+x+1)^2}$$

$$b) \frac{x^3+11}{x^3(x+1)(x-1)^2(x^2+x+4)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{(x+1)} + \frac{E}{(x-1)} + \frac{F}{(x-1)^2} + \frac{Gx+H}{x^2+x+4} + \frac{Ix+J}{(x^2+x+4)^2}$$

= PRIMJER 4.

Rastavi na pravljive razlomke i izračunaj koeficijente i integral.

$$a) f(x) = \frac{1}{x^2-a^2}$$

$$\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{(x-a)(x+a)} = \frac{A}{(x-a)} + \frac{B}{(x+a)} \quad |(x^2-a^2)$$

$$1 = A(x+a) + B(x-a)$$

→ metoda neodređenih koeficijenata:

(I) 1. način:

$$1 = A(x+a) + B(x-a) = x(A+B) + Aa - Ba$$

$$(1) \quad A+B=0$$

$$(2) \quad Aa-Ba=1$$

$$\underline{a(A-B)=0}$$

$$A = \frac{1}{2a}, \quad B = -\frac{1}{2a}$$

(II) 2. način: $x=a \rightarrow 1=A \cdot 2a + 0 \Rightarrow A = \frac{1}{2a}$

$$x=-a \rightarrow 1=B(-2a) \Rightarrow B = -\frac{1}{2a}$$

Dakle: $\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \frac{1}{x-a} - \frac{1}{2a} \frac{1}{x+a}$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \int \frac{1}{2a(x-a)} dx - \int \frac{1}{2a(x+a)} dx = \frac{1}{2a} \int \frac{1}{x-a} dx - \frac{1}{2a} \int \frac{1}{x+a} dx =$$

$$= \frac{1}{2a} [\ln|x-a| - \ln|x+a|] + C$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x^3-2x^2+x}$$

$$\frac{1}{x^3-2x^2+x} = \frac{1}{x(x^2-2x+1)} = \frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} \quad | \cdot (x^3-2x^2+x)$$

$$1 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx$$

→ metoda neopćitnih koeficijenata:

(I) 1. način:

$$1 = x^2(A+B) + x(-2A-B+C) + A$$

$$\begin{aligned} (1) \quad A+B=0 \\ (2) \quad -2A-B+C=0 \\ (3) \quad A=1 \end{aligned}$$

$$A=1, B=-1, C=1$$

$$\text{(II) 2. način: } \begin{aligned} x=0 &\rightarrow 1=A(-1)^2+0+0 \Rightarrow A=1 \\ x=1 &\rightarrow 1=0+0+C \cdot 1 \Rightarrow C=1 \\ x=2 &\rightarrow 1=A+2B+2C \Rightarrow B=-1 \end{aligned}$$

$$\text{Dakle: } \frac{1}{x^3-2x^2+x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\int \frac{1}{x^3-2x^2+x} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{(x-1)^2} dx = \ln|x| - \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C //$$

= S obzirom na stavak 2. i cijelicu da je integral zbroja jednak zbroju integrala, integracija racionalne funkcije svodi se na integraciju polyclih polinomaka,
↳ osnovni primjer:

$$(1) \int \frac{dx}{x-x_0} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x-x_0=t \\ dx=dt \end{array} \right| = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln(x-x_0) + C$$

$$(2) \int \frac{dx}{(x-x_0)^n} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x-x_0=t \\ dx=dt \end{array} \right| = \int \frac{dt}{t^n} = \frac{t^{-n+1}}{-n+1} + C = -\frac{1}{(n-1)(x-x_0)^{n-1}} + C //$$

$$(3) \int \frac{dx}{x^2+px+q} = \left| \begin{array}{l} p^2-4q < 0 \\ x+\frac{p}{2}=t \\ dx=dt \end{array} \right| = \int \frac{dx}{(\frac{x+p}{2})^2-\frac{p^2}{4}+q} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x+\frac{p}{2}=t \\ dx=dt \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{t}{a}\right) + C = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+\frac{p}{2}}{a}\right) + C //$$

$$(3)' \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx = \int \frac{Ax+B}{(\frac{x+p}{2})^2-\frac{p^2}{4}+q} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x+\frac{p}{2}=t \\ dx=dt \\ \text{OZNAKA: } q-\frac{p^2}{4}=a^2 \end{array} \right| = \int \frac{A(t-\frac{P}{2})+B}{t^2+a^2} dt =$$

$$= \frac{A}{2} \int \frac{2t dt}{t^2+a^2} + \left(B - \frac{AP}{2} \right) \int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{A}{2} \ln|t^2+a^2| + \left(B - \frac{AP}{2} \right) \cdot \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{t}{a}\right) + C =$$

$$= \frac{A}{2} \ln(x^2+px+q) + \left(B - \frac{AP}{2} \right) \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+\frac{p}{2}}{a}\right) + C //$$

$$(4) \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n} dx = \left| \begin{array}{l} n \geq 2; \\ p^2-4q < 0 \end{array} \right| = \dots = \frac{A}{2} \int \frac{2t dt}{(t^2+a^2)^n} + \left(B - \frac{AP}{2} \right) I_n =$$

$$= -\frac{A}{2(n-1)(x^2+px+q)^{n-1}} + \left(B - \frac{AP}{2} \right) I_n$$

$$\text{gdje je: } I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}, \quad n \geq 2.$$

Za integral I_n izvodimo rekursivnu formulu:

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2+a^2)-x^2}{(x^2+a^2)^n} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2a^2} \int \frac{x \cdot 2x dx}{(x^2+a^2)^n} =$$

$$= \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{2a^2} \left[x \frac{(x^2+a^2)^{-n+1}}{-n+1} - \int \frac{(x^2+a^2)^{-n+1}}{-n+1} dx \right] = \\ = \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{1}{2a^2(n-1)} \cdot \frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2a^2(n-1)} \cdot \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Dakle:

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} \cdot I_n + \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}}, \quad \text{za } n \geq 2, \text{ da vrijedi:}$$

$$I_1 = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right)$$

Posebice:

$$n=2 \Rightarrow I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+4a^2)^2} = \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + \frac{x}{2a^2(x^2+4a^2)} + C$$

= STAVAK 3.

↳ Sve su racionalne funkcije elementarno integrabilne, što smo dokazali razmatranjem 5 osnovnih primjera.

= Algoritam integriranja racionalne funkcije:

- 1) uspoređujemo stupaj brojnika i nazivnika te u slučaju $n \geq m$ dijelimo brojnik s nazivnikom (ime se integral svodi na integral prave racionalne funkcije $R_n(x)$)
- 2) provodimo faktorizaciju nazivnika $Q_m(x)$ u obliku (*)
- 3) prikazujemo $R(x)$ u obliku posjednih razlomaka, te integriramo svaki od tih razlomaka posebno

= PRIMER 5.

↳ Izračunati integral: $\int \frac{2x^3+4x^2+x+2}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx$.

$$\frac{2x^3+4x^2+x+2}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1} \quad | \cdot (x-1)^2(x^2+x+1)$$

$$2x^3+4x^2+x+2 = A(x-1)(x^2+x+1) + B(x^2+x+1) + (Cx+D)(x-1)^2$$

$$2x^3+4x^2+x+2 = Ax^3+Ax^2+Ax-x^3-Ax^2-Ax-A + Bx^2+Bx+B + (Cx+D)(x^2-2x+1)$$

$$2x^3+4x^2+x+2 = Ax^3-A+Bx^2+Bx+B+Cx^3-2Cx^2+Cx+Dx^2-2Dx+D$$

$$2x^3+4x^2+x+2 = x^3(A+C) + x^2(B+2C+D) + x(B+C-2D) + (-A+B+D)$$

$$(1) \quad A+C=2 \Rightarrow C=2-A=0$$

$$(2) \quad B-2C+D=4$$

$$(3) \quad B+C-2D=1$$

$$(4) \quad -A+B+D=2 \Rightarrow A=B+D-2 = 3+1-2=2$$

$$(1) \rightarrow (2) \quad B-4+2A+D=4$$

$$(1) \rightarrow (3) \quad B+2-A-2D=1$$

$$(4) \rightarrow (2) \quad B+D+2B+2D-4-4=4$$

$$(4) \rightarrow (3) \quad B+2D-B-D+2+2=1$$

$$3B+3D=12$$

$$3D=-3$$

$$B+D=4 \Rightarrow B=3$$

$$D=1$$

$$\int \frac{2x^3+4x^2+x+2}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx = \int \frac{2}{x-1} dx + \int \frac{3}{(x-1)^2} dx + \int \frac{1}{x^2+x+1} dx = 2 \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + \\ + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C //$$

14.2. INTEGRIRANJE NEKIH IRACIONALNIH FUNKCIJA

□ INTEGRALI OBLIKA: $\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$

= Integral se rješava tako da se pretpostavi njegovo rješenje u obliku:

$$(*) \int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = Q_{n-1}(x) \sqrt{ax^2+bx+c} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

gdje je $Q_{n-1}(x)$ polinom stupnja $(n-1)$ s neodređenim koeficijentima, a λ neodređena konstanta.

Svi nepoznati koeficijenti i konstanta λ određuju se metodom međuredenih koeficijenata mukom davanju identiteta (*).

= PRIMJER 1.

↳ Izračunaj: $\int \sqrt{x^2+A} dx = I$

$$I = \int \sqrt{x^2+A} = \int \frac{x^2+A}{\sqrt{x^2+A}} dx$$

↳ pretpostavimo rješenje:

$$\int \frac{x^2+A}{\sqrt{x^2+A}} dx = A_1 x + B_1 \sqrt{x^2+A} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+A}} \quad | \cdot \frac{d}{dx}$$

$$\frac{x^2+A}{\sqrt{x^2+A}} = A_1 \sqrt{x^2+A} + (A_1 x + B_1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+A}} \cdot 2x + \lambda \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+A}} \quad | \cdot \sqrt{x^2+A}$$

$$x^2+A = A_1(x^2+A) + (A_1 x + B_1)x + \lambda$$

$$x^2+A = 2A_1 x^2 + B_1 x + A_1 A + \lambda$$

$$(1) 1=2A_1$$

$$(2) 0=B_1$$

$$(3) A=A_1 A+\lambda$$

$$(1) \Rightarrow A_1 = \frac{1}{2}$$

$$(2) \Rightarrow B_1 = 0$$

$$(3) \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}A$$

$$I = \left(\frac{1}{2}x + 0 \right) \sqrt{x^2+A} + \frac{1}{2}A \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+A}} = \frac{1}{2}x \sqrt{x^2+A} + \frac{A}{2} \ln|x+\sqrt{x^2+A}| + C //$$

= PRIMJER 2.

↳ Izračunaj: $\int \sqrt{k^2-x^2} dx$

= Analogno se dokazuje kao u primjeru 1. da vrijedi:

$$\int \sqrt{k^2-x^2} dx = \frac{1}{2}x \sqrt{k^2-x^2} + \frac{k^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{k}\right) + C //$$

= PRIMJER 3.

↳ Izračunaj: $I = \int \sqrt{2-x-x^2} dx$

$$\int \sqrt{2-x-x^2} dx = \int \sqrt{(-x^2+x)+2} dx = \int \sqrt{-(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4} + 2} dx = \int \sqrt{\left(\frac{9}{4}\right)^2 - (x+\frac{1}{2})^2} dx =$$

-240+

$$= \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x + \frac{1}{2} = t \\ dx = dt \end{array} \right| \int \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - t^2} dt = \frac{1}{2} t \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - t^2} + \frac{9}{4} \arcsin\left(\frac{t}{\frac{3}{2}}\right) + C =$$

$$= \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2}\right) \sqrt{2x+4} + \frac{9}{8} \arcsin\left(\frac{2x+1}{3}\right) + C$$

= PRIMJER 4.

↳ Izračunati integral: $\int x^2 \sqrt{x^2+4} dx$.

$$I = \int x^2 \sqrt{x^2+4} dx = \int \frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}} dx$$

= Pretpostavimo rješenje:

$$\int \frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}} dx = (Ax^3+Bx^2+Cx+D)\sqrt{x^2+4} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} \quad \left| \frac{d}{dx} \right.$$

$$\frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}} = (3Ax^2+2Bx+C)\sqrt{x^2+4} + (Ax^3+Bx^2+Cx+D) \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + \lambda \frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$$

$$x^4+4x^2 = (3Ax^2+2Bx+C)(x^2+4) + (Ax^3+Bx^2+Cx+D)x + \lambda$$

$$x^4+4x^2 = x^4(4A) + x^3(3B) + x^2(12A+2C) + x(8B+D) + (4C+\lambda)$$

$$\begin{array}{ll} \Downarrow & \\ (1) & 4A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{4} \\ (2) & 3B=0 \Rightarrow B=0 \\ (3) & 12A+2C=4 \Rightarrow C=\frac{1}{2} \\ (4) & 8B+D=0 \Rightarrow D=0 \\ (5) & 4C+\lambda=0 \Rightarrow \lambda=-2 \end{array}$$

$$\int x^2 \sqrt{x^2+4} dx = \left(\frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x \right) \sqrt{x^2+4} - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{1}{4}(x^3+2x)\sqrt{x^2+4} - 2 \ln(x+\sqrt{x^2+4}) + C$$

□ INTEGRALI OBLIKA: $\int R\left[x, \sqrt[2]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \sqrt[3]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \dots\right] dx$

= Integrali gore navedenog oblika imaju racionalne funkcije R , ali su brojeve $p_1, p_2, q_1, q_2, \dots$ te realne brojeve a, b, c, d .

Ovi integrali sude se na integrante racionalne funkcije supstitucijom: $\frac{ax+b}{cx+d} = t^n$,

gdje je n mjerujući zajednički višekratnik brojeva q_1, q_2, \dots primjerice ako je zadani integral: $\int R(x\sqrt[n]{x}, 3\sqrt{x}, 4\sqrt{x})$ uvest ćemo supstitutivnu $x=t^{12}$.

= PRIMJER 5.

↳ Izračunati integral:

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{2x-1} - \sqrt[4]{2x-1}} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ 2x-1=t^4 \\ x=\frac{t^4+1}{2} \\ dx=2t^3dt \end{array} \right| = \int \frac{2t^3 dt}{t^2-t} = 2 \int \frac{t^2 dt}{t-1} = 2 \int \left(t+1+\frac{1}{t-1}\right) dt =$$

$$= (t+1)^2 + 2 \ln|t-1| + C = \left(1 + \sqrt[4]{2x-1}\right)^2 + 2 \ln|\sqrt[4]{2x-1}-1| + C$$

Samo je jedan Mali Ivica!

14.9. INTEGRALI NEKIH TRIGONOMETRIJSKIH I HIPERBOLOVIČKIH FUNKCIJA

□ INTEGRIRANJE NEKIH TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

= U posebnim slučaju radi se o integralu tipa:

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

gdje je R racionalna funkcija.

takav integral rješava se univerzalnom supstitucijom:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = t \Rightarrow x = 2 \arctg t \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Dokaz:

$$\sin x = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right)^2 - \left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)^2 = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Uvrštavajući upotrebljene supstitucije u gornji integral dobivamo:

$$I = \int R\left[\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right] \frac{2}{1+t^2} dt = \int R_t(t) dt$$

= U posebnom slučaju, ako vrijedi identitet:

$$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$$

prikladnja je supstitucija:

$$\operatorname{tg}x = t \Rightarrow x = \arctg t \quad \sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$dx = \frac{dt}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$$

Uvrštavajući upotrebljene supstitucije dobivamo:

$$I = \int R\left[\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right] \frac{dt}{1+t^2}$$

= PRIMJEDBA 1:

↪ Osim ove dvije navedene supstitucije postoji još neke u posebnim slučajevima, primjerice:

1) ako je $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ prikladnja je supstitucija $\cos x = t$

2) ako je $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ prikladnja je supstitucija $\sin x = t$

↪ U nekim slučajevima koristi se konstitutivne formule:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}$$

= PRIMJER 1:

↪ Izračunaj: $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} &= \int \frac{dx}{1 + \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}} \\ &\text{UNIV. SUPST: } \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = t \Rightarrow x = 2 \arctg t \\ &dx = 2 \frac{dt}{1+t^2} \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{1+t^2} \end{aligned}$$

$$= \int \frac{2dt}{2t+2} = \int \frac{dt}{t+1} = \ln|t+1| + C = \ln|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) + 1| + C //$$

= PRIMER 2.

↳ Izračunaj integral: $\int \frac{dx}{\sin^2 x - \sin x \cos x}$

$$\Rightarrow R(-\sin x, -\cos x) \rightarrow \frac{1}{\sin^2 x - \sin x \cos x} = \frac{1}{(-\sin x)^2 - (-\sin x)(-\cos x)} = \frac{1}{\sin^2 x - \sin x \cos x}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^2 x - \sin x \cos x} &= \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = t \Rightarrow x = 2 \arctg t \\ dx = 2 \frac{dt}{1+t^2} \end{array} \right| \frac{R(\sin x, \cos x)}{\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \int \frac{dt}{\frac{t^2-1}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t(t-1)} = \int \frac{t-(t-1)}{t(t-1)} dt = \int \frac{dt}{t-1} - \int \frac{dt}{t} = \\ &= \ln|t-1| - \ln|t| + C = \ln \left| \frac{t-1}{t} \right| + C = \ln \left| \frac{\operatorname{tg} x - 1}{\operatorname{tg} x} \right| + C // \end{aligned}$$

= PRIMER 3.

↳ Izračunaj integral: $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx &= \int \frac{\sin^2 x \sin x}{\cos^4 x} dx = \int \frac{(1-\cos^2 x) \sin x}{\cos^4 x} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ \cos x = t \\ dx(-\sin x) = dt \\ dx = \frac{-dt}{\sin x} \end{array} \right| = \int \frac{(1-t^2) dt}{t^4} = \\ &= -\int \frac{dt}{t^4} + \int \frac{t^2}{t^4} dt = \frac{1}{3t^3} - \frac{1}{t^4} + C // \end{aligned}$$

= PRIMER 4.

↳ Izračunaj integral: $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^2 x dx &= \int \frac{1}{4} \sin^2(2x) dx = \frac{1}{4} \int \frac{1-\cos(4x)}{2} dx = \frac{1}{8} \left(\int dx - \int \cos(4x) dx \right) = \\ &= \frac{x}{8} - \frac{\sin(4x)}{32} + C // \end{aligned}$$

□ INTEGRIRANJE NEKIH HIPERBOLICKIH FUNKCIJA

= Ako se radi o integralu u tipu: $\int R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x) dx$, integriraju je potpuno analogno trigonometrijskim funkcijama uvedenjem univerzalne supstitucije:

$$\operatorname{th}\left(\frac{x}{2}\right) = t \Rightarrow x = 2 \operatorname{arctht}$$

$$\operatorname{sh} x = \frac{2t}{1-t^2}$$

$$\operatorname{ch} x = \frac{1+t^2}{1-t^2}$$

DOKAZ:

$$\operatorname{sh} x = 2 \operatorname{sh}\left(\frac{x}{2}\right) \operatorname{ch}\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \operatorname{ch}^2\left(\frac{x}{2}\right) \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{x}{2}\right)}{\operatorname{ch}\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2 \operatorname{th}\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\operatorname{th}^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2t}{1-t^2}$$

$$\operatorname{ch} x = \operatorname{ch}^2\left(\frac{x}{2}\right) + \operatorname{sh}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \operatorname{ch}^2\left(\frac{x}{2}\right) \left(1 + \operatorname{th}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) = \frac{1+\operatorname{th}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1-\operatorname{th}^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1+t^2}{1-t^2}$$

= Potpuno analogno se primjenjuju i druge supstitucije kao i kod trigonometrijskih funkcija.

= Dodatna mogućnost je još i supstitucija:

$$e^x = t \Rightarrow x = \ln t \quad \operatorname{sh} x = \frac{t - \frac{1}{t}}{2}$$

$$dx = \frac{dt}{t} \quad \operatorname{ch} x = \frac{t + \frac{1}{t}}{2}$$

= PRIMER 5.

↳ Izračunaj: $\int \frac{dx}{1+2\operatorname{sh} x+3\operatorname{ch} x}$

a)

$$\int \frac{dx}{1+2\operatorname{sh} x+3\operatorname{ch} x} = \left| \begin{array}{l} \text{UNIV. SUPST:} \\ \operatorname{th}\left(\frac{x}{2}\right) = t \Rightarrow x = 2\operatorname{arctg} t \\ dx = \frac{2dt}{1-t^2} \end{array} \right| \quad \operatorname{sh} x = \frac{2t}{1-t^2} \quad \operatorname{ch} x = \frac{1+t^2}{1-t^2} \quad \left| \int \frac{2dt}{(1-t^2)\left(1+\frac{4t}{1-t^2}+\frac{3+3t^2}{1-t^2}\right)} \right.$$

$$= \int \frac{2dt}{1-t^2+4t+3+3t^2} = \int \frac{2dt}{2t^2+4t+4} = \int \frac{dt}{t^2+2t+2} = \int \frac{dt}{(t+1)^2+1} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ t+1=2 \\ dt=dz \end{array} \right|$$

$$= \int \frac{dz}{z^2+1} = \operatorname{arctg} z + C = \operatorname{arctg} \left(\operatorname{th}\left(\frac{x}{2}\right)+1 \right) + C //$$

b)

$$\int \frac{dx}{1+2\operatorname{sh} x+3\operatorname{ch} x} = \int \frac{dx}{1+2\frac{e^x-e^{-x}}{2}+3\frac{e^x+e^{-x}}{2}} = \int \frac{dx}{2+2e^x-2e^{-x}+3e^x+3e^{-x}} =$$

$$= \int \frac{2dx}{2+5e^x+e^{-x}} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ e^x=t \\ dx=e^xdt \\ dy=\frac{dt}{e^x} \end{array} \right| = \int \frac{2 \frac{dt}{t}}{2+5t+t^{-1}} = \int \frac{2dt}{2t+5t^2+1} = \frac{2}{5} \int \frac{dt}{(t+\frac{1}{\sqrt{5}})^2+\frac{4}{25}} =$$

$$= \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{t+\frac{1}{\sqrt{5}}}{\frac{2}{\sqrt{5}}} \right) + C = \operatorname{arctg} \left(\frac{5t+1}{2} \right) + C = \operatorname{arctg} \left(\frac{5e^x+1}{2} \right) + C //$$

□ INTEGRIRANJE NEKIH IRACIONALNIH FUNKCIJA POMOĆU TRIGONOMETRIJSKIH I LIJEPERBOUČKIH SUPSTITUCIJA

1) integrali tipa: $\int R(x, \sqrt{k^2-x^2}) dx$, $k > 0$

rješavaju se supstitucijom: $x = k \sin t$.

2) integrali tipa: $\int R(x, \sqrt{x^2+k^2}) dx$, $k > 0$

rješavaju se supstitucijom: $x = k \sinh t$.

3) integrali tipa: $\int R(x, \sqrt{x^2-k^2}) dx$, $k > 0$

rješavaju se supstitucijom: $x = k \cosh t$.

= Općenito: integrali tipa: $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$, se svode na jedan od prethodnih oblika \int transformacijom:

$$ax^2+bx+c = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

= PRIMJER 6.

\hookrightarrow Izračunaj integral: $\int x^2 \sqrt{x^2+4} dx$

$$\begin{aligned} I &= \int x^2 \sqrt{x^2+4} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x = 2 \sinh t \\ dx = 2 \cosh t dt \end{array} \right| = \int 4 \sinh^2 t \cdot 2 \cosh t \cdot 2 \cosh t dt = 16 \int \sinh^2 t \cosh^2 t dt = \\ &= 4 \int \sinh^2(2t) dt = 4 \int \frac{\cosh(4t)-1}{2} dt = \frac{1}{2} \sinh(4t) - 2t + C = \sinh(2t) \cosh(2t) - 2t + C = \\ &= 2 \sinh t \cosh t (2 \sinh^2 t + 1) - 2t + C = \frac{1}{4} (x^3 + 2x) \sqrt{x^2+4} - 2 \ln(x + \sqrt{x^2+4}) + C // \end{aligned}$$

ZADACI

$$\begin{aligned} ① \quad \int \frac{x dx}{x^2+x+1} &\Rightarrow \int \frac{x dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x+\frac{1}{2}=t \\ dx=dt \\ x=t-\frac{1}{2} \end{array} \right| = \int \frac{t-\frac{1}{2}}{t^2 + \frac{3}{4}} dt = \int \frac{t dt}{t^2 + \frac{3}{4}} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{3}{4}} = \\ &\left| \begin{array}{l} \text{SUPST: (1)} \\ t^2 + \frac{3}{4} = u \\ 2t dt = du \\ dt = \frac{du}{2t} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{du}{2}}{u} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{1}{2} \ln(t^2 + \frac{3}{4}) - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}) + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x^2+x+1| - \frac{\sqrt{3}}{3} \arctg\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ② \quad \int \frac{x^3 dx}{x^2+2x+4} &\quad \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x^2+2x+4 = u \\ 2x+2 = du \\ x+1 = \frac{u}{2} \end{array} \right| = \int \frac{x^3 dx}{u} = \int (x-2 + \frac{8}{x^2+2x+4}) dx = \int x dx - 2 \int dx + \\ &+ 8 \int \frac{dx}{x^2+2x+4} = \frac{x^2}{2} - 2x + 8 \int \frac{dx}{(x+1)^2+3} = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x+1=t \\ dx=dt \end{array} \right| = \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x + 8 \int \frac{dt}{t^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{x^2}{2} - 2x + 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \arctg\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right) + C // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ③ \quad \int \frac{dx}{x^5-x^2} &= \frac{1}{x^5-x^2} = \frac{1}{x^2(x^3-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{Dx+E}{x^2(x+1)} \quad | \cdot x^2(x^3-1) \\ &\hookrightarrow 1 = A x(x^3-1) + B(x^3-1) + C x^2(x^2+x+1) + (Dx+E)x^2(x-1) \\ &1 = A x^4 - A x + B x^3 - B + C x^4 + C x^3 + C x^2 + D x^3 - D x^2 + E x^3 + E x^2 \\ &1 = x^4(A+C+D) + x^3(B+C-D+E) + x^2(C-E) + x(A-B) \\ (1) \quad A+C+D=0 &\Rightarrow C=-D \Rightarrow D=-\frac{1}{3} \\ (2) \quad B+C-D+E=0 &\Rightarrow E=-\frac{1}{3} \\ (3) \quad C-E=0 &\Rightarrow C=E=\frac{1}{3} \\ (4) \quad A=0 &\Rightarrow A=0 \\ (5) \quad -B=1 &\Rightarrow B=-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^5-x^2} &= \int -\frac{1}{x^2} dx - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}}{x^2(x+1)} dx = \frac{1}{x} - \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{1}{3} \int \frac{x dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} - \\ &+ \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ x + \frac{1}{2} = t \\ dx = dt \\ x = t - \frac{1}{2} \end{array} \right\| = \frac{1}{x} - \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{1}{3} \left(\int \frac{(t - \frac{1}{2})dt}{t^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} - \int \frac{dt}{t^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \right) = \\
 &= \frac{1}{x} - \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{1}{3} \left(\int \frac{tdt}{t^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} - \frac{3}{2} \int \frac{dt}{t^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \right) = \left| \begin{array}{l} \text{SUPST:} \\ t^2 = u \\ 2tdt = du \\ dt = \frac{du}{2t} \end{array} \right\| = \\
 &= \frac{1}{x} - \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \int \frac{du}{u + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} - \frac{3}{2} \int \frac{dt}{t^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \right) = \\
 &= \frac{1}{x} - \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{1}{6} \ln|x^2 + x + 1| - \frac{\sqrt{3}}{3} \arctg \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C_{11}
 \end{aligned}$$

(4.)

-246-

$$\begin{aligned}
 (6) \quad & \int_0^1 \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \int_0^1 \frac{x^2+1-x^2}{(x^2+1)^2} dx = \int_0^1 \frac{x^2+1}{(x^2+1)^2} dx - \int_0^1 \frac{x^2 dx}{(x^2+1)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{x^2+1} - \frac{1}{2} \int_0^1 x \cdot \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx = \\
 & = \left| \begin{array}{l} u=x \\ du=dx \\ dv=\frac{2x}{(x^2+1)^2} dx \\ v=\int \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{SUST.} \\ x^2+1=t \\ 2x dx = dt \\ dx=\frac{dt}{2x} \end{array} \right| = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} \end{array} \right| = \\
 & = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2+1)} - \frac{1}{2} \left[\left. \frac{x}{x^2+1} \right|_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx \right] = \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{dx}{x^2+1} - \frac{x}{x^2+1} \cdot \frac{1}{2} \Big|_0^1 = \\
 & = \left[\frac{3}{2} \arctg x - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{x^2+1} \right) \right] \Big|_0^1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} - 0 + 0 = \frac{3\pi}{4} - \frac{1}{4} //
 \end{aligned}$$

$$(7) \quad \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+x+1)^2}$$