

DEVOIR SURVEILLÉ n°4

Durée : 4 heures

L'usage de calculatrices est interdit

AVERTISSEMENT

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction**, la **clarté** et la **précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans l'**appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

Exercice I : Étude d'une courbe

Dans le plan euclidien rapporté au repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) on considère la courbe Γ de représentation sur \mathbb{R}_-^* :

$$\begin{cases} x(t) = t^2 + \frac{2}{t} \\ y(t) = \frac{1}{t^2} + 2t \end{cases} \text{ avec } t < 0.$$

On notera M_t le point de Γ de paramètre $t < 0$.

1. (a) Dresser le tableau des variations conjointes de x et y . On précisera les limites en 0^- et en $-\infty$.
 (b) Étudier les branches infinies en 0^- et $-\infty$.
 Préciser l'allure de la courbe lorsque $t \rightarrow 0^-$ et lorsque $t \rightarrow -\infty$.
 (c) Déterminer les paramètres $t_1, t_2 < 0$ tels que $M(t_1) \in (O_y)$ et $M(t_2) \in (O_x)$.
 (d) On admet que $y(t_1) \approx -1,9$ et $x(t_2) \approx -1,9$.
 On donne également $x'(t_1) \approx -3,8$, $y'(t_1) \approx 3$ et $x'(t_2) \approx -4,8$, $y'(t_2) \approx 6$.
 Tracer la courbe Γ et placer le point M_{-1} .
2. (a) Montrer que le vecteur $(t, 1)$ est un vecteur directeur de la tangente à Γ au point M_t .
 (b) Montrer qu'une représentation paramétrique de la normale à Γ au point M_t est :

$$\begin{cases} x_t(u) = t^2 + \frac{2}{t} + u \\ y_t(u) = \frac{1}{t^2} + 2t - tu \end{cases} \text{ avec } u \in \mathbb{R}.$$

- (c) On note \mathcal{E} la développée de la courbe Γ et E_t les points de \mathcal{E} de paramètres $t < 0$.

Montrer que : $E_t = \left(t^2 + \frac{2}{t}, \frac{1}{t^2} + 2t \right) + \lambda(t) \begin{pmatrix} 1 \\ -t \end{pmatrix}$ avec $\lambda(t)$ à déterminer.

- (d) Utiliser ce résultat pour donner le centre et le rayon du cercle de courbure de Γ au point M_{-1} de paramètre $t = -1$. Tracer ce cercle sur le dessin réalisé à la question 1.(d).
3. Soit Σ le cercle de centre Ω de coordonnées $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et de rayon $r > 0$.
On dit que Σ et Γ sont tangents en un point A si :
- $A \in \Sigma \cap \Gamma$.
 - la tangente à Σ en A et la tangente à Γ en A sont confondues.
- (a) Montrer que Γ et Σ sont tangents en M_{-1} si et seulement si :

$$\begin{cases} r &= \sqrt{2}|a+1| \\ b &= a \end{cases}$$

- (b) Dans les conditions établies à la question précédente, donner une équation de Σ sous la forme $f_a(x, y) = 0$ ne dépendant que du paramètre a .
- (c) Effectuer les développements limités de $x(t)$ et $y(t)$ à l'ordre 3 en $t = -1$.
- (d) On donne et on pourra utiliser sans démonstration :

$$f_a(x(t), y(t)) \underset{t \rightarrow -1}{=} (28 - 4a)(t + 1)^2 + (28 - 4a)(t + 1)^3 + o((t + 1)^3).$$

Déterminer a pour qu'au voisinage de $t = -1$, $f_a(x(t), y(t)) = o((t + 1)^3)$.
Quelles remarques peut-on faire concernant Ω et r dans ce cas ?

Exercice II

1. Question préliminaire

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie d et f un endomorphisme de E . On note $f^2 = f \circ f$.

- (a) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$\ker(f - \lambda \text{id}_E) \subset \ker(f^2 - \lambda^2 \text{id}_E).$$

Quel lien peut-on en déduire entre les valeurs propres de f et celles de f^2 ?

- (b) Démontrer que si $\ker(f) \cap \text{Im}(f) \neq \{0_E\}$ alors :

$$\dim(\ker f^2) \geq \dim(\ker f) + 1.$$

- (c) On note χ_f et χ_{f^2} les polynômes caractéristiques respectifs de f et f^2 .

Montrer que $\chi_{f^2}(X^2) = (-1)^d \chi_f(X) \chi_f(-X)$.

2. Dans cette question, n désigne un entier supérieur ou égal à 3 et $E = \mathbb{R}_n[X]$.

Soit f l'application définie pour tout polynôme $P \in E$ par :

$$f(P) = (X^2 - X + 1)P(-1) + (X^3 - X)P(0) + (X^3 + X^2 + 1)P(1).$$

- (a) Montrer que f est un endomorphisme de E .
- (b) Déterminer $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$. On vérifiera que $\ker(f)$ est de dimension $n - 2$.

- (c) f est-il injectif? surjectif?
- (d) Justifier que 0 est valeur propre de f . Minorer sa multiplicité.
- (e) Démontrer que les polynômes $Q_1 = 3X^3 + 4X^2 - 3X + 4$ et $Q_2 = X^3 + X$ sont des vecteurs propres de f . Quelles sont les valeurs propres associées?
- (f) A-t-on $\ker(f) \oplus \operatorname{Im}(f) = E$?
- (g) Quelles sont les valeurs propres de f^2 ? En déduire que f^2 est diagonalisable.
On utilisera les résultats de la question préliminaire.
- (h) Montrer que $\chi_f(X)$ divise $X^{2n-2}(X^2 - 4)(X^2 - 16)$.
En déduire que f est trigonalisable.
- (i) Montrer que f n'est pas diagonalisable. On pourra raisonner par l'absurde.
Préciser les valeurs propres et les sous-espaces propres.

Problème : marche aléatoire sur \mathbb{Z}

Partie I : Formule de Stirling

1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt$.
 - (a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ pour tout $n \geq 2$.
 - (b) Montrer que pour tout $n \geq 2$, $I_n \leq I_{n-1} \leq I_{n-2}$ et en déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_{n-1}}{I_n} = 1$.
 - (c) En utilisant 1(a), montrer que : $I_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \frac{\pi}{2}$. On **admet** qu'on a : $I_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$.
 - (d) Déduire des questions précédentes que $\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{p} \left[\frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p)!} \right]^2 = \pi$.
2. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n^n e^{-n} \sqrt{n}}{n!}$$

- (a) Montrer que $\ln \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right) = O \left(\frac{1}{n^2} \right)$ (notation "grand O ")
En déduire la nature de la série $\sum \ln \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right)$.
- (b) En déduire que la suite $(\ln(u_n))_{n \geq 1}$ converge vers un réel λ et qu'il existe $k > 0$ tel que :

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} k \sqrt{n} n^n e^{-n}.$$

- (c) Utiliser les formules établies en 2(b) et 1.(d) pour montrer que $k = \sqrt{2\pi}$ et en déduire la formule de Stirling :

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}.$$

Partie II : Marche aléatoire sur l'axe \mathbb{Z}

A l'instant $n = 0$ un individu se trouve position en 0 et à chaque instant il se déplace à droite ou à gauche d'une unité, de façon équiprobable et indépendante des mouvements qui précèdent.

1. Calculer la probabilité de l'événement D : "l'individu se déplace vers la droite à chaque instant." On pourra introduire une suite monotone $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'événements bien choisis.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche la probabilité de A_n : "l'individu est de nouveau en 0 à l'instant n ".
 - (a) Justifier que cet événement se produit nécessairement après un nombre pair de déplacements.

(b) Montrer que $P(A_{2p}) = \frac{\binom{2p}{p}}{2^{2p}}$. Que vaut $P(A_{2p+1})$?

(c) Donner un équivalent de $P(A_{2p})$ à l'aide de la formule de Stirling et donner la limite de $P(A_{2p})$.


3. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On cherche la probabilité de l'événement B_{2p} : "l'individu est de nouveau en 0 *pour la première fois* à l'instant $2p$ ".

(a) On suppose que l'individu est en 1 à l'instant 1.

Montrer qu'il y a $\binom{2p-2}{p-1}$ chemins ramenant l'individu en 1 à l'instant $2p-1$ en $2p-2$ déplacements.

- (b) Justifier qu'il existe autant de chemins de longueur $2p-2$ conduisant de 1 à 1 et qui passent par 0 (au moins une fois) que de chemins de même longueur conduisant de 1 à -1 .

On pourra s'inspirer de la figure ci-dessous.



- (c) En déduire qu'il y a : $\binom{2p-2}{p-1} - \binom{2p-2}{p}$ chemins conduisant l'individu de 1 à l'instant 1 en 1 à l'instant $2p-1$ **sans passer par 0**.

(d) Montrer enfin que :

$$P(B_{2p}) = \frac{1}{2^{2p-1}} \left(\binom{2p-2}{p-1} - \binom{2p-2}{p} \right).$$

4. Simplifier : $\binom{2p-2}{p-1} + \binom{2p-2}{p}$.

5. En déduire que $P(B_{2p}) = P(A_{2p-2}) - P(A_{2p})$.

6. En déduire enfin la probabilité de l'événement R : "l'individu repasse en 0 au moins une fois".