

Técnica inalatória

10 s

O remédio só funciona se chegar ao pulmão. Confira o passo a passo do seu tipo de inalador.

Spray (bombinha)

Aerossol dosimetrado: o remédio sai sozinho, em jato

- 1 Sente ou fique em pé, com a coluna reta e o queixo levemente para cima.
- 2 Tire a tampa e **agite o spray** cerca de 5 vezes.
- 3 **Solte o ar** dos pulmões, longe do bocal, até onde for confortável.
- 4 Coloque o bocal entre os dentes e feche bem os lábios.
- 5 Comece a **puxar o ar devagar** e, logo no início, aperte o spray **uma vez**. Continue puxando devagar até encher o pulmão (4 a 5 segundos).
- 6 **Prenda a respiração por até 10 segundos**, ou o quanto for confortável. Depois solte o ar devagar.
- 7 Se a receita pede mais de um jato, repita tudo desde o passo 2.

O spray funciona melhor com **espaçador**, principalmente em crianças, idosos e na crise. Veja o infográfico “Uso do espaçador”.

Pó seco

Cápsula, disco ou giratório: é a sua força que puxa o remédio

- 1 Prepare a dose como o seu modelo pede: abrir, girar até o clique ou colocar e furar a cápsula. **Não agite** e mantenha o inalador na posição indicada na bula.
- 2 **Solte o ar longe do bocal**. Nunca sopre dentro do inalador: a umidade estraga o pó.
- 3 Feche bem os lábios em volta do bocal.
- 4 **Puxe o ar rápido e com força**, desde o começo, até encher o pulmão.
- 5 **Prenda a respiração por até 10 segundos** e solte o ar fora do inalador.
- 6 Com cápsula, abra e confira: se sobrou pó, inale de novo. Feche o inalador e guarde em local seco.

A grande diferença: no **spray** você puxa o ar **devagar**; no **pó** você puxa **rápido e forte**.

Névoa suave

Gire a base até o clique, abra a tampa, solte o ar, puxe o ar devagar e aperte o botão. Prenda a respiração por até 10 segundos.

Remédio com corticoide

Depois de usar, enxágue a boca, gargareje e cuspa a água. Isso evita rouquidão e “sapinho” na boca.

Contador de doses

Confira o número de doses que restam. Inalador vazio não trata, mesmo que ainda faça barulho.

Erros que impedem o remédio de chegar ao pulmão

Não soltar o ar antes de inalar, soprar dentro do inalador de pó, apertar o spray antes ou depois da hora de puxar o ar, puxar fraco no inalador de pó e não prender a respiração. Esses erros são comuns e estão ligados a mais crises.

Leve seus inaladores a toda consulta

Mostre à equipe como você usa. Revisar a técnica com frequência é uma das medidas mais simples para controlar asma e DPOC. Siga sempre a quantidade de jatos e os horários da sua receita.

Procure atendimento se

A falta de ar não melhorar com o remédio de alívio, se você tiver dificuldade para falar ou andar, ou se os lábios ou as unhas ficarem arroxeados.