

Uso do espaçador

1 jato

Com o espaçador, mais remédio chega ao pulmão e menos fica na boca. Veja quando usar, como encaixar e como limpar.

Quando usar

O espaçador é um tubo que segura o remédio para você inalar com calma

- **Sempre que usar remédio em spray**, tanto o de uso diário quanto o da crise.
- Principalmente em **crianças, idosos** e em quem tem dificuldade de apertar e puxar o ar ao mesmo tempo.
- Com remédio que tem **corticoide**: sobra menos remédio na boca e na garganta.
- **Não serve** para inalador de pó seco.

Bocal ou máscara?

- **Máscara**: crianças menores de 3 anos e qualquer pessoa que não consiga fechar os lábios no bocal.
- **Bocal**: para os demais. Ele leva mais remédio ao pulmão.

Não consegue puxar o ar fundo? Depois do jato, respire normalmente algumas vezes pelo espaçador, sem tirá-lo da boca. Em crianças, 2 a 3 respirações costumam esvaziar o espaçador.

Como usar

Passo a passo com bocal ou máscara

- 1 Sente com a coluna reta. **Agite o spray** cerca de 5 vezes e tire a tampa.
- 2 Encaixe o spray no espaçador, com o frasco **em pé**.
- 3 Solte o ar dos pulmões, até onde for confortável.
- 4 Coloque o bocal entre os dentes e feche bem os lábios. Com máscara, apoie-a firme sobre o nariz e a boca.
- 5 Comece a puxar o ar **devagar**, aperte o spray **uma vez** e continue puxando devagar (4 a 5 segundos) até encher o pulmão.
- 6 **Prenda a respiração por até 10 segundos**. Tire o espaçador da boca e relaxe.
- 7 Para outro jato, espere um pouco, agite de novo e repita tudo. **Um jato por vez**.

Dois erros comuns

Vários jatos de uma vez no espaçador: o remédio gruda na parede e se perde. **Demorar para inalar** depois do jato: esperar 10 segundos ou mais reduz muito a dose que chega ao pulmão.

Como higienizar

Lave **antes do primeiro uso** e depois pelo menos uma vez por mês, de preferência toda semana. Desmonte e lave à mão (nunca na lava-louças), em água fria ou morna com um pouco de detergente comum. Deixe de molho por 15 minutos. **Não enxágue e não seque com pano**: deixe secar ao ar, sobre uma toalha limpa. A película de detergente evita que o remédio grude no plástico. Só o bocal pode ser enxaguado.

Depois de usar

Tire o spray do espaçador e tampe. Se o remédio tiver corticoide, enxágue a boca, gargareje e cuspa. Leve o espaçador às consultas para a equipe conferir a técnica.