

Apellidos	Jiménez Cao
Nombre	Maia

Preguntas sobre grupos:

1. (4 puntos) Sea  $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/(3)$  el cuerpo con 3 elementos y  $\text{GL}(2, \mathbb{F}_3)$  el grupo de matrices invertibles  $2 \times 2$  con entradas en  $\mathbb{F}_3$ .

(a) ( $\frac{1}{2}$  punto) En el conjunto de vectores no nulos  $X = (\mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3) \setminus \{(0, 0)\}$  definimos una relación  $\sim$  de la siguiente manera:  $\vec{v} \sim \vec{w}$  si y solo si  $\vec{v} = \pm \vec{w}$ . Prueba que  $\sim$  es una relación de equivalencia y da la lista de todos los elementos del conjunto cociente, que denotaremos  $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3) = X / \sim$ , comprobando que hay exactamente cuatro.

(b) ( $\frac{1}{2}$  punto) Dada  $A \in \text{GL}(2, \mathbb{F}_3)$ , demuestra que la aplicación

$$\begin{aligned} \varphi_A : \mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3) &\longrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3) \\ [\vec{v}] &\longmapsto [A\vec{v}] \end{aligned}$$

está bien definida.

(c) ( $\frac{1}{2}$  punto) Enumera los elementos de  $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3)$  cuya lista has dado en el primer apartado, y que denotaremos  $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3) = \{[\vec{v}_1], [\vec{v}_2], [\vec{v}_3], [\vec{v}_4]\}$ . Prueba que, para todo  $A \in \text{GL}(2, \mathbb{F}_3)$ , la aplicación  $\varphi_A$  es biyectiva y deduce que existe una única permutación  $\sigma_A \in S_4$  tal que  $\varphi_A([\vec{v}_i]) = [\vec{v}_{\sigma_A(i)}]$  para todo  $i$ .

(d) ( $\frac{1}{2}$  punto) Demuestra que la aplicación

$$\begin{aligned} f : \text{GL}(2, \mathbb{F}_3) &\longrightarrow S_4 \\ A &\longmapsto \sigma_A \end{aligned}$$

es un homomorfismo de grupos.

(e) (1 punto) Prueba que para cada trasposición  $(ij) \in S_4$  existe  $A \in \text{GL}(2, \mathbb{F}_3)$  tal que  $\sigma_A = (ij)$  y deduce de aquí que  $f$  es sobreyectiva.

(f) (1 punto) Establece un isomorfismo entre  $S_4$  y un cociente de  $\text{GL}(2, \mathbb{F}_3)$ , describiendo explícitamente el subgrupo por el que se toma cociente, y úsalo para calcular el número de elementos de  $\text{GL}(2, \mathbb{F}_3)$ .



Maia Jiménez Cero

① a)  $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/(3) = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$

$$GL(2, \mathbb{F}_3) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \{0, 1, 2\}, \det \neq 0 \right\}$$

$$\vec{v} \sim \vec{w} \Leftrightarrow \vec{v} = \pm \vec{w}$$

$$X = (\mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3) \setminus \{(0, 0)\}$$

$$X = \{(\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{2}), (\bar{2}, \bar{1}), (\bar{2}, \bar{2}), (\bar{0}, \bar{2}), (\bar{2}, \bar{0})\}$$

Reflexiva: Sea  $\vec{v} = (x, y) \Rightarrow \vec{v} \sim \vec{v} \Leftrightarrow$

$$\vec{v} = \pm \vec{v} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}, \text{ se cumple.}$$

Simétrica: Sea  $\vec{v} = (x, y)$ ,  $\vec{w} = \pm(x', y')$ ,

$$\vec{v} \sim \vec{w} \Leftrightarrow \vec{v} = \pm \vec{w} \Leftrightarrow \vec{w} = \pm \vec{v} \Leftrightarrow \vec{w} \sim \vec{v}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \vec{w} \Rightarrow \vec{w} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{v}$$

Transitiva: Sean  $\vec{v}, \vec{w}, \vec{u} \in X$ ,

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v} \sim \vec{w} \Leftrightarrow \vec{v} = \pm \vec{w} \\ \vec{w} \sim \vec{u} \Leftrightarrow \vec{w} = \pm \vec{u} \end{array} \right\} \vec{v} = \pm \vec{u} \Leftrightarrow \vec{v} \sim \vec{u}.$$

Veamos ahora el conjunto cociente.

$$\begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{1} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} \\ -\bar{2} \end{pmatrix} \text{ en } \mathbb{F}_3 \quad \left( \text{ó } \begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} \\ -\bar{1} \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{0} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \bar{2} \\ \bar{0} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\bar{2} \\ \bar{0} \end{pmatrix} \text{ en } \mathbb{F}_3 \quad \downarrow \text{ para todos.}$$

$$\begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{1} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \bar{2} \\ \bar{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\bar{2} \\ -\bar{2} \end{pmatrix} \text{ en } \mathbb{F}_3$$

$$\begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \bar{2} \\ \bar{1} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\bar{2} \\ -\bar{1} \end{pmatrix} \text{ en } \mathbb{F}_3$$

$$\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3) = X / \sim = \left\{ \left[ \begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{1} \end{pmatrix} \right], \left[ \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{0} \end{pmatrix} \right], \left[ \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{1} \end{pmatrix} \right], \left[ \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \end{pmatrix} \right] \right\}.$$

$$\left[ \begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{1} \end{pmatrix} \right] = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{2} \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right] = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vemos que hay 4 clases,  $|X/\sim| = 4$ .

b)  $A \in GL(2, \mathbb{F}_2)$

$$f_A: \mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2) \longrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$$

$$[\bar{v}] \longmapsto [A\bar{v}]$$

bien definida

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid ad \neq bc, a, b, c, d \neq 0 \right\}$$

$$[A\bar{v}] = \left[ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix} \right], \text{ está}$$

bien definida porque siempre va a alguna clase de  $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ .

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{v}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Problemas que ver  $\mathcal{P} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ .

$$[\bar{v}] = \left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \Rightarrow f([\bar{v}]) = [A\bar{v}] = \left[ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] =$$

$$\left[ \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix} \right] \text{ con } \begin{matrix} a=1-b \\ c=1-d \end{matrix}$$