


Association between poly-substance use and substance use disorder treatment non completion admitted to multiple treatments between 2010-2019 in Chile

[Asociación entre el reporte de policonsumo y el abandono de tratamientos por consumo de sustancias: un estudio de cohorte retrospectivo en Chile, 2010-2019]

Andrés González-Santa Cruz, José Ruiz-Tagle Maturana, Mariel Mateo Pinones,
Álvaro Castillo-Carniglia

Introducción

- Uso de múltiples sustancias/policonsumo (PSU), común en personas en tratamientos por trastornos por uso de sustancias (TUS)
- Evidencia
 - Limitada
 - Hemisferio norte, principalmente




¿El policonsumo se encuentra asociado a un mayor riesgo de abandono/alta administrativa de tratamiento por TUS?

- Estudios previos pueden estar sesgados por tiempos de observación irregulares.

OBJETIVO

Determinar la eventual asociación entre reportar PSU al ingreso y la no finalización del tratamiento de TUS en Chile

Métodos



Datos: 13,317 adultos con múltiples ttos. para TUS (2010-2019), red de registros de SENDA (SISTRAT)

- 30,988 episodios de tratamiento en total

Variables:


- Exposición= Reporte PSU al ingreso a tratamientos
- Resultado= Abandono/alta administrativa

Análisis:

- Modelos de Poisson GEE
- Ajuste por covariables= sociodemográficas, salud mental, patrones de consumo.
- Corrección por la probabilidad inversa para tiempos de observación irregulares (*proportional intensity model*).
- Estratificado por tipo de tratamiento: mujeres/población general; ambulatoria-intensiva/ambulatoria/residencial)

Principales Resultados

Asociación entre PSU al ingreso y Abandono de tratamiento



PSU al ingreso se asocia modestamente con mayor riesgo de no completar el tratamiento.


- La asociación varía según el tipo de tratamiento.

La asociación no fue consistente en todos los tipos de tratamiento (Q de Cochran=14,49, p=0,0059).

Mayor riesgo de abandono/alta administrativa en:

- PG-PAI: RR= 1,04; IC95% 1,01-1,07
- M-PR: RR= 1,14; IC95% 1,06-1,23

Discusión




Para la **Práctica Clínica**:

- Adaptar programas de tratamiento para abordar las necesidades específicas de pacientes con PSU.
- Implementar estrategias para mejorar la retención en el tratamiento.

Para la **Investigación**:

- Realizar más estudios en contextos del Hemisferio Sur.
- Profundizar en el impacto de diferentes patrones de PSU en los resultados del tratamiento.



Implicancias:

- Necesidad de intervenciones personalizadas para pacientes que reportan PSU.
- Importancia de considerar el tipo de sustancia secundaria, como el alcohol.

