

MOMENTKID®

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA NEL DOLORE INFIAMMATORIO




OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA

MOMENTKID

KEYPOINTS




ANGELINI

MOMENTKID®



DOLORE INFIAMMATORIO

- ☁ Nel paziente pediatrico **Otite Media Acuta (OMA)** e **faringotonsillite** rappresentano due condizioni dolorose con componente infiammatoria
- ☁ L'**otalgia** è parte integrante della definizione di OMA, pertanto la gestione terapeutica di tale patologia deve prevedere una valutazione del **dolore** e la sua cura¹
- ☁ L'eziologia della maggioranza degli episodi di faringotonsillite, causa di **faringodinia**, è virale²



OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA

MOMENTKID

KEYPOINTS

MOMENTKID®



LINEE GUIDA **RACCOMANDAZIONI**

Il trattamento cardine dell'**otalgia** è rappresentato dalla somministrazione di antidolorifici a dosaggio adeguato per via sistemica, come **IBUPROFENE**¹

IBUPROFENE è raccomandato per il trattamento del dolore nel bambino con **faringotonsillite** acuta^{Mod. da 2}




OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA

MOMENTKID

KEYPOINTS



MOMENTKID®



LINEE GUIDA **RACCOMANDAZIONI**



Nelle Linee Guida dell'American Academy of Pediatrics viene sottolineato come il trattamento del dolore, specialmente durante le prime 24 ore di un episodio di OMA, debba essere attuato **indipendentemente dall'impostazione o meno della terapia antibiotica**¹

La terapia antibiotica non ha un effetto immediato e sostanziale nel ridurre il dolore che si accompagna a un episodio di OMA³



OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA

MOMENTKID

KEYPOINTS



MOMENTKID®



LA VIGILE ATTESA^{MOD. DA 3}





In assenza di gravi patologie di base e quando il follow up può essere assicurato, la strategia di vigile attesa prevede:

- la non somministrazione dell'antibiotico per 48-72 ore dall'esordio dei sintomi
- informazioni scritte ai genitori
- la somministrazione dell'antibiotico se dopo 48-72 ore i sintomi non si risolvono o peggiorano



Questa strategia dovrebbe essere implementata in tutti i bambini con otalgia di età superiore all'anno, a meno che non presentino sintomi gravi o otorrea



MOMENTKID®



FARMACO DI PRIMA SCELTA

- Studi clinici hanno dimostrato analgesia equivalente vs paracetamolo+codeina⁴

**IN ATTESA
FEEDBACK GRAFICO**



OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

**MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA**

MOMENTKID

KEYPOINTS

MOMENTKID®



FARMACO DI PRIMA SCELTA VS CORTICOSTEROIDI

OTITE MEDIA ACUTA

Momentkid trattamento di prima scelta ^{4,5}

Corticosteroidi solo in casi gravi e recidivanti, dopo fallimento con altre terapie ⁴

FARINGODINIA ACUTA A ELEVATO CARATTERE INFIAMMATORIO

Momentkid trattamento di prima scelta ^{4,5}

Corticosteroidi non raccomandati ⁵

OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA


MOMENTKID










KEYPOINTS



MOMENTKID®



EFFETTI INDESIDERATI PIÙ FREQUENTI LEGATI ALL'IMPIEGO CRONICO SISTEMICO DI CORTICOSTEROIDI



-  Miopatia steroidea
-  Osteoporosi
-  Aumentata suscettibilità alle infezioni
-  Ritenzione idrosalina
-  Cataratta-glaucoma
-  Ipercorticismo
-  Psicosi
-  Atrofia della cute
-  Alterazioni metaboliche (iperglicemia)



MOMENTKID®

Nel trattamento del dolore di media intensità in particolare associato a flogosi⁵



CLASSE C – SOP
150 ML

Aroma miele-banana



OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA


MOMENTKID

KEYPOINTS


ANGELINI



RCP



MOMENTKID®



DOSAGGIO E POSOLOGIA

Nella terapia antalgica è opportuno, nella maggioranza dei casi, non prescrivere analgesici al bisogno ma prevedere la somministrazione ad **orari fissi** ⁵

| Peso | Età | Dose singola in ml | n° max di somministrazioni al giorno |
|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| 5,6-7 kg | 3-6 mesi | 2,5 ml | 3 nelle 24 h |
| 7-10 kg | 6-12 mesi | 2,5 ml | |
| 10-15 kg | 1-3 anni | 5 ml | |
| 15-20 kg | 4-6 anni | 7,5 ml (5+ 2,5 ml) | |
| 20-28 kg | 7-9 anni | 10 ml | |
| 28-43 kg | 10-12 anni | 15 ml | |

OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA

MOMENTKID

KEYPOINTS

MOMENTKID®



KEYPOINTS

- ☁ Ootalgia e faringodinia sono due sintomi di otite media acuta (OMA) e faringotonsillite, condizioni infiammatorie frequenti in età pediatrica
- ☁ Momentkid è il farmaco di prima scelta^{4,5}
- ☁ Nella gestione dell'OMA è raccomandato in associazione alla terapia antibiotica⁶
- ☁ In caso di OMA e faringodinia l'impiego di corticosteroidi non è raccomandato^{Mod. da 4,5}


OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA

MOMENTKID

KEYPOINTS



MOMENTKID®



KEYPOINTS

| | MOMENTKID | Corticosteroidi |
|--------------|--|---|
| OTALGIA | <i>Raccomandato dalle linee guida SIP e AAP¹</i> <i>Trattamento del dolore nelle prime 24 ore indipendentemente dall'impostazione di terapia antibiotica¹</i> | <i>Riservati a casi gravi e recidivanti che non hanno presentato risoluzione o miglioramento dopo terapia con altre molecole antinfiammatorie o analgesiche⁴</i> |
| FARINGODINIA | <i>Raccomandato dalle linee guida SIPPS per il trattamento di dolore e febbre associati a faringotonsillite acuta²</i> | <i>Non raccomandati²</i> |
| ODONTALGIA | <i>Efficacia sovrapponibile a paracetamolo + codeina (post-operatorio)⁴</i> | |

OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA

MOMENTKID

KEYPOINTS



ANGELINI



MOMENTKID®



BIBLIOGRAFIA

1. Otite Media Acuta: dalla diagnosi alla prevenzione. Linee Guida della Società Italiana di Pediatria
2. Gestione della Faringotonsillite in Età Pediatrica 2011. SIPPS
3. Di Mario S. et al. Otite media acuta in età pediatrica - Linea Guida Regionale. Dossier 154 - 2007
4. Giovannini M. Ped Med. Chir. (Med. Surg. Ped.) 2013; 35:205-11
5. Borrometi F et al Congress Report SIO 2013
6. Position Paper coordinato da FIMP in collaborazione con SIP, SIGENP, SIPPS. Edit-Symposia Pediatria e Neonatologia, Numero Speciale 2012



OTITE MEDIA ACUTA
FARINGOTONSILLITE

LINEE GUIDA

MOMENTKID
FARMACO DI PRIMA SCELTA

MOMENTKID

KEYPOINTS

