

# SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA GAUSOVA ELIMINACIJA

---

predavač:  
Aleksandar Kovačević

# Sistem linearnih algebarskih jednačina (SLAJ)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

# Sistem linearnih algebarskih jednačina (SLAJ)

- Matrični oblik


$$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

# Motivacioni primer - GPS


- Problem određivanje pozicije kod GPS sistema svodi se na rešavanje sistema jednačina.
- Sistem ima četiri nepoznate
  - tri koordinate položaja  $(x,y,z)$
  - grešku sata gps risivera  $t_b$
- Da bi odredili poziciju treba nam  $n \geq 4$  satelita.
- Jednačine sistema koji rešavamo nisu linearne ali se mogu linearizovati.

# GPS



**Solving the GPS  
Geometry Problem**

# GPS



# GPS Jednačine

$$PR_1 = ct_b + \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}$$

$$PR_2 = ct_b + \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2}$$

$$PR_3 = ct_b + \sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 + (z - z_3)^2}$$

$$PR_4 = ct_b + \sqrt{(x - x_4)^2 + (y - y_4)^2 + (z - z_4)^2}$$

- tri koordinate položaja (x,y,z)
- grešku sata gps risivera  $t_b$
- c je brzina svetlosti

# GPS rešenje jednačina

- Prethodni sistem može se rešiti pomoću više različitih numeričkih metoda:
  - Transformišemo sistem u linearan
    - Ako imamo 4 satelita koristimo neki od metoda za rešavanje SLAJ npr. Gausovu eliminaciju
    - Ako imamo više od 4 satelita koristimo Metod Najmanjih Kvadrata, pa u okviru tog metoda rešavamo SLAJ npr. Gausovom eliminacijom
  - Nelinearnom Metodom Najmanjih Kvadrata
  - Iterativnom metodom za rešavanje nelinearnih jednačina npr. Njutnovom metodom




# SLAJ sa malim brojem jednačina


- Tri načina za rešavanje:
  - Grafički
  - Kramerovo pravilo
  - Eliminacijom

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$


# Grafički metod (jedinствeno rešenje)




# Grafički metod (nema rešenja)



# Grafički metod (beskonačno mnogo rešenja)



# Grafički metod (loše uslovljen sistem)



# Kramerovo pravilo

- Izračunati determinantu  $D$  matrice  $A$ .
- matrica 2x2
- matrica 3x3

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

# Kramerovo pravilo

- Da bi izračunali  $x_k$  za sistem:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n\end{aligned}$$

- Pravimo novu matricu  $A_k$  tako što u  $A$  zamenimo  $k$ -tu kolonu sa vektorom  $b$  i računamo njenu determinantu  $D_k$ .

$$x_k = \frac{D_k}{D}$$

# Primer

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$



# Kramerovo pravilo

## loše uslovljen sistem

- Šta bi se dogodilo da je determinanta  $D$  ima vrednost blizu nule ili nula?

$$D = \det[A] \approx 0$$

- Deljenje nulom (linearno zavisani sistem) – ima više rešenja.
- Deljenje jako malim brojem (loša opcija zbog grešaka zokruživanja – detaljnije kasnije tokom predavanja).

# Gausova eliminacija

- Manipulisanje jednačinama da bi se eliminisala jedna promenljiva.
- Razviti algoritam koji će to da radi za svaku promenljivu.
- Cilj je doći do gornje trougaone matrice

$$U = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- Zamenom unazad pronaći rešenje sistema.

# Gausova eliminacija

- Direktan metod
  - nema iteracija tj. trenutnih i prethodnih rešenja.
- Koraci:
  - Eliminacija unapred
    - Kolonu po kolonu elimišemo elemente ispod glavne dijagonale
    - Rezultat je gornja torugaona matrica
  - Zamena unazad
    - Izračunavamo  $x_n$  direktno
    - unazad zamenom računamo ostale od  $x_{n-1}$  do  $x_1$

# Gausova eliminacija

- Početak (elimišemo  $x_1$ )
$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n\end{aligned}$$
- Množimo prvu jednačinu sa  $-a_{21}/a_{11}$  i sabiramo je sa drugom

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ \left( a_{21} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{11} \right)x_1 + \left( a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} \right)x_2 + \dots + \left( a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n} \right)x_n &= b_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n\end{aligned}$$

# Gausova eliminacija

- Rezultat

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \dots + a_{3n}x_n = b_3$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

- Ponoviti prethodni postupak dok se ne dobije

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

$$\vdots$$

$$a'_{n2}x_2 + \dots + a'_{nn}x_n = b'_n$$

# Gausova eliminacija

- Prva jednačina zove se pivot jednačina.
- $a_{11}$  je pivot element.
- Nastavljamo: **sada množimo drugu jednačinu sa -  $a'_{32}/a'_{22}$  i saberemo je sa trećom**

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

$$\left( \cancel{a'_{32}} - \frac{a'_{32}}{a'_{22}} a'_{22} \right) x_2 + \dots + \left( a'_{3n} - \frac{a'_{32}}{a'_{22}} a'_{2n} \right) x_n = \left( b'_3 - \frac{a'_{32}}{a'_{22}} b'_2 \right)$$
$$\vdots$$

# Gausova eliminacija

- Ponoviti postupak da bi eliminisali  $a'_{i2}$  i dobili

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

$$a''_{33}x_3 + \dots + a''_{3n}x_n = b''_3$$

$$\vdots$$

$$a''_{n3}x_3 + \dots + a''_{nn}x_n = b''_n$$

- Nastaviti da bi dobili:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

$$a''_{33}x_3 + \dots + a''_{3n}x_n = b''_3$$

$$\vdots$$

$$a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}$$

# Zamena unazad

- Sada možemo zamenom unazad da dobijemo rešenje  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ .
- Običnim deljenjem dobijamo:

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

- Zamenimo  $x_n$  u  $(n-1)$ -u jednačinu

$$a_{n-1,n-1}^{(n-2)} x_{n-1} + a_{n-1,n}^{(n-2)} x_n = b_{n-1}^{(n-2)}$$

- Rešiti za  $x_{n-1}$
- Ponoviti proces da bi dobili:  $x_{n-2}, x_{n-3}, \dots, x_2, x_1$



# Zamena unazad

- Počinjemo sa  $x_n$
- Izračunavamo  $x_{n-2}, x_{n-3}, \dots, x_2, x_1$

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

$$x_i = \frac{b_i^{(i-1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i-1)} x_j}{a_{ii}^{(i-1)}}$$

$$a_{ii}^{(i-1)} \neq 0$$

# Eliminacija prve kolone

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{bmatrix}$$

$$f_{21} = -a_{21} / a_{11}$$

$$f_{31} = -a_{31} / a_{11}$$

$$f_{41} = -a_{41} / a_{11}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & b'_2 \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & a'_{34} & b'_3 \\ 0 & a'_{42} & a'_{43} & a'_{44} & b'_4 \end{bmatrix}$$

$$(2) + f_{21} \times (1)$$

$$(3) + f_{31} \times (1)$$

$$(4) + f_{41} \times (1)$$

# Eliminacija druge kolone

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & b'_2 \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & a'_{34} & b'_3 \\ 0 & a'_{42} & a'_{43} & a'_{44} & b'_4 \end{array} \right]$$

$$f_{32} = -a'_{32} / a'_{22}$$

$$f_{42} = -a'_{42} / a'_{22}$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & b'_2 \\ 0 & 0 & a''_{33} & a''_{34} & b''_3 \\ 0 & 0 & a''_{43} & a''_{44} & b''_4 \end{array} \right]$$

$$(3) + f_{32} \times (2)$$

$$(4) + f_{42} \times (2)$$

# Eliminacija treće kolone

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & b'_2 \\ 0 & 0 & a''_{33} & a''_{34} & a''_3 \\ 0 & 0 & a''_{43} & a''_{44} & a''_4 \end{bmatrix}$$

$$f_{43} = -a''_{43} / a''_{33}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & b'_2 \\ 0 & 0 & a''_{33} & a''_{34} & b''_3 \\ 0 & 0 & 0 & a'''_{44} & b'''_4 \end{bmatrix}$$

**Gornja trougaona  
matrica**

$$(4) + f_{43} \times (3)$$

# Zamena unazad

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & b'_2 \\ 0 & 0 & a''_{33} & a''_{34} & b''_3 \\ 0 & 0 & 0 & a'''_{44} & b'''_4 \end{array} \right]$$

**Gornja trougaona  
matrica**

$$x_4 = b'''_4 / a'''_{44}$$

$$x_3 = (b''_3 - a''_{34}x_4) / a''_{33}$$

$$x_2 = (b'_2 - a'_{23}x_3 - a'_{24}x_4) / a'_{22}$$

$$x_1 = (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - a_{14}x_4) / a_{11}$$

$$a_{11}, a'_{22}, a''_{33}, a'''_{44} \neq 0$$

# Primer

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

$$f_{21} = 1$$

$$f_{31} = 0$$

$$f_{41} = -6$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & -10 & -14 & 5 \end{array} \right]$$

$$(2) + (1) \times f_{21}$$

$$(3) + (1) \times f_{31}$$

$$(4) + (1) \times f_{41}$$

# Eliminacija unapred

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & | & 2 \\ 0 & 2 & -10 & -14 & | & -5 \end{bmatrix}$$

$$f_{32} = -1/2$$

$$f_{42} = -1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & | & 2 \\ 0 & 0 & -14 & -14 & | & -5 \end{bmatrix}$$

$$(3) + (2) \times f_{32}$$

$$(4) + (2) \times f_{42}$$

# Gornja trougaona matrica

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & -14 & -14 & -5 \end{array} \right] \quad f_{43} = -14$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -70 & -33 \end{array} \right] \quad (4) + (3) \times f_{43}$$



# Zamena unazad

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -70 & -33 \end{array} \right]$$

$$x_4 = -33 / -70 = 33/70$$

$$x_3 = 4x_4 - 2 = -4/35$$

$$x_2 = -2x_3 = 8/35$$

$$x_1 = 1 - 2x_3 - 3x_4 = -13/70$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} -13/70 \\ 8/35 \\ -4/35 \\ 33/70 \end{bmatrix}$$

# Algoritam za Gausovu eliminaciju

- 1. **Eliminacija unapred**
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$
- za svaku jednačinu k, k = 1 do n-1
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$
- za svaku jednačinu i, i = (k+1) do n
$$\vdots$$
- (a) pomnoži jednačinu k sa  $-a_{ik}/a_{kk}$ 
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$
- (b) saberi jednačinu k sa jednačinom i
- Ovde dobijamo gornju trougaonu matricu
- 2. **Zamena unazad**
- (a) izračunaj  $x_n$  kao  $b_{nn}/a_{nn}$
- (b) zameni  $x_n$  u (n-1)-u jednačinu, izračunaj  $x_{n-1}$
- (c) ponavljaj (b), za n-2, n-3, itd. dok sve nepoznate nisu određene.

# Matlab kod

```
function x=gauss(A,b)
%A,b su matrica A i vektor b
%x je resenje sistema
[n,m]=size(A);
%eliminacija unapred
for k=1:n-1
    for i=(k+1):n
        f=-A(i,k)/A(k,k);
        for j=k:n
            A(i,j)=A(i,j)+f*A(k,j);
        end
        b(i)=b(i)+f*b(k);
    end
end
%zamena unazad
x(n)=b(n)/A(n,n);
for i=n-1:-1:1
    s=0;
    for j=(i+1):n
        s = s + A(i,j)*x(j);
    end
    x(i)=(b(i)-s)/A(i,i);
end
```

(slajd ponovljen radi lakšeg  
objašnjavanja Matlab koda)

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

$$a''_{33}x_3 + \dots + a''_{3n}x_n = b''_3$$

$$\vdots$$

$$a''_{n3}x_3 + \dots + a''_{nn}x_n = b''_n$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

$$a''_{33}x_3 + \dots + a''_{3n}x_n = b''_3$$

$$\vdots$$

$$a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}$$

# (slajd ponovljen radi lakšeg objašnjavanja Matlab koda)

- Počnemo sa  $x_n$
- Izračunavamo  $x_{n-2}, x_{n-3}, \dots, x_2, x_1$

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

$$x_i = \frac{b_i^{(i-1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i-1)} x_j}{a_{ii}^{(i-1)}}$$

$$a_{ii}^{(i-1)} \neq 0$$

```
>> format short
>> x = Gauss(A,b)
```

```
m =
    4
n =
    4
A =
    1    0    2    3
   -1    2    2   -3
    0    1    1    4
    6    2    2    4
b =
    1
   -1
    2
    1
```

```
f =
    1
A =
    1    0    2    3
    0    2    4    0
    0    1    1    4
    6    2    2    4
b =
    1
    0
    2
    2
```

```
f =
    0
A =
    1    0    2    3
    0    2    4    0
    0    1    1    4
    6    2    2    4
b =
    1
    0
    2
    1
```

```
f =
   -6
A =
    1    0    2    3
    0    2    4    0
    0    1    1    4
    0    2   -10   -14
b =
    1
    0
    2
   -5
```

Eliminišemo prvu kolonu

```
f =
   -0.5000
A =
    1    0    2    3
    0    2    4    0
    0    0   -1    4
    0    2   -10   -14
b =
    1
    0
    2
   -5
```

```
f =
   -1
A =
    1    0    2    3
    0    2    4    0
    0    0   -1    4
    0    0  -14   -14
b =
    1
    0
    2
   -5
```

Elimišemo drugu kolonu

```
f =
  -14
A =
    1    0    2    3
    0    2    4    0
    0    0   -1    4
    0    0   -1  -70
b =
    1
    0
    2
  -33
```

Eliminišemo treću kolonu

```
x =
    0
    0
    0
    0.4714
x =
    0
    0
   -0.1143
    0.4714
x =
    0
    0.2286
   -0.1143
    0.4714
x =
   -0.1857
    0.2286
   -0.1143
    0.4714
```

$x_4$

$x_3$

$x_2$

$x_1$

Zamena unazad

# Broj operacija - efikasnost

- Postaje značajan sa povećanjem broja jednačina.
- Eliminacija unapred izvršava  $O(n^3/3)$  operacija
- Zamena unazad izvršava  $O(n^2/2)$

# Broj operacija - efikasnost

n sabiranja

n množenja i 1 deljenje

Spoljna petlja k	Unutrašnja petlja i	Operacije sabiranja i oduzimanja	Operacije množenja i deljenja
1	2, n	$(n-1)(n)$	$(n-1)(n+1)$
2	3, n	$(n-2)(n-1)$	$(n-2)(n)$
⋮	⋮	⋮	⋮
k	k+1, n	$(n-k)(n-k+1)$	$(n-k)(n-k+2)$
⋮	⋮	⋮	⋮
n-1	n, n	$(1)(2)$	$(1)(3)$

**Ukupan broj operacija za eliminaciju unapred =  $2n^3/3 + O(n^2)$**

**Ukupan broj operacija za zamenu unazad =  $n^2 + O(n)$**



Matlab kod (ponovljen zbog prethodnog  
slajda)

```
function x=gauss(A,b)
%A,b su matrica A i vektor b
%x je resenje sistema
[n,m]=size(A);
%eliminacija unapred
for k=1:n-1
    for i=(k+1):n
        f=-A(i,k)/A(k,k);
        for j=k:n
            A(i,j)=A(i,j)+f*A(k,j);
        end
        b(i)=b(i)+f*b(k);
    end
end
%zamena unazad
x(n)=b(n)/A(n,n);
for i=n-1:-1:1
    s=0;
    for j=(i+1):n
        s = s + A(i,j)*x(j);
    end
    x(i)=(b(i)-s)/A(i,i);
end
```

# Broj operacija - efikasnost

- **Broj operacija u pokretnom zarezu (flops, *floating-point operations*) za Gausovu eliminaciju**


$n$	Eliminacija unapred	Zamena unazad	Ukupno Flops- a	$\frac{2n^3}{3}$	Procenat koji ide na eliminaciju
10	705	100	805	667	87.58%
100	671550	10000	681550	666667	98.53%
1000	$6.67 \times 10^8$	1000000	$6.68 \times 10^6$	$6.67 \times 10^8$	99.85%

- **Broj operacija rapidno raste sa porastom  $n$**
- **Najviše operacija se troši na korak eliminacije**
- **Dakle, efikasnost se može poboljšati poboljšanjem efikasnosti eliminacije**
- **Paralelizacija operacija, prilagođavanje za multi-core procesore itd.**

# Problemi sa Gaussovom eliminacijom

- Problemi sa Gaussovom eliminacijom
  - deljenje nulom
  - deljenje malim brojevima (greške u zaokruživanju)
  - loše uslovljeni sistemi

# Problem deljenja malim brojevima



$$1/0.00046=2173.91$$

$$1/0.0005 = 2000$$

$$2173.91 - 2000 = 173.91 \text{ – ozbiljna greška}$$

$$1/2000 = 0.0005$$


$$1/2001 = 0.00049975$$

$$0.0005 - 0.00049975 = 0.00000025 \text{ – mala greška}$$


# Greške u zaokruživanju

- Jako mnogo zaokruživanja u  $n^3/3$  operacija.
- Još važnije – greška se propagira (nagomilava).
- Za velike sisteme (sa više od 100 jednačina), greške u zaokruživanju su veoma značajne.
- Greške u zaokruživanju su naročito ozbiljne kod loše uslovljenih sistema.
- To su sistemi kod kojih male promene u koeficijentima dovode do velikih promena u rešenju.

# Loše uslovljen sistem



# Dobro uslovljen sistem



# Loše uslovljen sistem

- Ako je sistem 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -\frac{a_{11}}{a_{12}}x_1 + \frac{b_1}{a_{12}} \\ x_2 = -\frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 + \frac{b_2}{a_{22}} \end{cases}$$
- loše uslovljen to znači da su nagibi pravih vrlo bliski pa:

$$\frac{a_{11}}{a_{12}} \cong \frac{a_{21}}{a_{22}} \Rightarrow a_{11}a_{22} \cong a_{21}a_{12} \Rightarrow a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \cong 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \approx 0 \Rightarrow$$

Ako koristimo Kramerovo pravilo imali bi deljenje jako malim brojem, što znači da male promene D uzrokuju velike promene u x.



# Parcijalni pivoting

- Problem deljenja nulom ili jako malim brojevima rešava se “pivotingom”:
  - Kad radimo eliminaciju unapred bираmo uvek pivot koji ima najveću apsolutnu vrednost u toj koloni.
  - Zamenimo trenutnu jednačinu sa tom kod koje smo pronašli najveći element – parcijalni pivoting.
- Ako pivot tražimo u celoj matrici, a ne u trenutnoj koloni onda menjamo i vrstu i kolonu i imamo kompletan pivoting.
- Kompletan pivoting se retko koristi jer je zahtevan, a ne pomaže mnogo.

# Gausova eliminacija sa parcijalnim pivotingom

- **Eliminacija unapred**
- za svaku jednačinu  $k$ ,  $k = 1$  do  $n-1$ 
  - pretražiti sve jednačine  $i \geq k$  za max. element po apsolutnoj vrednosti
  - zameniti jednačinu  $k$  sa tom koja ima max.
  - Izvšriti eliminaciju
    - (a) pomnožiti jednačinu  $k$  sa  $-a_{ik}/a_{kk}$
    - (b) sabrati sa jednačinom  $i$

# Parcijalni pivoting

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & & + 2x_3 & + 3x_4 & = 1 \\ -x_1 & + 2x_2 & + 2x_3 & - 3x_4 & = -1 \\ & x_2 & + x_3 & + 4x_4 & = 2 \\ 6x_1 & + 2x_2 & + 2x_3 & + 4x_4 & = 1 \end{array}$$

$$[A \mid b] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

# Eliminacija unapred

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right]$$

**Zameniti vrste 1 i 4**

$$f_{21} = 1/6$$

$$f_{31} = 0$$

$$f_{41} = -1/6$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 7/3 & 7/3 & -7/3 & -5/6 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -1/3 & 5/3 & 7/3 & 5/6 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} (2) + (1) \times f_{21} \\ (3) + (1) \times f_{31} \\ (4) + (1) \times f_{41} \end{array}$$

# Eliminacija unapred

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 7/3 & 7/3 & -7/3 & -5/6 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -1/3 & 5/3 & 7/3 & 5/6 \end{array} \right]$$

**Zamena vrsta nije potrebna**

$$f_{32} = -3/7$$

$$f_{42} = -1/7$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 7/3 & 7/3 & -7/3 & -5/6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 33/14 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 5/7 \end{array} \right]$$

$$(3) + (2) \times f_{32}$$

$$(4) + (2) \times f_{42}$$

# Zamena unazad

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 7/3 & 7/3 & -7/3 & -5/6 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 5/7 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 33/14 \end{array} \right] \quad \text{Zameniti vrste 3 i 4}$$

$f_{43} = 0$

$$x_4 = (33/14)/5 = 33/70$$

$$x_3 = (5/7 - 2 x_4)/2 = -4/35$$

$$x_2 = (-5/6 + 7/3 x_4 - 7/3 x_3)/(7/3) = 8/35$$

$$x_1 = (1 - 4 x_4 - 2 x_3 - 2 x_2)/6 = -13/70$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} -13/70 \\ 8/35 \\ -4/35 \\ 33/70 \end{bmatrix}$$

```

function x=gaussPivoting(A,b)
[n,m]=size(A);
%eliminacija unapred
for k=1:n-1
    %pronaci vrstu sa maksimalnim elementom po
    %apsolutnoj vrednosti u k-toj koloni krenuti od vrste k
    [maxEl vrMax]=max(abs(A(k:n,k)));
    %zameniti tu vrstu sa k-tom vrstom
    vrMax = k + vrMax - 1;%jer max vraca vrednosti u intervalu 1..n
    temp = A(vrMax,:);
    A(vrMax,:)=A(k,:);
    A(k,:)=temp;
    %istu zamenu uraditi u vektoru b da bi sistem bio dosledan
    temp=b(k);
    b(k)=b(vrMax);
    b(vrMax)=temp;
    for i=(k+1):n
        m=-A(i,k)/A(k,k);
        for j=k:n
            A(i,j)=A(i,j)+m*A(k,j);
        end
        b(i)=b(i)+m*b(k);
    end
end
%zamena unazad

```

```
>> format short
>> x=GaussPivoting(A,b)
A =          b=
    1         0         2         3         1
   -1         2         2        -3        -1
    0         1         1         4         2
    6         2         2         4         1
vrMax =
    4
```

Pronalazimo prvi pivot tj. njegovu vrstu

```
A =          b=
    6         2         2         4         1
   -1         2         2        -3        -1
    0         1         1         4         2
    1         0         2         3         1
f =
0.1667
```

Zamenimo vrstu 1 sa vrstom 4

```
A =          b=
  6.0000    2.0000    2.0000    4.0000    1.0000
         0    2.3333    2.3333   -2.3333   -0.8333
         0    1.0000    1.0000    4.0000    2.0000
  1.0000         0    2.0000    3.0000    1.0000
f =
0
```

```
A =          b=
  6.0000    2.0000    2.0000    4.0000    1.0000
         0    2.3333    2.3333   -2.3333   -0.8333
         0    1.0000    1.0000    4.0000    2.0000
  1.0000         0    2.0000    3.0000    1.0000
f =
-0.1667
```

Eliminišemo prvu kolonu

```
A =          b=
  6.0000    2.0000    2.0000    4.0000    1.0000
         0    2.3333    2.3333   -2.3333   -0.8333
         0    1.0000    1.0000    4.0000    2.0000
         0   -0.3333    1.6667    2.3333    0.8333
```

Nema potrebe za zamenom vrsta