

# Resumen de teoremas para el final de Lógica


Agustín Curto, agucurto95@gmail.com  
Francisco Nievas, frannievas@gmail.com

2017

## Contents

1	Estructuras algebraicas ordenadas	2
---	-----------------------------------	---

**Nota:** Este resumen se corresponde con la materia dictada en el año 2017. Los autores no se responsabilizan de posibles cambios que pudiesen realizarse en los temas dictados en la misma, así como tampoco de errores involuntarios que pudiesen existir en dicho resumen.

Por favor, mejorá este documento en github   
<https://github.com/ResumenesFaMAF/resumenLogica>

# 1 Estructuras algebraicas ordenadas

**Lemma 1.** Sean  $(P, \leq)$  y  $(P', \leq')$  posets. Supongamos que  $F$  es un isomorfismo de  $(P, \leq)$  en  $(P', \leq')$ , entonces:

- a) Para cada  $S \subseteq P$  y cada  $a \in P$ , se tiene que  $a$  es **cota superior** (resp. **inferior**) de  $S$  si y solo si  $F(a)$  es **cota superior** (resp. **inferior**) de  $F(S)$ .
- b) Para cada  $S \subseteq P$ , se tiene que  $\exists \sup(S)$  si y solo si  $\exists \sup(F(S))$  y en el caso de que existan tales elementos se tiene que  $F(\sup(S)) = \sup(F(S))$ .
- c)  $P$  tiene 1 (resp. 0) si y solo si  $P'$  tiene 1 (resp. 0) y en tal caso tales elementos están conectados por  $F$ .
- d) Para cada  $m \in P$ ,  $m$  es **maximal** (resp. **minimal**) si y solo si  $F(m)$  es **maximal** (resp. **minimal**).
- e) Para  $a, b \in P$ , tenemos que  $a \prec b$  si y solo si  $F(a) \prec' F(b)$ .

*Proof.* a) Probaremos solo el caso de la **cota superior**.

$\Rightarrow$  Supongamos que  $a$  es **cota superior** de  $S$ , veamos entonces que  $F(a)$  es **cota superior** de  $F(S)$ . Sean:

- $x \in F(S)$
- $s \in S$  tal que  $x = F(s)$ .

Ya que  $s \leq a$ , tenemos que  $x = F(s) \leq' F(a)$ . Luego,  $F(a)$  es **cota superior**.

$\Leftarrow$  Supongamos ahora que  $F(a)$  es **cota superior** de  $F(S)$  y veamos entonces que  $a$  es cota superior de  $S$ .

Sea  $s \in S$ , ya que  $F(s) \leq' F(a)$ , tenemos que  $s = F^{-1}(F(s)) \leq F^{-1}(F(a)) = a$ . Por lo tanto,  $a$  es **cota superior**.

- b)  $\Rightarrow$  Supongamos existe  $\sup(S)$ . Veamos que  $F(\sup(S))$  es el supremo de  $F(S)$ . Por el inciso (a)  $F(\sup(S))$  es cota superior de  $F(S)$ . Veamos que es la menor de las cotas superiores. Supongamos  $b'$  cota superior de  $F(S)$ , entonces  $F^{-1}(b')$  es cota superior de  $S$ , es decir,  $\sup(S) \leq F^{-1}(b')$ , produciendo  $F(\sup(S)) \leq' b'$ . Por lo tanto,  $F(\sup(S))$  es el supremo de  $F(S)$ .

$\Leftarrow$  Supongamos existe  $\sup(F(S))$ . Veamos que  $F^{-1}(\sup(F(S)))$  es el supremo de  $S$ . Nuevamente, por el inciso (a)  $F^{-1}(\sup(F(S)))$  es cota superior de  $S$ . Veamos que es la menor de las cotas superiores. Supongamos  $b$  cota superior de  $S$ , entonces  $F(b)$  es cota superior de  $F(S)$ , es decir,  $\sup(F(S)) \leq F(b)$ , produciendo  $F^{-1}(\sup(F(S))) \leq b$ . Por lo tanto,  $F^{-1}(\sup(F(S)))$  es el supremo de  $S$ .

- c) Se desprende del inciso (b) tomando  $S = P$ .

- d) Probaremos solo el caso **maximal**.

$\Rightarrow$  Supongamos que  $m$  es maximal de  $(P, \leq)$ . Veamos que  $F(m)$  es maximal de  $(P', \leq')$ . Supongamos que  $F(m)$  no es maximal de  $(P', \leq')$ , es decir,  $F(m) <' b' \forall b' \in P'$ . Dado que  $F$  es isomorfismo:

$$\begin{aligned} F^{-1}(F(m)) &< F^{-1}(b') \\ m &< F^{-1}(b') \end{aligned}$$

Lo cual es un absurdo, dado que  $m$  es maximal de  $(P, \leq)$ . Por lo tanto,  $F(m)$  es maximal de  $(P', \leq')$ .

$\Leftarrow$  Supongamos que  $F(m)$  es maximal de  $(P', \leq')$ . Veamos que  $m$  es maximal de  $(P, \leq)$ . Supongamos que  $m$  no es maximal de  $(P, \leq)$ , es decir,  $m < b \forall b \in P$ . Dado que  $F$  es isomorfismo:

$$F(m) < F(b)$$

Lo cual es un absurdo, dado que  $F(m)$  es maximal de  $(P', \leq')$ . Por lo tanto,  $m$  es maximal de  $(P, \leq)$ .

e)  $\Rightarrow$  Supongamos  $a \prec b$ , veamos que  $F(a) \prec' F(b)$ . Debemos ver:

$$1) F(a) <' F(b)$$

$$2) \nexists z' \text{ tal que } F(a) < z' < F(b)$$

Ya que  $a \prec b$ , por definición tenemos:  $\boxed{a < b \text{ y } \nexists z \text{ tal que } a < z < b}$  ( $\star$ )

Dado que la función  $F$  es un isomorfismo, se cumple (1). Veamos que se cumple (2), supongamos que  $\exists z'$  tal que  $F(a) < z' < F(b)$ . Luego, nuevamente utilizando que  $F$  es isomorfismo, tenemos:

$$\begin{array}{ccccc} F^{-1}(F(a)) & < & F^{-1}(z') & < & F^{-1}(F(b)) \\ a & < & F^{-1}(z') & < & b \end{array}$$

Lo cual, contradice ( $\star$ ), el absurdo vino de suponer que  $\exists z'$  tal que  $F(a) < z' < F(b)$ , por lo tanto  $\nexists z'$  tal que  $F(a) < z' < F(b)$ .

Finalmente, dado que se cumplen los puntos (1) y (2), se cumple también  $F(a) \prec' F(b)$ .

$\Leftarrow$  Supongamos  $F(a) \prec' F(b)$ , veamos que  $a \prec b$ .

Ya que  $F^{-1} : (P', \leq') \rightarrow (P, \leq)$  es isomorfismo, por lo ya visto tenemos:

$$\begin{array}{ccc} F^{-1}(F(a)) & \prec & F^{-1}(F(b)) \\ a & \prec & b \end{array}$$

□

**Lemma 2.** Dado un reticulado  $(L, \leq)$  y elementos  $x, y, z, w \in L$ , se cumplen las siguientes propiedades:

$$(1) x \leq x \text{ s } y$$

$$(8) x \text{ i } (x \text{ s } y) = x$$

$$(2) x \text{ i } y \leq x$$

$$(9) (x \text{ s } y) \text{ s } z = x \text{ s } (y \text{ s } z)$$

$$(3) x \text{ s } x = x \text{ i } x = x$$

$$(10) (x \text{ i } y) \text{ i } z = x \text{ i } (y \text{ i } z)$$

$$(4) x \text{ s } y = y \text{ s } x$$

$$(11) \text{ Si } x \leq z \text{ e } y \leq w \text{ entonces:}$$

$$(5) x \text{ i } y = y \text{ i } x$$

$$\bullet x \text{ s } y \leq z \text{ s } w$$

$$(6) x \leq y \Leftrightarrow x \text{ s } y = y \Leftrightarrow x \text{ i } y = x$$

$$\bullet x \text{ i } y \leq z \text{ i } w$$

$$(7) x \text{ s } (x \text{ i } y) = x$$

$$(12) (x \text{ i } y) \text{ s } (x \text{ i } z) \leq x \text{ i } (y \text{ s } z)$$

*Proof.* Dado que las propiedades (1), (2), (3), (4), (5), (6), son consecuencia inmediata de las definiciones de s e i, probaremos solo las restantes.

(7)

$$\begin{aligned}
x \dot{\vee} y &\leq x && \text{Por (2)} \\
(x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} x &= x && \text{Por (6)} \\
x \dot{\wedge} (x \dot{\vee} y) &= x && \text{Por (3)}
\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}
x &\leq x \dot{\wedge} y && \text{Por (1)} \\
x \dot{\vee} (y \dot{\wedge} x) &= x && \text{Por (6)}
\end{aligned}$$

(9) Para probar la igualdad probaremos las siguientes desigualdades:

- $\boxed{(x \dot{\wedge} y) \dot{\wedge} z \leq x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)}$

Notese que  $x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)$  es cota superior de  $\{x, y, z\}$  ya que:

$$\begin{aligned}
x &\leq x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z) \\
y &\leq (y \dot{\wedge} z) \leq x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z) \\
z &\leq (y \dot{\wedge} z) \leq x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)
\end{aligned}$$

Por otro lado,  $x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)$  es cota superior de  $\{x, y\}$ , tenemos que  $x \dot{\wedge} y \leq x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)$ , por lo cual  $x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)$  es cota superior del conjunto  $\{x \dot{\wedge} y, z\}$ , lo cual dice que  $(x \dot{\wedge} y) \dot{\wedge} z \leq x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)$ .

- $\boxed{(x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z \geq x \dot{\wedge} (y \dot{\vee} z)}$

Notese que  $(x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z$  es cota superior de  $\{x, y, z\}$  ya que:

$$\begin{aligned}
x &\leq x \dot{\wedge} y \leq (x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z \\
y &\leq x \dot{\wedge} y \leq (x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z \\
z &\leq (x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z
\end{aligned}$$

Por otro lado,  $(x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z$  es cota superior de  $\{y, z\}$ , tenemos que  $y \dot{\vee} z \leq (x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z$ , por lo cual  $(x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z$  es cota superior del conjunto  $\{x, y \dot{\vee} z\}$ , lo cual dice que  $(x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z \geq x \dot{\wedge} (y \dot{\vee} z)$ .

Por lo tanto,  $(x \dot{\wedge} y) \dot{\vee} z = x \dot{\wedge} (y \dot{\vee} z)$

(10) Para probar la igualdad probaremos las siguientes desigualdades:

- $\boxed{(x \dot{\vee} y) \dot{\vee} z \leq x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z)}$

Notese que  $x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z)$  es cota inferior de  $\{x, y, z\}$  ya que:

$$\begin{aligned}
x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z) &\leq x \\
(y \dot{\vee} z) \dot{\vee} x &\leq y \dot{\vee} z \leq x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z) \\
z &\leq (y \dot{\vee} z) \leq x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z)
\end{aligned}$$

Por otro lado,  $x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z)$  es cota inferior de  $\{x, y\}$ , tenemos que  $x \dot{\vee} y \leq x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z)$ , por lo cual  $x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z)$  es cota inferior del conjunto  $\{x \dot{\vee} y, z\}$ , lo cual dice que  $(x \dot{\vee} y) \dot{\vee} z \leq x \dot{\vee} (y \dot{\vee} z)$ .

- $\boxed{(x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z \geq x \dot{\vee} (y \dot{\wedge} z)}$

Notese que  $(x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z$  es cota inferior de  $\{x, y, z\}$  ya que:

$$\begin{aligned}
x &\leq x \dot{\vee} y \leq (x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z \\
y &\leq x \dot{\vee} y \leq (x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z \\
z &\leq (x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z
\end{aligned}$$

Por otro lado,  $(x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z$  es cota inferior de  $\{y, z\}$ , tenemos que  $y \dot{\wedge} z \leq (x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z$ , por lo cual  $(x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z$  es cota inferior del conjunto  $\{x, y \dot{\wedge} z\}$ , lo cual dice que  $(x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z \geq x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)$ .

Por lo tanto,  $(x \dot{\vee} y) \dot{\wedge} z = x \dot{\wedge} (y \dot{\wedge} z)$

(11)

$$\begin{array}{ll} x \leq z \leq z \text{ s } w & x \leq z \Rightarrow x \dot{\vee} y \leq z \\ y \leq w \leq z \text{ s } w & y \leq w \Rightarrow x \dot{\vee} y \leq w \end{array}$$

Luego,  $z \text{ s } w$  es cota superior de  $\{x, y\}$  y  $x \dot{\vee} y$  es cota inferior de  $\{z, w\}$ , por lo tanto,  $x \text{ s } y \leq z \text{ s } w$  y  $x \dot{\vee} y \leq z \dot{\wedge} w$ .

(12)

$$\left. \begin{array}{l} (x \dot{\vee} y), (x \dot{\wedge} z) \leq x \\ (x \dot{\vee} y), (x \dot{\wedge} z) \leq y \text{ s } z \end{array} \right\} \Rightarrow (x \dot{\vee} y), (x \dot{\wedge} z) \leq x \dot{\wedge} (y \text{ s } z)$$

$$\therefore (x \dot{\vee} y) \text{ s } (x \dot{\wedge} z) \leq x \dot{\wedge} (y \text{ s } z)$$

□

**Lemma 3.** Sea  $(L, \leq)$  un reticulado, dados elementos  $x_1, \dots, x_n \in L$ , con  $n \geq 2$ , se tiene

$$\begin{array}{ll} (\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n & = \sup(\{x_1, \dots, x_n\}) \\ (\dots (x_1 \dot{\wedge} x_2) \dot{\wedge} \dots) \dot{\wedge} x_n & = \inf(\{x_1, \dots, x_n\}) \end{array}$$

*Proof.* Probaremos por inducción en  $n$ .

Caso Base:  $n = 2$

$$\begin{array}{ll} x_1 \text{ s } x_2 & = \sup(\{x_1, x_2\}) \\ x_1 \dot{\wedge} x_2 & = \inf(\{x_1, x_2\}) \end{array}$$

Lo cual vale, dado que es la definición.

Caso Inductivo:  $n > 2$

Supongamos ahora que vale para  $n$  y veamos entonces que vale para  $n+1$ . Sean  $x_1, \dots, x_{n+1} \in L$ , por hipótesis inductiva tenemos que:

$$\begin{array}{ll} (\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n & = \sup(\{x_1, \dots, x_n\}) \quad (\star_1) \\ (\dots (x_1 \dot{\wedge} x_2) \dot{\wedge} \dots) \dot{\wedge} x_n & = \inf(\{x_1, \dots, x_n\}) \quad (\star_2) \end{array}$$

Veamos entonces que:

$$\begin{array}{ll} ((\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n) \text{ s } x_{n+1} & = \sup(\{x_1, \dots, x_{n+1}\}) \quad (\dagger_1) \\ ((\dots (x_1 \dot{\wedge} x_2) \dot{\wedge} \dots) \dot{\wedge} x_n) \dot{\wedge} x_{n+1} & = \inf(\{x_1, \dots, x_{n+1}\}) \quad (\dagger_2) \end{array}$$

Para ello debemos ver  $((\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n) \text{ s } x_{n+1}$  es cota superior de  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$  y que es la menor de las cotas superiores. Además, que  $((\dots (x_1 \dot{\wedge} x_2) \dot{\wedge} \dots) \dot{\wedge} x_n) \dot{\wedge} x_{n+1}$  es cota inferior de  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$  y que es la mayor de las cotas inferiores.

Es fácil ver que  $((\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n) \text{ s } x_{n+1}$  es cota superior de  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ . Supongamos que  $z$  es otra cota superior de  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ . Ya que  $z$  es también cota superior del conjunto  $\{x_1, \dots, x_n\}$ , por  $(\star_1)$  tenemos que:

$$(\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n \leq z$$

Además, dado que  $x_{n+1} \leq z$ , tenemos que:

$$((\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n) \text{ s } x_{n+1} \leq z$$

Por lo tanto, vale  $(\dagger_1)$ .

Nuevamente, es fácil ver que  $((\dots (x_1 \text{ i } x_2) \text{ i } \dots) \text{ i } x_n) \text{ i } x_{n+1}$  es cota inferior de  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ . Supongamos que  $z'$  es otra cota inferior de  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ . Ya que  $z'$  es también cota inferior del conjunto  $\{x_1, \dots, x_n\}$ , por  $(\star_2)$  tenemos que:

$$z' \leq (\dots (x_1 \text{ i } x_2) \text{ i } \dots) \text{ i } x_n$$

Además, dado que  $z' \leq x_{n+1}$ , tenemos que:

$$z' \leq ((\dots (x_1 \text{ i } x_2) \text{ i } \dots) \text{ i } x_n) \text{ i } x_{n+1}$$

Por lo tanto, vale  $(\dagger_2)$ . □

**Theorem 4.** Sea  $(L, \text{ s }, \text{ i })$  un reticulado, la relación binaria definida por:

$$x \leq y \Leftrightarrow x \text{ s } y = y$$

es un orden parcial sobre  $L$  para el cual se cumple:

$$\begin{aligned} \sup(\{x, y\}) &= x \text{ s } y \\ \inf(\{x, y\}) &= x \text{ i } y \end{aligned}$$

*Proof.* • Reflexiva: Sea  $x \in L$  un elemento cualquiera. Luego,

$$\left. \begin{aligned} x \text{ s } x &= x \\ x \text{ i } x &= x \end{aligned} \right\} \Rightarrow x \leq x$$

- Antisimétrica: Sean  $x, y \in L$  elementos cualesquiera. Supongamos que  $x \leq y$  e  $y \leq x$ , entonces:

$$\left. \begin{aligned} x \leq y &\Rightarrow x \text{ s } y = y \\ y \leq x &\Rightarrow x \text{ s } y = x \end{aligned} \right\} \Rightarrow x = y$$

- Transitiva: Supongamos que  $x \leq y$  e  $y \leq z$ , entonces:

$$x \text{ s } z = x \text{ s } (y \text{ s } z) = (x \text{ s } y) \text{ s } z = y \text{ s } z = z$$

por lo cual  $x \leq z$ .

Veamos ahora que  $\sup(\{x, y\}) = x \text{ s } y$ . Es claro que  $x \text{ s } y$  es una cota superior del conjunto  $\{x, y\}$ , veamos que es la menor. Supongamos  $x, y \leq z$ , entonces:

$$(x \text{ s } y) \text{ s } z = x \text{ s } (y \text{ s } z) = x \text{ s } z = z$$

por lo que  $x \text{ s } y \leq z$ , es decir,  $x \text{ s } y$  es la menor cota superior.

Resta probar que  $\inf(\{x, y\}) = x \text{ i } y$ . Nuevamente, es claro que  $x \text{ i } y$  es una cota inferior del conjunto  $\{x, y\}$ , veamos que es la mayor. Supongamos  $z \leq x, y$ , entonces:

$$(x \text{ i } y) \text{ i } z = x \text{ i } (y \text{ i } z) = x \text{ i } z = z$$

por lo que  $z \leq x \text{ i } y$ , es decir,  $x \text{ i } y$  es la mayor cota inferior. □

**Lemma 5.** Si  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  es un homomorfismo biyectivo, entonces  $F$  es un isomorfismo.

*Proof.* Debemos probar que  $F^{-1}$  es un homomorfismo. Sean  $F(x), F(y)$  dos elementos cualesquiera de  $L'$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} F^{-1}(F(x) \mathbf{s}' F(y)) &= F^{-1}(F(x \mathbf{s} y)) & F^{-1}(F(x) \mathbf{i}' F(y)) &= F^{-1}(F(x \mathbf{i} y)) \\ &= x \mathbf{s} y & &= x \mathbf{i} y \\ &= F^{-1}(F(x)) \mathbf{s} F^{-1}(F(y)) & &= F^{-1}(F(x)) \mathbf{i} F^{-1}(F(y)) \end{aligned}$$

Luego,  $F^{-1}$  es homomorfismo y por lo tanto  $F$  es isomorfismo.  $\square$

**Lemma 6.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  reticulados y sea  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  un homomorfismo, entonces  $I_F$  es un subuniverso de  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$ .

*Proof.* Ya que  $L \neq \emptyset$ , tenemos que  $I_F \neq \emptyset$ . Sean  $a, b \in I_F$ ,  $x, y \in L$  tales que  $F(x) = a$  y  $F(y) = b$ . Se tiene que:

$$\begin{aligned} a \mathbf{s}' b &= F(x) \mathbf{s}' F(y) = F(x \mathbf{s} y) \in I_F \\ a \mathbf{i}' b &= F(x) \mathbf{i}' F(y) = F(x \mathbf{i} y) \in I_F \end{aligned}$$

por lo cual  $I_F$  es cerrada bajo  $\mathbf{s}'$  e  $\mathbf{i}'$ .  $\square$

**Lemma 7.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  reticulados y sean  $(L, \leq)$  y  $(L', \leq')$  los posets asociados. Sea  $F : L \rightarrow L'$  una función, entonces  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  si y solo si  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \leq)$  en  $(L', \leq')$ .

*Proof.*  $\Rightarrow$  Supongamos que  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$ .

Sean  $x, y \in L$  tales que  $x \leq y$ . Tenemos:

$$\begin{aligned} y &= x \mathbf{s} y \\ F(y) &= F(x \mathbf{s} y) \\ &= F(x) \mathbf{s}' F(y) \\ \therefore F(x) &\leq' F(y) \end{aligned}$$

Sean  $x', y' \in L'$  tales que  $x' \leq' y'$ . Tenemos:

$$\begin{aligned} y' &= x' \mathbf{s}' y' \\ F^{-1}(y') &= F^{-1}(x' \mathbf{s}' y') \\ &= F^{-1}(x') \mathbf{s} F^{-1}(y') \\ \therefore F^{-1}(x') &\leq F^{-1}(y') \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \leq)$  en  $(L', \leq')$ .

$\Leftarrow$  Supongamos ahora que  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \leq)$  en  $(L', \leq')$ , entonces el **Lemma 1** nos dice que  $F$  y  $F_1$  respetan la operaciones de supremo e ínfimo, por lo cual  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$ .  $\square$

**Lemma 8.** Sea  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}})$  un reticulado. El orden parcial  $\tilde{\leq}$  asociado a este reticulado cumple:

$$x/\theta \tilde{\leq} y/\theta \Leftrightarrow y \theta (x \mathbf{s} y)$$

*Proof.* Veamos que  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}})$  satisface las 7 identidades de la definición de reticulado. Sean  $x/\theta, y/\theta, z/\theta$  elementos cualesquiera de  $L/\theta$ .

$$(I1) \quad \boxed{x/\theta \tilde{s} x/\theta = x/\theta \tilde{i} x/\theta = x/\theta}$$

$$\begin{aligned} x/\theta \tilde{s} x/\theta &= (x \mathbf{s} x)/\theta = x/\theta \\ x/\theta \tilde{i} x/\theta &= (x \mathbf{i} x)/\theta = x/\theta \end{aligned}$$

$$(I2) \quad \boxed{x/\theta \tilde{s} y/\theta = y/\theta \tilde{s} x/\theta}$$

$$\begin{aligned} x/\theta \tilde{s} y/\theta &= (x \mathbf{s} y)/\theta \\ &= (y \mathbf{s} x)/\theta \\ &= y/\theta \tilde{s} y/\theta \end{aligned}$$

$$(I3) \quad \boxed{x/\theta \tilde{i} y/\theta = y/\theta \tilde{i} x/\theta}$$

$$\begin{aligned} x/\theta \tilde{i} y/\theta &= (x \mathbf{i} y)/\theta \\ &= (y \mathbf{i} x)/\theta \\ &= y/\theta \tilde{i} y/\theta \end{aligned}$$

$$(I4) \quad \boxed{(x/\theta \tilde{s} y/\theta) \tilde{s} z/\theta = x/\theta \tilde{s} (y/\theta \tilde{s} z/\theta)}$$

$$\begin{aligned} (x/\theta \tilde{s} y/\theta) \tilde{s} z/\theta &= (x \mathbf{s} y)/\theta \tilde{s} z/\theta \\ &= ((x \mathbf{s} y) \mathbf{s} z)/\theta \\ &= (x \mathbf{s} (y \mathbf{s} z))/\theta \\ &= x/\theta \tilde{s} (y \mathbf{s} z)/\theta \\ &= x/\theta \tilde{s} (y/\theta \tilde{s} z/\theta) \end{aligned}$$

$$(I5) \quad \boxed{(x/\theta \tilde{i} y/\theta) \tilde{i} z/\theta = x/\theta \tilde{i} (y/\theta \tilde{i} z/\theta)}$$

$$\begin{aligned} (x/\theta \tilde{i} y/\theta) \tilde{i} z/\theta &= (x \mathbf{i} y)/\theta \tilde{i} z/\theta \\ &= ((x \mathbf{i} y) \mathbf{i} z)/\theta \\ &= (x \mathbf{i} (y \mathbf{i} z))/\theta \\ &= x/\theta \tilde{i} (y \mathbf{i} z)/\theta \\ &= x/\theta \tilde{i} (y/\theta \tilde{i} z/\theta) \end{aligned}$$

$$(I6) \quad \boxed{x/\theta \tilde{s} (x/\theta \tilde{i} y/\theta) = x/\theta}$$

$$\begin{aligned} x/\theta \tilde{s} (x/\theta \tilde{i} y/\theta) &= x/\theta \tilde{s} (x \mathbf{i} y)/\theta \\ &= (x \mathbf{s} (x \mathbf{i} y))/\theta \\ &= x/\theta \end{aligned}$$

$$(I7) \quad \boxed{x/\theta \tilde{i} (x/\theta \tilde{s} y/\theta) = x/\theta}$$

$$\begin{aligned} x/\theta \tilde{i} (x/\theta \tilde{s} y/\theta) &= x/\theta \tilde{i} (x \mathbf{s} y)/\theta \\ &= (x \mathbf{i} (x \mathbf{s} y))/\theta \\ &= x/\theta \end{aligned}$$

□

**Corollary 9.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado en el cual hay un elemento máximo 1 (resp. mínimo 0), entonces si  $\theta$  es una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$ ,  $1/\theta$  (resp.  $0/\theta$ ) es un elemento máximo (resp. mínimo) de  $(L/\theta, \tilde{s}, \tilde{i})$ .

*Proof.* Ya que  $1 \theta (x \mathbf{s} 1)$ , para cada  $x \in L$ , tenemos que  $x/\theta \tilde{\leq} 1/\theta$ , para cada  $x \in L$ . □

**Lemma 10.** Si  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  es un homomorfismo de reticulados, entonces  $\ker F$  es una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$ .

*Proof.* Veamos primero que  $\ker F$  es una relación de equivalencia.

- Reflexiva:  $(x, x) \in \ker F$ . Trivial pues  $F(x) = F(x)$ .
- Simétrica: Si  $(x, y) \in \ker F \Rightarrow (y, x) \in \ker F$ .  
Si  $(x, y) \in \ker F \Rightarrow F(x) = F(y)$ . Luego, vale también  $F(y) = F(x)$ .
- Transitiva: Si  $(x, y), (y, z) \in \ker F \Rightarrow (x, z) \in \ker F$ .

$$\left. \begin{aligned} (x, y) &\in \ker F \Rightarrow F(x) = F(y) \\ (y, z) &\in \ker F \Rightarrow F(y) = F(z) \end{aligned} \right\} \Rightarrow F(x) = F(y) = F(z)$$

Por lo tanto,  $(x, z) \in \ker F$ .

Supongamos  $x \ker F(x')$  y  $y \ker F(y')$ , entonces:

$$\begin{aligned} F(x \mathbf{s} y) &= F(x) \mathbf{s}' F(y) = F(x') \mathbf{s}' F(y') = F(x' \mathbf{s} y') \\ F(x \mathbf{i} y) &= F(x) \mathbf{i}' F(y) = F(x') \mathbf{i}' F(y') = F(x' \mathbf{i} y') \end{aligned}$$

lo cual nos dice que  $(x \mathbf{s} y) \ker F(x' \mathbf{s} y')$  y  $(x \mathbf{i} y) \ker F(x' \mathbf{i} y')$ . □



**Lemma 11.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado y sea  $\theta$  una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$ , entonces  $\pi_\theta$  es un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}})$ . Además  $\ker \pi_\theta = \theta$ .

*Proof.* Sean  $x, y \in L$  elementos cualquier. Tenemos que:

$$\begin{aligned}\pi_\theta(x \mathbf{s} y) &= (x \mathbf{s} y)/\theta = x/\theta \tilde{\mathbf{s}} y/\theta = \pi_\theta(x) \tilde{\mathbf{s}} \pi_\theta(y) \\ \pi_\theta(x \mathbf{i} y) &= (x \mathbf{i} y)/\theta = x/\theta \tilde{\mathbf{i}} y/\theta = \pi_\theta(x) \tilde{\mathbf{i}} \pi_\theta(y)\end{aligned}$$

por lo cual  $\pi_\theta$  preserva las operaciones de supremo e ínfimo.  $\square$

**Lemma 12.** Si  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$  un homomorfismo biyectivo, entonces  $F$  es un isomorfismo.

*Proof.* Debemos probar que  $F^{-1}$  es un homomorfismo. Sean  $F(x), F(y)$  dos elementos cualesquiera de  $L'$ , tenemos que:

$$\begin{aligned}F^{-1}(F(1)) &= F^{-1}(1') & F^{-1}(F(0)) &= F^{-1}(0') \\ F^{-1}(1') &= 1 & F^{-1}(0') &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F^{-1}(F(x) \mathbf{s}' F(y)) &= F^{-1}(F(x \mathbf{s} y)) & F^{-1}(F(x) \mathbf{i}' F(y)) &= F^{-1}(F(x \mathbf{i} y)) \\ &= x \mathbf{s} y & &= x \mathbf{i} y \\ &= F^{-1}(F(x)) \mathbf{s} F^{-1}(F(y)) & &= F^{-1}(F(x)) \mathbf{i} F^{-1}(F(y))\end{aligned}$$

Luego,  $F^{-1}$  es homomorfismo y por lo tanto  $F$  es isomorfismo.  $\square$

**Lemma 13.** Si  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$  es un homomorfismo, entonces  $I_F$  es un subuniverso de  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$ .

*Proof.* Dado que  $F$  es un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  utilizando el **Lemma 6** tenemos que  $I_F$  es subuniverso de  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  lo cual ya que  $0', 1' \in I_F$  implica que  $I_F$  es un subuniverso de  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$ .  $\square$

**Lemma 14.** Si  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$  es un homomorfismo de reticulados acotados, entonces  $\ker F$  es una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$ .

**Lemma 15.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  un reticulado acotado y  $\theta$  una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$ , entonces:

a)  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, 0/\theta, 1/\theta)$  es un reticulado acotado.

b)  $\pi_\theta$  es un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  en  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, 0/\theta, 1/\theta)$  cuyo núcleo es  $\theta$ .

**Lemma 16.** Si  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}^c, 0, 1) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', \mathbf{c}', 0', 1')$  un homomorfismo biyectivo, entonces  $F$  es un isomorfismo.

**Lemma 17.** Si  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}^c, 0, 1) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', \mathbf{c}', 0', 1')$  es un homomorfismo, entonces  $I_F$  es un subuniverso de  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', \mathbf{c}', 0', 1')$ .

**Lemma 18.** Si  $F : (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}^c, 0, 1) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', \mathbf{c}', 0', 1')$  es un homomorfismo de reticulados complementados, entonces  $\ker F$  es una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}^c, 0, 1)$ .

**Lemma 19.** Sea  $(L, s, i^c, 0, 1)$  un reticulado complementado y sea  $\theta$  una congruencia sobre  $(L, s, i^c, 0, 1)$ .

a)  $(L/\theta, \tilde{s}, \tilde{i}^c, 0/\theta, 1/\theta)$  es un reticulado complementado.

b)  $\pi_\theta$  es un homomorfismo de  $(L, s, i^c, 0, 1)$  en  $(L/\theta, \tilde{s}, \tilde{i}^c, 0/\theta, 1/\theta)$  cuyo núcleo es  $\theta$ .

**Lemma 20.** Sea  $(L, s, i)$  un reticulado. Son equivalentes:

(1)  $x i (y s z) = (x i y) s (x i z)$ , cualesquiera sean  $x, y, z \in L$

(2)  $x s (y i z) = (x s y) i (x s z)$ , cualesquiera sean  $x, y, z \in L$ .

*Proof.*  $\boxed{(1) \Rightarrow (2)}$  Notar que:

$$\begin{aligned} (x s y) i (x s z) &= ((x s y) i x) s ((x s y) i z) \\ &= (x s (z i (x s y))) \\ &= (x s ((z i x) s (z i y))) \\ &= (x s (z i x)) s (z i y) \\ &= x s (z i y) \\ &= x s (y i z) \end{aligned}$$

$\boxed{(2) \Rightarrow (1)}$  Notar que:

$$\begin{aligned} (x i y) s (x i z) &= ((x i y) s x) i ((x i y) s z) \\ &= (x i (z s (x i y))) \\ &= (x i ((z s x) i (z s y))) \\ &= (x i (z s x)) i (z s y) \\ &= x i (z s y) \\ &= x i (y s z) \end{aligned}$$

□

**Lemma 21.** Si  $(L, s, i, 0, 1)$  un reticulado acotado y distributivo, entonces todo elemento tiene a lo sumo un complemento.

*Proof.* Supongamos  $x \in L$  tiene complementos  $y, z$ . Se tiene:

$$\begin{aligned} y s x &= 1 = x s z \\ y i x &= 0 = x i z \end{aligned}$$

por lo cual:

$$y = y s 0 = y s (x i z) = (y s x) i (y s z) = 1 i (y s z) = (x s z) i (y s z) = (x i y) s z = 0 s z = z$$

Por lo tanto,  $y = z$ . □

**Lemma 22.** Si  $S \neq \emptyset$ , entonces  $[S]$  es un filtro. Más aún si  $F$  es un filtro y  $F \supseteq S$ , entonces  $F \supseteq [S]$ .

*Proof.* Recordemos:

$$[S] = \{y \in L : y \geq s_1 i \dots i s_n, \text{ para algunos } s_1, \dots, s_n \in S, n \geq 1\}$$

1.  $[S] \neq \emptyset$ : Ya que  $S \subseteq [S]$ , tenemos que  $[S] \neq \emptyset$ .
2.  $x, y \in [S] \Rightarrow x \dot{\vee} y \in [S]$ : Sean  $x, y$  tales que:

$$\begin{aligned} y &\geq s_1 \dot{\vee} s_2 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} s_n, \text{ i.e., } y \in [S] \\ z &\geq t_1 \dot{\vee} t_2 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} t_m, \text{ i.e., } z \in [S] \end{aligned}$$

con  $s_1, s_2, \dots, s_n, t_1, t_2, \dots, t_m \in S$ , entonces:

$$y \dot{\vee} z \geq s_1 \dot{\vee} s_2 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} s_n \dot{\vee} t_1 \dot{\vee} t_2 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} t_m$$

3.  $x \in [S] \text{ y } x \leq y \Rightarrow y \in [S]$ : Por construcción, claramente  $[S]$  cumple esta propiedad.

□

**Lemma 23. (Zorn)** Sea  $(P, \leq)$  un poset y supongamos que cada cadena de  $P$  tiene una cota superior, entonces existe un elemento maximal en  $P$ .

**Theorem 24. (Teorema del Filtro Primo)** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado distributivo y  $F$  un filtro. Supongamos  $x_0 \in L - F$ , entonces hay un filtro primo  $P$  tal que  $x_0 \notin P$  y  $F \subseteq P$ .

*Proof.* Sea:

$$\mathcal{F} = \{F_1 : F_1 \text{ es un filtro, } x_0 \notin F_1 \text{ y } F \subseteq F_1\}$$

Notar que  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ , por lo cual  $(\mathcal{F}, \subseteq)$  es un poset.

Veamos que cada cadena en  $(\mathcal{F}, \subseteq)$  tiene una cota superior. Sea  $C$  una cadena.

- Si  $C = \emptyset$ , entonces cualquier elemento de  $\mathcal{F}$  es cota de  $C$ .
- Si  $C \neq \emptyset$ . Sea:

$$G = \{x \in L : x \in F_1, \text{ para algún } F_1 \in C\}$$

Veamos que  $G$  es un filtro.

1. Es claro que  $G \neq \emptyset$ .
2. Supongamos que  $x, y \in G$ . Sean  $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$  tales que  $x \in F_1$  y  $y \in F_2$ .
  - Si  $F_1 \subseteq F_2$ , entonces ya que  $F_2$  es un filtro tenemos que  $x \dot{\vee} y \in F_2 \subseteq G$ .
  - Si  $F_2 \subseteq F_1$ , entonces tenemos que  $x \dot{\vee} y \in F_1 \subseteq G$ .

Ya que  $C$  es una cadena, tenemos que siempre  $x \dot{\vee} y \in G$ .

3. En forma analoga se prueba la propiedad restante ...

Por lo tanto, tenemos que  $G$  es un filtro. Además  $x_0 \notin G$ , por lo que  $G \in \mathcal{F}$  es cota superior de  $C$ . Por el **Lemma 23**,  $(\mathcal{F}, \subseteq)$  tiene un elemento maximal  $P$ . Veamos que  $P$  es un filtro primo.

Supongamos  $x \mathbf{s} y \in P$  y  $x, y \notin P$ , entonces ya que  $P$  es maximal tenemos que:

$$x_0 \in [P \cup \{x\}] \cap [P \cup \{y\}]$$

Ya que  $x_0 \in [P \cup \{x\}]$ , tenemos que hay elementos  $p_1, \dots, p_n \in P$ , tales que:

$$x_0 \geq p_1 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} p_n \dot{\vee} x$$

Ya que  $x_0 \in [P \cup \{y\}]$ , tenemos que hay elementos  $q_1, \dots, q_m \in P$ , tales que:

$$x_0 \geq q_1 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} q_m \dot{\vee} y$$

Denotemos:

$$p = p_1 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} p_n \dot{\vee} q_1 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} q_m$$

tenemos que:

$$\begin{aligned} x_0 &\geq p \dot{\vee} x \\ x_0 &\geq p \dot{\vee} y \end{aligned}$$

Se tiene que  $x_0 \geq (p \dot{\vee} x) \dot{\wedge} (p \dot{\vee} y) = p \dot{\vee} (x \dot{\wedge} y) \in P$ , lo cual es absurdo ya que  $x_0 \notin P$ .  $\square$

**Corollary 25.** Sea  $(L, \dot{\vee}, \dot{\wedge}, 0, 1)$  un reticulado acotado distributivo. Si  $\emptyset \neq S \subseteq L$  es tal que  $s_1 \dot{\vee} s_2 \dot{\vee} \dots \dot{\vee} s_n \neq 0$ , para cada  $s_1, \dots, s_n \in S$ , entonces hay un filtro primo que contiene a  $S$ .

*Proof.* Dado que  $[S] \neq L$ , se puede aplicar el **Theorem 24** (Teorema del filtro primo).  $\square$

**Lemma 26.** Sea  $(B, \dot{\vee}, \dot{\wedge}, \dot{\vee}^c, 0, 1)$  un álgebra de Boole, entonces para un filtro  $F \subseteq B$  las siguientes son equivalentes:

(1)  $F$  es primo

(2)  $x \in F$  ó  $x^c \in F$ , para cada  $x \in B$ .

*Proof.*  $\boxed{(1) \Rightarrow (2)}$  Ya que  $x \dot{\wedge} x^c = 1 \in F$ , y  $F$  es filtro primo, por definición de filtro primo se cumple que  $x \in F$  ó  $x^c \in F$ .

$\boxed{(2) \Rightarrow (1)}$  Supongamos que  $x \dot{\wedge} y \in F$  y que  $x \notin F$ , entonces por (2),  $x^c \in F$  y por lo tanto tenemos que:

$$y \geq x^c \dot{\vee} y = 0 \dot{\wedge} (x^c \dot{\vee} y) = (x^c \dot{\vee} x) \dot{\wedge} (x^c \dot{\vee} y) = x^c \dot{\vee} (x \dot{\wedge} y) \in F$$

lo cual dice que  $y \in F$ .  $\square$

**Lemma 27.** Sea  $(B, \dot{\vee}, \dot{\wedge}, \dot{\vee}^c, 0, 1)$  un álgebra de Boole. Supongamos que  $b \neq 0$  y  $a = \inf A$ , con  $A \subseteq B$ , entonces si  $b \dot{\vee} a = 0 \exists e \in A$  tal que  $b \dot{\vee} e^c \neq 0$ .

*Proof.* Supongamos que para cada  $e \in A$ , tengamos que  $b \dot{\vee} e^c = 0$ , entonces tenemos que para cada  $e \in A$ ,

$$b = b \dot{\vee} (e \dot{\wedge} e^c) = (b \dot{\vee} e) \dot{\wedge} (b \dot{\vee} e^c) = b \dot{\vee} e$$

lo cual nos dice que  $b$  es cota inferior de  $A$ . Pero si  $b \leq a$ , entonces  $b = b \dot{\vee} a = 0$ , es decir,  $b = 0$ , lo cual es un absurdo dado que por hipótesis sabíamos que  $b \neq 0$ .  $\square$

**Theorem 28. (Rasiova y Sikorski)** Sea  $(B, \dot{\vee}, \dot{\wedge}, \dot{\vee}^c, 0, 1)$  un álgebra de Boole. Sea  $x \in B$ , tal que  $x \neq 0$ . Supongamos que  $A_1, A_2, \dots$  son subconjuntos de  $B$  tales que existe  $\inf(A_j)$ , para cada  $j = 1, 2, \dots$ , entonces hay un filtro primo  $P$  el cual cumple:

a)  $x \in P$

b)  $A_j \subseteq P \Rightarrow \inf(A_j) \in P$ , para cada  $j = 1, 2, \dots$

*Proof.* Sea  $a_j = \inf(A_j)$ , para  $j = 1, 2, \dots$  construiremos inductivamente una sucesión  $b_0, b_1, \dots$  de elementos de  $B$  tal que:

- $b_0 = x$

- $b_0 \text{ i } \dots \text{ i } b_n \neq 0$ , para cada  $n \geq 0$
- $b_j = a_j$  ó  $b_j^c \in A_j$ , para cada  $j \geq 1$

(1) Definamos  $b_0 = x$

(2) Supongamos ya definimos  $b_0, \dots, b_n$ , veamos como definir  $b_{n+1}$ .

- Si  $(b_0 \text{ i } \dots \text{ i } b_n) \text{ i } a_{n+1} \neq 0$ , entonces definamos  $b_{n+1} = a_{n+1}$ .
- Si  $(b_0 \text{ i } \dots \text{ i } b_n) \text{ i } a_{n+1} = 0$ , entonces por el **Lemma 27**, tenemos que hay un  $e \in A_{n+1}$  tal que  $(b_0 \text{ i } \dots \text{ i } b_n) \text{ i } e^c \neq 0$ , lo cual nos permite definir  $b_{n+1} = e^c$ .

Dado que el conjunto  $S = \{b_0, b_1, \dots\}$  satisface la hipótesis del **Corollary 25**, por lo tanto hay un filtro primo  $P$  tal que  $\{b_0, b_1, \dots\} \subseteq P$ , el cual satisface las propiedades (a) y (b) dado que así lo construimos.  $\square$