



UNIVERSITÀ DI PERUGIA  
Dipartimento di Matematica e Informatica



Appunti *Simulazione*

# Formulario

---

Anno Accademico 2021-2022

*Last Update: January 18, 2023*

# Contents

<b>1</b>	<b>Distribuzioni</b>	<b>4</b>
1.1	Stimare la Distribuzione . . . . .	4
1.2	Calcolare la Probabilità di una Distribuzione . . . . .	5
1.2.1	Esponenziale . . . . .	5
1.2.1.1	Senza Intervalli . . . . .	5
1.2.1.2	Con Intervalli . . . . .	5
1.2.2	Poisson . . . . .	5
1.2.3	Geometrica . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Goodness of Fit</b>	<b>6</b>
2.1	Test $\chi^2$ . . . . .	6
2.1.1	Dati senza Intervalli . . . . .	6
2.1.2	Dati con Intervalli . . . . .	7
2.2	Test Kolmogorov . . . . .	8
2.2.1	Dati Senza Intervalli . . . . .	9
2.2.2	Dati Con Intervalli . . . . .	9
2.3	Informazioni utili su Formule . . . . .	10
2.3.1	Komorov . . . . .	10
2.3.1.1	<i>cumsum</i> . . . . .	10



*”Oi, con quanto sentimento  
defeco sul tuo naso,  
così che ti coli sul mento.”*

Wolfgang Amadeus Mozart

# Chapter 1

## Distribuzioni

### 1.1 Stimare la Distribuzione

Per stimare una distribuzione avendo solo i dati iniziali del problema effettua le seguenti operazioni:

**N.B.** nel caso di *Intervalli*,  $categoria_i$  va sostituito con *Punto Medio Intervallo<sub>i</sub>*

1.  $n = \sum f_i$ : assicurati di aver calcolato la somma totale delle osservazioni

2. Calcola la **Media**:

(a) Aggiungi *Colonna Totale*:  $categoria_i * f_i$

(b) Calcola la media effettiva con:  $media = \frac{\sum totale}{n}$

3. Calcola la **Varianza**  $\sigma^2$ :

(a) Aggiungi *Colonna ris*:  $(categoria_i - media)^2 * f_i$

(b) Calcola la varianza effettiva con:  $\sigma^2 = \frac{\sum ris}{n-1}$

4. Calcola la **Deviazione Standard**  $\sigma$ :

(a)  $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

5. Calcola  $V = \frac{\sigma}{media}$

Una volta completati tutti i calcoli controlla se il coefficiente  $V$  è vicino ad 1 e:

- se lo è allora utilizza l'**Esponenziale**,
- se non lo è è **Poissoniana** ma per avere una verifica, controlla che la media e la varianza siano uguali.



**Note:**

Si può avere una prima idea del tipo di distribuzione anche osservando le frequenze per categoria:

- Se le frequenze hanno valori alti per le prime categorie e poi decrescono, probabilmente è esponenziale negativa.
- Se le frequenze hanno valori bassi per le prime categorie e poi crescono, probabilmente è esponenziale...
- Se le frequenze hanno valori alti nelle categorie centrali e bassi verso le categorie agli estremi, probabilmente è Poissoniana
- Nel caso in cui sia geometrica solitamente viene esplicitato.

## 1.2 Calcolare la Probabilità di una Distribuzione

### 1.2.1 Esponenziale

#### 1.2.1.1 Senza Intervalli

$$p(i) = \frac{e^{\frac{-\text{categoria}_i}{\text{media}}}}{\text{media}}$$

#### 1.2.1.2 Con Intervalli

$$p(i) = 1 - e^{\frac{-\text{categoria}_i}{\text{media}}}$$

### 1.2.2 Poisson

$$p(i) = \frac{e^{-\text{media}} * \text{media}^{\text{categoria}_i}}{\text{categoria}_i!}$$

### 1.2.3 Geometrica

$$p(i) = \rho * (1 - \rho)^{\text{categoria}_i}$$



# Chapter 2

## Goodness of Fit

### 2.1 Test $\chi^2$

Devi utilizzare questa sezione solo se il numero delle **osservazioni totale**  $n > 30$ .

#### 2.1.1 Dati senza Intervalli

Devi utilizzare questa sezione solo quando hai dei dati **Senza Intervalli**, devi anche fare attenzione che il **numero di osservazioni**  $n > 30!!$

Operazioni da effettuare:

1. Riportare i dati in una tabella in Calc:
  - *Colonna 1: categorie*
  - *Colonna 2:  $f_i$*
2. Raggruppare le categorie se  $\exists categoria < 5$ :
  - Parti dall'ultimo a salire (dal basso verso l'alto delle categorie)
  - Raggruppare tutte nell'ultima categoria che le faccia diventare maggiori di 5 sommando le frequenze.
  - *Esempio:*



	A	B	C	D	E
1	VALORI	frequenze	f(i) raggruppate		
2	0	59	59		
3	1	26	26		
4	2	24	24		
5	3	18	18		
6	4	12	12		
7	5	5	5		
8	6	4	12		
9	7	3			
10	9	3			
11	11	2			
12					

	A	B	C	D
1	VALORI	frequenze	f(i) raggruppate	
2	0	59	59	
3	1	26	26	
4	2	24	24	
5	3	18	18	
6	4	12	12	
7	5	5	9	
8	6	1		
9	7	1		
10	9	1		
11	11	1		

3. Calcolare:

- $n = \sum(f_i)$
- $f(i) = f_i/n$ : non serve
- Capire la distribuzione se non è data (vedi 1.1)
- $p(i)$ : dipende dalla distribuzione (vedi 1.2)
- $F_i = n * p(i)$ : numero di intervalli unitari teorici con  $i$  arrivi
- $G_i = \frac{(f_i - F_i)^2}{F_i}$
- $V = \sum G_i$ : sommare tutti i valori di  $G$
- $df = \text{Numero Categorie} - 1 - \text{Numero Parametri Distribuzione}$

Una volta terminati i calcoli devi guardare la riga nella tabella del  $\chi^2$  (AGGIUNGERE REF) con lo stesso valore di  $df$ : devi controllare che il valore  $V$  ricada negli intervalli che non superino il  $P_{95}$ .

## 2.1.2 Dati con Intervalli

Devi utilizzare questa sezione solo quando hai dei dati divisi in **Intervalli**, devi anche fare attenzione che il **numero di osservazioni**  $n > 30$ !!

Calcoli da effettuare:

- Riportare i dati in una tabella in Calc:
  - Colonna 1: categorie*, probabilmente devi aggiungerle tu, parti da 0 in poi
  - Colonna 2: intervallo*, del tipo  $x_1 - x_2$ . Fai sempre attenzione che  $x_2 \geq x_1$  !!! In caso li inverti.
  - Colonna 3: frequenza*  $f_i$



2. Aggiungere *Colonna*  $x_1$  (intervallo più piccolo)
3. Aggiungere *Colonna*  $x_2$  (intervallo più grande)
4. Aggiungere *Colonna Punto Medio Intervalli* tra  $x_2$  e  $x_1$  con  $\frac{x_1+x_2}{2}$
5. Calcolare:
  - (a) capire la distribuzione se non è data (vedi 1.1)
  - (b)  ~~$f(i) = f_i/n$ : non serve~~
  - (c)  $p(i) = p(x_2) - p(x_1)$  = calcolare secondo la distribuzione (vedi 1.2)
  - (d)  $F_i = n * p(i)$ : numero di intervalli unitari teorici con  $i$  arrivi
  - (e)  $G_i = \frac{(f_i - F_i)^2}{F_i}$
  - (f)  $V = \sum G_i$ : sommare tutti i valori di  $G$
  - (g)  $df$  = Numero Categorie  $- 1 -$  Numero Parametri Distribuzione
6. Raggruppare le categorie se  $\exists$  categoria  $< 5$ :
  - Parti dall'ultimo a salire (dal basso verso l'alto delle categorie)
  - Raggruppare tutte nell'ultima categoria che le faccia diventare maggiori di 5 sommando le frequenze.
  - *Esempio:*

	A	B	C	D	E
1	VALORI	frequenze	f(i) raggruppate		
2	0	59	59		
3	1	26	26		
4	2	24	24		
5	3	18	18		
6	4	12	12		
7	5	5	5		
8	6	4	12		
9	7	3			
10	9	3			
11	11	2			
12					

	A	B	C	D
1	VALORI	frequenze	f(i) raggruppate	
2	0	59	59	
3	1	26	26	
4	2	24	24	
5	3	18	18	
6	4	12	12	
7	5	5	9	
8	6	1		
9	7	1		
10	9	1		
11	11	1		

Una volta terminati i calcoli devi guardare la riga nella tabella del  $\chi^2$  (AGGIUNGERE REF) con lo stesso valore di  $df$ : devi controllare che il valore  $V$  ricada negli intervalli che non superino il  $P_{95}$ .

## 2.2 Test Kolmogorov

Devi utilizzare questa sezione solo se il numero delle **osservazioni totale**  $n < 30$ .





### 2.2.1 Dati Senza Intervalli

Devi utilizzare questa sezione solo quando hai dei dati **Senza Intervalli**, devi anche fare attenzione che il **numero di osservazioni totali**  $n < 30!!$

Operazioni da effettuare:

1. Riportare i dati in una tabella in Calc:

- *Colonna categorie*
- *Colonna frequenze  $f_i$*

2. Calcolare:

- (a)  $f(i) = f_i/n$ : frequenze osservate
- (b) Individuare la distribuzione di probabilità adatta (vedi 1.1)
- (c)  $p(i)$ : probabilità teorica (vedi 1.2)
- (d)  $d_i = \text{cumsum}(f(i))$ : somma cumulativa delle  $f(i)$
- (e)  $D_i = \text{cumsum}(p(i))$ : somma cumulativa delle  $p(i)$
- (f)  $D = |d_i - D_i|$ : la differenza assoluta
- (g)  $D_{max} = \max(D)$ : il massimo valore tra le differenze assolute  $D$

Una volta completati tutti i calcoli, cercare nella tabella di *Kolmogorov-Smirnov* la riga corrispondente al valore delle osservazioni totali  $n$ : se il valore  $D_{max}$  è sotto il  $D_{0,10}$  la distribuzione è accettata, altrimenti no.

### 2.2.2 Dati Con Intervalli

Devi utilizzare questa sezione solo quando hai dei dati **Senza Intervalli**, devi anche fare attenzione che il **numero di osservazioni totali**  $n < 30!!$

**N.B.:** *non abbiamo trovato esercizi con cui testare questa sezione !*

Operazioni da effettuare:

1. Riportare i dati in una tabella in Calc:

- *Colonna categorie*: probabilmente devi aggiungerle tu, parti da 0 in poi
- *Colonna intervallo*: del tipo  $x_1 - x_2$ . Fai sempre attenzione che  $x_2 \geq x_1$  !!! In caso li inverti.



- *Colonna frequenze  $f_i$*
- 2. Aggiungere *Colonna  $x_1$*  (estremo più piccolo dell'intervallo)
- 3. Aggiungere *Colonna  $x_2$*  (estremo più grande dell'intervallo)
- 4. Calcolare:
  - (a)  $f(i) = f_i/n$ : frequenze osservate
  - (b) Individuare la distribuzione di probabilità adatta (vedi 1.1)
  - (c)  $p(i) = p(x_2) - p(x_1)$ : probabilità teorica per ogni intervallo (vedi 1.2)
  - (d)  $d_i = \text{cumsum}(f(i))$ : somma cumulativa delle  $f(i)$
  - (e)  $D_i = \text{cumsum}(p(i))$ : somma cumulativa delle  $p(i)$
  - (f)  $D = |d_i - D_i|$ : la differenza assoluta
  - (g)  $D_{max} = \max(D)$ : il massimo valore tra le differenze assolute  $D$

Una volta completati tutti i calcoli, cercare nella tabella di *Kolmogorov-Smirnov* la riga corrispondente al valore delle osservazioni totali  $n$ : se il valore  $D_{max}$  è sotto il  $D_{0,10}$  la distribuzione è accettata, altrimenti no.

## 2.3 Informazioni utili su Formule

### 2.3.1 Komorov

#### 2.3.1.1 *cumsum*

Per calcolare *cumsum* (somma cumulativa) va eseguito il seguente procedimento:

- La prima cella resta uguale alla prima cella della colonna di riferimento (es.  $f(i)$  o  $p(i)$ )
- Dalla seconda cella in poi si blocca la prima cella della somma cumulativa (quella calcolata al punto precedente) e si somma fino alla cella  $i$  di riferimento (vedi Figura 2.1)

