
Aprendizagem Automática

FICHA N. 2

ENUNCIADO

Nome: Fábio Alexandre Cruz Silva Dias

Número: A42921

ATENÇÃO: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

1. No ficheiro `A42921_Q001_data.p`, encontram-se dois conjuntos de dados bidimensionais, um para treino e outro para teste, divididos em 3 classes (índices de 0 a 2). Há quatro variáveis num dicionário: as chaves `trueClassTrain` e `trueClassTest` contêm os índices das classes dos dados de treino e de teste, enquanto as chaves `Xtrain` e `Xtest` contêm os dados. Classifique o conjunto de teste com o classificador k vizinhos mais próximos (k NN), com $k = 15$, e utilize a métrica de distância, $\mathcal{D}_\diamond(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, entre dois vetores bidimensionais \mathbf{x} e \mathbf{y} (nota: caso haja empate, escolha a classe com menor índice).

$$\mathcal{D}_\diamond(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x} - \mathbf{y})^\top \begin{bmatrix} +1 & -2 \\ +1 & +1 \end{bmatrix} (\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

- (a) Para esta alínea, use valores inteiros.

- O número de pontos da classe ϖ_2 classificados na classe ϖ_1 é 9.
- O número de pontos da classe ϖ_0 classificados na classe ϖ_0 é 184.
- Todas as respostas anteriores.
- Nenhuma das respostas anteriores.

- (b) Para esta alínea, use valores inteiros.

- O número de acertos na classe ϖ_2 é de 189.
- O número total de erros é de 14.
- Todas as respostas anteriores.
- Nenhuma das respostas anteriores.

2. Considere o conjunto de 10 vetores bi-dimensionais, divididos em duas classes $\Omega = \{\varpi_0, \varpi_1\}$, representados na matriz $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 6 & 8 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 2 & -1 & 2 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ (os 5 primeiros vetores do conjunto pertencem à classe ϖ_0).

- (a) Considere que o conjunto \mathbf{X} foi classificado usando o classificador de distância ao centroide com a métrica de distância de cosseno. Considere ainda que ϖ_0 corresponde à classe dos negativos e ϖ_1 à dos positivos. Para esta alínea, use valores inteiros.

- O número de acertos na classe dos negativos é de 5.
- O número de acertos na classe dos positivos é de 5.
- Todas as respostas anteriores.

- iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (b) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas decimais.
 - i. A distância de Manhattan entre os vetores de média das duas classes é: 7.80.
 - ii. A distância de cosseno entre os vetores de média das duas classes é: 0.10.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (c) Considere que o conjunto X foi classificado usando o classificador de distância ao centroide com a métrica de distância euclidiana. Considere ainda que ϖ_0 corresponde à classe dos negativos e ϖ_1 à dos positivos. Para esta alínea, use valores inteiros.
 - i. O número de Falsos Negativos é: 0.
 - ii. O número de Verdadeiros Positivos é: 4.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (d) Considere que se pretende classificar novos vetores com o classificador de distância ao centroide usando a métrica de distância de Manhattan.
 - i. O vetor $\mathbf{x} = [4, -1]^\top$ é classificado na classe ϖ_0 .
 - ii. O vetor $\mathbf{x} = [3, -1]^\top$ é classificado na classe ϖ_0 .
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (e) Considere que se pretende classificar novos vetores com o classificador de distância ao centroide usando a métrica de distância de Mahalanobis.
 - i. O vetor $\mathbf{x} = [-3, 3]^\top$ é classificado na classe ϖ_1 .
 - ii. O vetor $\mathbf{x} = [-1, -2]^\top$ é classificado na classe ϖ_1 .
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
3. No ficheiro `A42921_Q003_data.p` estão os resultados de um classificador, num problema de duas classes (negativos e positivos). Há duas variáveis num dicionário: a chave `trueClass` contém os índices da verdadeira classe, enquanto a chave `estClass` contém o resultado da classificação (ambas as variáveis são `np.arrays` com valores inteiros 0-negativos, 1-positivos).
- (a) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 1 casa decimal.
 - i. A percentagem de exemplos da classe dos negativos é de 70.0%.
 - ii. A percentagem de acertos da classe dos negativos é de 77.5%.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (b) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 3 casas decimais.
 - i. O F-score é: 0.681.
 - ii. A taxa de falso positivos (falsos alarmes) é: 0.495.
 - iii. Todas as respostas anteriores.

- iv. Nenhuma das respostas anteriores.
- (c) Para esta alínea, use valores inteiros.
 - i. O número de Verdadeiros Positivos é: 227.
 - ii. O número de Falsos Negativos é: 138.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.