PREGUNTAS Y RESPUESTAS POST-OPERATORIO

En este momento debes tener muchas expectativas, dudas y miedos: ¿Qué fue lo que hice?, ¿Por qué me operé?, No pensé que fuera así,

Estos sentimientos y preguntas son normales

Lo único que te podemos recalcar es que estás en el momento más crucial para hacer todos los cambios de hábitos para que puedas lograr los objetivos que quieres:

- "BAJAR DE PESO"
- Mantenerlo
- Curarte o mejorarte de todas las enfermedades que dependen o están relacionadas con la OBESIDAD.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME DUELE?

Debes estar sintiendo un poco de dolor en el epigastrio, y una sensación de presión detrás del esternón, esto es normal, no te asustes. Primero es el área donde se realizó el procedimiento, tu estómago ahora esta pequeño y con edema (inflamado) por la cirugía que realizamos, cada vez que el estómago se contrae sientes como un cólico o apretón, a medida que pasa los días esta sensación va a ser menos frecuente y con menos intensidad. Para mejorar estos síntomas debes tomar los medicamentos ordenados en la formula postoperatoria.

¿QUÉ VOY A COMER?

Vas a seguir un plan nutricional que te vamos a entregar, donde te damos las recomendaciones por pasos de horarios, cantidades, ingredientes y preparaciones a usar.

Es normal sentir un poco de angustia por lo pequeño de las porciones, pero debes estar seguro que son las cantidades suficientes para tu metabolismo.

¿QUÉ DEBO HACER CON LAS HERIDAS?

El tipo de suturas que utilizamos son intradérmicas y absorbibles. NO hay puntos para quitar. Las dejamos cubiertas con Fixomul (cinta quirúrgica), las debes lavar con agua y jabón de baño normal. No hay necesidad de cambiar las banditas, 8 días después de la cirugía te retiras el Fixomul, lavas las heridas con agua y jabón de baño, posteriormente las cubres con Fixomul durante 8 días más. La humedad puede hacer que los bordes de la herida se pongan blancos y con secreciones.

En algunos pacientes se puede acumular líquido en las heridas a lo que se le llama SEROMA, el cual se puede drenar solo y salir por la herida
"agua sangre".

Si notas secreciones espesas y fétidas, debes llamarnos o consultar para revisarlas, ya que puede ser una infección de la misma.

DR. ANDRES FELIPE PACHECO
CIRUGÍA BARIATRICA Y LAPAROSCOPIA AVANZADA

¿HÁBITOS INTESTINALES?

En estos primeros días después de la cirugía, pueden pasar varias cosas:

Que presentes estreñimiento, por lo poco que estas comiendo. Si tienes incomodidades por no ir al baño, puedes tomar EVALAX frasco de 250 gr, 2 cucharadas disueltas en un vaso de agua cada noche.

Otros pacientes es el caso opuesto, por estar recibiendo una dieta completamente líquida, pueden tener un poco de diarrea o deposiciones completamente líquidas, pero en número normal (2 o 3 veces al día). En este caso es hacer algunos cambios en la dieta, por ejemplo, el tipo de frutas que se están consumiendo.

¿DEBO ESTAR EN CAMA?, ¿QUÉ PUEDO Y QUÉ NO PUEDO HACER?

No debes estar acostado, es todo lo contrario, debes intentar hacer tus actividades lo más normal posible. Hacer ejercicios respiratorios para evitar acumulación de secreciones en los pulmones.

A los 8 días de operado, debes empezar a hacer caminatas como ejercicio entre 20 y 30 minutos. Después del mes debes iniciar actividad cardiovascular y fortalecimiento muscular según la indicación del MedicoDeportólogo.

"Recuerda estas OPERADO NO ESTAS ENFERMO"

¿CUÁNDO DEBO ASISTIR A CONTROL MÉDICO?

De rutina el primer control es a la semana de operado.

Los controles los programamos según la evolución de cada paciente, generalmente son a los 8 días, a los 30 días con el Medico Deportólogo, 3 meses, 6 meses, 1 año y/o cuando el paciente lo necesite.

Pero ante cualquier duda te debes comunicar con nosotros.



SIGNOS DE ALARMA

Los signos de alarma que debes tener presente son:

- Fiebre (temperatura mayor de 38 grados).
- Dificultad para respirar, sensación de ahogo en reposo.
- Taquicardia.
- Presión arterial muy alta o muy baja.
- Lipotimias (mareo).
- Vómito y/o náuseas frecuentes.
- Dolor que no mejora a pesar de los analgésicos.
- Sangrado importante por las heridas o en la deposición

Si presentas alguno de estos síntomas debes acudir a la urgencia de la clínica donde te operamos y comunicarte de inmediato con nosotros.

DR. ANDRES FELIPE PACHECO
CIRUGÍA BARIATRICA Y LAPAROSCOPIA AVANZADA

SEDE MEDELLÍN
+57 (310) 516 9824
CRA 25A No. 1A SUR - 45
C.C. EL TESORO, TORRE MÉDICA 2,
CONS 1560

@afpacheco_cirugiabariatrica @afpacheco_
Dr. Andrés Felipe Pacheco Andres Felipe Pacheco

DR. ANDRES FELIPE PACHECO
CIRUGÍA BARIATRICA Y LAPAROSCOPIA AVANZADA

GUÍA POST - OPERATORIA

PRIMERA SEMANA

- Durante esta semana la dieta es SOLO LÍQUIDOS.
- Los alimentos pueden ser endulzados, con STEVIA para apoyar la pérdida de peso.
- La preparación de la sopa es la de una sopa normal, pero en el momento de servir se deben excluir todos los carbohidratos y únicamente con la PROTEÍNA y VERDURAS se licúa y luego se cuela quedando con una consistencia de crema.
- Tomar cada 15 minutos sorbos de AGUA o suero de rehidratación oral (se recomienda Electrolit).
- Las principales comidas se pueden reemplazar por batidos de proteínas, se sugiere ISO100, ISOPURE O PROWHEY, disueltos en agua, cantidad 1 vaso.
- En esta fase (primeros 8 días) debe evitar leche y café.

En estos primeros 10 días es muy importante mantenerte hidratado tomando frecuentemente agua, té o suero de rehidratación oral (Se sugiere Electrolit).

PRIMER DÍA POST - OPERATORIO

DESAYUNO
Tomar a tolerancia jugo de frutas (melón, mango, papaya, sandia/patilla) té, aromática, suero de rehidratación oral.

MERIENDA
Tomar a tolerancia té o jugo de frutas.

ALMUERZO
Tomar a tolerancia consomé (caldo de carne o pollo), sin sólidos.

MERIENDA
Tomar a tolerancia té o jugo de frutas.

CENA
Tomar a tolerancia caldo o jugo de frutas.

MERIENDA
Tomar a tolerancia jugo de frutas o gelatina.

DEL SEGUNDO ALOCTAVO DÍA POST - OPERATORIO

DESAYUNO
3 onzas de batido de Proteina, se sugiere ISOPURE, PROWHEY, disuelto en agua.

MERIENDA
3 onzas de té o jugo de frutas.

ALMUERZO
3 onzas de sopa de vegetales, carne o pollo, únicamente con la PROTEINA y VERDURAS se licúa y luego se cuela quedando con una consistencia de crema.

MERIENDA
3 onzas de té o jugo de frutas

CENA
3 onzas de sopa de vegetales, carne o pollo, únicamente con la PROTEINA y VERDURAS se licúa y luego se cuela quedando con una consistencia de crema.

MERIENDA
3 onzas de jugo de frutas o gelatina.

DEL NOVENO AL DÍA VEINTE

Comer a un ritmo lento.

Tómese el tiempo para masticar cada bocado y mastique bien los alimentos. Evite comer y beber al mismo tiempo... Beber 30 minutos antes y 30 minutos después de las comidas.

Tómese un descanso entre cada bocado para que pueda evaluar la sensación de saciedad.

Deja de comer o beber a la primera señal de saciedad... ¡RECONOCER LA SACIEDAD! Esto podría incluir: cualquier opresión al rededor del pecho, eructos, hipo.

En esta fase puede integrar a la diera leche descremada y café.

DESAYUNO
1 huevo, (a su gusto, solo o con vegetales) o un yogurt bajo en azúcar , aguacate.

MERIENDA
Una porción de fruta fresca (evitar los cítricos) o 1 yogurt bajo en azúcar.

ALMUERZO
Una porción de pollo o pescado, acompañado de ensalada fresca o verduras al vapor, todo muy finamente picado.

Ó un pocillo de sopa de lentejas o fríjoles.

MERIENDA
Una porción de fruta fresca o 1 yogurt bajo en azúcar o un té verde con almendras.

CENA
3 onzas de batido de Proteina ISO100, ISOPURE O PROWHEY, disuelto en agua, si desea puede reemplazarlo por sopa o crema de vegetales.

DR. ANDRES FELIPE PACHECO
CIRUGÍA BARIATRICA Y LAPAROSCOPIA AVANZADA

DEL DÍA VEINTE AL TREINTA POST OPERATORIO

Iniciar a los 20 días después de cirugía.

El objetivo es llegar al normopeso.

Seguir programa de ejercicio establecido con el Médico Deportologo en la consulta del primer mes.

DESAYUNO
1 huevo, con cebolla, tomate, maíz tierno, champiñones o un yogurt bajo en azúcar, o una porción de jamón y queso.

MERIENDA
Una porción de fruta fresca, frutos secos o 1 yogurt bajo en azúcar.

ALMUERZO
Una porción de pollo o pescado o carne molida, acompañado de ensalada fresca o verduras al vapor, todo muy finamente picado ó un pocillo de sopa de lentejas o fríjoles.

MERIENDA
Una porción de fruta fresca, frutos secos o 1 yogurt bajo en azúcar.

CENA
Una porción de pollo o pescado o carne molida, acompañado de ensalada fresca o verduras al vapor, todo muy finamente picado.

¡RECUERDA!



No se debe consumir ningún tipo de licor durante los primeros cuatro (4) meses posteriores a la cirugía, ni bebidas con gas.



El ejercicio es básico para lograr la pérdida de peso y mantenerla.