

Espaços Métricos - Capítulo 1

Fabio Zhao Yuan Wang*

Considere o espaço euclidiano \mathbb{R}^n . Os pontos de \mathbb{R}^n são listas $x = (x_1, \dots, x_n)$ onde $x_i \in \mathbb{R}$ para todo $i \in \mathbb{N}_{\leq n}$. Há três maneiras de definir distância entre dois pontos em \mathbb{R}^n . Dados $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$,

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad d'(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|, \quad d''(x, y) = \max_{i \in \mathbb{N}_{\leq n}} |x_i - y_i|.$$

Proposição 1: Sejam d , d' e d'' métricas de \mathbb{R}^n definidas como a pouco. Para cada $x, y \in \mathbb{R}^n$, temos que:

$$d''(x, y) \stackrel{(1)}{\leq} d(x, y) \stackrel{(2)}{\leq} d'(x, y) \stackrel{(3)}{\leq} n \cdot d''(x, y),$$

onde $n \in \mathbb{N}$.

Dem: Vejamos a desigualdade (1). Seja $j \in \mathbb{N}_{\leq n}$ tal que $|x_j - y_j| = d''(x, y)$, então,


$$|x_j - y_j| = \sqrt{(x_j - y_j)^2} \leq \sqrt{(x_j - y_j)^2 + C},$$

onde $C \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Note que, para $A = \mathbb{N}_{\leq n} \setminus \{j\}$, temos que $d_j(x, y) = \sqrt{\sum_{i \in A} |x_i - y_i|^2} \geq 0$, visto que d_j é na verdade a métrica d aplicada a pontos em \mathbb{R}^{n-1} . Deste modo, seja $c = d_j^2(x, y)$. Com isto,

$$d''(x, y) = |x_j - y_j| \leq \sqrt{(x_j - y_j)^2 + d_j^2(x, y)} = \sqrt{d^2(x, y)} = d(x, y),$$

como queríamos.

tst

*  Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cidade, Paraná, Brasil. ✉ fabioyuan@gmail.com.